

大切な腎臓を守るためにG市の特徴を見てみよう

腎臓の病気分類	GFR基準 (mg/分)	年代	糸球体ろ過量 (GFR) (mg/分)	血清クレアチニン 1.3mg/分以上	+危険因子の重なり				
					血圧	尿酸	脂質異常	糖代謝異常	BMI
					収縮期: 140mmHg以上 拡張期: 90mmHg以上 または高血圧で治療中	7mg/dl以上 または 高尿酸血症・痛風で 治療中	LDL: 140mg/dl以上 または 高脂血症で治療中	空腹時血糖: 110mg/dl以上 随時血糖: 140mg/dl以上 HbA1c: 5.5%以上 または糖尿病で治療 中	25以上
(人工透析期)	15.0未満	70代	10.7	4.96	○	○			
腎機能不全期	15 29.9	60代	17.2	2.62	○		○		
		80代	19.6	2.9	○	○			
		70代	22.6	2.61	○	○			
		80代	23.1	2.51	○	○			
		70代	24.1	2.5	○	○	○	○	○
		80代	25.9	2.27	○	○	○	○	
		70代	26.4	2.27	○	○	○	○	
		60代	26.8	2.29	○	○			○
		70代	29.3	2.1	○	○	○		○
		90代	29.7	1.99	○	○		○	
腎機能障害期	30.0 59.9	70代	30.5	2.01	○		○	○	
		50代	32.8	1.53	○	○	○		
		70代	33.8	1.86	○	○	○		○
		80代	34.3	1.79	○	○	○		
		70代	34.6	1.79	○				
		80代	35.2	1.35	○		○	○	○
		70代	35.6	1.76	○			○	
		80代	36.6	1.68	○	○			
		70代	37.2	1.32	○				
		60代	37.4	1.32					
		60代	37.9	1.69		○		○	
		40代	38.4	1.37	○				○
		70代	39.3	1.62	○	○		○	
		90代	39.4	1.56	○				
		80代	40.4	1.54	○				
		80代	41.2	1.53	○	○	○		
		60代	41.7	1.56	○	○	○		○
		70代	42.1	1.53	○	○		○	○
		70代	42.5	1.5		○			
		60代	42.8	1.53	○	○		○	
		80代	43.5	1.46	○	○			
		80代	44.2	1.44	○	○			
		80代	44.8	1.42	○	○			
		80代	45.1	1.41	○	○			
		60代	45.9	1.44	○			○	
		40代	45.9	1.55	○	○	○		○
		70代	47.1	1.38	○	○			○
		80代	47.3	1.35			○	○	
		70代	47.4	1.36	○	○	○		
		70代	47.9	1.37	○	○	○	○	○
		70代	47.9	1.36			○		
		60代	47.9	1.38	○	○	○	○	○
		70代	48.2	1.34					
		80代	48.4	1.33	○	○			
		70代	48.9	1.35	○				○
		70代	48.9	1.34	○	○	○		○
80代	49.3	1.31	○						
70代	49.4	1.34	○						
60代	49.6	1.35	○		○	○			
50代	49.9	1.4	○			○			
70代	50.2	1.31	○			○			
70代	50.4	1.31	○	○					
50代	50.7	1.35	○	○					
60代	51.2	1.31	○	○		○	○		
60代	51.3	1.31	○	○			○		
50代	51.7	1.35	○	○	○				
60代	51.8	1.31	○	○					
計		58		重なりの数(人) 割合	52 89.7%	38 65.5%	21 36.2%	19 32.8%	16 27.6%

高血圧+高尿酸の重なり 36名 (62%)