


医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B01-12004	02年3月6日	登録番号	02年2月21日	同一症例番号	年月日	死・感・重未・先・癌・改・OTC	
区分	副作用・感染症	15日(30日)	情報入手日	02年2月21日	同一症例番号	年月日	死・感・重未・先・癌・改・OTC	
患者略名	男・女	入院・外来・不明	妊娠(無)・有(妊娠週)・不明	医薬品副作用歴	無・不明	主な既往歴、患者の体質等	無・不明 (厚生労働省処理欄)	
	81歳	医療機関所在地:	職業:	有()	有()	有()	有()	
販売名 (企業名)	S・O	一般名	使用法		使用理由 原疾患には下線 合併症には()	副作用・ 感染症名	幻覚	
			経路	一日量				開始
タミフル (日本ロシユ)	S	リン酸オセルタミビル	P0	150mg	02.2.13	02.2.17	インフルエンザ	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過
ミノマイシン (ワイズレダリー)	O	塩酸ミノサイクリン	P0	不明	02.2.13	02.2.17	インフルエンザ	
キョーリンAP2顆粒 (杏林)	O	シメトリド・無水カ	P0	不明	02.2.13	02.2.17	インフルエンザ	
フロム (サントリー)	O	フェイン	P0	不明	02.2.18	02.2.20	不明	
ロキソニン (三共)	O	ロキソプロフェンナ トリウム	P0	不明	02.2.18	02.2.20	不明	
その他の治療	無・有	(放射線療法 輸血 手術 麻酔 その他())	不明	不明	不明	不明	不明	不明
再投与	無・有	(再発・再発せず)	不明	不明	不明	不明	不明	不明
転帰	回	(02年2月20日)						



(三六)	ロキソノロノエンブ トリウム	手術	麻酔	その他 ()	・ <u>不明</u>	再投与	無・有 (再発・再発せず) ・ <u>不明</u>	転帰 回 (02年2月20日)

<p>識別番号 B01-12004</p>	<p>02年3月6日</p>	<p>担当医等の意見</p>		<p>報告企業の意見</p>
<p>副作用の程度(本剤との因果関係) 幻覚：軽微(不明) 担当医のコメント： 幻覚を見たのは前の施設での処方なので詳細は不明。高齢者なので、個人の精神的なもの かもしれない。</p>		<p>処置と今後の対策</p>		
<p>使用上の注意の記載状況等</p>		<p>MCN 307489 当症例については、詳細調査を試みたが担当医の協力が得られず、これ以上の調査は困難であるため、当情報をもって最終報告とする。尚、本症例票は弊社医薬情報担当者からの情報に基づき作成した。 本副作用について、担当医は「軽微」と判断したが、「一過性の幻覚」が重篤度分類にてGrade 2であることから、「軽微でも重篤でもない」と判断し、30日報告するものである。</p>		<p>参考事項</p>

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B01-12005	02年3月6日	登録番号	02年2月19日	同一症例番号	年月日	死・感・重未・先・癒・改・OTC
区分	副作用・感染症	15日(30日)	年月日	情報入手日	02年2月19日	同一症例番号	年月日
患者略名	男	入院・外来・不明	妊娠(無)	有(妊娠週)	不明	医薬品副作用歴	無・不明
	女	95歳	職業:	有()	有()	主な既往歴、患者の体質等	無・不明
			医療機関所在地:	有()	有()		(厚生労働省処理欄)
販売名 (企業名)	一般名	S・O	使用量		使用理由	副作用・ 感染症名	幻覚
タミフル (日本ロシユ)	リン酸オセルタミビル	S	経路	開始	原疾患には下線 合併症には()	年月日	
セキロイド (日医工)	テオフィリン	O	一日量	終了	インフルエンザ疑診		
タケプロン (武田)	ランソプラゾール	O	150mg	02.2.8	喘息予防		
プリンペラン (藤沢)	メトクロプラミド	O	100mg	00.1.24	潰瘍再発予防		
アモバン (アバンティス)	ゾピクロン	O	15mg	00.3.13	食欲不振		
レンドルミン (日本ベリンガー)	プロチゾラム	O	7.5mg	00.3.13	不眠		
ムコダイン (杏林)	カルボシステイン	O	0.25mg	00.3.13	不眠		
センナリド (ハヤシ、三和化学)	センノシド	O	1.5g	00.3.13	喘息予防、痰		
ダーゼン (武田)	セラペプターゼ	O	12mg (頓用)	00.5.26	便秘		
クラビビット (第一製薬)	レボフロキサシン	O	30mg	00.5.26	喘息予防、痰		
		O	300mg	02.2.7	不眠		
					腰痛 (骨粗鬆症)		
その他の治療	無・有(放射線療法 輸血 手術 麻酔 その他())	不明	再投与	無・有()	再発・再発せず	不明	転帰
							回 (02年2月15日)

医薬品副作用・感染症症例票

識別番号	B01-12005	02年3月6日	02年2月19日	02年2月19日	同一症例番号	年月日	死・感・重未・先・癌・改・OTC
区分	副作用・感染症	15日(30日)	情報入手日	02年2月19日	同一症例番号	年月日	死・感・重未・先・癌・改・OTC
患者略名	男	入院・外来	妊娠	無・不明	医薬品副作用歴	無・不明	主な既往歴、患者の体質等 無・不明 (厚生労働省処理欄)
F.T.	95歳	不明	妊婦	無・不明	(有) (ロキソニン：胃潰瘍(1999.12.28))	(有) (既往歴：胃潰瘍、気管支喘息)	(有) (既往歴：胃潰瘍、気管支喘息)
販売名 (企業名)	一般名	経路	一日量	開始	終了	使用理由 原疾患には下線 合併症には()	副作用・ 感染症名
		S					年月日
タミフル (日本ロシユ)	リン酸オセルタミビル	P0	150mg	02.2.8	02.2.12	インフルエンザ疑診	02. 2. 7
セキロイド (日医工)	テオファイリン	0	100mg	00.1.24	継続	喘息 予防	02. 2. 8
タケブロン (武田)	ランソプラゾール	0	15mg	00.3.13	継続	潰瘍再発 予防	02. 2. 12
プリンペラン (藤沢)	メトクロプラミド	0	15mg	00.3.13	継続	食欲 不振	02. 2. 13
アモバン (アベンテイス)	ゾピクロン	0	7.5mg	00.3.13	継続	不眠	02. 2. 15
レンドルミン (日本ベーリンガー)	プロチゾラム	0	0.25mg	00.3.13	継続	不眠	
ムコダイン (杏林)	カルボシステイン	0	1.5g	00.3.13	継続	喘息 予防、痰	
センナリド (ハカカ・三和化学)	センノシド	0	12mg (頓用)	00.5.26	継続	便秘	
ダーゼン (武田)	セラパプターゼ	0	30mg	00.5.26	継続	喘息 予防、痰	
クラビット (第一製薬)	レボフロキサシン	0	300mg	02.2.7	不明	不眠	

【臨床検査値】

施設基準値	02.2.6	2.7	2.12	2.15
最高体温 (°C)		39.0		36.8
血圧 (mmHg)	120/60			
RBC (×10 ⁴ /μL)	380-500	392		
Hb (g/dL)	11.3-15.1	12.0		
Hct (%)	34.0-45.8	36.6		
PLT (×10 ⁴ /μL)	15.0-40.0	14.1		
WBC (μL)	4300-8500	6100		
GOT (IU/L)	8-40	18		
CRP (mg/dL)	0-10	0		

副作用・感染症名 年月日 副作用・感染症名 年月日

02. 2. 7 39°Cの発熱、腰痛出現。CRP4+。
クラビット300mg/日 7日間処方。
02. 2. 8 インフルエンザ疑いのため、本剤150mg/日(分2)5日間処方。
02. 2. 12 幻覚(幻視[木が倒れてくる]、幻聴[ハチの発ぶ音])発現。
本剤投与中止。
02. 2. 13 幻覚軽快。
02. 2. 15 幻覚は完全に回復。
身長、体重不明

副作用・感染症名 年月日 副作用・感染症名 年月日

02. 2. 7 39°Cの発熱、腰痛出現。CRP4+。
クラビット300mg/日 7日間処方。
02. 2. 8 インフルエンザ疑いのため、本剤150mg/日(分2)5日間処方。
02. 2. 12 幻覚(幻視[木が倒れてくる]、幻聴[ハチの発ぶ音])発現。
本剤投与中止。
02. 2. 13 幻覚軽快。
02. 2. 15 幻覚は完全に回復。
身長、体重不明

識別番号	B01-12005	02年3月6日
<p>担当医等の意見</p> <p>副作用の程度(本剤との因果関係) 幻覚(幻視、幻聴)：軽微(本剤によるかもしれない) 担当医のコメント 因果関係ははっきりしないと思われる。</p>	<p>報告企業の意見</p>	
<p>処置と今後の対策</p>	<p>参考事項</p>	
<p>使用上の注意の記載状況等</p>	<p>MCN 307392</p> <p>本副作用について、担当医は「軽微」と判断したが、「一過性の幻覚」が重篤度分類にて Grade 2 であることから、「軽微でも重篤でもない」と判断し、30日報告するものである。</p>	