

医薬品副作用・感染症症例票(1)

識別番号	B01-2125	01年5月31日	登録番号	B01-100	01年4月6日	情報入手	01年3月29日	同一症例番号	年月日	死・感・重未・先・癌・改・OTC
区分	副作用・感染症	15日・30日	入院	外来・不明	妊娠	無・有(妊娠週)	不明	医薬品副作用歴	無・不明	(厚生労働省処理欄)
患者略名	男	73歳	医療機関所在地	北海道	職業	無職		主な既往歴、患者の体質等	無・不明	
T. K.	女							(既往歴：29歳時肺結核(左上葉切除)、20歳代虫垂炎、気管支喘息)		
販売名 (企業名)	S ・ O	一般名	使用法			使用理由 原疾患には下線 合併症には()	副作用・ 感染症名	年月日	急性肝障害、急性腎不全	
			経路	一日量	開始					終了
タミフル (日本ロシユ)	S	リン酸タミビル	P O	150mg	01.3.14	01.3.19	インフルエンザ [*] 疑い		副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過	
クラリスド錠 (ダイナボット)	S	クラリスロマイシ ン	P O	400mg	01.3.14	01.3.21	上気道炎	00.12.31	身長：■■■■cm、体重：■■■■kg。 喘息重積発作にて入院。全身状態はかなり悪かった。臨床検査により、肝障害が判明。低酸素血症による肝障害と考えた。A病院入院。ネオ フィリン、モダシン(用法・用量不明)を喘息治療のため投与開始。 ほとんどもど起き上がれずIVH施行。 足が腫れていたが、心不全による浮腫と判断し、フランシドテープを 使用。喘息にホクナリテープを使用。 肝機能検査値ほぼ正常範囲に回復。 臨床検査より高尿酸血症が判明。 腹部CT実施。肝膿瘍が大、小幾つか見られた。 A病院退院。 高熱、咳、鼻汁を主訴とし来院。胸部X線で異常なく、喘息も認めず。 インフルエンザと診断し、本剤150mg/日経口投与開始。患者帰宅。 本剤投与終了。	
ムコソルバン錠 (帝人)	S	塩酸アンブロキシ ール	P O	45mg	01.3.14	01.3.21	上気道炎	01.1.9		
ソランタール錠 (藤沢)	S	塩酸チアラミド	P O	3TAB	01.3.14	01.3.21	上気道炎	01.1.10		
アブレース (杏林)	S	トロキシピド	P O	300mg	01.3.14	01.3.21	上気道炎	01.1.11		
ニューロタン錠 (萬有)	O	ロサルタンカリウ ム	P O	50mg	00.12.31	継続	(高血圧)	01.1.22		
ラシックス20mg錠 (アベンティス)	O	フロセミド	P O	10mg	00.12.31	継続	(慢性心不全)	01.1.23		
プレドニン錠 (塩野義)	O	プレドニゾン	P O	4mg	00.12.31	継続	気管支喘息	01.3.10		
フランシドテープ (トーアエイヨー)	O	硝酸イソソルビド	O D	不明 (屯用)	01.1.10	継続	(慢性心不全) 浮腫 (次ページに続く)	01.3.19 01.3.21		
その他の治療	無・有	(放射線療法 輸血 手術 麻酔 その他())	不明	再投与	無・有(再発・再発せず)・不明	転帰	死(01年4月1日)		(次ページに続く)	

医薬品副作用・感染症症例票(2)

識別番号	B01-2125	01年5月31日					
区分	副作用・感染症	15日・30日					
患者略名	男 T. K.	73歳					
登録番号	B01-100	01年4月6日					
情報入手	01年3月29日	同一症例番号					
入院(外来)	不明	主な既往歴、患者の体質等 無・不明 (喫煙:19歳~65歳:5本/日 飲酒なし アレルギー:喘息(花粉))					
医療機関所在地:北海道	妊娠(無)・有(妊娠週)・不明 職業:無職	(厚生労働省処理欄)					
販売名 (企業名)	S O	急性肝障害、急性腎不全					
一般名	経路	使用量	開始	終了	使用理由 原疾患には下線 合併症には()	副作用・ 感染症名	年月日
ホクナリンテープ (北陸製薬)	OD	不明 (屯用)	01. 1. 10	継続	気管支喘息	年月日	副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過
ガスター錠 20mg (山之内)	PO	40mg	01. 1. 15	継続	ステロイド使用	01. 3. 23	午前中嘔気が強く、腹痛もあり独歩でA病院来院。喘息発作は認められなかったが、血液検査にて肝機能異常、脱水によると思われる腎機能異常、炎症反応を認めた。喀痰の菌検査では常在菌のみ認められた。要入院と考えたが、満床につきB病院に転院紹介。精密検査の結果、急性肝障害で治療開始。その後黄疸発現。B病院入院。急性腎不全となり、血漿交換、透析を開始する。意識レベル低下。肝炎ウイルス(A,B,C)、EBウイルス、単純ヘルペスウイルス検査全て陰性。
フルタイド (ガラクト・スミダイン)	IH	400µg	01. 1. 23	継続	気管支喘息	01. 3. 24	肝不全、腎不全により死亡。
ユニファイル錠 200 (大塚)	PO	200mg	01. 1. 30	継続	気管支喘息 (糖尿病) (高尿酸血症)	01. 3. 31 01. 4. 1 AMI:05	剖検なし。

その他の治療	無・有 (放射線療法	輸血	手術	麻酔	その他 ()) ・不明	再投与	有 (再発・再発せず) ・不明	転帰	死 (01年4月1日)
--------	------------	----	----	----	-------	---------	-----	-----------------	----	-------------

医薬品副作用・感染症症例票(3)

【臨床検査値】<A病院>

基準値	単位	00.12.31	01.1.1	1.3	1.5	1.8	1.11	1.18	1.25	2.1	2.13	2.20	3.6	3.21	3.23	
体温	℃															
血圧	mmHg	134 / -				202 / -							36.9		36.6	
WBC	$\times 10^3$	6.9	9.5				8.5	8.0	7.4	7.9	8.5	8.4	147 / 82		168 / 96	
RBC	$\times 10^4$	456	493				430	473	509	468	506	471	474		475	
Hb	g/dL	12.0	13.2				11.6	12.8	13.7	12.8	14.2	13.1	39.6		40.7	
Ht	%	37.0	40.0				34.9	38.1	41.5	38.1	41.8	38.9	39.6		40.7	
MCV	μm^3	81.1	81.1				81.2	80.5	81.3	81.4	82.5	82.6	83.4		85.8	
MCH	Pg	26.3	26.7				27.0	27.1	26.8	27.4	28.1	27.8	27.7		27.8	
MCHC	%	32.4	32.9				33.2	33.6	33.0	33.6	34.0	33.7	33.1		32.4	
RDW	%	17.5	18.0				18.8	18.5	18.8	20.4	20.3	20.2	19.8		18.2	
Plt	$\times 10^4$	18.5	20.4				22.5	21.0	18.1	19.3	23.3	23.3	20.9		24.8	
Pct	%	0.171	0.189				0.192	0.181	0.148	0.146	0.182	0.184	0.167		0.21	
MPV	μm^3	9.2	9.2				8.5	8.6	8.2	7.6	7.8	7.9	8.0		8.5	
PDW	%	16.5	16.2				16.4	16.4	16.9	16.0	16.3	16.6	15.7		16.5	
Stab	%														1	
Seg	%	84	88				82	81	89	67	63	63	66		93	
Lympho	%	9	8				10	10	5	25	29	29	24		3	
Mono	%	5	2				6	7	5	6	6	6	8		2	
Eosino	%	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	
Baso	%	1	1				1	1	1	1	1	1	1		1	
A-Lymph	%								1							
Metamye	%															
TP	g/dL	5.4	5.5				5.1	6.0	6.6	5.8	6.5	5.7	6.0		6.0	
T-Bil	mg/dL	2.26	2.41				1.11	1.28	0.87	0.81	0.59	0.52	0.56		2.36	
TTT	KU						3.1									
ZTT	KU						4.0									
GOT	IU/L	177	104				14	18	28	14	18	20	16		1943	
GPT	IU/L	315	276				28	34	52	21	13	9	8		1110	
ALP	IU/L	265	187				151	172	236	245	210	198	176		299	
LDH	IU/L	414	314				249	260	458	293	314	265	263		2978	
γ -GTP	IU/L						57									
Ch-E	IU/L						110	121	124	120	176	168	195		146	
Amy	IU/L	92	104				97									
CPK	IU/L	59	48				62									
BUN	mg/dL	28.0	15.7				16.6	22.2	26.1	27.9	17.6	16.6	14.2		34.8	
Cre	mg/dL	1.1	1.0				1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9		1.4	
UA	mg/dL						7.0	7.3	7.3	8.0	7.3	7.4	7.5		14.5	
Na	mEq/L	135	138				138	138	138	142	140	139	143			
K	mEq/L	2.8	3.6				4.0	4.0	5.0	4.2	4.5	4.5	4.3			
Cl	mEq/L	93	96				99	97	100	105	100	102	104			
Ca	mg/dL						4.3	4.6	4.6	4.4	4.7	4.5	4.5			
T-Cho	mg/dL						168									
TG	mg/dL						75									
HDL-C	mg/dL						57									
NEFA	μ Eq/L						460									
CRP	mg/dL						1.22	0.23	0.07	0.37	0.23	0.09	0.51		2.92	
チチリソ	pg/ml						18.25									
随時尿 AMY	IU/L						300								148	
血糖																

医薬品副作用・感染症症例票(4)

【臨床検査値】〈B病院〉

	単位	基準値	01.3.23	3.26	3.30
体温	℃		37.0	36.5	37.2
血圧	mmHg		147/99	135/82	150/72
WBC		4000-8000	15100	15000	19800
RBC	×10 ⁴	430-570	422	517	416
Hb	g/dL	14-18	12.0	14.7	11.6
Plt	×10 ⁴	12-40	21.0	3.8	1.4
総ビリルビン	mg/dL	0.2-1.1	2.39	4.86	11.86
直接ビリルビン	mg/dL	0.0-0.6	1.23	2.97	7.92
AST	IU/L	7-38	3756	570	70
ALT	IU/L	4-43	1827	1147	119
ALP	IU/L	100-280	218	202	162
LDH	IU/L	120-520	9027	2668	1321
LAP	IU/L	21-50	200	77	40
γ-GTP	IU/L	10-63	170	133	43
Ch-E	IU/L	32-187	113	106	192
BUN	mg/dL	8-22	54.8	123.6	84.7
Cre	mg/dL	0.6-1.1	1.76	4.57	4.07
UA	mg/dL	2.5-8.3	15.9	13.9	4.3
PT	秒	11-14	32		17.9
APTT	秒	28-37	44.7		81.6