

異常な行動が記録されている事例の集計

18. 異常な行動に関する患者の記憶の関係

【年齢①】

患者の記憶	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	2	5	26	27	13	43			41	25
No	35	95	71	73	17	57			123	75
小計	37	100	97	100	30	100	0		164	100
不明	57		47		11		3		118	
総計	94		144		41		3		282	

【年齢②】

患者の記憶	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	1	7	1	5	11	26	13	32	2	18	13	39			41	25
No	14	93	21	95	31	74	28	68	9	82	20	61			123	75
小計	15	100	22	100	42	100	41	100	11	100	33	100	0		164	100
不明	21		36		23		19		5		11		3		118	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

19. 異常な行動と光に対する反応の関係

【年齢①】

光に対する反応	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
No	33	97	55	98	14	100			102	98
Yes	1	3	1	2		0			2	2
小計	34	100	56	100	14	100	0		104	100
不明	60		88		27		3		178	
総計	94		144		41		3		282	

【年齢②】

光に対する反応	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	1	6		0		0	1	4		0		0			2	2
No	15	94	18	100	26	100	22	96	5	100	16	100			102	98
小計	16	100	18	100	26	100	23	100	5	100	16	100	0		104	100
不明	20		40		39		37		11		28		3		178	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計

20.異常な行動が発現したタミフル服用回数

【年齢①】

服用回数	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1	51	59	74	56	14	36			139	54
2	27	31	41	31	6	15			74	29
3	2	2	10	8	1	3			13	5
4	5	6	1	1	5	13			11	4
5	1	1	2	2	4	10			7	3
6	1	1	1	1	5	13			7	3
8		0	2	2	2	5			4	2
9		0		0	1	3			1	0
10		0	1	1	1	3			2	1
小計	87	100	132	100	39	100	0		258	100
不明	7		12		2		3		24	
総計	94		144		41		3		282	

【年齢②】

服用回数	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1	20	59	31	58	33	55	30	54	9	69	16	38			139	54
2	12	35	15	28	21	35	18	32	2	15	6	14			74	29
3		0	2	4	3	5	7	13		0	1	2			13	5
4	2	6	3	6	1	2		0		0	5	12			11	4
5		0	1	2	1	2		0	1	8	4	10			7	3
6		0	1	2	1	2		0		0	5	12			7	3
8		0		0		0		0	1	8	3	7			4	2
9		0		0		0		0		0	1	2			1	0
10		0		0		0	1	2		0	1	2			2	1
小計	34	100	53	100	60	100	56	100	13	100	42	100	0		258	100
不明	2		5		5		4		3		2		3		24	
総計	36		58		65		60		16		44		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計

21.異常な行動が発現した回数

【年齢①】

再投与再発の有無	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
再現性あり	16	17	12	8	3	7		0	31	11
再現性なし	23	24	29	20	7	17		0	59	21
再現性不明	54	57	103	72	29	71	3	100	189	67
再現性不明 (症状継続のため不明)		0		0	1	2		0	1	0
タミフル投与したか不明		0		0	1	2		0	1	0
服用前から	1	1		0		0		0	1	0
総計	94	100	144	100	41	100	3	100	282	100

【年齢②】

再投与再発の有無	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
再現性あり	9	25	7	12	8	12	3	5	1	6	3	7		0	31	11
再現性なし	6	17	17	29	13	20	10	17	5	31	8	18		0	59	21
再現性不明	20	56	34	59	44	68	47	78	10	63	31	70	3	100	189	67
再現性不明 (症状継続のため不明)		0		0		0		0		0	1	2		0	1	0
タミフル投与したか不明		0		0		0		0		0	1	2		0	1	0
服用前から	1	3		0		0		0		0		0		0	1	0
総計	36	100	58	100	65	100	60	100	16	100	44	100	3	100	282	100

22.異常な行動とインフルエンザ発症からの時間的な関係

【年齢①】

病日	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
0	31	42	40	34	10	27			81	36
1	27	37	46	40	5	14			78	35
2	10	14	19	16	8	22			37	16
3	2	3	3	3	7	19			12	5
4	2	3	4	3	4	11			10	4
5		0	2	2	1	3			3	1
6	1	1	1	1		0			2	1
7		0		0	1	3			1	0
8		0	1	1		0			1	0
9		0		0	1	3			1	0
小計	73	100	116	100	37	100	0		226	100
不明	21		28		4		3		56	
総計	94		144		41		3		282	

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計

【年齢②】

病日	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)	総計 (%)	
0	14	50	17	38	17	35	18	35	5	38	10	25		81	36
1	5	18	22	49	21	44	20	38	4	31	6	15		78	35
2	7	25	3	7	6	13	10	19	2	15	9	23		37	16
3	1	4	1	2	2	4	1	2		0	7	18		12	5
4	1	4	1	2	1	2	1	2	1	8	5	13		10	4
5		0		0	1	2	1	2		0	1	3		3	1
6		0	1	2		0	1	2		0		0		2	1
7		0		0		0		0		0	1	3		1	0
8		0		0		0		0	1	8		0		1	0
9		0		0		0		0		0	1	3		1	0
小計	28	100	45	100	48	100	52	100	13	100	40	100	0	226	100
不明	8		13		17		8		3		4		3	56	
総計	36		58		65		60		16		44		3	282	

23. 服用開始から異常な行動発現までの時間

【年齢①】

異常な行動発現までの時間	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
30分以内	4	10	2	3	1	9			7	6
30分から1時間以内	4	10	4	7	1	9			9	8
1時間から2時間以内	4	10	6	10	2	18			12	11
2時間から3時間以内	4	10	9	16		0			13	12
3時間から4時間以内	5	13	8	14	1	9			14	13
4時間から5時間以内	5	13	3	5		0			8	7
5時間から6時間以内	2	5	1	2		0			3	3
6時間から12時間以内	9	23	15	26	3	27			27	25
12時間から24時間以内	2	5	9	16		0			11	10
24時間から72時間以内		0	1	2	2	18			3	3
72時間から		0		0	1	9			1	1
小計	39	100	58	100	11	100	0		108	100
不明	55		86		30		3		174	
総計	94		144		41		3		282	

異常な行動が記録されている事例の集計

【年齢②】

異常な行動発現までの時間	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)	総計 (%)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合		件数	割合
30分以内	2	20	2	7	2	8		0		0	1	8		7	6
30分から1時間以内		0	4	14	3	13		0		0	2	15		9	8
1時間から2時間以内		0	4	14	2	8	3	11	1	25	2	15		12	11
2時間から3時間以内		0	4	14	3	13	5	18	1	25		0		13	12
3時間から4時間以内	4	40	1	3	3	13	4	14		0	2	15		14	13
4時間から5時間以内	1	10	4	14	1	4	2	7		0		0		8	7
5時間から6時間以内	1	10	1	3	1	4		0		0		0		3	3
6時間から12時間以内	2	20	7	24	6	25	8	29	1	25	3	23		27	25
12時間から24時間以内		0	2	7	2	8	6	21	1	25		0		11	10
24時間から72時間以内		0		0	1	4		0		0	2	15		3	3
72時間から		0		0		0		0		0	1	8		1	1
小計	10	100	29	100	24	100	28	100	4	100	13	100	0	108	100
不明	26		29		41		32		12		31		3	174	
総計	36		58		65		60		16		44		3	282	

24. 直前の服用から異常な行動発現までの時間

【年齢①】

異常な行動発現までの時間	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)	総計 (%)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合		件数	割合
30分以内	7	15	4	6	1	10		12	9
30分から1時間以内	9	19	7	10	1	10		17	13
1時間から2時間以内	7	15	11	16	1	10		19	15
2時間から3時間以内	5	10	14	20	2	20		21	17
3時間から4時間以内	6	13	10	14	1	10		17	13
4時間から5時間以内	5	10	5	7		0		10	8
5時間から6時間以内	4	8	2	3	1	10		7	6
6時間から12時間以内	5	10	15	22	2	20		22	17
12時間から		0	1	1	1	10		2	2
小計	48	100	69	100	10	100	0	127	100
不明	46		75		31		3	155	
総計	94		144		41		3	282	

異常な行動が記録されている事例の集計

【年齢②】

異常な行動発現までの時間	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)	総計 (%)	
30分以内	2	15	5	14	4	13		0		0	1	8		12	9
30分から1時間以内	3	23	6	17	6	20		0		0	2	17		17	13
1時間から2時間以内		0	7	20	4	13	5	15	2	50	1	8		19	15
2時間から3時間以内		0	5	14	3	10	9	27	2	50	2	17		21	17
3時間から4時間以内	4	31	2	6	3	10	6	18		0	2	17		17	13
4時間から5時間以内	1	8	4	11	2	7	3	9		0		0		10	8
5時間から6時間以内	2	15	2	6	2	7		0		0	1	8		7	6
6時間から12時間以内	1	8	4	11	6	20	9	27		0	2	17		22	17
12時間から		0		0		0	1	3		0	1	8		2	2
小計	13	100	35	100	30	100	33	100	4	100	12	100	0	127	100
不明	23		23		35		27		12		32		3	155	
総計	36		58		65		60		16		44		3	282	

25. 既往について

タミフルを以前に服用があると報告があったもの	11例
精神神経症状を発現した	6例
発現せず	5例
(その他:兄がタミフル使用時に異常な既往歴あり 1例 (11例には含まれていない))	
発熱時に譫妄・異常行動の既往あり	9例
他剤による副作用既往歴あり	3例
ウイルス性脳炎の既往歴あり	1例
睡眠時驚愕症の既往あり	8例

26. 他剤による同様な副作用の既往はあるか

他剤による既往	症例数
はい	8
いいえ	176
不明	98
総計	282

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例の集計

27. 睡眠時驚愕症等既往の有無

睡眠時驚愕症等の既往	症例数
有	13
無	144
不明	125
総計	282

28. 睡眠時驚愕症等の家族歴の有無

睡眠時驚愕症等の家族歴	症例数
有	2
無	123
不明	157
総計	282