

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注: 複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1. 異常な行動の発現症例: 年齢別

患者年齢別①

年齢	症例数	(%)
10歳未満	116	38
10代	150	49
20代	8	3
30代	5	2
40代	5	2
50代	7	2
60代	4	1
70代	6	2
80代	4	1
90代	4	1
不明	4	
総計	313	

患者年齢別②

年齢	症例数	(%)
6歳以下	44	14
7歳から9歳	72	23
10歳から12歳	69	22
13歳から15歳	62	20
16歳から18歳	16	5
19歳以上	46	15
不明	4	
総計	313	

2. 異常な行動の発現症例: 性別

性別	症例数	(%)
男性	223	72
女性	86	28
不明	4	
総計	313	

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

3. 異常な行動の発現症例：インフルエンザウイルス型別

ウイルス型	症例数	(%)
A型インフルエンザ	170	54
A&B型インフルエンザ	4	1
B型インフルエンザ	75	24
型不明	45	14
不明	16	5
予防*	3	1
総計	313	100

\* 予防症例2例の内訳

- 1) 咳、咽頭痛、関節痛、38℃台の発熱と記載されている。
- 2) インフルエンザ疑いの記載あり
- 3) 鎮咳剤・抗生剤等併用の記載あり

4. 異常な行動の発現時期別

【年別】

発現年度	症例数	(%)
2001	1	0
2002	4	1
2003	12	4
2004	10	3
2005	25	8
2006	68	22
2007	174	57
2008	12	4
小計	306	100
不明	7	
総計	313	

【シーズン別】

発現シーズン	症例数	(%)
2000-2001シーズン	1	0
2001-2002シーズン	4	1
2002-2003シーズン	11	4
2003-2004シーズン	11	4
2004-2005シーズン	15	5
2005-2006シーズン	77	25
2006-2007シーズン	166	54
2007-2008シーズン	21	7
小計	306	100
不明	7	
総計	313	

シーズン：8月から7月

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

5. インフルエンザ発症から異常な行動の発現までの病日  
 患者年齢別①

病日	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1日	38	42	42	36	11	29			91	37
2日	36	40	46	39	5	13			87	35
3日	12	13	19	16	8	21			39	16
4日	2	2	3	3	7	18			12	5
5日	2	2	4	3	4	11			10	4
6日以上	1	1	4	3	3	8			8	3
小計	91	100	118	100	38	100	0		247	100
不明	25		32		5		4		66	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

病日	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1日	15	43	23	41	18	37	19	36	5	38	11	27			91	37
2日	10	29	26	46	21	43	20	38	4	31	6	15			87	35
3日	8	23	4	7	6	12	10	19	2	15	9	22			39	16
4日	1	3	1	2	2	4	1	2			7	17			12	5
5日	1	3	1	2	1	2	1	2	1	8	5	12			10	4
6日以上		0	1	2	1	2	2	4	1	8	3	7			8	3
小計	35	100	56	100	49	100	53	100	13	100	41	100	0		247	100
不明	9		16		20		9		3		5		4		66	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計

(注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

6. 最初の投与から異常な行動の発現までの時間

患者年齢別①

初回服用から異常行動発現までの時間	10歳未満 (%)	10代 (%)	20代以上 (%)	不明 (%)	総計 (%)
1時間未満	4	4	1		9
1時間以上2時間未満	8	7	1		16
2時間以上3時間未満	7	11	2		20
3時間以上4時間未満	5	10			15
4時間以上5時間未満	4	3	1		8
5時間以上6時間未満	6	2			8
6時間以上12時間未満	9	14	1		24
12時間以上24時間未満	5	10	2		17
24時間以上48時間未満		1			1
148時間以上			3		3
小計	48	62	11	0	121
不明	68	88	32	4	192
総計	116	150	43	4	313

患者年齢別②

初回服用から異常行動発現までの時間	6歳以下 (%)	7歳から9歳以下 (%)	10歳から12歳以下 (%)	13歳から15歳以下 (%)	16歳から18歳以下 (%)	19歳以上 (%)	不明 (%)	総計 (%)
1時間未満	2	2	3	1		1		9
1時間以上2時間未満	2	6	5	1		2		16
2時間以上3時間未満		7	3	6	2	2		20
3時間以上4時間未満	1	4	5	4		1		15
4時間以上5時間未満	3	1	1	2		1		8
5時間以上6時間未満	1	5	1	1				8
6時間以上12時間未満	3	6	6	7	1	1		24
12時間以上24時間未満	1	4	2	7	1	2		17
24時間以上48時間未満			1					1
148時間以上						3		3
小計	13	35	27	29	4	13	0	121
不明	31	37	42	33	9	32	4	192
総計	44	72	69	62	13	45	4	313

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

7. 直前の投与から異常な行動の発現までの時間

患者年齢別①

直前服用から異常行動発現までの時間	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1時間未満	7	12	6	8	1	10			14	10
1時間以上2時間未満	13	22	10	14	1	10			24	17
2時間以上3時間未満	10	17	19	26	1	10			30	21
3時間以上4時間未満	9	16	14	19	2	20			25	18
4時間以上5時間未満	4	7	5	7	1	10			10	7
5時間以上6時間未満	7	12	2	3		0			9	6
6時間以上12時間未満	7	12	15	21	2	20			24	17
12時間以上	1	2	2	3	2	20			5	4
小計	58	100	73	100	10	100	0		141	100
不明	58		77		33		4		172	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

直前服用から異常行動発現までの時間	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1時間未満	2	13	5	12	5	15	1	3			1	8			14	10
1時間以上2時間未満	5	31	8	19	8	24	1	3			2	17			24	17
2時間以上3時間未満			10	24	5	15	10	29	4	100	1	8			30	21
3時間以上4時間未満	2	13	7	17	5	15	8	24			3	25			25	18
4時間以上5時間未満	3	19	1	2	2	6	3	9			1	8			10	7
5時間以上6時間未満	2	13	5	12	1	3	1	3							9	6
6時間以上12時間未満	2	13	5	12	7	21	8	24			2	17			24	17
12時間以上			1	2			2	6			2	17			5	4
小計	16	100	42	100	33	100	34	100	4	100	12	100	0		141	100
不明	28		30		36		28		12		34		4		172	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

8. 異常な行動の発現の直前の体温(6時間前以内)

①体温

異常な行動の発現前の体温	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
34度台			1	3					1	1
35度台	1	3	1	3					2	2
36度台	1	3							1	1
37度台	3	8	3	8	2	40			8	10
38度台	13	34	16	42	1	20			30	37
39度台	14	37	15	39	1	20			30	37
40度台	5	13	2	5	1	20			8	10
41度台以上	1	3							1	1
小計	38	100	38	100	5	100	0		81	100
不明	78		112		38		4		232	
総計	116		150		43		4		313	

①体温

異常な行動の発現前の体温	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
34度台					1	5									1	1
35度台	1	6					1	7							2	2
36度台			1	5					1	33	3	43			1	1
37度台	2	11	1	5	1	5									8	10
38度台	7	39	6	30	8	42	5	36	2	67	2	29			30	37
39度台	7	39	7	35	7	37	8	57			1	14			30	37
40度台			5	25	2	11					1	14			8	10
41度台以上	1	6													1	1
小計	18	100	20	100	19	100	14	100	3	100	7	100	0		81	100
不明	26		52		50		48		13		39		4		232	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

②異常な行動の発現時の体温の経過  
 患者年齢別①

体温	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
発熱持続	45	64	72	73	5	23			122	64
解熱過程	23	33	24	24	14	64			61	32
解熱後	2	3	2	2	3	14			7	4
小計	70	100	98	100	22	100	0		190	100
不明	46		52		21		4		123	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

体温	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
発熱持続	20	69	25	61	34	76	33	75	4	50	6	26			122	64
解熱過程	8	28	15	37	10	22	10	23	4	50	14	61			61	32
解熱後	1	3	1	2	1	2	1	2	0	0	3	13			7	4
小計	29	100	41	100	45	100	44	100	8	100	23	100	0		190	100
不明	15		31		24		18		8		23		4		123	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

9. 異常な行動の発現時刻別  
 患者年齢別①

副作用発現時刻	10歳未満 (%)	10代 (%)	20代以上 (%)	不明 (%)	総計 (%)
0-6時	11	29	6		46
6-12時	4	10	4		18
12-18時	24	29	3		56
18-24時	37	36	8		81
小計	76	104	21	0	201
不明	40	46	22	4	112
総計	116	150	43	4	313

患者年齢別②

副作用発現時刻	6歳以下 (%)	7歳から9歳以下 (%)	10歳から12歳以下 (%)	13歳から15歳以下 (%)	16歳から18歳以下 (%)	19歳以上 (%)	不明 (%)	総計 (%)
0-6時	2	9	11	16	1	7		46
6-12時	1	3	4	5	1	4		18
12-18時	8	16	15	10	3	4		56
18-24時	14	23	16	15	4	9		81
小計	25	51	46	46	9	24	0	201
不明	19	21	23	16	7	22	4	112
総計	44	72	69	62	16	46	4	313



異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1.0. 就寝から異常な行動までの時間  
 患者年齢別①

就眠から発現までの時間	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1時間未満	9	41	7	26	1	25			17	32
1時間以上2時間未満	3	14	5	19					8	15
2時間以上3時間未満	5	23	5	19	2	50			12	23
3時間以上4時間未満	1	5	2	7	1	25			4	8
4時間以上5時間未満	2	9	1	4					3	6
5時間以上	2	9	7	26					9	17
小計	22	100	27	100	4	100	0		53	100
不明/就寝中でない	94		123		39		4		260	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

就眠から発現までの時間	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1時間未満	2	33	7	44	6	40	1	9			1	25			17	32
1時間以上2時間未満	2	33	1	6	3	20	1	9							8	15
2時間以上3時間未満			5	31	1	7	4	36	1	100	2	50			12	23
3時間以上4時間未満	1	17			1	7	1	9			1	25			4	8
4時間以上5時間未満	1	17	1	6			1	9							3	6
5時間以上			2	13	4	27	3	27							9	17
小計	6	100	16	100	15	100	11	100	1	100	4	100	0		53	100
不明/就寝中でない	38		56		54		51		15		42		4		260	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1.1. 異常な行動の発現が就寝中か否か  
 患者年齢別①

就寝中	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	49	66	58	67	6	29			113	62
No	25	34	28	33	15	71	1	100	69	38
小計	74	100	86	100	21	100	1	100	182	100
不明	42		64		22		3		131	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

就寝中	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	17	57	32	73	26	65	24	71	7	70	7	32			113	62
No	13	43	12	27	14	35	10	29	3	30	15	68	1	100	69	38
小計	30	100	44	100	40	100	34	100	10	100	22	100	1	100	182	100
不明	14		28		29		28		6		23		3		131	
総計	44		72		69		62		16		45		4		313	

1.2. 異常な行動の発現が覚醒直後か否か  
 患者年齢別①

覚醒直後に発現	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	39	65	50	59	6	30			95	58
No	21	35	35	41	14	70			70	42
小計	60	100	85	100	20	100	0		165	100
不明	56		65		23		4		148	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

覚醒直後に発現	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
Yes	16	59	23	70	24	63	17	49	7	78	8	35			95	58
No	11	41	10	30	14	37	18	51	2	22	15	65			70	42
小計	27	100	33	100	38	100	35	100	9	100	23	100	0		165	100
不明	17		39		31		27		7		23		4		148	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

参考) 11と12のクロス集計

		覚醒後に発現したか						
		Yes	(%)	No	(%)	小計	不明	総計
就寝中に発現したか	Yes	80	95	6	20	86	27	113
	(%)	91		9		100		
	No	8	5	38	80	46	23	69
	(%)	11		89		100		
	小計	88	100	44	100	132	50	182
	不明	7		26		33	98	131
総計	95		70		165	148	313	

1.3. 異常な行動が一眠りして回復したか否か  
 患者年齢別①

一眠後完全回復	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
Yes	53	75	89	85	11	46			153	77
No	18	25	16	15	13	54			47	24
小計	71	100	105	100	24	100	0		200	100
不明	45		45		19		4		113	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

一眠後完全回復	6歳以下	(%)	7歳から 9歳以下	(%)	10歳か ら12歳 以下	(%)	13歳か ら15歳 以下	(%)	16歳か ら18歳 以下	(%)	19歳以 上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
Yes	19	70	34	77	39	85	38	83	10	100	13	48			153	77
No	8	30	10	23	7	15	8	17			14	52			47	24
小計	27	100	44	100	46	100	46	100	10	100	27	100	0		200	100
不明	17		28		23		16		6		19		4		113	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

## 異常な行動が記録されている事例の集計

(注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

### 14. 異常な行動に関する患者の記憶の有無

#### 患者年齢別①

患者の記憶	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
有	4	8	27	27	14	45			45	25
無	45	92	74	73	17	55			136	75
小計	49	100	101	100	31	100	0		181	100
不明	67		49		12		4		132	
総計	116		150		43		4		313	

#### 患者年齢別②

患者の記憶	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
有	1	5	3	10	11	24	14	33	2	18	14	41			45	25
無	18	95	27	90	34	76	28	67	9	82	20	59			136	75
小計	19	100	30	100	45	100	42	100	11	100	34	100	0		181	100
不明	25		42		24		20		5		12		4		132	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

### 15. 光に対する反応の有無

#### 患者年齢別①

光に対する反応	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
有	1	2	1	2					2	2
無	40	98	58	98	14	100			112	98
小計	41	100	59	100	14	100	0		114	100
不明	75		91		29		4		199	
総計	116		150		43		4		313	

#### 患者年齢別②

光に対する反応	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
有	1	6					1	4							2	2
無	17	94	23	100	29	100	22	96	5	100	16	100			112	98
小計	18	100	23	100	29	100	23	100	5	100	16	100	0		114	100
不明	26		49		40		39		11		30		4		199	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

16. 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の既往歴の有無

睡眠時驚愕症等の既往	症例数	(%)
有	15	9
無	161	91
小計	176	100
不明	137	
総計	313	

17. 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の家族歴の有無

睡眠時驚愕症等の家族歴	症例数	(%)
有	2	1
無	139	99
小計	141	100
不明	172	
総計	313	

18. 異常な行動の回復までの時間

患者年齢別①

回復までの時間	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
30分未満	33	42	54	50	5	17	1	100	93	43
30分以上60分未満	9	12	16	15	3	10			28	13
1時間以上6時間未満	16	21	24	22	4	14			44	20
6時間以上24時間未満	14	18	5	5	4	14			23	11
24時間以上	2	3	1	1	6	21			9	4
未回復	4	5	8	7	7	24			19	9
小計	78	100	108	100	29	100	1	100	216	100
不明	38		42		14		3		97	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

回復までの時間	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
30分未満	14	47	19	43	24	50	23	49	6	67	6	20	1	100	93	44
30分以上60分未満	3	10	6	14	11	23	5	11			3	10			28	13
1時間以上6時間未満	5	17	11	25	9	19	10	21	3	33	6	20			44	21
6時間以上24時間未満	6	20	8	18	5	10	3	6			4	13			23	11
24時間以上	2	7		0	1	2		0			6	20			9	4
未回復	1	3	3	7	1	2	7	15			7	23			19	9
小計	30	100	44	100	48	100	47	100	9	100	30	100	1	100	209	100
不明	13		25		21		14		7		14		3		97	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1.9. 異常な行動が発現した後に投与を継続した症例の状況

患者年齢別①

再投薬による再現性の有無	10歳未満 (%)	10代 (%)	20代以上 (%)	不明 (%)	総計 (%)
再現性あり(注)	13 32	12 29	2 22		27 29
再現性なし	28 68	30 71	7 78		65 71
小計	41 100	42 100	9 100	0	92 100
不明/その他	75	108	34	4	221
総計	116	150	43	4	313

患者年齢別②

再投薬による再現性の有無	6歳以下 (%)	7歳から9歳以下 (%)	10歳から12歳以下 (%)	13歳から15歳以下 (%)	16歳から18歳以下 (%)	19歳以上 (%)	不明 (%)	総計 (%)
再現性あり(注)	7 44	6 24	8 36	3 23	1 17	2 20		27 29
再現性なし	9 56	19 76	14 64	10 77	5 83	8 80		65 71
小計	16 100	25 100	22 100	13 100	6 100	10 100	0	92 100
不明/その他	28	47	47	49	10	36	4	221
総計	44	72	69	62	16	46	4	313

(注) 精神神経症状の異常も含む有害事象が複数回発現しているもの

異常な行動が記録されている事例の集計  
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

20. 他剤による同様な副作用歴の有無

他剤による既往歴	症例数	(%)
有	8	4
無	196	96
小計	204	100
不明	109	
総計	313	

21. 熱性痙攣の既往歴の有無

熱性痙攣の既往歴	症例数	(%)
有	10	17
無	48	83
小計	58	100
不明	255	
総計	313	

22. 熱性痙攣の家族歴の有無

熱性痙攣の既往歴	症例数	(%)
有	2	6
無	32	94
小計	34	100
不明	279	
総計	313	

異常な行動が記録されている事例の集計

参考1. 主な併用薬剤の内

薬効小分類 <sup>(注1)</sup>	薬剤許審名(薬効細分類) <sup>(注2)</sup>	集計
催眠鎮静剤, 抗不安剤	その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤	5
	ベンゾジアゼピン系製剤	9
	有機ブロム化合物製剤	1
計		15
抗てんかん剤	その他の抗てんかん剤	5
計		5
解熱鎮痛消炎剤	アスピリン・ダイアルミネート <sup>(注3)</sup>	1
	アニリン系製剤	102
	サリチル酸系製剤	2
	その他の解熱鎮痛消炎剤	17
	フェニル酢酸系製剤	5
	塩基性消炎鎮痛剤	4
計		131
抗パーキンソン剤	アマンタジン製剤	1
	ピペリデン製剤	1
計		2
精神神経用剤	その他の精神神経用剤	9
	フェノチアジン系製剤	2
計		11
総合感冒剤	非ピリン系感冒剤 (2) <sup>(注3)</sup>	1
	非ピリン系感冒剤 (3) <sup>(注3)</sup>	1
	非ピリン系感冒剤 (4) <sup>(注3)</sup>	17
計		19
その他の中枢神経系用薬	塩酸ドネペジル <sup>(注3)</sup>	1
計		1
眼科用剤	その他の眼科用剤	2
計		2
耳鼻科用剤	その他の耳鼻科用剤	2
	耳鼻科用抗生物質製剤	1
計		3
鎮暈剤	その他の鎮暈剤	1
計		1
強心剤	カフェイン系製剤	3
計		3
不整脈用剤	その他の不整脈用剤	1
計		1
利尿剤	その他の利尿剤	3
	チアジド系製剤	1
	抗アルドステロン製剤	1
計		5



異常な行動が記録されている事例の集計

薬効小分類 <sup>(注1)</sup>	薬剤辞書名(薬効細分類) <sup>(注2)</sup>	集計
血圧降下剤	アンジオテンシン変換酵素阻害剤	1
	その他の血圧降下剤	6
	メチルドパ製剤	1
	ラウオルフィア製剤	1
計		9
血管拡張剤	冠血管拡張剤	8
計		8
高脂血症用剤	その他の高脂血症用剤	1
計		1
その他の循環器官用薬	D-マンニトール <sup>(注3)</sup>	1
	ポリスチレンスルホン酸カルシウム <sup>(注3)</sup>	2
	酒石酸イフェンプロジル <sup>(注3)</sup>	1
計		4
鎮咳剤	エフェドリン及びマオウ製剤	4
	その他の鎮咳剤	38
	デキストロメトルファン製剤	21
計		63
去たん剤	システイン系製剤	70
	その他の去たん剤	31
	プロムヘキシシン製剤	7
	植物性製剤	2
計		110
鎮咳去たん剤	その他の鎮咳去たん剤	64
	植物性製剤	5
計		69
気管支拡張剤	イソプレナリン系製剤	2
	キサントシン系製剤	5
	その他の気管支拡張剤	21
計		28
含嗽剤	アズレンスルホン酸ナトリウム <sup>(注3)</sup>	1
	アズレンスルホン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム <sup>(注3)</sup>	1
	ポピドンヨード <sup>(注3)</sup>	1
計		3
その他の呼吸器官用薬	プロピオン酸フルチカゾン <sup>(注3)</sup>	3
計		3
止しゃ剤、整腸剤	活性生菌製剤	13
計		13
消化性潰瘍用剤	H <sub>2</sub> 遮断剤	2
	その他の消化性潰瘍用剤	23
計		25
健胃消化剤	その他の健胃消化剤	2
計		2
制酸剤	無機塩製剤	3
計		3
下剤、浣腸剤	その他の下剤、浣腸剤	1
	植物性製剤	2
計		3
利胆剤	胆汁酸製剤	1
計		1

異常な行動が記録されている事例の集計

薬効小分類 <sup>(注1)</sup>	薬剤詳名(薬効細分類) <sup>(注1)</sup>	集計
その他の消化器官用薬	他に分類されない消化器官用薬	13
計		13
脳下垂体ホルモン剤	その他の脳下垂体ホルモン剤	1
計		1
甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	抗甲状腺ホルモン製剤	1
	甲状腺ホルモン製剤	2
計		3
副腎ホルモン剤	コルチゾン系製剤	1
	フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	1
	プレドニゾン系製剤	2
計		4
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	すい臓ホルモン剤	1
計		1
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	塩酸タムスロシン <sup>(注3)</sup>	2
計		2
外用殺菌消毒剤	ヨウ素化合物	1
計		1
ビタミンA及びD剤	合成ビタミンD製剤	1
計		1
ビタミンB1剤	ビタミンB1誘導体制剤	1
計		1
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	パントテン酸系製剤	1
計		1
ビタミンC剤	アスコルビン酸 <sup>(注3)</sup>	1
	アスコルビン酸・L-システイン <sup>(注3)</sup>	1
計		2
ビタミンK剤	メナテトレノン <sup>(注3)</sup>	1
計		1
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	1
計		1
無機質製剤	鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	1
計		1
糖類剤	ブドウ糖製剤	1
計		1
たん白アミノ酸製剤	その他のたん白アミノ酸製剤	1
計		1

異常な行動が記録されている事例の集計

薬効小分類 <sup>(注1)</sup>	薬剤群名(薬効細分類) <sup>(注1)</sup>	集計
血液代用剤	その他の血液代用剤	12
計		12
止血剤	抗プラスミン剤	12
計		12
血液凝固阻止剤	ジクマロール系製剤	3
計		3
その他の血液・体液用薬	他に分類されない血液・体液用薬	7
計		7
痛風治療剤	アロプリノール製剤	2
計		2
酵素製剤	その他の酵素製剤	19
計		19
糖尿病用剤	ビグアナイド系製剤	1
	糖尿病用剤	1
計		2
他に分類されない代謝性医薬品	他に分類されないその他の代謝性医薬品	1
計		1
抗ヒスタミン剤	その他の抗ヒスタミン剤	56
	トリペレナミン系製剤	1
	フェノチアジン系製剤	12
計		69
その他のアレルギー用薬	エバスチン <sup>(注3)</sup>	1
	オキサトミド <sup>(注3)</sup>	3
	フマル酸エメダスチン <sup>(注3)</sup>	1
	フマル酸ケトチフェン <sup>(注3)</sup>	5
	ブランルカスト水和物 <sup>(注3)</sup>	2
	ベシル酸ベボタスチン <sup>(注3)</sup>	1
	ペミロラストカリウム <sup>(注3)</sup>	1
	モンテルカストナトリウム <sup>(注3)</sup>	3
	ラマトロバン <sup>(注3)</sup>	1
	ロラタジン <sup>(注3)</sup>	1
	塩酸アゼラスチン <sup>(注3)</sup>	1
	塩酸エピナスチン <sup>(注3)</sup>	2
	塩酸セチリジン <sup>(注3)</sup>	3
	塩酸フェキソフェナジン <sup>(注3)</sup>	1
計		26

異常な行動が記録されている事例の集計

薬効小分類 <sup>(注1)</sup>	薬剤群名(薬効細分類) <sup>(注1)</sup>	集計
漢方製剤 <sup>(注2)</sup>	桂麻各半湯 <sup>(注3)</sup>	1
	柴胡桂枝湯 <sup>(注3)</sup>	1
	小青竜湯 <sup>(注3)</sup>	1
	麻杏甘石湯 <sup>(注3)</sup>	1
	麻黄湯 <sup>(注3)</sup>	2
計		6
主としてグラム陽性菌に作用するもの	リンコマイシン系抗生物質製剤	1
計		1
主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミノ糖系抗生物質製剤	1
計		1
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オキサセフェム系抗生物質製剤	1
	セフェム系抗生物質製剤	21
	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	1
	ペニシリン系抗生物質製剤	4
計		27
主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシン製剤	1
	その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21
計		22
合成抗菌剤	ピリドンカルボン酸系製剤	5
計		5
抗ウイルス剤	アシクロビル <sup>(注3)</sup>	1
計		1
矯味, 矯臭, 着色剤	シロップ製剤	1
計		1
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	医療用酸素 <sup>(注3)</sup>	1
計		1
あへんアルカロイド系麻薬	コデイン系製剤	1
計		1
Unknown drug (不明薬) <sup>(注4)</sup>		29

注1) 医薬品データファイルVer2008.04.21を使用した

注2) 薬効中分類

注3) 一般名

注4) 併用薬剤のうち、医薬品コードの特定されていないもの

# 異常な行動が記録されている事例の集計

## 参考2. 既往症・合併症

集計用疾患名(※)	既往症	合併症	計
貧血		1	1
特発性血小板減少性紫斑		1	1
鉄欠乏性貧血		1	1
心房細動		2	2
心不全		1	1
慢性心不全		1	1
冠状動脈瘤		1	1
期外収縮		1	1
洞不全症候群		1	1
停留精巣	1		1
血友病		1	1
甲状腺腫大		1	1
アレルギー性結膜炎	1	1	2
糖尿病性失明		1	1
糖尿病性網膜症		1	1
腹痛		1	1
便秘	1	1	2
消化不良		1	1
胃潰瘍	1		1
慢性胃炎		1	1
胃炎		1	1
鼠径ヘルニア	1		1
左側鼠径ヘルニア	1		1
右側鼠径ヘルニア	1		1
不明熱		1	1
胆砂		1	1
肝炎		1	1
肝障害		1	1
アトピー		1	1
アレルギー	1	1	2
花粉症	1	2	3
虫垂炎	1		1
喘息様気管支炎	1	1	2
気管支炎		1	1
急性気管支炎		2	2
喘鳴を伴う気管支炎		1	1
糖尿病性壊疽		1	1
ウイルス性脳炎	1		1

## 異常な行動が記録されている事例の集計

インフルエンザ	17		17
A型インフルエンザウイルス感染	4	1	5
B型インフルエンザウイルス感染	2		2
麻疹	1		1
髄膜炎	1		1
流行性耳下腺炎	1		1
感冒	1	1	2
中耳炎		1	1
急性中耳炎		1	1
慢性中耳炎		1	1
咽頭炎		1	1
肺炎		2	2
副鼻腔炎		2	2
結核後遺症		1	1
陳旧性結核	1		1
上気道感染		1	1
ウイルス性下痢	1		1
ウイルス性筋炎		1	1
細菌感染		1	1
レンサ球菌感染		1	1
ウイルス性発疹		1	1
熱射病	1		1
外傷		1	1
脱水		1	1
糖尿病		2	2
成長障害		1	1
高クレアチニン血症		1	1
腰部脊柱管狭窄症	1		1
骨粗鬆症		1	1
胃癌		1	1
頸動脈血栓症	1		1
脳梗塞		3	3
認知症		1	1
脳炎		1	1
髄膜脳炎	1		1
てんかん		2	2
熱性痙攣	9	1	10
熱性痙攣発作	1		1
脳動脈瘤	1		1

## 異常な行動が記録されている事例の集計

精神遅滞		2	2
片頭痛	1		1
異常興奮	1		1
うつ病		4	4
抑うつ神経症	1	1	2
不眠症		2	2
強迫性障害		1	1
統合失調症		1	1
夜驚症	1		1
睡眠時驚愕	2		2
睡眠時遊行症	4		4
夢遊症	1		1
自殺企図	1		1
腎不全		2	2
慢性腎不全		2	2
腎機能障害		1	1
喘息	4	3	7
気管支喘息	3	8	11
喘息性気管支炎		1	1
慢性呼吸不全	1	1	2
過呼吸	1		1
アレルギー性鼻炎		1	1
喘鳴		1	1
小児喘息		1	1
上気道の炎症	1		1
アトピー性皮膚炎	3	2	5
大動脈瘤	1		1
高血圧		4	4
気管支喘息		1	1
川崎病後冠動脈瘤 <sup>注2)</sup>		1	1
川崎病 <sup>注3)</sup>	1		1

注1) 一部を除きMedDRA/J Version11.0を使用した

注2) MEDIS病名コード

注3) 医師記載名称