


米国で推奨されていて、日本で任意あるいは未承認のワクチン

- 日本で任意接種
 - B型インフルエンザ桿菌 (HiB)
 - 肺炎球菌 (23価、多糖)^{※1}
 - 水痘
 - インフルエンザ (小児)
 - A型肝炎 (16歳以上)
 - 流行性耳下腺炎
 - B型肝炎^{※2}
- その他、定期接種外のワクチン
- 日本で未承認
 - 肺炎球菌 (7価、Conjugate)
 - ポリオ (不活化)
 - ヒトパピローマウイルス (HPV)
 - ロタウイルス
 - 髄膜炎菌

※1 2歳以上の脾摘患者における肺炎球菌による感染症の発症予防については保険適応あり
 ※2 母子感染予防、血液による汚染事故後のB型肝炎発症予防については保険適応あり

Vaccine-specific Coverage Rates Among Pre-school Aged Children



† DTP(3+) is not a Healthy People 2010 objective. DTP(4) is used to assess Healthy People 2010 objectives.
 Note: Children in the USIS and NHIS were 24-35 months of age. Children in the NIS were 19-35 months of age.
 Source: USIS (1967-1985), NHIS (1991-1993) CDC, NCHS, and NIS (1994-December 2002), CDC, NIP and NCHS; No data from 1986-1990 due to cancellation of USIS because of budget reductions