

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

平成21年6月3日タミフル臨床WG
 資料4-3

1. 異常な行動の発現症例：年齢別
 患者年齢別①

| 年齢 | 症例数 | 割合 |
|-------|-----|-----|
| 10歳未満 | 138 | 40 |
| 10代 | 161 | 46 |
| 20代 | 8 | 2 |
| 30代 | 6 | 2 |
| 40代 | 5 | 1 |
| 50代 | 8 | 2 |
| 60代 | 7 | 2 |
| 70代 | 7 | 2 |
| 80代 | 5 | 1 |
| 90代 | 4 | 1 |
| 不明 | 4 | |
| 総計 | 353 | 100 |

患者年齢別②

| 年齢 | 症例数 | 割合 |
|----------|-----|-----|
| 6歳以下 | 53 | 15 |
| 7歳から9歳 | 85 | 24 |
| 10歳から12歳 | 75 | 21 |
| 13歳から15歳 | 65 | 19 |
| 16歳から18歳 | 17 | 5 |
| 19歳以上 | 54 | 15 |
| 不明 | 4 | |
| 総計 | 353 | 100 |

2. 異常な行動の発現症例：性別

| 性別 | 症例数 | 割合 |
|----|-----|-----|
| 男性 | 251 | 72 |
| 女性 | 97 | 28 |
| 不明 | 5 | |
| 総計 | 353 | 100 |

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

3. 異常な行動の発現症例：インフルエンザウイルス型別

| | | |
|-------------|-----|-----|
| A型インフルエンザ | 197 | 56 |
| A&B型インフルエンザ | 5 | 1 |
| B型インフルエンザ | 80 | 23 |
| 型不明 | 46 | 13 |
| 不明 | 22 | 6 |
| 予防* | 3 | 1 |
| 総計 | 353 | 100 |

*予防症例2例の内訳

- 1) 咳、咽頭痛、関節痛、38℃台の発熱と記載されている。
- 2) インフルエンザ疑いの記載あり
- 3) 鎮咳剤・抗生剤等併用の記載あり

4. 異常な行動の発現時期別

【年別】

| | | |
|------|-----|-----|
| 2001 | 2 | 1 |
| 2002 | 5 | 1 |
| 2003 | 12 | 3 |
| 2004 | 10 | 3 |
| 2005 | 27 | 8 |
| 2006 | 69 | 20 |
| 2007 | 178 | 51 |
| 2008 | 23 | 7 |
| 2009 | 20 | 6 |
| 不明 | 7 | 2 |
| 総計 | 353 | 100 |

【シーズン別】

| | | |
|---------------|-----|-----|
| 2000-2001シーズン | 2 | 1 |
| 2001-2002シーズン | 5 | 1 |
| 2002-2003シーズン | 11 | 3 |
| 2003-2004シーズン | 11 | 3 |
| 2004-2005シーズン | 17 | 5 |
| 2005-2006シーズン | 78 | 23 |
| 2006-2007シーズン | 170 | 49 |
| 2007-2008シーズン | 25 | 7 |
| 2008-2009シーズン | 27 | 8 |
| 不明 | 7 | 2 |
| 総計 | 353 | 100 |

シーズン：8月から7月

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

5. インフルエンザ発症から異常な行動の発現までの病日
 患者年齢別①

| 病日 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1日 | 52 | 47 | 49 | 38 | 13 | 30 | | | 114 | 40 |
| 2日 | 40 | 36 | 46 | 36 | 7 | 16 | | | 93 | 33 |
| 3日 | 12 | 11 | 19 | 15 | 8 | 19 | | | 39 | 14 |
| 4日 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | | | 15 | 5 |
| 5日 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | | | 11 | 4 |
| 6日以上 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | | | 10 | 4 |
| 不明 | 27 | | 33 | | 7 | | 4 | | 71 | |
| 総計 | 138 | | 161 | | 50 | | 4 | | 353 | |

患者年齢別②

| 病日 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1日 | 21 | 48 | 31 | 46 | 24 | 44 | 20 | 36 | 5 | 36 |
| 2日 | 11 | 25 | 29 | 43 | 21 | 38 | 20 | 36 | 4 | 29 |
| 3日 | 8 | 18 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 | 18 | 2 | 14 |
| 4日 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 8 |
| 5日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 6日以上 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| 不明 | 9 | | 18 | | 20 | | 10 | | 3 | |
| 総計 | 53 | | 85 | | 75 | | 65 | | 17 | |

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注: 複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

6. 最初の投与から異常な行動の発現までの時間
 患者年齢別①

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|----|-----|----|----|----|---|--|-----|----|
| 1時間未満 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 13 | | | 11 | 7 |
| 1時間以上2時間未満 | 8 | 12 | 8 | 11 | 1 | 7 | | | 17 | 11 |
| 2時間以上3時間未満 | 9 | 14 | 12 | 17 | 2 | 13 | | | 23 | 15 |
| 3時間以上4時間未満 | 9 | 14 | 11 | 15 | | | | | 20 | 13 |
| 4時間以上5時間未満 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | | | 8 | 5 |
| 5時間以上6時間未満 | 7 | 11 | 2 | 3 | | | | | 9 | 6 |
| 6時間以上12時間未満 | 10 | 15 | 16 | 23 | 2 | 13 | | | 28 | 18 |
| 12時間以上24時間未満 | 7 | 11 | 11 | 15 | 3 | 20 | | | 21 | 14 |
| 24時間以上48時間未満 | 5 | 8 | 1 | 1 | | | | | 6 | 4 |
| 48時間以上 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 27 | | | 9 | 6 |
| 不明 | 72 | | | | 35 | | 4 | | 201 | |
| 総計 | 138 | | 161 | | 50 | | 4 | | 353 | |

患者年齢別②

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1時間未満 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | | 2 | 11 | | 11 | 7 |
| 1時間以上2時間未満 | 2 | 10 | 6 | 13 | 6 | 19 | 1 | 3 | | 2 | 11 | | 17 | 11 |
| 2時間以上3時間未満 | 1 | 5 | 8 | 18 | 4 | 13 | 6 | 19 | 2 | 40 | 2 | 11 | | 23 |
| 3時間以上4時間未満 | 4 | 19 | 5 | 11 | 6 | 19 | 4 | 13 | | | 1 | 6 | | 20 |
| 4時間以上5時間未満 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | | | 1 | 6 | | 8 |
| 5時間以上6時間未満 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 9 |
| 6時間以上12時間未満 | 3 | 14 | 7 | 16 | 8 | 25 | 7 | 23 | 1 | 20 | 2 | 11 | | 28 |
| 12時間以上24時間未満 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | 6 | 8 | 26 | 1 | 20 | 3 | 17 | | 21 |
| 24時間以上48時間未満 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | | | | | | | | 6 |
| 48時間以上 | 2 | 10 | | | | | 1 | 3 | 1 | 20 | 5 | 28 | | 9 |
| 不明 | 32 | | 40 | | 43 | | 34 | | 12 | | 36 | | 4 | 201 |
| 総計 | 53 | | 85 | | 75 | | 65 | | 17 | | 54 | | 4 | 353 |

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

7. 直前の投与から異常な行動の発現までの時間
 患者年齢別①

| 年齢 | 0歳未満 | 0歳～1歳未満 | 1歳～2歳未満 | 2歳～3歳未満 | 3歳～4歳未満 | 4歳～5歳未満 | 5歳～6歳未満 | 6歳～12歳未満 | 12歳以上 | |
|-------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|-----|
| 1時間未満 | 9 | 13 | 6 | 8 | 2 | 14 | | | 17 | 10 |
| 1時間以上2時間未満 | 13 | 19 | 11 | 14 | 1 | 7 | | | 25 | 15 |
| 2時間以上3時間未満 | 13 | 19 | 20 | 26 | 1 | 7 | | | 34 | 21 |
| 3時間以上4時間未満 | 13 | 19 | 15 | 19 | 2 | 14 | | | 30 | 19 |
| 4時間以上5時間未満 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | | | 10 | 6 |
| 5時間以上6時間未満 | 8 | 11 | 2 | 3 | | | | | 10 | 6 |
| 6時間以上12時間未満 | 9 | 13 | 15 | 19 | 5 | 36 | | | 29 | 18 |
| 12時間以上 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | | | 7 | 4 |
| 合計 | 70 | 100 | 83 | 100 | 17 | 100 | 0 | 0 | 152 | 100 |
| 不明 | 68 | | 83 | | 36 | | 4 | | 191 | |
| 総計 | 138 | | 161 | | 50 | | 4 | | 353 | |

患者年齢別②

| 年齢 | 0歳未満 | 0歳～1歳未満 | 1歳～2歳未満 | 2歳～3歳未満 | 3歳～4歳未満 | 4歳～5歳未満 | 5歳～6歳未満 | 6歳～12歳未満 | 12歳以上 | | | |
|-------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|-----|----|-----|
| 1時間未満 | 3 | 14 | 6 | 12 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 12 | 17 | 10 |
| 1時間以上2時間未満 | 5 | 24 | 8 | 16 | 9 | 25 | 1 | 3 | 2 | 12 | 25 | 15 |
| 2時間以上3時間未満 | 1 | 5 | 12 | 24 | 6 | 17 | 10 | 29 | 4 | 80 | 34 | 21 |
| 3時間以上4時間未満 | 5 | 24 | 8 | 16 | 6 | 17 | 8 | 24 | 3 | 18 | 30 | 19 |
| 4時間以上5時間未満 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| 5時間以上6時間未満 | 2 | 10 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | 10 | 6 |
| 6時間以上12時間未満 | 2 | 10 | 7 | 14 | 7 | 19 | 8 | 24 | 5 | 29 | 29 | 18 |
| 12時間以上 | | | 1 | 2 | | | 2 | 6 | 1 | 20 | 3 | 18 |
| 合計 | 24 | 100 | 48 | 100 | 36 | 100 | 24 | 100 | 5 | 100 | 47 | 100 |
| 不明 | 32 | | 36 | | 39 | | 31 | | 12 | | 37 | |
| 総計 | 53 | | 85 | | 75 | | 65 | | 17 | | 84 | |

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注: 複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

8-1. 異常な行動の発現の直前の体温(6時間前以内)

患者年齢別①

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----|-----|----|----|----|---|-----|----|
| 34度台 | | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 |
| 35度台 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 |
| 36度台 | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 |
| 37度台 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 25 | | 9 | 8 |
| 38度台 | 19 | 35 | 21 | 45 | 2 | 25 | | 42 | 39 |
| 39度台 | 19 | 35 | 18 | 38 | 2 | 25 | | 39 | 36 |
| 40度台 | 9 | 17 | 3 | 6 | 2 | 25 | | 14 | 13 |
| 41度台以上 | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 |
| 不明 | 84 | | 114 | | 42 | | 4 | 244 | |
| 総計 | 138 | | 161 | | 50 | | 4 | 353 | |

患者年齢別②

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 34度台 | | | | 1 | 4 | | | | | 1 | 1 | |
| 35度台 | 1 | 4 | | | | 1 | 6 | | | 2 | 2 | |
| 36度台 | | | 1 | 3 | | | | | | 1 | 1 | |
| 37度台 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | | 1 | 33 | 3 | 27 | |
| 38度台 | 9 | 38 | 10 | 33 | 11 | 44 | 7 | 44 | 2 | 67 | 3 | 27 |
| 39度台 | 9 | 38 | 10 | 33 | 9 | 36 | 8 | 50 | | 3 | 27 | |
| 40度台 | 1 | 4 | 8 | 27 | 3 | 12 | | | | 2 | 18 | |
| 41度台以上 | 1 | 4 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 不明 | 29 | | 55 | | 50 | | 49 | | 14 | 43 | 4 | 244 |
| 総計 | 53 | | 85 | | 75 | | 65 | | 17 | 54 | 4 | 353 |

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

8-2. 異常な行動の発現時の体温の経過
 患者年齢別①

| 体温 | 10歳未満 | 10歳以上 | 20歳未満 | 20歳以上 | 30歳未満 | 30歳以上 | 40歳未満 | 40歳以上 | 50歳未満 | 50歳以上 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 発熱持続 | 53 | 67 | 74 | 73 | 5 | 22 | | | 132 | 65 |
| 解熱過程 | 25 | 32 | 25 | 25 | 14 | 61 | | | 64 | 32 |
| 解熱後 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | | | 7 | 3 |
| 不明 | 75 | 100 | 10 | 100 | 23 | 100 | | | 203 | 100 |
| 不明 | 59 | 60 | | | 27 | | | | 4 | 150 |
| 総計 | 138 | | 161 | | 50 | | | | 4 | 353 |

患者年齢別②

| 体温 | 10歳未満 | 10歳以上 | 20歳未満 | 20歳以上 | 30歳未満 | 30歳以上 | 40歳未満 | 40歳以上 | 50歳未満 | 50歳以上 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 発熱持続 | 23 | 74 | 30 | 63 | 36 | 75 | 33 | 75 | 4 | 50 |
| 解熱過程 | 8 | 26 | 17 | 35 | 11 | 23 | 10 | 23 | 4 | 50 |
| 解熱後 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 4 |
| 不明 | 34 | 100 | 43 | 100 | 43 | 100 | 43 | 100 | 4 | 100 |
| 不明 | 22 | | 37 | | 27 | | 21 | | 9 | 30 |
| 総計 | 53 | | 85 | | 75 | | 65 | | 17 | 54 |

異常な行動が記録されている事例の集計

(注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

9. 異常な行動の発現時刻別

患者年齢別①

| 発現時刻 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 不明 | 合計 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0-6時 | 15 | 16 | 30 | 27 | 7 | 29 | | | | 52 | 23 |
| 6-12時 | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 | 21 | | | | 21 | 9 |
| 12-18時 | 32 | 34 | 33 | 30 | 3 | 13 | | | | 68 | 30 |
| 18-24時 | 40 | 43 | 38 | 34 | 9 | 38 | | | | 87 | 38 |
| 不明 | 45 | 100 | 50 | 100 | 23 | 100 | 4 | | | 228 | 100 |
| 合計 | 138 | 161 | 161 | 130 | 50 | 200 | 4 | | | 353 | |

患者年齢別②

| 発現時刻 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 不明 | 合計 | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 0-6時 | 3 | 10 | 12 | 19 | 12 | 23 | 16 | 34 | 1 | 11 | 8 | 30 | 52 | 23 |
| 6-12時 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 1 | 11 | 5 | 19 | 21 | 9 |
| 12-18時 | 11 | 35 | 21 | 34 | 19 | 37 | 10 | 21 | 3 | 33 | 4 | 15 | 68 | 30 |
| 18-24時 | 15 | 48 | 25 | 40 | 17 | 33 | 16 | 34 | 4 | 44 | 10 | 37 | 87 | 38 |
| 不明 | 22 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 | 18 | 100 | 8 | 100 | 27 | 100 | 4 | 125 |
| 合計 | 53 | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 17 | 8 | 54 | 4 | 353 | | |

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

10. 就寝から異常な行動までの時間
 患者年齢別①

| 異常な行動までの時間 | 10歳未満 (%) | | 10代 (%) | | 20代 (%) | | 30代 (%) | | 40代 (%) | |
|------------|-----------|----|---------|----|---------|----|---------|--|---------|----|
| 1時間未満 | 9 | 38 | 8 | 26 | 1 | 17 | | | 18 | 30 |
| 1時間以上2時間未満 | 3 | 13 | 7 | 23 | 1 | 17 | | | 11 | 18 |
| 2時間以上3時間未満 | 7 | 29 | 5 | 16 | 2 | 33 | | | 14 | 23 |
| 3時間以上4時間未満 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 17 | | | 4 | 7 |
| 4時間以上5時間未満 | 2 | 8 | 1 | 3 | | | | | 3 | 5 |
| 5時間以上 | 2 | 8 | 8 | 26 | 1 | 17 | | | 11 | 18 |
| 不明/就寝中でない | 114 | | 130 | | 44 | | 4 | | 292 | |
| 総計 | 138 | | 161 | | 50 | | 4 | | 353 | |

患者年齢別②

| 異常な行動までの時間 | 10歳未満 (%) | | 10代 (%) | | 20代 (%) | | 30代 (%) | | 40代 (%) | | 50代 (%) | | 60代 (%) | | 70代 (%) | |
|------------|-----------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|-----|---------|----|---------|--|---------|----|
| 1時間未満 | 2 | 29 | 7 | 41 | 7 | 37 | 1 | 9 | | | 1 | 17 | | | 18 | 30 |
| 1時間以上2時間未満 | 2 | 29 | 1 | 6 | 5 | 26 | 1 | 9 | | | 1 | 17 | | | 10 | 16 |
| 2時間以上3時間未満 | 1 | 14 | 6 | 35 | 1 | 5 | 4 | 36 | 1 | 100 | 2 | 33 | | | 15 | 25 |
| 3時間以上4時間未満 | 1 | 14 | | | 1 | 5 | 1 | 9 | | | 1 | 17 | | | 4 | 7 |
| 4時間以上5時間未満 | 1 | 14 | 1 | 6 | | | 1 | 9 | | | | | | | 3 | 5 |
| 5時間以上 | | | 2 | 12 | 5 | 26 | 3 | 27 | | | 1 | 17 | | | 11 | 18 |
| 不明/就寝中でない | 46 | | 68 | | 56 | | 54 | | 16 | | 48 | | 4 | | 292 | |
| 総計 | 53 | | 85 | | 75 | | 65 | | 17 | | 54 | | 4 | | 353 | |

異常な行動が記録されている事例の集計

(注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1.1. 異常な行動の発現が就寝中か否か

患者年齢別①

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|-----|-----|----|
| Yes | 59 | 66 | 62 | 66 | 12 | 44 | | | 133 | 63 |
| No | 31 | 34 | 32 | 34 | 15 | 56 | 1 | 100 | 79 | 37 |
| 不明 | 48 | | 67 | | 23 | | 3 | | 141 | |
| 総計 | 138 | | 161 | | 50 | | 4 | | 353 | |

患者年齢別②

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|-----|----|
| Yes | 20 | 54 | 39 | 74 | 30 | 65 | 24 | 67 | 7 | 70 | 13 | 45 | | | 133 | 63 |
| No | 17 | 46 | 14 | 26 | 16 | 35 | 12 | 33 | 3 | 30 | 16 | 55 | 1 | 100 | 79 | 37 |
| 不明 | 16 | | 32 | | 29 | | 29 | | 7 | | 25 | | 3 | | 141 | |
| 総計 | 53 | | 85 | | 75 | | 65 | | 17 | | 54 | | 4 | | 353 | |

1.2. 異常な行動の発現が覚醒直後か否か

患者年齢別①

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|--|-----|----|
| Yes | 48 | 65 | 54 | 58 | 10 | 42 | | | 112 | 59 |
| No | 26 | 35 | 39 | 42 | 14 | 58 | | | 79 | 41 |
| 不明 | 64 | | 68 | | 26 | | 4 | | 162 | |
| 総計 | 138 | | 161 | | 50 | | 4 | | 353 | |

患者年齢別②

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|-----|----|
| Yes | 18 | 56 | 30 | 71 | 28 | 64 | 17 | 46 | 7 | 78 | 12 | 44 | | | 112 | 59 |
| No | 14 | 44 | 12 | 29 | 16 | 36 | 20 | 54 | 2 | 22 | 16 | 56 | | | 79 | 41 |
| 不明 | 21 | | 43 | | 31 | | 28 | | 8 | | 27 | | 4 | | 162 | |
| 総計 | 53 | | 85 | | 75 | | 65 | | 17 | | 54 | | 4 | | 353 | |

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

参考) 11と12のクロス集計

| | | 覚醒後に発現したか | | | | | |
|-----------|-----|-----------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | No | | Yes | | 不明 | |
| 就寝中に発現したか | Yes | 95 | 91 | 6 | 12 | 32 | 133 |
| | No | 94 | 6 | | | | |
| | 不明 | 9 | 9 | 46 | 88 | 24 | 79 |
| | 合計 | 16 | 84 | | | | |
| | 総計 | | | 52 | 100 | 56 | 212 |
| | Yes | 8 | 27 | 35 | 106 | 141 | |
| | 総計 | 112 | 79 | 191 | 162 | 353 | |

13. 異常な行動が一眠りして回復したか否か

患者年齢別①

| 患者年齢別 | 10歳未満 | 10歳以上 | 10歳未満 | 10歳以上 | 20歳以上 | 不明 | 合計 | 10歳未満 | 10歳以上 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-------|-------|
| Yes | 64 | 74 | 93 | 82 | 12 | 46 | | 169 | 75 |
| No | 22 | 26 | 20 | 18 | 14 | 54 | | 56 | 25 |
| 不明 | 88 | 100 | 143 | 100 | 26 | 100 | 4 | 207 | 100 |
| 不明 | 52 | | 48 | | 24 | | 4 | 128 | |
| 総計 | 138 | | 161 | | 50 | | 4 | 353 | |

患者年齢別②

| 患者年齢別 | 10歳未満 | 10歳以上 | 10歳未満 | 10歳以上 | 20歳以上 | 不明 | 合計 | 10歳未満 | 10歳以上 | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-------|-------|-----|----|-----|---|-----|-----|
| Yes | 22 | 67 | 42 | 79 | 43 | 83 | 38 | 79 | 10 | 100 | 14 | 48 | | 169 | 75 |
| No | 11 | 33 | 11 | 21 | 9 | 17 | 10 | 21 | | | 15 | 52 | | 56 | 25 |
| 不明 | 33 | 100 | 53 | 100 | 52 | 100 | 45 | 100 | 13 | 100 | 39 | 100 | 4 | 225 | 100 |
| 不明 | 20 | | 32 | | 23 | | 17 | | 7 | | 25 | | 4 | 128 | |
| 総計 | 53 | | 85 | | 75 | | 65 | | 17 | | 54 | | 4 | 353 | |

異常な行動が記録されている事例の集計

(注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1.4. 異常な行動に関する患者の記憶の有無

患者年齢別①

| 年齢 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 有 | 4 | 7 | 28 | 26 | 15 | 43 | | | 47 | 24 |
| 無 | 52 | 93 | 79 | 74 | 20 | 57 | | | 151 | 76 |
| 不明 | 82 | 54 | 54 | 15 | 15 | 4 | | | 155 | |
| 総計 | 138 | 161 | 161 | 115 | 50 | 4 | | | 353 | |

患者年齢別②

| 年齢 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|
| 有 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 24 | 14 | 33 | 2 | 18 | 15 | 39 | 47 | 24 |
| 無 | 19 | 95 | 33 | 92 | 39 | 76 | 28 | 67 | 9 | 82 | 23 | 61 | 151 | 76 |
| 不明 | 33 | 49 | 49 | 24 | 24 | 23 | 6 | 6 | 16 | 4 | 4 | 155 | | |
| 総計 | 53 | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 17 | 54 | 4 | 4 | 353 | | | |

1.5. 光に対する反応の有無

患者年齢別①

| 年齢 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 有 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | 3 | 2 |
| 無 | 45 | 98 | 63 | 97 | 14 | 100 | | | 122 | 98 |
| 不明 | 92 | 54 | 54 | 36 | 4 | 4 | | | 225 | |
| 総計 | 138 | 161 | 161 | 115 | 50 | 4 | | | 353 | |

患者年齢別②

| 年齢 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|
| 有 | 1 | 6 | | 1 | 3 | 1 | 4 | | | 3 | 2 | | | |
| 無 | 17 | 94 | 28 | 100 | 33 | 97 | 22 | 96 | 5 | 100 | 17 | 100 | 122 | 98 |
| 不明 | 35 | 57 | 57 | 41 | 41 | 42 | 12 | 12 | 37 | 4 | 4 | 228 | | |
| 総計 | 53 | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 17 | 54 | 4 | 4 | 353 | | | |

異常な行動が記録されている事例の集計

(注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1.6. 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の既往歴の有無

| 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の既往歴 | 症例数 | (%) |
|--------------------|-----|-----|
| 有 | 17 | 9 |
| 無 | 175 | 91 |
| 小計 | 192 | 100 |
| 不明 | 161 | |
| 総計 | 353 | |

1.7. 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の家族歴の有無

| 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の家族歴 | 症例数 | (%) |
|--------------------|-----|-----|
| 有 | 2 | 1 |
| 無 | 151 | 99 |
| 小計 | 153 | 100 |
| 不明 | 200 | |
| 総計 | 353 | |

1.8. 異常な行動の回復までの時間

患者年齢別①

| 回復までの時間 | 10歳未満 | 10歳以上19歳未満 | 20歳以上29歳未満 | 30歳以上39歳未満 | 40歳以上49歳未満 | 50歳以上59歳未満 | 60歳以上69歳未満 | 70歳以上79歳未満 | 80歳以上89歳未満 | 90歳以上 |
|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 30分未満 | 35 | 38 | 56 | 49 | 5 | 16 | 1 | 100 | 97 | 41 |
| 30分以上60分未満 | 10 | 11 | 16 | 14 | 3 | 9 | | | 29 | 12 |
| 1時間以上6時間未満 | 19 | 21 | 25 | 22 | 4 | 13 | | | 48 | 20 |
| 6時間以上24時間未満 | 17 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13 | | | 26 | 11 |
| 24時間以上 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 | | | 18 | 8 |
| 未回復 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | | | 21 | 9 |
| 小計 | 91 | 100 | 105 | 90 | 32 | 167 | 3 | 100 | 236 | 100 |
| 不明 | 47 | | 46 | | 18 | | 3 | | 114 | |
| 総計 | 138 | | 161 | | 50 | | 4 | | 353 | |

患者年齢別②

| 回復までの時間 | 7歳未満 | 7歳以上9歳未満 | 10歳以上14歳未満 | 15歳以上19歳未満 | 20歳以上24歳未満 | 25歳以上29歳未満 | 30歳以上34歳未満 | 35歳以上39歳未満 | 40歳以上44歳未満 | 45歳以上49歳未満 | 50歳以上54歳未満 | 55歳以上59歳未満 | 60歳以上64歳未満 | 65歳以上69歳未満 | 70歳以上74歳未満 | 75歳以上79歳未満 | 80歳以上84歳未満 | 85歳以上89歳未満 | 90歳以上 |
|-------------|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 30分未満 | 15 | 43 | 20 | 36 | 26 | 49 | 23 | 46 | 6 | 60 | 6 | 17 | 1 | 100 | 97 | 41 | | | |
| 30分以上60分未満 | 3 | 9 | 7 | 13 | 11 | 21 | 5 | 10 | | | 3 | 9 | | | 29 | 12 | | | |
| 1時間以上6時間未満 | 6 | 17 | 13 | 24 | 10 | 19 | 10 | 20 | 3 | 30 | 6 | 17 | | | 48 | 20 | | | |
| 6時間以上24時間未満 | 6 | 17 | 10 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | | | 4 | 11 | | | 26 | 11 | | | |
| 24時間以上 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | | | 8 | 23 | | | 18 | 8 | | | |
| 未回復 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 10 | 8 | 23 | | | 21 | 9 | | | |
| 小計 | 35 | 100 | 55 | 100 | 53 | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 35 | 100 | 3 | 100 | 236 | 100 | | | |
| 不明 | 18 | | 30 | | 22 | | 15 | | 7 | | 19 | | 3 | | 114 | | | | |
| 総計 | 53 | | 85 | | 75 | | 65 | | 17 | | 54 | | 4 | | 353 | | | | |

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注: 複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1.9. 異常な行動が発現した後に投与を継続した症例の状況
 患者年齢別①

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|---|--|-----|-----|
| 再現性あり(注) | 15 | 25 | 13 | 27 | 3 | 20 | | | 31 | 25 |
| 再現性なし | 44 | 75 | 36 | 73 | 12 | 80 | | | 92 | 75 |
| 不明/その他 | 89 | 100 | 49 | 100 | 15 | 100 | 0 | | 224 | 100 |
| 総計 | 138 | | 161 | | 50 | | 4 | | 353 | |

患者年齢別②

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|--|-----|-----|
| 再現性あり(注) | 7 | 36 | 8 | 26 | 8 | 29 | 4 | 38 | 1 | 29 | 3 | 19 | | | 38 | 29 |
| 再現性なし | 16 | 64 | 28 | 74 | 20 | 71 | 10 | 63 | 5 | 71 | 13 | 81 | | | 92 | 71 |
| 不明/その他 | 31 | 100 | 49 | 100 | 26 | 100 | 18 | 100 | 11 | 100 | 38 | 100 | 0 | | 223 | 100 |
| 総計 | 53 | | 85 | | 75 | | 65 | | 17 | | 54 | | 4 | | 353 | |

(注) 精神神経症状の異常も含む有害事象が複数回発現しているもの

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

20. 他剤による同様な副作用歴の有無

| 他剤による副作用歴 | 症例数 | 割合 |
|-----------|-----|-----|
| 有 | 8 | 4 |
| 無 | 213 | 96 |
| 不明 | 22 | 100 |
| 不明 | 132 | |
| 総計 | 353 | |

21. 熱性痙攣の既往歴の有無

| 熱性痙攣の既往歴 | 症例数 | 割合 |
|----------|-----|-----|
| 有 | 11 | 15 |
| 無 | 64 | 85 |
| 不明 | 75 | 100 |
| 不明 | 278 | |
| 総計 | 353 | |

22. 熱性痙攣の家族歴の有無

| 熱性痙攣の家族歴 | 症例数 | 割合 |
|----------|-----|-----|
| 有 | 4 | 10 |
| 無 | 36 | 90 |
| 不明 | 70 | 100 |
| 不明 | 313 | |
| 総計 | 353 | |

リン酸オセルタミビルの異常な行動が記録されている事例の集計

参考1: 主な併用薬剤の内訳

| | | |
|-------------|-------------------------------|-----|
| 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤 | 5 |
| | ベンゾジアゼピン系製剤 | 9 |
| | 有機ブロム化合物製剤 | 1 |
| 計 | | 15 |
| 抗てんかん剤 | その他の抗てんかん剤 | 6 |
| 計 | | 6 |
| 解熱鎮痛消炎剤 | アスピリン・ダイアルミネート ^{注3)} | 1 |
| | アニリン系製剤 | 109 |
| | サリチル酸系製剤 | 2 |
| | その他の解熱鎮痛消炎剤 | 18 |
| | フェニル酢酸系製剤 | 5 |
| | 塩基性消炎鎮痛剤 | 4 |
| 計 | | 139 |
| 抗パーキンソン剤 | アマンタジン製剤 | 1 |
| | ピペリデン製剤 | 1 |
| 計 | | 2 |
| 精神神経用剤 | その他の精神神経用剤 | 9 |
| | フェノチアジン系製剤 | 2 |
| 計 | | 11 |
| 総合感冒剤 | 非ピリン系感冒剤 (2) ^{注3)} | 1 |
| | 非ピリン系感冒剤 (3) ^{注3)} | 1 |
| | 非ピリン系感冒剤 (4) ^{注3)} | 17 |
| 計 | | 19 |
| その他の中枢神経系用薬 | 塩酸ドネペジル ^{注3)} | 1 |
| 計 | | 1 |
| 眼科用剤 | その他の眼科用剤 | 2 |
| 計 | | 2 |
| 耳鼻科用剤 | その他の耳鼻科用剤 | 2 |
| | 耳鼻科用抗生物質製剤 | 1 |
| 計 | | 3 |
| 鎮量剤 | その他の鎮量剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| 強心剤 | カフェイン系製剤 | 3 |
| 計 | | 3 |
| 不整脈用剤 | その他の不整脈用剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| 利尿剤 | その他の利尿剤 | 3 |
| | チアジド系製剤 | 1 |
| | 抗アルドステロン製剤 | 1 |
| 計 | | 5 |

リン酸オセルタミビルの異常な行動が記録されている事例の集計

| | | |
|------------|--|-----|
| 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | 1 |
| | その他の血圧降下剤 | 7 |
| | メチルドパ製剤 | 1 |
| | ラウオルフィア製剤 | 1 |
| 計 | | 10 |
| 血管収縮剤 | 塩酸ミドドリン ^(注3) | 1 |
| 計 | | 1 |
| 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 | 9 |
| 計 | | 9 |
| 高脂血症用剤 | その他の高脂血症用剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| その他の循環器官用薬 | 塩酸セベラマー ^(注3) | 1 |
| | D-マンニトール ^(注3) | 1 |
| | ポリスチレンスルホン酸カルシウム ^(注3) | 2 |
| | 酒石酸イフェンプロジル ^(注3) | 2 |
| 計 | | 6 |
| 鎮咳剤 | エフェドリン及びマオウ製剤 | 4 |
| | その他の鎮咳剤 | 39 |
| | デキストロメトルファン製剤 | 21 |
| 計 | | 64 |
| 去たん剤 | システイン系製剤 | 75 |
| | その他の去たん剤 | 38 |
| | プロムヘキシシン製剤 | 8 |
| | 植物性製剤 | 3 |
| 計 | | 124 |
| 鎮咳去たん剤 | その他の鎮咳去たん剤 | 69 |
| | 植物性製剤 | 6 |
| 計 | | 75 |
| 気管支拡張剤 | イソプレナリン系製剤 | 2 |
| | キサンチン系製剤 | 5 |
| | サルブタモール製剤 | 1 |
| | その他の気管支拡張剤 | 24 |
| 計 | | 32 |
| 含嗽剤 | アズレンスルホン酸ナトリウム ^(注3) | 2 |
| | アズレンスルホン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム ^(注3) | 1 |
| | ポピドンヨード ^(注3) | 2 |
| 計 | | 5 |
| その他の呼吸器官用薬 | プロピオン酸フルチカゾン ^(注3) | 3 |
| 計 | | 3 |
| 止しゃ剤、整腸剤 | 活性生菌製剤 | 18 |
| 計 | | 18 |
| 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 | 2 |
| | その他の消化性潰瘍用剤 | 25 |
| 計 | | 27 |
| 健胃消化剤 | その他の健胃消化剤 | 2 |
| 計 | | 2 |
| 制酸剤 | 無機塩製剤 | 3 |
| 計 | | 3 |

リン酸オセルタミビルの異常な行動が記録されている事例の集計

| | | |
|--|--|-------------|
| 下剤, 浣腸剤 | その他の下剤, 浣腸剤 植物性製剤 | 1 3 |
| 計 | | 4 |
| 利胆剤 | 胆汁酸製剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| その他の消化器官用薬 | 他に分類されない消化器官用薬 | 16 |
| 計 | | 16 |
| 脳下垂体ホルモン剤 | その他の脳下垂体ホルモン剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| 甲状腺, 副甲状腺ホルモ ン剤 | 抗甲状腺ホルモン製剤 甲状腺ホルモン製剤 | 1 2 |
| 計 | | 3 |
| 副腎ホルモン剤 | コルチゾン系製剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 プレドニゾン系製剤 | 1 1 2 |
| 計 | | 4 |
| その他のホルモン剤 (抗 ホルモン剤を含む。) | すい臓ホルモン剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| その他の泌尿生殖器官及 び肛門用薬 | 塩酸タムスロシン ^(注3) | 2 |
| 計 | | 2 |
| 外皮用殺菌消毒剤 | ヨウ素化合物 | 1 |
| 計 | | 1 |
| ビタミンA及びD剤 | 合成ビタミンD製剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| ビタミンB1剤 | ビタミンB1誘導体制剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| ビタミンB剤 (ビタミン B1剤を除く。) | パントテン酸系製剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| ビタミンC剤 | アスコルビン酸 ^(注3) アスコルビン酸・L-システイン ^(注3) | 1 1 |
| 計 | | 2 |
| ビタミンK剤 | メナテトレノン ^(注3) | 1 |
| 計 | | 1 |
| 混合ビタミン剤 (vitam in A・D混合製剤を除 く。) | その他の混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 2 |
| 計 | | 2 |
| 無機質製剤 | 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む。) | 1 |
| 計 | | 1 |
| 糖類剤 | ブドウ糖製剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| たん白アミノ酸製剤 | その他のたん白アミノ酸製剤 | 1 |
| 計 | | 1 |

リン酸オセルタミビルの異常な行動が記録されている事例の集計

| | | |
|----------------|------------------------------|----|
| 血液代用剤 | その他の血液代用剤 | 13 |
| 計 | | 13 |
| 止血剤 | 抗プラスミン剤 | 12 |
| 計 | | 12 |
| 血液凝固阻止剤 | ジクマロール系製剤 | 3 |
| 計 | | 3 |
| その他の血液・体液用薬 | 他に分類されない血液・体液用薬 | 8 |
| 計 | | 8 |
| 痛風治療剤 | アロプリノール製剤 | 2 |
| 計 | | 2 |
| 酵素製剤 | その他の酵素製剤 | 21 |
| 計 | | 21 |
| 糖尿病用剤 | ビグアナイド系製剤 | 1 |
| | 糖尿病用剤 | 1 |
| 計 | | 2 |
| 他に分類されない代謝性医薬品 | 他に分類されないその他の代謝性医薬品 | 1 |
| 計 | | 1 |
| 抗ヒスタミン剤 | その他の抗ヒスタミン剤 | 59 |
| | トリベレナミン系製剤 | 1 |
| | フェノチアジン系製剤 | 12 |
| 計 | | 72 |
| その他のアレルギー用薬 | エバスチン ^{注3)} | 1 |
| | オキサトミド ^{注3)} | 3 |
| | フマル酸エメダスチン ^{注3)} | 1 |
| | フマル酸ケトチフェン ^{注3)} | 6 |
| | برانルカスト水和物 ^{注3)} | 2 |
| | ベシル酸ベボタスチン ^{注3)} | 1 |
| | ペミロラστοカリウム ^{注3)} | 1 |
| | モンテルカστοナトリウム ^{注3)} | 3 |
| | ラマトロバン ^{注3)} | 1 |
| | ロラタジン ^{注3)} | 1 |
| | 塩酸アゼラスチン ^{注3)} | 1 |
| | 塩酸エピナスチン ^{注3)} | 2 |
| | 塩酸セチリジン ^{注3)} | 3 |
| | 塩酸フェキソフェナジン ^{注3)} | 1 |
| 計 | | 27 |

リン酸オセルタミビルの異常な行動が記録されている事例の集計

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----|
| 漢方製剤 ^{注2)} | 桂麻各半湯 ^{注3)} | 1 |
| | 柴胡桂枝湯 ^{注3)} | 1 |
| | 小青竜湯 ^{注3)} | 1 |
| | 麻杏甘石湯 ^{注3)} | 1 |
| | 麻黄湯 ^{注3)} | 3 |
| 計 | | 7 |
| 主としてグラム陽性菌に作用するもの | リンコマイシン系抗生物質製剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| 主としてグラム陰性菌に作用するもの | アミノ糖系抗生物質製剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | オキサセフェム系抗生物質製剤 | 1 |
| | セフェム系抗生物質製剤 | 23 |
| | その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1 |
| | ペニシリン系抗生物質製剤 | 4 |
| 計 | | 29 |
| 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | エリスロマイシン製剤 | 1 |
| | その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 23 |
| 計 | | 24 |
| 合成抗菌剤 | ピリドンカルボン酸系製剤 | 5 |
| 計 | | 5 |
| 抗ウイルス剤 | アシクロビル ^{注3)} | 1 |
| 計 | | 1 |
| 矯味、矯臭、着色剤 | シロップ製剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | 医療用酸素 ^{注3)} | 1 |
| 計 | | 1 |
| あへんアルカロイド系麻薬 | コデイン系製剤 | 1 |
| 計 | | 1 |
| Unknown drug (不明薬) ^{注4)} | | 29 |

注1) 医薬品データファイルVer2008.08.19を使用した

注2) 薬効中分類

注3) 一般名

注4) 併用薬剤のうち、医薬品コードの特定されていないもの

リン酸オセルタミビル の異常な行動が記録されている事例の集計

参考2. 既往症・合併症

| 既往症・合併症 | 1 | 2 | 3 |
|--------------|---|---|---|
| 貧血 | | 1 | 1 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | | 1 | 1 |
| 鉄欠乏性貧血 | | 1 | 1 |
| 心房細動 | | 2 | 2 |
| 心不全 | | 1 | 1 |
| 慢性心不全 | | 1 | 1 |
| 冠状動脈瘤 | | 1 | 1 |
| 期外収縮 | | 1 | 1 |
| 洞不全症候群 | | 1 | 1 |
| 停留精巣 | 1 | | 1 |
| 血友病 | | 1 | 1 |
| 甲状腺腫大 | | 1 | 1 |
| アレルギー性結膜炎 | 1 | 1 | 2 |
| 糖尿病性失明 | | 1 | 1 |
| 糖尿病性網膜症 | | 1 | 1 |
| 腹痛 | | 1 | 1 |
| 便秘 | 1 | 2 | 3 |
| 消化不良 | | 1 | 1 |
| 胃潰瘍 | 1 | | 1 |
| 慢性胃炎 | | 1 | 1 |
| 胃炎 | | 1 | 1 |
| 鼠径ヘルニア | 1 | | 1 |
| 左側鼠径ヘルニア | 1 | | 1 |
| 右側鼠径ヘルニア | 1 | | 1 |
| 発熱 | | 1 | 1 |
| 不明熱 | | 1 | 1 |
| 胆砂 | | 1 | 1 |
| 肝炎 | | 1 | 1 |
| 肝障害 | | 1 | 1 |
| アトピー | | 1 | 1 |
| アレルギー | 1 | 1 | 2 |
| 花粉症 | 1 | 2 | 3 |

リン酸オセルタミビルの異常な行動が記録されている事例の集計

| 集計対象疾患 | 症例数 | 全例数 | 割合 |
|-----------------|-----|-----|----|
| 虫垂炎 | 1 | | 1 |
| 喘息様気管支炎 | 1 | 1 | 2 |
| 気管支炎 | | 1 | 1 |
| 急性気管支炎 | | 2 | 2 |
| 喘鳴を伴う気管支炎 | | 1 | 1 |
| 糖尿病性壊疽 | | 1 | 1 |
| ウイルス性脳炎 | 1 | | 1 |
| インフルエンザ | 23 | | 23 |
| A型インフルエンザウイルス感染 | 4 | 1 | 5 |
| B型インフルエンザウイルス感染 | 2 | | 2 |
| 麻疹 | 1 | | 1 |
| 髄膜炎 | 1 | | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | | 1 |
| 感冒 | 1 | 1 | 2 |
| 中耳炎 | | 1 | 1 |
| 急性中耳炎 | | 1 | 1 |
| 慢性中耳炎 | | 1 | 1 |
| 滲出性中耳炎 | | 1 | 1 |
| 咽頭炎 | | 1 | 1 |
| 肺炎 | | 2 | 2 |
| マイコプラズマ性肺炎 | 1 | | 1 |
| 耳下腺炎 | 1 | | 1 |
| 副鼻腔炎 | | 2 | 2 |
| 結核後遺症 | | 1 | 1 |
| 陳旧性結核 | 1 | | 1 |
| 上気道感染 | | 1 | 1 |
| ウイルス性下痢 | 1 | | 1 |
| ウイルス性筋炎 | | 1 | 1 |
| 細菌感染 | | 1 | 1 |
| レンサ球菌感染 | 1 | 1 | 2 |
| ウイルス性発疹 | | 1 | 1 |
| 突発性発疹 | 1 | | 1 |

リン酸オセルタミビルの異常な行動が記録されている事例の集計

| 集計用疾患名 | 観例数 | 合併症 | 計 |
|-----------|-----|-----|----|
| A型肝炎 | 1 | | 1 |
| 扁桃炎 | 1 | 1 | 2 |
| 熱射病 | 1 | | 1 |
| 外傷 | | 1 | 1 |
| 脱水 | | 1 | 1 |
| 糖尿病 | | 3 | 3 |
| 成長障害 | | 1 | 1 |
| 高クレアチニン血症 | | 1 | 1 |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 1 | | 1 |
| 骨粗鬆症 | | 1 | 1 |
| 胃癌 | | 1 | 1 |
| 頸動脈血栓症 | 1 | | 1 |
| 脳梗塞 | | 3 | 3 |
| 認知症 | | 2 | 2 |
| 脳炎 | | 1 | 1 |
| 髄膜炎 | 1 | | 1 |
| てんかん | | 2 | 2 |
| 熱性痙攣 | 9 | 1 | 10 |
| 熱性痙攣発作 | 1 | | 1 |
| 脳動脈瘤 | 1 | | 1 |
| 精神遅滞 | | 2 | 2 |
| 片頭痛 | 1 | | 1 |
| 異常興奮 | 1 | | 1 |
| うつ病 | | 4 | 4 |
| 抑うつ神経症 | 1 | 1 | 2 |
| 不眠症 | | 2 | 2 |
| 強迫性障害 | | 1 | 1 |
| 統合失調症 | | 1 | 1 |
| 夜驚症 | 1 | | 1 |
| 睡眠時驚愕 | 2 | | 2 |
| 睡眠時遊行症 | 5 | | 5 |
| 夢遊症 | 1 | | 1 |

リン酸オセルタミビルの異常な行動が記録されている事例の集計

| 異常な行動 | 頻度 | 割合 | 合計 |
|-------------------------|----|----|----|
| 自殺企図 | 1 | | 1 |
| かんしゃく発作 | 1 | | 1 |
| 幻覚 | 1 | 1 | 2 |
| 異常行動 | 1 | | 1 |
| 痙攣 | 1 | | 1 |
| 腎不全 | | 2 | 2 |
| 慢性腎不全 | | 3 | 3 |
| 腎機能障害 | | 1 | 1 |
| 喘息 | 5 | 3 | 8 |
| 気管支喘息 | 3 | 9 | 12 |
| 喘息性気管支炎 | 1 | 1 | 2 |
| 慢性呼吸不全 | 1 | 1 | 2 |
| 過呼吸 | 1 | | 1 |
| アレルギー性鼻炎 | | 1 | 1 |
| 喘鳴 | | 1 | 1 |
| 小児喘息 | | 1 | 1 |
| 上気道の炎症 | 1 | | 1 |
| アトピー性皮膚炎 | 3 | 2 | 5 |
| 大動脈瘤 | 1 | | 1 |
| 高血圧 | | 5 | 5 |
| 高脂血症 | | 1 | 1 |
| 気管支喘息 | | 2 | 2 |
| 川崎病後冠動脈瘤 ^{注2)} | | 1 | 1 |
| 川崎病 ^{注3)} | 1 | | 1 |

注1) 一部を除きMedDRA/J Version11.0 LLT日本語名称を使用した

注2) MEDIS病名コード

注3) 医師記載名称