

「プレドニン錠 5mg」の「プルゼニド錠」との誤投与防止について

昨今、弊社製品「プレドニン錠 5mg」とノバルティス ファーマ株式会社の製品「プルゼニド錠」について、相互に誤投与される例が複数報告されております。

このため、「プレドニン錠 5mg」をご使用いただく場合に、以下についてご配慮くださいますようお願い申し上げます。

1. 処方せんへの書き誤り、読み誤り、また処方への聞き誤りによるプルゼニド錠との誤投与防止のため、成分・含量を含む薬剤名記載の徹底をお願いいたします。
例：プレドニン錠 5 mg 1日〇錠 分◇ ●日分
2. 処方へのオーダリングシステムをご採用の施設では、処方への入力、チェックの機能充実に一層のご配慮をお願いいたします。

何卒ご理解を賜り、医薬品の適正使用推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

薬剤の対比表

| 販売名 | プレドニン錠 5mg | プルゼニド錠 |
|-------|---|---|
| 成分・含量 | 1錠中 プレドニゾロン 5 mg | 1錠中プルゼニド（センナ配糖体のカルシウム塩）をセンノシドA・Bとして12 mg含有する。 |
| 薬効分類 | 合成副腎皮質ホルモン剤 | 緩下剤 |
| 効能・効果 | 慢性・急性副腎皮質機能不全、リウマチ疾患、膠原病等 | 便秘症 |
| 用法・用量 | 通常、成人にはプレドニゾロンとして1日5～60 mgを1～4回に分割経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 | センノシドA・Bとして、通常成人1日1回12～24 mg（1～2錠）を就寝前に経口投与する。高度の便秘には、1回48mg（4錠）まで増量することができる。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 |
| 製剤写真 |  |  |
| 包装 | PTP100錠・500錠、瓶500錠 | PTP100錠・500錠・1000錠、バラ1000錠 |
| 製造販売元 | 塩野義製薬株式会社 | ノバルティス ファーマ株式会社 |

お問い合わせ先：塩野義製薬株式会社 医薬情報センター
 (住所) 〒541-0045 大阪市中央区道修町3丁目1番8号
 (TEL) 0120-956-734 (FAX) 06-6202-1541
<http://www.shionogi.co.jp/med/>