

# 処方せん記載例

注)第4回検討会の議論をふまえ修正予定

# 【処方例1 内用薬(均等処方)の場合】 現行の処方せん記載例(1日量)

Rp1)	アムロジンOD(5mg)	1錠
	リバロ(1mg)	1錠
	分1 朝食後	7日分
Rp2)	フロモックス(100)	3錠
	メジコン(15)	3錠
	ムコソルバン(15)	3錠
	分3 毎食後	7日分
Rp3)	インテバンSP(25)	2C
	分2 朝夕食後	7日分
Rp4)	マイスリー(5)	1錠
	1回1錠1日1回 就寝前	7日分

# 【処方例1 内用薬(均等処方)の場合】

## 過渡的記載例(1回量ベース型)

### 【例1】1日量を分量欄に併記型

Rp1) アムロジンOD(5mg) 1錠(1日1錠)  
 リバロ(1mg) 1錠(1日1錠)  
 1日1回 朝食後 7日分

Rp2) フロモックス(100) 1錠(1日3錠)  
 メジコン(15) 1錠(1日3錠)  
 ムコソルバン(15) 1錠(1日3錠)  
 1日3回 毎食後 7日分

Rp3) インテバンSP(25)1カプセル(1日2カプセル)  
 1日2回 朝夕食後 7日分

Rp4) マイスリー(5) 1錠(1日1錠)  
 1日1回 就寝前 7日分

### 【例2】1日量を用法欄に併記型

Rp1) アムロジンOD(5mg) 1錠  
 リバロ(1mg) 1錠  
 1日1回(1日量各1錠)朝食後 7日分

Rp2) フロモックス(100) 1錠  
 メジコン(15) 1錠  
 ムコソルバン(15) 1錠  
 1日3回(1日量各3錠)毎食後 7日分

Rp3) インテバンSP(25) 1カプセル  
 1日2回(1日量2カプセル)朝夕食後  
 7日分

Rp4) マイスリー(5) 1錠  
 1日1回(1日量1錠)就寝前 7日分

# 【処方例1 内用薬(均等処方)の場合】 過渡的記載例(1回量ベース型)

## 【例3】1日量を分量欄に併記型 \*

Rp1)	アムロジンOD(5mg)	1錠	
	リバロ(1mg)	1錠	
	1日1回 朝食後		7日分
Rp2)	フロモックス(100)	1錠(1日3錠)	
	メジコン(15)	1錠(1日3錠)	
	ムコソルバン(15)	1錠(1日3錠)	
	1日3回 毎食後		7日分
Rp3)	インテバンSP(25)	1カプセル(1日2カプセル)	
	1日2回 朝夕食後		7日分
Rp4)	マイスリー(5)	1錠	
	1日1回 就寝前		7日分

## 【例4】1日量を併記しない例 \*\*

本処方せんは1回量で記載されています

Rp1)	アムロジンOD(5mg)	1錠	
	リバロ(1mg)	1錠	
	1日1回 朝食後		7日分
Rp2)	フロモックス(100)	1錠	
	メジコン(15)	1錠	
	ムコソルバン(15)	1錠	
	1日3回 毎食後		7日分
Rp3)	インテバンSP(25)	1カプセル	
	1日2回 朝夕食後		7日分
Rp4)	マイスリー(5)	1錠	
	1日1回 就寝前		7日分

\* 服用回数が1回の場合には1日量は省略可という規定を前提

\*\* 1日〇回という記載及びこの処方せんが1回量で記載されていることを明記した場合には1日量は省略可とする規定を前提(1回量記載推進のための方策)

# 【処方例1 内用薬(均等処方)の場合】

## 将来像(1回量記載方式に統一後のアウトプット例)

処方せん(医師、薬剤師用)

Rp1)	アムロジンOD(5mg)	1錠	
	リバロ(1mg)	1錠	
	1日1回 朝		7日分
Rp2)	フロモックス(100)	1錠	
	メジコン(15)	1錠	
	ムコソルバン(15)	1錠	
	1日3回 朝昼夜		7日分
Rp3)	インテバンSP(25)	1カプセル	
	1日2回 朝夜		7日分
Rp4)	マイスリー(5)	1錠	
	1日1回 就寝前		7日分

処方情報紙(患者、看護師向け)

朝	7日分	
	アムロジンOD(5mg)	1錠
	リバロ(1mg)	1錠
	フロモックス(100)	1錠
	メジコン(15)	1錠
	ムコソルバン(15)	1錠
	インテバンSP(25)	1カプセル
昼	7日分	
	フロモックス(100)	1錠
	メジコン(15)	1錠
	ムコソルバン(15)	1錠
夜	7日分	
	フロモックス(100)	1錠
	メジコン(15)	1錠
	ムコソルバン(15)	1錠
	インテバンSP(25)	1カプセル
就寝前	7日分	
	マイスリー(5)	1錠



## 【処方例2 内用薬(散剤)の場合】

(現行)

テグレート細粒50% 1.6

分2 朝夕食後 14日分

テグレート細粒50% 800mg

分2 朝夕食後 14日分

テグレート細粒50% 1.6g(製剤量)

以上1日量分2 朝夕食後 14日分

カルバマゼピン 800mg(1日原薬量)

1日2回に分けて 朝夕食後 14日分

(過渡的記載例)

(将来像)

テグレート細粒50% 0.8g(1回製剤量)

1日2回 朝夜 14日分

カルバマゼピン 400mg(1回原薬量)

1日2回 朝夜 14日分

# 【処方例3】内用液剤の場合

(現行)

セルシンシロップ0.1% 3mL

分2 朝夕食後 14日分

セルシンシロップ0.1% 3mL(製剤量)

以上1日量 1日2回に分けて朝夕食後 14日分

ジアゼパム

3mg(原薬量)

以上1日量シロップで 分2朝夕食後 14日分

(過渡的記載例)

(将来像)

セルシンシロップ0.1% 1回 1.5mL(製剤量)

1日2回 朝夜 14日分

ジアゼパム

1.5mg(1回原薬量)

1日2回シロップで 朝夜 14日分

# 【処方例4】不均等分割投与の場合

(現行)

プレドニン錠(5mg) 7錠(4-2-1)  
分3 毎食後 7日分

プレドニン錠(5mg) 7錠(4-2-1)  
以上1日量 分3毎食後 7日分

プレドニン錠(5mg) 7錠  
以上1日量3回に分けて(朝4-昼2-夕1) 食後 7日分

(過渡的記載例)

(将来像)

①プレドニン(5mg)	1回	4錠
1日1回 朝	7日分	
②プレドニン(5mg)	1回	2錠
1日1回 昼	7日分	
③プレドニン(5mg)	1回	1錠
1日1回 夜	7日分	



# 【処方例5】休薬期間のある場合

(現行)

リウマトレックス(2mg) 2C  
毎週日曜 1日2回 朝夕食後 4日分  
リウマトレックス(2mg) 1C  
毎週月曜日 1日1回朝食後 4日分

リウマトレックス(2mg) 2カプセル  
毎週日曜 分2朝夕食後 4日分(投与実日数)  
リウマトレックス(2mg) 1カプセル  
毎週月曜 分1朝食後 4日分(投与実日数)

(過渡的記載例)

(将来像)

リウマトレックス(2mg) 1回 1カプセル  
週3回(日曜9時、21時、月曜9時)服用を  
1つの周期として4周期分