


用法マスタの作成・運用 【内服連続投与の場合】



7

用法マスタの作成・運用 【内服不連続投与の場合】

痛み	疼痛時
	頭痛時
	歯痛時
	胸痛時
	腹痛時
	腰痛時
	関節痛時
呼吸	喘鳴時※
	喘息発作時
	しゃっくり時
	咳込時
循環器	血圧上昇時
	血圧上昇時○mHg以上
消化器	便秘時
	下痢時
	嘔吐時
	吐き気時
	空腹時
	出血時
腎	亡尿時
	亡尿時○ml./時間未満
	多尿時
	むくみ時

精神神経	不眠時
	不安時
	不穏時
	いろいろ時
	けいれん時
	めまい時
	疲労時
	発熱時
熱	発熱時○度以上
	悪寒時
	かゆい時
皮膚	発疹時
	発作時
その他症状	症状ある時
	ゴロゴロする時
	検査前
医療	検査時
	検査後
	手術前
	手術後
	処置前
	処置時
	処置後

8

用法マスタの作成・運用 【外用薬投与の場合】

投与回数

+

使用方法

+

体表部位

外用	貼付
	塗布
	適用
	消毒
	湿布
	撒布
	噴霧
	うがい
	吸入
	点耳
	点眼
	点鼻
	トローチ
	膀胱洗浄
	鼻腔内洗浄
	注腸
	洗腸
	肛門挿入
	膣内挿入

全身			
頭部			
頭頂部			
後頭部	1	1	
ひたい			
顔			
まゆ	1	1	1
まゆのまわり	1	1	1
まぶた	1	1	1
目のまわり	1	1	1
頬	1	1	1
鼻部	1	1	
鼻のまわり	1	1	
鼻の下			
鼻腔内			
耳	1	1	1
耳たぶ	1	1	1
耳のうしろ	1	1	1
耳のまわり	1	1	1
耳の中			

口			
口のまわり			
口唇			
口腔内			
口腔内ほほの内側			
口腔内上あご部			
上歯茎部			
下歯茎部			
舌			
舌の裏側			
喉の奥			
扁桃腺部			
下あご			
首			
うなじ			
肩	1	1	1
上肢	1	1	1
腕	1	1	1
上腕	1	1	1
前腕	1	1	1

用法マスタの運用方法

