

④ 水疱・びらん・潰瘍

進行すると表皮下水疱を生じさらに強い疼痛を訴えるようになる。水疱の膜が破れると、びらん・潰瘍化し、出血や痂皮（かさぶた）を伴う。



図18

グレード3		図18
薬 剤	スニチニブ	
疾 患	腎細胞がん	
所 見	足底全体に鱗屑・痂皮を伴うび 漫性の紅斑がみられ、土踏まず 部などには表皮下水疱（ないし 膿疱）を反映する黄白色皮疹が 認められる。グレード3と判定。	



図19

グレード3		図19
薬 剤	ソラフェニブ	
疾 患	腎細胞がん	
所 見	足底から足縁部に腫脹を伴う高 度な紅斑がみられ、大きな表皮 下水疱を形成している。疼痛の ため歩行が困難であり、グレー ド3と判定。	

写真提供: Dr. Caroline Robert, Head of the Dermatology Unit, Institute Gustave Roussy



図20

グレード3		図20
薬 剤	カペシタビン	
疾 患	乳がん	
所 見	足底（土踏まず部以外の部位）に 高 度な紅斑がみられ、過角化と 落 屑、（水疱が破れて乾固した） 痂皮を伴う。疼痛のため歩行が 困難であり、グレード3と判定。	