第３部　身体状況調査の結果

第 20 表　身長・体重の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

年齢(歳)	男性						女性					
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
1	34	78.9	4.5	34	10.6	1.4	17	78.5	5.6	17	10.0	1.4
2	36	89.5	4.9	37	12.9	1.5	34	88.7	3.8	34	12.5	1.5
3	23	97.2	3.6	23	15.2	1.6	41	96.7	3.6	41	14.5	1.5
4	30	103.6	7.4	30	16.7	1.7	33	103.5	3.9	33	16.6	2.1
5	42	109.1	3.5	42	17.8	1.9	32	109.9	4.7	32	19.0	2.2
6	21	116.2	5.8	21	20.7	4.0	38	116.0	4.2	38	20.9	2.7
7	34	122.6	4.5	34	24.2	4.2	46	121.1	5.2	46	23.3	3.4
8	33	129.1	6.0	33	27.6	6.1	43	127.9	5.4	43	26.5	4.6
9	43	133.9	5.8	43	30.3	5.9	41	132.0	5.7	41	29.0	5.8
10	42	138.3	6.7	42	36.2	9.6	35	139.5	6.7	35	34.6	7.8
11	37	145.6	5.6	37	39.8	11.3	45	145.5	7.2	45	38.1	7.9
12	44	151.3	8.6	44	44.0	9.3	30	152.0	6.0	30	42.3	5.9
13	36	158.4	7.2	36	49.2	8.5	37	155.3	6.6	37	47.7	8.4
14	40	165.4	5.8	40	54.9	9.2	33	155.9	4.5	32	50.4	9.2
15	26	169.5	7.5	25	60.0	9.5	40	157.1	5.9	40	52.1	8.3
16	33	168.2	5.7	33	60.4	11.3	36	156.9	5.7	34	51.2	6.7
17	28	173.0	5.1	26	62.4	10.7	34	158.9	5.2	34	54.3	8.5
18	25	171.9	6.0	25	63.4	9.5	22	158.4	5.5	21	53.4	8.2
19	29	172.0	8.5	29	64.4	12.6	22	156.0	4.9	21	49.8	4.7
20	37	169.8	4.5	36	62.6	9.2	24	158.3	4.5	22	53.1	7.0
21	20	171.3	5.4	20	62.1	7.2	30	159.4	5.7	30	51.2	7.1
22	26	170.6	5.9	24	64.1	11.4	19	158.5	4.7	19	51.2	8.3
23	26	171.5	7.3	26	64.2	9.1	30	159.3	4.9	29	51.5	5.9
24	22	171.3	5.6	22	69.2	15.0	32	158.6	4.9	31	51.1	9.0
25	25	171.9	5.6	25	65.4	13.1	25	160.2	5.6	24	52.3	6.3
26-29	128	171.1	5.2	125	67.3	12.7	141	158.5	4.8	133	51.4	6.5
30-39	376	171.6	5.7	375	68.6	11.6	455	158.3	4.9	441	53.5	9.7
40-49	373	169.6	5.7	372	69.1	10.7	492	156.8	5.3	487	55.1	8.7
50-59	492	167.4	6.3	488	66.6	9.7	624	154.6	5.2	620	55.1	8.3
60-69	550	164.2	6.0	548	64.0	8.7	692	151.3	5.4	689	53.9	8.7
70歳以上	589	161.0	6.4	585	60.3	9.0	751	146.9	6.1	749	49.7	8.5
（再掲）												
20歳以上	2664	166.6	7.2	2646	65.2	10.5	3315	153.4	6.9	3274	53.1	8.8
20-29歳	284	171.0	5.5	278	65.8	11.9	301	158.8	4.9	288	51.5	6.9
60-64	274	164.8	6.2	272	64.6	8.6	324	151.7	5.4	322	53.7	9.1
65-69	276	163.6	5.8	276	63.5	8.8	368	151.0	5.3	367	54.0	8.4
70-74	285	161.6	6.2	284	61.8	8.8	282	148.6	5.3	282	51.2	8.3
75-79	176	161.2	6.3	174	60.8	9.6	236	147.1	5.9	234	50.6	8.1
80歳以上	128	159.3	6.6	127	56.5	7.4	233	144.7	6.6	233	47.0	8.6

注）　体重は妊婦除外

第 21 表　BMI の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

年齢(歳)	男性			女性		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	2782	23.36	3.30	3423	22.54	3.62
15-19歳	138	21.23	3.25	150	21.05	2.87
20-29	278	22.44	3.74	288	20.45	2.65
30-39	375	23.29	3.68	441	21.37	3.81
40-49	372	23.99	3.27	487	22.44	3.49
50-59	488	23.74	3.07	620	23.06	3.37
60-69	547	23.75	2.94	689	23.54	3.66
70歳以上	584	23.26	3.07	748	23.04	3.65
（再掲）						
20歳以上	2644	23.47	3.27	3273	22.60	3.64
20-69歳	2060	23.53	3.32	2525	22.48	3.63
40-69	1407	23.81	3.07	1796	23.08	3.54
65-69	275	23.72	2.91	367	23.71	3.69
70-74	283	23.68	3.18	282	23.16	3.42
75-79	174	23.31	3.04	234	23.42	3.53
80-84	86	22.60	2.71	142	23.12	4.17
80歳以上	127	22.27	2.64	232	22.50	3.97
85歳以上	41	21.56	2.35	90	21.51	3.43

注）　妊婦除外

第 22 表　BMI の分布（15 歳以上）

	総数		男性		女性	
	人数	%	人数	%	人数	%
総数	6205	100	2782	100	3423	100
-<15	9	0.1	1	0.0	8	0.2
15-15.9	32	0.5	8	0.3	24	0.7
16-16.9	86	1.4	22	0.8	64	1.9
17-17.9	181	2.9	59	2.1	122	3.6
18-18.9	362	5.8	110	4.0	252	7.4
19-19.9	588	9.5	195	7.0	393	11.5
20-20.9	725	11.7	295	10.6	430	12.6
21-21.9	725	11.7	297	10.7	428	12.5
22-22.9	756	12.2	381	13.7	375	11.0
23-23.9	690	11.1	348	12.5	342	10.0
24-24.9	547	8.8	295	10.6	252	7.4
25-25.9	440	7.1	243	8.7	197	5.8
26-26.9	322	5.2	164	5.9	158	4.6
27-27.9	226	3.6	131	4.7	95	2.8
28-28.9	161	2.6	78	2.8	83	2.4
29-29.9	119	1.9	61	2.2	58	1.7
30-30.9	85	1.4	29	1.0	56	1.6
31-31.9	56	0.9	29	1.0	27	0.8
32-32.9	34	0.5	13	0.5	21	0.6
33-33.9	30	0.5	11	0.4	19	0.6
34-34.9	10	0.2	6	0.2	4	0.1
35-	21	0.3	6	0.2	15	0.4

注）　妊婦除外

第 23 表　BMI の状況（性・年齢階級別）

		総数		肥満度(BMI)					
				やせ		普通		肥満	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別	総数	2782	100.0	134	4.8	1877	67.5	771	27.7
男性	15-19歳	138	100.0	21	15.2	101	73.2	16	11.6
	20-29歳	278	100.0	20	7.2	203	73.0	55	19.8
	30-39歳	375	100.0	19	5.1	256	68.3	100	26.7
	40-49歳	372	100.0	9	2.4	236	63.4	127	34.1
	50-59歳	488	100.0	21	4.3	314	64.3	153	31.4
	60-69歳	547	100.0	15	2.7	364	66.5	168	30.7
	70歳以上	584	100.0	29	5.0	403	69.0	152	26.0
	(再掲)20歳以上	2644	100.0	113	4.3	1776	67.2	755	28.6
	(再掲)20-69歳	2060	100.0	84	4.1	1373	66.7	603	29.3
	(再掲)40-69歳	1407	100.0	45	3.2	914	65.0	448	31.8
	(再掲)65-69歳	275	100.0	7	2.5	183	66.5	85	30.9
	(再掲)70-74歳	283	100.0	10	3.5	183	64.7	90	31.8
	(再掲)75-79歳	174	100.0	9	5.2	122	70.1	43	24.7
	(再掲)80-84歳	86	100.0	7	8.1	64	74.4	15	17.4
	(再掲)85歳以上	41	100.0	3	7.3	34	82.9	4	9.8
女性	総数	3423	100.0	344	10.0	2346	68.5	733	21.4
	15-19歳	150	100.0	19	12.7	117	78.0	14	9.3
	20-29歳	288	100.0	65	22.6	207	71.9	16	5.6
	30-39歳	441	100.0	88	20.0	290	65.8	63	14.3
	40-49歳	487	100.0	39	8.0	354	72.7	94	19.3
	50-59歳	620	100.0	29	4.7	443	71.5	148	23.9
	60-69歳	689	100.0	37	5.4	452	65.6	200	29.0
	70歳以上	748	100.0	67	9.0	483	64.6	198	26.5
	(再掲)20歳以上	3273	100.0	325	9.9	2229	68.1	719	22.0
	(再掲)20-69歳	2525	100.0	258	10.2	1746	69.1	521	20.6
	(再掲)40-69歳	1796	100.0	105	5.8	1249	69.5	442	24.6
	(再掲)65-69歳	367	100.0	18	4.9	236	64.3	113	30.8
	(再掲)70-74歳	282	100.0	15	5.3	189	67.0	78	27.7
	(再掲)75-79歳	234	100.0	18	7.7	148	63.2	68	29.1
	(再掲)80-84歳	142	100.0	17	12.0	87	61.3	38	26.8
	(再掲)85歳以上	90	100.0	17	18.9	59	65.6	14	15.6

注）　妊婦除外。BMI による肥満の判定は p. 17 参照

第 24 表　日比式肥満区分［児童・生徒］

〈ア．性・年齢階級別〉

	総　数								男　性								女　性							
	総　数		年　齢(歳)						総　数		年　齢(歳)						総　数		年　齢(歳)					
			6-8歳		9-11歳		12-14歳				6-8歳		9-11歳		12-14歳				6-8歳		9-11歳		12-14歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
肥満度(日比式)																								
-30%未満	1	0.1	0	0	0	0	1	0.5	1	0.3	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
-30%以上-20%未満	15	2.2	2	0.9	5	2.1	8	3.7	5	1.5	1	1.1	1	0.8	3	2.5	10	2.9	1	0.8	4	3.3	5	5.1
-20%以上-10%未満	110	16.2	25	11.6	38	15.6	47	21.5	60	18.2	14	15.9	16	13.1	30	25.0	50	14.4	11	8.7	22	18.2	17	17.2
-10%以上　0%未満	216	31.9	81	37.7	74	30.5	61	27.9	106	32.1	33	37.5	40	32.8	33	27.5	110	31.7	48	37.8	34	28.1	28	28.3
0%以上+10%未満	173	25.6	59	27.4	63	25.9	51	23.3	84	25.5	25	28.4	31	25.4	28	23.3	89	25.6	34	26.8	32	26.4	23	23.2
+10%以上+20%未満	82	12.1	32	14.9	27	11.1	23	10.5	29	8.8	7	8.0	14	11.5	8	6.7	53	15.3	25	19.7	13	10.7	15	15.2
+20%以上+30%未満	47	6.9	13	6.0	17	7.0	17	7.8	25	7.6	6	6.8	8	6.6	11	9.2	22	6.3	7	5.5	9	7.4	6	6.1
+30%以上+40%未満	16	2.4	1	0.5	9	3.7	6	2.7	10	3.0	1	1.1	5	4.1	4	3.3	6	1.7	0	0	4	3.3	2	2.0
+40%以上	17	2.5	2	0.9	10	4.1	5	2.3	10	3.0	1	1.1	7	5.7	2	1.7	7	2.0	1	0.8	3	2.5	3	3.0
総　数	677	100.0	215	100.0	243	100.0	219	100.0	330	100.0	88	100.0	122	100.0	120	100.0	347	100.0	127	100.0	121	100.0	99	100.0

〈イ．性・通学区分別〉

		総　数		小学校1～3年生である		小学校4～6年生である		中学生である	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	肥満度(日比式)								
男　性	-30%未満	1	0.3	0	0	0	0	1	1.2
	-30%以上-20%未満	5	1.6	2	2.1	0	0	3	3.5
	-20%以上-10%未満	57	18.4	15	15.5	17	13.5	25	29.1
	-10%以上0%未満	98	31.7	36	37.1	39	31.0	23	26.7
	0%以上+10%未満	78	25.2	26	26.8	34	27.0	18	20.9
	+10%以上+20%未満	27	8.7	11	11.3	11	8.7	5	5.8
	+20%以上+30%未満	24	7.8	6	6.2	10	7.9	8	9.3
	+30%以上+40%未満	9	2.9	0	0	7	5.6	2	2.3
	+40%以上	10	3.2	1	1.0	8	6.3	1	1.2
	総　　数	309	100	97	100	126	100	86	100
女　性	肥満度(日比式)								
	-30%以上-20%未満	10	3.1	2	1.5	5	4.4	3	3.8
	-20%以上-10%未満	49	15.0	16	11.9	23	20.2	10	12.8
	-10%以上0%未満	104	31.8	49	36.3	33	28.9	22	28.2
	0%以上+10%未満	81	24.8	33	24.4	27	23.7	21	26.9
	+10%以上+20%未満	49	15.0	25	18.5	12	10.5	12	15.4
	+20%以上+30%未満	21	6.4	8	5.9	8	7.0	5	6.4
	+30%以上+40%未満	6	1.8	0	0	4	3.5	2	2.6
	+40%以上	7	2.1	2	1.5	2	1.8	3	3.8
	総　　数	327	100	135	100	114	100	78	100
総　数	肥満度(日比式)								
	-30%未満	1	0.2	0	0	0	0	1	0.6
	-30%以上-20%未満	15	2.4	4	1.7	5	2.1	6	3.7
	-20%以上-10%未満	106	16.7	31	13.4	40	16.7	35	21.3
	-10%以上0%未満	202	31.8	85	36.6	72	30.0	45	27.4
	0%以上+10%未満	159	25.0	59	25.4	61	25.4	39	23.8
	+10%以上+20%未満	76	11.9	36	15.5	23	9.6	17	10.4
	+20%以上+30%未満	45	7.1	14	6.0	18	7.5	13	7.9
	+30%以上+40%未満	15	2.4	0	0	11	4.6	4	2.4
	+40%以上	17	2.7	3	1.3	10	4.2	4	2.4
	総　　数	636	100	232	100	240	100	164	100

注）　日比式による区分は p.17 参照

第25表　腹囲の区分（性・年齢階級別）

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	腹囲の区分																		
	<85cm(男)/<90cm(女)	861	50.1	50	89.3	98	75.4	108	61.7	92	50.3	130	45.5	173	41.5	210	44.6	811	48.8
	≧85cm(男)/≧90cm(女)	857	49.9	6	10.7	32	24.6	67	38.3	91	49.7	156	54.5	244	58.5	261	55.4	851	51.2
	総数	1718	100	56	100	130	100	175	100	183	100	286	100	417	100	471	100	1662	100
女性	腹囲の区分																		
	<85cm(男)/<90cm(女)	1980	79.7	71	95.9	160	98.8	268	90.8	312	90.2	388	82.6	396	70.5	385	67.1	1909	79.2
	≧85cm(男)/≧90cm(女)	503	20.3	3	4.1	2	1.2	27	9.2	34	9.8	82	17.4	166	29.5	189	32.9	500	20.8
	総数	2483	100	74	100	162	100	295	100	346	100	470	100	562	100	574	100	2409	100
総数	腹囲の区分																		
	<85cm(男)/<90cm(女)	2841	67.6	121	93.1	258	88.4	376	80.0	404	76.4	518	68.5	569	58.1	595	56.9	2720	66.8
	≧85cm(男)/≧90cm(女)	1360	32.4	9	6.9	34	11.6	94	20.0	125	23.6	238	31.5	410	41.9	450	43.1	1351	33.2
	総数	4201	100	130	100	292	100	470	100	529	100	756	100	979	100	1045	100	4071	100

注）妊婦除外

第26表　BMI・腹囲の区分（性・年齢階級別）

		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	BMI・腹囲の区分																		
	BMI<25, 腹囲<85/90cm	826	48.1	49	87.5	94	72.3	102	58.3	87	47.5	125	43.7	162	38.8	207	43.9	777	46.8
	BMI≧25, 腹囲<85/90cm	35	2.0	1	1.8	4	3.1	6	3.4	5	2.7	5	1.7	11	2.6	3	0.6	34	2.0
	BMI<25, 腹囲≧85/90cm	360	21.0	0	0	2	1.5	17	9.7	29	15.8	61	21.3	117	28.1	134	28.5	360	21.7
	BMI≧25, 腹囲≧85/90cm	497	28.9	6	10.7	30	23.1	50	28.6	62	33.9	95	33.2	127	30.5	127	27.0	491	29.5
	総数	1718	100	56	100	130	100	175	100	183	100	286	100	417	100	471	100	1662	100
女性	BMI・腹囲の区分																		
	BMI<25, 腹囲<85/90cm	1766	71.1	64	86.5	152	93.8	244	82.7	272	78.6	344	73.2	349	62.1	341	59.4	1702	70.7
	BMI≧25, 腹囲<85/90cm	214	8.6	7	9.5	8	4.9	24	8.1	40	11.6	44	9.4	47	8.4	44	7.7	207	8.6
	BMI<25, 腹囲≧85/90cm	128	5.2	0	0	0	0	2	0.7	7	2.0	13	2.8	41	7.3	65	11.3	128	5.3
	BMI≧25, 腹囲≧85/90cm	375	15.1	3	4.1	2	1.2	25	8.5	27	7.8	69	14.7	125	22.2	124	21.6	372	15.4
	総数	2483	100	74	100	162	100	295	100	346	100	470	100	562	100	574	100	2409	100
総数	BMI・腹囲の区分																		
	BMI<25, 腹囲<85/90cm	2592	61.7	113	86.9	246	84.2	346	73.6	359	67.9	469	62.0	511	52.2	548	52.4	2479	60.9
	BMI≧25, 腹囲<85/90cm	249	5.9	8	6.2	12	4.1	30	6.4	45	8.5	49	6.5	58	5.9	47	4.5	241	5.9
	BMI<25, 腹囲≧85/90cm	488	11.6	0	0	2	0.7	19	4.0	36	6.8	74	9.8	158	16.1	199	19.0	488	12.0
	BMI≧25, 腹囲≧85/90cm	872	20.8	9	6.9	32	11.0	75	16.0	89	16.8	164	21.7	252	25.7	251	24.0	863	21.2
	総数	4201	100	130	100	292	100	470	100	529	100	756	100	979	100	1045	100	4071	100

注）妊婦除外

第 27 表の１　血圧を下げる薬の服用状況（性・年齢階級別）

		総　数		服用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性　別	年齢(歳)						
男　性	20-29歳	159	100.0	2	1.3	157	98.7
	30-39歳	210	100.0	2	1.0	208	99.0
	40-49歳	216	100.0	18	8.3	198	91.7
	50-59歳	316	100.0	49	15.5	267	84.5
	60-69歳	435	100.0	144	33.1	291	66.9
	70歳-	488	100.0	221	45.3	267	54.7
	総　数	1824	100.0	436	23.9	1388	76.1
女　性	年齢(歳)						
	20-29歳	185	100.0	0	0	185	100.0
	30-39歳	313	100.0	1	0.3	312	99.7
	40-49歳	362	100.0	14	3.9	348	96.1
	50-59歳	499	100.0	69	13.8	430	86.2
	60-69歳	581	100.0	176	30.3	405	69.7
	70歳-	602	100.0	283	47.0	319	53.0
	総　数	2542	100.0	543	21.4	1999	78.6
総　数	年齢(歳)						
	20-29歳	344	100.0	2	0.6	342	99.4
	30-39歳	523	100.0	3	0.6	520	99.4
	40-49歳	578	100.0	32	5.5	546	94.5
	50-59歳	815	100.0	118	14.5	697	85.5
	60-69歳	1016	100.0	320	31.5	696	68.5
	70歳-	1090	100.0	504	46.2	586	53.8
	総　数	4366	100.0	979	22.4	3387	77.6

注）　妊婦除外

第 27 表の２　脈の乱れを治す薬の服用状況（性・年齢階級別）

		総　数		服用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性　別	年齢(歳)						
男　性	20-29歳	159	100.0	1	0.6	158	99.4
	30-39歳	210	100.0	1	0.5	209	99.5
	40-49歳	216	100.0	4	1.9	212	98.1
	50-59歳	316	100.0	5	1.6	311	98.4
	60-69歳	435	100.0	26	6.0	409	94.0
	70歳-	488	100.0	61	12.5	427	87.5
	総　数	1824	100.0	98	5.4	1726	94.6
女　性	年齢(歳)						
	20-29歳	185	100.0	0	0	185	100.0
	30-39歳	313	100.0	1	0.3	312	99.7
	40-49歳	362	100.0	3	0.8	359	99.2
	50-59歳	498	100.0	3	0.6	495	99.4
	60-69歳	581	100.0	25	4.3	556	95.7
	70歳-	601	100.0	55	9.2	546	90.8
	総　数	2540	100.0	87	3.4	2453	96.6
総　数	年齢(歳)						
	20-29歳	344	100.0	1	0.3	343	99.7
	30-39歳	523	100.0	2	0.4	521	99.6
	40-49歳	578	100.0	7	1.2	571	98.8
	50-59歳	814	100.0	8	1.0	806	99.0
	60-69歳	1016	100.0	51	5.0	965	95.0
	70歳-	1089	100.0	116	10.7	973	89.3
	総　数	4364	100.0	185	4.2	4179	95.8

注）　妊婦除外

第 27 表の３　コレステロールを下げる薬の服用状況（性・年齢階級別）

		総　数		服用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性　別	年齢(歳)						
男　性	20-29歳	159	100.0	2	1.3	157	98.7
	30-39歳	210	100.0	4	1.9	206	98.1
	40-49歳	216	100.0	9	4.2	207	95.8
	50-59歳	316	100.0	20	6.3	296	93.7
	60-69歳	435	100.0	44	10.1	391	89.9
	70歳-	488	100.0	55	11.3	433	88.7
	総　数	1824	100.0	134	7.3	1690	92.7
女　性	年齢(歳)						
	20-29歳	185	100.0	0	0	185	100.0
	30-39歳	313	100.0	2	0.6	311	99.4
	40-49歳	362	100.0	5	1.4	357	98.6
	50-59歳	498	100.0	37	7.4	461	92.6
	60-69歳	580	100.0	109	18.8	471	81.2
	70歳	601	100.0	150	25.0	451	75.0
	総　数	2539	100.0	303	11.9	2236	88.1
総数	年齢(歳)						
	20-29歳	344	100.0	2	0.6	342	99.4
	30-39歳	523	100.0	6	1.1	517	98.9
	40-49歳	578	100.0	14	2.4	564	97.6
	50-59歳	814	100.0	57	7.0	757	93.0
	60-69歳	1015	100.0	153	15.1	862	84.9
	70歳-	1089	100.0	205	18.8	884	81.2
	総　数	4363	100.0	437	10.0	3926	90.0

注）　妊婦除外

第 27 表の４　インスリン注射又は血糖を下げる薬の服用状況（性・年齢階級別）

		総　数		薬使用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性　別	年齢(歳)						
男　性	20-29歳	159	100.0	1	0.6	158	99.4
	30-39歳	210	100.0	2	1.0	208	99.0
	40-49歳	216	100.0	5	2.3	211	97.7
	50-59歳	316	100.0	19	6.0	297	94.0
	60-69歳	435	100.0	50	11.5	385	88.5
	70歳-	488	100.0	41	8.4	447	91.6
	総　数	1824	100.0	118	6.5	1706	93.5
女　性	年齢(歳)						
	20-29歳	185	100.0	0	0	185	100.0
	30-39歳	313	100.0	1	0.3	312	99.7
	40-49歳	362	100.0	3	0.8	359	99.2
	50-59歳	498	100.0	16	3.2	482	96.8
	60-69歳	581	100.0	31	5.3	550	94.7
	70歳	601	100.0	37	6.2	564	93.8
	総　数	2540	100.0	88	3.5	2452	96.5
総　数	年齢(歳)						
	20-29歳	344	100.0	1	0.3	343	99.7
	30-39歳	523	100.0	3	0.6	520	99.4
	40-49歳	578	100.0	8	1.4	570	98.6
	50-59歳	814	100.0	35	4.3	779	95.7
	60-69歳	1016	100.0	81	8.0	935	92.0
	70歳-	1089	100.0	78	7.2	1011	92.8
	総　数	4364	100.0	206	4.7	4158	95.3

注）　妊婦除外

第 28 表の１　血圧の状況（性・年齢階級別）

		総数		高血圧学会基準（２回測定値の平均値）												（再掲）	
				至適血圧		正常血圧		正常高値		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧		収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%※
総　数	総　数	4199	100.0	1104	26.3	745	17.7	779	18.6	1051	25.0	408	9.7	112	2.7	800	19.1
	15-19歳	127	100.0	103	81.1	13	10.2	10	7.9	1	0.8	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	292	100.0	190	65.1	64	21.9	20	6.8	17	5.8	1	0.3	0	0	6	2.1
	30-39歳	473	100.0	273	57.7	107	22.6	56	11.8	30	6.3	6	1.3	1	0.2	4	0.8
	40-49歳	530	100.0	198	37.4	107	20.2	97	18.3	94	17.7	29	5.5	5	0.9	29	5.5
	50-59歳	750	100.0	156	20.8	163	21.7	162	21.6	185	24.7	59	7.9	25	3.3	81	10.8
	60-69歳	977	100.0	122	12.5	160	16.4	222	22.7	308	31.5	133	13.6	32	3.3	233	23.8
	70歳以上	1050	100.0	62	5.9	131	12.5	212	20.2	416	39.6	180	17.1	49	4.7	447	42.6
	(再掲)65-74歳	985	100.0	76	7.7	136	13.8	221	22.4	357	36.2	155	15.7	40	4.1	324	32.9
	(再掲)75歳以上	582	100.0	37	6.4	64	11.0	121	20.8	235	40.4	100	17.2	25	4.3	268	46.0
性　別	総　数	1700	100.0	299	17.6	317	18.6	366	21.5	478	28.1	188	11.1	52	3.1	325	19.1
男　性	15-19歳	57	100.0	37	64.9	11	19.3	9	15.8	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	124	100.0	46	37.1	45	36.3	17	13.7	15	12.1	1	0.8	0	0	6	4.8
	30-39歳	171	100.0	68	39.8	45	26.3	30	17.5	22	12.9	5	2.9	1	0.6	3	1.8
	40-49歳	184	100.0	40	21.7	38	20.7	42	22.8	48	26.1	15	8.2	1	0.5	7	3.8
	50-59歳	278	100.0	42	15.1	60	21.6	71	25.5	72	25.9	22	7.9	11	4.0	25	9.0
	60-69歳	416	100.0	42	10.1	69	16.6	95	22.8	131	31.5	64	15.4	15	3.6	91	21.9
	70歳以上	470	100.0	24	5.1	49	10.4	102	21.7	190	40.4	81	17.2	24	5.1	193	41.1
	(再掲)65-74歳	451	100.0	27	6.0	56	12.4	105	23.3	165	36.6	79	17.5	19	4.2	145	32.2
	(再掲)75歳以上	236	100.0	12	5.1	22	9.3	53	22.5	97	41.1	39	16.5	13	5.5	106	44.9
女　性	総　数	2499	100.0	805	32.2	428	17.1	413	16.5	573	22.9	220	8.8	60	2.4	475	19.0
	15-19歳	70	100.0	66	94.3	2	2.9	1	1.4	1	1.4	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	168	100.0	144	85.7	19	11.3	3	1.8	2	1.2	0	0	0	0	0	0
	30-39歳	302	100.0	205	67.9	62	20.5	26	8.6	8	2.6	1	0.3	0	0	1	0.3
	40-49歳	346	100.0	158	45.7	69	19.9	55	15.9	46	13.3	14	4.0	4	1.2	22	6.4
	50-59歳	472	100.0	114	24.2	103	21.8	91	19.3	113	23.9	37	7.8	14	3.0	56	11.9
	60-69歳	561	100.0	80	14.3	91	16.2	127	22.6	177	31.6	69	12.3	17	3.0	142	25.3
	70歳以上	580	100.0	38	6.6	82	14.1	110	19.0	226	39.0	99	17.1	25	4.3	254	43.8
	(再掲)65-74歳	534	100.0	49	9.2	80	15.0	116	21.7	192	36.0	76	14.2	21	3.9	179	33.5
	(再掲)75歳以上	346	100.0	25	7.2	42	12.1	68	19.7	138	39.9	61	17.6	12	3.5	162	46.8

※　総数に対する割合

第 28 表の２　血圧の状況（性・年齢階級別）

		総　数		高血圧学会（２回測定値の平均値）												（再掲）	
				至適血圧		正常血圧		正常高値		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧		収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%※
総　数	総　数	4182	100.0	1089	26.0	744	17.8	779	18.6	1050	25.1	408	9.8	112	2.7	800	19.1
	15-19歳	126	100.0	103	81.7	13	10.3	10	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	283	100.0	182	64.3	63	22.3	20	7.1	17	6.0	1	0.4	0	0	6	2.1
	30-39歳	466	100.0	266	57.1	107	23.0	56	12.0	30	6.4	6	1.3	1	0.2	4	0.9
	40-49歳	530	100.0	198	37.4	107	20.2	97	18.3	94	17.7	29	5.5	5	0.9	29	5.5
	50-59歳	750	100.0	156	20.8	163	21.7	162	21.6	185	24.7	59	7.9	25	3.3	81	10.8
	60-69歳	977	100.0	122	12.5	160	16.4	222	22.7	308	31.5	133	13.6	32	3.3	233	23.8
	70歳以上	1050	100.0	62	5.9	131	12.5	212	20.2	416	39.6	180	17.1	49	4.7	447	42.6
	(再掲)65-74歳	985	100.0	76	7.7	136	13.8	221	22.4	357	36.2	155	15.7	40	4.1	324	32.9
	(再掲)75歳以上	582	100.0	37	6.4	64	11.0	121	20.8	235	40.4	100	17.2	25	4.3	268	46.0
性　別	総　数	1700	100.0	299	17.6	317	18.6	366	21.5	478	28.1	188	11.1	52	3.1	325	19.1
男　性	15-19歳	57	100.0	37	64.9	11	19.3	9	15.8	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	124	100.0	46	37.1	45	36.3	17	13.7	15	12.1	1	0.8	0	0	6	4.8
	30-39歳	171	100.0	68	39.8	45	26.3	30	17.5	22	12.9	5	2.9	1	0.6	3	1.8
	40-49歳	184	100.0	40	21.7	38	20.7	42	22.8	48	26.1	15	8.2	1	0.5	7	3.8
	50-59歳	278	100.0	42	15.1	60	21.6	71	25.5	72	25.9	22	7.9	11	4.0	25	9.0
	60-69歳	416	100.0	42	10.1	69	16.6	95	22.8	131	31.5	64	15.4	15	3.6	91	21.9
	70歳以上	470	100.0	24	5.1	49	10.4	102	21.7	190	40.4	81	17.2	24	5.1	193	41.1
	(再掲)65-74歳	451	100.0	27	6.0	56	12.4	105	23.3	165	36.6	79	17.5	19	4.2	145	32.2
	(再掲)75歳以上	236	100.0	12	5.1	22	9.3	53	22.5	97	41.1	39	16.5	13	5.5	106	44.9
女　性	総　数	2482	100.0	790	31.8	427	17.2	413	16.6	572	23.0	220	8.9	60	2.4	475	19.1
	15-19歳	69	100.0	66	95.7	2	2.9	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	159	100.0	136	85.5	18	11.3	3	1.9	2	1.3	0	0	0	0	0	0
	30-39歳	295	100.0	198	67.1	62	21.0	26	8.8	8	2.7	1	0.3	0	0	1	0.3
	40-49歳	346	100.0	158	45.7	69	19.9	55	15.9	46	13.3	14	4.0	4	1.2	22	6.4
	50-59歳	472	100.0	114	24.2	103	21.8	91	19.3	113	23.9	37	7.8	14	3.0	56	11.9
	60-69歳	561	100.0	80	14.3	91	16.2	127	22.6	177	31.6	69	12.3	17	3.0	142	25.3
	70歳以上	580	100.0	38	6.6	82	14.1	110	19.0	226	39.0	99	17.1	25	4.3	254	43.8
	(再掲)65-74歳	534	100.0	49	9.2	80	15.0	116	21.7	192	36.0	76	14.2	21	3.9	179	33.5
	(再掲)75歳以上	346	100.0	25	7.2	42	12.1	68	19.7	138	39.9	61	17.6	12	3.5	162	46.8

注）妊婦除外
※　総数に対する割合

第 28 表の 3　血圧の状況（性・年齢階級別）

		総　数		高血圧学会(2回測定値の平均値)												（再掲）	
				至適血圧		正常血圧		正常高値		軽症高血圧		中等度高血圧		重症高血圧		収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%※
総　数	総　数	3254	100.0	1051	32.3	664	20.4	606	18.6	647	19.9	229	7.0	57	1.8	430	13.1
	15-19歳	126	100.0	103	81.7	13	10.3	10	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	282	100.0	182	64.5	63	22.3	19	6.7	17	6.0	1	0.4	0	0	6	2.1
	30-39歳	463	100.0	266	57.5	107	23.1	56	12.1	29	6.3	5	1.1	0	0	4	0.9
	40-49歳	502	100.0	197	39.2	106	21.1	93	18.5	80	15.9	22	4.4	4	0.8	27	5.4
	50-59歳	641	100.0	151	23.6	152	23.7	144	22.5	140	21.8	41	6.4	13	2.0	57	8.9
	60-69歳	670	100.0	106	15.8	138	20.6	160	23.9	178	26.6	67	10.0	21	3.1	128	19.1
	70歳以上	570	100.0	46	8.1	85	14.9	124	21.8	203	35.6	93	16.3	19	3.3	208	36.5
	(再掲)65-74歳	607	100.0	60	9.9	101	16.6	142	23.4	200	32.9	80	13.2	24	4.0	172	28.3
	(再掲)75歳以上	286	100.0	26	9.1	40	14.0	67	23.4	106	37.1	44	15.4	3	1.0	114	39.9
性　別	総　数	1286	100.0	284	22.1	282	21.9	286	22.2	306	23.8	102	7.9	26	2.0	182	14.2
男　性	15-19歳	57	100.0	37	64.9	11	19.3	9	15.8	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	123	100.0	46	37.4	45	36.6	16	13.0	15	12.2	1	0.8	0	0	6	4.9
	30-39歳	169	100.0	68	40.2	45	26.6	30	17.8	21	12.4	5	3.0	0	0	3	1.8
	40-49歳	168	100.0	40	23.8	38	22.6	40	23.8	39	23.2	10	6.0	1	0.6	7	4.2
	50-59歳	233	100.0	40	17.2	55	23.6	64	27.5	53	22.7	16	6.9	5	2.1	18	7.7
	60-69歳	278	100.0	33	11.9	59	21.2	66	23.7	78	28.1	31	11.2	11	4.0	51	18.3
	70歳以上	258	100.0	20	7.8	29	11.2	61	23.6	100	38.8	39	15.1	9	3.5	97	37.6
	(再掲)65-74歳	265	100.0	20	7.5	39	14.7	61	23.0	96	36.2	36	13.6	13	4.9	81	30.6
	(再掲)75歳以上	119	100.0	10	8.4	12	10.1	31	26.1	48	40.3	17	14.3	1	0.8	48	40.3
女　性	総　数	1968	100.0	767	39.0	382	19.4	320	16.3	341	17.3	127	6.5	31	1.6	248	12.5
	15-19歳	69	100.0	66	95.7	2	2.9	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	159	100.0	136	85.5	18	11.3	3	1.9	2	1.3	0	0	0	0	0	0
	30-39歳	294	100.0	198	67.3	62	21.1	26	8.8	8	2.7	0	0	0	0	1	0.3
	40-49歳	334	100.0	157	47.0	68	20.4	53	15.9	41	12.3	12	3.6	3	0.9	20	6.0
	50-59歳	408	100.0	111	27.2	97	23.8	80	19.6	87	21.3	25	6.1	8	2.0	39	9.6
	60-69歳	392	100.0	73	18.6	79	20.2	94	24.0	100	25.5	36	9.2	10	2.6	77	19.6
	70歳以上	312	100.0	26	8.3	56	17.9	63	20.2	103	33.0	54	17.3	10	3.2	111	35.6
	(再掲)65-74歳	342	100.0	40	11.7	62	18.1	81	23.7	104	30.4	44	12.9	11	3.2	91	26.6
	(再掲)75歳以上	167	100.0	16	9.6	28	16.8	36	21.6	58	34.7	27	16.2	2	1.2	66	39.5

注）妊婦・血圧を下げる薬服用者除外
※　総数に対する割合

第 29 表の１−１　最低血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総　数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	2回の平均値(mmHg)																
男　性	40-49	2	0.1	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
	50-59	30	1.8	6	10.5	9	7.3	1	0.6	1	0.5	1	0.4	5	1.2	7	1.5
	60-69	196	11.5	22	38.6	26	21.0	29	17.0	11	6.0	18	6.5	40	9.6	50	10.6
	70-79	504	29.6	19	33.3	49	39.5	72	42.1	57	31.0	70	25.2	105	25.2	132	28.1
	80-89	575	33.8	9	15.8	30	24.2	44	25.7	58	31.5	109	39.2	147	35.3	178	37.9
	90-99	292	17.2	0	0	10	8.1	20	11.7	43	23.4	57	20.5	84	20.2	78	16.6
	100-109	78	4.6	0	0	0	0	4	2.3	13	7.1	15	5.4	29	7.0	17	3.6
	110-119	21	1.2	0	0	0	0	1	0.6	1	0.5	6	2.2	6	1.4	7	1.5
	120-129	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.7	0	0	0	0
	総　数	1700	100	57	100	124	100	171	100	184	100	278	100	416	100	470	100
女　性	2回の平均値(mmHg)																
	-39	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
	40-49	12	0.5	5	7.1	1	0.6	1	0.3	1	0.3	0	0	1	0.2	3	0.5
	50-59	127	5.1	13	18.6	41	24.4	31	10.3	17	4.9	6	1.3	6	1.1	13	2.2
	60-69	436	17.4	34	48.6	67	39.9	101	33.4	53	15.3	51	10.8	49	8.7	81	14.0
	70-79	852	34.1	17	24.3	50	29.8	119	39.4	134	38.7	149	31.6	188	33.5	195	33.6
	80-89	693	27.7	0	0	7	4.2	42	13.9	99	28.6	158	33.5	196	34.9	191	32.9
	90-99	285	11.4	1	1.4	2	1.2	7	2.3	29	8.4	78	16.5	91	16.2	77	13.3
	100-109	71	2.8	0	0	0	0	1	0.3	10	2.9	23	4.9	23	4.1	14	2.4
	110-119	16	0.6	0	0	0	0	0	0	1	0.3	5	1.1	5	0.9	5	0.9
	120-129	6	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.6	2	0.4	2	0.4	0	0
	総　数	2499	100	70	100	168	100	302	100	346	100	472	100	561	100	580	100

第 29 表の１−２　最低血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)															
	総　数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-	
	最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																
男　性	81.5	11.3	69.7	9.7	74.6	10.1	78.1	10.3	83.4	10.3	84.6	11.3	83.6	11.3	81.5	10.8
女　性	77.5	11.8	63.8	9.6	65.8	9.2	70.8	9.1	77.3	11.1	81.5	11.4	81.6	10.7	79.1	11.0

注）２回測定値の平均値

第 29 表の１−３　最高血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総　数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	2回の平均値(mmHg)																
男　性	-89	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
	90-99	16	0.9	4	7.0	2	1.6	4	2.3	3	1.6	1	0.4	1	0.2	1	0.2
	100-109	104	6.1	13	22.8	19	15.3	23	13.5	12	6.5	17	6.1	14	3.4	6	1.3
	110-119	228	13.4	21	36.8	33	26.6	50	29.2	36	19.6	33	11.9	34	8.2	21	4.5
	120-129	364	21.4	14	24.6	44	35.5	53	31.0	51	27.7	76	27.3	75	18.0	51	10.9
	130-139	357	21.0	5	8.8	16	12.9	26	15.2	44	23.9	66	23.7	96	23.1	104	22.1
	140-149	261	15.4	0	0	6	4.8	10	5.8	24	13.0	34	12.2	72	17.3	115	24.5
	150-159	176	10.4	0	0	3	2.4	3	1.8	9	4.9	28	10.1	60	14.4	73	15.5
	160-169	104	6.1	0	0	1	0.8	1	0.6	5	2.7	13	4.7	37	8.9	47	10.0
	170-179	48	2.8	0	0	0	0	1	0.6	0	0	2	0.7	16	3.8	29	6.2
	180-	41	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2.9	11	2.6	22	4.7
	総　数	1700	100	57	100	124	100	171	100	184	100	278	100	416	100	470	100
女　性	2回の平均値(mmHg)																
	-89	12	0.5	3	4.3	4	2.4	4	1.3	1	0.3	0	0	0	0	0	0
	90-99	128	5.1	19	27.1	33	19.6	43	14.2	21	6.1	6	1.3	5	0.9	1	0.2
	100-109	329	13.2	28	40.0	65	38.7	94	31.1	65	18.8	39	8.3	28	5.0	10	1.7
	110-119	412	16.5	16	22.9	46	27.4	78	25.8	93	26.9	88	18.6	58	10.3	33	5.7
	120-129	429	17.2	2	2.9	20	11.9	58	19.2	64	18.5	104	22.0	98	17.5	83	14.3
	130-139	404	16.2	2	2.9	0	0	21	7.0	46	13.3	92	19.5	130	23.2	113	19.5
	140-149	326	13.0	0	0	0	0	3	1.0	35	10.1	58	12.3	104	18.5	126	21.7
	150-159	214	8.6	0	0	0	0	0	0	8	2.3	46	9.7	63	11.2	97	16.7
	160-169	141	5.6	0	0	0	0	1	0.3	9	2.6	22	4.7	39	7.0	70	12.1
	170-179	59	2.4	0	0	0	0	0	0	2	0.6	8	1.7	23	4.1	26	4.5
	180-	45	1.8	0	0	0	0	0	0	2	0.6	9	1.9	13	2.3	21	3.6
	総　数	2499	100	70	100	168	100	302	100	346	100	472	100	561	100	580	100

第 29 表の１−４　最高血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)															
	総　数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-	
	最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																
男　性	135.1	19.0	115.0	10.4	121.1	12.6	122.0	12.8	128.3	14.0	133.7	17.5	139.9	18.7	145.3	17.9
女　性	129.8	21.3	105.0	10.8	106.9	9.7	111.8	12.2	122.0	17.4	131.8	18.8	137.7	18.9	144.0	18.1

注）２回測定値の平均値

第 29 表の 2 − 1　最低血圧の分布（性・年齢階級別）

		総数 人数	総数 %	15-19歳 人数	15-19歳 %	20-29歳 人数	20-29歳 %	30-39歳 人数	30-39歳 %	40-49歳 人数	40-49歳 %	50-59歳 人数	50-59歳 %	60-69歳 人数	60-69歳 %	70歳- 人数	70歳- %
		年齢(歳)															
性　別	2回の平均値(mmHg)																
男　性	40-49	2	0.1	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
	50-59	30	1.8	6	10.5	9	7.3	1	0.6	1	0.5	1	0.4	5	1.2	7	1.5
	60-69	196	11.5	22	38.6	26	21.0	29	17.0	11	6.0	18	6.5	40	9.6	50	10.6
	70-79	504	29.6	19	33.3	49	39.5	72	42.1	57	31.0	70	25.2	105	25.2	132	28.1
	80-89	575	33.8	9	15.8	30	24.2	44	25.7	58	31.5	109	39.2	147	35.3	178	37.9
	90-99	292	17.2	0	0	10	8.1	20	11.7	43	23.4	57	20.5	84	20.2	78	16.6
	100-109	78	4.6	0	0	0	0	4	2.3	13	7.1	15	5.4	29	7.0	17	3.6
	110-119	21	1.2	0	0	0	0	1	0.6	1	0.5	6	2.2	6	1.4	7	1.5
	120-129	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.7	0	0	0	0
	総　数	1700	100	57	100	124	100	171	100	184	100	278	100	416	100	470	100
女　性	2回の平均値(mmHg)																
	-39	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
	40-49	11	0.4	5	7.2	0	0	1	0.3	1	0.3	0	0	1	0.2	3	0.5
	50-59	122	4.9	13	18.8	39	24.5	28	9.5	17	4.9	6	1.3	6	1.1	13	2.2
	60-69	430	17.3	34	49.3	63	39.6	99	33.6	53	15.3	51	10.8	49	8.7	81	14.0
	70-79	848	34.2	17	24.6	48	30.2	117	39.7	134	38.7	149	31.6	188	33.5	195	33.6
	80-89	693	27.9	0	0	7	4.4	42	14.2	99	28.6	158	33.5	196	34.9	191	32.9
	90-99	284	11.4	0	0	2	1.3	7	2.4	29	8.4	78	16.5	91	16.2	77	13.3
	100-109	71	2.9	0	0	0	0	1	0.3	10	2.9	23	4.9	23	4.1	14	2.4
	110-119	16	0.6	0	0	0	0	0	0	1	0.3	5	1.1	5	0.9	5	0.9
	120-129	6	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.6	2	0.4	2	0.4	0	0
	総　数	2482	100	69	100	159	100	295	100	346	100	472	100	561	100	580	100

注）　妊婦除外

第 29 表の 2 − 2　最低血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	総数 平均	総数 標準偏差	15-19歳 平均	15-19歳 標準偏差	20-29歳 平均	20-29歳 標準偏差	30-39歳 平均	30-39歳 標準偏差	40-49歳 平均	40-49歳 標準偏差	50-59歳 平均	50-59歳 標準偏差	60-69歳 平均	60-69歳 標準偏差	70歳- 平均	70歳- 標準偏差
	年齢(歳)															
	最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)	
性　別																
男　性	81.5	11.3	69.7	9.7	74.6	10.1	78.1	10.3	83.4	10.3	84.6	11.3	83.6	11.3	81.5	10.8
女　性	77.6	11.8	63.4	9.0	66.1	9.0	71.0	9.1	77.3	11.1	81.5	11.4	81.6	10.7	79.1	11.0

注）　妊婦除外。2 回測定値の平均値

第 29 表の 2 − 3　最高血圧の分布（性・年齢階級別）

		総数 人数	総数 %	15-19歳 人数	15-19歳 %	20-29歳 人数	20-29歳 %	30-39歳 人数	30-39歳 %	40-49歳 人数	40-49歳 %	50-59歳 人数	50-59歳 %	60-69歳 人数	60-69歳 %	70歳- 人数	70歳- %
		年齢(歳)															
性　別	2回の平均値(mmHg)																
男　性	-89	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
	90-99	16	0.9	4	7.0	2	1.6	4	2.3	3	1.6	1	0.4	1	0.2	1	0.2
	100-109	104	6.1	13	22.8	19	15.3	23	13.5	12	6.5	17	6.1	14	3.4	6	1.3
	110-119	228	13.4	21	36.8	33	26.6	50	29.2	36	19.6	33	11.9	34	8.2	21	4.5
	120-129	364	21.4	14	24.6	44	35.5	53	31.0	51	27.7	76	27.3	75	18.0	51	10.9
	130-139	357	21.0	5	8.8	16	12.9	26	15.2	44	23.9	66	23.7	96	23.1	104	22.1
	140-149	261	15.4	0	0	6	4.8	10	5.8	24	13.0	34	12.2	72	17.3	115	24.5
	150-159	176	10.4	0	0	3	2.4	3	1.8	9	4.9	28	10.1	60	14.4	73	15.5
	160-169	104	6.1	0	0	1	0.8	1	0.6	5	2.7	13	4.7	37	8.9	47	10.0
	170-179	48	2.8	0	0	0	0	1	0.6	0	0	2	0.7	16	3.8	29	6.2
	180-	41	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2.9	11	2.6	22	4.7
	総　数	1700	100	57	100	124	100	171	100	184	100	278	100	416	100	470	100
女　性	2回の平均値(mmHg)																
	-89	12	0.5	3	4.3	4	2.5	4	1.4	1	0.3	0	0	0	0	0	0
	90-99	124	5.0	19	27.5	31	19.5	41	13.9	21	6.1	6	1.3	5	0.9	1	0.2
	100-109	321	12.9	28	40.6	62	39.0	89	30.2	65	18.8	39	8.3	28	5.0	10	1.7
	110-119	409	16.5	16	23.2	43	27.0	78	26.4	93	26.9	88	18.6	58	10.3	33	5.7
	120-129	428	17.2	2	2.9	19	11.9	58	19.7	64	18.5	104	22.0	98	17.5	83	14.3
	130-139	403	16.2	1	1.4	0	0	21	7.1	46	13.3	92	19.5	130	23.2	113	19.5
	140-149	326	13.1	0	0	0	0	3	1.0	35	10.1	58	12.3	104	18.5	126	21.7
	150-159	214	8.6	0	0	0	0	0	0	8	2.3	46	9.7	63	11.2	97	16.7
	160-169	141	5.7	0	0	0	0	1	0.3	9	2.6	22	4.7	39	7.0	70	12.1
	170-179	59	2.4	0	0	0	0	0	0	2	0.6	8	1.7	23	4.1	26	4.5
	180-	45	1.8	0	0	0	0	0	0	2	0.6	9	1.9	13	2.3	21	3.6
	総　数	2482	100	69	100	159	100	295	100	346	100	472	100	561	100	580	100

注）　妊婦除外

第 29 表の 2 − 4　最高血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	総数 平均	総数 標準偏差	15-19歳 平均	15-19歳 標準偏差	20-29歳 平均	20-29歳 標準偏差	30-39歳 平均	30-39歳 標準偏差	40-49歳 平均	40-49歳 標準偏差	50-59歳 平均	50-59歳 標準偏差	60-69歳 平均	60-69歳 標準偏差	70歳- 平均	70歳- 標準偏差
	年齢(歳)															
	最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)	
性　別																
男　性	135.1	19.0	115.0	10.4	121.1	12.6	122.0	12.8	128.3	14.0	133.7	17.5	139.9	18.7	145.3	17.9
女　性	129.9	21.3	104.5	10.1	107.0	9.6	112.1	12.2	122.0	17.4	131.8	18.8	137.7	18.9	144.0	18.1

注）　妊婦除外。2 回測定値の平均値

第 29 表の３－１　最低血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総　数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	2回の平均値(mmHg)																
男　性	40-49	2	0.2	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4
	50-59	27	2.1	6	10.5	9	7.3	1	0.6	1	0.6	1	0.4	5	1.8	4	1.6
	60-69	166	12.9	22	38.6	26	21.1	29	17.2	11	6.5	18	7.7	29	10.4	31	12.0
	70-79	409	31.8	19	33.3	49	39.8	72	42.6	57	33.9	60	25.8	78	28.1	74	28.7
	80-89	430	33.4	9	15.8	29	23.6	44	26.0	56	33.3	98	42.1	97	34.9	97	37.6
	90-99	189	14.7	0	0	10	8.1	19	11.2	34	20.2	43	18.5	46	16.5	37	14.3
	100-109	51	4.0	0	0	0	0	4	2.4	8	4.8	10	4.3	18	6.5	11	4.3
	110-119	11	0.9	0	0	0	0	0	0	1	0.6	2	0.9	5	1.8	3	1.2
	120-129	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	0	0
	総　数	1286	100	57	100	123	100	169	100	168	100	233	100	278	100	258	100
女　性	2回の平均値(mmHg)																
	40-49	9	0.5	5	7.2	0	0	1	0.3	1	0.3	0	0	1	0.3	1	0.3
	50-59	111	5.6	13	18.8	39	24.5	28	9.5	17	5.1	6	1.5	5	1.3	3	1.0
	60-69	379	19.3	34	49.3	63	39.6	99	33.7	53	15.9	49	12.0	36	9.2	45	14.4
	70-79	711	36.1	17	24.6	48	30.2	117	39.8	131	39.2	135	33.1	146	37.2	117	37.5
	80-89	507	25.8	0	0	7	4.4	42	14.3	96	28.7	137	33.6	135	34.4	90	28.8
	90-99	184	9.3	0	0	2	1.3	7	2.4	26	7.8	57	14.0	51	13.0	41	13.1
	100-109	49	2.5	0	0	0	0	0	0	8	2.4	18	4.4	13	3.3	10	3.2
	110-119	13	0.7	0	0	0	0	0	0	1	0.3	4	1.0	3	0.8	5	1.6
	120-129	5	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.5	2	0.5	0	0
	総　数	1968	100	69	100	159	100	294	100	334	100	408	100	392	100	312	100

注）　妊婦・血圧を下げる薬服用者除外

第 29 表の３－２　最低血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)															
	総　数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-	
	最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																
男　性	81.5	11.3	69.7	9.7	74.6	10.1	78.1	10.3	83.4	10.3	84.6	11.3	83.6	11.3	81.5	10.8
女　性	77.5	11.8	63.8	9.6	65.8	9.2	70.8	9.1	77.3	11.1	81.5	11.4	81.6	10.7	79.1	11.0

注）　妊婦・血圧を下げる薬服用者除外。２回測定値の平均値

第 29 表の３－３　最高血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総　数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	2回の平均値(mmHg)																
男　性	-89	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4
	90-99	15	1.2	4	7.0	2	1.6	4	2.4	3	1.8	0	0	1	0.4	1	0.4
	100-109	101	7.9	13	22.8	19	15.4	23	13.6	12	7.1	17	7.3	12	4.3	5	1.9
	110-119	215	16.7	21	36.8	32	26.0	50	29.6	36	21.4	32	13.7	26	9.4	18	7.0
	120-129	323	25.1	14	24.6	44	35.8	53	31.4	49	29.2	71	30.5	63	22.7	29	11.2
	130-139	270	21.0	5	8.8	16	13.0	26	15.4	40	23.8	57	24.5	67	24.1	59	22.9
	140-149	170	13.2	0	0	6	4.9	9	5.3	18	10.7	25	10.7	49	17.6	63	24.4
	150-159	96	7.5	0	0	3	2.4	3	1.8	7	4.2	16	6.9	28	10.1	39	15.1
	160-169	59	4.6	0	0	1	0.8	1	0.6	3	1.8	10	4.3	18	6.5	26	10.1
	170-179	17	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	7	2.5	9	3.5
	180-	19	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.7	7	2.5	8	3.1
	総　数	1286	100	57	100	123	100	169	100	168	100	233	100	278	100	258	100
女　性	2回の平均値(mmHg)																
	-89	12	0.6	3	4.3	4	2.5	4	1.4	1	0.3	0	0	0	0	0	0
	90-99	124	6.3	19	27.5	31	19.5	41	13.9	21	6.3	6	1.5	5	1.3	1	0.3
	100-109	316	16.1	28	40.6	62	39.0	89	30.3	65	19.5	39	9.6	26	6.6	7	2.2
	110-119	388	19.7	16	23.2	43	27.0	78	26.5	92	27.5	85	20.8	53	13.5	21	6.7
	120-129	377	19.2	2	2.9	19	11.9	58	19.7	63	18.9	97	23.8	82	20.9	56	17.9
	130-139	306	15.5	1	1.4	0	0	21	7.1	43	12.9	81	19.9	96	24.5	64	20.5
	140-149	205	10.4	0	0	0	0	3	1.0	31	9.3	46	11.3	59	15.1	66	21.2
	150-159	108	5.5	0	0	0	0	0	0	6	1.8	31	7.6	32	8.2	39	12.5
	160-169	80	4.1	0	0	0	0	0	0	9	2.7	15	3.7	20	5.1	36	11.5
	170-179	34	1.7	0	0	0	0	0	0	1	0.3	5	1.2	12	3.1	16	5.1
	180-	18	0.9	0	0	0	0	0	0	2	0.6	3	0.7	7	1.8	6	1.9
	総　数	1968	100	69	100	159	100	294	100	334	100	408	100	392	100	312	100

注）　妊婦・血圧を下げる薬服用者除外。

第 29 表の３－４　最高血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)															
	総　数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳-	
	最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																
男　性	131.1	17.7	115.0	10.4	121.2	12.6	121.6	12.2	126.8	13.2	131.2	16.2	136.8	18.5	142.3	17.4
女　性	125.5	19.9	104.5	10.1	107.0	9.6	111.9	11.9	121.3	17.1	129.1	17.2	134.0	18.7	141.7	18.0

注）　妊婦・血圧を下げる薬服用者除外。２回測定値の平均値

第 30 表　血色素量の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																					
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	血色素量(g/dl)																								
男　性	-<10	10	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.0	6	1.3	1	0.5	2	0.9	1	0.7	2	3.3	1	4.0
	10-<11	8	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	6	1.3	2	1.0	2	0.9	1	0.7	2	3.3	1	4.0
	11-<12	36	2.3	0	0	2	1.3	3	1.7	2	0.8	5	1.3	24	5.4	5	2.4	8	3.6	8	5.7	5	8.2	3	12.0
	12-<13	102	6.6	0	0	2	1.3	5	2.9	5	1.9	28	7.1	62	13.9	21	10.2	17	7.7	30	21.4	10	16.4	5	20.0
	13-<14	210	13.6	3	2.6	8	5.1	16	9.1	31	12.0	48	12.2	104	23.3	26	12.6	51	23.1	27	19.3	18	29.5	8	32.0
	14-<15	432	27.9	22	18.8	39	24.8	44	25.1	84	32.6	130	32.9	113	25.3	60	29.1	63	28.5	34	24.3	11	18.0	5	20.0
	15-<16	487	31.4	55	47.0	58	36.9	67	38.3	96	37.2	123	31.1	88	19.7	62	30.1	51	23.1	27	19.3	9	14.8	1	4.0
	16-<17	201	13.0	28	23.9	40	25.5	26	14.9	28	10.9	42	10.6	37	8.3	21	10.2	24	10.9	8	5.7	4	6.6	1	4.0
	17-<18	54	3.5	8	6.8	8	5.1	13	7.4	11	4.3	9	2.3	5	1.1	5	2.4	2	0.9	3	2.1	0	0	0	0
	18-	9	0.6	1	0.9	0	0	1	0.6	1	0.4	4	1.0	2	0.4	3	1.5	1	0.5	1	0.7	0	0	0	0
	総　数	1549	100	117	100	157	100	175	100	258	100	395	100	447	100	206	100	221	100	140	100	61	100	25	100
女　性	血色素量(g/dl)																								
	-<10	48	2.1	3	2.0	5	1.7	19	5.8	9	2.0	3	0.6	9	1.7	2	0.7	4	1.8	2	1.1	3	3.0	0	0
	10-<11	70	3.0	2	1.3	11	3.8	15	4.6	8	1.8	6	1.1	28	5.1	6	2.1	4	1.8	10	5.7	7	6.9	7	15.2
	11-<12	225	9.8	13	8.5	32	11.0	46	14.0	21	4.6	34	6.4	79	14.5	20	6.9	25	11.3	31	17.6	15	14.9	8	17.4
	12-<13	711	30.9	52	34.0	103	35.5	86	26.1	135	29.8	163	30.6	172	31.6	82	28.5	71	32.0	53	30.1	36	35.6	12	26.1
	13-<14	834	36.2	52	34.0	103	35.5	115	35.0	168	37.1	213	40.0	183	33.6	112	38.9	83	37.4	56	31.8	32	31.7	12	26.1
	14-<15	332	14.4	27	17.6	31	10.7	39	11.9	88	19.4	90	16.9	57	10.5	50	17.4	28	12.6	16	9.1	7	6.9	6	13.0
	15-<16	78	3.4	4	2.6	5	1.7	9	2.7	22	4.9	23	4.3	15	2.8	16	5.6	7	3.2	6	3.4	1	1.0	1	2.2
	16-<17	4	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	2	0.4	0	0	0	0	2	1.1	0	0	0	0
	総　数	2302	100	153	100	290	100	329	100	453	100	532	100	545	100	288	100	222	100	176	100	101	100	46	100

第 30 表　血色素量の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)		血色素量(g/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	14.8	1.4	15.6	0.8	15.4	1.1	15.2	1.2	15.0	1.1	14.7	1.3	14.1	1.5	14.6	1.4	14.4	1.4	14.0	1.5	13.6	1.6	13.2	1.6
女　性	13.0	1.2	13.0	1.1	12.8	1.1	12.7	1.4	13.2	1.1	13.2	1.0	12.8	1.2	13.2	1.1	13.0	1.2	12.8	1.2	12.6	1.2	12.5	1.3

第 31 表　赤血球数の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																					
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	赤血球数(万個/mm^3)																								
男　性	-<400	105	6.8	0	0	1	0.6	3	1.7	9	3.5	25	6.3	67	15.0	18	8.7	20	9.0	25	17.9	15	24.6	7	28.0
	400-<450	355	22.9	0	0	15	9.6	22	12.6	42	16.3	99	25.1	177	39.6	58	28.2	85	38.5	58	41.4	24	39.3	10	40.0
	450-<500	655	42.3	41	35.0	59	37.6	83	47.4	134	51.9	200	50.6	138	30.9	96	46.6	73	33.0	40	28.6	20	32.8	5	20.0
	500-<550	391	25.2	63	53.8	78	49.7	60	34.3	69	26.7	65	16.5	56	12.5	29	14.1	37	16.7	14	10.0	2	3.3	3	12.0
	550-<600	42	2.7	13	11.1	4	2.5	7	4.0	4	1.6	5	1.3	9	2.0	4	1.9	6	2.7	3	2.1	0	0	0	0
	650-	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
	＜410(再掲)	157	10.1	0	0	1	0.6	5	2.9	10	3.9	38	9.6	103	23.0	21	10.2	29	13.1	36	25.7	25	41.0	13	52.0
	≧530(再掲)	147	9.5	34	29.1	27	17.2	19	10.9	19	7.4	27	6.8	21	4.7	13	6.3	16	7.2	4	2.9	1	1.6	0	0
	総　数	1549	100	117	100	157	100	175	100	258	100	395	100	447	100	206	100	221	100	140	100	61	100	25	100
女　性	赤血球数(万個/mm^3)																								
	-<400	370	16.1	14	9.2	33	11.4	42	12.8	43	9.5	72	13.5	166	30.5	39	13.5	48	21.6	57	32.4	39	38.6	22	47.8
	400-<450	1228	53.3	79	51.6	162	55.9	194	59.0	233	51.4	286	53.8	274	50.3	152	52.8	122	55.0	85	48.3	50	49.5	17	37.0
	450-<500	624	27.1	55	35.9	80	27.6	79	24.0	154	34.0	162	30.5	94	17.2	88	30.6	46	20.7	29	16.5	12	11.9	7	15.2
	500-<550	75	3.3	5	3.3	15	5.2	14	4.3	20	4.4	11	2.1	10	1.8	8	2.8	5	2.3	5	2.8	0	0	0	0
	550-<600	5	0.2	0	0	0	0	0	0	3	0.7	1	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	＜380(再掲)	141	6.1	4	2.6	8	2.8	9	2.7	12	2.6	22	4.1	86	15.8	13	4.5	22	9.9	27	15.3	20	19.8	17	37.0
	≧480(再掲)	214	9.3	16	10.5	26	9.0	30	9.1	58	12.8	49	9.2	35	6.4	33	11.5	21	9.5	11	6.3	2	2.0	1	2.2
	総　数	2302	100	153	100	290	100	329	100	453	100	532	100	545	100	288	100	222	100	176	100	101	100	46	100

第 31 表　赤血球数の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	赤血球数(万個/mm^3)		赤血球数(万個/mm^3)		赤血球数(万個/mm^3)		赤血球数(万個/mm^3)		赤血球数(万個/mm^3)		赤血球数(万個/mm^3)		赤血球数(万個/mm^3)		赤血球数(万個/mm^3)		赤血球数(万個/mm^3)		赤血球数(万個/mm^3)		赤血球数(万個/mm^3)		赤血球数(万個/mm^3)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	471.4	45.9	512.6	30.2	497.0	34.2	487.6	35.9	478.3	36.1	465.0	42.5	447.1	48.7	461.9	44.6	457.7	46.2	441.5	48.9	432.7	46.6	420.5	51.7
女　性	432.9	36.7	441.3	29.8	437.4	33.3	434.8	32.4	442.2	34.3	434.9	34.0	417.4	41.9	435.5	36.4	426.0	39.1	415.5	44.7	409.1	37.6	401.4	44.9

第 32 表　ヘマトクリット値の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	ヘマトクリット(%)																								
男　性	25-<30	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	30-<35	16	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.3	11	2.5	3	1.5	2	0.9	3	2.1	3	4.9	3	12.0
	35-<40	100	6.5	0	0	4	2.5	5	2.9	7	2.7	20	5.1	64	14.3	16	7.8	20	9.0	26	18.6	13	21.3	5	20.0
	40-<45	502	32.4	14	12.0	30	19.1	49	28.0	88	34.1	136	34.4	185	41.4	73	35.4	91	41.2	54	38.6	28	45.9	12	48.0
	45-<50	762	49.2	84	71.8	96	61.1	95	54.3	136	52.7	190	48.1	161	36.0	92	44.7	91	41.2	51	36.4	14	23.0	5	20.0
	50-<55	153	9.9	19	16.2	25	15.9	25	14.3	26	10.1	40	10.1	18	4.0	21	10.2	12	5.4	3	2.1	3	4.9	0	0
	55-	14	0.9	0	0	2	1.3	1	0.6	1	0.4	3	0.8	7	1.6	1	0.5	4	1.8	3	2.1	0	0	0	0
	＜39.8(再掲)	110	7.1	0	0	4	2.5	5	2.9	7	2.7	24	6.1	70	15.7	17	8.3	21	9.5	26	18.6	15	24.6	8	32.0
	≧51.9(再掲)	62	4.0	6	5.1	10	6.4	9	5.1	10	3.9	14	3.5	13	2.9	5	2.4	7	3.2	5	3.6	1	1.6	0	0
	総　数	1549	100	117	100	157	100	175	100	258	100	395	100	447	100	206	100	221	100	140	100	61	100	25	100
女　性	ヘマトクリット(%)																								
	-<25	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	25-<30	12	0.5	0	0	1	0.3	5	1.5	1	0.2	1	0.2	4	0.7	1	0.3	1	0.5	2	1.1	1	1.0	0	0
	30-<35	86	3.7	4	2.6	11	3.8	19	5.8	14	3.1	7	1.3	31	5.7	6	2.1	7	3.2	12	6.8	6	5.9	6	13.0
	35-<40	711	30.9	58	37.9	108	37.2	120	36.5	105	23.2	152	28.6	168	30.8	79	27.4	55	24.8	60	34.1	38	37.6	15	32.6
	40-<45	1250	54.3	77	50.3	149	51.4	159	48.3	269	59.4	307	57.7	289	53.0	163	56.6	137	61.7	82	46.6	50	49.5	20	43.5
	45-<50	233	10.1	14	9.2	20	6.9	26	7.9	59	13.0	63	11.8	51	9.4	37	12.8	21	9.5	19	10.8	6	5.9	5	10.9
	50-<55	9	0.4	0	0	1	0.3	0	0	5	1.1	2	0.4	1	0.2	2	0.7	0	0	1	0.6	0	0	0	0
	＜33.4(再掲)	51	2.2	2	1.3	7	2.4	14	4.3	5	1.1	5	0.9	18	3.3	4	1.4	4	1.8	5	2.8	6	5.9	3	6.5
	≧45.0(再掲)	242	10.5	14	9.2	21	7.2	26	7.9	64	14.1	65	12.2	52	9.5	39	13.5	21	9.5	20	11.4	6	5.9	5	10.9
	総　数	2302	100	153	100	290	100	329	100	453	100	532	100	545	100	288	100	222	100	176	100	101	100	46	100

第 32 表　ヘマトクリット値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)		ヘマトクリット(%)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	45.6	3.9	47.6	2.4	47.2	3.1	46.6	3.3	46.1	3.1	45.5	3.8	43.9	4.4	45.2	4.0	44.7	4.2	43.7	4.5	42.7	4.4	41.2	4.5
女　性	41.0	3.4	40.8	3.0	40.6	3.1	40.1	3.6	41.8	3.4	41.7	3.1	40.6	3.7	41.7	3.3	41.1	3.5	40.5	3.7	39.8	3.5	40.0	4.2

第 33 表　平均赤血球容積（MCV）の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20–29歳		30–39歳		40–49歳		50–59歳		60–69歳		70歳以上		(再掲)65–69歳		(再掲)70–74歳		(再掲)75–79歳		(再掲)80–84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	MCV(fl)																								
男　性	70–<75	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75–<80	4	0.3	0	0	0	0	1	0.6	1	0.4	1	0.3	1	0.2	1	0.5	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	80–<85	18	1.2	1	0.9	1	0.6	2	1.1	4	1.6	5	1.3	5	1.1	3	1.5	4	1.8	0	0	0	0	1	4.0
	85–<90	101	6.5	23	19.7	14	8.9	16	9.1	17	6.6	9	2.3	22	4.9	7	3.4	11	5.0	6	4.3	4	6.6	1	4.0
	90–<95	458	29.6	58	49.6	71	45.2	63	36.0	84	32.6	96	24.3	86	19.2	50	24.3	51	23.1	23	16.4	9	14.8	3	12.0
	95–<100	529	34.2	35	29.9	46	29.3	59	33.7	78	30.2	151	38.2	160	35.8	75	36.4	73	33.0	51	36.4	23	37.7	13	52.0
	100–<105	333	21.5	0	0	22	14.0	28	16.0	64	24.8	95	24.1	124	27.7	49	23.8	59	26.7	44	31.4	18	29.5	3	12.0
	105–<110	85	5.5	0	0	3	1.9	6	3.4	8	3.1	28	7.1	40	8.9	14	6.8	20	9.0	10	7.1	6	9.8	4	16.0
	110–<115	15	1.0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	9	2.3	5	1.1	7	3.4	2	0.9	3	2.1	0	0	0	0
	115–<120	5	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	4	0.9	0	0	0	0	3	2.1	1	1.6	0	0
	総　数	1549	100	117	100	157	100	175	100	258	100	395	100	447	100	206	100	221	100	140	100	61	100	25	100
女　性	MCV(fl)																								
	–<70	9	0.4	2	1.3	0	0	2	0.6	5	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70–<75	17	0.7	1	0.7	3	1.0	10	3.0	3	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75–<80	24	1.0	1	0.7	11	3.8	7	2.1	3	0.7	0	0	2	0.4	0	0	1	0.5	0	0	1	1.0	0	0
	80–<85	57	2.5	5	3.3	13	4.5	26	7.9	6	1.3	2	0.4	5	0.9	1	0.3	2	0.9	2	1.1	0	0	1	2.2
	85–<90	206	8.9	21	13.7	44	15.2	48	14.6	39	8.6	33	6.2	21	3.9	22	7.6	8	3.6	7	4.0	5	5.0	1	2.2
	90–<95	788	34.2	77	50.3	110	37.9	104	31.6	178	39.3	186	35.0	133	24.4	93	32.3	66	29.7	43	24.4	17	16.8	7	15.2
	95–<100	840	36.5	40	26.1	83	28.6	94	28.6	167	36.9	220	41.4	236	43.3	123	42.7	95	42.8	78	44.3	52	51.5	11	23.9
	100–<105	304	13.2	6	3.9	24	8.3	34	10.3	47	10.4	74	13.9	119	21.8	36	12.5	45	20.3	33	18.8	22	21.8	19	41.3
	105–<110	51	2.2	0	0	2	0.7	4	1.2	5	1.1	17	3.2	23	4.2	13	4.5	4	1.8	9	5.1	4	4.0	6	13.0
	110–<115	4	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.7	0	0	1	0.5	2	1.1	0	0	1	2.2
	120–	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	0	0	2	1.1	0	0	0	0
	総　数	2302	100	153	100	290	100	329	100	453	100	532	100	545	100	288	100	222	100	176	100	101	100	46	100

第 33 表　平均赤血球容積（MCV）の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20–29歳		30–39歳		40–49歳		50–59歳		60–69歳		70歳以上		(再掲)65–69歳		(再掲)70–74歳		(再掲)75–79歳		(再掲)80–84歳		(再掲)85歳以上	
	MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	97.0	5.5	92.9	3.2	95.1	4.5	95.7	5.0	96.6	5.3	98.1	5.5	98.4	5.6	98.1	5.7	97.8	5.6	99.2	5.6	98.9	5.5	98.2	5.7
女　性	94.9	5.8	92.7	5.3	92.9	5.9	92.4	7.1	94.6	5.5	95.9	4.3	97.4	5.2	95.9	4.4	96.7	4.5	97.8	6.0	97.4	4.6	99.9	5.6

第 34 表　平均赤血球血色素量（MCH）の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20−29歳		30−39歳		40−49歳		50−59歳		60−69歳		70歳以上		(再掲) 65−69歳		(再掲) 70−74歳		(再掲) 75−79歳		(再掲) 80−84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	MCH(pg)																								
男　性	20−<25	13	0.8	0	0	0	0	2	1.1	3	1.2	5	1.3	3	0.7	3	1.5	2	0.9	0	0	1	1.6	0	0
	25−<27	18	1.2	0	0	1	0.6	3	1.7	2	0.8	3	0.8	9	2.0	1	0.5	6	2.7	1	0.7	1	1.6	1	4.0
	27−<29	79	5.1	11	9.4	12	7.6	7	4.0	11	4.3	13	3.3	25	5.6	7	3.4	10	4.5	9	6.4	4	6.6	2	8.0
	29−<31	521	33.6	71	60.7	72	45.9	71	40.6	84	32.6	99	25.1	124	27.7	56	27.2	67	30.3	35	25.0	17	27.9	5	20.0
	31−<33	666	43.0	33	28.2	57	36.3	73	41.7	115	44.6	192	48.6	196	43.8	95	46.1	90	40.7	66	47.1	27	44.3	13	52.0
	33−<35	212	13.7	2	1.7	14	8.9	17	9.7	37	14.3	68	17.2	74	16.6	37	18.0	36	16.3	25	17.9	9	14.8	4	16.0
	35−<40	40	2.6	0	0	1	0.6	2	1.1	6	2.3	15	3.8	16	3.6	7	3.4	10	4.5	4	2.9	2	3.3	0	0
	総　数	1549	100	117	100	157	100	175	100	258	100	395	100	447	100	206	100	221	100	140	100	61	100	25	100
女　性	MCH(pg)																								
	−<20	12	0.5	2	1.3	0	0	4	1.2	5	1.1	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	20−<25	64	2.8	3	2.0	17	5.9	31	9.4	9	2.0	1	0.2	3	0.6	0	0	0	0	1	0.6	1	1.0	1	2.2
	25−<27	85	3.7	7	4.6	25	8.6	27	8.2	11	2.4	9	1.7	6	1.1	6	2.1	3	1.4	1	0.6	1	1.0	1	2.2
	27−<29	288	12.5	28	18.3	49	16.9	43	13.1	51	11.3	64	12.0	53	9.7	31	10.8	21	9.5	23	13.1	8	7.9	1	2.2
	29−<31	1150	50.0	86	56.2	127	43.8	141	42.9	255	56.3	292	54.9	249	45.7	168	58.3	118	53.2	63	35.8	50	49.5	18	39.1
	31−<33	638	27.7	26	17.0	64	22.1	73	22.2	117	25.8	152	28.6	206	37.8	75	26.0	73	32.9	79	44.9	37	36.6	17	37.0
	33−<35	59	2.6	1	0.7	7	2.4	10	3.0	4	0.9	13	2.4	24	4.4	7	2.4	6	2.7	6	3.4	4	4.0	8	17.4
	35−<40	4	0.2	0	0	1	0.3	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0
	40−	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	0	0	2	1.1	0	0	0	0
	総　数	2302	100	153	100	290	100	329	100	453	100	532	100	545	100	288	100	222	100	176	100	101	100	46	100

第 34 表　平均赤血球血色素量（MCH）の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20−29歳		30−39歳		40−49歳		50−59歳		60−69歳		70歳以上		(再掲) 65−69歳		(再掲) 70−74歳		(再掲) 75−79歳		(再掲) 80−84歳		(再掲) 85歳以上	
	MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	31.4	1.9	30.5	1.1	30.9	1.5	31.1	1.7	31.4	1.8	31.8	2.0	31.6	2.0	31.7	2.0	31.5	2.0	31.8	1.8	31.5	2.1	31.4	1.8
女　性	30.0	2.2	29.5	2.1	29.4	2.4	29.2	3.0	29.9	2.1	30.4	1.4	30.7	1.7	30.3	1.4	30.4	1.5	30.8	1.9	30.7	1.6	31.2	2.1

第 35 表　平均赤血球血色素濃度（MCHC）の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	MCHC(%)																								
男　性	26-<28	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	1	0.5	0	0	1	1.6	0	0
	28-<30	38	2.5	1	0.9	2	1.3	6	3.4	4	1.6	11	2.8	14	3.1	6	2.9	5	2.3	6	4.3	2	3.3	1	4.0
	30-<32	457	29.5	22	18.8	43	27.4	43	24.6	61	23.6	113	28.6	175	39.1	57	27.7	79	35.7	54	38.6	30	49.2	12	48.0
	32-<34	964	62.2	80	68.4	100	63.7	113	64.6	176	68.2	250	63.3	245	54.8	134	65.0	128	57.9	80	57.1	25	41.0	12	48.0
	34-	88	5.7	14	12.0	12	7.6	13	7.4	17	6.6	21	5.3	11	2.5	9	4.4	8	3.6	0	0	3	4.9	0	0
	総　数	1549	100	117	100	157	100	175	100	258	100	395	100	447	100	206	100	221	100	140	100	61	100	25	100
女　性	MCHC(%)																								
	24-<26	3	0.1	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	26-<28	18	0.8	1	0.7	2	0.7	10	3.0	3	0.7	1	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0	0	0	0	0	1	2.2
	28-<30	150	6.5	4	2.6	24	8.3	38	11.6	32	7.1	21	3.9	31	5.7	10	3.5	11	5.0	11	6.3	5	5.0	4	8.7
	30-<32	1235	53.6	74	48.4	144	49.7	139	42.2	229	50.6	304	57.1	345	63.3	169	58.7	139	62.6	113	64.2	64	63.4	29	63.0
	32-<34	882	38.3	74	48.4	115	39.7	139	42.2	187	41.3	203	38.2	164	30.1	106	36.8	70	31.5	52	29.5	30	29.7	12	26.1
	34-	14	0.6	0	0	5	1.7	2	0.6	1	0.2	3	0.6	3	0.6	2	0.7	1	0.5	0	0	2	2.0	0	0
	総　数	2302	100	153	100	290	100	329	100	453	100	532	100	545	100	288	100	222	100	176	100	101	100	46	100

第 35 表　平均赤血球血色素濃度（MCHC）の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)		MCHC(%)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	32.4	1.1	32.9	1.1	32.5	1.0	32.6	1.2	32.6	1.0	32.4	1.1	32.1	1.1	32.3	1.1	32.2	1.1	32.1	1.0	31.9	1.4	32.0	1.0
女　性	31.6	1.1	31.8	1.0	31.6	1.2	31.5	1.4	31.6	1.1	31.7	0.9	31.5	1.0	31.7	0.9	31.5	1.0	31.5	1.0	31.5	0.9	31.2	1.2

第 36 表　フェリチンの分布（性・年齢階級別）

性別	フェリチン(ng/ml)	総数 人数	総数 %	20-29歳 人数	20-29歳 %	30-39歳 人数	30-39歳 %	40-49歳 人数	40-49歳 %	50-59歳 人数	50-59歳 %	60-69歳 人数	60-69歳 %	70歳以上 人数	70歳以上 %	(再掲)65-69歳 人数	(再掲)65-69歳 %	(再掲)70-74歳 人数	(再掲)70-74歳 %	(再掲)75-79歳 人数	(再掲)75-79歳 %	(再掲)80-84歳 人数	(再掲)80-84歳 %	(再掲)85歳以上 人数	(再掲)85歳以上 %
男性	1.1-<5	6	0.4	0	0	1	0.6	1	0.6	1	0.4	1	0.3	2	0.4	1	0.5	1	0.4	0	0	1	1.6	0	0
	5-<10	26	1.7	0	0	0	0	4	2.3	4	1.6	9	2.3	9	2.0	4	1.9	5	2.2	4	2.8	0	0	0	0
	10-<15	29	1.9	0	0	0	0	1	0.6	6	2.3	5	1.3	17	3.8	2	1.0	6	2.7	9	6.4	2	3.3	0	0
	15-<20	31	2.0	1	0.8	2	1.3	1	0.6	1	0.4	10	2.5	16	3.5	6	2.9	8	3.6	2	1.4	4	6.6	2	8.0
	20-<25	37	2.4	0	0	1	0.6	2	1.1	3	1.2	11	2.8	20	4.4	7	3.4	10	4.5	7	5.0	3	4.9	0	0
	25-<30	37	2.4	5	4.2	2	1.3	4	2.3	4	1.6	8	2.0	14	3.1	5	2.4	4	1.8	4	2.8	5	8.2	1	4.0
	30-<35	27	1.7	1	0.8	4	2.5	3	1.7	2	0.8	4	1.0	13	2.9	2	1.0	7	3.1	4	2.8	0	0	2	8.0
	35-<40	49	3.1	6	5.1	5	3.2	3	1.7	5	1.9	11	2.8	19	4.2	7	3.4	10	4.5	6	4.3	1	1.6	2	8.0
	40-<45	35	2.2	2	1.7	3	1.9	3	1.7	6	2.3	8	2.0	13	2.9	4	1.9	5	2.2	6	4.3	0	0	2	8.0
	45-<50	40	2.6	6	5.1	2	1.3	3	1.7	6	2.3	7	1.8	16	3.5	2	1.0	6	2.7	3	2.1	6	9.8	1	4.0
	50-<60	79	5.1	11	9.3	8	5.1	6	3.4	10	3.9	8	2.0	36	8.0	6	2.9	18	8.0	9	6.4	9	14.8	0	0
	60-<70	92	5.9	10	8.5	11	7.0	9	5.1	15	5.8	19	4.8	28	6.2	13	6.3	11	4.9	9	6.4	4	6.6	4	16.0
	70-<80	99	6.4	15	12.7	11	7.0	6	3.4	17	6.6	28	7.1	22	4.9	14	6.8	10	4.5	7	5.0	4	6.6	1	4.0
	80-<90	96	6.2	10	8.5	7	4.4	5	2.8	21	8.1	30	7.6	23	5.1	16	7.7	12	5.4	6	4.3	3	4.9	2	8.0
	90-<100	99	6.4	3	2.5	7	4.4	12	6.8	21	8.1	26	6.6	30	6.7	14	6.8	14	6.3	11	7.8	4	6.6	1	4.0
	100-<150	359	23.1	24	20.3	51	32.3	46	26.1	59	22.9	102	25.8	77	17.1	53	25.6	40	17.9	24	17.0	9	14.8	4	16.0
	150-<200	181	11.6	9	7.6	28	17.7	30	17.0	24	9.3	45	11.4	45	10.0	21	10.1	25	11.2	15	10.6	3	4.9	2	8.0
	200-	235	15.1	15	12.7	15	9.5	37	21.0	53	20.5	64	16.2	51	11.3	30	14.5	32	14.3	15	10.6	3	4.9	1	4.0
	＜27(再掲)	144	9.2	3	2.5	6	3.8	10	5.7	16	6.2	41	10.4	68	15.1	24	11.6	31	13.8	24	17.0	11	18.0	2	8.0
	≧320(再掲)	67	4.3	1	0.8	4	2.5	8	4.5	12	4.7	27	6.8	15	3.3	11	5.3	12	5.4	1	0.7	1	1.6	1	4.0
	総数	1557	100	118	100	158	100	176	100	258	100	396	100	451	100	207	100	224	100	141	100	61	100	25	100
女性	-<1.1	2	0.1	0	0	1	0.3	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1-<5	142	6.1	20	12.9	39	13.4	61	18.5	17	3.8	3	0.6	2	0.4	2	0.7	1	0.4	0	0	1	1.0	0	0
	5-<10	182	7.9	18	11.6	51	17.5	53	16.1	27	6.0	15	2.8	18	3.3	9	3.1	5	2.2	6	3.4	6	5.9	1	2.2
	10-<15	144	6.2	18	11.6	29	10.0	37	11.2	17	3.8	16	3.0	27	4.9	8	2.7	10	4.5	11	6.2	5	5.0	1	2.2
	15-<20	139	6.0	14	9.0	29	10.0	35	10.6	18	4.0	11	2.0	32	5.8	5	1.7	18	8.0	9	5.1	3	3.0	2	4.3
	20-<25	118	5.1	15	9.7	25	8.6	21	6.4	17	3.8	16	3.0	24	4.4	9	3.1	9	4.0	10	5.6	2	2.0	3	6.5
	25-<30	139	6.0	8	5.2	22	7.6	30	9.1	34	7.5	19	3.5	26	4.7	8	2.7	9	4.0	10	5.6	4	4.0	3	6.5
	30-<35	112	4.8	10	6.5	22	7.6	14	4.3	22	4.9	23	4.3	21	3.8	10	3.4	8	3.6	7	4.0	4	4.0	2	4.3
	35-<40	137	5.9	9	5.8	16	5.5	14	4.3	24	5.3	34	6.3	40	7.3	21	7.2	15	6.7	12	6.8	8	7.9	5	10.9
	40-<45	130	5.6	12	7.7	10	3.4	11	3.3	33	7.3	35	6.5	29	5.3	22	7.6	14	6.3	8	4.5	7	6.9	0	0
	45-<50	123	5.3	6	3.9	17	5.8	8	2.4	30	6.6	26	4.8	36	6.6	14	4.8	13	5.8	14	7.9	7	6.9	2	4.3
	50-<60	194	8.4	13	8.4	11	3.8	12	3.6	41	9.1	60	11.2	57	10.4	33	11.3	27	12.1	13	7.3	11	10.9	6	13.0
	60-<70	165	7.1	6	3.9	5	1.7	10	3.0	42	9.3	58	10.8	44	8.0	36	12.4	17	7.6	11	6.2	11	10.9	5	10.9
	70-<80	126	5.4	3	1.9	5	1.7	8	2.4	30	6.6	45	8.4	35	6.4	21	7.2	11	4.9	14	7.9	7	6.9	3	6.5
	80-<90	108	4.7	2	1.3	3	1.0	7	2.1	25	5.5	39	7.3	32	5.8	19	6.5	12	5.4	14	7.9	5	5.0	1	2.2
	90-<100	73	3.2	0	0	1	0.3	4	1.2	14	3.1	27	5.0	27	4.9	14	4.8	14	6.3	7	4.0	4	4.0	2	4.3
	100-<150	171	7.4	0	0	2	0.7	2	0.6	41	9.1	71	13.2	55	10.0	39	13.4	23	10.3	14	7.9	13	12.9	5	10.9
	150-<200	62	2.7	1	0.6	2	0.7	1	0.3	14	3.1	24	4.5	20	3.6	13	4.5	8	3.6	9	5.1	1	1.0	2	4.3
	200-	46	2.0	0	0	1	0.3	0	0	7	1.5	15	2.8	23	4.2	8	2.7	10	4.5	8	4.5	2	2.0	3	6.5
	＜3.4(再掲)	72	3.1	9	5.8	18	6.2	34	10.3	10	2.2	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0
	≧89(再掲)	364	15.7	1	0.6	8	2.7	7	2.1	78	17.2	144	26.8	126	23.0	77	26.5	55	24.6	39	22.0	20	19.8	12	26.1
	総数	2313	100	155	100	291	100	329	100	453	100	537	100	548	100	291	100	224	100	177	100	101	100	46	100

第 36 表　フェリチンの平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

性別	総数 平均	総数 標準偏差	20-29歳 平均	20-29歳 標準偏差	30-39歳 平均	30-39歳 標準偏差	40-49歳 平均	40-49歳 標準偏差	50-59歳 平均	50-59歳 標準偏差	60-69歳 平均	60-69歳 標準偏差	70歳以上 平均	70歳以上 標準偏差	(再掲)65-69歳 平均	(再掲)65-69歳 標準偏差	(再掲)70-74歳 平均	(再掲)70-74歳 標準偏差	(再掲)75-79歳 平均	(再掲)75-79歳 標準偏差	(再掲)80-84歳 平均	(再掲)80-84歳 標準偏差	(再掲)85歳以上 平均	(再掲)85歳以上 標準偏差
	フェリチン(ng/ml)																							
男性	122.8	114.9	105.0	72.9	120.4	83.2	137.3	88.7	134.2	110.4	137.8	156.8	103.0	96.9	134.2	169.0	115.8	113.0	96.8	79.1	78.6	69.2	83.2	73.3
女性	53.1	55.5	27.4	22.1	28.0	61.5	24.2	24.8	57.6	47.7	72.4	57.9	68.3	61.0	70.8	48.5	69.2	63.4	68.5	60.6	61.1	43.2	78.1	80.9

第 37 表　総たんぱく質値の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	総たんぱく質(g/dl)																								
男　性	-<6.0	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	0	0	2	1.4	0	0	0	0
	6.0-<6.5	17	1.1	0	0	0	0	1	0.6	4	1.6	1	0.3	11	2.4	0	0	4	1.8	4	2.8	0	0	3	12.0
	6.5-<7.0	144	9.2	2	1.7	11	7.0	18	10.2	26	10.1	42	10.6	45	10.0	23	11.1	19	8.5	16	11.3	7	11.5	3	12.0
	7.0-<7.5	572	36.7	34	28.8	53	33.5	64	36.4	88	34.1	156	39.4	177	39.2	78	37.7	90	40.2	50	35.5	28	45.9	9	36.0
	7.5-<8.0	614	39.4	58	49.2	76	48.1	64	36.4	113	43.8	143	36.1	160	35.5	78	37.7	83	37.1	52	36.9	17	27.9	8	32.0
	8.0-<8.5	177	11.4	17	14.4	17	10.8	25	14.2	22	8.5	47	11.9	49	10.9	25	12.1	23	10.3	17	12.1	7	11.5	2	8.0
	8.5-	31	2.0	7	5.9	1	0.6	4	2.3	5	1.9	7	1.8	7	1.6	3	1.4	5	2.2	0	0	2	3.3	0	0
	総　数	1557	100	118	100	158	100	176	100	258	100	396	100	451	100	207	100	224	100	141	100	61	100	25	100
女　性	総たんぱく質(g/dl)																								
	-<6.0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	1	0.6	0	0	0	0
	6.0-<6.5	15	0.6	1	0.6	0	0	1	0.3	3	0.7	4	0.7	6	1.1	1	0.3	2	0.9	2	1.1	0	0	2	4.3
	6.5-<7.0	191	8.3	8	5.2	16	5.5	27	8.2	31	6.8	49	9.1	60	10.9	25	8.6	18	8.0	24	13.6	11	10.9	7	15.2
	7.0-<7.5	876	37.9	55	35.5	109	37.5	136	41.3	160	35.3	201	37.5	215	39.2	115	39.5	95	42.4	60	33.9	43	42.6	17	37.0
	7.5-<8.0	892	38.6	70	45.2	120	41.2	130	39.5	175	38.6	208	38.8	189	34.5	108	37.1	76	33.9	61	34.5	37	36.6	15	32.6
	8.0-<8.5	299	12.9	19	12.3	44	15.1	31	9.4	76	16.8	64	11.9	65	11.9	38	13.1	26	11.6	27	15.3	8	7.9	4	8.7
	8.5-	38	1.6	2	1.3	2	0.7	4	1.2	8	1.8	10	1.9	12	2.2	4	1.4	7	3.1	2	1.1	2	2.0	1	2.2
	総　数	2312	100	155	100	291	100	329	100	453	100	536	100	548	100	291	100	224	100	177	100	101	100	46	100

第 37 表　総たんぱく質値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	総たんぱく質(g/dl)		総たんぱく質(g/dl)		総たんぱく質(g/dl)		総たんぱく質(g/dl)		総たんぱく質(g/dl)		総たんぱく質(g/dl)		総たんぱく質(g/dl)		総たんぱく質(g/dl)		総たんぱく質(g/dl)		総たんぱく質(g/dl)		総たんぱく質(g/dl)		総たんぱく質(g/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	7.5	0.4	7.7	0.4	7.5	0.4	7.5	0.5	7.5	0.4	7.5	0.4	7.4	0.5	7.5	0.4	7.5	0.4	7.4	0.5	7.5	0.5	7.2	0.5
女　性	7.5	0.4	7.5	0.4	7.5	0.4	7.5	0.4	7.5	0.4	7.5	0.4	7.5	0.5	7.5	0.5	7.5	0.5	7.5	0.5	7.4	0.4	7.4	0.5

第 38 表　アルブミン値の分布（性・年齢階級別）

		総数 人数	総数 %	20-29歳 人数	20-29歳 %	30-39歳 人数	30-39歳 %	40-49歳 人数	40-49歳 %	50-59歳 人数	50-59歳 %	60-69歳 人数	60-69歳 %	70歳以上 人数	70歳以上 %	(再掲)65-69歳 人数	(再掲)65-69歳 %	(再掲)70-74歳 人数	(再掲)70-74歳 %	(再掲)75-79歳 人数	(再掲)75-79歳 %	(再掲)80-84歳 人数	(再掲)80-84歳 %	(再掲)85歳以上 人数	(再掲)85歳以上 %
性別	アルブミン(g/dl)																								
男性	3.2-<3.4	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	0	0	1	0.7	0	0	1	4.0
	3.4-<3.6	3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.4	0	0	2	0.9	0	0	0	0	0	0
	3.6-<3.8	9	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	7	1.6	1	0.5	1	0.4	3	2.1	2	3.3	1	4.0
	3.8-<4.0	26	1.7	0	0	0	0	0	0	1	0.4	6	1.5	19	4.2	4	1.9	4	1.8	8	5.7	3	4.9	4	16.0
	4.0-<4.2	101	6.5	0	0	0	0	3	1.7	8	3.1	21	5.3	69	15.3	11	5.3	35	15.6	21	14.9	6	9.8	7	28.0
	4.2-<4.4	240	15.4	0	0	2	1.3	8	4.5	26	10.1	78	19.7	126	27.9	48	23.2	61	27.2	41	29.1	20	32.8	4	16.0
	4.4-<4.6	399	25.6	10	8.5	26	16.5	36	20.5	85	32.9	128	32.3	114	25.3	67	32.4	56	25.0	38	27.0	16	26.2	4	16.0
	4.6-<4.8	389	25.0	29	24.6	51	32.3	50	28.4	69	26.7	101	25.5	89	19.7	52	25.1	50	22.3	25	17.7	10	16.4	4	16.0
	4.8-<5.0	265	17.0	34	28.8	49	31.0	56	31.8	57	22.1	50	12.6	19	4.2	20	9.7	13	5.8	3	2.1	3	4.9	0	0
	5.0-<5.2	93	6.0	34	28.8	23	14.6	20	11.4	7	2.7	7	1.8	2	0.4	3	1.4	1	0.4	0	0	1	1.6	0	0
	5.2-	30	1.9	11	9.3	7	4.4	3	1.7	5	1.9	2	0.5	2	0.4	1	0.5	1	0.4	1	0.7	0	0	0	0
	≦3.5(再掲)	5	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	4	0.9	0	0	2	0.9	1	0.7	0	0	1	4.0
	総数	1557	100	118	100	158	100	176	100	258	100	396	100	451	100	207	100	224	100	141	100	61	100	25	100
女性	アルブミン(g/dl)																								
	3.2-<3.4	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1.0	0	0
	3.4-<3.6	6	0.3	1	0.6	1	0.3	0	0	0	0	1	0.2	3	0.5	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	2	4.3
	3.6-<3.8	10	0.4	2	1.3	0	0	1	0.3	1	0.2	0	0	6	1.1	0	0	0	0	2	1.1	1	1.0	3	6.5
	3.8-<4.0	31	1.3	1	0.6	1	0.3	0	0	4	0.9	4	0.7	21	3.8	3	1.0	4	1.8	6	3.4	6	5.9	5	10.9
	4.0-<4.2	148	6.4	1	0.6	8	2.7	9	2.7	13	2.9	44	8.2	73	13.3	27	9.3	24	10.7	24	13.6	20	19.8	5	10.9
	4.2-<4.4	415	17.9	8	5.2	42	14.4	63	19.1	59	13.0	110	20.5	133	24.3	63	21.6	54	24.1	43	24.3	23	22.8	13	28.3
	4.4-<4.6	699	30.2	35	22.6	76	26.1	124	37.7	139	30.7	174	32.5	151	27.6	100	34.4	68	30.4	50	28.2	24	23.8	9	19.6
	4.6-<4.8	634	27.4	53	34.2	101	34.7	84	25.5	144	31.8	142	26.5	110	20.1	65	22.3	45	20.1	39	22.0	18	17.8	8	17.4
	4.8-<5.0	294	12.7	37	23.9	50	17.2	42	12.8	73	16.1	51	9.5	41	7.5	25	8.6	27	12.1	9	5.1	4	4.0	1	2.2
	5.0-<5.2	64	2.8	16	10.3	12	4.1	4	1.2	17	3.8	6	1.1	9	1.6	5	1.7	2	0.9	3	1.7	4	4.0	0	0
	5.2-	10	0.4	1	0.6	0	0	2	0.6	3	0.7	4	0.7	0	0	2	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
	≦3.5(再掲)	7	0.3	1	0.6	1	0.3	0	0	0	0	1	0.2	4	0.7	1	0.3	0	0	1	0.6	1	1.0	2	4.3
	総数	2312	100	155	100	291	100	329	100	453	100	536	100	548	100	291	100	224	100	177	100	101	100	46	100

第 38 表　アルブミン値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

年齢(歳)：各欄 アルブミン(g/dl)

	総数 平均	総数 標準偏差	20-29歳 平均	20-29歳 標準偏差	30-39歳 平均	30-39歳 標準偏差	40-49歳 平均	40-49歳 標準偏差	50-59歳 平均	50-59歳 標準偏差	60-69歳 平均	60-69歳 標準偏差	70歳以上 平均	70歳以上 標準偏差	(再掲)65-69歳 平均	(再掲)65-69歳 標準偏差	(再掲)70-74歳 平均	(再掲)70-74歳 標準偏差	(再掲)75-79歳 平均	(再掲)75-79歳 標準偏差	(再掲)80-84歳 平均	(再掲)80-84歳 標準偏差	(再掲)85歳以上 平均	(再掲)85歳以上 標準偏差
性別																								
男性	4.6	0.3	4.9	0.2	4.8	0.2	4.7	0.2	4.6	0.2	4.5	0.3	4.4	0.3	4.5	0.3	4.4	0.3	4.3	0.3	4.4	0.3	4.2	0.3
女性	4.5	0.3	4.6	0.3	4.6	0.2	4.5	0.2	4.6	0.2	4.5	0.2	4.4	0.3	4.5	0.2	4.4	0.3	4.4	0.3	4.4	0.3	4.2	0.3

第 39 表の１　ヘモグロビン A1c の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	ヘモグロビンA1c(%)																								
男　性	-3.9	2	0.1	0	0	0	0	1	0.6	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	20	1.3	4	3.4	4	2.5	2	1.1	4	1.6	2	0.5	4	0.9	0	0	1	0.4	3	2.1	0	0	0	0
	4.4-4.5	62	4.0	13	11.1	11	7.0	15	8.6	7	2.7	10	2.5	6	1.3	6	2.9	4	1.8	1	0.7	0	0	1	4.0
	4.6-4.7	157	10.1	35	29.9	28	17.8	22	12.6	19	7.4	27	6.8	26	5.8	10	4.9	11	4.9	7	5.0	6	9.8	2	8.0
	4.8-4.9	261	16.8	32	27.4	44	28.0	41	23.4	42	16.3	52	13.1	50	11.1	30	14.6	22	9.9	19	13.5	7	11.5	2	8.0
	5.0-5.1	277	17.8	23	19.7	35	22.3	43	24.6	43	16.7	65	16.4	68	15.1	29	14.1	35	15.7	24	17.0	8	13.1	1	4.0
	5.2	136	8.8	6	5.1	17	10.8	13	7.4	22	8.5	31	7.8	47	10.4	16	7.8	26	11.7	14	9.9	1	1.6	6	24.0
	5.3	94	6.1	4	3.4	6	3.8	7	4.0	22	8.5	30	7.6	25	5.6	14	6.8	9	4.0	10	7.1	4	6.6	2	8.0
	5.4	111	7.1	0	0	3	1.9	10	5.7	25	9.7	31	7.8	42	9.3	17	8.3	17	7.6	12	8.5	8	13.1	5	20.0
	5.5	78	5.0	0	0	2	1.3	8	4.6	10	3.9	18	4.5	40	8.9	9	4.4	19	8.5	9	6.4	7	11.5	5	20.0
	5.6	63	4.1	0	0	3	1.9	4	2.3	12	4.7	18	4.5	26	5.8	11	5.3	17	7.6	3	2.1	5	8.2	1	4.0
	5.7	37	2.4	0	0	2	1.3	1	0.6	5	1.9	9	2.3	20	4.4	6	2.9	10	4.5	8	5.7	2	3.3	0	0
	5.8	34	2.2	0	0	0	0	2	1.1	7	2.7	15	3.8	10	2.2	10	4.9	2	0.9	4	2.8	4	6.6	0	0
	5.9	24	1.5	0	0	0	0	0	0	9	3.5	3	0.8	12	2.7	3	1.5	7	3.1	4	2.8	1	1.6	0	0
	6.0	17	1.1	0	0	1	0.6	0	0	2	0.8	7	1.8	7	1.6	3	1.5	4	1.8	3	2.1	0	0	0	0
	6.1	18	1.2	0	0	0	0	0	0	4	1.6	8	2.0	6	1.3	4	1.9	2	0.9	3	2.1	1	1.6	0	0
	6.2-6.3	27	1.7	0	0	0	0	2	1.1	3	1.2	14	3.5	8	1.8	9	4.4	4	1.8	3	2.1	1	1.6	0	0
	6.4-6.5	21	1.4	0	0	1	0.6	0	0	2	0.8	8	2.0	10	2.2	1	0.5	4	1.8	4	2.8	2	3.3	0	0
	6.6-6.7	21	1.4	0	0	0	0	1	0.6	2	0.8	7	1.8	11	2.4	6	2.9	9	4.0	2	1.4	0	0	0	0
	6.8-6.9	18	1.2	0	0	0	0	2	1.1	2	0.8	6	1.5	8	1.8	5	2.4	3	1.3	4	2.8	1	1.6	0	0
	7.0-7.1	15	1.0	0	0	0	0	0	0	2	0.8	9	2.3	4	0.9	4	1.9	3	1.3	0	0	1	1.6	0	0
	7.2-7.3	8	0.5	0	0	0	0	0	0	1	0.4	5	1.3	2	0.4	2	1.0	1	0.4	0	0	1	1.6	0	0
	7.4-7.5	10	0.6	0	0	0	0	0	0	1	0.4	5	1.3	4	0.9	1	0.5	3	1.3	1	0.7	0	0	0	0
	7.6-7.7	7	0.5	0	0	0	0	0	0	1	0.4	2	0.5	4	0.9	1	0.5	3	1.3	1	0.7	0	0	0	0
	7.8-7.9	4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	3	0.7	1	0.5	2	0.9	0	0	1	1.6	0	0
	8.0-8.1	6	0.4	0	0	0	0	1	0.6	0	0	4	1.0	1	0.2	2	1.0	1	0.4	0	0	0	0	0	0
	8.2-8.3	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	1	0.5	0	0	1	0.7	0	0	0	0
	8.4-8.5	3	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.4	2	0.5	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.8-8.9	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.0-	18	1.2	0	0	0	0	0	0	10	3.9	4	1.0	4	0.9	3	1.5	3	1.3	1	0.7	0	0	0	0
	総　数	1553	100	117	100	157	100	175	100	258	100	396	100	450	100	206	100	223	100	141	100	61	100	25	100

		年齢(歳)																							
		総　数		20–29歳		30–39歳		40–49歳		50–59歳		60–69歳		70歳以上		（再掲）65–69歳		（再掲）70–74歳		（再掲）75–79歳		（再掲）80–84歳		（再掲）85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女　性	ヘモグロビンA1c(%)																								
	–3.9	1	0.0	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.0–4.1	8	0.3	2	1.3	5	1.7	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2
	4.2–4.3	22	1.0	3	2.0	8	2.8	8	2.4	0	0	1	0.2	2	0.4	1	0.3	0	0	1	0.6	1	1.0	0	0
	4.4–4.5	98	4.2	24	15.7	29	10.0	21	6.4	7	1.5	8	1.5	9	1.6	4	1.4	4	1.8	4	2.3	1	1.0	0	0
	4.6–4.7	201	8.7	35	22.9	39	13.4	46	13.9	34	7.5	18	3.4	29	5.3	9	3.1	10	4.4	5	2.8	9	8.9	5	10.9
	4.8–4.9	377	16.3	42	27.5	95	32.8	69	20.9	62	13.7	56	10.5	53	9.7	32	11.1	18	8.0	18	10.2	11	10.9	6	13.0
	5.0–5.1	439	19.0	22	14.4	63	21.7	61	18.5	89	19.6	104	19.5	100	18.2	53	18.3	44	19.6	29	16.4	17	16.8	10	21.7
	5.2	244	10.6	12	7.8	19	6.6	33	10.0	60	13.2	60	11.3	60	10.9	30	10.4	21	9.3	21	11.9	13	12.9	5	10.9
	5.3	190	8.2	3	2.0	7	2.4	24	7.3	51	11.3	50	9.4	55	10.0	26	9.0	27	12.0	18	10.2	7	6.9	3	6.5
	5.4	187	8.1	7	4.6	7	2.4	15	4.5	45	9.9	58	10.9	55	10.0	35	12.1	20	8.9	19	10.7	11	10.9	5	10.9
	5.5	144	6.2	1	0.7	6	2.1	21	6.4	29	6.4	42	7.9	45	8.2	23	8.0	18	8.0	13	7.3	9	8.9	5	10.9
	5.6	88	3.8	1	0.7	5	1.7	8	2.4	12	2.6	31	5.8	31	5.6	16	5.5	15	6.7	9	5.1	7	6.9	0	0
	5.7	58	2.5	0	0	3	1.0	8	2.4	11	2.4	16	3.0	20	3.6	11	3.8	6	2.7	8	4.5	4	4.0	2	4.3
	5.8	37	1.6	0	0	0	0	3	0.9	9	2.0	15	2.8	10	1.8	5	1.7	2	0.9	5	2.8	1	1.0	2	4.3
	5.9	33	1.4	0	0	0	0	3	0.9	11	2.4	8	1.5	11	2.0	5	1.7	5	2.2	4	2.3	1	1.0	1	2.2
	6.0	25	1.1	0	0	0	0	1	0.3	8	1.8	5	0.9	11	2.0	1	0.3	8	3.6	2	1.1	1	1.0	0	0
	6.1	22	1.0	0	0	1	0.3	0	0	5	1.1	11	2.1	5	0.9	4	1.4	3	1.3	0	0	2	2.0	0	0
	6.2–6.3	29	1.3	0	0	0	0	3	0.9	3	0.7	9	1.7	14	2.6	5	1.7	4	1.8	6	3.4	4	4.0	0	0
	6.4–6.5	17	0.7	0	0	0	0	0	0	3	0.7	6	1.1	8	1.5	5	1.7	6	2.7	2	1.1	0	0	0	0
	6.6–6.7	15	0.6	0	0	1	0.3	1	0.3	3	0.7	7	1.3	3	0.5	5	1.7	1	0.4	2	1.1	0	0	0	0
	6.8–6.9	14	0.6	0	0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	6	1.1	5	0.9	5	1.7	3	1.3	2	1.1	0	0	0	0
	7.0–7.1	6	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.2	3	0.6	2	0.4	2	0.7	1	0.4	1	0.6	0	0	0	0
	7.2–7.3	8	0.3	0	0	1	0.3	0	0	1	0.2	1	0.2	5	0.9	1	0.3	4	1.8	0	0	0	0	1	2.2
	7.4–7.5	7	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.2	3	0.6	3	0.5	2	0.7	3	1.3	0	0	0	0	0	0
	7.6–7.7	5	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.6	2	0.4	1	0.3	0	0	1	0.6	1	1.0	0	0
	7.8–7.9	4	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	3	0.5	0	0	0	0	3	1.7	0	0	0	0
	8.0–8.1	3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	1	0.2	2	0.7	0	0	1	0.6	0	0	0	0
	8.2–8.3	3	0.1	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.4–8.5	4	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	2	0.4	1	0.3	0	0	2	1.1	0	0	0	0
	8.6–8.7	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.8–8.9	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0	0	0	0	0
	9.0–	15	0.6	0	0	0	0	3	0.9	5	1.1	4	0.8	3	0.5	2	0.7	1	0.4	1	0.6	1	1.0	0	0
	総　数	2308	100	153	100	290	100	330	100	453	100	533	100	549	100	289	100	225	100	177	100	101	100	46	100

		年齢(歳)																							
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総　数	ヘモグロビンA_{1c}(%)																								
	-3.9	3	0.1	1	0.4	0	0	1	0.2	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	9	0.2	2	0.7	5	1.1	0	0	0	0	0	0	2	0.2	0	0	1	0.2	0	0	0	0	1	1.4
	4.2-4.3	42	1.1	7	2.6	12	2.7	10	2.0	4	0.6	3	0.3	6	0.6	1	0.2	1	0.2	4	1.3	1	0.6	0	0
	4.4-4.5	160	4.1	37	13.7	40	8.9	36	7.1	14	2.0	18	1.9	15	1.5	10	2.0	8	1.8	5	1.6	1	0.6	1	1.4
	4.6-4.7	358	9.3	70	25.9	67	15.0	68	13.5	53	7.5	45	4.8	55	5.5	19	3.8	21	4.7	12	3.8	15	9.3	7	9.9
	4.8-4.9	638	16.5	74	27.4	139	31.1	110	21.8	104	14.6	108	11.6	103	10.3	62	12.5	40	8.9	37	11.6	18	11.1	8	11.3
	5.0-5.1	716	18.5	45	16.7	98	21.9	104	20.6	132	18.6	169	18.2	168	16.8	82	16.6	79	17.6	53	16.7	25	15.4	11	15.5
	5.2	380	9.8	18	6.7	36	8.1	46	9.1	82	11.5	91	9.8	107	10.7	46	9.3	47	10.5	35	11.0	14	8.6	11	15.5
	5.3	284	7.4	7	2.6	13	2.9	31	6.1	73	10.3	80	8.6	80	8.0	40	8.1	36	8.0	28	8.8	11	6.8	5	7.0
	5.4	298	7.7	7	2.6	10	2.2	25	5.0	70	9.8	89	9.6	97	9.7	52	10.5	37	8.3	31	9.7	19	11.7	10	14.1
	5.5	222	5.7	1	0.4	8	1.8	29	5.7	39	5.5	60	6.5	85	8.5	32	6.5	37	8.3	22	6.9	16	9.9	10	14.1
	5.6	151	3.9	1	0.4	8	1.8	12	2.4	24	3.4	49	5.3	57	5.7	27	5.5	32	7.1	12	3.8	12	7.4	1	1.4
	5.7	95	2.5	0	0	5	1.1	9	1.8	16	2.3	25	2.7	40	4.0	17	3.4	16	3.6	16	5.0	6	3.7	2	2.8
	5.8	71	1.8	0	0	0	0	5	1.0	16	2.3	30	3.2	20	2.0	15	3.0	4	0.9	9	2.8	5	3.1	2	2.8
	5.9	57	1.5	0	0	0	0	3	0.6	20	2.8	11	1.2	23	2.3	8	1.6	12	2.7	8	2.5	2	1.2	1	1.4
	6.0	42	1.1	0	0	1	0.2	1	0.2	10	1.4	12	1.3	18	1.8	4	0.8	12	2.7	5	1.6	1	0.6	0	0
	6.1	40	1.0	0	0	1	0.2	0	0	9	1.3	19	2.0	11	1.1	8	1.6	5	1.1	3	0.9	3	1.9	0	0
	6.2-6.3	56	1.5	0	0	0	0	5	1.0	6	0.8	23	2.5	22	2.2	14	2.8	8	1.8	9	2.8	5	3.1	0	0
	6.4-6.5	38	1.0	0	0	1	0.2	0	0	5	0.7	14	1.5	18	1.8	6	1.2	10	2.2	6	1.9	2	1.2	0	0
	6.6-6.7	36	0.9	0	0	1	0.2	2	0.4	5	0.7	14	1.5	14	1.4	11	2.2	10	2.2	4	1.3	0	0	0	0
	6.8-6.9	32	0.8	0	0	1	0.2	3	0.6	3	0.4	12	1.3	13	1.3	10	2.0	6	1.3	6	1.9	1	0.6	0	0
	7.0-7.1	21	0.5	0	0	0	0	0	0	3	0.4	12	1.3	6	0.6	6	1.2	4	0.9	1	0.3	1	0.6	0	0
	7.2-7.3	16	0.4	0	0	1	0.2	0	0	2	0.3	6	0.6	7	0.7	3	0.6	5	1.1	0	0	1	0.6	1	1.4
	7.4-7.5	17	0.4	0	0	0	0	0	0	2	0.3	8	0.9	7	0.7	3	0.6	6	1.3	1	0.3	0	0	0	0
	7.6-7.7	12	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.1	5	0.5	6	0.6	2	0.4	3	0.7	2	0.6	1	0.6	0	0
	7.8-7.9	8	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	6	0.6	1	0.2	2	0.4	3	0.9	1	0.6	0	0
	8.0-8.1	9	0.2	0	0	0	0	1	0.2	0	0	6	0.6	2	0.2	4	0.8	1	0.2	1	0.3	0	0	0	0
	8.2-8.3	5	0.1	0	0	0	0	1	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.1	2	0.4	0	0	1	0.3	0	0	0	0
	8.4-8.5	7	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.1	4	0.4	2	0.2	2	0.4	0	0	2	0.6	0	0	0	0
	8.6-8.7	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.2	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.8-8.9	3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.2	1	0.1	2	0.4	1	0.2	0	0	0	0	0	0
	9.0-	33	0.9	0	0	0	0	3	0.6	15	2.1	8	0.9	7	0.7	5	1.0	4	0.9	2	0.6	1	0.6	0	0
	総　数	3861	100	270	100	447	100	505	100	711	100	929	100	999	100	495	100	448	100	318	100	162	100	71	100

第 39 表の１　ヘモグロビン A_{1c} の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	ヘモグロビンA_{1c}(%)		ヘモグロビンA_{1c}(%)		ヘモグロビンA_{1c}(%)		ヘモグロビンA_{1c}(%)		ヘモグロビンA_{1c}(%)		ヘモグロビンA_{1c}(%)		ヘモグロビンA_{1c}(%)		ヘモグロビンA_{1c}(%)		ヘモグロビンA_{1c}(%)		ヘモグロビンA_{1c}(%)		ヘモグロビンA_{1c}(%)		ヘモグロビンA_{1c}(%)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	5.3	0.9	4.8	0.2	4.9	0.3	5.0	0.5	5.5	1.1	5.5	1.0	5.5	0.8	5.6	1.0	5.6	0.8	5.4	0.7	5.5	0.6	5.2	0.3
女　性	5.3	0.7	4.8	0.3	4.9	0.4	5.1	0.7	5.3	0.7	5.5	0.8	5.4	0.7	5.5	0.8	5.5	0.7	5.5	0.8	5.3	0.6	5.2	0.5
総　数	5.3	0.8	4.8	0.3	4.9	0.4	5.1	0.7	5.4	0.9	5.5	0.9	5.5	0.7	5.5	0.9	5.5	0.8	5.5	0.8	5.4	0.6	5.2	0.4

第 39 表の２　ヘモグロビン $A_{1}c$ の分布（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）65-69歳		（再掲）70-74歳		（再掲）75-79歳		（再掲）80-84歳		（再掲）85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別	ヘモグロビンA1c(%)																								
男性	-3.9	2	0.1	0	0	0	0	1	0.6	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	20	1.4	4	3.4	4	2.6	2	1.2	4	1.6	2	0.6	4	1.0	0	0	1	0.5	3	2.2	0	0	0	0
	4.4-4.5	62	4.3	13	11.1	11	7.1	15	8.7	7	2.9	10	2.9	6	1.5	6	3.4	4	2.0	1	0.7	0	0	1	4.3
	4.6-4.7	156	10.8	35	29.9	27	17.4	22	12.7	19	7.8	27	7.8	26	6.3	10	5.6	11	5.5	7	5.2	6	11.1	2	8.7
	4.8-4.9	261	18.0	32	27.4	44	28.4	41	23.7	42	17.1	52	14.9	50	12.2	30	16.9	22	11.0	19	14.2	7	13.0	2	8.7
	5.0-5.1	276	19.0	23	19.7	35	22.6	43	24.9	43	17.6	65	18.7	67	16.3	29	16.3	35	17.5	24	17.9	7	13.0	1	4.3
	5.2	133	9.2	6	5.1	17	11.0	13	7.5	22	9.0	30	8.6	45	10.9	15	8.4	25	12.5	14	10.4	1	1.9	5	21.7
	5.3	94	6.5	4	3.4	6	3.9	7	4.0	22	9.0	30	8.6	25	6.1	14	7.9	9	4.5	10	7.5	4	7.4	2	8.7
	5.4	108	7.5	0	0	3	1.9	10	5.8	25	10.2	30	8.6	40	9.7	16	9.0	17	8.5	12	9.0	6	11.1	5	21.7
	5.5	76	5.2	0	0	2	1.3	8	4.6	10	4.1	18	5.2	38	9.2	9	5.1	19	9.5	9	6.7	6	11.1	4	17.4
	5.6	58	4.0	0	0	2	1.3	4	2.3	11	4.5	16	4.6	25	6.1	9	5.1	16	8.0	3	2.2	5	9.3	1	4.3
	5.7	35	2.4	0	0	2	1.3	0	0	5	2.0	9	2.6	19	4.6	6	3.4	10	5.0	7	5.2	2	3.7	0	0
	5.8	32	2.2	0	0	0	0	2	1.2	7	2.9	14	4.0	9	2.2	9	5.1	2	1.0	4	3.0	3	5.6	0	0
	5.9	23	1.6	0	0	0	0	0	0	9	3.7	3	0.9	11	2.7	3	1.7	6	3.0	4	3.0	1	1.9	0	0
	6.0	15	1.0	0	0	1	0.6	0	0	2	0.8	5	1.4	7	1.7	3	1.7	4	2.0	3	2.2	0	0	0	0
	6.1	14	1.0	0	0	0	0	0	0	3	1.2	6	1.7	5	1.2	3	1.7	1	0.5	3	2.2	1	1.9	0	0
	6.2-6.3	19	1.3	0	0	0	0	2	1.2	1	0.4	10	2.9	6	1.5	7	3.9	3	1.5	2	1.5	1	1.9	0	0
	6.4-6.5	15	1.0	0	0	1	0.6	0	0	1	0.4	5	1.4	8	1.9	0	0	3	1.5	3	2.2	2	3.7	0	0
	6.6-6.7	13	0.9	0	0	0	0	1	0.6	2	0.8	3	0.9	7	1.7	3	1.7	5	2.5	2	1.5	0	0	0	0
	6.8-6.9	6	0.4	0	0	0	0	2	1.2	1	0.4	0	0	3	0.7	0	0	1	0.5	1	0.7	1	1.9	0	0
	7.0-7.1	7	0.5	0	0	0	0	0	0	1	0.4	5	1.4	1	0.2	2	1.1	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	7.2-7.3	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.4-7.5	3	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	2	0.5	0	0	1	0.5	1	0.7	0	0	0	0
	7.6-7.7	3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.5	1	0.6	1	0.5	1	0.7	0	0	0	0
	7.8-7.9	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	0	0	1	0.5	0	0	1	1.9	0	0
	8.4-8.5	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.8-8.9	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.0-	12	0.8	0	0	0	0	0	0	7	2.9	3	0.9	2	0.5	2	1.1	1	0.5	1	0.7	0	0	0	0
	総数	1449	100	117	100	155	100	173	100	245	100	348	100	411	100	178	100	200	100	134	100	54	100	23	100

年齢(歳)

注）　インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女　性	ヘモグロビンA1c(%)																								
	-3.9	1	0.0	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	8	0.4	2	1.3	5	1.7	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.3
	4.2-4.3	22	1.0	3	2.0	8	2.8	8	2.4	0	0	1	0.2	2	0.4	1	0.4	0	0	1	0.6	1	1.0	0	0
	4.4-4.5	98	4.4	24	15.7	29	10.0	21	6.4	7	1.6	8	1.6	9	1.7	4	1.5	4	1.9	4	2.5	1	1.0	0	0
	4.6-4.7	200	9.0	35	22.9	39	13.5	46	14.1	34	7.7	18	3.6	28	5.4	9	3.4	10	4.7	4	2.5	9	9.0	5	11.4
	4.8-4.9	377	16.9	42	27.5	95	32.9	69	21.1	62	14.1	56	11.1	53	10.3	32	12.0	18	8.5	18	11.3	11	11.0	6	13.6
	5.0-5.1	435	19.5	22	14.4	63	21.8	61	18.7	88	20.0	103	20.4	98	19.0	52	19.5	43	20.3	29	18.2	17	17.0	9	20.5
	5.2	242	10.9	12	7.8	19	6.6	33	10.1	60	13.7	59	11.7	59	11.5	29	10.9	21	9.9	20	12.6	13	13.0	5	11.4
	5.3	189	8.5	3	2.0	7	2.4	24	7.3	51	11.6	49	9.7	55	10.7	25	9.4	27	12.7	18	11.3	7	7.0	3	6.8
	5.4	186	8.4	7	4.6	7	2.4	15	4.6	45	10.3	57	11.3	55	10.7	34	12.8	20	9.4	19	11.9	11	11.0	5	11.4
	5.5	141	6.3	1	0.7	6	2.1	21	6.4	29	6.6	42	8.3	42	8.2	23	8.6	18	8.5	11	6.9	8	8.0	5	11.4
	5.6	88	4.0	1	0.7	5	1.7	8	2.4	12	2.7	31	6.2	31	6.0	16	6.0	15	7.1	9	5.7	7	7.0	0	0
	5.7	56	2.5	0	0	3	1.0	8	2.4	10	2.3	15	3.0	20	3.9	11	4.1	6	2.8	8	5.0	4	4.0	2	4.5
	5.8	36	1.6	0	0	0	0	3	0.9	9	2.1	15	3.0	9	1.7	5	1.9	2	0.9	4	2.5	1	1.0	2	4.5
	5.9	29	1.3	0	0	0	0	3	0.9	9	2.1	7	1.4	10	1.9	4	1.5	5	2.4	3	1.9	1	1.0	1	2.3
	6.0	21	0.9	0	0	0	0	1	0.3	7	1.6	3	0.6	10	1.9	0	0	8	3.8	1	0.6	1	1.0	0	0
	6.1	21	0.9	0	0	1	0.3	0	0	5	1.1	11	2.2	4	0.8	4	1.5	2	0.9	0	0	2	2.0	0	0
	6.2-6.3	22	1.0	0	0	0	0	2	0.6	3	0.7	6	1.2	11	2.1	3	1.1	4	1.9	3	1.9	4	4.0	0	0
	6.4-6.5	10	0.4	0	0	0	0	0	0	2	0.5	4	0.8	4	0.8	4	1.5	3	1.4	1	0.6	0	0	0	0
	6.6-6.7	8	0.4	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	5	1.0	1	0.2	3	1.1	0	0	1	0.6	0	0	0	0
	6.8-6.9	8	0.4	0	0	1	0.3	1	0.3	0	0	3	0.6	3	0.6	2	0.8	1	0.5	2	1.3	0	0	0	0
	7.0-7.1	3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	1	0.2	1	0.4	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	7.2-7.3	4	0.2	0	0	1	0.3	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.4	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	7.4-7.5	4	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	2	0.4	0	0	2	0.9	0	0	0	0	0	0
	7.6-7.7	4	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	2	0.4	1	0.4	0	0	1	0.6	1	1.0	0	0
	7.8-7.9	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0	0	0	1	0.6	0	0	0	0
	8.2-8.3	3	0.1	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.4-8.5	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.0-	7	0.3	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	2	0.4	3	0.6	0	0	1	0.5	1	0.6	1	1.0	0	0
	総　数	2227	100	153	100	289	100	327	100	439	100	504	100	515	100	266	100	212	100	159	100	100	100	44	100

注）　インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

		年齢(歳)																									
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総　数	ヘモグロビンA1c(%)																								
	-3.9	3	0.1	1	0.4	0	0	1	0.2	0	0	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	9	0.2	2	0.7	5	1.1	0	0	0	0	0	0	2	0.2	0	0	1	0.2	0	0	0	0	1	1.5
	4.2-4.3	42	1.1	7	2.6	12	2.7	10	2.0	4	0.6	3	0.4	6	0.6	1	0.2	1	0.2	4	1.4	1	0.6	0	0
	4.4-4.5	160	4.4	37	13.7	40	9.0	36	7.2	14	2.0	18	2.1	15	1.6	10	2.3	8	1.9	5	1.7	1	0.6	1	1.5
	4.6-4.7	356	9.7	70	25.9	66	14.9	68	13.6	53	7.7	45	5.3	54	5.8	19	4.3	21	5.1	11	3.8	15	9.7	7	10.4
	4.8-4.9	638	17.4	74	27.4	139	31.3	110	22.0	104	15.2	108	12.7	103	11.1	62	14.0	40	9.7	37	12.6	18	11.7	8	11.9
	5.0-5.1	711	19.3	45	16.7	98	22.1	104	20.8	131	19.2	168	19.7	165	17.8	81	18.2	78	18.9	53	18.1	24	15.6	10	14.9
	5.2	375	10.2	18	6.7	36	8.1	46	9.2	82	12.0	89	10.4	104	11.2	44	9.9	46	11.2	34	11.6	14	9.1	10	14.9
	5.3	283	7.7	7	2.6	13	2.9	31	6.2	73	10.7	79	9.3	80	8.6	39	8.8	36	8.7	28	9.6	11	7.1	5	7.5
	5.4	294	8.0	7	2.6	10	2.3	25	5.0	70	10.2	87	10.2	95	10.3	50	11.3	37	9.0	31	10.6	17	11.0	10	14.9
	5.5	217	5.9	1	0.4	8	1.8	29	5.8	39	5.7	60	7.0	80	8.6	32	7.2	37	9.0	20	6.8	14	9.1	9	13.4
	5.6	146	4.0	1	0.4	7	1.6	12	2.4	23	3.4	47	5.5	56	6.0	25	5.6	31	7.5	12	4.1	12	7.8	1	1.5
	5.7	91	2.5	0	0	5	1.1	8	1.6	15	2.2	24	2.8	39	4.2	17	3.8	16	3.9	15	5.1	6	3.9	2	3.0
	5.8	68	1.8	0	0	0	0	5	1.0	16	2.3	29	3.4	18	1.9	14	3.2	4	1.0	8	2.7	4	2.6	2	3.0
	5.9	52	1.4	0	0	0	0	3	0.6	18	2.6	10	1.2	21	2.3	7	1.6	11	2.7	7	2.4	2	1.3	1	1.5
	6.0	36	1.0	0	0	1	0.2	1	0.2	9	1.3	8	0.9	17	1.8	3	0.7	12	2.9	4	1.4	1	0.6	0	0
	6.1	35	1.0	0	0	1	0.2	0	0	8	1.2	17	2.0	9	1.0	7	1.6	3	0.7	3	1.0	3	1.9	0	0
	6.2-6.3	41	1.1	0	0	0	0	4	0.8	4	0.6	16	1.9	17	1.8	10	2.3	7	1.7	5	1.7	5	3.2	0	0
	6.4-6.5	25	0.7	0	0	1	0.2	0	0	3	0.4	9	1.1	12	1.3	4	0.9	6	1.5	4	1.4	2	1.3	0	0
	6.6-6.7	21	0.6	0	0	0	0	2	0.4	3	0.4	8	0.9	8	0.9	6	1.4	5	1.2	3	1.0	0	0	0	0
	6.8-6.9	14	0.4	0	0	1	0.2	3	0.6	1	0.1	3	0.4	6	0.6	2	0.5	2	0.5	3	1.0	1	0.6	0	0
	7.0-7.1	10	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.1	7	0.8	2	0.2	3	0.7	2	0.5	0	0	0	0	0	0
	7.2-7.3	5	0.1	0	0	1	0.2	0	0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0	0	0	0	0
	7.4-7.5	7	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.3	1	0.1	4	0.4	0	0	3	0.7	1	0.3	0	0	0	0
	7.6-7.7	7	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.4	4	0.4	2	0.5	1	0.2	2	0.7	1	0.6	0	0
	7.8-7.9	4	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0	0	3	0.3	0	0	1	0.2	1	0.3	1	0.6	0	0
	8.2-8.3	3	0.1	0	0	0	0	1	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.4-8.5	3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.4	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.8-8.9	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.0-	19	0.5	0	0	0	0	1	0.2	8	1.2	5	0.6	5	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.7	1	0.6	0	0
	総　数	3676	100	270	100	444	100	500	100	684	100	852	100	926	100	444	100	412	100	293	100	154	100	67	100

注）　インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

第 39 表の２　ヘモグロビン A1c の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																								
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	ヘモグロビンA1c(%)		ヘモグロビンA1c(%)		ヘモグロビンA1c(%)		ヘモグロビンA1c(%)		ヘモグロビンA1c(%)		ヘモグロビンA1c(%)		ヘモグロビンA1c(%)		ヘモグロビンA1c(%)		ヘモグロビンA1c(%)		ヘモグロビンA1c(%)		ヘモグロビンA1c(%)		ヘモグロビンA1c(%)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	5.2	0.7	4.8	0.2	4.9	0.3	5.0	0.4	5.4	1.0	5.4	0.8	5.4	0.6	5.4	0.9	5.4	0.6	5.4	0.7	5.4	0.6	5.2	0.3
女　性	5.2	0.6	4.8	0.3	4.9	0.4	5.1	0.6	5.2	0.5	5.4	0.7	5.3	0.6	5.4	0.5	5.4	0.6	5.4	0.7	5.3	0.6	5.2	0.4
総　数	5.2	0.6	4.8	0.3	4.9	0.4	5.1	0.5	5.3	0.7	5.4	0.7	5.4	0.6	5.4	0.7	5.4	0.6	5.4	0.7	5.4	0.6	5.2	0.4

注）　インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

第 40 表の 1　血糖値の分布（食後 3 時間以上，性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	血糖値(mg/dl)																										
男　性	40-<60	3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.8	0	0	2	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-<80	62	4.5	6	5.9	10	7.9	7	4.6	13	5.4	10	2.8	16	4.0	7	3.7	5	2.6	6	4.7	3	5.6	2	8.7
	80-<100	660	47.8	69	68.3	95	75.4	96	63.2	118	48.8	146	40.7	136	34.0	73	38.8	73	37.6	44	34.1	11	20.4	8	34.8
	100-<120	367	26.6	21	20.8	16	12.7	39	25.7	63	26.0	104	29.0	124	31.0	48	25.5	55	28.4	35	27.1	25	46.3	9	39.1
	120-<140	150	10.9	5	5.0	4	3.2	5	3.3	18	7.4	45	12.5	73	18.3	26	13.8	33	17.0	28	21.7	9	16.7	3	13.0
	140-<160	56	4.1	0	0	0	0	3	2.0	10	4.1	20	5.6	23	5.8	13	6.9	14	7.2	6	4.7	2	3.7	1	4.3
	160-<180	36	2.6	0	0	0	0	0	0	9	3.7	15	4.2	12	3.0	9	4.8	4	2.1	5	3.9	3	5.6	0	0
	180-<200	13	0.9	0	0	0	0	1	0.7	1	0.4	7	1.9	4	1.0	5	2.7	2	1.0	1	0.8	1	1.9	0	0
	200-<220	5	0.4	0	0	1	0.8	0	0	3	1.2	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	220-<240	5	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.6	3	0.8	1	0.5	2	1.0	1	0.8	0	0	0	0
	240-<260	4	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	3	0.8	0	0	3	1.5	0	0	0	0	0	0
	260-	19	1.4	0	0	0	0	1	0.7	6	2.5	6	1.7	6	1.5	4	2.1	3	1.5	3	2.3	0	0	0	0
	≧110(再掲)	408	29.6	7	6.9	7	5.6	18	11.8	68	28.1	136	37.9	172	43.0	76	40.4	77	39.7	60	46.5	25	46.3	10	43.5
	総　数	1380	100	101	100	126	100	152	100	242	100	359	100	400	100	188	100	194	100	129	100	54	100	23	100
女　性	血糖値(mg/dl)																										
	40-<60	3	0.2	1	0.8	1	0.4	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-<80	56	2.8	6	4.8	16	6.4	9	3.3	14	3.6	6	1.3	5	1.0	2	0.8	3	1.5	0	0	2	2.2	0	0
	80-<100	914	46.0	91	72.2	178	71.2	169	61.7	175	44.8	154	33.0	147	30.6	87	34.3	65	33.3	47	30.3	25	27.8	10	24.4
	100-<120	709	35.7	24	19.0	50	20.0	85	31.0	153	39.1	199	42.7	198	41.2	104	40.9	74	37.9	64	41.3	41	45.6	19	46.3
	120-<140	193	9.7	3	2.4	3	1.2	7	2.6	36	9.2	64	13.7	80	16.6	32	12.6	31	15.9	28	18.1	12	13.3	9	22.0
	140-<160	52	2.6	1	0.8	0	0	0	0	5	1.3	18	3.9	28	5.8	12	4.7	11	5.6	9	5.8	7	7.8	1	2.4
	160-<180	22	1.1	0	0	1	0.4	2	0.7	2	0.5	6	1.3	11	2.3	3	1.2	8	4.1	1	0.6	1	1.1	1	2.4
	180-<200	10	0.5	0	0	0	0	0	0	1	0.3	6	1.3	3	0.6	5	2.0	0	0	1	0.6	2	2.2	0	0
	200-<220	9	0.5	0	0	1	0.4	1	0.4	1	0.3	3	0.6	3	0.6	2	0.8	2	1.0	1	0.6	0	0	0	0
	220-<240	4	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	2	0.4	1	0.4	1	0.5	1	0.6	0	0	0	0
	240-<260	4	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.4	1	0.2	2	0.8	0	0	0	0	0	0	1	2.4
	260-	12	0.6	0	0	0	0	0	0	3	0.8	6	1.3	3	0.6	4	1.6	0	0	3	1.9	0	0	0	0
	≧110(再掲)	524	26.4	8	6.3	17	6.8	31	11.3	91	23.3	175	37.6	202	42.0	95	37.4	75	38.5	72	46.5	38	42.2	17	41.5
	総　数	1988	100	126	100	250	100	274	100	391	100	466	100	481	100	254	100	195	100	155	100	90	100	41	100

第 40 表の 1　血糖値の平均値及び標準偏差（食後 3 時間以上，性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	108.5	35.8	94.2	10.8	94.7	15.6	97.9	23.0	110.5	42.0	113.7	40.4	114.5	37.0	116.0	45.4	116.2	42.0	114.4	35.9	112.1	23.2	105.3	21.4
女　性	105.6	29.7	93.5	12.5	93.7	13.9	96.9	13.8	104.7	30.8	113.0	36.4	113.5	32.7	114.6	40.1	111.9	24.0	116.7	45.9	111.5	21.3	113.6	28.9

第 40 表の２　血糖値の分布（食後３時間以上，性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	血糖値(mg/dl)																								
男　性	40-<60	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-<80	58	4.5	6	5.9	9	7.2	7	4.7	13	5.6	9	2.8	14	3.8	6	3.7	4	2.3	5	4.0	3	6.3	2	9.5
	80-<100	646	50.0	69	68.3	95	76.0	96	64.0	116	50.2	140	44.2	130	35.3	69	42.3	69	39.4	44	35.5	10	20.8	7	33.3
	100-<120	354	27.4	21	20.8	16	12.8	38	25.3	62	26.8	100	31.5	117	31.8	45	27.6	52	29.7	35	28.2	22	45.8	8	38.1
	120-<140	138	10.7	5	5.0	4	3.2	5	3.3	17	7.4	40	12.6	67	18.2	24	14.7	28	16.0	28	22.6	8	16.7	3	14.3
	140-<160	46	3.6	0	0	0	0	3	2.0	8	3.5	13	4.1	22	6.0	9	5.5	14	8.0	5	4.0	2	4.2	1	4.8
	160-<180	25	1.9	0	0	0	0	0	0	7	3.0	8	2.5	10	2.7	4	2.5	4	2.3	4	3.2	2	4.2	0	0
	180-<200	6	0.5	0	0	0	0	1	0.7	1	0.4	2	0.6	2	0.5	2	1.2	0	0	1	0.8	1	2.1	0	0
	200-<220	4	0.3	0	0	1	0.8	0	0	3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	220-<240	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	240-<260	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	260-	12	0.9	0	0	0	0	0	0	4	1.7	4	1.3	4	1.1	3	1.8	2	1.1	2	1.6	0	0	0	0
	≧110(再掲)	348	26.9	7	6.9	7	5.6	17	11.3	60	26.0	104	32.8	153	41.6	57	35.0	66	37.7	56	45.2	21	43.8	10	47.6
	総　数	1292	100	101	100	125	100	150	100	231	100	317	100	368	100	163	100	175	100	124	100	48	100	21	100
女　性	血糖値(mg/dl)																								
	40-<60	3	0.2	1	0.8	1	0.4	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-<80	56	2.9	6	4.8	16	6.4	9	3.3	14	3.7	6	1.4	5	1.1	2	0.9	3	1.6	0	0	2	2.2	0	0
	80-<100	904	47.1	91	72.2	178	71.5	168	61.8	172	45.5	151	34.3	144	31.6	84	35.9	64	34.8	45	31.5	25	28.1	10	25.6
	100-<120	694	36.1	24	19.0	50	20.1	85	31.3	152	40.2	190	43.2	193	42.4	99	42.3	71	38.6	63	44.1	40	44.9	19	48.7
	120-<140	180	9.4	3	2.4	3	1.2	7	2.6	32	8.5	60	13.6	75	16.5	30	12.8	30	16.3	25	17.5	12	13.5	8	20.5
	140-<160	50	2.6	1	0.8	0	0	0	0	5	1.3	18	4.1	26	5.7	12	5.1	10	5.4	8	5.6	7	7.9	1	2.6
	160-<180	14	0.7	0	0	0	0	2	0.7	1	0.3	5	1.1	6	1.3	2	0.9	4	2.2	0	0	1	1.1	1	2.6
	180-<200	7	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.1	2	0.4	4	1.7	0	0	0	0	2	2.2	0	0
	200-<220	4	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	1	0.2	2	0.4	0	0	1	0.5	1	0.7	0	0	0	0
	220-<240	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	240-<260	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	260-	4	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.5	1	0.2	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0
	≧110(再掲)	472	24.6	8	6.3	16	6.4	30	11.0	81	21.4	155	35.2	182	40.0	81	34.6	67	36.4	62	43.4	38	42.7	15	38.5
	総　数	1920	100	126	100	249	100	272	100	378	100	440	100	455	100	234	100	184	100	143	100	89	100	39	100

注）　インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

第 40 表の２　血糖値の平均値及び標準偏差（食後３時間以上，性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)		血糖値 (mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	105.5	30.7	94.2	10.8	94.8	15.6	96.6	15.7	107.6	37.9	108.7	34.1	111.8	32.2	110.9	40.3	112.6	36.0	111.9	31.3	111.1	22.4	106.2	22.3
女　性	103.5	23.5	93.5	12.5	93.4	13.2	96.5	12.1	102.5	22.9	109.8	27.0	110.9	27.7	108.8	21.9	110.0	21.9	112.0	38.4	111.6	21.4	109.5	17.8

注）　インスリン注射又は血糖を下げる薬服用者除外

第 41 表の 1　総コレステロール値の分布（性・年齢階級別）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）65-69歳		（再掲）70-74歳		（再掲）75-79歳		（再掲）80-84歳		（再掲）85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	総コレステロール（mg/dl）																								
男　性	−<120	8	0.5	0	0	0	0	1	0.6	1	0.4	2	0.5	4	0.9	2	1.0	2	0.9	1	0.7	1	1.6	0	0
	120−<140	39	2.5	6	5.1	2	1.3	1	0.6	5	1.9	13	3.3	12	2.7	7	3.4	6	2.7	3	2.1	1	1.6	2	8.0
	140−<160	145	9.3	23	19.5	13	8.2	19	10.8	16	6.2	31	7.8	43	9.5	18	8.7	21	9.4	11	7.8	6	9.8	5	20.0
	160−<180	256	16.4	33	28.0	37	23.4	15	8.5	36	14.0	49	12.4	86	19.1	32	15.5	40	17.9	31	22.0	13	21.3	2	8.0
	180−<200	373	24.0	23	19.5	36	22.8	43	24.4	49	19.0	108	27.3	114	25.3	51	24.6	53	23.7	39	27.7	14	23.0	8	32.0
	200−<220	348	22.4	21	17.8	31	19.6	43	24.4	64	24.8	98	24.7	91	20.2	57	27.5	48	21.4	27	19.1	12	19.7	4	16.0
	220−<240	213	13.7	9	7.6	18	11.4	28	15.9	45	17.4	57	14.4	56	12.4	22	10.6	30	13.4	19	13.5	5	8.2	2	8.0
	240−<260	119	7.6	2	1.7	15	9.5	19	10.8	26	10.1	26	6.6	31	6.9	14	6.8	18	8.0	7	5.0	5	8.2	1	4.0
	260−<280	32	2.1	0	0	3	1.9	6	3.4	9	3.5	6	1.5	8	1.8	3	1.4	4	1.8	3	2.1	1	1.6	0	0
	280−<300	15	1.0	0	0	3	1.9	0	0	3	1.2	5	1.3	4	0.9	1	0.5	1	0.4	0	0	2	3.3	1	4.0
	300−	9	0.6	1	0.8	0	0	1	0.6	4	1.6	1	0.3	2	0.4	0	0	1	0.4	0	0	1	1.6	0	0
	総　数	1557	100	118	100	158	100	176	100	258	100	396	100	451	100	207	100	224	100	141	100	61	100	25	100
女　性	総コレステロール（mg/dl）																								
	−<120	3	0.1	1	0.6	1	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2
	120−<140	31	1.3	8	5.2	11	3.8	5	1.5	2	0.4	3	0.6	2	0.4	3	1.0	2	0.9	0	0	0	0	0	0
	140−<160	132	5.7	27	17.4	40	13.7	13	4.0	9	2.0	14	2.6	29	5.3	9	3.1	13	5.8	8	4.5	3	3.0	5	10.9
	160−<180	316	13.7	43	27.7	73	25.1	57	17.3	32	7.1	53	9.9	58	10.6	31	10.7	25	11.2	18	10.2	12	11.9	3	6.5
	180−<200	445	19.2	40	25.8	70	24.1	79	24.0	75	16.6	76	14.2	105	19.2	42	14.4	36	16.1	37	20.9	21	20.8	11	23.9
	200−<220	551	23.8	23	14.8	59	20.3	82	24.9	116	25.6	129	24.1	142	25.9	75	25.8	57	25.4	47	26.6	27	26.7	11	23.9
	220−<240	406	17.6	8	5.2	23	7.9	46	14.0	100	22.1	112	20.9	117	21.4	54	18.6	49	21.9	35	19.8	24	23.8	9	19.6
	240−<260	260	11.2	3	1.9	10	3.4	30	9.1	69	15.2	91	17.0	57	10.4	46	15.8	25	11.2	19	10.7	8	7.9	5	10.9
	260−<280	93	4.0	0	0	4	1.4	8	2.4	29	6.4	26	4.9	26	4.7	15	5.2	12	5.4	9	5.1	4	4.0	1	2.2
	280−<300	57	2.5	1	0.6	0	0	6	1.8	17	3.8	23	4.3	10	1.8	11	3.8	5	2.2	4	2.3	1	1.0	0	0
	300−	18	0.8	1	0.6	0	0	3	0.9	4	0.9	9	1.7	1	0.2	5	1.7	0	0	0	0	1	1.0	0	0
	総　数	2312	100	155	100	291	100	329	100	453	100	536	100	548	100	291	100	224	100	177	100	101	100	46	100

年齢（歳）

第 41 表の 1　総コレステロール値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）65-69歳		（再掲）70-74歳		（再掲）75-79歳		（再掲）80-84歳		（再掲）85歳以上	
	総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	198.5	33.8	182.1	31.5	198.9	33.8	204.1	32.8	207.0	35.5	199.1	32.1	195.2	33.3	195.3	30.8	196.7	33.6	193.2	28.7	197.3	39.6	187.7	38.3
女　性	208.8	35.0	180.5	30.8	187.1	29.2	204.3	32.8	220.2	32.9	219.9	34.8	210.7	31.7	218.4	35.6	212.1	32.7	211.3	30.9	210.3	30.3	202.2	32.6

年齢（歳）

第 41 表の２　総コレステロール値の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	総コレステロール(mg/dl)																								
男　性	-<120	8	0.6	0	0	0	0	1	0.6	1	0.4	2	0.6	4	1.0	2	1.1	2	1.0	1	0.8	1	1.9	0	0
	120-<140	34	2.4	6	5.1	2	1.3	1	0.6	5	2.1	9	2.5	11	2.8	5	2.7	6	3.0	3	2.4	1	1.9	1	4.5
	140-<160	137	9.5	23	19.7	13	8.4	19	11.2	15	6.2	28	7.9	39	9.8	15	8.2	17	8.6	11	8.7	6	11.1	5	22.7
	160-<180	239	16.6	32	27.4	37	24.0	15	8.8	34	14.0	46	12.9	75	18.8	29	15.8	36	18.2	27	21.4	10	18.5	2	9.1
	180-<200	343	23.8	23	19.7	34	22.1	43	25.3	47	19.4	97	27.2	99	24.8	46	25.0	44	22.2	34	27.0	14	25.9	7	31.8
	200-<220	321	22.3	21	17.9	30	19.5	40	23.5	60	24.8	87	24.4	83	20.8	51	27.7	43	21.7	25	19.8	11	20.4	4	18.2
	220-<240	193	13.4	9	7.7	18	11.7	25	14.7	42	17.4	50	14.0	49	12.3	19	10.3	27	13.6	16	12.7	4	7.4	2	9.1
	240-<260	114	7.9	2	1.7	14	9.1	19	11.2	26	10.7	26	7.3	27	6.8	14	7.6	17	8.6	6	4.8	3	5.6	1	4.5
	260-<280	28	1.9	0	0	3	1.9	6	3.5	6	2.5	5	1.4	8	2.0	2	1.1	4	2.0	3	2.4	1	1.9	0	0
	280-<300	13	0.9	0	0	3	1.9	0	0	2	0.8	5	1.4	3	0.8	1	0.5	1	0.5	0	0	2	3.7	0	0
	300-	9	0.6	1	0.9	0	0	1	0.6	4	1.7	1	0.3	2	0.5	0	0	1	0.5	0	0	1	1.9	0	0
	総　数	1439	100	117	100	154	100	170	100	242	100	356	100	400	100	184	100	198	100	126	100	54	100	22	100
女　性	総コレステロール(mg/dl)																								
	-<120	3	0.1	1	0.6	1	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.6
	120-<140	31	1.5	8	5.2	11	3.8	5	1.5	2	0.5	3	0.7	2	0.5	3	1.3	2	1.1	0	0	0	0	0	0
	140-<160	114	5.6	27	17.4	39	13.5	12	3.7	7	1.7	10	2.3	19	4.7	6	2.6	8	4.6	4	3.3	3	4.1	4	10.5
	160-<180	280	13.8	43	27.7	73	25.3	57	17.5	29	6.9	41	9.5	37	9.1	22	9.6	12	6.9	13	10.7	9	12.2	3	7.9
	180-<200	387	19.1	40	25.8	70	24.2	79	24.3	70	16.7	57	13.2	71	17.4	31	13.5	23	13.2	26	21.5	14	18.9	8	21.1
	200-<220	485	23.9	23	14.8	58	20.1	81	24.9	104	24.8	105	24.3	114	28.0	57	24.9	49	28.2	33	27.3	21	28.4	11	28.9
	220-<240	352	17.4	8	5.2	23	8.0	44	13.5	92	22.0	93	21.5	92	22.6	44	19.2	42	24.1	24	19.8	18	24.3	8	21.1
	240-<260	231	11.4	3	1.9	10	3.5	30	9.2	66	15.8	78	18.1	44	10.8	41	17.9	24	13.8	12	9.9	5	6.8	3	7.9
	260-<280	78	3.8	0	0	4	1.4	8	2.5	28	6.7	19	4.4	19	4.7	10	4.4	9	5.2	7	5.8	3	4.1	0	0
	280-<300	50	2.5	1	0.6	0	0	6	1.8	17	4.1	19	4.4	7	1.7	10	4.4	5	2.9	2	1.7	0	0	0	0
	300-	16	0.8	1	0.6	0	0	3	0.9	4	1.0	7	1.6	1	0.2	5	2.2	0	0	0	0	1	1.4	0	0
	総　数	2027	100	155	100	289	100	325	100	419	100	432	100	407	100	229	100	174	100	121	100	74	100	38	100

注）　コレステロールを下げる薬服用者除外

第 41 表の２　総コレステロール値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)		総コレステロール(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	198.4	33.9	182.2	31.6	198.5	33.9	203.7	33.2	206.3	35.2	199.5	32.1	194.9	33.6	195.8	30.4	197.1	34.4	192.4	29.4	196.2	40.4	185.5	30.2
女　性	208.6	35.1	180.5	30.8	187.1	29.2	204.2	32.7	221.3	33.0	220.8	34.4	212.1	31.3	220.8	36.1	216.5	32.1	211.3	30.1	209.1	29.9	200.2	31.0

注）　コレステロールを下げる薬服用者除外

第 42 表の１　トリグリセリド値の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	トリグリセリド(mg/dl)																								
男　性	20-<50	46	3.0	13	11.0	6	3.8	4	2.3	5	1.9	6	1.5	12	2.7	3	1.4	4	1.8	5	3.5	2	3.3	1	4.0
	50-<80	268	17.2	32	27.1	38	24.1	28	15.9	33	12.8	60	15.2	77	17.1	28	13.5	27	12.1	33	23.4	9	14.8	8	32.0
	80-<110	299	19.2	23	19.5	27	17.1	20	11.4	54	20.9	73	18.4	102	22.6	41	19.8	50	22.3	26	18.4	20	32.8	6	24.0
	110-<140	250	16.1	14	11.9	17	10.8	31	17.6	40	15.5	65	16.4	83	18.4	30	14.5	40	17.9	26	18.4	12	19.7	5	20.0
	140-<170	207	13.3	11	9.3	23	14.6	21	11.9	39	15.1	57	14.4	56	12.4	30	14.5	33	14.7	14	9.9	8	13.1	1	4.0
	170-<200	154	9.9	5	4.2	14	8.9	19	10.8	23	8.9	53	13.4	40	8.9	32	15.5	20	8.9	18	12.8	1	1.6	1	4.0
	200-	333	21.4	20	16.9	33	20.9	53	30.1	64	24.8	82	20.7	81	18.0	43	20.8	50	22.3	19	13.5	9	14.8	3	12.0
	≧150(再掲)	618	39.7	32	27.1	64	40.5	80	45.5	110	42.6	173	43.7	159	35.3	97	46.9	93	41.5	46	32.6	15	24.6	5	20.0
	総　数	1557	100	118	100	158	100	176	100	258	100	396	100	451	100	207	100	224	100	141	100	61	100	25	100
女　性	トリグリセリド(mg/dl)																								
	20-<50	142	6.1	32	20.6	42	14.4	43	13.1	9	2.0	4	0.7	12	2.2	4	1.4	5	2.2	3	1.7	3	3.0	1	2.2
	50-<80	509	22.0	61	39.4	87	29.9	102	31.0	100	22.1	72	13.4	87	15.9	34	11.7	34	15.2	29	16.4	18	17.8	6	13.0
	80-<110	552	23.9	34	21.9	63	21.6	71	21.6	114	25.2	142	26.5	128	23.4	69	23.7	60	26.8	38	21.5	16	15.8	14	30.4
	110-<140	368	15.9	11	7.1	43	14.8	40	12.2	85	18.8	95	17.7	94	17.2	51	17.5	32	14.3	35	19.8	23	22.8	4	8.7
	140-<170	260	11.2	12	7.7	24	8.2	26	7.9	48	10.6	78	14.6	72	13.1	46	15.8	32	14.3	19	10.7	12	11.9	9	19.6
	170-<200	178	7.7	1	0.6	9	3.1	25	7.6	31	6.8	50	9.3	62	11.3	33	11.3	23	10.3	22	12.4	9	8.9	8	17.4
	200-	303	13.1	4	2.6	23	7.9	22	6.7	66	14.6	95	17.7	93	17.0	54	18.6	38	17.0	31	17.5	20	19.8	4	8.7
	≧150(再掲)	637	27.6	10	6.5	47	16.2	65	19.8	128	28.3	191	35.6	196	35.8	115	39.5	79	35.3	59	33.3	39	38.6	19	41.3
	総　数	2312	100	155	100	291	100	329	100	453	100	536	100	548	100	291	100	224	100	177	100	101	100	46	100

第 42 表の１　トリグリセリド値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	154.4	101.5	120.4	73.5	144.5	86.5	180.0	125.8	165.8	110.7	161.3	109.9	144.0	83.8	163.9	117.4	155.5	86.8	135.7	80.3	127.6	58.4	128.3	114.0
女　性	128.4	82.4	80.9	41.8	102.6	62.6	107.9	71.4	135.9	89.7	145.9	84.7	144.3	87.1	150.1	83.3	147.3	94.5	145.8	91.8	141.8	73.5	129.5	50.8

第 42 表の２　トリグリセリド値の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	トリグリセリド(mg/dl)																								
男　性	20-<50	45	3.1	13	11.1	6	3.9	4	2.4	5	2.1	5	1.4	12	3.0	2	1.1	4	2.0	5	4.0	2	3.7	1	4.5
	50-<80	260	18.1	32	27.4	38	24.7	28	16.5	32	13.2	57	16.0	73	18.3	26	14.1	25	12.6	32	25.4	9	16.7	7	31.8
	80-<110	280	19.5	23	19.7	27	17.5	20	11.8	53	21.9	62	17.4	95	23.8	36	19.6	46	23.2	24	19.0	19	35.2	6	27.3
	110-<140	228	15.8	14	12.0	16	10.4	30	17.6	40	16.5	60	16.9	68	17.0	29	15.8	34	17.2	21	16.7	9	16.7	4	18.2
	140-<170	192	13.3	11	9.4	22	14.3	20	11.8	34	14.0	55	15.4	50	12.5	28	15.2	29	14.6	13	10.3	7	13.0	1	4.5
	170-<200	135	9.4	4	3.4	14	9.1	17	10.0	18	7.4	47	13.2	35	8.8	28	15.2	17	8.6	16	12.7	1	1.9	1	4.5
	200-	299	20.8	20	17.1	31	20.1	51	30.0	60	24.8	70	19.7	67	16.8	35	19.0	43	21.7	15	11.9	7	13.0	2	9.1
	≧150(再掲)	556	38.6	31	26.5	61	39.6	76	44.7	99	40.9	154	43.3	135	33.8	84	45.7	80	40.4	39	31.0	12	22.2	4	18.2
	総　数	1439	100	117	100	154	100	170	100	242	100	356	100	400	100	184	100	198	100	126	100	54	100	22	100
女　性	トリグリセリド(mg/dl)																								
	20-<50	138	6.8	32	20.6	42	14.5	43	13.2	8	1.9	4	0.9	9	2.2	4	1.7	4	2.3	1	0.8	3	4.1	1	2.6
	50-<80	475	23.4	61	39.4	87	30.1	102	31.4	95	22.7	63	14.6	67	16.5	28	12.2	24	13.8	26	21.5	12	16.2	5	13.2
	80-<110	494	24.4	34	21.9	63	21.8	71	21.8	110	26.3	118	27.3	98	24.1	56	24.5	49	28.2	28	23.1	10	13.5	11	28.9
	110-<140	314	15.5	11	7.1	43	14.9	38	11.7	75	17.9	77	17.8	70	17.2	43	18.8	23	13.2	26	21.5	17	23.0	4	10.5
	140-<170	219	10.8	12	7.7	24	8.3	26	8.0	44	10.5	59	13.7	54	13.3	30	13.1	27	15.5	10	8.3	11	14.9	6	15.8
	170-<200	146	7.2	1	0.6	9	3.1	25	7.7	28	6.7	42	9.7	41	10.1	28	12.2	16	9.2	12	9.9	5	6.8	8	21.1
	200-	241	11.9	4	2.6	21	7.3	20	6.2	59	14.1	69	16.0	68	16.7	40	17.5	31	17.8	18	14.9	16	21.6	3	7.9
	≧150(再掲)	521	25.7	10	6.5	45	15.6	63	19.4	116	27.7	148	34.3	139	34.2	88	38.4	60	34.5	33	27.3	30	40.5	16	42.1
	総　数	2027	100	155	100	289	100	325	100	419	100	432	100	407	100	229	100	174	100	121	100	74	100	38	100

注）　コレステロールを下げる薬服用者除外

第 42 表の２　トリグリセリド値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	151.6	100.0	119.8	73.5	141.2	81.8	178.3	126.1	164.7	113.0	158.8	107.8	139.3	78.5	159.7	113.4	152.5	84.9	131.0	77.2	122.8	55.6	109.0	51.1
女　性	124.6	80.4	80.9	41.8	101.5	61.5	106.7	70.1	135.3	91.1	142.5	82.5	141.9	84.3	148.0	85.6	150.2	100.7	134.1	73.1	142.4	71.2	128.0	49.2

注）　コレステロールを下げる薬服用者除外

第 43 表の１　HDL−コレステロール値の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																					
		総　数		20−29歳		30−39歳		40−49歳		50−59歳		60−69歳		70歳以上		(再掲) 65−69歳		(再掲) 70−74歳		(再掲) 75−79歳		(再掲) 80−84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	HDLコレステロール(mg/dl)																								
男　性	−<30	14	0.9	0	0	0	0	1	0.6	3	1.2	4	1.0	6	1.3	2	1.0	3	1.3	3	2.1	0	0	0	0
	30−<40	183	11.8	9	7.6	17	10.8	23	13.1	26	10.1	50	12.6	58	12.9	28	13.5	35	15.6	16	11.3	5	8.2	2	8.0
	40−<50	412	26.5	28	23.7	44	27.8	43	24.4	61	23.6	107	27.0	129	28.6	61	29.5	70	31.3	33	23.4	16	26.2	10	40.0
	50−<60	427	27.4	35	29.7	44	27.8	54	30.7	72	27.9	99	25.0	123	27.3	55	26.6	54	24.1	41	29.1	22	36.1	6	24.0
	60−<70	268	17.2	22	18.6	27	17.1	26	14.8	56	21.7	62	15.7	75	16.6	26	12.6	34	15.2	25	17.7	12	19.7	4	16.0
	70−<80	141	9.1	14	11.9	18	11.4	18	10.2	21	8.1	38	9.6	32	7.1	20	9.7	13	5.8	15	10.6	3	4.9	1	4.0
	80−<90	70	4.5	6	5.1	5	3.2	4	2.3	10	3.9	24	6.1	21	4.7	9	4.3	10	4.5	6	4.3	3	4.9	2	8.0
	90−<100	32	2.1	4	3.4	2	1.3	5	2.8	8	3.1	9	2.3	4	0.9	4	1.9	3	1.3	1	0.7	0	0	0	0
	100−	10	0.6	0	0	1	0.6	2	1.1	1	0.4	3	0.8	3	0.7	2	1.0	2	0.9	1	0.7	0	0	0	0
	総　数	1557	100	118	100	158	100	176	100	258	100	396	100	451	100	207	100	224	100	141	100	61	100	25	100
女　性	HDLコレステロール(mg/dl)																								
	−<30	8	0.3	0	0	1	0.3	0	0	1	0.2	2	0.4	4	0.7	1	0.3	0	0	3	1.7	1	1.0	0	0
	30−<40	94	4.1	1	0.6	3	1.0	5	1.5	10	2.2	41	7.6	34	6.2	23	7.9	15	6.7	10	5.6	6	5.9	3	6.5
	40−<50	303	13.1	6	3.9	31	10.7	40	12.2	53	11.7	74	13.8	99	18.1	42	14.4	43	19.2	32	18.1	13	12.9	11	23.9
	50−<60	581	25.1	37	23.9	58	19.9	62	18.8	110	24.3	156	29.1	158	28.8	95	32.6	55	24.6	54	30.5	37	36.6	12	26.1
	60−<70	602	26.0	50	32.3	95	32.6	86	26.1	121	26.7	120	22.4	130	23.7	63	21.6	53	23.7	46	26.0	19	18.8	12	26.1
	70−<80	384	16.6	28	18.1	60	20.6	68	20.7	76	16.8	77	14.4	75	13.7	39	13.4	36	16.1	19	10.7	14	13.9	6	13.0
	80−<90	190	8.2	22	14.2	28	9.6	30	9.1	41	9.1	39	7.3	30	5.5	12	4.1	15	6.7	6	3.4	8	7.9	1	2.2
	90−<100	98	4.2	7	4.5	12	4.1	24	7.3	25	5.5	17	3.2	13	2.4	11	3.8	5	2.2	5	2.8	3	3.0	0	0
	100−	52	2.2	4	2.6	3	1.0	14	4.3	16	3.5	10	1.9	5	0.9	5	1.7	2	0.9	2	1.1	0	0	1	2.2
	総　数	2312	100	155	100	291	100	329	100	453	100	536	100	548	100	291	100	224	100	177	100	101	100	46	100

第 43 表の１　HDL−コレステロール値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																					
	総　数		20−29歳		30−39歳		40−49歳		50−59歳		60−69歳		70歳以上		(再掲) 65−69歳		(再掲) 70−74歳		(再掲) 75−79歳		(再掲) 80−84歳		(再掲) 85歳以上	
	HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	55.3	15.0	57.7	13.7	55.6	13.9	55.3	15.2	56.3	14.7	55.6	16.3	53.9	14.6	54.6	16.6	52.9	15.4	55.2	14.5	54.5	12.0	53.8	13.1
女　性	63.6	15.7	68.2	13.5	65.8	13.7	67.8	16.9	65.8	16.7	61.1	15.5	59.4	14.5	59.8	15.2	60.4	15.0	58.4	14.2	59.7	14.4	58.1	13.4

第 43 表の 2　HDL−コレステロール値の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総　数		20−29歳		30−39歳		40−49歳		50−59歳		60−69歳		70歳以上		(再掲)65−69歳		(再掲)70−74歳		(再掲)75−79歳		(再掲)80−84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	HDLコレステロール(mg/dl)																								
男　性	−<30	14	1.0	0	0	0	0	1	0.6	3	1.2	4	1.1	6	1.5	2	1.1	3	1.5	3	2.4	0	0	0	0
	30−<40	163	11.3	9	7.7	15	9.7	23	13.5	25	10.3	45	12.6	46	11.5	23	12.5	28	14.1	14	11.1	2	3.7	2	9.1
	40−<50	378	26.3	27	23.1	43	27.9	41	24.1	55	22.7	94	26.4	118	29.5	54	29.3	63	31.8	31	24.6	16	29.6	8	36.4
	50−<60	394	27.4	35	29.9	43	27.9	50	29.4	68	28.1	87	24.4	111	27.8	49	26.6	48	24.2	38	30.2	20	37.0	5	22.7
	60−<70	252	17.5	22	18.8	27	17.5	26	15.3	53	21.9	56	15.7	68	17.0	23	12.5	32	16.2	21	16.7	11	20.4	4	18.2
	70−<80	132	9.2	14	12.0	18	11.7	18	10.6	20	8.3	36	10.1	26	6.5	18	9.8	10	5.1	12	9.5	3	5.6	1	4.5
	80−<90	66	4.6	6	5.1	5	3.2	4	2.4	10	4.1	22	6.2	19	4.8	9	4.9	10	5.1	5	4.0	2	3.7	2	9.1
	90−<100	30	2.1	4	3.4	2	1.3	5	2.9	7	2.9	9	2.5	3	0.8	4	2.2	2	1.0	1	0.8	0	0	0	0
	100−	10	0.7	0	0	1	0.6	2	1.2	1	0.4	3	0.8	3	0.8	2	1.1	2	1.0	1	0.8	0	0	0	0
	総　数	1439	100	117	100	154	100	170	100	242	100	356	100	400	100	184	100	198	100	126	100	54	100	22	100
女　性	HDLコレステロール(mg/dl)																								
	−<30	7	0.3	0	0	1	0.3	0	0	1	0.2	2	0.5	3	0.7	1	0.4	0	0	2	1.7	1	1.4	0	0
	30−<40	84	4.1	1	0.6	2	0.7	4	1.2	10	2.4	36	8.3	31	7.6	20	8.7	13	7.5	9	7.4	6	8.1	3	7.9
	40−<50	255	12.6	6	3.9	30	10.4	39	12.0	49	11.7	58	13.4	73	17.9	31	13.5	35	20.1	20	16.5	8	10.8	10	26.3
	50−<60	490	24.2	37	23.9	58	20.1	62	19.1	100	23.9	119	27.5	114	28.0	72	31.4	38	21.8	39	32.2	28	37.8	9	23.7
	60−<70	533	26.3	50	32.3	95	32.9	85	26.2	114	27.2	98	22.7	91	22.4	49	21.4	39	22.4	28	23.1	15	20.3	9	23.7
	70−<80	339	16.7	28	18.1	60	20.8	67	20.6	68	16.2	58	13.4	58	14.3	29	12.7	30	17.2	13	10.7	9	12.2	6	15.8
	80−<90	179	8.8	22	14.2	28	9.7	30	9.2	38	9.1	36	8.3	25	6.1	11	4.8	14	8.0	4	3.3	6	8.1	1	2.6
	90−<100	90	4.4	7	4.5	12	4.2	24	7.4	23	5.5	15	3.5	9	2.2	11	4.8	3	1.7	5	4.1	1	1.4	0	0
	100−	50	2.5	4	2.6	3	1.0	14	4.3	16	3.8	10	2.3	3	0.7	5	2.2	2	1.1	1	0.8	0	0	0	0
	総　数	2027	100	155	100	289	100	325	100	419	100	432	100	407	100	229	100	174	100	121	100	74	100	38	100

注）　コレステロールを下げる薬服用者除外

第 43 表の 2　HDL−コレステロール値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																							
	総　数		20−29歳		30−39歳		40−49歳		50−59歳		60−69歳		70歳以上		(再掲)65−69歳		(再掲)70−74歳		(再掲)75−79歳		(再掲)80−84歳		(再掲)85歳以上	
	HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)		HDLコレステロール(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																								
男　性	55.5	15.1	57.8	13.7	56.0	13.8	55.5	15.4	56.4	14.8	55.9	16.7	53.9	14.5	55.1	17.1	53.1	15.4	54.7	14.5	55.0	11.2	54.7	13.6
女　性	64.1	16.0	68.2	13.5	65.9	13.6	68.0	16.9	65.9	16.9	61.5	16.1	59.1	14.8	60.4	16.1	60.5	15.5	58.3	14.7	58.7	14.0	56.7	12.6

注）　コレステロールを下げる薬服用者除外

第 44 表の１　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総　数		20–29歳		30–39歳		40–49歳		50–59歳		60–69歳		70歳以上		（再掲）40–74歳		（再掲）65–74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	メタボリックシンドローム																				
男　性	腹囲異常+項目2つ以上該当	345	22.4	1	0.9	14	9.0	23	13.3	59	23.0	115	29.3	133	29.7	267	25.5	138	32.3	63	28.0
	腹囲異常＋項目1つ以上該当	354	22.9	14	12.1	24	15.4	40	23.1	72	28.0	97	24.7	107	23.9	262	25.0	100	23.4	54	24.0
	上記以外	844	54.7	101	87.1	118	75.6	110	63.6	126	49.0	181	46.1	208	46.4	517	49.4	189	44.3	108	48.0
	総　数	1543	100	116	100	156	100	173	100	257	100	393	100	448	100	1046	100	427	100	225	100
女　性	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	228	10.0	0	0	6	2.2	10	3.1	27	6.0	80	15.1	105	19.3	158	10.3	85	16.6	64	20.0
	腹囲異常＋項目1つ以上該当	196	8.6	2	1.4	11	3.9	16	4.9	41	9.1	62	11.7	64	11.8	146	9.5	65	12.7	37	11.6
	上記以外	1845	81.3	139	98.6	262	93.9	301	92.0	381	84.9	387	73.2	375	68.9	1225	80.1	363	70.8	219	68.4
	総　数	2269	100	141	100	279	100	327	100	449	100	529	100	544	100	1529	100	513	100	320	100
総　数	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	573	15.0	1	0.4	20	4.6	33	6.6	86	12.2	195	21.1	238	24.0	425	16.5	223	23.7	127	23.3
	腹囲異常＋項目1つ以上該当	550	14.4	16	6.2	35	8.0	56	11.2	113	16.0	159	17.2	171	17.2	408	15.8	165	17.6	91	16.7
	上記以外	2689	70.5	240	93.4	380	87.4	411	82.2	507	71.8	568	61.6	583	58.8	1742	67.7	552	58.7	327	60.0
	総　数	3812	100	257	100	435	100	500	100	706	100	922	100	992	100	2575	100	940	100	545	100

注）妊婦除外。ヘモグロビン A_{1c} 値≧5.5% の場合。項目の基準は p. 53 参照

第 44 表の２　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総　数		20–29歳		30–39歳		40–49歳		50–59歳		60–69歳		70歳以上		（再掲）40–74歳		（再掲）65–74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	メタボリックシンドローム																				
男　性	腹囲異常+項目2つ以上該当	314	20.3	1	0.9	14	9.0	18	10.4	56	21.8	107	27.2	118	26.3	246	23.5	129	30.2	53	23.6
	腹囲異常＋項目1つ以上該当	379	24.6	14	12.1	23	14.7	45	26.0	74	28.8	103	26.2	120	26.8	278	26.6	106	24.8	64	28.4
	上記以外	850	55.1	101	87.1	119	76.3	110	63.6	127	49.4	183	46.6	210	46.9	522	49.9	192	45.0	108	48.0
	総　数	1543	100	116	100	156	100	173	100	257	100	393	100	448	100	1046	100	427	100	225	100
女　性	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	211	9.3	0	0	5	1.8	8	2.4	25	5.6	78	14.7	95	17.5	146	9.5	79	15.4	60	18.8
	腹囲異常＋項目1つ以上該当	210	9.3	2	1.4	11	3.9	17	5.2	42	9.4	64	12.1	74	13.6	156	10.2	71	13.8	41	12.8
	上記以外	1848	81.4	139	98.6	263	94.3	302	92.4	382	85.1	387	73.2	375	68.9	1227	80.2	363	70.8	219	68.4
	総　数	2269	100	141	100	279	100	327	100	449	100	529	100	544	100	1529	100	513	100	320	100
総　数	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	525	13.8	1	0.4	19	4.4	26	5.2	81	11.5	185	20.1	213	21.5	392	15.2	208	22.1	113	20.7
	腹囲異常＋項目1つ以上該当	589	15.5	16	6.2	34	7.8	62	12.4	116	16.4	167	18.1	194	19.6	434	16.9	177	18.8	105	19.3
	上記以外	2698	70.8	240	93.4	382	87.8	412	82.4	509	72.1	570	61.8	585	59.0	1749	67.9	555	59.0	327	60.0
	総　数	3812	100	257	100	435	100	500	100	706	100	922	100	992	100	2575	100	940	100	545	100

注）妊婦除外。ヘモグロビン A_{1c} 値≧5.6% の場合。項目の基準は p. 53 参照

第 45 表の 1　腹囲区分別，血中脂質，血圧，血糖のいずれかのリスクを有する割合（性・年齢階級別）

			リスク保有数									
			総　数		0		1		2		3	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	年齢(歳)	腹囲異常										
男　性	総　数	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	746	100.0	261	35.0	333	44.6	130	17.4	22	2.9
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	797	100.0	98	12.3	354	44.4	255	32.0	90	11.3
	20-29歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	87	100.0	64	73.6	20	23.0	3	3.4	0	0
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	29	100.0	14	48.3	14	48.3	1	3.4	0	0
	30-39歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	96	100.0	72	75.0	22	22.9	1	1.0	1	1.0
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	60	100.0	22	36.7	24	40.0	9	15.0	5	8.3
	40-49歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	88	100.0	38	43.2	42	47.7	6	6.8	2	2.3
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	85	100.0	22	25.9	40	47.1	19	22.4	4	4.7
	50-59歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	111	100.0	42	37.8	54	48.6	15	13.5	0	0
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	146	100.0	15	10.3	72	49.3	47	32.2	12	8.2
	60-69歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	164	100.0	29	17.7	90	54.9	37	22.6	8	4.9
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	229	100.0	17	7.4	97	42.4	86	37.6	29	12.7
	70歳以上	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	200	100.0	16	8.0	105	52.5	68	34.0	11	5.5
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	248	100.0	8	3.2	107	43.1	93	37.5	40	16.1
	(再掲)40-74歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	458	100.0	116	25.3	233	50.9	92	20.1	17	3.7
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	588	100.0	59	10.0	262	44.6	199	33.8	68	11.6
	(再掲)65-74歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	179	100.0	15	8.4	99	55.3	53	29.6	12	6.7
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	248	100.0	10	4.0	100	40.3	96	38.7	42	16.9
	(再掲)75歳以上	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	105	100.0	9	8.6	58	55.2	34	32.4	4	3.8
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	120	100.0	3	2.5	54	45.0	46	38.3	17	14.2
女　性	総　数	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	1791	100.0	778	43.4	654	36.5	282	15.7	77	4.3
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	478	100.0	54	11.3	196	41.0	156	32.6	72	15.1
	20-29歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	139	100.0	134	96.4	4	2.9	1	0.7	0	0
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	2	100.0	0	0	2	100.0	0	0	0	0
	30-39歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	253	100.0	222	87.7	30	11.9	1	0.4	0	0
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	26	100.0	9	34.6	11	42.3	4	15.4	2	7.7
	40-49歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	295	100.0	173	58.6	104	35.3	17	5.8	1	0.3
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	32	100.0	6	18.8	16	50.0	10	31.3	0	0
	50-59歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	369	100.0	137	37.1	173	46.9	53	14.4	6	1.6
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	80	100.0	12	15.0	41	51.3	23	28.8	4	5.0
	60-69歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	373	100.0	81	21.7	164	44.0	99	26.5	29	7.8
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	156	100.0	14	9.0	62	39.7	45	28.8	35	22.4
	70歳以上	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	362	100.0	31	8.6	179	49.4	111	30.7	41	11.3
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	182	100.0	13	7.1	64	35.2	74	40.7	31	17.0
	(再掲)40-74歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	1186	100.0	406	34.2	514	43.3	213	18.0	53	4.5
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	343	100.0	39	11.4	146	42.6	107	31.2	51	14.9
	(再掲)65-74歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	347	100.0	46	13.3	163	47.0	100	28.8	38	11.0
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	166	100.0	16	9.6	65	39.2	51	30.7	34	20.5
	(再掲)75歳以上	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	213	100.0	16	7.5	106	49.8	67	31.5	24	11.3
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	107	100.0	6	5.6	37	34.6	45	42.1	19	17.8
総　数	総　数	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	2537	100.0	1039	41.0	987	38.9	412	16.2	99	3.9
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	1275	100.0	152	11.9	550	43.1	411	32.2	162	12.7
	20-29歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	226	100.0	198	87.6	24	10.6	4	1.8	0	0
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	31	100.0	14	45.2	16	51.6	1	3.2	0	0
	30-39歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	349	100.0	294	84.2	52	14.9	2	0.6	1	0.3
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	86	100.0	31	36.0	35	40.7	13	15.1	7	8.1
	40-49歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	383	100.0	211	55.1	146	38.1	23	6.0	3	0.8
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	117	100.0	28	23.9	56	47.9	29	24.8	4	3.4
	50-59歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	480	100.0	179	37.3	227	47.3	68	14.2	6	1.3
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	226	100.0	27	11.9	113	50.0	70	31.0	16	7.1
	60-69歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	537	100.0	110	20.5	254	47.3	136	25.3	37	6.9
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	385	100.0	31	8.1	159	41.3	131	34.0	64	16.6
	70歳以上	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	562	100.0	47	8.4	284	50.5	179	31.9	52	9.3
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	430	100.0	21	4.9	171	39.8	167	38.8	71	16.5
	(再掲)40-74歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	1644	100.0	522	31.8	747	45.4	305	18.6	70	4.3
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	931	100.0	98	10.5	408	43.8	306	32.9	119	12.8
	(再掲)65-74歳	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	526	100.0	61	11.6	262	49.8	153	29.1	50	9.5
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	414	100.0	26	6.3	165	39.9	147	35.5	76	18.4
	(再掲)75歳以上	＜85 cm(男)/＜90 cm(女)	318	100.0	25	7.9	164	51.6	101	31.8	28	8.8
		≧85 cm(男)/≧90 cm(女)	227	100.0	9	4.0	91	40.1	91	40.1	36	15.9

注）　妊婦除外。ヘモグロビン A_{1C}≧5.5% の場合。項目の基準は p. 53 参照

第 45 表の２　腹囲区分別，血中脂質，血圧，血糖のリスクの保有状況［すべての組み合せ（②血中脂質③血圧④血糖］（性・年齢階級別）

			リスク保有組み合わせ																	
			総　数		②有③有④有		②有③有④無		②無③有④有		②有③無④有		②有③無④無		②無③有④無		②無③無④有		②無③無④無	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	年齢(歳)	腹囲異常																		
男　性	総　数	<85cm(男)/<90cm(女)	746	100.0	22	2.9	40	5.4	81	10.9	9	1.2	14	1.9	288	38.6	31	4.2	261	35.0
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	797	100.0	90	11.3	77	9.7	164	20.6	14	1.8	27	3.4	300	37.6	27	3.4	98	12.3
	20-29歳	<85cm(男)/<90cm(女)	87	100.0	0	0	3	3.4	0	0	0	0	2	2.3	18	20.7	0	0	64	73.6
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	29	100.0	0	0	1	3.4	0	0	0	0	4	13.8	10	34.5	0	0	14	48.3
	30-39歳	<85cm(男)/<90cm(女)	96	100.0	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0	1	1.0	20	20.8	1	1.0	72	75.0
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	60	100.0	5	8.3	7	11.7	2	3.3	0	0	4	6.7	19	31.7	1	1.7	22	36.7
	40-49歳	<85cm(男)/<90cm(女)	88	100.0	2	2.3	2	2.3	3	3.4	1	1.1	2	2.3	39	44.3	1	1.1	38	43.2
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	85	100.0	4	4.7	9	10.6	9	10.6	1	1.2	9	10.6	31	36.5	0	0	22	25.9
	50-59歳	<85cm(男)/<90cm(女)	111	100.0	0	0	1	0.9	11	9.9	3	2.7	3	2.7	40	36.0	11	9.9	42	37.8
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	146	100.0	12	8.2	17	11.6	25	17.1	5	3.4	3	2.1	62	42.5	7	4.8	15	10.3
	60-69歳	<85cm(男)/<90cm(女)	164	100.0	8	4.9	14	8.5	20	12.2	3	1.8	2	1.2	76	46.3	12	7.3	29	17.7
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	229	100.0	29	12.7	23	10.0	59	25.8	4	1.7	6	2.6	78	34.1	13	5.7	17	7.4
	70歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	200	100.0	11	5.5	19	9.5	47	23.5	2	1.0	4	2.0	95	47.5	6	3.0	16	8.0
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	248	100.0	40	16.1	20	8.1	69	27.8	4	1.6	1	0.4	100	40.3	6	2.4	8	3.2
	(再掲)40-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	458	100.0	17	3.7	27	5.9	57	12.4	8	1.7	8	1.7	197	43.0	28	6.1	116	25.3
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	588	100.0	68	11.6	60	10.2	126	21.4	13	2.2	19	3.2	219	37.2	24	4.1	59	10.0
	(再掲)65-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	179	100.0	12	6.7	16	8.9	34	19.0	3	1.7	2	1.1	86	48.0	11	6.1	15	8.4
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	248	100.0	42	16.9	23	9.3	67	27.0	6	2.4	1	0.4	90	36.3	9	3.6	10	4.0
	(再掲)75歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	105	100.0	4	3.8	9	8.6	24	22.9	1	1.0	3	2.9	53	50.5	2	1.9	9	8.6
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	120	100.0	17	14.2	9	7.5	36	30.0	1	0.8	0	0	52	43.3	2	1.7	3	2.5
女　性	総　数	<85cm(男)/<90cm(女)	1791	100.0	77	4.3	102	5.7	168	9.4	12	0.7	37	2.1	520	29.0	97	5.4	778	43.4
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	478	100.0	72	15.1	55	11.5	95	19.9	6	1.3	10	2.1	167	34.9	19	4.0	54	11.3
	20-29歳	<85cm(男)/<90cm(女)	139	100.0	0	0	0	0	1	0.7	0	0	1	0.7	3	2.2	0	0	134	96.4
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	2	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	1	50.0	0	0
	30-39歳	<85cm(男)/<90cm(女)	253	100.0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	1	0.4	21	8.3	8	3.2	222	87.7
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	26	100.0	2	7.7	1	3.8	3	11.5	0	0	1	3.8	6	23.1	4	15.4	9	34.6
	40-49歳	<85cm(男)/<90cm(女)	295	100.0	1	0.3	3	1.0	14	4.7	0	0	2	0.7	76	25.8	26	8.8	173	58.6
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	32	100.0	0	0	2	6.3	8	25.0	0	0	0	0	12	37.5	4	12.5	6	18.8
	50-59歳	<85cm(男)/<90cm(女)	369	100.0	6	1.6	16	4.3	35	9.5	2	0.5	12	3.3	128	34.7	33	8.9	137	37.1
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	80	100.0	4	5.0	3	3.8	19	23.8	1	1.3	1	1.3	36	45.0	4	5.0	12	15.0
	60-69歳	<85cm(男)/<90cm(女)	373	100.0	29	7.8	34	9.1	60	16.1	5	1.3	11	2.9	134	35.9	19	5.1	81	21.7
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	156	100.0	35	22.4	16	10.3	27	17.3	2	1.3	7	4.5	51	32.7	4	2.6	14	9.0
	70歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	362	100.0	41	11.3	49	13.5	57	15.7	5	1.4	10	2.8	158	43.6	11	3.0	31	8.6
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	182	100.0	31	17.0	33	18.1	38	20.9	3	1.6	1	0.5	61	33.5	2	1.1	13	7.1
	(再掲)40-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	1186	100.0	53	4.5	69	5.8	135	11.4	9	0.8	28	2.4	401	33.8	85	7.2	406	34.2
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	343	100.0	51	14.9	33	9.6	70	20.4	4	1.2	8	2.3	125	36.4	13	3.8	39	11.4
	(再掲)65-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	347	100.0	38	11.0	36	10.4	59	17.0	5	1.4	7	2.0	141	40.6	15	4.3	46	13.3
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	166	100.0	34	20.5	21	12.7	29	17.5	1	0.6	3	1.8	58	34.9	4	2.4	16	9.6
	(再掲)75歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	213	100.0	24	11.3	33	15.5	31	14.6	3	1.4	7	3.3	95	44.6	4	1.9	16	7.5
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	107	100.0	19	17.8	21	19.6	22	20.6	2	1.9	1	0.9	35	32.7	1	0.9	6	5.6
総　数	総　数	<85cm(男)/<90cm(女)	2537	100.0	99	3.9	142	5.6	249	9.8	21	0.8	51	2.0	808	31.8	128	5.0	1039	41.0
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	1275	100.0	162	12.7	132	10.4	259	20.3	20	1.6	37	2.9	467	36.6	46	3.6	152	11.9
	20-29歳	<85cm(男)/<90cm(女)	226	100.0	0	0	3	1.3	1	0.4	0	0	3	1.3	21	9.3	0	0	198	87.6
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	31	100.0	0	0	1	3.2	0	0	0	0	4	12.9	11	35.5	1	3.2	14	45.2
	30-39歳	<85cm(男)/<90cm(女)	349	100.0	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0	2	0.6	41	11.7	9	2.6	294	84.2
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	86	100.0	7	8.1	8	9.3	5	5.8	0	0	5	5.8	25	29.1	5	5.8	31	36.0
	40-49歳	<85cm(男)/<90cm(女)	383	100.0	3	0.8	5	1.3	17	4.4	1	0.3	4	1.0	115	30.0	27	7.0	211	55.1
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	117	100.0	4	3.4	11	9.4	17	14.5	1	0.9	9	7.7	43	36.8	4	3.4	28	23.9
	50-59歳	<85cm(男)/<90cm(女)	480	100.0	6	1.3	17	3.5	46	9.6	5	1.0	15	3.1	168	35.0	44	9.2	179	37.3
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	226	100.0	16	7.1	20	8.8	44	19.5	6	2.7	4	1.8	98	43.4	11	4.9	27	11.9
	60-69歳	<85cm(男)/<90cm(女)	537	100.0	37	6.9	48	8.9	80	14.9	8	1.5	13	2.4	210	39.1	31	5.8	110	20.5
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	385	100.0	64	16.6	39	10.1	86	22.3	6	1.6	13	3.4	129	33.5	17	4.4	31	8.1
	70歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	562	100.0	52	9.3	68	12.1	104	18.5	7	1.2	14	2.5	253	45.0	17	3.0	47	8.4
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	430	100.0	71	16.5	53	12.3	107	24.9	7	1.6	2	0.5	161	37.4	8	1.9	21	4.9
	(再掲)40-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	1644	100.0	70	4.3	96	5.8	192	11.7	17	1.0	36	2.2	598	36.4	113	6.9	522	31.8
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	931	100.0	119	12.8	93	10.0	196	21.1	17	1.8	27	2.9	344	36.9	37	4.0	98	10.5
	(再掲)65-74歳	<85cm(男)/<90cm(女)	526	100.0	50	9.5	52	9.9	93	17.7	8	1.5	9	1.7	227	43.2	26	4.9	61	11.6
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	414	100.0	76	18.4	44	10.6	96	23.2	7	1.7	4	1.0	148	35.7	13	3.1	26	6.3
	(再掲)75歳以上	<85cm(男)/<90cm(女)	318	100.0	28	8.8	42	13.2	55	17.3	4	1.3	10	3.1	148	46.5	6	1.9	25	7.9
		≧85cm(男)/≧90cm(女)	227	100.0	36	15.9	30	13.2	58	25.6	3	1.3	1	0.4	87	38.3	3	1.3	9	4.0

注）　妊婦除外。ヘモグロビン A_{1C}≧5.5% の場合。リスクの項目の基準は p.53 参照

第 46 表　運動習慣の状況（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																	
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）65-74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	運動習慣																		
男　性	習慣無(健康上の理由)	119	6.6	1	0.7	3	1.4	7	3.3	9	2.9	34	7.9	65	13.5	46	10.0	39	15.6
	習慣無(その他)	1126	62.7	122	80.8	174	82.1	171	81.0	217	70.5	213	49.3	229	47.4	212	46.3	119	47.6
	運動の習慣有	552	30.7	28	18.5	35	16.5	33	15.6	82	26.6	185	42.8	189	39.1	200	43.7	92	36.8
	総　数	1797	100	151	100	212	100	211	100	308	100	432	100	483	100	458	100	250	100
女　性	運動習慣																		
	習慣無(健康上の理由)	197	7.8	4	2.1	3	0.9	9	2.5	24	4.9	44	7.7	113	19.0	71	13.2	71	19.6
	習慣無(その他)	1625	64.0	160	83.3	274	85.1	275	75.8	331	67.1	291	50.7	294	49.4	242	44.9	193	53.3
	運動の習慣有	717	28.2	28	14.6	45	14.0	79	21.8	138	28.0	239	41.6	188	31.6	226	41.9	98	27.1
	総　数	2539	100	192	100	322	100	363	100	493	100	574	100	595	100	539	100	362	100
総　数	運動習慣																		
	習慣無(健康上の理由)	316	7.3	5	1.5	6	1.1	16	2.8	33	4.1	78	7.8	178	16.5	117	11.7	110	18.0
	習慣無(その他)	2751	63.4	282	82.2	448	83.9	446	77.7	548	68.4	504	50.1	523	48.5	454	45.5	312	51.0
	運動の習慣有	1269	29.3	56	16.3	80	15.0	112	19.5	220	27.5	424	42.1	377	35.0	426	42.7	190	31.0
	総　数	4336	100	343	100	534	100	574	100	801	100	1006	100	1078	100	997	100	612	100

第 47 表　1 週間の運動日数（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																	
		総　数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）65-74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	運動日数																		
男　性	運動無し	1245	69.3	123	81.5	177	83.5	178	84.4	226	73.4	247	57.2	294	60.9	258	56.3	158	63.2
	2日/週	99	5.5	8	5.3	13	6.1	9	4.3	20	6.5	30	6.9	19	3.9	27	5.9	8	3.2
	3日/週	78	4.3	6	4.0	7	3.3	7	3.3	12	3.9	24	5.6	22	4.6	23	5.0	10	4.0
	4日/週	47	2.6	4	2.6	5	2.4	1	0.5	6	1.9	18	4.2	13	2.7	18	3.9	6	2.4
	5日/週	63	3.5	3	2.0	4	1.9	7	3.3	7	2.3	25	5.8	17	3.5	20	4.4	13	5.2
	6日/週	27	1.5	2	1.3	4	1.9	0	0	3	1.0	8	1.9	10	2.1	7	1.5	8	3.2
	7日/週	238	13.2	5	3.3	2	0.9	9	4.3	34	11.0	80	18.5	108	22.4	105	22.9	47	18.8
	総　数	1797	100	151	100	212	100	211	100	308	100	432	100	483	100	458	100	250	100
女　性	運動日数																		
	運動無し	1822	71.8	164	85.4	277	86.0	284	78.2	355	72.0	335	58.4	407	68.4	313	58.1	264	72.9
	2日/週	162	6.4	11	5.7	15	4.7	30	8.3	35	7.1	40	7.0	31	5.2	36	6.7	20	5.5
	3日/週	104	4.1	3	1.6	12	3.7	13	3.6	22	4.5	35	6.1	19	3.2	27	5.0	12	3.3
	4日/週	69	2.7	4	2.1	4	1.2	8	2.2	9	1.8	27	4.7	17	2.9	24	4.5	7	1.9
	5日/週	89	3.5	3	1.6	6	1.9	6	1.7	14	2.8	35	6.1	25	4.2	27	5.0	16	4.4
	6日/週	49	1.9	2	1.0	2	0.6	5	1.4	12	2.4	18	3.1	10	1.7	17	3.2	4	1.1
	7日/週	244	9.6	5	2.6	6	1.9	17	4.7	46	9.3	84	14.6	86	14.5	95	17.6	39	10.8
	総　数	2539	100	192	100	322	100	363	100	493	100	574	100	595	100	539	100	362	100
総　数	運動日数																		
	運動無し	3067	70.7	287	83.7	454	85.0	462	80.5	581	72.5	582	57.9	701	65.0	571	57.3	422	69.0
	2日/週	261	6.0	19	5.5	28	5.2	39	6.8	55	6.9	70	7.0	50	4.6	63	6.3	28	4.6
	3日/週	182	4.2	9	2.6	19	3.6	20	3.5	34	4.2	59	5.9	41	3.8	50	5.0	22	3.6
	4日/週	116	2.7	8	2.3	9	1.7	9	1.6	15	1.9	45	4.5	30	2.8	42	4.2	13	2.1
	5日/週	152	3.5	6	1.7	10	1.9	13	2.3	21	2.6	60	6.0	42	3.9	47	4.7	29	4.7
	6日/週	76	1.8	4	1.2	6	1.1	5	0.9	15	1.9	26	2.6	20	1.9	24	2.4	12	2.0
	7日/週	482	11.1	10	2.9	8	1.5	26	4.5	80	10.0	164	16.3	194	18.0	200	20.1	86	14.1
	総　数	4336	100	343	100	534	100	574	100	801	100	1006	100	1078	100	997	100	612	100

第 48 表　運動を行う日の平均運動時間（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																	
		総　数		20−29歳		30−39歳		40−49歳		50−59歳		60−69歳		70歳以上		（再掲）65−74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	運動時間(分)																		
男　性	運動無し	1245	69.3	123	81.5	177	83.5	178	84.4	226	73.4	247	57.2	294	60.9	258	56.3	158	63.2
	30−<60分/日	209	11.6	5	3.3	14	6.6	15	7.1	29	9.4	65	15.0	81	16.8	64	14.0	40	16.0
	60−<120分/日	231	12.9	10	6.6	8	3.8	14	6.6	40	13.0	83	19.2	76	15.7	95	20.7	36	14.4
	120−<180分/日	63	3.5	7	4.6	7	3.3	4	1.9	10	3.2	20	4.6	15	3.1	19	4.1	9	3.6
	180分以上/日	49	2.7	6	4.0	6	2.8	0	0	3	1.0	17	3.9	17	3.5	22	4.8	7	2.8
	総　数	1797	100	151	100	212	100	211	100	308	100	432	100	483	100	458	100	250	100
女　性	運動時間(分)																		
	運動無し	1822	71.8	164	85.4	277	86.0	284	78.2	355	72.0	335	58.4	407	68.4	313	58.1	264	72.9
	30−<60分/日	334	13.2	8	4.2	12	3.7	34	9.4	66	13.4	111	19.3	103	17.3	120	22.3	53	14.6
	60−<120分/日	251	9.9	7	3.6	21	6.5	29	8.0	44	8.9	96	16.7	54	9.1	72	13.4	31	8.6
	120−<180分/日	86	3.4	8	4.2	8	2.5	13	3.6	16	3.2	20	3.5	21	3.5	24	4.5	9	2.5
	180分以上/日	46	1.8	5	2.6	4	1.2	3	0.8	12	2.4	12	2.1	10	1.7	10	1.9	5	1.4
	総　数	2539	100	192	100	322	100	363	100	493	100	574	100	595	100	539	100	362	100
総　数	運動時間(分)																		
	運動無し	3067	70.7	287	83.7	454	85.0	462	80.5	581	72.5	582	57.9	701	65.0	571	57.3	422	69.0
	30−<60分/日	543	12.5	13	3.8	26	4.9	49	8.5	95	11.9	176	17.5	184	17.1	184	18.5	93	15.2
	60−<120分/日	482	11.1	17	5.0	29	5.4	43	7.5	84	10.5	179	17.8	130	12.1	167	16.8	67	10.9
	120−<180分/日	149	3.4	15	4.4	15	2.8	17	3.0	26	3.2	40	4.0	36	3.3	43	4.3	18	2.9
	180分以上/日	95	2.2	11	3.2	10	1.9	3	0.5	15	1.9	29	2.9	27	2.5	32	3.2	12	2.0
	総　数	4336	100	343	100	534	100	574	100	801	100	1006	100	1078	100	997	100	612	100

第 49 表　運動強度の状況（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																	
		総　数		20−29歳		30−39歳		40−49歳		50−59歳		60−69歳		70歳以上		（再掲）65−74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	運動強度																		
男　性	運動無し	1245	69.3	123	81.5	177	83.5	178	84.4	226	73.4	247	57.2	294	60.9	258	56.3	158	63.2
	高等度	54	3.0	14	9.3	11	5.2	4	1.9	9	2.9	13	3.0	3	0.6	10	2.2	0	0
	中等度	164	9.1	10	6.6	14	6.6	14	6.6	19	6.2	60	13.9	47	9.7	58	12.7	21	8.4
	低等度	334	18.6	4	2.6	10	4.7	15	7.1	54	17.5	112	25.9	139	28.8	132	28.8	71	28.4
	総　数	1797	100	151	100	212	100	211	100	308	100	432	100	483	100	458	100	250	100
女　性	運動強度																		
	運動無し	1822	71.8	164	85.4	277	86.0	284	78.2	355	72.0	335	58.4	407	68.4	313	58.1	264	72.9
	高等度	59	2.3	5	2.6	10	3.1	17	4.7	13	2.6	11	1.9	3	0.5	4	0.7	2	0.6
	中等度	213	8.4	13	6.8	18	5.6	26	7.2	52	10.5	82	14.3	22	3.7	63	11.7	6	1.7
	低等度	445	17.5	10	5.2	17	5.3	36	9.9	73	14.8	146	25.4	163	27.4	159	29.5	90	24.9
	総　数	2539	100	192	100	322	100	363	100	493	100	574	100	595	100	539	100	362	100
総　数	運動強度																		
	運動無し	3067	70.7	287	83.7	454	85.0	462	80.5	581	72.5	582	57.9	701	65.0	571	57.3	422	69.0
	高等度	113	2.6	19	5.5	21	3.9	21	3.7	22	2.7	24	2.4	6	0.6	14	1.4	2	0.3
	中等度	377	8.7	23	6.7	32	6.0	40	7.0	71	8.9	142	14.1	69	6.4	121	12.1	27	4.4
	低等度	779	18.0	14	4.1	27	5.1	51	8.9	127	15.9	258	25.6	302	28.0	291	29.2	161	26.3
	総　数	4336	100	343	100	534	100	574	100	801	100	1006	100	1078	100	997	100	612	100

第50表　運動習慣別栄養素等摂取量

		総数		性別			
				男性		女性	
		運動習慣		運動習慣		運動習慣	
		習慣無(その他)	運動の習慣有	習慣無(その他)	運動の習慣有	習慣無(その他)	運動の習慣有
対象者数		2676	1251	1095	546	1581	705
エネルギー	kcal	1946	1962	2180	2200	1784	1777
たんぱく質	g	72.1	74.5	78.6	81.8	67.7	68.9
うち動物性	g	38.0	38.9	41.8	43.7	35.4	35.1
脂質	g	53.3	52.9	56.2	57.8	51.2	49.1
うち動物性	g	26.2	26.5	28.5	29.8	24.6	23.9
炭水化物	g	276.4	278.7	306.8	306.0	255.4	257.6
カリウム	mg	2479	2742	2539	2822	2438	2681
カルシウム	mg	538	628	528	629	545	628
マグネシウム	mg	266	288	281	302	256	277
リン	mg	1028	1089	1095	1174	981	1023
鉄	mg	8.5	9.2	8.9	9.5	8.3	9.0
亜鉛	mg	8.4	8.6	9.3	9.4	7.8	7.9
銅	mg	1.25	1.30	1.35	1.40	1.18	1.22
ビタミンA	μgRE	603	688	622	719	590	663
ビタミンD	μg	8.4	9.1	8.8	10.1	8.1	8.3
ビタミンE	mgα-TE	9.8	11.4	8.7	11.5	10.6	11.3
ビタミンK	μg	265	300	264	301	265	299
ビタミンB_1	mg	1.55	1.95	1.79	2.26	1.39	1.71
ビタミンB_2	mg	1.47	1.77	1.50	1.88	1.44	1.69
ナイアシン	mgNE	16.1	17.0	17.8	19.1	14.9	15.3
ビタミンB_6	mg	1.86	2.46	2.12	2.73	1.68	2.24
ビタミンB_{12}	μg	7.4	8.3	8.1	9.3	6.9	7.4
葉酸	μg	328	369	336	379	323	362
パントテン酸	mg	5.58	5.95	5.93	6.40	5.34	5.60
ビタミンC	mg	136	166	120	153	146	175
コレステロール	mg	322	314	343	351	308	285
食物繊維	g	16.1	17.8	16.1	18.0	16.0	17.6
うち水溶性	g	3.5	3.9	3.5	3.9	3.5	3.9
うち不溶性	g	11.8	13.0	11.8	13.2	11.7	12.8
食塩(ナトリウム×2.54/1000)	g	11.6	11.8	12.5	12.7	11.0	11.2
脂肪エネルギー比率	%	24.5	23.9	23.0	23.2	25.5	24.5
炭水化物エネルギー比率	%	60.6	60.8	62.5	61.8	59.3	60.0
動物性たんぱく質比率	%	50.8	50.5	51.4	52.0	50.4	49.3

注） 20歳以上。妊婦・「健康上の理由」により運動習慣の無い者除外

第 51 表　歩行数の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																			
	総　数		15−19歳		20−29歳		30−39歳		40−49歳		50−59歳		60−69歳		70歳以上		（再掲）65−74歳		（再掲）75歳以上	
	歩行数（歩/日）		歩行数（歩/日）		歩行数（歩/日）		歩行数（歩/日）		歩行数（歩/日）		歩行数（歩/日）		歩行数（歩/日）		歩行数（歩/日）		歩行数（歩/日）		歩行数（歩/日）	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性　別																				
男　性	7621	4844	8637	5073	8736	5261	8568	4699	8059	4488	8400	5544	7418	4407	5151	3569	6713	4168	4335	3254
女　性	6620	4222	8391	5834	7350	3976	6992	3491	7388	4631	7541	3977	6777	4102	4088	3151	5823	3610	3420	2899
総　数	7079	4545	8510	5472	8029	4698	7739	4181	7687	4578	7935	4778	7066	4252	4559	3382	6240	3906	3786	3077

第 52 表　歩行数の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総　数		15−19歳		20−29歳		30−39歳		40−49歳		50−59歳		60−69歳		70歳以上		（再掲）65−74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性　別	歩行数(歩/日)																				
男　性	1-1999	252	7.8	7	3.8	18	5.1	15	3.3	15	3.3	26	4.5	46	7.6	125	20.2	64	10.5	92	28.8
	2000-3999	500	15.4	19	10.4	40	11.4	46	10.1	62	13.7	85	14.7	85	14.0	163	26.3	126	20.6	81	25.3
	4000-5999	597	18.4	39	21.4	58	16.5	93	20.4	88	19.4	89	15.4	122	20.0	108	17.4	104	17.0	61	19.1
	6000-7999	585	18.0	32	17.6	56	16.0	75	16.5	92	20.3	110	19.0	125	20.5	95	15.3	108	17.6	44	13.8
	8000-9999	474	14.6	26	14.3	61	17.4	75	16.5	73	16.1	97	16.8	83	13.6	59	9.5	77	12.6	25	7.8
	10000-	840	25.9	59	32.4	118	33.6	151	33.2	123	27.2	171	29.6	148	24.3	70	11.3	133	21.7	17	5.3
	総　数	3248	100	182	100	351	100	455	100	453	100	578	100	609	100	620	100	612	100	320	100
女　性	歩行数(歩/日)																				
	1-1999	400	10.4	9	4.7	15	4.1	20	4.0	15	2.7	32	4.7	61	8.2	248	31.8	96	13.8	192	40.1
	2000-3999	658	17.2	21	10.9	65	17.8	87	17.2	76	13.4	93	13.7	125	16.9	191	24.5	143	20.6	120	25.1
	4000-5999	823	21.5	40	20.7	79	21.6	120	23.8	127	22.4	134	19.7	173	23.3	150	19.2	172	24.8	78	16.3
	6000-7999	733	19.1	39	20.2	71	19.4	96	19.0	151	26.7	137	20.1	135	18.2	104	13.3	109	15.7	60	12.5
	8000-9999	552	14.4	27	14.0	50	13.7	92	18.2	99	17.5	124	18.2	118	15.9	42	5.4	85	12.2	14	2.9
	10000-	667	17.4	57	29.5	86	23.5	90	17.8	98	17.3	161	23.6	129	17.4	46	5.9	89	12.8	15	3.1
	総　数	3833	100	193	100	366	100	505	100	566	100	681	100	741	100	781	100	694	100	479	100
総　数	歩行数(歩/日)																				
	1-1999	652	9.2	16	4.3	33	4.6	35	3.6	30	2.9	58	4.6	107	7.9	373	26.6	160	12.3	284	35.5
	2000-3999	1158	16.4	40	10.7	105	14.6	133	13.9	138	13.5	178	14.1	210	15.6	354	25.3	269	20.6	201	25.2
	4000-5999	1420	20.1	79	21.1	137	19.1	213	22.2	215	21.1	223	17.7	295	21.9	258	18.4	276	21.1	139	17.4
	6000-7999	1318	18.6	71	18.9	127	17.7	171	17.8	243	23.8	247	19.6	260	19.3	199	14.2	217	16.6	104	13.0
	8000-9999	1026	14.5	53	14.1	111	15.5	167	17.4	172	16.9	221	17.6	201	14.9	101	7.2	162	12.4	39	4.9
	10000-	1507	21.3	116	30.9	204	28.5	241	25.1	221	21.7	332	26.4	277	20.5	116	8.3	222	17.0	32	4.0
	総　数	7081	100	375	100	717	100	960	100	1019	100	1259	100	1350	100	1401	100	1306	100	799	100