

第 2 部 身体状況調査の結果

第 14 表 身長・体重の平均値及び標準偏差一年齢階級，身長・体重別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，1 歳以上〔体重は妊婦除外〕

	男 性						女 性					
	身 長(cm)			体 重(kg)			身 長(cm)			体 重(kg)		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	2,163	163.8	16.5	2,160	62.9	16.2	2,453	152.2	12.3	2,434	51.2	12.2
1 歳	11	77.8	4.2	11	10.4	1.5	9	78.5	3.1	10	10.0	0.6
2 歳	12	88.7	3.4	12	12.9	0.8	13	87.9	3.6	13	12.1	0.8
3 歳	23	96.7	3.7	23	14.9	1.6	14	95.1	7.6	14	14.0	2.6
4 歳	12	106.6	5.0	12	17.6	2.2	10	101.7	3.2	10	15.3	1.6
5 歳	19	110.7	4.7	19	19.1	2.7	13	108.1	5.7	13	17.8	2.1
6 歳	9	118.1	4.4	9	21.5	2.4	17	118.2	4.6	17	21.9	3.2
7 歳	17	122.0	5.2	17	23.2	3.5	16	121.9	3.8	16	22.8	3.1
8 歳	18	128.4	6.8	18	28.1	5.3	17	129.6	6.7	17	27.6	5.4
9 歳	18	134.4	6.0	18	34.5	10.4	23	133.5	7.2	23	30.7	6.6
10歳	22	139.7	6.1	22	34.4	8.5	18	141.2	6.3	18	33.2	6.5
11歳	20	147.0	8.4	20	44.3	13.5	23	146.6	6.5	23	38.3	8.4
12歳	15	155.1	9.9	15	47.1	10.5	16	150.4	5.6	16	42.2	8.9
13歳	21	160.8	5.6	21	51.3	10.1	18	153.6	5.2	18	45.6	6.1
14歳	22	165.8	4.5	22	57.9	11.9	27	155.3	5.3	27	45.8	6.1
15歳	20	168.2	5.7	20	56.8	10.6	14	157.1	6.0	14	49.6	5.2
16歳	18	170.1	5.6	18	57.1	5.8	17	155.7	6.4	17	47.5	6.3
17歳	21	171.2	7.1	21	57.9	5.4	13	157.0	6.0	13	49.4	4.8
18歳	11	172.1	4.4	11	60.2	7.4	16	159.1	4.4	16	54.1	10.7
19歳	18	171.9	5.8	17	67.9	7.4	23	158.8	4.6	23	51.9	7.2
20歳	15	173.2	4.6	15	64.8	11.0	13	155.4	3.7	13	46.6	6.6
21歳	7	169.6	3.7	7	62.4	6.8	25	157.6	6.2	25	51.9	5.8
22歳	17	172.7	6.2	17	65.5	14.0	14	158.4	6.3	14	52.4	9.5
23歳	11	174.0	3.3	11	70.9	12.1	10	157.8	5.6	10	52.4	10.0
24歳	11	173.2	4.0	11	64.4	13.3	12	158.4	5.1	11	49.8	5.5
25歳	10	173.4	7.5	10	68.6	14.0	9	157.3	7.2	8	53.3	9.0
26－29歳	39	171.6	4.6	39	64.2	11.7	55	158.4	5.2	50	55.2	12.4
30－39歳	187	171.7	5.7	185	70.9	12.2	203	158.2	4.6	196	54.9	10.1
40－49歳	273	171.4	5.7	273	71.0	11.6	300	158.1	5.1	298	55.7	9.6
50－59歳	276	170.0	5.9	274	70.5	10.8	351	157.7	5.2	347	55.9	10.1
60－69歳	338	168.2	5.9	338	67.9	9.5	384	154.9	5.3	383	54.0	9.2
70歳以上	652	163.9	6.6	654	62.9	9.9	760	150.1	6.0	761	51.5	9.0
(再掲)												
20歳以上	1,836	168.0	6.9	1,834	67.2	11.2	2,136	154.6	6.5	2,116	53.7	9.6
20－29歳	110	172.4	5.0	110	65.4	12.1	138	157.9	5.5	131	52.6	9.9
60－64歳	159	168.6	6.1	158	68.0	9.9	177	155.8	5.5	176	54.4	9.5
65－69歳	179	167.8	5.8	180	67.9	9.2	207	154.2	5.0	207	53.7	9.0
70－74歳	246	166.5	5.8	247	65.9	9.6	273	152.3	5.4	273	53.5	8.5
75－79歳	190	163.7	5.9	190	62.3	10.1	210	150.4	5.7	210	51.9	9.2
80歳以上	216	161.2	6.8	217	60.2	9.2	277	147.7	6.0	278	49.3	8.9

注) 女性の体重の集計は妊婦 11 名を除外して行った。

(4 年)

第15表 BMIの平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－
男性・女性，15歳以上〔妊婦除外〕

	男 性			女 性		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	1,917	23.6	3.5	2,192	22.4	3.7
15-19歳	87	20.6	3.0	83	20.3	2.6
20-29歳	110	22.0	3.8	131	21.1	3.3
30-39歳	185	24.1	3.9	196	21.9	3.9
40-49歳	273	24.2	3.7	298	22.3	3.8
50-59歳	274	24.4	3.4	347	22.5	3.8
60-69歳	337	24.0	3.1	382	22.5	3.7
70歳以上	651	23.4	3.2	755	22.9	3.6
(再掲)						
20歳以上	1,830	23.8	3.4	2,109	22.5	3.7
20-69歳	1,179	23.9	3.6	1,354	22.2	3.8
40-69歳	884	24.2	3.4	1,027	22.4	3.7
65-69歳	179	24.1	3.0	207	22.6	3.5
70-74歳	246	23.7	3.1	272	23.1	3.5
75-79歳	189	23.3	3.2	209	22.9	3.8
80-84歳	131	23.5	3.3	153	22.7	3.5
80歳以上	216	23.2	3.2	274	22.6	3.6
85歳以上	85	22.7	3.1	121	22.5	3.7

注1) 身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお，女性は妊婦11名を除外した。

(4年)

注2) BMIは体重(kg)/(身長(m))²で算出した。

第 16 表 BMI の分布－BMI の区分，人数，割合－総数・男性・女性，15 歳以上〔妊婦除外〕

	総 数		男 性		女 性	
	人 数	%	人 数	%	人 数	%
総 数	4,109	100.0	1,917	100.0	2,192	100.0
15未満	7	0.2	2	0.1	5	0.2
15－16未満	20	0.5	7	0.4	13	0.6
16－17未満	65	1.6	13	0.7	52	2.4
17－18未満	150	3.7	50	2.6	100	4.6
18－19未満	270	6.6	82	4.3	188	8.6
19－20未満	360	8.8	111	5.8	249	11.4
20－21未満	439	10.7	168	8.8	271	12.4
21－22未満	480	11.7	209	10.9	271	12.4
22－23未満	448	10.9	220	11.5	228	10.4
23－24未満	443	10.8	244	12.7	199	9.1
24－25未満	394	9.6	224	11.7	170	7.8
25－26未満	277	6.7	163	8.5	114	5.2
26－27未満	233	5.7	140	7.3	93	4.2
27－28未満	174	4.2	108	5.6	66	3.0
28－29未満	109	2.7	51	2.7	58	2.6
29－30未満	69	1.7	42	2.2	27	1.2
30－31未満	58	1.4	26	1.4	32	1.5
31－32未満	32	0.8	14	0.7	18	0.8
32－33未満	24	0.6	9	0.5	15	0.7
33－34未満	18	0.4	12	0.6	6	0.3
34－35未満	16	0.4	10	0.5	6	0.3
35以上	23	0.6	12	0.6	11	0.5

注 1) 身長と体重の測定を行った 15 歳以上の者を集計対象とした。なお，女性は妊婦 11 名を除外した。

(4 年)

注 2) BMI は体重 (kg) / (身長 (m))² で算出した。

第17表の1 BMIの状況－年齢階級、肥満度（BMI）別、人数、割合－総数・男性・女性、15歳以上〔妊婦除外〕

		総 数		や せ 18.5未満		普 通 18.5以上25未満		肥 満 25以上		(再掲) 20以下		(再掲) 25以上30未満		(再掲) 30以上	
		人 数	%	人 数	%	人 数	%	人 数	%	人 数	%	人 数	%	人 数	%
総数	総 数	4,109	100.0	364	8.9	2,712	66.0	1,033	25.1	879	21.4	862	21.0	171	4.2
	15-19歳	170	100.0	46	27.1	114	67.1	10	5.9	83	48.8	8	4.7	2	1.2
	20-29歳	241	100.0	41	17.0	167	69.3	33	13.7	93	38.6	24	10.0	9	3.7
	30-39歳	381	100.0	35	9.2	253	66.4	93	24.4	84	22.0	68	17.8	25	6.6
	40-49歳	571	100.0	36	6.3	388	68.0	147	25.7	123	21.5	113	19.8	34	6.0
	50-59歳	621	100.0	37	6.0	406	65.4	178	28.7	116	18.7	152	24.5	26	4.2
	60-69歳	719	100.0	56	7.8	462	64.3	201	28.0	125	17.4	170	23.6	31	4.3
	70歳以上	1,406	100.0	113	8.0	922	65.6	371	26.4	255	18.1	327	23.3	44	3.1
	(再掲)														
	20歳以上	3,939	100.0	318	8.1	2,598	66.0	1,023	26.0	796	20.2	854	21.7	169	4.3
	20-69歳	2,533	100.0	205	8.1	1,676	66.2	652	25.7	541	21.4	527	20.8	125	4.9
	40-69歳	1,911	100.0	129	6.8	1,256	65.7	526	27.5	364	19.0	435	22.8	91	4.8
	65歳以上	1,792	100.0	143	8.0	1,167	65.1	482	26.9	319	17.8	424	23.7	58	3.2
	65-69歳	386	100.0	30	7.8	245	63.5	111	28.8	64	16.6	97	25.1	14	3.6
	70-74歳	518	100.0	35	6.8	329	63.5	154	29.7	77	14.9	138	26.6	16	3.1
	75-79歳	398	100.0	28	7.0	273	68.6	97	24.4	74	18.6	83	20.9	14	3.5
	80-84歳	284	100.0	24	8.5	189	66.5	71	25.0	50	17.6	61	21.5	10	3.5
	85歳以上	490	100.0	50	10.2	320	65.3	120	24.5	104	21.2	106	21.6	14	2.9
男性	総 数	1,917	100.0	106	5.5	1,224	63.8	587	30.6	266	13.9	504	26.3	83	4.3
	15-19歳	87	100.0	27	31.0	54	62.1	6	6.9	39	44.8	5	5.7	1	1.1
	20-29歳	110	100.0	16	14.5	73	66.4	21	19.1	35	31.8	15	13.6	6	5.5
	30-39歳	185	100.0	6	3.2	120	64.9	59	31.9	18	9.7	44	23.8	15	8.1
	40-49歳	273	100.0	7	2.6	174	63.7	92	33.7	32	11.7	74	27.1	18	6.6
	50-59歳	274	100.0	4	1.5	160	58.4	110	40.1	22	8.0	98	35.8	12	4.4
	60-69歳	337	100.0	8	2.4	215	63.8	114	33.8	26	7.7	98	29.1	16	4.7
	70歳以上	651	100.0	38	5.8	428	65.7	185	28.4	94	14.4	170	26.1	15	2.3
	(再掲)														
	20歳以上	1,830	100.0	79	4.3	1,170	63.9	581	31.7	227	12.4	499	27.3	82	4.5
	20-69歳	1,179	100.0	41	3.5	742	62.9	396	33.6	133	11.3	329	27.9	67	5.7
	40-69歳	884	100.0	19	2.1	549	62.1	316	35.7	80	9.0	270	30.5	46	5.2
	65歳以上	830	100.0	41	4.9	542	65.3	247	29.8	107	12.9	224	27.0	23	2.8
	65-69歳	179	100.0	3	1.7	114	63.7	62	34.6	13	7.3	54	30.2	8	4.5
	70-74歳	246	100.0	12	4.9	153	62.2	81	32.9	26	10.6	75	30.5	6	2.4
	75-79歳	189	100.0	12	6.3	131	69.3	46	24.3	30	15.9	42	22.2	4	2.1
	80-84歳	131	100.0	7	5.3	88	67.2	36	27.5	15	11.5	32	24.4	4	3.1
	85歳以上	216	100.0	14	6.5	144	66.7	58	26.9	38	17.6	53	24.5	5	2.3
女性	総 数	2,192	100.0	258	11.8	1,488	67.9	446	20.3	613	28.0	358	16.3	88	4.0
	15-19歳	83	100.0	19	22.9	60	72.3	4	4.8	44	53.0	3	3.6	1	1.2
	20-29歳	131	100.0	25	19.1	94	71.8	12	9.2	58	44.3	9	6.9	3	2.3
	30-39歳	196	100.0	29	14.8	133	67.9	34	17.3	66	33.7	24	12.2	10	5.1
	40-49歳	298	100.0	29	9.7	214	71.8	55	18.5	91	30.5	39	13.1	16	5.4
	50-59歳	347	100.0	33	9.5	246	70.9	68	19.6	94	27.1	54	15.6	14	4.0
	60-69歳	382	100.0	48	12.6	247	64.7	87	22.8	99	25.9	72	18.8	15	3.9
	70歳以上	755	100.0	75	9.9	494	65.4	186	24.6	161	21.3	157	20.8	29	3.8
	(再掲)														
	20歳以上	2,109	100.0	239	11.3	1,428	67.7	442	21.0	569	27.0	355	16.8	87	4.1
	20-69歳	1,354	100.0	164	12.1	934	69.0	256	18.9	408	30.1	198	14.6	58	4.3
	40-69歳	1,027	100.0	110	10.7	707	68.8	210	20.4	284	27.7	165	16.1	45	4.4
	65歳以上	962	100.0	102	10.6	625	65.0	235	24.4	212	22.0	200	20.8	35	3.6
	65-69歳	207	100.0	27	13.0	131	63.3	49	23.7	51	24.6	43	20.8	6	2.9
	70-74歳	272	100.0	23	8.5	176	64.7	73	26.8	51	18.8	63	23.2	10	3.7
	75-79歳	209	100.0	16	7.7	142	67.9	51	24.4	44	21.1	41	19.6	10	4.8
	80-84歳	153	100.0	17	11.1	101	66.0	35	22.9	35	22.9	29	19.0	6	3.9
	85歳以上	274	100.0	36	13.1	176	64.2	62	22.6	66	24.1	53	19.3	9	3.3
	85歳以上	121	100.0	19	15.7	75	62.0	27	22.3	31	25.6	24	19.8	3	2.5

注1) 身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦11名を除外した。

注2) BMIは体重(kg)÷(身長(m))²で算出した。

注3) BMIの判定は下記のとおり。

やせ：18.5未満

普通：18.5以上25未満

肥満：25以上

※年齢調整した、肥満者(BMI ≥ 25kg/m²)の割合(20歳以上)は、総数24.9%、男性31.4%、女性19.2%。年齢調整した、やせの者(BMI < 18.5kg/m²)の割合(20歳以上)は、総数8.8%、男性4.7%、女性12.3%。年齢調整した、低栄養傾向の者(BMI ≤ 20kg/m²)の割合(65歳以上)は、総数17.9%、男性13.2%、女性22.0%。

年齢調整した肥満者とやせの者の割合は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を、

年齢調整した低栄養傾向の者の割合は、平成22年国勢調査による基準人口(65-74歳、75-84歳、85歳以上の3区分)を用いて算出した。

第 17 表の 2 目標とする BMI の範囲の分布－年齢階級，目標とする BMI の範囲，人数，割合－総数・男性・女性，18 歳以上〔妊婦除外〕

		総数		範囲未満		範囲内		範囲以上	
		人 数	%	人 数	%	人 数	%	人 数	%
総 数	総数	4,006	100.0	880	22.0	2,095	52.3	1,031	25.7
	18－49歳	1,260	100.0	125	9.9	854	67.8	281	22.3
	50－69歳	1,340	100.0	295	22.0	666	49.7	379	28.3
	70歳以上	1,406	100.0	460	32.7	575	40.9	371	26.4
	(再掲)								
	18－19歳	67	100.0	13	19.4	46	68.7	8	11.9
	20－29歳	241	100.0	41	17.0	167	69.3	33	13.7
	30－39歳	381	100.0	35	9.2	253	66.4	93	24.4
	40－49歳	571	100.0	36	6.3	388	68.0	147	25.7
	50－59歳	621	100.0	116	18.7	327	52.7	178	28.7
	60－69歳	719	100.0	179	24.9	339	47.1	201	28.0
	70－79歳	916	100.0	284	31.0	381	41.6	251	27.4
	80歳以上	490	100.0	176	35.9	194	39.6	120	24.5
	65歳以上	1,792	100.0	578	32.3	732	40.8	482	26.9
男 性	65－74歳	904	100.0	272	30.1	367	40.6	265	29.3
	75歳以上	888	100.0	306	34.5	365	41.1	217	24.4
	総数	1,858	100.0	278	15.0	995	53.6	585	31.5
	18－49歳	596	100.0	33	5.5	387	64.9	176	29.5
	50－69歳	611	100.0	71	11.6	316	51.7	224	36.7
	70歳以上	651	100.0	174	26.7	292	44.9	185	28.4
	(再掲)								
	18－19歳	28	100.0	4	14.3	20	71.4	4	14.3
	20－29歳	110	100.0	16	14.5	73	66.4	21	19.1
	30－39歳	185	100.0	6	3.2	120	64.9	59	31.9
	40－49歳	273	100.0	7	2.6	174	63.7	92	33.7
	50－59歳	274	100.0	22	8.0	142	51.8	110	40.1
	60－69歳	337	100.0	49	14.5	174	51.6	114	33.8
	70－79歳	435	100.0	105	24.1	203	46.7	127	29.2
女 性	80歳以上	216	100.0	69	31.9	89	41.2	58	26.9
	65歳以上	830	100.0	210	25.3	373	44.9	247	29.8
	65－74歳	425	100.0	93	21.9	189	44.5	143	33.6
	75歳以上	405	100.0	117	28.9	184	45.4	104	25.7
	総数	2,148	100.0	602	28.0	1,100	51.2	446	20.8
	18－49歳	664	100.0	92	13.9	467	70.3	105	15.8
	50－69歳	729	100.0	224	30.7	350	48.0	155	21.3
	70歳以上	755	100.0	286	37.9	283	37.5	186	24.6
	(再掲)								
	18－19歳	39	100.0	9	23.1	26	66.7	4	10.3
	20－29歳	131	100.0	25	19.1	94	71.8	12	9.2
	30－39歳	196	100.0	29	14.8	133	67.9	34	17.3
	40－49歳	298	100.0	29	9.7	214	71.8	55	18.5
	50－59歳	347	100.0	94	27.1	185	53.3	68	19.6
	60－69歳	382	100.0	130	34.0	165	43.2	87	22.8
	70－79歳	481	100.0	179	37.2	178	37.0	124	25.8
	80歳以上	274	100.0	107	39.1	105	38.3	62	22.6
	65歳以上	962	100.0	368	38.3	359	37.3	235	24.4
	65－74歳	479	100.0	179	37.4	178	37.2	122	25.5
	75歳以上	483	100.0	189	39.1	181	37.5	113	23.4

注 1) 身長と体重の測定を行った 18 歳以上の者を集計対象とした。なお，女性は妊婦 11 名を除外した。(4 年)
 注 2) BMI は体重 (kg) / (身長 (m))² で算出した。

<参考> 目標とする BMI の範囲 (18 歳以上)^{1, 2}

年齢(歳)	目標とするBMI (kg/m ²)
18－49	18.5－24.9
50－64	20.0－24.9
65－74	21.5－24.9 ³
75以上	21.5－24.9 ³

¹ 男女共通。あくまでも参考として使用すべきである。
² 観察疫学研究において報告された総死亡率が最も低かった BMI を基に，疾患別の発症率と BMI との関連，死因と BMI との関連，喫煙や疾患の合併による BMI や死亡リスクへの影響，日本人の BMI の実態に配慮し，総合的に判断し目標とする範囲を設定。
³ 高齢者では，フレイルの予防及び生活習慣病の発症予防の両者に配慮する必要があることも踏まえ，当目標とする BMI の範囲を 21.5－24.9 kg/m² とした。
 (厚生労働省「日本人の食事摂取基準 (2020 年版)」)

第18表 学校保健統計調査方式による肥満区分—学校保健統計調査方式による肥満区分，年齢階級別，人数，割合—総数・男性・女性，6～14歳

		総 数		6～8歳		9～11歳		12～14歳	
		人 数	%	人 数	%	人 数	%	人 数	%
総数	総 数	337	100.0	94	100.0	124	100.0	119	100.0
	－30%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	－30%超～－20%以下	20	5.9	4	4.3	7	5.6	9	7.6
	－20%超～－10%以下	65	19.3	13	13.8	30	24.2	22	18.5
	－10%超～ 0%未満	103	30.6	38	40.4	33	26.6	32	26.9
	0%以上～+10%未満	77	22.8	23	24.5	23	18.5	31	26.1
	+10%以上～+20%未満	37	11.0	12	12.8	11	8.9	14	11.8
	+20%以上～+30%未満	16	4.7	3	3.2	9	7.3	4	3.4
	+30%以上～+40%未満	12	3.6	1	1.1	6	4.8	5	4.2
	+40%以上～+50%未満	4	1.2	0	0.0	2	1.6	2	1.7
	+50%以上	3	0.9	0	0.0	3	2.4	0	0.0
男性	総 数	162	100.0	44	100.0	60	100.0	58	100.0
	－30%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	－30%超～－20%以下	4	2.5	0	0.0	1	1.7	3	5.2
	－20%超～－10%以下	31	19.1	6	13.6	15	25.0	10	17.2
	－10%超～ 0%未満	42	25.9	19	43.2	13	21.7	10	17.2
	0%以上～+10%未満	39	24.1	11	25.0	12	20.0	16	27.6
	+10%以上～+20%未満	23	14.2	6	13.6	7	11.7	10	17.2
	+20%以上～+30%未満	12	7.4	2	4.5	6	10.0	4	6.9
	+30%以上～+40%未満	5	3.1	0	0.0	2	3.3	3	5.2
	+40%以上～+50%未満	3	1.9	0	0.0	1	1.7	2	3.4
	+50%以上	3	1.9	0	0.0	3	5.0	0	0.0
女性	総 数	175	100.0	50	100.0	64	100.0	61	100.0
	－30%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	－30%超～－20%以下	16	9.1	4	8.0	6	9.4	6	9.8
	－20%超～－10%以下	34	19.4	7	14.0	15	23.4	12	19.7
	－10%超～ 0%未満	61	34.9	19	38.0	20	31.3	22	36.1
	0%以上～+10%未満	38	21.7	12	24.0	11	17.2	15	24.6
	+10%以上～+20%未満	14	8.0	6	12.0	4	6.3	4	6.6
	+20%以上～+30%未満	4	2.3	1	2.0	3	4.7	0	0.0
	+30%以上～+40%未満	7	4.0	1	2.0	4	6.3	2	3.3
	+40%以上～+50%未満	1	0.6	0	0.0	1	1.6	0	0.0
	+50%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注1) 身長と体重の測定を行った6～14歳の者を集計対象とした。

(4年)

注2) 学校保健統計調査方式による区分は，p.15参照。

第19表 腹囲の分布－腹囲の区分，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除外〕

		総数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,531	100.0	209	100.0	328	100.0	505	100.0	561	100.0	654	100.0	1,274	100.0	2,202	100.0
	50cm未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50－55	1	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55－60	15	0.4	5	2.4	2	0.6	3	0.6	4	0.7	0	0.0	1	0.1	7	0.3
	60－65	94	2.7	21	10.0	13	4.0	22	4.4	8	1.4	15	2.3	15	1.2	52	2.4
	65－70	206	5.8	31	14.8	24	7.3	37	7.3	37	6.6	26	4.0	51	4.0	117	5.3
	70－75	426	12.1	47	22.5	59	18.0	80	15.8	70	12.5	64	9.8	106	8.3	245	11.1
	75－80	503	14.2	35	16.7	59	18.0	75	14.9	104	18.5	79	12.1	151	11.9	310	14.1
	80－85	666	18.9	31	14.8	55	16.8	96	19.0	99	17.6	134	20.5	251	19.7	433	19.7
	85－90	659	18.7	16	7.7	57	17.4	80	15.8	101	18.0	144	22.0	261	20.5	429	19.5
	90－95	448	12.7	7	3.3	25	7.6	47	9.3	64	11.4	103	15.7	202	15.9	287	13.0
	95－100	280	7.9	7	3.3	12	3.7	35	6.9	38	6.8	53	8.1	135	10.6	176	8.0
	100－105	132	3.7	4	1.9	13	4.0	18	3.6	15	2.7	21	3.2	61	4.8	81	3.7
	105－110	62	1.8	1	0.5	6	1.8	10	2.0	11	2.0	8	1.2	26	2.0	42	1.9
	110－115	20	0.6	2	1.0	0	0.0	1	0.2	6	1.1	4	0.6	7	0.5	15	0.7
	115－120	10	0.3	1	0.5	1	0.3	0	0.0	2	0.4	1	0.2	5	0.4	3	0.1
	120cm以上	9	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.2	2	0.4	2	0.3	2	0.2	5	0.2
男 性	(再掲)＜85cm(男)/＜90cm(女)	2,180	61.7	175	83.7	231	70.4	343	67.9	363	64.7	378	57.8	690	54.2	1,342	60.9
	(再掲)≥85cm(男)/≥90cm(女)	1,351	38.3	34	16.3	97	29.6	162	32.1	198	35.3	276	42.2	584	45.8	860	39.1
	総 数	1,629	100.0	90	100.0	157	100.0	237	100.0	247	100.0	306	100.0	592	100.0	1,015	100.0
	50cm未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50－55	1	0.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55－60	2	0.1	1	1.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60－65	14	0.9	5	5.6	2	1.3	2	0.8	0	0.0	2	0.7	3	0.5	5	0.5
	65－70	26	1.6	3	3.3	1	0.6	4	1.7	2	0.8	3	1.0	13	2.2	14	1.4
	70－75	95	5.8	17	18.9	14	8.9	14	5.9	15	6.1	8	2.6	27	4.6	42	4.1
	75－80	201	12.3	20	22.2	30	19.1	33	13.9	35	14.2	24	7.8	59	10.0	110	10.8
	80－85	327	20.1	17	18.9	30	19.1	57	24.1	48	19.4	77	25.2	98	16.6	221	21.8
	85－90	390	23.9	12	13.3	38	24.2	50	21.1	60	24.3	84	27.5	146	24.7	251	24.7
	90－95	265	16.3	5	5.6	17	10.8	29	12.2	40	16.2	56	18.3	118	19.9	169	16.7
	95－100	171	10.5	4	4.4	8	5.1	26	11.0	26	10.5	32	10.5	75	12.7	113	11.1
	100－105	80	4.9	3	3.3	10	6.4	15	6.3	8	3.2	11	3.6	33	5.6	52	5.1
	105－110	35	2.1	0	0.0	3	1.9	6	2.5	7	2.8	4	1.3	15	2.5	24	2.4
	110－115	9	0.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	3	1.2	2	0.7	3	0.5	7	0.7
	115－120	6	0.4	1	1.1	1	0.6	0	0.0	2	0.8	1	0.3	1	0.2	3	0.3
	120cm以上	7	0.4	0	0.0	2	1.3	1	0.4	1	0.4	2	0.7	1	0.2	4	0.4
女 性	(再掲)＜85cm	666	40.9	64	71.1	78	49.7	110	46.4	100	40.5	114	37.3	200	33.8	392	38.6
	(再掲)≥85cm	963	59.1	26	28.9	79	50.3	127	53.6	147	59.5	192	62.7	392	66.2	623	61.4
	総 数	1,902	100.0	119	100.0	171	100.0	268	100.0	314	100.0	348	100.0	682	100.0	1,187	100.0
	50cm未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50－55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	55－60	13	0.7	4	3.4	1	0.6	3	1.1	4	1.3	0	0.0	1	0.1	7	0.6
	60－65	80	4.2	16	13.4	11	6.4	20	7.5	8	2.5	13	3.7	12	1.8	47	4.0
	65－70	180	9.5	28	23.5	23	13.5	33	12.3	35	11.1	23	6.6	38	5.6	103	8.7
	70－75	331	17.4	30	25.2	45	26.3	66	24.6	55	17.5	56	16.1	79	11.6	203	17.1
	75－80	302	15.9	15	12.6	29	17.0	42	15.7	69	22.0	55	15.8	92	13.5	200	16.8
	80－85	339	17.8	14	11.8	25	14.6	39	14.6	51	16.2	57	16.4	153	22.4	212	17.9
	85－90	269	14.1	4	3.4	19	11.1	30	11.2	41	13.1	60	17.2	115	16.9	178	15.0
	90－95	183	9.6	2	1.7	8	4.7	18	6.7	24	7.6	47	13.5	84	12.3	118	9.9
	95－100	109	5.7	3	2.5	4	2.3	9	3.4	12	3.8	21	6.0	60	8.8	63	5.3
	100－105	52	2.7	1	0.8	3	1.8	3	1.1	7	2.2	10	2.9	28	4.1	29	2.4
	105－110	27	1.4	1	0.8	3	1.8	4	1.5	4	1.3	4	1.1	11	1.6	18	1.5
	110－115	11	0.6	1	0.8	0	0.0	1	0.4	3	1.0	2	0.6	4	0.6	8	0.7
	115－120	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.6	0	0.0
	120cm以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.1
	(再掲)＜90cm	1,514	79.6	111	93.3	153	89.5	233	86.9	263	83.8	264	75.9	490	71.8	950	80.0
	(再掲)≥90cm	388	20.4	8	6.7	18	10.5	35	13.1	51	16.2	84	24.1	192	28.2	237	20.0

注) 腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお女性は妊婦6名を除外した。

(4年)

第20表 BMI・腹囲の分布－BMI・腹囲の区分，人数，年齢階級別，割合－総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除外〕

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	3,520	100.0	209	100.0	327	100.0	504	100.0	561	100.0	652	100.0	1,267	100.0	2,197	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm(男)/90cm(女)	2,033	57.8	170	81.3	216	66.1	321	63.7	336	59.9	349	53.5	641	50.6	1,236	56.3
	BMIのみ超(BMI≥25)	139	3.9	5	2.4	14	4.3	21	4.2	27	4.8	27	4.1	45	3.6	102	4.6
	腹囲のみ超(腹囲≥85cm(男)/90cm(女))	566	16.1	10	4.8	33	10.1	55	10.9	64	11.4	117	17.9	287	22.7	340	15.5
	BMI≥25, 腹囲≥85cm(男)/90cm(女)	782	22.2	24	11.5	64	19.6	107	21.2	134	23.9	159	24.4	294	23.2	519	23.6
男 性	総 数	1,626	100.0	90	100.0	157	100.0	237	100.0	247	100.0	305	100.0	590	100.0	1,013	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	648	39.9	63	70.0	77	49.0	106	44.7	98	39.7	109	35.7	195	33.1	379	37.4
	BMIのみ超(BMI≥25)	16	1.0	1	1.1	1	0.6	4	1.7	2	0.8	4	1.3	4	0.7	12	1.2
	腹囲のみ超(腹囲≥85cm)	453	27.9	9	10.0	31	19.7	50	21.1	51	20.6	91	29.8	221	37.5	273	26.9
	BMI≥25, 腹囲≥85cm	509	31.3	17	18.9	48	30.6	77	32.5	96	38.9	101	33.1	170	28.8	349	34.5
女 性	総 数	1,894	100.0	119	100.0	170	100.0	267	100.0	314	100.0	347	100.0	677	100.0	1,184	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	1,385	73.1	107	89.9	139	81.8	215	80.5	238	75.8	240	69.2	446	65.9	857	72.4
	BMIのみ超(BMI≥25)	123	6.5	4	3.4	13	7.6	17	6.4	25	8.0	23	6.6	41	6.1	90	7.6
	腹囲のみ超(腹囲≥90cm)	113	6.0	1	0.8	2	1.2	5	1.9	13	4.1	26	7.5	66	9.7	67	5.7
	BMI≥25, 腹囲≥90cm	273	14.4	7	5.9	16	9.4	30	11.2	38	12.1	58	16.7	124	18.3	170	14.4

注) 身長，体重及び腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお，女性は妊婦11名を除外した。

(4年)

(参考) 内臓脂肪型肥満の診断基準：

- BMI 25 以上で，男性のウエスト周囲径 85cm 以上，
女性のウエスト周囲径 90cm 以上を上半身肥満の疑いとする。
- 上半身肥満の疑いと判定され，腹部CT法による内臓脂肪面積 100cm² 以上（男女とも）を内臓脂肪型肥満と診断する。
（日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会，2000 年）

※国民健康・栄養調査の「腹囲」は，「立位のへその高さ」で計測したが，計測位置は「ウエスト周囲径」と同じである。

第21表 薬の服用状況－薬の服用状況，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総 数	2,507	100.0	120	100.0	210	100.0	339	100.0	367	100.0	484	100.0	987	100.0
	使用なし	1,441	57.5	120	100.0	198	94.3	295	87.0	271	73.8	253	52.3	304	30.8
	使用あり(一つ以上)	1,066	42.5	0	0.0	12	5.7	44	13.0	96	26.2	231	47.7	683	69.2
	血圧を下げる薬	799	31.9	0	0.0	6	2.9	31	9.1	59	16.1	156	32.2	547	55.4
	脈の乱れに関する薬	82	3.3	0	0.0	1	0.5	3	0.9	5	1.4	6	1.2	67	6.8
	コレステロールを下げる薬	491	19.6	0	0.0	4	1.9	12	3.5	49	13.4	117	24.2	309	31.3
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	168	6.7	0	0.0	1	0.5	5	1.5	13	3.5	42	8.7	107	10.8
	貧血治療のための薬(鉄剤)	32	1.3	0	0.0	2	1.0	7	2.1	7	1.9	4	0.8	12	1.2
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	211	8.4	0	0.0	3	1.4	6	1.8	16	4.4	48	9.9	138	14.0
男性	総 数	1,119	100.0	52	100.0	99	100.0	142	100.0	151	100.0	225	100.0	450	100.0
	使用なし	605	54.1	52	100.0	93	93.9	119	83.8	100	66.2	105	46.7	136	30.2
	使用あり(一つ以上)	514	45.9	0	0.0	6	6.1	23	16.2	51	33.8	120	53.3	314	69.8
	血圧を下げる薬	397	35.5	0	0.0	5	5.1	19	13.4	31	20.5	86	38.2	256	56.9
	脈の乱れに関する薬	53	4.7	0	0.0	1	1.0	2	1.4	5	3.3	5	2.2	40	8.9
	コレステロールを下げる薬	200	17.9	0	0.0	3	3.0	7	4.9	24	15.9	52	23.1	114	25.3
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	101	9.0	0	0.0	1	1.0	4	2.8	11	7.3	25	11.1	60	13.3
	貧血治療のための薬(鉄剤)	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	3	0.7
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	135	12.1	0	0.0	1	1.0	5	3.5	13	8.6	29	12.9	87	19.3
女性	総 数	1,388	100.0	68	100.0	111	100.0	197	100.0	216	100.0	259	100.0	537	100.0
	使用なし	836	60.2	68	100.0	105	94.6	176	89.3	171	79.2	148	57.1	168	31.3
	使用あり(一つ以上)	552	39.8	0	0.0	6	5.4	21	10.7	45	20.8	111	42.9	369	68.7
	血圧を下げる薬	402	29.0	0	0.0	1	0.9	12	6.1	28	13.0	70	27.0	291	54.2
	脈の乱れに関する薬	29	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	27	5.0
	コレステロールを下げる薬	291	21.0	0	0.0	1	0.9	5	2.5	25	11.6	65	25.1	195	36.3
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	67	4.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.9	17	6.6	47	8.8
	貧血治療のための薬(鉄剤)	27	1.9	0	0.0	2	1.8	7	3.6	5	2.3	4	1.5	9	1.7
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	76	5.5	0	0.0	2	1.8	1	0.5	3	1.4	19	7.3	51	9.5

注1) 血圧を下げる薬、脈の乱れに関する薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬、貧血治療のための薬(鉄剤)、及びインスリン注射又は血糖を下げる薬の服用状況に回答した者を集計対象とした。

(4年)

注2) 複数回答。

注3) 身体状況調査の問診「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「無」と回答した者、(7)に「有」かつ「(7-1) 現在の糖尿病治療の有無(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)」に「無」と回答した者、及び(7)及び(7-1)に「有」かつ「(7-2) 現在の投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)の有無」に「無」と回答した者を、現在の状況を「無」とした。

第22表の1 血圧の状況—年齢階級, 日本高血圧学会による血圧の分類別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数		正常血圧		正常高値血圧		高値血圧		Ⅰ度高血圧		Ⅱ度高血圧		Ⅲ度高血圧		(再掲) (孤立性)収縮期 高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*
総 数	総 数	2,140	100.0	627	29.3	332	15.5	578	27.0	486	22.7	104	4.9	13	0.6	377	17.6
	20-29歳	92	100.0	76	82.6	7	7.6	7	7.6	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1
	30-39歳	163	100.0	99	60.7	13	8.0	38	23.3	12	7.4	0	0.0	1	0.6	4	2.5
	40-49歳	275	100.0	136	49.5	33	12.0	65	23.6	29	10.5	7	2.5	5	1.8	7	2.5
	50-59歳	298	100.0	100	33.6	39	13.1	92	30.9	59	19.8	7	2.3	1	0.3	23	7.7
	60-69歳	417	100.0	91	21.8	72	17.3	131	31.4	98	23.5	23	5.5	2	0.5	72	17.3
	70歳以上	895	100.0	125	14.0	168	18.8	245	27.4	286	32.0	67	7.5	4	0.4	270	30.2
	(再掲) 65-74歳	560	100.0	102	18.2	112	20.0	160	28.6	151	27.0	33	5.9	2	0.4	126	22.5
	(再掲) 75歳以上	565	100.0	64	11.3	102	18.1	160	28.3	188	33.3	49	8.7	2	0.4	187	33.1
男 性	総 数	938	100.0	194	20.7	136	14.5	294	31.3	252	26.9	53	5.7	9	1.0	185	19.7
	20-29歳	37	100.0	25	67.6	5	13.5	6	16.2	1	2.7	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	30-39歳	70	100.0	29	41.4	9	12.9	23	32.9	8	11.4	0	0.0	1	1.4	2	2.9
	40-49歳	112	100.0	34	30.4	14	12.5	43	38.4	13	11.6	5	4.5	3	2.7	2	1.8
	50-59歳	119	100.0	23	19.3	13	10.9	47	39.5	32	26.9	4	3.4	0	0.0	9	7.6
	60-69歳	190	100.0	33	17.4	27	14.2	60	31.6	54	28.4	14	7.4	2	1.1	40	21.1
	70歳以上	410	100.0	50	12.2	68	16.6	115	28.0	144	35.1	30	7.3	3	0.7	131	32.0
	(再掲) 65-74歳	250	100.0	42	16.8	47	18.8	68	27.2	76	30.4	16	6.4	1	0.4	61	24.4
	(再掲) 75歳以上	265	100.0	24	9.1	40	15.1	79	29.8	96	36.2	24	9.1	2	0.8	93	35.1
女 性	総 数	1,202	100.0	433	36.0	196	16.3	284	23.6	234	19.5	51	4.2	4	0.3	192	16.0
	20-29歳	55	100.0	51	92.7	2	3.6	1	1.8	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	93	100.0	70	75.3	4	4.3	15	16.1	4	4.3	0	0.0	0	0.0	2	2.2
	40-49歳	163	100.0	102	62.6	19	11.7	22	13.5	16	9.8	2	1.2	2	1.2	5	3.1
	50-59歳	179	100.0	77	43.0	26	14.5	45	25.1	27	15.1	3	1.7	1	0.6	14	7.8
	60-69歳	227	100.0	58	25.6	45	19.8	71	31.3	44	19.4	9	4.0	0	0.0	32	14.1
	70歳以上	485	100.0	75	15.5	100	20.6	130	26.8	142	29.3	37	7.6	1	0.2	139	28.7
	(再掲) 65-74歳	310	100.0	60	19.4	65	21.0	92	29.7	75	24.2	17	5.5	1	0.3	65	21.0
	(再掲) 75歳以上	300	100.0	40	13.3	62	20.7	81	27.0	92	30.7	25	8.3	0	0.0	94	31.3

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(4年)

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお, 1回しか測定できなかった者については, その値を採用した。

注3) 日本高血圧学会による血圧の分類は p.16 を参照。

* 総数に対する割合

第 22 表の 2 血圧の状況－年齢階級，日本高血圧学会による血圧の分類別，人数，割合－総数・男性・女性，20 歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

		総数		正常血圧		正常高値血圧		高値血圧		Ⅰ度高血圧		Ⅱ度高血圧		Ⅲ度高血圧		(再掲) (孤立性)収縮期 高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*
総 数	総 数	1,435	100.0	548	38.2	214	14.9	351	24.5	262	18.3	52	3.6	8	0.6	177	12.3
	20-29歳	92	100.0	76	82.6	7	7.6	7	7.6	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1
	30-39歳	157	100.0	99	63.1	10	6.4	36	22.9	11	7.0	0	0.0	1	0.6	4	2.5
	40-49歳	250	100.0	131	52.4	31	12.4	60	24.0	21	8.4	3	1.2	4	1.6	6	2.4
	50-59歳	249	100.0	93	37.3	34	13.7	69	27.7	45	18.1	7	2.8	1	0.4	18	7.2
	60-69歳	281	100.0	69	24.6	53	18.9	80	28.5	66	23.5	12	4.3	1	0.4	42	14.9
	70歳以上	406	100.0	80	19.7	79	19.5	99	24.4	117	28.8	30	7.4	1	0.2	106	26.1
	(再掲) 65-74歳	327	100.0	75	22.9	69	21.1	80	24.5	86	26.3	17	5.2	0	0.0	69	21.1
	(再掲) 75歳以上	224	100.0	39	17.4	40	17.9	59	26.3	64	28.6	21	9.4	1	0.4	60	26.8
男 性	総 数	588	100.0	160	27.2	88	15.0	178	30.3	134	22.8	23	3.9	5	0.9	77	13.1
	20-29歳	37	100.0	25	67.6	5	13.5	6	16.2	1	2.7	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	30-39歳	65	100.0	29	44.6	7	10.8	21	32.3	7	10.8	0	0.0	1	1.5	2	3.1
	40-49歳	98	100.0	32	32.7	13	13.3	40	40.8	9	9.2	2	2.0	2	2.0	1	1.0
	50-59歳	94	100.0	21	22.3	11	11.7	35	37.2	23	24.5	4	4.3	0	0.0	6	6.4
	60-69歳	116	100.0	21	18.1	20	17.2	32	27.6	37	31.9	5	4.3	1	0.9	19	16.4
	70歳以上	178	100.0	32	18.0	32	18.0	44	24.7	57	32.0	12	6.7	1	0.6	48	27.0
	(再掲) 65-74歳	138	100.0	27	19.6	31	22.5	29	21.0	43	31.2	8	5.8	0	0.0	30	21.7
	(再掲) 75歳以上	100	100.0	15	15.0	14	14.0	29	29.0	33	33.0	8	8.0	1	1.0	29	29.0
女 性	総 数	847	100.0	388	45.8	126	14.9	173	20.4	128	15.1	29	3.4	3	0.4	100	11.8
	20-29歳	55	100.0	51	92.7	2	3.6	1	1.8	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	92	100.0	70	76.1	3	3.3	15	16.3	4	4.3	0	0.0	0	0.0	2	2.2
	40-49歳	152	100.0	99	65.1	18	11.8	20	13.2	12	7.9	1	0.7	2	1.3	5	3.3
	50-59歳	155	100.0	72	46.5	23	14.8	34	21.9	22	14.2	3	1.9	1	0.6	12	7.7
	60-69歳	165	100.0	48	29.1	33	20.0	48	29.1	29	17.6	7	4.2	0	0.0	23	13.9
	70歳以上	228	100.0	48	21.1	47	20.6	55	24.1	60	26.3	18	7.9	0	0.0	58	25.4
	(再掲) 65-74歳	189	100.0	48	25.4	38	20.1	51	27.0	43	22.8	9	4.8	0	0.0	39	20.6
	(再掲) 75歳以上	124	100.0	24	19.4	26	21.0	30	24.2	31	25.0	13	10.5	0	0.0	31	25.0

注 1) 血圧の測定を行い，身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した 20 歳以上の者を集計対象とした。

(4 年)

注 2) 数値は 2 回の測定値の平均値を用いた。なお，1 回しか測定できなかった者については，その値を採用した。

注 3) 日本高血圧学会による血圧の分類は p.16 を参照。

* 総数に対する割合

第23表の2 収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の平均値及び標準偏差一年齢階級別，人数，平均値，標準偏差一総数・男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用を含む〕
(mmHg)

	総 数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 40歳以上			(再掲) 40－89歳			
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	
総 数	収縮期(最高)血圧	2,140	128.1	17.7	92	108.7	10.1	163	113.7	14.2	275	119.4	16.5	298	124.8	16.6	417	130.7	15.6	895	135.2	16.1	1,885	130.3	17.1	1,854	130.2	17.1
	拡張期(最低)血圧	2,140	75.9	10.7	92	68.9	7.7	163	73.0	10.7	275	76.5	11.6	298	78.8	10.5	417	77.3	10.1	895	75.2	10.6	1,885	76.4	10.7	1,854	76.4	10.7
男	収縮期(最高)血圧	938	131.4	16.5	37	114.1	11.1	70	120.9	12.8	112	123.8	15.6	119	128.7	15	190	133.3	15.4	410	136.7	15.8	831	133.0	16.2	818	132.9	16.2
性	拡張期(最低)血圧	938	78.0	10.6	37	70.5	7.9	70	77.8	9.1	112	80.4	11.8	119	82.4	9.5	190	79.5	9.8	410	76.1	10.6	831	78.4	10.7	818	78.4	10.7
女	収縮期(最高)血圧	1,202	125.5	18.3	55	105.2	7.7	93	108.2	12.7	163	116.3	16.4	179	122.1	17.2	227	128.5	15.4	485	134.0	16.3	1,054	128.1	17.6	1,036	128.0	17.6
性	拡張期(最低)血圧	1,202	74.2	10.5	55	67.9	7.4	93	69.4	10.4	163	73.9	10.8	179	76.5	10.4	227	75.5	10	485	74.4	10.5	1,054	74.9	10.5	1,036	74.9	10.4

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。
注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお，1回しか測定できなかった者については，その値を採用した。

※年齢調整した，収縮期（最高）血圧の平均値（20歳以上）は，総数1230mmHg，男性1270mmHg，女性1201mmHg。
年齢調整値は，平成22年国勢調査による基準人口（20-29歳，30-39歳，40-49歳，50-59歳，60-69歳，70歳以上の6区分）を用いて算出した。

（4年）

第23表の4 収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の平均値及び標準偏差一年齢階級別、人数、平均値、標準偏差一総数・男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

(mmHg)

			総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40歳以上		(再掲) 40－89歳	
			人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	収縮期(最高)血圧		1,435	124.4	17.8	92	108.7	10.1	157	113.1	14.0	250	118.0	15.8	249	123.4	17.1	281	129.6	16.2
	拡張期(最低)血圧		1,435	75.6	10.7	92	68.9	7.7	157	72.7	10.7	250	75.5	10.9	249	78.4	10.7	281	77.2	10.0
男	収縮期(最高)血圧		588	128.3	16.5	37	114.1	11.1	65	120.2	12.6	98	122.0	14.4	94	127.4	15.8	116	132.9	15.7
	拡張期(最低)血圧		588	78.3	10.4	37	70.5	7.9	65	77.4	9.2	98	79.3	10.7	94	82.3	9.7	116	79.7	9.6
女	収縮期(最高)血圧		847	121.7	18.3	55	105.2	7.7	92	108.1	12.7	152	115.4	16.1	155	120.9	17.5	165	127.3	16.2
	拡張期(最低)血圧		847	73.8	10.6	55	67.9	7.4	92	69.3	10.4	152	73.1	10.4	155	76.0	10.6	165	75.4	9.9

注1) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

(4年)

第 25 表の 1 赤血球数の分布－赤血球数の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	884	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	180	100.0	383	100.0	234	100.0	249	100.0
	400万個/mm ³ 未満	76	8.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	6	3.3	68	17.8	20	8.5	51	20.5
	400－449	193	21.8	0	0.0	5	7.6	6	5.7	13	11.4	39	21.7	130	33.9	65	27.8	89	35.7
	450－499	353	39.9	11	31.4	22	33.3	52	49.1	56	49.1	82	45.6	130	33.9	95	40.6	76	30.5
	500－549	217	24.5	15	42.9	28	42.4	38	35.8	41	36.0	46	25.6	49	12.8	47	20.1	31	12.4
	550－599	38	4.3	8	22.9	10	15.2	7	6.6	2	1.8	6	3.3	5	1.3	6	2.6	2	0.8
	600－649	6	0.7	0	0.0	1	1.5	2	1.9	1	0.9	1	0.6	1	0.3	1	0.4	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	1	0.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女 性	総 数	1,113	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	214	100.0	431	100.0	281	100.0	268	100.0
	400万個/mm ³ 未満	183	16.4	8	16.3	7	7.9	21	13.4	15	8.7	27	12.6	105	24.4	48	17.1	78	29.1
	400－449	554	49.8	19	38.8	46	51.7	71	45.2	87	50.3	123	57.5	208	48.3	156	55.5	114	42.5
	450－499	329	29.6	18	36.7	32	36.0	59	37.6	60	34.7	56	26.2	104	24.1	68	24.2	68	25.4
	500－549	45	4.0	4	8.2	4	4.5	6	3.8	11	6.4	8	3.7	12	2.8	8	2.8	7	2.6
	550－599	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.4	1	0.4
	600－649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 赤血球数の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 25 表の 2 赤血球数の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上

	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	884	471.9	53.2	35	528.7	44.9	66	510.6	38.5	106	495.9	38.1	114	488.9	37.3	180	478.1	42.7	383	445.5	54.1	234	465.2	49.8	249	439.8	53.8
女性	1,113	434.5	40.0	49	443.4	40.0	89	444.0	32.2	157	440.5	34.0	173	445.1	35.2	214	435.0	33.5	431	424.9	45.7	281	431.7	35.8	268	420.7	49.8

注) 赤血球数の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 26 表の 1 ヘマトクリット値の分布－ヘマトクリット値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	884	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	180	100.0	383	100.0	234	100.0	249	100.0
	25.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4
	25.0－29.9	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	2	0.9	2	0.8
	30.0－34.9	15	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	14	3.7	2	0.9	12	4.8
	35.0－39.9	79	8.9	0	0.0	1	1.5	1	0.9	3	2.6	8	4.4	66	17.2	24	10.3	49	19.7
	40.0－44.9	355	40.2	9	25.7	21	31.8	41	38.7	42	36.8	71	39.4	171	44.6	93	39.7	116	46.6
	45.0－49.9	378	42.8	17	48.6	40	60.6	54	50.9	65	57.0	86	47.8	116	30.3	102	43.6	62	24.9
	50.0－54.9	50	5.7	9	25.7	4	6.1	10	9.4	4	3.5	14	7.8	9	2.3	9	3.8	7	2.8
	55.0%以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.9	0	0.0
	(再掲)39.8未満	94	10.6	0	0.0	1	1.5	1	0.9	2	1.8	7	3.9	83	21.7	25	10.7	63	25.3
女 性	(再掲)51.9以上	17	1.9	1	2.9	1	1.5	4	3.8	3	2.6	6	3.3	2	0.5	5	2.1	0	0.0
	総 数	1,113	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	214	100.0	431	100.0	281	100.0	268	100.0
	25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0－29.9	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	6	1.4	0	0.0	6	2.2
	30.0－34.9	66	5.9	2	4.1	9	10.1	13	8.3	7	4.0	3	1.4	32	7.4	6	2.1	28	10.4
	35.0－39.9	375	33.7	23	46.9	32	36.0	67	42.7	51	29.5	67	31.3	135	31.3	89	31.7	85	31.7
	40.0－44.9	567	50.9	20	40.8	47	52.8	69	43.9	90	52.0	120	56.1	221	51.3	159	56.6	125	46.6
	45.0－49.9	95	8.5	4	8.2	1	1.1	8	5.1	23	13.3	23	10.7	36	8.4	25	8.9	24	9.0
	50.0－54.9	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	1	0.2	2	0.7	0	0.0
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	36	3.2	1	2.0	6	6.7	7	4.5	4	2.3	0	0.0	18	4.2	1	0.4	17	6.3
	(再掲)45.0以上	98	8.8	4	8.2	1	1.1	8	5.1	24	13.9	24	11.2	37	8.6	27	9.6	24	9.0

注) ヘマトクリット値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 26 表の 2 ヘマトクリット値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上

	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	884	44.5	4.0	35	47.5	2.6	66	46.3	2.7	106	45.9	3.0	114	45.6	2.9	180	45.3	3.3	383	42.8	4.5	234	44.5	4.1	249	42.3	4.4
女性	1,113	40.5	3.5	49	40.3	3.4	89	39.6	3.3	157	39.8	3.4	173	41.1	3.5	214	41.2	2.9	431	40.4	3.7	281	41.0	2.9	268	40.0	4.1

注) ヘマトクリット値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 29 表の 1 平均赤血球血色素濃度（MCHC）の分布－平均赤血球血色素濃度の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	884	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	180	100.0	383	100.0	234	100.0	249	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22－24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24－26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26－28未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0
	28－30未満	5	0.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	3	0.8	1	0.4	2	0.8
	30－32未満	155	17.5	2	5.7	4	6.1	13	12.3	15	13.2	36	20.0	85	22.2	47	20.1	56	22.5
	32－34未満	608	68.8	22	62.9	43	65.2	71	67.0	79	69.3	127	70.6	266	69.5	166	70.9	171	68.7
女 性	34%以上	115	13.0	10	28.6	19	28.8	22	20.8	19	16.7	17	9.4	28	7.3	19	8.1	20	8.0
	総 数	1,113	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	214	100.0	431	100.0	281	100.0	268	100.0
	22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	22－24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	24－26未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	26－28未満	4	0.4	0	0.0	1	1.1	1	0.6	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	28－30未満	39	3.5	2	4.1	5	5.6	10	6.4	5	2.9	5	2.3	12	2.8	4	1.4	9	3.4
	30－32未満	376	33.8	11	22.4	24	27.0	50	31.8	49	28.3	74	34.6	168	39.0	109	38.8	105	39.2
	32－34未満	667	59.9	34	69.4	54	60.7	90	57.3	115	66.5	130	60.7	244	56.6	164	58.4	150	56.0
	34%以上	26	2.3	2	4.1	5	5.6	6	3.8	1	0.6	5	2.3	7	1.6	4	1.4	4	1.5

注) 血色素量及びヘマトクリット値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 29 表の 2 平均赤血球血色素濃度（MCHC）の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上

	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲)65－74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	884	32.9	1.1	35	33.4	1.1	66	33.5	1.0	106	33.2	1.1	114	32.9	1.1	180	32.9	1.0	383	32.7	1.0	234	32.8	1.0	249	32.7	1.0
女性	1,113	32.2	1.1	49	32.5	1.1	89	32.2	1.4	157	32.2	1.3	173	32.1	1.3	214	32.2	1.0	431	32.1	0.9	281	32.1	0.9	268	32.1	1.0

注) 血色素量及びヘマトクリット値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 30 表の 1 血清総たんぱく質値の分布－血清総たんぱく質値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75－79歳		(再掲) 80歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	887	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	181	100.0	385	100.0	235	100.0	115	100.0	135	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0－6.4	15	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.8	10	2.6	3	1.3	5	4.3	2	1.5
	6.5－6.9	137	15.4	2	5.7	7	10.6	14	13.2	13	11.4	35	19.3	66	17.1	52	22.1	21	18.3	12	8.9
	7.0－7.4	421	47.5	11	31.4	25	37.9	51	48.1	56	49.1	88	48.6	190	49.4	110	46.8	53	46.1	78	57.8
	7.5－7.9	251	28.3	15	42.9	28	42.4	33	31.1	40	35.1	41	22.7	94	24.4	52	22.1	28	24.3	36	26.7
	8.0－8.4	57	6.4	7	20.0	6	9.1	8	7.5	5	4.4	10	5.5	21	5.5	17	7.2	6	5.2	6	4.4
	8.5g/dL以上	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	4	1.0	1	0.4	2	1.7	1	0.7
女 性	(再掲)6.5未満	15	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.8	10	2.6	3	1.3	5	4.3	2	1.5
	総 数	1,120	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	215	100.0	437	100.0	284	100.0	126	100.0	146	100.0
	6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6.0－6.4	15	1.3	0	0.0	0	0.0	3	1.9	2	1.2	2	0.9	8	1.8	2	0.7	5	4.0	1	0.7
	6.5－6.9	211	18.8	6	12.2	10	11.2	26	16.6	26	15	47	21.9	96	22.0	69	24.3	24	19.0	37	25.3
	7.0－7.4	494	44.1	18	36.7	39	43.8	77	49.0	82	47.4	90	41.9	188	43.0	115	40.5	55	43.7	60	41.1
	7.5－7.9	319	28.5	18	36.7	33	37.1	49	31.2	50	28.9	61	28.4	108	24.7	75	26.4	31	24.6	37	25.3
	8.0－8.4	76	6.8	7	14.3	6	6.7	2	1.3	13	7.5	15	7.0	33	7.6	22	7.7	10	7.9	9	6.2
	8.5g/dL以上	5	0.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9	1	0.4	1	0.8	2	1.4
	(再掲)6.5未満	15	1.3	0	0.0	0	0.0	3	1.9	2	1.2	2	0.9	8	1.8	2	0.7	5	4.0	1	0.7

注) 血清総たんぱく質値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 30 表の 2 血清総たんぱく質値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上

	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲)65－74歳			(再掲)75－79歳			(再掲)80歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	887	7.3	0.4	35	7.6	0.4	66	7.5	0.4	106	7.4	0.4	114	7.3	0.3	181	7.3	0.4	385	7.3	0.4	235	7.3	0.4	115	7.3	0.5	135	7.3	0.4
女性	1,120	7.3	0.4	49	7.5	0.4	89	7.4	0.4	157	7.3	0.4	173	7.3	0.4	215	7.3	0.4	437	7.3	0.4	284	7.3	0.4	126	7.3	0.5	146	7.3	0.4

注) 血清総たんぱく質値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第31表の1 血清アルブミン値の分布－血清アルブミン値の区分，年齢階級別，人数，割合－
男性・女性，20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	887	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	181	100.0	385	100.0	235	100.0	115	100.0	135	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	0.8	1	0.4	0	0.0	2	1.5
	3.4-3.5	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	0	0.0	3	2.6	1	0.7
	3.6-3.7	13	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	12	3.1	6	2.6	1	0.9	5	3.7
	3.8-3.9	60	6.8	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	1.8	11	6.1	46	11.9	19	8.1	9	7.8	25	18.5
	4.0-4.1	114	12.9	0	0.0	0	0.0	4	3.8	9	7.9	16	8.8	85	22.1	34	14.5	21	18.3	39	28.9
	4.2-4.3	181	20.4	0	0.0	2	3.0	18	17.0	17	14.9	41	22.7	103	26.8	56	23.8	40	34.8	28	20.7
	4.4-4.5	210	23.7	3	8.6	15	22.7	28	26.4	27	23.7	59	32.6	78	20.3	70	29.8	22	19.1	20	14.8
	4.6-4.7	156	17.6	5	14.3	17	25.8	33	31.1	33	28.9	32	17.7	36	9.4	27	11.5	15	13.0	10	7.4
	4.8-4.9	88	9.9	13	37.1	17	25.8	14	13.2	16	14.0	16	8.8	12	3.1	15	6.4	2	1.7	5	3.7
	5.0-5.1	51	5.7	12	34.3	13	19.7	8	7.5	7	6.1	5	2.8	6	1.6	7	3.0	2	1.7	0	0.0
	5.2g/dL以上	6	0.7	2	5.7	1	1.5	1	0.9	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)3.5以下	8	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	7	1.8	1	0.4	3	2.6	3	2.2
女性	総数	1,120	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	215	100.0	437	100.0	284	100.0	126	100.0	146	100.0
	3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	2	0.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	3.4-3.5	7	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	1	0.5	4	0.9	0	0.0	0	0.0	4	2.7
	3.6-3.7	21	1.9	1	2.0	0	0.0	3	1.9	1	0.6	0	0.0	16	3.7	2	0.7	2	1.6	12	8.2
	3.8-3.9	61	5.4	0	0.0	4	4.5	5	3.2	5	2.9	5	2.3	42	9.6	14	4.9	12	9.5	19	13.0
	4.0-4.1	169	15.1	4	8.2	4	4.5	19	12.1	21	12.1	33	15.3	88	20.1	48	16.9	20	15.9	40	27.4
	4.2-4.3	272	24.3	2	4.1	12	13.5	43	27.4	46	26.6	56	26.0	113	25.9	73	25.7	34	27.0	34	23.3
	4.4-4.5	313	27.9	11	22.4	32	36.0	44	28.0	61	35.3	61	28.4	104	23.8	85	29.9	30	23.8	28	19.2
	4.6-4.7	178	15.9	19	38.8	20	22.5	32	20.4	26	15.0	37	17.2	44	10.1	41	14.4	18	14.3	4	2.7
	4.8-4.9	73	6.5	7	14.3	13	14.6	7	4.5	8	4.6	18	8.4	20	4.6	17	6.0	9	7.1	3	2.1
	5.0-5.1	19	1.7	4	8.2	3	3.4	3	1.9	3	1.7	3	1.4	3	0.7	2	0.7	0	0.0	2	1.4
	5.2g/dL以上	5	0.4	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	2	0.5	1	0.4	1	0.8	0	0.0
	(再掲)3.5以下	9	0.8	0	0.0	1	1.1	1	0.6	1	0.6	1	0.5	5	1.1	1	0.4	0	0.0	4	2.7

注) 血清アルブミン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(4年)

第31表の2 血清アルブミン値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－
男性・女性，20歳以上

(g/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75-79歳			(再掲) 80歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	887	4.4	0.3	35	4.9	0.2	66	4.7	0.3	106	4.6	0.2	114	4.5	0.3	181	4.4	0.3	385	4.2	0.3	235	4.3	0.3	115	4.3	0.3	135	4.2	0.3
女性	1,120	4.4	0.3	49	4.6	0.3	89	4.5	0.3	157	4.4	0.3	173	4.4	0.3	215	4.4	0.3	437	4.3	0.3	284	4.3	0.3	126	4.3	0.3	146	4.1	0.3

注) 血清アルブミン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(4年)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女 性	総 数	1,114	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	214	100.0	432	100.0	282	100.0	268	100.0
	4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	5	0.4	1	2.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.5	0	0.0	2	0.7
	4.7-4.8	21	1.9	3	6.1	2	2.2	6	3.8	3	1.7	3	1.4	4	0.9	2	0.7	3	1.1
	4.9-5.0	81	7.3	16	32.7	19	21.3	18	11.5	11	6.4	7	3.3	10	2.3	13	4.6	3	1.1
	5.1-5.2	185	16.6	10	20.4	20	22.5	50	31.8	32	18.5	29	13.6	44	10.2	35	12.4	22	8.2
	5.3	121	10.9	10	20.4	14	15.7	16	10.2	23	13.3	23	10.7	35	8.1	29	10.3	21	7.8
	5.4	126	11.3	4	8.2	13	14.6	17	10.8	24	13.9	21	9.8	47	10.9	27	9.6	30	11.2
	5.5	136	12.2	3	6.1	9	10.1	18	11.5	17	9.8	30	14.0	59	13.7	32	11.3	40	14.9
	5.6	101	9.1	1	2.0	4	4.5	11	7.0	23	13.3	21	9.8	41	9.5	23	8.2	27	10.1
	5.7	90	8.1	1	2.0	3	3.4	5	3.2	17	9.8	19	8.9	45	10.4	30	10.6	29	10.8
	5.8	57	5.1	0	0.0	0	0.0	5	3.2	9	5.2	16	7.5	27	6.3	20	7.1	14	5.2
	5.9	44	3.9	0	0.0	0	0.0	3	1.9	3	1.7	11	5.1	27	6.3	18	6.4	14	5.2
	6.0	34	3.1	0	0.0	0	0.0	4	2.5	5	2.9	8	3.7	17	3.9	10	3.5	13	4.9
	6.1	18	1.6	0	0.0	1	1.1	1	0.6	0	0.0	5	2.3	11	2.5	7	2.5	6	2.2
	6.2	13	1.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	0.9	10	2.3	4	1.4	8	3.0
	6.3	8	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.4	4	0.9	5	1.8	1	0.4
	6.4	10	0.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.6	3	1.4	5	1.2	2	0.7	5	1.9
	6.5	11	1.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	9	2.1	3	1.1	7	2.6
	6.6-6.7	9	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	4	1.9	4	0.9	5	1.8	3	1.1
	6.8-6.9	12	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4	9	2.1	5	1.8	7	2.6
	7.0-7.1	11	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	9	2.1	5	1.8	5	1.9
	7.2-7.3	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	3	0.7	3	1.1	2	0.7
	7.4-7.5	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	1	0.4	2	0.7
	7.6-7.7	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.4	1	0.4
	7.8-7.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	8.0-8.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0
	8.2-8.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	8.4-8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.6-8.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.8-8.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.2-9.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0
	9.4以上	4	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4

注) ヘモグロビン A1c (NGSP) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(4年)

第32表の2 ヘモグロビン A1c (NGSP) の平均値及び標準偏差一年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—総数・男性・女性, 20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

(%)

	総数				20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	1,997	5.6	0.7		84	5.1	0.2	155	5.3	0.3	263	5.4	0.7	287	5.6	0.8	394	5.6	0.6	814	5.8	0.7	516	5.7	0.7	516	5.8	0.6
男性	883	5.7	0.7		35	5.1	0.2	66	5.3	0.3	106	5.5	0.6	114	5.7	0.7	180	5.7	0.7	382	5.8	0.7	234	5.8	0.8	248	5.9	0.7
女性	1,114	5.6	0.6		49	5.1	0.2	89	5.3	0.3	157	5.4	0.7	173	5.5	0.9	214	5.6	0.5	432	5.7	0.6	282	5.7	0.6	268	5.7	0.6

注) ヘモグロビン A1c (NGSP) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(4年)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女 性	総 数	1,057	100.0	49	100.0	87	100.0	156	100.0	171	100.0	199	100.0	395	100.0	261	100.0	240	100.0
	4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	5	0.5	1	2.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.5	0	0.0	2	0.8
	4.7-4.8	21	2.0	3	6.1	2	2.3	6	3.8	3	1.8	3	1.5	4	1.0	2	0.8	3	1.3
	4.9-5.0	81	7.7	16	32.7	19	21.8	18	11.5	11	6.4	7	3.5	10	2.5	13	5.0	3	1.3
	5.1-5.2	185	17.5	10	20.4	20	23.0	50	32.1	32	18.7	29	14.6	44	11.1	35	13.4	22	9.2
	5.3	120	11.4	10	20.4	14	16.1	16	10.3	23	13.5	23	11.6	34	8.6	29	11.1	20	8.3
	5.4	125	11.8	4	8.2	13	14.9	17	10.9	24	14.0	21	10.6	46	11.6	27	10.3	29	12.1
	5.5	136	12.9	3	6.1	9	10.3	18	11.5	17	9.9	30	15.1	59	14.9	32	12.3	40	16.7
	5.6	101	9.6	1	2.0	4	4.6	11	7.1	23	13.5	21	10.6	41	10.4	23	8.8	27	11.3
	5.7	89	8.4	1	2.0	3	3.4	5	3.2	17	9.9	19	9.5	44	11.1	30	11.5	28	11.7
	5.8	55	5.2	0	0.0	0	0.0	5	3.2	9	5.3	16	8.0	25	6.3	20	7.7	12	5.0
	5.9	40	3.8	0	0.0	0	0.0	3	1.9	3	1.8	11	5.5	23	5.8	17	6.5	11	4.6
	6.0	31	2.9	0	0.0	0	0.0	4	2.6	5	2.9	7	3.5	15	3.8	8	3.1	12	5.0
	6.1	15	1.4	0	0.0	1	1.1	1	0.6	0	0.0	4	2.0	9	2.3	6	2.3	5	2.1
	6.2	12	1.1	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.0	9	2.3	4	1.5	7	2.9
	6.3	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	3	0.8	4	1.5	0	0.0
	6.4	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.4
	6.5	8	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	7	1.8	2	0.8	6	2.5
	6.6-6.7	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	3	0.8	3	1.1	2	0.8
	6.8-6.9	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.5	1	0.4	5	2.1
	7.0-7.1	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	2	0.8	2	0.8
	7.2-7.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	0.8
	7.4-7.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0
	7.6-7.7	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.4	1	0.4
	7.8-7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0-8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.2-8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.4-8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.6-8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.8-8.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.2-9.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0
	9.4以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注1) ヘモグロビン A1c (NGSP) の測定を行い、身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用を「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(4年)

注2) 「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用」の判定は p.6 参照。

第32表の4 ヘモグロビン A1c (NGSP) の平均値及び標準偏差一年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—総数・男性・女性、20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用除者〕

(%)

	総数				20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	1,825	5.5	0.5		84	5.1	0.2	153	5.3	0.3	257	5.4	0.5	274	5.5	0.8	357	5.5	0.4	700	5.6	0.5	457	5.6	0.4	438	5.6	0.5
男性	768	5.5	0.4		35	5.1	0.2	66	5.3	0.3	101	5.4	0.3	103	5.5	0.6	158	5.5	0.4	305	5.6	0.5	196	5.5	0.4	198	5.6	0.5
女性	1,057	5.5	0.6		49	5.1	0.2	87	5.3	0.3	156	5.4	0.7	171	5.5	0.9	199	5.5	0.3	395	5.6	0.5	261	5.6	0.5	240	5.6	0.5

注1) ヘモグロビン A1c (NGSP) の測定を行い、身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用を「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(4年)

注2) 「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用」の判定は p.6 参照。

第 33 表の 1 血糖値の分布－血糖値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上
〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	687	100.0	30	100.0	48	100.0	84	100.0	95	100.0	138	100.0	292	100.0	179	100.0	189	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40－59	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	1.1	0	0.0
	60－79	36	5.2	5	16.7	4	8.3	5	6.0	5	5.3	6	4.3	11	3.8	7	3.9	7	3.7
	80－99	350	50.9	20	66.7	39	81.3	60	71.4	57	60.0	71	51.4	103	35.3	80	44.7	63	33.3
	100－119	188	27.4	5	16.7	4	8.3	13	15.5	24	25.3	46	33.3	96	32.9	60	33.5	63	33.3
	120－139	61	8.9	0	0.0	1	2.1	4	4.8	6	6.3	6	4.3	44	15.1	14	7.8	32	16.9
	140－159	23	3.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	5	3.6	17	5.8	7	3.9	13	6.9
	160－179	9	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	3	2.2	5	1.7	2	1.1	4	2.1
	180－199	7	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	6	2.1	4	2.2	2	1.1
	200－219	5	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.7	2	1.1	3	1.6
	220－239	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.7	1	0.3	0	0.0	1	0.5
	240－259	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5
	260mg/dL以上	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.3	1	0.6	0	0.0
	(再掲)110以上	174	25.3	0	0.0	2	4.2	6	7.1	11	11.6	35	25.4	120	41.1	56	31.3	83	43.9
女 性	総 数	793	100.0	33	100.0	62	100.0	116	100.0	131	100.0	152	100.0	299	100.0	203	100.0	184	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40－59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60－79	41	5.2	5	15.2	6	9.7	10	8.6	6	4.6	9	5.9	5	1.7	6	3.0	3	1.6
	80－99	438	55.2	25	75.8	46	74.2	85	73.3	86	65.6	83	54.6	113	37.8	89	43.8	65	35.3
	100－119	223	28.1	3	9.1	9	14.5	17	14.7	31	23.7	47	30.9	116	38.8	72	35.5	77	41.8
	120－139	47	5.9	0	0.0	0	0.0	2	1.7	6	4.6	8	5.3	31	10.4	20	9.9	17	9.2
	140－159	23	2.9	0	0.0	1	1.6	1	0.9	0	0.0	3	2.0	18	6.0	8	3.9	12	6.5
	160－179	7	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.3	2	1.0	5	2.7
	180－199	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	0.7	2	1.0	1	0.5
	200－219	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.5	1	0.5
	220－239	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.3	2	1.0	2	1.1
	240－259	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.3	1	0.5	1	0.5
	260mg/dL以上	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)110以上	148	18.7	1	3.0	4	6.5	5	4.3	9	6.9	23	15.1	106	35.5	57	28.1	67	36.4

注) 血糖値の測定を行った 20 歳以上の者のうち，血液採取が食後 3 時間以降に行われた者を集計対象とした。

(4 年)

第 33 表の 2 血糖値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，
20 歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	687	103.5	26.5	30	88.0	10.4	48	91.6	9.5	84	94.9	14.2	95	99.6	30.2	138	101.8	21.5	292	111.7	30.3	179	106.3	28.0	189	112.2	28.7
女性	793	101.4	26.6	33	87.3	8.2	62	91.2	12.1	116	93.1	16.1	131	99.0	39.3	152	99.8	19.7	299	110.2	26.9	203	106.7	25.5	184	110.6	26.9

注) 血糖値の測定を行った 20 歳以上の者のうち，血液採取が食後 3 時間以降に行われた者を集計対象とした。

(4 年)

第33表の3 血糖値の分布－血糖値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	608	100.0	30	100.0	48	100.0	81	100.0	87	100.0	122	100.0	240	100.0	149	100.0	159	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40－59	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.7	0	0.0
	60－79	36	5.9	5	16.7	4	8.3	5	6.2	5	5.7	6	4.9	11	4.6	7	4.7	7	4.4
	80－99	339	55.8	20	66.7	39	81.3	59	72.8	56	64.4	66	54.1	99	41.3	76	51.0	61	38.4
	100－119	169	27.8	5	16.7	4	8.3	12	14.8	22	25.3	42	34.4	84	35.0	53	35.6	57	35.8
	120－139	43	7.1	0	0.0	1	2.1	3	3.7	3	3.4	4	3.3	32	13.3	8	5.4	24	15.1
	140－159	11	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	1.6	8	3.3	3	2.0	6	3.8
	160－179	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.8	2	0.8	0	0.0	2	1.3
	180－199	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	0.7	1	0.6
	200－219	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220－239	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.4	0	0.0	1	0.6
	240－259	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260mg/dL以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)110以上	119	19.6	0	0.0	2	4.2	5	6.2	6	6.9	27	22.1	79	32.9	35	23.5	58	36.5
女 性	総 数	761	100.0	33	100.0	61	100.0	116	100.0	131	100.0	143	100.0	277	100.0	189	100.0	168	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40－59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60－79	41	5.4	5	15.2	6	9.8	10	8.6	6	4.6	9	6.3	5	1.8	6	3.2	3	1.8
	80－99	434	57.0	25	75.8	46	75.4	85	73.3	86	65.6	82	57.3	110	39.7	88	46.6	63	37.5
	100－119	212	27.9	3	9.1	8	13.1	17	14.7	31	23.7	42	29.4	111	40.1	66	34.9	73	43.5
	120－139	41	5.4	0	0.0	0	0.0	2	1.7	6	4.6	7	4.9	26	9.4	18	9.5	13	7.7
	140－159	22	2.9	0	0.0	1	1.6	1	0.9	0	0.0	3	2.1	17	6.1	8	4.2	11	6.5
	160－179	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0
	180－199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.6
	200－219	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.5	1	0.6
	220－239	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	1	0.5	2	1.2
	240－259	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.6
	260mg/dL以上	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)110以上	126	16.6	1	3.0	3	4.9	5	4.3	9	6.9	19	13.3	89	32.1	48	25.4	55	32.7

注1) 血糖値の測定を行った20歳以上の者のうち，血液採取を食後3時間以降に行い，かつ身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用について「無」と回答した者を集計対象とした。(4年)

注2) 「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用」の判定は p.6 参照。

第33表の4 血糖値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	608	99.2	20.3	30	88.0	10.4	48	91.6	9.5	81	94.5	14.0	87	96.1	25.7	122	99.4	19.4	240	104.6	21.2	149	99.8	17.1	159	106.1	21.8
女性	761	99.9	24.9	33	87.3	8.2	61	90.8	11.8	116	93.1	16.1	131	99.0	39.3	143	97.7	14.0	277	107.8	24.7	189	103.9	20.2	168	108.4	25.7

注1) 血糖値の測定を行った20歳以上の者のうち，血液採取を食後3時間以降に行い，かつ身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用について「無」と回答した者を集計対象とした。(4年)

注2) 「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用」の判定は p.6 参照。

第 34 表の 1 血清総コレステロール値の分布－血清総コレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－79歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	887	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	181	100.0	385	100.0	651	100.0	235	100.0	250	100.0
	120mg/dL未満	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	5	1.3	2	0.3	1	0.4	4	1.6
	120－139	24	2.7	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	3	1.7	20	5.2	15	2.3	8	3.4	13	5.2
	140－159	80	9.0	9	25.7	8	12.1	2	1.9	7	6.1	14	7.7	40	10.4	45	6.9	19	8.1	28	11.2
	160－179	140	15.8	5	14.3	16	24.2	12	11.3	9	7.9	21	11.6	77	20.0	86	13.2	39	16.6	54	21.6
	180－199	184	20.7	6	17.1	9	13.6	13	12.3	19	16.7	42	23.2	95	24.7	143	22.0	58	24.7	61	24.4
	200－219	213	24.0	11	31.4	16	24.2	33	31.1	27	23.7	47	26.0	79	20.5	162	24.9	47	20.0	51	20.4
	220－239	121	13.6	3	8.6	7	10.6	20	18.9	21	18.4	24	13.3	46	11.9	97	14.9	36	15.3	25	10.0
	240－259	70	7.9	0	0.0	5	7.6	16	15.1	16	14.0	18	9.9	15	3.9	58	8.9	16	6.8	10	4.0
	260－279	33	3.7	1	2.9	2	3.0	5	4.7	8	7.0	9	5.0	8	2.1	29	4.5	8	3.4	4	1.6
	280－299	6	0.7	0	0.0	1	1.5	3	2.8	1	0.9	1	0.6	0	0.0	5	0.8	1	0.4	0	0.0
	300mg/dL以上	10	1.1	0	0.0	1	1.5	2	1.9	5	4.4	2	1.1	0	0.0	9	1.4	2	0.9	0	0.0
女 性	総 数	1,120	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	215	100.0	437	100.0	836	100.0	284	100.0	272	100.0
	120mg/dL未満	1	0.1	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120－139	9	0.8	2	4.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.4	3	0.4	0	0.0	6	2.2
	140－159	54	4.8	10	20.4	8	9.0	7	4.5	2	1.2	2	0.9	25	5.7	21	2.5	4	1.4	22	8.1
	160－179	138	12.3	14	28.6	25	28.1	24	15.3	10	5.8	18	8.4	47	10.8	76	9.1	26	9.2	34	12.5
	180－199	195	17.4	7	14.3	25	28.1	30	19.1	23	13.3	25	11.6	85	19.5	135	16.1	46	16.2	54	19.9
	200－219	239	21.3	10	20.4	17	19.1	36	22.9	32	18.5	54	25.1	90	20.6	181	21.7	62	21.8	60	22.1
	220－239	206	18.4	2	4.1	10	11.2	33	21.0	39	22.5	41	19.1	81	18.5	168	20.1	55	19.4	47	17.3
	240－259	143	12.8	2	4.1	2	2.2	15	9.6	36	20.8	33	15.3	55	12.6	129	15.4	49	17.3	23	8.5
	260－279	80	7.1	1	2.0	0	0.0	8	5.1	19	11.0	24	11.2	28	6.4	74	8.9	25	8.8	12	4.4
	280－299	30	2.7	0	0.0	1	1.1	1	0.6	5	2.9	16	7.4	7	1.6	27	3.2	12	4.2	5	1.8
	300mg/dL以上	25	2.2	0	0.0	0	0.0	3	1.9	7	4.0	2	0.9	13	3.0	22	2.6	5	1.8	9	3.3

注) 血清総コレステロール値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)
 ※年齢調整した，血清総コレステロール 240mg/dL 以上の者（20 歳以上）の割合は，男性 14.9%，女性 21.1%。
 年齢調整値は，平成 22 年国勢調査による基準人口（20-29 歳，30-39 歳，40-49 歳，50-59 歳，60-69 歳，70 歳以上の 6 区分）を用いて算出した。

第 34 表の 2 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

		総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 40－79歳			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男 性		887	200.6	36.0	35	187.7	31.9	66	198.4	38.8	106	217.7	33.0	114	217.4	39.0	181	206.3	33.9	385	189.7	32.4	651	204.8	35.2	235	198.7	34.2	250	187.9	32.2
女 性		1,120	215.8	39.2	49	182.1	33.2	89	191.0	27.5	157	210.4	34.9	173	232.3	42.1	215	227.2	35.7	437	214.4	38.5	836	222.5	38.2	284	223.6	35.1	272	208.9	39.9

注) 血清総コレステロール値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第34表の3 血清総コレステロール値の分布－血清総コレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－79歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	697	100.0	35	100.0	63	100.0	99	100.0	93	100.0	132	100.0	275	100.0	497	100.0	171	100.0	178	100.0
	120mg/dL未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.6
	120－139	19	2.7	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	3	2.3	15	5.5	12	2.4	6	3.5	10	5.6
	140－159	56	8.0	9	25.7	7	11.1	2	2.0	5	5.4	7	5.3	26	9.5	29	5.8	13	7.6	17	9.6
	160－179	109	15.6	5	14.3	16	25.4	11	11.1	6	6.5	14	10.6	57	20.7	61	12.3	28	16.4	41	23.0
	180－199	132	18.9	6	17.1	9	14.3	12	12.1	15	16.1	27	20.5	63	22.9	98	19.7	38	22.2	40	22.5
	200－219	175	25.1	11	31.4	15	23.8	30	30.3	23	24.7	36	27.3	60	21.8	129	26.0	37	21.6	38	21.3
	220－239	102	14.6	3	8.6	7	11.1	19	19.2	19	20.4	20	15.2	34	12.4	82	16.5	27	15.8	19	10.7
	240－259	63	9.0	0	0.0	5	7.9	16	16.2	14	15.1	15	11.4	13	4.7	51	10.3	12	7.0	10	5.6
	260－279	27	3.9	1	2.9	1	1.6	5	5.1	6	6.5	8	6.1	6	2.2	24	4.8	8	4.7	2	1.1
	280－299	4	0.6	0	0.0	1	1.6	2	2.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	0.6	1	0.6	0	0.0
	300mg/dL以上	8	1.1	0	0.0	1	1.6	2	2.0	4	4.3	1	0.8	0	0.0	7	1.4	1	0.6	0	0.0
女 性	総 数	873	100.0	49	100.0	88	100.0	153	100.0	154	100.0	159	100.0	270	100.0	643	100.0	191	100.0	163	100.0
	120mg/dL未満	1	0.1	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120－139	7	0.8	2	4.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.5	2	0.3	0	0.0	4	2.5
	140－159	37	4.2	10	20.4	8	9.1	7	4.6	1	0.6	0	0.0	11	4.1	12	1.9	2	1.0	9	5.5
	160－179	100	11.5	14	28.6	25	28.4	24	15.7	9	5.8	9	5.7	19	7.0	48	7.5	9	4.7	15	9.2
	180－199	131	15.0	7	14.3	25	28.4	30	19.6	19	12.3	9	5.7	41	15.2	84	13.1	19	9.9	25	15.3
	200－219	180	20.6	10	20.4	16	18.2	34	22.2	28	18.2	41	25.8	51	18.9	133	20.7	39	20.4	36	22.1
	220－239	166	19.0	2	4.1	10	11.4	31	20.3	33	21.4	35	22.0	55	20.4	136	21.2	44	23.0	32	19.6
	240－259	126	14.4	2	4.1	2	2.3	15	9.8	34	22.1	27	17.0	46	17.0	114	17.7	42	22.0	17	10.4
	260－279	72	8.2	1	2.0	0	0.0	8	5.2	18	11.7	21	13.2	24	8.9	66	10.3	19	9.9	12	7.4
	280－299	29	3.3	0	0.0	1	1.1	1	0.7	5	3.2	15	9.4	7	2.6	26	4.0	12	6.3	5	3.1
	300mg/dL以上	24	2.7	0	0.0	0	0.0	3	2.0	7	4.5	2	1.3	12	4.4	22	3.4	5	2.6	8	4.9

注) 血清総コレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(4年)

第34表の4 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

		総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 40－79歳			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男 性		697	202.6	35.5	35	187.7	31.9	63	197.9	38.3	99	217.7	33.1	93	218.0	37.7	132	209.3	33.8	275	191.8	31.7	497	207.1	34.9	171	200.6	34.0	178	190.2	31.3
女 性		873	219.5	40.7	49	182.1	33.2	88	190.7	27.5	153	210.1	35.2	154	234.5	43.1	159	234.3	34.4	270	223.7	40.2	643	227.7	39.1	191	232.8	34.2	163	218.1	42.8

注) 血清総コレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(4年)

第36表の1 血清LDLコレステロール値（直接法）の分布－血清LDLコレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総 数	20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40歳以上	(再掲) 40－79歳	(再掲) 65－74歳	(再掲) 75歳以上
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	887	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	181	100.0	385	100.0	786	100.0
	40mg/dL未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.3	0	0.0
	40－49	7	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	0.9	0	0.0	4	1.0	7	0.9
	50－59	20	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.3	14	3.6	20	2.5	15	2.3
	60－69	33	3.7	2	5.7	2	3.0	1	0.9	4	2.2	23	6.0	29	3.7	20	3.1
	70－79	49	5.5	6	17.1	3	4.5	2	1.9	9	5.0	27	7.0	40	5.1	29	4.5
	80－89	89	10.0	3	8.6	8	12.1	8	7.5	8	7.0	53	13.8	78	9.9	57	8.8
	90－99	93	10.5	1	2.9	7	10.6	8	7.5	8	7.0	24	13.3	45	11.7	69	10.6
	100－109	105	11.8	4	11.4	13	19.7	8	7.5	7	6.1	20	11.0	53	13.8	88	11.2
	110－119	124	14.0	7	20.0	6	9.1	17	16.0	18	15.8	29	16.0	47	12.2	111	14.1
	120－129	115	13.0	6	17.1	7	10.6	13	12.3	21	18.4	25	13.8	43	11.2	102	13.0
	130－139	70	7.9	0	0.0	6	9.1	11	10.4	11	9.6	22	12.2	20	5.2	64	8.1
	140－149	73	8.2	3	8.6	8	12.1	14	13.2	8	7.0	12	6.6	28	7.3	62	7.9
	150－159	46	5.2	1	2.9	1	1.5	6	5.7	15	13.2	7	3.9	16	4.2	44	5.6
	160－169	21	2.4	2	5.7	2	3.0	4	3.8	1	0.9	8	4.4	4	1.0	17	2.2
	170－179	17	1.9	0	0.0	1	1.5	5	4.7	6	5.3	2	1.1	3	0.8	16	2.0
	180－189	10	1.1	0	0.0	1	1.5	3	2.8	3	2.6	1	0.6	2	0.5	9	1.1
	190－199	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	2	1.1	1	0.3	5	0.6
	200－209	5	0.6	0	0.0	1	1.5	1	0.9	3	2.6	0	0.0	0	0.0	4	0.5
	210－219	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	220mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.3
女 性	総 数	1,120	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	215	100.0	437	100.0	982	100.0
	40mg/dL未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	3	0.3
	40－49	2	0.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.1	1	0.1
	50－59	9	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	7	1.6	9	0.9
	60－69	22	2.0	4	8.2	4	4.5	3	1.9	3	1.7	0	0.0	8	1.8	14	1.4
	70－79	49	4.4	4	8.2	6	6.7	7	4.5	5	2.9	7	3.3	20	4.6	39	4.0
	80－89	98	8.8	11	22.4	13	14.6	17	10.8	5	2.9	19	8.8	33	7.6	74	7.5
	90－99	117	10.4	5	10.2	16	18.0	19	12.1	13	7.5	14	6.5	50	11.4	96	9.8
	100－109	142	12.7	6	12.2	12	13.5	22	14.0	16	9.2	23	10.7	63	14.4	124	12.6
	110－119	151	13.5	6	12.2	14	15.7	22	14.0	20	11.6	28	13.0	61	14.0	131	13.3
	120－129	138	12.3	4	8.2	13	14.6	17	10.8	24	13.9	36	16.7	44	10.1	121	12.3
	130－139	120	10.7	4	8.2	6	6.7	14	8.9	18	10.4	28	13.0	50	11.4	110	11.2
	140－149	95	8.5	3	6.1	1	1.1	15	9.6	25	14.5	13	6.0	38	8.7	91	9.3
	150－159	60	5.4	0	0.0	2	2.2	6	3.8	17	9.8	14	6.5	21	4.8	58	5.9
	160－169	39	3.5	1	2.0	2	2.2	7	4.5	6	3.5	9	4.2	14	3.2	36	3.7
	170－179	37	3.3	0	0.0	0	0.0	4	2.5	8	4.6	15	7.0	10	2.3	37	3.8
	180－189	10	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.7	3	1.4	3	0.7	10	1.0
	190－199	9	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	3	1.4	4	0.9	9	0.9
	200－209	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.7	0	0.0	1	0.2	5	0.5
	210－219	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	3	0.7	5	0.5
	220mg/dL以上	9	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	2	0.9	4	0.9	9	0.9

注) 血清LDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(4年)

第36表の2 血清LDLコレステロール値（直接法）の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 40歳以上			(再掲) 40－79歳			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
男性	887	114.0	31.1	35	109.0	27.1	66	115.6	28.9	106	127.3	33.6	114	128.2	30.4	181	116.2	29.8	385	105.2	28.9	786	114.1	31.4	651	116.7	31.5	235	112.0	30.3	250	103.6	27.7
女性	1,120	120.0	32.5	49	100.3	25.5	89	105.5	22.2	157	116.8	29.2	173	132.1	37.1	215	126.2	30.7	437	118.4	32.4	982	122.2	32.9	836	124.0	32.8	284	124.7	30.8	272	114.5	33.1

注) 血清LDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(4年)

第 36 表の 3 血清 LDL コレステロール値（直接法）の分布－血清 LDL コレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40歳以上		(再掲) 40－79歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	697	100.0	35	100.0	63	100.0	99	100.0	93	100.0	132	100.0	275	100.0	599	100.0	497	100.0	171	100.0	178	100.0
	40mg/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	40－49	4	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	2	0.7	4	0.7	3	0.6	1	0.6	1	0.6
	50－59	13	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	3.8	8	2.9	13	2.2	10	2.0	5	2.9	4	2.2
	60－69	24	3.4	2	5.7	2	3.2	1	1.0	1	1.1	2	1.5	16	5.8	20	3.3	16	3.2	4	2.3	12	6.7
	70－79	31	4.4	6	17.1	2	3.2	2	2.0	2	2.2	4	3.0	15	5.5	23	3.8	15	3.0	9	5.3	9	5.1
	80－89	65	9.3	3	8.6	8	12.7	8	8.1	5	5.4	7	5.3	34	12.4	54	9.0	40	8.0	16	9.4	24	13.5
	90－99	70	10.0	1	2.9	7	11.1	7	7.1	6	6.5	16	12.1	33	12.0	62	10.4	50	10.1	22	12.9	21	11.8
	100－109	81	11.6	4	11.4	13	20.6	8	8.1	5	5.4	12	9.1	39	14.2	64	10.7	49	9.9	21	12.3	25	14.0
	110－119	86	12.3	7	20.0	6	9.5	15	15.2	11	11.8	14	10.6	33	12.0	73	12.2	58	11.7	17	9.9	24	13.5
	120－129	101	14.5	6	17.1	7	11.1	12	12.1	21	22.6	24	18.2	31	11.3	88	14.7	78	15.7	25	14.6	19	10.7
	130－139	58	8.3	0	0.0	5	7.9	10	10.1	9	9.7	17	12.9	17	6.2	53	8.8	48	9.7	15	8.8	12	6.7
	140－149	69	9.9	3	8.6	8	12.7	14	14.1	8	8.6	11	8.3	25	9.1	58	9.7	49	9.9	16	9.4	15	8.4
	150－159	40	5.7	1	2.9	1	1.6	5	5.1	14	15.1	7	5.3	12	4.4	38	6.3	35	7.0	7	4.1	8	4.5
	160－169	21	3.0	2	5.7	2	3.2	4	4.0	1	1.1	8	6.1	4	1.5	17	2.8	16	3.2	8	4.7	1	0.6
	170－179	17	2.4	0	0.0	1	1.6	5	5.1	6	6.5	2	1.5	3	1.1	16	2.7	15	3.0	3	1.8	1	0.6
	180－189	7	1.0	0	0.0	0	0.0	3	3.0	2	2.2	1	0.8	1	0.4	7	1.2	7	1.4	0	0.0	1	0.6
	190－199	4	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	1.5	1	0.4	4	0.7	4	0.8	2	1.2	0	0.0
	200－209	3	0.4	0	0.0	1	1.6	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0
	210－219	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
女 性	総 数	873	100.0	49	100.0	88	100.0	153	100.0	154	100.0	159	100.0	270	100.0	736	100.0	643	100.0	191	100.0	163	100.0
	40mg/dL未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.2
	40－49	2	0.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	50－59	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.6	3	1.1	5	0.7	3	0.5	0	0.0	3	1.8
	60－69	18	2.1	4	8.2	4	4.5	3	2.0	3	1.9	0	0.0	4	1.5	10	1.4	8	1.2	1	0.5	3	1.8
	70－79	31	3.6	4	8.2	6	6.8	7	4.6	4	2.6	2	1.3	8	3.0	21	2.9	17	2.6	1	0.5	7	4.3
	80－89	67	7.7	11	22.4	13	14.8	17	11.1	5	3.2	10	6.3	11	4.1	43	5.8	38	5.9	10	5.2	6	3.7
	90－99	81	9.3	5	10.2	16	18.2	18	11.8	13	8.4	7	4.4	22	8.1	60	8.2	51	7.9	15	7.9	12	7.4
	100－109	93	10.7	6	12.2	12	13.6	22	14.4	10	6.5	15	9.4	28	10.4	75	10.2	66	10.3	16	8.4	17	10.4
	110－119	119	13.6	6	12.2	14	15.9	22	14.4	17	11.0	21	13.2	39	14.4	99	13.5	82	12.8	26	13.6	24	14.7
	120－129	112	12.8	4	8.2	12	13.6	16	10.5	23	14.9	29	18.2	28	10.4	96	13.0	86	13.4	28	14.7	21	12.9
	130－139	98	11.2	4	8.2	6	6.8	14	9.2	14	9.1	22	13.8	38	14.1	88	12.0	76	11.8	21	11.0	26	16.0
	140－149	85	9.7	3	6.1	1	1.1	14	9.2	23	14.9	13	8.2	31	11.5	81	11.0	75	11.7	28	14.7	12	7.4
	150－159	54	6.2	0	0.0	2	2.3	5	3.3	15	9.7	11	6.9	21	7.8	52	7.1	42	6.5	14	7.3	12	7.4
	160－169	34	3.9	1	2.0	2	2.3	7	4.6	6	3.9	8	5.0	10	3.7	31	4.2	28	4.4	8	4.2	6	3.7
	170－179	36	4.1	0	0.0	0	0.0	4	2.6	8	5.2	14	8.8	10	3.7	36	4.9	36	5.6	12	6.3	4	2.5
	180－189	9	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.9	2	1.3	3	1.1	9	1.2	8	1.2	1	0.5	2	1.2
	190－199	8	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.3	4	1.5	8	1.1	8	1.2	5	2.6	1	0.6
	200－209	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.9	0	0.0	1	0.4	5	0.7	5	0.8	1	0.5	0	0.0
	210－219	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	3	1.1	5	0.7	5	0.8	1	0.5	2	1.2
	220mg/dL以上	9	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9	2	1.3	4	1.5	9	1.2	8	1.2	3	1.6	3	1.8

注) 血清 LDL コレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した 20 歳以上の者を集計対象とした。（4 年）

第 36 表の 4 血清 LDL コレステロール値（直接法）の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)																																	
	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 40歳以上			(再掲) 40－79歳			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
男性	697	116.6	30.5	35	109.0	27.1	63	114.8	27.7	99	128.4	33.5	93	128.4	28.5	132	119.8	29.5	275	108.2	28.8	599	117.2	31.0	497	119.7	31.1	171	114.4	29.5	178	106.9	27.6
女性	873	123.5	33.5	49	100.3	25.5	88	105.3	22.2	153	116.5	29.3	154	133.5	38.5	159	131.3	30.0	270	127.2	34.2	736	127.2	33.8	643	128.6	33.5	191	132.7	31.1	163	123.9	35.5

注) 血清 LDL コレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した 20 歳以上の者を集計対象とした。（4 年）

第37表の1 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の分布－血清LDLコレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40歳以上	(再掲) 40-79歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	855	100.0	34	100.0	61	100.0	97	100.0	110	100.0	175	100.0	378	100.0	760	100.0
	40mg/dL未満	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.6	4	1.1	6	0.8
	40-49	6	0.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.3	5	0.7
	50-59	20	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	3	1.7	16	4.2	20	2.6
	60-69	38	4.4	2	5.9	3	4.9	1	1.0	0	0.0	5	2.9	27	7.1	33	4.3
	70-79	53	6.2	4	11.8	4	6.6	2	2.1	4	3.6	9	5.1	30	7.9	45	5.9
	80-89	98	11.5	3	8.8	9	14.8	9	9.3	11	10.0	20	11.4	46	12.2	86	11.3
	90-99	111	13.0	5	14.7	11	18.0	12	12.4	8	7.3	20	11.4	55	14.6	95	12.5
	100-109	102	11.9	6	17.6	6	9.8	6	6.2	15	13.6	21	12.0	48	12.7	90	11.8
	110-119	107	12.5	6	17.6	6	9.8	12	12.4	14	12.7	25	14.3	44	11.6	95	12.5
	120-129	92	10.8	1	2.9	9	14.8	13	13.4	14	12.7	21	12.0	34	9.0	82	10.8
	130-139	76	8.9	2	5.9	5	8.2	11	11.3	12	10.9	21	12.0	25	6.6	69	9.1
	140-149	60	7.0	2	5.9	6	9.8	9	9.3	11	10.0	11	6.3	21	5.6	52	6.8
	150-159	37	4.3	1	2.9	1	1.6	8	8.2	8	7.3	7	4.0	12	3.2	35	4.6
	160-169	18	2.1	1	2.9	0	0.0	3	3.1	5	4.5	4	2.3	5	1.3	17	2.2
	170-179	15	1.8	0	0.0	1	1.6	6	6.2	1	0.9	4	2.3	3	0.8	14	1.8
	180-189	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	1.8	1	0.6	1	0.3	5	0.7
	190-199	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	0.5	3	0.4
	200-209	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0	3	0.4
	210-219	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.9	1	0.6	0	0.0	3	0.4
	220mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.3
女性	総数	1,106	100.0	49	100.0	88	100.0	155	100.0	170	100.0	212	100.0	432	100.0	969	100.0
	40mg/dL未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.2
	40-49	3	0.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.2	2	0.2
	50-59	12	1.1	1	2.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	9	2.1	11	1.1
	60-69	24	2.2	2	4.1	5	5.7	4	2.6	1	0.6	1	0.5	11	2.5	17	1.8
	70-79	43	3.9	5	10.2	4	4.5	4	2.6	6	3.5	11	5.2	13	3.0	34	3.5
	80-89	96	8.7	11	22.4	15	17.0	14	9.0	8	4.7	16	7.5	32	7.4	70	7.2
	90-99	116	10.5	8	16.3	14	15.9	27	17.4	11	6.5	14	6.6	42	9.7	94	9.7
	100-109	146	13.2	7	14.3	16	18.2	24	15.5	14	8.2	20	9.4	65	15.0	123	12.7
	110-119	133	12.0	6	12.2	13	14.8	17	11.0	21	12.4	17	8.0	59	13.7	114	11.8
	120-129	147	13.3	1	2.0	13	14.8	21	13.5	22	12.9	36	17.0	54	12.5	133	13.7
	130-139	107	9.7	4	8.2	2	2.3	13	8.4	20	11.8	31	14.6	37	8.6	101	10.4
	140-149	102	9.2	3	6.1	3	3.4	10	6.5	20	11.8	24	11.3	42	9.7	96	9.9
	150-159	57	5.2	0	0.0	2	2.3	7	4.5	18	10.6	12	5.7	18	4.2	55	5.7
	160-169	38	3.4	0	0.0	0	0.0	4	2.6	10	5.9	9	4.2	15	3.5	38	3.9
	170-179	35	3.2	0	0.0	1	1.1	5	3.2	5	2.9	7	3.3	17	3.9	34	3.5
	180-189	20	1.8	0	0.0	0	0.0	2	1.3	6	3.5	7	3.3	5	1.2	20	2.1
	190-199	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.9	3	0.7	6	0.6
	200-209	7	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.8	2	0.9	1	0.2	7	0.7
	210-219	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	0.5	3	0.3
	220mg/dL以上	9	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	2	0.9	4	0.9	9	0.9

注) 血清総コレステロール値，血清HDLコレステロール値及び血清中性脂肪（トリグリセライド）の測定を行い，血清中性脂肪（トリグリセライド）が400mg/dL未満の20歳以上の者を集計対象とした。（4年）

Friedewaldの式 LDLコレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL) - 中性脂肪 (mg/dL) / 5
(中性脂肪 (トリグリセライド) が400mg/dL未満の場合。)

第37表の2 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)																																	
	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
男性	855	111.0	31.0	34	103.1	26.8	61	108.7	24.8	97	125.7	32.7	110	123.8	30.9	175	114.3	29.7	378	103.0	29.6	760	111.5	31.6	628	113.8	31.7	230	109.1	31.1	246	101.9	28.5
女性	1,106	120.9	33.1	49	98.8	23.2	88	104.8	22.0	155	116.6	28.5	170	133.3	37.8	212	127.6	32.1	432	120.0	33.1	969	123.4	33.5	823	125.0	33.5	279	125.9	32.3	271	116.6	33.9

注) 血清総コレステロール値，血清HDLコレステロール値及び血清中性脂肪（トリグリセライド）の測定を行い，血清中性脂肪（トリグリセライド）が400mg/dL未満の20歳以上の者を集計対象とした。（4年）

Friedewaldの式 LDLコレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL) - 中性脂肪 (mg/dL) / 5
(中性脂肪 (トリグリセライド) が400mg/dL未満の場合。)

第38表の1 血清 non HDL コレステロール値の分布－血清 non HDL コレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－79歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	887	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	181	100.0	385	100.0	651	100.0	235	100.0	250	100.0
	70mg/dL未満	8	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	0	0.0	6	1.6	4	0.6	2	0.9	4	1.6
	70－80未満	16	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.2	12	3.1	12	1.8	5	2.1	7	2.8
	80－90未満	25	2.8	5	14.3	3	4.5	0	0.0	1	0.9	3	1.7	13	3.4	13	2.0	5	2.1	10	4.0
	90－100未満	38	4.3	1	2.9	4	6.1	2	1.9	3	2.6	3	1.7	25	6.5	19	2.9	9	3.8	18	7.2
	100－110未満	68	7.7	3	8.6	5	7.6	6	5.7	6	5.3	9	5.0	39	10.1	48	7.4	18	7.7	26	10.4
	110－120未満	92	10.4	4	11.4	8	12.1	6	5.7	9	7.9	15	8.3	50	13.0	60	9.2	24	10.2	35	14.0
	120－130未満	85	9.6	1	2.9	10	15.2	8	7.5	6	5.3	21	11.6	39	10.1	62	9.5	29	12.3	22	8.8
	130－140未満	98	11.0	8	22.9	6	9.1	9	8.5	7	6.1	19	10.5	49	12.7	65	10.0	26	11.1	33	13.2
	140－150未満	107	12.1	4	11.4	4	6.1	16	15.1	14	12.3	30	16.6	39	10.1	89	13.7	29	12.3	25	10.0
	150－160未満	88	9.9	4	11.4	7	10.6	10	9.4	15	13.2	25	13.8	27	7.0	67	10.3	27	11.5	20	8.0
	160－170未満	78	8.8	2	5.7	6	9.1	7	6.6	16	14.0	17	9.4	30	7.8	61	9.4	17	7.2	19	7.6
	170－180未満	59	6.7	2	5.7	2	3.0	14	13.2	9	7.9	9	5.0	23	6.0	47	7.2	12	5.1	15	6.0
	180－190未満	42	4.7	1	2.9	3	4.5	5	4.7	9	7.9	8	4.4	16	4.2	35	5.4	15	6.4	6	2.4
	190－200未満	27	3.0	0	0.0	4	6.1	5	4.7	3	2.6	9	5.0	6	1.6	21	3.2	8	3.4	3	1.2
	200－210未満	15	1.7	0	0.0	1	1.5	4	3.8	3	2.6	2	1.1	5	1.3	11	1.7	3	1.3	3	1.2
	210－220未満	12	1.4	0	0.0	1	1.5	4	3.8	2	1.8	2	1.1	3	0.8	10	1.5	2	0.9	2	0.8
	220mg/dL以上	29	3.3	0	0.0	2	3.0	9	8.5	10	8.8	5	2.8	3	0.8	27	4.1	4	1.7	2	0.8
女 性	総 数	1,120	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	215	100.0	437	100.0	836	100.0	284	100.0	272	100.0
	70mg/dL未満	3	0.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.1	0	0.0	2	0.7
	70－80未満	12	1.1	4	8.2	3	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.1	2	0.2	0	0.0	5	1.8
	80－90未満	19	1.7	2	4.1	2	2.2	6	3.8	2	1.2	0	0.0	7	1.6	11	1.3	1	0.4	6	2.2
	90－100未満	48	4.3	10	20.4	10	11.2	7	4.5	4	2.3	4	1.9	13	3.0	20	2.4	6	2.1	10	3.7
	100－110未満	95	8.5	6	12.2	14	15.7	19	12.1	7	4.0	15	7.0	34	7.8	60	7.2	15	5.3	28	10.3
	110－120未満	87	7.8	4	8.2	14	15.7	20	12.7	9	5.2	12	5.6	28	6.4	60	7.2	18	6.3	19	7.0
	120－130未満	135	12.1	8	16.3	12	13.5	12	7.6	15	8.7	25	11.6	63	14.4	93	11.1	36	12.7	39	14.3
	130－140未満	128	11.4	3	6.1	14	15.7	20	12.7	24	13.9	20	9.3	47	10.8	97	11.6	32	11.3	27	9.9
	140－150未満	132	11.8	4	8.2	8	9.0	19	12.1	19	11.0	29	13.5	53	12.1	105	12.6	39	13.7	31	11.4
	150－160未満	113	10.1	3	6.1	5	5.6	17	10.8	16	9.2	31	14.4	41	9.4	91	10.9	30	10.6	27	9.9
	160－170未満	89	7.9	2	4.1	1	1.1	11	7.0	20	11.6	15	7.0	40	9.2	71	8.5	26	9.2	25	9.2
	170－180未満	93	8.3	2	4.1	3	3.4	10	6.4	20	11.6	18	8.4	40	9.2	78	9.3	27	9.5	20	7.4
	180－190未満	39	3.5	0	0.0	1	1.1	2	1.3	9	5.2	7	3.3	20	4.6	33	3.9	14	4.9	10	3.7
	190－200未満	42	3.8	0	0.0	0	0.0	7	4.5	11	6.4	11	5.1	13	3.0	36	4.3	11	3.9	8	2.9
	200－210未満	25	2.2	0	0.0	2	2.2	1	0.6	6	3.5	9	4.2	7	1.6	20	2.4	6	2.1	5	1.8
	210－220未満	15	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.2	8	3.7	4	0.9	15	1.8	7	2.5	0	0.0
	220mg/dL以上	45	4.0	0	0.0	0	0.0	5	3.2	9	5.2	11	5.1	20	4.6	43	5.1	16	5.6	10	3.7

注) 血清総コレステロール値及びHDL コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(4年)

non HDL コレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL)

第38表の2 血清 non HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 40－79歳			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男 性	887	142.7	36.0	35	130.0	28.5	66	142.9	39.1	106	159.4	37.9	114	157.7	38.1	181	146.3	32.4	385	133.0	33.0	651	146.1	35.8	235	140.9	33.5	250	131.6	32.5
女 性	1,120	145.9	37.6	49	116.3	28.5	89	123.1	26.3	157	139.4	35.0	173	157.4	41.0	215	155.2	35.8	437	147.1	36.8	836	151.1	37.6	284	153.6	35.1	272	142.8	37.4

注) 血清総コレステロール値及びHDL コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(4年)

※年齢調整した，血清 nonHDL コレステロール値の平均値（20歳以上）は，男性144.8mg/dL，女性140.7mg/dL。

年齢調整値は，平成22年国勢調査による基準人口（20-29歳，30-39歳，40-49歳，50-59歳，60-69歳，70歳以上の6区分）を用いて算出した。

第 38 表の 3 血清 non HDL コレステロール値の分布－血清 non HDL コレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－79歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	697	100.0	35	100.0	63	100.0	99	100.0	93	100.0	132	100.0	275	100.0	497	100.0	171	100.0	178	100.0
	70mg/dL未満	6	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	4	1.5	3	0.6	1	0.6	3	1.7
	70－80未満	11	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.0	7	2.5	9	1.8	4	2.3	3	1.7
	80－90未満	22	3.2	5	14.3	3	4.8	0	0.0	1	1.1	3	2.3	10	3.6	12	2.4	5	2.9	7	3.9
	90－100未満	29	4.2	1	2.9	4	6.3	2	2.0	3	3.2	3	2.3	16	5.8	14	2.8	6	3.5	12	6.7
	100－110未満	50	7.2	3	8.6	4	6.3	6	6.1	3	3.2	4	3.0	30	10.9	35	7.0	14	8.2	19	10.7
	110－120未満	66	9.5	4	11.4	8	12.7	6	6.1	7	7.5	9	6.8	32	11.6	38	7.6	15	8.8	23	12.9
	120－130未満	69	9.9	1	2.9	10	15.9	8	8.1	4	4.3	16	12.1	30	10.9	50	10.1	21	12.3	17	9.6
	130－140未満	68	9.8	8	22.9	6	9.5	8	8.1	6	6.5	10	7.6	30	10.9	39	7.8	14	8.2	22	12.4
	140－150未満	75	10.8	4	11.4	3	4.8	15	15.2	10	10.8	17	12.9	26	9.5	61	12.3	20	11.7	15	8.4
	150－160未満	73	10.5	4	11.4	7	11.1	10	10.1	13	14.0	20	15.2	19	6.9	54	10.9	21	12.3	13	7.3
	160－170未満	73	10.5	2	5.7	6	9.5	7	7.1	16	17.2	15	11.4	27	9.8	57	11.5	16	9.4	17	9.6
	170－180未満	51	7.3	2	5.7	2	3.2	11	11.1	9	9.7	9	6.8	18	6.5	40	8.0	8	4.7	14	7.9
	180－190未満	34	4.9	1	2.9	3	4.8	4	4.0	6	6.5	8	6.1	12	4.4	28	5.6	12	7.0	5	2.8
	190－200未満	24	3.4	0	0.0	4	6.3	5	5.1	3	3.2	7	5.3	5	1.8	18	3.6	6	3.5	3	1.7
	200－210未満	15	2.2	0	0.0	1	1.6	4	4.0	3	3.2	2	1.5	5	1.8	11	2.2	3	1.8	3	1.7
	210－220未満	11	1.6	0	0.0	0	0.0	4	4.0	2	2.2	2	1.5	3	1.1	10	2.0	2	1.2	2	1.1
	220mg/dL以上	20	2.9	0	0.0	2	3.2	8	8.1	6	6.5	3	2.3	1	0.4	18	3.6	3	1.8	0	0.0
女 性	総 数	873	100.0	49	100.0	88	100.0	153	100.0	154	100.0	159	100.0	270	100.0	643	100.0	191	100.0	163	100.0
	70mg/dL未満	2	0.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	70－80未満	10	1.1	4	8.2	3	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	1	0.2	0	0.0	3	1.8
	80－90未満	15	1.7	2	4.1	2	2.3	6	3.9	2	1.3	0	0.0	3	1.1	9	1.4	1	0.5	2	1.2
	90－100未満	37	4.2	10	20.4	10	11.4	7	4.6	4	2.6	1	0.6	5	1.9	15	2.3	1	0.5	4	2.5
	100－110未満	66	7.6	6	12.2	14	15.9	19	12.4	6	3.9	8	5.0	13	4.8	38	5.9	6	3.1	10	6.1
	110－120未満	61	7.0	4	8.2	14	15.9	19	12.4	7	4.5	6	3.8	11	4.1	39	6.1	9	4.7	7	4.3
	120－130未満	97	11.1	8	16.3	12	13.6	12	7.8	13	8.4	18	11.3	34	12.6	63	9.8	20	10.5	21	12.9
	130－140未満	92	10.5	3	6.1	13	14.8	20	13.1	18	11.7	14	8.8	24	8.9	68	10.6	17	8.9	14	8.6
	140－150未満	95	10.9	4	8.2	8	9.1	19	12.4	17	11.0	19	11.9	28	10.4	72	11.2	22	11.5	18	11.0
	150－160未満	95	10.9	3	6.1	5	5.7	17	11.1	14	9.1	26	16.4	30	11.1	77	12.0	23	12.0	21	12.9
	160－170未満	71	8.1	2	4.1	1	1.1	10	6.5	18	11.7	13	8.2	27	10.0	59	9.2	22	11.5	14	8.6
	170－180未満	79	9.0	2	4.1	3	3.4	9	5.9	19	12.3	13	8.2	33	12.2	66	10.3	23	12.0	17	10.4
	180－190未満	34	3.9	0	0.0	1	1.1	1	0.7	8	5.2	6	3.8	18	6.7	28	4.4	11	5.8	10	6.1
	190－200未満	39	4.5	0	0.0	0	0.0	7	4.6	11	7.1	9	5.7	12	4.4	33	5.1	9	4.7	8	4.9
	200－210未満	22	2.5	0	0.0	2	2.3	1	0.7	6	3.9	8	5.0	5	1.9	19	3.0	5	2.6	3	1.8
	210－220未満	15	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.3	8	5.0	4	1.5	15	2.3	7	3.7	0	0.0
	220mg/dL以上	43	4.9	0	0.0	0	0.0	5	3.3	9	5.8	10	6.3	19	7.0	41	6.4	15	7.9	10	6.1

注) 血清総コレステロール値及びHDL コレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

non HDL コレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDL コレステロール (mg/dL)

第 38 表の 4 血清 non HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

																				(mg/dL)										
	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 40－79歳			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	697	144.2	36.0	35	130.0	28.5	63	142.5	38.6	99	158.3	37.9	93	157.8	36.8	132	148.3	33.2	275	134.9	33.2	497	147.9	36.0	171	142.3	34.0	178	133.9	32.5
女性	873	149.1	39.5	49	116.3	28.5	88	123.0	26.4	153	138.9	35.0	154	159.4	42.5	159	160.6	36.1	270	156.6	38.9	643	155.6	39.3	191	161.8	36.2	163	152.9	39.9

注) 血清総コレステロール値及びHDL コレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 40 表の 1 血清クレアチニン値の分布－血清クレアチニン値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	887	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	181	100.0	385	100.0	235	100.0	250	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.50-0.59	12	1.4	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	7	3.9	4	1.0	5	2.1	3	1.2
	0.60-0.69	80	9.0	3	8.6	7	10.6	9	8.5	11	9.6	19	10.5	31	8.1	25	10.6	17	6.8
	0.70-0.79	188	21.2	12	34.3	13	19.7	34	32.1	26	22.8	32	17.7	71	18.4	43	18.3	43	17.2
	0.80-0.89	228	25.7	13	37.1	19	28.8	32	30.2	40	35.1	45	24.9	79	20.5	49	20.9	53	21.2
	0.90-0.99	176	19.8	6	17.1	21	31.8	22	20.8	20	17.5	27	14.9	80	20.8	44	18.7	51	20.4
	1.00-1.19	142	16.0	1	2.9	5	7.6	8	7.5	12	10.5	39	21.5	77	20.0	50	21.3	52	20.8
	1.20-1.39	33	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.6	8	4.4	22	5.7	12	5.1	14	5.6
	1.40-1.59	13	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.6	11	2.9	2	0.9	9	3.6
	1.60-1.79	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.3	2	0.9	1	0.4
	1.80-1.99	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4
	2.00mg/dL以上	10	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.6	8	2.1	3	1.3	6	2.4
女 性	総 数	1,120	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	215	100.0	437	100.0	284	100.0	272	100.0
	0.40mg/dL未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.4	1	0.4
	0.40-0.49	57	5.1	3	6.1	8	9.0	10	6.4	8	4.6	8	3.7	20	4.6	13	4.6	11	4.0
	0.50-0.59	318	28.4	22	44.9	42	47.2	48	30.6	53	30.6	63	29.3	90	20.6	75	26.4	54	19.9
	0.60-0.69	403	36.0	20	40.8	29	32.6	56	35.7	66	38.2	82	38.1	150	34.3	103	36.3	88	32.4
	0.70-0.79	210	18.8	1	2.0	10	11.2	33	21.0	30	17.3	44	20.5	92	21.1	61	21.5	53	19.5
	0.80-0.89	68	6.1	2	4.1	0	0.0	6	3.8	9	5.2	13	6.0	38	8.7	20	7.0	27	9.9
	0.90-0.99	31	2.8	1	2.0	0	0.0	0	0.0	4	2.3	2	0.9	24	5.5	6	2.1	19	7.0
	1.00-1.19	20	1.8	0	0.0	0	0.0	4	2.5	2	1.2	3	1.4	11	2.5	5	1.8	9	3.3
	1.20-1.39	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	1.40-1.59	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9	0	0.0	4	1.5
	1.60-1.79	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9	0	0.0	4	1.5
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4

注) 血清クレアチニン値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。

(4 年)

第 40 表の 2 血清クレアチニン値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上

		総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男 性		887	0.9	0.4	35	0.8	0.1	66	0.8	0.1	106	0.8	0.1	114	0.9	0.8	181	0.9	0.2	385	0.9	0.3
女 性		1,120	0.7	0.3	49	0.6	0.1	89	0.6	0.1	157	0.6	0.1	173	0.7	0.6	215	0.6	0.1	437	0.7	0.2

注) 血清クレアチニン値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。

(4 年)

第 41 表の 1 推算 GFR の分布－推算 GFR の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上

総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	887	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	181	100.0	235	100.0	250	100.0
	15mL/min/1.73m ² 未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-30未満	10	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.3	7	2.8
	30-60未満	208	23.4	0	0.0	0	0.0	4	3.8	10	8.8	53	29.3	77	32.8	97	38.8
	60-90未満	544	61.3	10	28.6	41	62.1	78	73.6	88	77.2	107	59.1	138	58.7	138	55.2
女 性	90mL/min/1.73m ² 以上	124	14.0	25	71.4	25	37.9	24	22.6	15	13.2	20	11.0	17	7.2	8	3.2
	総 数	1,120	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	215	100.0	284	100.0	272	100.0
	15mL/min/1.73m ² 未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4
	15-30未満	8	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.9
	30-60未満	183	16.3	0	0.0	0	0.0	7	4.5	19	11.0	28	13.0	52	18.3	95	34.9
性	60-90未満	713	63.7	8	16.3	35	39.3	106	67.5	122	70.5	164	76.3	208	73.2	158	58.1
	90mL/min/1.73m ² 以上	214	19.1	41	83.7	54	60.7	44	28.0	31	17.9	23	10.7	24	8.5	10	3.7

注) 血清クレアニン値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。

推算GFR (mL/min/1.73m²)

= 194×血清クレアニン値 (mg/dL)^{-1.094} ×年齢 (歳)^{0.287} (男性)

= 194×血清クレアニン値 (mg/dL)^{-1.094} ×年齢 (歳)^{0.287} ×0.739 (女性)

注) エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2023 年版の推算式

第 41 表の 2 推算 GFR の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上

	総 数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男 性	887	71.7	18.0	35	100.7	15.3	66	86.8	15.0	106	81.4	12.4	114	75.3	14.5	181	70.4	17.0	385	63.5	15.3	235	67.2	15.7	250	62.0	15.4
女 性	1,120	74.9	18.0	49	103.0	14.9	89	95.4	13.7	157	82.6	15.5	173	76.4	14.6	215	72.4	12.7	437	65.4	15.1	284	70.2	12.9	272	63.1	15.9

注) 血清クレアニン値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。

推算GFR (mL/min/1.73m²)

= 194×血清クレアニン値 (mg/dL)^{-1.094} ×年齢 (歳)^{0.287} (男性)

= 194×血清クレアニン値 (mg/dL)^{-1.094} ×年齢 (歳)^{0.287} ×0.739 (女性)

注) エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2023 年版の推算式

第 44 表の 1 AST (GOT) の分布－AST (GOT) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20 歳以上

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲)65－74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	887	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	181	100.0	385	100.0	235	100.0	250	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5－9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10－19	218	24.6	14	40.0	21	31.8	27	25.5	31	27.2	39	21.5	86	22.3	45	19.1	62	24.8
	20－29	472	53.2	13	37.1	29	43.9	53	50.0	58	50.9	104	57.5	215	55.8	139	59.1	134	53.6
	30－39	121	13.6	4	11.4	8	12.1	17	16.0	14	12.3	26	14.4	52	13.5	34	14.5	35	14.0
	40－49	37	4.2	3	8.6	3	4.5	4	3.8	5	4.4	6	3.3	16	4.2	7	3.0	10	4.0
	50IU/L以上	38	4.3	1	2.9	5	7.6	5	4.7	5	4.4	6	3.3	16	4.2	10	4.3	9	3.6
女 性	総 数	1,120	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	215	100.0	437	100.0	284	100.0	272	100.0
	5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5－9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	10－19	437	39.0	37	75.5	60	67.4	103	65.6	63	36.4	64	29.8	110	25.2	80	28.2	65	23.9
	20－29	565	50.4	10	20.4	25	28.1	47	29.9	88	50.9	127	59.1	268	61.3	168	59.2	169	62.1
	30－39	93	8.3	2	4.1	3	3.4	7	4.5	16	9.2	18	8.4	47	10.8	27	9.5	30	11.0
	40－49	12	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	3	1.4	7	1.6	4	1.4	5	1.8
	50IU/L以上	13	1.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	4	2.3	3	1.4	5	1.1	5	1.8	3	1.1

注) AST (GOT) の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 44 表の 2 AST (GOT) の平均値及び標準偏差－年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差－男性・女性, 20 歳以上

	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲)65－74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	887	26.1	12.0	35	24.8	10.4	66	26.2	12.7	106	26.2	11.6	114	25.8	12.2	181	25.4	9.3	385	26.5	13.2	235	26.3	11.8	250	26.1	12.9
女性	1,120	22.4	7.6	49	17.6	4.0	89	18.8	6.6	157	19.1	5.0	173	23.1	8.7	215	23.4	7.9	437	24.0	7.6	284	23.8	8.6	272	24.1	7.4

注) AST (GOT) の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 45 表の 1 ALT (GPT) の分布－ALT (GPT) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20 歳以上

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲)65－74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総 数	887	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	181	100.0	385	100.0	235	100.0	250	100.0
	5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0
	5－9	22	2.5	1	2.9	2	3.0	1	0.9	1	0.9	3	1.7	14	3.6	6	2.6	9	3.6
	10－19	372	41.9	17	48.6	22	33.3	30	28.3	31	27.2	72	39.8	200	51.9	96	40.9	145	58.0
	20－29	278	31.3	6	17.1	17	25.8	37	34.9	41	36.0	66	36.5	111	28.8	80	34.0	69	27.6
	30－39	92	10.4	2	5.7	5	7.6	16	15.1	22	19.3	21	11.6	26	6.8	24	10.2	14	5.6
	40－49	55	6.2	3	8.6	2	3.0	12	11.3	8	7.0	7	3.9	23	6.0	18	7.7	8	3.2
	50IU/L以上	67	7.6	6	17.1	18	27.3	10	9.4	11	9.6	12	6.6	10	2.6	10	4.3	5	2.0
女 性	総 数	1,120	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	215	100.0	437	100.0	284	100.0	272	100.0
	5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5－9	54	4.8	10	20.4	7	7.9	12	7.6	7	4.0	7	3.3	11	2.5	6	2.1	8	2.9
	10－19	700	62.5	31	63.3	55	61.8	112	71.3	99	57.2	124	57.7	279	63.8	180	63.4	178	65.4
	20－29	254	22.7	6	12.2	19	21.3	22	14.0	37	21.4	56	26.0	114	26.1	70	24.6	67	24.6
	30－39	71	6.3	0	0.0	3	3.4	9	5.7	21	12.1	17	7.9	21	4.8	15	5.3	14	5.1
	40－49	19	1.7	0	0.0	2	2.2	1	0.6	2	1.2	8	3.7	6	1.4	7	2.5	2	0.7
	50IU/L以上	21	1.9	2	4.1	2	2.2	1	0.6	7	4.0	3	1.4	6	1.4	6	2.1	3	1.1

注) ALT (GPT) の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 45 表の 2 ALT (GPT) の平均値及び標準偏差－年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差－男性・女性, 20 歳以上

	総数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲)65－74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	887	26.2	19.3	35	30.6	26.0	66	38.3	34.8	106	32.5	28.4	114	28.9	14.7	181	25.0	13.3	385	21.6	12.8	235	24.2	13.2	250	20.2	11.7
女性	1,120	18.8	10.0	49	14.6	10.0	89	17.3	11.9	157	16.5	7.8	173	20.9	12.2	215	20.5	10.3	437	18.8	8.8	284	19.6	10.2	272	18.4	8.6

注) ALT (GPT) の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(4 年)

第 48 表 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況－メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の疑い、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20 歳以上〔妊婦除外〕

	総 数	20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－74歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数		人数		人数		人数		人数		人数		人数		人数		人数	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
総 数	総 数	1,972	100.0	81	100.0	150	100.0	261	100.0	286	100.0	390	100.0	804	100.0	511	100.0	508	100.0
	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	346	17.5	1	1.2	9	6.0	20	7.7	29	10.1	80	20.5	207	25.7	115	22.5	136	26.8
	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	339	17.2	5	6.2	16	10.7	34	13.0	56	19.6	75	19.2	153	19.0	102	20.0	99	19.5
	上記以外	1,287	65.3	75	92.6	125	83.3	207	79.3	201	70.3	235	60.3	444	55.2	294	57.5	273	53.7
男 性	総 数	875	100.0	35	100.0	65	100.0	106	100.0	114	100.0	179	100.0	376	100.0	232	100.0	243	100.0
	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	246	28.1	1	2.9	9	13.8	14	13.2	25	21.9	56	31.3	141	37.5	77	33.2	94	38.7
	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	226	25.8	3	8.6	11	16.9	26	24.5	36	31.6	48	26.8	102	27.1	68	29.3	67	27.6
	上記以外	403	46.1	31	88.6	45	69.2	66	62.3	53	46.5	75	41.9	133	35.4	87	37.5	82	33.7
女 性	総 数	1,097	100.0	46	100.0	85	100.0	155	100.0	172	100.0	211	100.0	428	100.0	279	100.0	265	100.0
	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	100	9.1	0	0.0	0	0.0	6	3.9	4	2.3	24	11.4	66	15.4	38	13.6	42	15.8
	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	113	10.3	2	4.3	5	5.9	8	5.2	20	11.6	27	12.8	51	11.9	34	12.2	32	12.1
	上記以外	884	80.6	44	95.7	80	94.1	141	91.0	148	86.0	160	75.8	311	72.7	207	74.2	191	72.1

注 1) 血圧、腹囲、ヘモグロビン A1c、血清 HDL コレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬、コレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の服用状況にすべて回答し、かつインスリン注射又は血糖を下げる薬が有効回答であった 20 歳以上の者を集計対象とした。なお妊婦 2 名を除外した。（4 年）

注 2) 「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用」の判定は p.6 参照。

注 3) 「メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の疑い」の判定基準は p.16～17 参照

第49表の1 腹囲区分別、血中脂質、血圧、血糖のいずれかのリスクを有する割合－年齢階級、腹囲の区分、血中脂質・血圧・血糖のリスク保有数別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

		腹囲(cm)	総 数		リ ス ク 保 有 数							
					0		1つ		2つ		3つ	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	<85cm(男)/90cm(女)	1,150	100.0	518	45.0	423	36.8	168	14.6	41	3.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	822	100.0	137	16.7	339	41.2	243	29.6	103	12.5
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	65	100.0	63	96.9	2	3.1	0	0.0	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	16	100.0	10	62.5	5	31.3	1	6.3	0	0.0
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	101	100.0	82	81.2	17	16.8	2	2.0	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	49	100.0	24	49.0	16	32.7	9	18.4	0	0.0
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	179	100.0	140	78.2	36	20.1	2	1.1	1	0.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	82	100.0	28	34.1	34	41.5	16	19.5	4	4.9
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	174	100.0	101	58.0	61	35.1	9	5.2	3	1.7
		≥85cm(男)/90cm(女)	112	100.0	27	24.1	56	50.0	24	21.4	5	4.5
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	210	100.0	64	30.5	103	49.0	39	18.6	4	1.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	180	100.0	25	13.9	75	41.7	59	32.8	21	11.7
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	421	100.0	68	16.2	204	48.5	116	27.6	33	7.8
		≥85cm(男)/90cm(女)	383	100.0	23	6.0	153	39.9	134	35.0	73	19.1
	(再掲) 40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	719	100.0	342	47.6	281	39.1	83	11.5	13	1.8
		≥85cm(男)/90cm(女)	514	100.0	95	18.5	219	42.6	139	27.0	61	11.9
男 性	(再掲) 65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	264	100.0	61	23.1	133	50.4	62	23.5	8	3.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	247	100.0	30	12.1	102	41.3	70	28.3	45	18.2
	(再掲) 75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	265	100.0	31	11.7	123	46.4	83	31.3	28	10.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	243	100.0	8	3.3	99	40.7	94	38.7	42	17.3
	総 数	<85cm	313	100.0	127	40.6	136	43.5	43	13.7	7	2.2
		≥85cm	562	100.0	90	16.0	226	40.2	174	31.0	72	12.8
	20-29歳	<85cm	23	100.0	21	91.3	2	8.7	0	0.0	0	0.0
		≥85cm	12	100.0	8	66.7	3	25.0	1	8.3	0	0.0
	30-39歳	<85cm	27	100.0	18	66.7	9	33.3	0	0.0	0	0.0
		≥85cm	38	100.0	18	47.4	11	28.9	9	23.7	0	0.0
	40-49歳	<85cm	51	100.0	38	74.5	13	25.5	0	0.0	0	0.0
		≥85cm	55	100.0	15	27.3	26	47.3	11	20.0	3	5.5
	50-59歳	<85cm	36	100.0	18	50.0	15	41.7	3	8.3	0	0.0
		≥85cm	78	100.0	17	21.8	36	46.2	20	25.6	5	6.4
	60-69歳	<85cm	58	100.0	13	22.4	35	60.3	10	17.2	0	0.0
		≥85cm	121	100.0	17	14.0	48	39.7	41	33.9	15	12.4
	70歳以上	<85cm	118	100.0	19	16.1	62	52.5	30	25.4	7	5.9
		≥85cm	258	100.0	15	5.8	102	39.5	92	35.7	49	19.0
女 性	(再掲) 40-74歳	<85cm	186	100.0	81	43.5	87	46.8	18	9.7	0	0.0
		≥85cm	346	100.0	59	17.1	145	41.9	98	28.3	44	12.7
	(再掲) 65-74歳	<85cm	67	100.0	17	25.4	39	58.2	11	16.4	0	0.0
		≥85cm	165	100.0	20	12.1	68	41.2	46	27.9	31	18.8
	(再掲) 75歳以上	<85cm	77	100.0	7	9.1	38	49.4	25	32.5	7	9.1
		≥85cm	166	100.0	5	3.0	67	40.4	66	39.8	28	16.9
	総 数	<90cm	837	100.0	391	46.7	287	34.3	125	14.9	34	4.1
		≥90cm	260	100.0	47	18.1	113	43.5	69	26.5	31	11.9
	20-29歳	<90cm	42	100.0	42	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	4	100.0	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	<90cm	74	100.0	64	86.5	8	10.8	2	2.7	0	0.0
		≥90cm	11	100.0	6	54.5	5	45.5	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	<90cm	128	100.0	102	79.7	23	18.0	2	1.6	1	0.8
		≥90cm	27	100.0	13	48.1	8	29.6	5	18.5	1	3.7
	50-59歳	<90cm	138	100.0	83	60.1	46	33.3	6	4.3	3	2.2
		≥90cm	34	100.0	10	29.4	20	58.8	4	11.8	0	0.0
	60-69歳	<90cm	152	100.0	51	33.6	68	44.7	29	19.1	4	2.6
		≥90cm	59	100.0	8	13.6	27	45.8	18	30.5	6	10.2
	70歳以上	<90cm	303	100.0	49	16.2	142	46.9	86	28.4	26	8.6
		≥90cm	125	100.0	8	6.4	51	40.8	42	33.6	24	19.2
	(再掲) 40-74歳	<90cm	533	100.0	261	49.0	194	36.4	65	12.2	13	2.4
		≥90cm	168	100.0	36	21.4	74	44.0	41	24.4	17	10.1
	(再掲) 65-74歳	<90cm	197	100.0	44	22.3	94	47.7	51	25.9	8	4.1
		≥90cm	82	100.0	10	12.2	34	41.5	24	29.3	14	17.1
	(再掲) 75歳以上	<90cm	188	100.0	24	12.8	85	45.2	58	30.9	21	11.2
		≥90cm	77	100.0	3	3.9	32	41.6	28	36.4	14	18.2

注1) 血圧、腹囲、ヘモグロビンA1c、血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下

げる薬、コレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況に回答し、かつインスリン注射又は血糖を下げる薬が有効回答であった20歳以上の者を集計対象とした。なお、妊婦6名を除外した。

注2) 「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用」の判定はp.6参照。

注3) リスクの項目の基準はp.17参照。

第 50 表 糖尿病の指摘の有無－糖尿病の指摘の有無，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20 歳以上

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－74歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	1,995	100.0	84	100.0	155	100.0	263	100.0	287	100.0	394	100.0	812	100.0	1,242	100.0	516	100.0	514	100.0
	あ り	366	18.3	1	1.2	8	5.2	20	7.6	36	12.5	93	23.6	208	25.6	219	17.6	129	25.0	138	26.8
	な し	1,629	81.7	83	98.8	147	94.8	243	92.4	251	87.5	301	76.4	604	74.4	1,023	82.4	387	75.0	376	73.2
男 性	総 数	882	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	180	100.0	381	100.0	534	100.0	234	100.0	247	100.0
	あ り	216	24.5	1	2.9	3	4.5	10	9.4	25	21.9	51	28.3	126	33.1	126	23.6	69	29.5	86	34.8
	な し	666	75.5	34	97.1	63	95.5	96	90.6	89	78.1	129	71.7	255	66.9	408	76.4	165	70.5	161	65.2
女 性	総 数	1,113	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	214	100.0	431	100.0	708	100.0	282	100.0	267	100.0
	あ り	150	13.5	0	0.0	5	5.6	10	6.4	11	6.4	42	19.6	82	19.0	93	13.1	60	21.3	52	19.5
	な し	963	86.5	49	100.0	84	94.4	147	93.6	162	93.6	172	80.4	349	81.0	615	86.9	222	78.7	215	80.5

注) ヘモグロビン A1c の測定値があり，身体状況調査の問診において「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に回答した者を集計対象とした。(4 年)

第 51 表 糖尿病を指摘されたことがある者における治療の有無，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20 歳以上

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－74歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	366	100.0	1	100.0	8	100.0	20	100.0	36	100.0	93	100.0	208	100.0	219	100.0	129	100.0	138	100.0
	あ り	222	60.7	0	0.0	2	25.0	8	40.0	19	52.8	54	58.1	139	66.8	125	57.1	80	62.0	95	68.8
	な し	144	39.3	1	100.0	6	75.0	12	60.0	17	47.2	39	41.9	69	33.2	94	42.9	49	38.0	43	31.2
男 性	総 数	216	100.0	1	100.0	3	100.0	10	100.0	25	100.0	51	100.0	126	100.0	126	100.0	69	100.0	86	100.0
	あ り	146	67.6	0	0.0	0	0.0	5	50.0	15	60.0	35	68.6	91	72.2	87	69.0	52	75.4	59	68.6
	な し	70	32.4	1	100.0	3	100.0	5	50.0	10	40.0	16	31.4	35	27.8	39	31.0	17	24.6	27	31.4
女 性	総 数	150	100.0	0	0.0	5	100.0	10	100.0	11	100.0	42	100.0	82	100.0	93	100.0	60	100.0	52	100.0
	あ り	76	50.7	0	0.0	2	40.0	3	30.0	4	36.4	19	45.2	48	58.5	38	40.9	28	46.7	36	69.2
	な し	74	49.3	0	0.0	3	60.0	7	70.0	7	63.6	23	54.8	34	41.5	55	59.1	32	53.3	16	30.8

注 1) ヘモグロビン A1c の測定値があり，身体状況調査の問診において「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」及び「(7－1) 現在の糖尿病の治療の有無」が有効回答の者のうち，「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。(4 年)

第 52 表 現在，糖尿病治療をしている者における投薬の有無－投薬の有無，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20 歳以上

		総数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－74歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	222	100.0	0	0.0	2	100.0	8	100.0	19	100.0	54	100.0	139	100.0	125	100.0	80	100.0	95	100.0
	インスリン注射又は 血糖を下げる薬	170	76.6	0	0.0	2	100.0	6	75.0	13	68.4	37	68.5	112	80.6	92	73.6	59	73.8	76	80.0
	なし	52	23.4	0	0.0	0	0.0	2	25.0	6	31.6	17	31.5	27	19.4	33	26.4	21	26.3	19	20.0
男 性	総数	146	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	15	100.0	35	100.0	91	100.0	87	100.0	52	100.0	59	100.0
	インスリン注射又は 血糖を下げる薬	114	78.1	0	0.0	0	0.0	5	100.0	11	73.3	22	62.9	76	83.5	65	74.7	38	73.1	49	83.1
	なし	32	21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	26.7	13	37.1	15	16.5	22	25.3	14	26.9	10	16.9
女 性	総数	76	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	4	100.0	19	100.0	48	100.0	38	100.0	28	100.0	36	100.0
	インスリン注射又は 血糖を下げる薬	56	73.7	0	0.0	2	100.0	1	33.3	2	50.0	15	78.9	36	75.0	27	71.1	21	75.0	27	75.0
	なし	20	26.3	0	0.0	0	0.0	2	66.7	2	50.0	4	21.1	12	25.0	11	28.9	7	25.0	9	25.0

注 1) ヘモグロビン A1c の測定値があり，身体状況調査の問診において「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」，「(7－1) 現在の糖尿病の治療の有無」，
及び「(7－2) 現在の投薬」が有効回答の者のうち，「(7－1) 現在の糖尿病の治療の有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。
注 2) 「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用」の判定は p.6 参照。

第 53 表 現在，糖尿病治療をしている者における生活習慣の改善の取組の有無－生活習慣の改善の取組の有無，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20 歳以上

		総数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－74歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	221	100.0	0	0.0	2	100.0	8	100.0	19	100.0	53	100.0	139	100.0	124	100.0	79	100.0	95	100.0
	あり	164	74.2	0	0.0	1	50.0	7	87.5	16	84.2	39	73.6	101	72.7	96	77.4	59	74.7	67	70.5
	なし	57	25.8	0	0.0	1	50.0	1	12.5	3	15.8	14	26.4	38	27.3	28	22.6	20	25.3	28	29.5
男 性	総数	145	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	15	100.0	34	100.0	91	100.0	86	100.0	51	100.0	59	100.0
	あり	109	75.2	0	0.0	0	0.0	5	100.0	14	93.3	24	70.6	66	72.5	67	77.9	37	72.5	42	71.2
	なし	36	24.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	10	29.4	25	27.5	19	22.1	14	27.5	17	28.8
女 性	総数	76	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	4	100.0	19	100.0	48	100.0	38	100.0	28	100.0	36	100.0
	あり	55	72.4	0	0.0	1	50.0	2	66.7	2	50.0	15	78.9	35	72.9	29	76.3	22	78.6	25	69.4
	なし	21	27.6	0	0.0	1	50.0	1	33.3	2	50.0	4	21.1	13	27.1	9	23.7	6	21.4	11	30.6

注 1) ヘモグロビン A1c の測定値があり，身体状況調査の問診において「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」，「(7－1) 現在の糖尿病の治療の有無」，
「(7－2) 現在の投薬」及び「(7－3) 生活改善の取組の状況」が有効回答の者のうち，「(7－1) 現在の糖尿病の治療の有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。
注 2) 「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用」の判定は p.6 参照。

第 54 表 「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況－糖尿病が疑われる者の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20 歳以上

	総 数	20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－74歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	1,995	100.0	84	100.0	155	100.0	263	100.0	287	100.0	394	100.0	812	100.0	516	100.0	514	100.0
	糖尿病が強く疑われる者	261	13.1	0	0.0	2	1.3	10	3.8	21	7.3	57	14.5	171	21.1	92	17.8	117	22.8
	(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者*	170	65.1	0	0.0	2	100.0	6	60.0	13	61.9	37	64.9	112	65.5	59	64.1	76	65.0
	糖尿病の可能性を否定できない者	112	5.6	0	0.0	5	3.2	10	3.8	13	4.5	22	5.6	62	7.6	32	6.2	46	8.9
男 性	上記以外	1,622	81.3	84	100.0	148	95.5	243	92.4	253	88.2	315	79.9	579	71.3	392	76.0	351	68.3
	総 数	882	100.0	35	100.0	66	100.0	106	100.0	114	100.0	180	100.0	381	100.0	234	100.0	247	100.0
	糖尿病が強く疑われる者	160	18.1	0	0.0	0	0.0	5	4.7	16	14.0	36	20.0	103	27.0	55	23.5	68	27.5
	(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者*	114	71.3	0	0.0	0	0.0	5	100.0	11	68.8	22	61.1	76	73.8	38	69.1	49	72.1
女 性	糖尿病の可能性を否定できない者	53	6.0	0	0.0	3	4.5	5	4.7	6	5.3	9	5.0	30	7.9	13	5.6	25	10.1
	上記以外	669	75.9	35	100.0	63	95.5	96	90.6	92	80.7	135	75.0	248	65.1	166	70.9	154	62.3
	総 数	1,113	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	214	100.0	431	100.0	282	100.0	267	100.0
	糖尿病が強く疑われる者	101	9.1	0	0.0	2	2.2	5	3.2	5	2.9	21	9.8	68	15.8	37	13.1	49	18.4
	(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者*	56	55.4	0	0.0	2	100.0	1	20.0	2	40.0	15	71.4	36	52.9	21	56.8	27	55.1
	糖尿病の可能性を否定できない者	59	5.3	0	0.0	2	2.2	5	3.2	7	4.0	13	6.1	32	7.4	19	6.7	21	7.9
	上記以外	953	85.6	49	100.0	85	95.5	147	93.6	161	93.1	180	84.1	331	76.8	226	80.1	197	73.8

注 1) 身体状況調査においてヘモグロビン A1c の測定値があり、身体状況調査の問診において「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1) 現在の糖尿病の治療の有無」及び「(7-2) 現在の投薬」が有効回答の者を集計対象とした。

注 2) 判定基準は p.17 参照。
* 「服薬者」は、「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用」の判定 p.6 参照。

※ 年齢調整した、糖尿病が強く疑われる者の割合 (20 歳以上) は、総数 88%, 男性 11.9%, 女性 6.3%。
年齢調整値は、平成 22 年国勢調査による基準人口 (20-29 歳、30-39 歳、40-49 歳、50-59 歳、60-69 歳、70 歳以上の 6 区分) を用いて算出した。

「糖尿病が強く疑われる者」の判定
ヘモグロビン A1c の測定値があり、身体状況調査票 (7)、(7-1) 及び (7-2) が有効回答の者のうち、ヘモグロビン A1c (NGSP) の値が 6.5% 以上、または、身体状況調査票の (7-1) 「現在の糖尿病の治療の有無」に「有」と回答した者
「糖尿病の可能性を否定できない者」の判定
ヘモグロビン A1c の測定値がある者のうち、ヘモグロビン A1c (NGSP) 値が 6.0% 以上、6.5% 未満で、“糖尿病が強く疑われる者” 以外の者

第55表 「糖尿病が強く疑われる者」における治療の有無－糖尿病の治療の有無、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総 数	20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－74歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	261	100.0	0	0.0	2	100.0	10	100.0	21	100.0	57	100.0	142	100.0	92	100.0	117	100.0
	あ り*	222	85.1	0	0.0	2	100.0	8	80.0	19	90.5	54	94.7	125	88.0	80	87.0	95	81.2
	な し	39	14.9	0	0.0	0	0.0	2	20.0	2	9.5	3	5.3	17	12.0	12	13.0	22	18.8
男 性	総 数	160	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	16	100.0	36	100.0	92	100.0	55	100.0	68	100.0
	あ り*	146	91.3	0	0.0	0	0.0	5	100.0	15	93.8	35	97.2	87	94.6	52	94.5	59	86.8
	な し	14	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	2.8	5	5.4	3	5.5	9	13.2
女 性	総 数	101	100.0	0	0.0	2	100.0	5	100.0	5	100.0	21	100.0	50	100.0	37	100.0	49	100.0
	あ り*	76	75.2	0	0.0	2	100.0	3	60.0	4	80.0	19	90.5	38	76.0	28	75.7	36	73.5
	な し	25	24.8	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	20.0	2	9.5	12	24.0	9	24.3	13	26.5

注1) 身体状況調査においてヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査の問診において「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」及び

「(7-1) 現在の糖尿病の治療の有無」が有効回答の者を集計対象とした。

注2) 「糖尿病が強く疑われる者」の判定基準はp.17 参照。

※身体状況調査票の問診(7-1)「現在糖尿病の治療の有無(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)」に「有」と回答した者を治療ありとした。

(4年)

第56表 高血圧症有病者の状況－高血圧症有病者の状況，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総数	20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－74歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		2137	100.0	92	100.0	162	100.0	275	100.0	298	100.0	415	100.0	1318	100.0	558	100.0	565	100.0
総数	高血圧症有病者	1,024	47.9	2	2.2	17	10.5	53	19.3	102	34.2	213	51.3	578	43.9	334	59.9	427	75.6
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	702	68.6	0	0.0	5	29.4	25	47.2	49	48.0	134	62.9	356	61.6	231	69.2	341	79.9
	高値血圧者	351	16.4	7	7.6	36	22.2	60	21.8	69	23.2	80	19.3	249	18.9	80	14.3	59	10.4
	正常高値血圧者	214	10.0	7	7.6	10	6.2	31	11.3	34	11.4	53	12.8	157	11.9	69	12.4	40	7.1
	上記以外	548	25.6	76	82.6	99	61.1	131	47.6	93	31.2	69	16.6	334	25.3	75	13.4	39	6.9
男性	総数	936	100.0	37	100.0	69	100.0	112	100.0	119	100.0	189	100.0	565	100.0	249	100.0	265	100.0
	高血圧症有病者	510	54.5	1	2.7	12	17.4	27	24.1	52	43.7	116	61.4	290	51.3	162	65.1	207	78.1
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	348	68.2	0	0.0	4	33.3	14	51.9	25	48.1	73	62.9	179	61.7	111	68.5	165	79.7
	高値血圧者	178	19.0	6	16.2	21	30.4	40	35.7	35	29.4	32	16.9	122	21.6	29	11.6	29	10.9
	正常高値血圧者	88	9.4	5	13.5	7	10.1	13	11.6	11	9.2	20	10.6	62	11.0	31	12.4	14	5.3
	上記以外	160	17.1	25	67.6	29	42.0	32	28.6	21	17.6	21	11.1	91	16.1	27	10.8	15	5.7
女性	総数	1,201	100.0	55	100.0	93	100.0	163	100.0	179	100.0	226	100.0	753	100.0	309	100.0	300	100.0
	高血圧症有病者	514	42.8	1	1.8	5	5.4	26	16.0	50	27.9	97	42.9	288	38.2	172	55.7	220	73.3
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	354	68.9	0	0.0	1	20.0	11	42.3	24	48.0	61	62.9	177	61.5	120	69.8	176	80.0
	高値血圧者	173	14.4	1	1.8	15	16.1	20	12.3	34	19.0	48	21.2	127	16.9	51	16.5	30	10.0
	正常高値血圧者	126	10.5	2	3.6	3	3.2	18	11.0	23	12.8	33	14.6	95	12.6	38	12.3	26	8.7
	上記以外	388	32.3	51	92.7	70	75.3	99	60.7	72	40.2	48	21.2	243	32.3	48	15.5	24	8.0

注1) 血圧の測定を行い，身体状況調査の問診において「(6)(a) 血圧を下げる薬」に回答をしている者を集計対象とした。
注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお，1回しか測定できなかった者については，その値を採用した。
* 「服薬者」とは，身体状況調査の問診において「(6)(a) 血圧を下げる薬」に「有」と回答した者。

(4年)

「高血圧症有病者」の判定
収縮期血圧 140mmHg 以上，または拡張期血圧 90mmHg 以上，もしくは血圧を下げる薬を服用している者
「高値血圧者」の判定
収縮期血圧 130-139mmHg，かつ／または拡張期血圧 80-89mmHg で，血圧を下げる薬を服用していない者
「正常高値血圧者」の判定
収縮期血圧 120-129mmHg，かつ拡張期血圧 80mmHg 未満で，血圧を下げる薬を服用していない者

第 57 表 「脂質異常症が疑われる者」の状況－脂質異常症が疑われる者の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20 歳以上

	総 数	20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 40－74歳		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数		人数		人数		人数		人数		人数		人数		人数		人数	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
総 数	総 数	2,002	100.0	84	100.0	154	100.0	263	100.0	287	100.0	396	100.0	818	100.0	1,245	100.0	518	100.0
	脂質異常症が疑われる者	518	25.9	3	3.6	15	9.7	21	8.0	42	14.6	123	31.1	314	38.4	294	23.6	181	34.9
	(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	432	83.4	0	0.0	3	20.0	11	52.4	40	95.2	105	85.4	273	86.9	251	85.4	156	86.2
	上記以外	1,484	74.1	81	96.4	139	90.3	242	92.0	245	85.4	273	68.9	504	61.6	951	76.4	337	65.1
男 性	総 数	885	100.0	35	100.0	65	100.0	106	100.0	114	100.0	181	100.0	384	100.0	536	100.0	235	100.0
	脂質異常症が疑われる者	256	28.9	3	8.6	13	20.0	13	12.3	22	19.3	63	34.8	142	37.0	147	27.4	84	35.7
	(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	188	73.4	0	0.0	2	15.4	7	53.8	21	95.5	49	77.8	109	76.8	115	78.2	64	76.2
	上記以外	629	71.1	32	91.4	52	80.0	93	87.7	92	80.7	118	65.2	242	63.0	389	72.6	151	64.3
女 性	総 数	1,117	100.0	49	100.0	89	100.0	157	100.0	173	100.0	215	100.0	434	100.0	709	100.0	283	100.0
	脂質異常症が疑われる者	262	23.5	0	0.0	2	2.2	8	5.1	20	11.6	60	27.9	172	39.6	147	20.7	97	34.3
	(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	244	93.1	0	0.0	1	50.0	4	50.0	19	95.0	56	93.3	164	95.3	136	92.5	92	94.8
	上記以外	855	76.5	49	100.0	87	97.8	149	94.9	153	88.4	155	72.1	262	60.4	562	79.3	186	65.7

注 1) HDL コレステロールを測定し、身体状況調査の問診において「(6) (c) コレステロールを下げる薬」、「(6) (d) 中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬」の使用状況に回答した者を集計対象とした。

* 「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6) (c) コレステロールを下げる薬」、「(6) (d) 中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬」に使用「有」と回答した者。

「脂質異常症が疑われる者」の判定
国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記のとおりとした。
HDL コレステロールが 40mg/dL 未満、もしくはコレステロールを下げる薬または中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬を服用している者。

第58表 運動禁止の有無－運動禁止の有無，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総数	20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 20－64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	2,514	100.0	119	100.0	212	100.0	338	100.0	367	100.0	483	100.0	995	100.0	1,257	100.0	623	100.0	634	100.0
	運動禁止の有	29	1.2	0	0.0	2	0.9	2	0.6	2	0.5	7	1.4	16	1.6	18	1.4	9	1.4	9	1.4
	運動禁止の無	2,485	98.8	119	100.0	210	99.1	336	99.4	365	99.5	476	98.6	979	98.4	1,239	98.6	614	98.6	625	98.6
男性	総数	1,121	100.0	53	100.0	100	100.0	141	100.0	151	100.0	224	100.0	452	100.0	549	100.0	279	100.0	293	100.0
	運動禁止の有	14	1.2	0	0.0	1	1.0	2	1.4	0	0.0	3	1.3	8	1.8	5	0.9	5	1.8	4	1.4
	運動禁止の無	1,107	98.8	53	100.0	99	99.0	139	98.6	151	100.0	221	98.7	444	98.2	544	99.1	274	98.2	289	98.6
女性	総数	1,393	100.0	66	100.0	112	100.0	197	100.0	216	100.0	259	100.0	543	100.0	708	100.0	344	100.0	341	100.0
	運動禁止の有	15	1.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	0.9	4	1.5	8	1.5	6	0.8	4	1.2	5	1.5
	運動禁止の無	1,378	98.9	66	100.0	111	99.1	197	100.0	214	99.1	255	98.5	535	98.5	702	99.2	340	98.8	336	98.5

注) 身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に回答した者を集計対象とした。(4年)

第59表 1週間の運動日数－1週間の運動日数，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 20－64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総 数	総 数	2,479	100.0	119	100.0	208	100.0	334	100.0	364	100.0	475	100.0	979	100.0	1,240	100.0	1,239	100.0	614	100.0	625	100.0
	運動無し	1,159	46.8	71	59.7	123	59.1	205	61.4	188	51.6	228	48.0	344	35.1	695	56.0	464	37.4	256	41.7	208	33.3
	1日/週	189	7.6	15	12.6	24	11.5	22	6.6	31	8.5	42	8.8	55	5.6	116	9.4	73	5.9	40	6.5	33	5.3
	2日/週	216	8.7	9	7.6	13	6.3	28	8.4	37	10.2	38	8.0	91	9.3	97	7.8	119	9.6	57	9.3	62	9.9
	3日/週	217	8.8	10	8.4	14	6.7	23	6.9	27	7.4	35	7.4	108	11.0	89	7.2	128	10.3	65	10.6	63	10.1
	4日/週	102	4.1	5	4.2	8	3.8	15	4.5	14	3.8	17	3.6	43	4.4	49	4.0	53	4.3	25	4.1	28	4.5
	5日/週	137	5.5	6	5.0	13	6.3	14	4.2	28	7.7	24	5.1	52	5.3	73	5.9	64	5.2	32	5.2	32	5.1
	6日/週	59	2.4	0	0.0	2	1.0	4	1.2	5	1.4	17	3.6	31	3.2	17	1.4	42	3.4	22	3.6	20	3.2
男 性	7日/週	400	16.1	3	2.5	11	5.3	23	6.9	34	9.3	74	15.6	255	26.0	104	8.4	296	23.9	117	19.1	179	28.6
	総 数	1,104	100.0	53	100.0	98	100.0	138	100.0	151	100.0	220	100.0	444	100.0	541	100.0	563	100.0	274	100.0	289	100.0
	運動無し	507	45.9	29	54.7	53	54.1	87	63.0	79	52.3	112	50.9	147	33.1	304	56.2	203	36.1	114	41.6	89	30.8
	1日/週	92	8.3	8	15.1	14	14.3	11	8.0	14	9.3	19	8.6	26	5.9	60	11.1	32	5.7	15	5.5	17	5.9
	2日/週	91	8.2	5	9.4	8	8.2	9	6.5	22	14.6	17	7.7	30	6.8	49	9.1	42	7.5	21	7.7	21	7.3
	3日/週	92	8.3	6	11.3	8	8.2	10	7.2	7	4.6	15	6.8	46	10.4	35	6.5	57	10.1	29	10.6	28	9.7
	4日/週	43	3.9	4	7.5	3	3.1	6	4.3	6	4.0	8	3.6	16	3.6	21	3.9	22	3.9	14	5.1	8	2.8
	5日/週	64	5.8	1	1.9	8	8.2	4	2.9	10	6.6	15	6.8	26	5.9	30	5.5	34	6.0	19	6.9	15	5.2
女 性	6日/週	26	2.4	0	0.0	1	1.0	3	2.2	2	1.3	5	2.3	15	3.4	9	1.7	17	3.0	7	2.6	10	3.5
	7日/週	189	17.1	0	0.0	3	3.1	8	5.8	11	7.3	29	13.2	138	31.1	33	6.1	156	27.7	55	20.1	101	34.9
	総 数	1,375	100.0	66	100.0	110	100.0	196	100.0	213	100.0	255	100.0	535	100.0	699	100.0	676	100.0	340	100.0	336	100.0
	運動無し	652	47.4	42	63.6	70	63.6	118	60.2	109	51.2	116	45.5	197	36.8	391	55.9	261	38.6	142	41.8	119	35.4
	1日/週	97	7.1	7	10.6	10	9.1	11	5.6	17	8.0	23	9.0	29	5.4	56	8.0	41	6.1	25	7.4	16	4.8
	2日/週	125	9.1	4	6.1	5	4.5	19	9.7	15	7.0	21	8.2	61	11.4	48	6.9	77	11.4	36	10.6	41	12.2
	3日/週	125	9.1	4	6.1	6	5.5	13	6.6	20	9.4	20	7.8	62	11.6	54	7.7	71	10.5	36	10.6	35	10.4
	4日/週	59	4.3	1	1.5	5	4.5	9	4.6	8	3.8	9	3.5	27	5.0	28	4.0	31	4.6	11	3.2	20	6.0
	5日/週	73	5.3	5	7.6	5	4.5	10	5.1	18	8.5	9	3.5	26	4.9	43	6.2	30	4.4	13	3.8	17	5.1
	6日/週	33	2.4	0	0.0	1	0.9	1	0.5	3	1.4	12	4.7	16	3.0	8	1.1	25	3.7	15	4.4	10	3.0
	7日/週	211	15.3	3	4.5	8	7.3	15	7.7	23	10.8	45	17.6	117	21.9	71	10.2	140	20.7	62	18.2	78	23.2

注) 身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、(9)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。

第 60 表 運動を行う日の平均運動時間－運動を行う日の平均運動時間の区分、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20 歳以上

	総数	20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 20－64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
	総数	1,320	100.0	48	100.0	85	100.0	129	100.0	176	100.0	635	100.0	545	100.0	775	100.0	358	100.0	417	100.0
総 数	30分未満	170	12.9	3	6.3	10	11.8	13	10.1	24	13.6	77	12.1	67	12.3	103	13.3	44	12.3	59	14.1
	30分以上60分未満	439	33.3	19	39.6	28	32.9	43	33.3	53	30.1	221	34.8	177	32.5	262	33.8	114	31.8	148	35.5
	60分以上120分未満	490	37.1	17	35.4	35	41.2	47	36.4	64	36.4	239	37.6	207	38.0	283	36.5	131	36.6	152	36.5
	120分以上180分未満	134	10.2	8	16.7	9	10.6	19	14.7	18	10.2	54	8.5	61	11.2	73	9.4	37	10.3	36	8.6
	180分以上	87	6.6	1	2.1	3	3.5	7	5.4	17	9.7	44	6.9	33	6.1	54	7.0	32	8.9	22	5.3
男 性	総数	597	100.0	24	100.0	45	100.0	51	100.0	72	100.0	297	100.0	237	100.0	360	100.0	160	100.0	200	100.0
	30分未満	61	10.2	1	4.2	5	11.1	3	5.9	8	11.1	27	9.1	21	8.9	40	11.1	19	11.9	21	10.5
	30分以上60分未満	164	27.5	7	29.2	13	28.9	11	21.6	16	22.2	90	30.3	60	25.3	104	28.9	39	24.4	65	32.5
	60分以上120分未満	246	41.2	10	41.7	21	46.7	25	49.0	31	43.1	120	40.4	109	46.0	137	38.1	56	35.0	81	40.5
	120分以上180分未満	75	12.6	6	25.0	3	6.7	9	17.6	9	12.5	31	10.4	30	12.7	45	12.5	24	15.0	21	10.5
女 性	総数	723	100.0	24	100.0	40	100.0	78	100.0	104	100.0	338	100.0	308	100.0	415	100.0	198	100.0	217	100.0
	30分未満	109	15.1	2	8.3	5	12.5	10	12.8	16	15.4	50	14.8	46	14.9	63	15.2	25	12.6	38	17.5
	30分以上60分未満	275	38.0	12	50.0	15	37.5	32	41.0	37	35.6	131	38.8	117	38.0	158	38.1	75	37.9	83	38.2
	60分以上120分未満	244	33.7	7	29.2	14	35.0	22	28.2	33	31.7	119	35.2	98	31.8	146	35.2	75	37.9	71	32.7
	120分以上180分未満	59	8.2	2	8.3	6	15.0	10	12.8	9	8.7	23	6.8	31	10.1	28	6.7	13	6.6	15	6.9
総 数	総数	36	5.0	1	4.2	0	0.0	4	5.1	9	8.7	15	4.4	16	5.2	20	4.8	10	5.1	10	4.6

注) 身体状況調査の問診において (8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、(9)のすべての質問に回答した者のうち、(9) (a)「1 週間の運動日数」が 1 日以上と回答した者を集計対象とした。(4 年)

第 61 表 運動習慣の有無－運動習慣の有無、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20 歳以上

	総数	20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上		(再掲) 20－64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65－74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
	総数	2,479	100.0	119	100.0	208	100.0	334	100.0	364	100.0	979	100.0	1,240	100.0	1,239	100.0	614	100.0	625	100.0
総 数	運動の習慣有	825	33.3	20	16.8	38	18.3	79	23.7	102	28.0	454	46.4	288	23.2	537	43.3	248	40.4	289	46.2
	運動の習慣無	1,654	66.7	99	83.2	170	81.7	255	76.3	262	72.0	525	53.6	952	76.8	702	56.7	366	59.6	336	53.8
男 性	総数	1,104	100.0	53	100.0	98	100.0	138	100.0	151	100.0	444	100.0	541	100.0	563	100.0	274	100.0	289	100.0
	運動の習慣有	392	35.5	10	18.9	20	20.4	31	22.5	47	31.1	222	50.0	129	23.8	263	46.7	115	42.0	148	51.2
	運動の習慣無	712	64.5	43	81.1	78	79.6	107	77.5	104	68.9	222	50.0	412	76.2	300	53.3	159	58.0	141	48.8
女 性	総数	1,375	100.0	66	100.0	110	100.0	196	100.0	213	100.0	535	100.0	699	100.0	676	100.0	340	100.0	336	100.0
	運動の習慣有	433	31.5	10	15.2	18	16.4	48	24.5	55	25.8	232	43.4	159	22.7	274	40.5	133	39.1	141	42.0
	運動の習慣無	942	68.5	56	84.8	92	83.6	148	75.5	158	74.2	303	56.6	540	77.3	402	59.5	207	60.9	195	58.0

注) 身体状況調査の問診において (8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、(9)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。(4 年)
※「運動の習慣有」とは、身体状況調査の問診 (9)で1 回 30 分以上の運動を週 2 回以上実施し、1 年以上継続していると回答した者。
※年齢調整した、運動習慣のある者の割合 (20 歳以上)は、総数 27.8%、男性 29.5%、女性 26.4%。
年齢調整値は、平成 22 年国勢調査による基準人口 (20-29 歳、30-39 歳、40-49 歳、50-59 歳、60-69 歳、70 歳以上の 6 区分) を用いて算出した。

第 62 表 歩数の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－総数・男性・女性，20 歳以上

	総 数			20－29歳			30－39歳			40－49歳			50－59歳			60－69歳			70歳以上			(再掲) 20－64歳			(再掲) 65歳以上			(再掲) 65－74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総 数	4,139	6,118	4,059	291	6,869	4,516	405	6,984	4,227	660	7,028	3,936	701	7,138	4,215	746	6,244	3,880	1,336	4,637	3,516	2,415	6,901	4,094	1,724	5,022	3,745	904	5,821	3,823	820	4,141	3,451
男 性	1,912	6,465	4,360	128	7,445	5,440	185	7,699	4,854	318	7,345	4,327	322	7,589	4,486	349	6,361	4,006	610	4,893	3,555	1,118	7,323	4,511	794	5,257	3,828	428	5,985	3,970	366	4,407	3,472
女 性	2,227	5,820	3,757	163	6,417	3,584	220	6,383	3,518	342	6,733	3,515	379	6,754	3,936	397	6,142	3,768	726	4,422	3,471	1,297	6,536	3,660	930	4,821	3,663	476	5,675	3,684	454	3,926	3,422

注) 栄養摂取状況調査票の身体状況「1 日の身体活動数 (歩数)」及び「歩数計の装着状況」の両方に回答した者を集計対象とした。なお、歩数が 100 歩未満又は 50,000 歩以上の者を除外した。(4 年)
※年齢調整した、歩数の平均値 (20 歳以上) は、総数 6,396 歩/日、男性 6,790 歩/日、女性 6,063 歩/日。
年齢調整値は、平成 22 年国勢調査による基準人口 (20－29 歳、30－39 歳、40－49 歳、50－59 歳、60－69 歳、70 歳以上の 6 区分) を用いて算出した。