

スイッチOTC医薬品の候補となる成分の要望状況について(平成29年度要望)

No.	要望番号	要望者	成分名	要望する効能・効果	要望のあった成分に対応する医療用医薬品の情報				備考
					販売名	会社名	効能・効果	用法・用量	
1	H29-5	個人	レボセチリジン	鼻炎、皮膚炎	ザイザル錠 5mg ザイザルシ ロップ0.05%	グラクソ・スミ スクライン株 式会社	アレルギー性鼻炎 蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、発疹、皮膚そう痒 症	[錠剤] 通常、成人にはレボセチリジン塩酸塩として1回5mg を1日1回、就寝前に経口投与する。なお、年齢、症状 により適宜増減するが、最高投与量は1日10mgとす る。 [シロップ剤] 通常、成人には1回10mL(レボセチリジン塩酸塩とし て5mg)を1日1回、就寝前に経口投与する。なお、年 齢、症状により適宜増減するが、最高投与量は1日 20mL(レボセチリジン塩酸塩として10mg)とする。	
2	H29-8	個人	トレチノイン トコ フェリル	床ずれ	オルセノン軟 膏0.25%	株式会社 ポーラファル マ	褥瘡、皮膚潰瘍(熱傷潰瘍、糖尿病性潰 瘍、下腿潰瘍)	症状及び病巣の大きさに応じて適量を使用する。 潰瘍面を清拭後、1日1~2回ガーゼなどにのぼして 貼布するか、又は患部に直接塗布する。	
3	H29-9	個人 以外	酒石酸トルテロジ ン	女性の突然起こる我慢できない 強い尿意およびそれを伴う尿失 禁、頻尿	デトルシトール カプセル	ファイザー株 式会社	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及 び切迫性尿失禁	通常、成人には酒石酸トルテロジンとして4mgを1日1 回経口投与する。なお、患者の忍容性に依りて減量 する。	
4	H29- 10	個人 以外	ドンペリドン	はきけ(むかつき、嘔気、悪心)、 嘔吐、食欲不振、腹部膨満感、胃 もたれ、胸やけ、胸つかえ、げっ ぶ	ナウゼリン錠 10、同OD錠 10	協和発酵キリ ン株式会社	下記疾患および薬剤投与時の消化器症 状(悪心、嘔吐、食欲不振、腹部膨満、上 腹部不快感、腹痛、胸やけ、あい気) ○慢性胃炎、胃下垂症、胃切除後症候群 ○抗悪性腫瘍剤またはレボドパ製剤投与 時	通常、ドンペリドンとして1回10mgを1日3回食前に経 口投与する。ただし、レボドパ製剤投与時にはドンペ リドンとして1回5~10mgを1日3回食前に経口投与す る。なお、年齢、症状により適宜増減する。	
5	H29- 13	個人 以外	メナテトレノン	軽度の骨密度低下を健康診断等 で指摘された者での骨粗鬆症の 発症の予防	グラケープ セル15mg	エーザイ株式 会社	骨粗鬆症における骨量・疼痛の改善	通常、成人にはメナテトレノンとして1日45mgを3回に 分けて食後に経口投与する。	

注)「成分名」、「要望する効能・効果」、「要望のあった成分に対応する医療用医薬品の情報(販売名、会社名)」については、要望内容を参考にして記載。

スイッチOTC医薬品の候補となる成分の要望状況について(平成30年度要望)

No.	要望番号	要望者	成分名	要望する効能・効果	要望のあった成分に対応する医療用医薬品の情報			備考
					販売名	会社名	効能・効果	
6	H30-3	個人以外	栄養成分31成分 (カゼインナトリウム、カゼインナトリウムカルシウム、分離大豆たん白質、トウモロコシ油、大豆レシチン、デキストリン、精製白糖、レチノールパルミチン酸エステル、コレカルシフェロール、トコフェロール酢酸エステル、フィトナジオン、アスコルビン酸、チアミン塩化物塩酸塩、リボフラビン、ピリドキシン塩酸塩、シアノコバラミン、塩化コリン、葉酸、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ピオチン、炭酸水素ナトリウム、塩化マグネシウム、クエン酸カリウム、第三リン酸カルシウム、塩化カリウム、クエン酸ナトリウム水和物、硫酸亜鉛水和物、硫酸鉄水和物、塩化マンガン、硫酸銅)	虚弱体質・病中病後・食欲不振・発熱性消耗疾患・低栄養などの栄養障害の場合の栄養補給	エンシュア・リキッド	アボット ジャパン株式会社	一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。	標準量として成人には1日1,500～2,250m(1,500～2,250kcal)を経管又は経口投与する。1mL当たり1kcalである。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 経管投与では本剤を1時間に100～150mLの速度で持続的又は1日数回に分けて投与する。経口投与では1日1回又は数回に分けて投与する。 ただし、初期量は標準量の1/3～1/2量とし、水で約倍量に希釈(0.5kcal/mL)して投与する。以後は患者の状態により徐々に濃度及び量を増し標準量とする。

注)「成分名」、「要望する効能・効果」、「要望のあった成分に対応する医療用医薬品の情報(販売名、会社名)」については、要望内容を参考にして記載。

スイッチOTC医薬品の候補となる成分の要望状況について(令和元年度要望)

No.	要望番号	要望者	成分名	要望する効能・効果	要望のあった成分に対応する医療用医薬品の情報				備考
					販売名	会社名	効能・効果	用法・用量	
7	R1-1	個人以外	ラメルテオン	一時的な不眠の次の症状の緩和: 寝つきが悪い、眠りが浅い	ロゼレム錠 8mg	武田薬品工業株式会社	不眠症における入眠困難の改善	通常、成人にはラメルテオンとして1回8mgを就寝前に経口投与する。	
8	R1-2	個人以外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和:鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、鼻のかゆみ、目のかゆみ、なみだ目、目の充血	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	グラクソ・スミスクライン株式会社	アレルギー性鼻炎	成人には、通常1回各鼻腔に2噴霧(1噴霧あたりフルチカゾンフランカルボン酸エステルとして27.5μgを含有)を1日1回投与する。 小児には、通常1回各鼻腔に1噴霧(1噴霧あたりフルチカゾンフランカルボン酸エステルとして27.5μgを含有)を1日1回投与する。	
9	R1-3	個人以外	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス) β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)	健康な成人・小児等の乳糖不耐症により生ずる消化不良の改善	ガランターゼ散50%、ミルラクト細粒50%	ニプロESファーマ、高田製薬	1. 乳児の乳糖不耐により生ずる消化不良の改善 (1) 一次性乳糖不耐症 (2) 二次性乳糖不耐症 単一症候性下痢症、急性消化不良症、感冒性下痢症、白色便性下痢症、慢性下痢症、未熟児・新生児の下痢 2. 経管栄養食、経口流動食など摂取時の乳糖不耐により生ずる下痢などの改善	1. 乳児の乳糖不耐により生ずる消化不良の改善には、通常、1回0.25~0.5g(β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)として0.125~0.25g)を哺乳時同時に経口投与する。 2. 経管栄養食、経口流動食など摂取時の乳糖不耐により生ずる下痢などの改善には、通常、摂取乳糖量10gに対して1g(β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)として0.5g)を食餌とともに投与する。なお、症状により増減する。	

注)「成分名」、「要望する効能・効果」、「要望のあった成分に対応する医療用医薬品の情報(販売名、会社名)」については、要望内容を参考にして記載。

スイッチOTC医薬品の候補となる成分の要望状況について(令和2年度要望)

No.	要望番号	要望者	成分名	要望する効能・効果	要望のあった成分に対応する医療用医薬品の情報			備考
					販売名	会社名	効能・効果	
10	R2-1	個人以外	ピランテルパモ酸塩	蟻虫の駆除	コンバントリン錠100mg コンバントリンドライシロップ100mg	佐藤製薬	蟻虫の駆除	<p>(1) コンバントリン錠100mg(1) 通常体重1 kg当りピランテルとして10 mgを1回経口投与する。</p> <p>体重換算による服用量の概算は、次表の通りである。 体重 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg以上 服用量 2錠 3錠 4錠 5錠 本剤は食事に関係なく投与することができ、また下剤を使用する必要はない。 なお、投与は1回のみである。</p> <p>(2) コンバントリンドライシロップ100mg(2) 通常小児に対し体重1 kg当りピランテルとして10 mgを1回経口投与する。</p> <p>体重換算による服用量の概算は、次表の通りである。 体重 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg以上 服用量 1包 2包 3包 4包 5包 本剤は食事に関係なく投与することができ、また下剤を使用する必要はない。 本剤は、用時適量の水を加えシロップ剤として投与するが、そのまま経口投与することもできる。</p>
11	R2-2	個人	過酸化ベンゾイル	にきび	ベピオゲル2.5%	マルホ	尋常性ざ瘡	1日1回、洗顔後、患部に適量を塗布する。

注)「成分名」、「要望する効能・効果」、「要望のあった成分に対応する医療用医薬品の情報(販売名、会社名)」については、要望内容を参考にして記載。