

正誤表

令和元年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会の参考資料6について、下記のとおり誤りがありましたので訂正いたします。
なお、これらの訂正に関しまして、審議結果には影響がないことを確認しております。

通し 番号	資料番号	頁数	該当箇所	正	誤																																														
1	参考資料 6	60	表 9-10（参考）製品等を経 由した 8：2 フルオロテロ マー化合物由来の PFOA 暴 露量と PFOA 暴露量との合 算値及びリスク評価結果一覧 （化粧品を含む）（暴露量の 単位：ng/kg/day）	<table><tr><th>暴露 経路</th><th>暴露シナリオ</th><th>生涯 平均値</th><th>HQ</th></tr><tr><td>吸入</td><td>室内空気の吸入</td><td>1.0</td><td>0.050</td></tr><tr><td rowspan="2">経口</td><td>室内ダストの摂取</td><td>0.53</td><td>0.026</td></tr><tr><td>よだれかけのマウジング</td><td>0.014</td><td>7.1×10⁻⁴</td></tr><tr><td rowspan="2">経皮</td><td>カーペットとの皮膚接触</td><td>9.9×10⁻⁴</td><td>5.0×10⁻⁵</td></tr><tr><td>化粧品（化審法対象外）</td><td>3.0</td><td>0.15</td></tr><tr><td colspan="2">合計推定暴露量</td><td>4.5</td><td>0.23</td></tr><tr><td colspan="2">HQ</td><td>0.23</td><td></td></tr></table>	暴露 経路	暴露シナリオ	生涯 平均値	HQ	吸入	室内空気の吸入	1.0	0.050	経口	室内ダストの摂取	0.53	0.026	よだれかけのマウジング	0.014	7.1×10 ⁻⁴	経皮	カーペットとの皮膚接触	9.9×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁵	化粧品（化審法対象外）	3.0	0.15	合計推定暴露量		4.5	0.23	HQ		0.23		<table><tr><th>生涯 平均値</th><th>HQ</th></tr><tr><td>1.0</td><td>0.050</td></tr><tr><td>0.53</td><td>0.026</td></tr><tr><td>0.014</td><td>7.1×10⁻⁴</td></tr><tr><td>9.9×10⁻⁴</td><td>5.0×10⁻⁵</td></tr><tr><td>0.085</td><td>4.2×10⁻³</td></tr><tr><td>1.6</td><td>0.082</td></tr><tr><td>0.082</td><td></td></tr></table>	生涯 平均値	HQ	1.0	0.050	0.53	0.026	0.014	7.1×10 ⁻⁴	9.9×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁵	0.085	4.2×10 ⁻³	1.6	0.082	0.082	
暴露 経路		暴露シナリオ	生涯 平均値	HQ																																															
吸入	室内空気の吸入	1.0	0.050																																																
経口	室内ダストの摂取	0.53	0.026																																																
	よだれかけのマウジング	0.014	7.1×10 ⁻⁴																																																
経皮	カーペットとの皮膚接触	9.9×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁵																																																
	化粧品（化審法対象外）	3.0	0.15																																																
合計推定暴露量		4.5	0.23																																																
HQ		0.23																																																	
生涯 平均値	HQ																																																		
1.0	0.050																																																		
0.53	0.026																																																		
0.014	7.1×10 ⁻⁴																																																		
9.9×10 ⁻⁴	5.0×10 ⁻⁵																																																		
0.085	4.2×10 ⁻³																																																		
1.6	0.082																																																		
0.082																																																			
2		60	6 行目	経皮、経口及び吸入経路の合計推定暴露量と有害性評価値を比較したハザード比（HQ）は、成人期で 0.23、生涯平均値で 0.23 となった。	経皮、経口及び吸入経路の合計推定暴露量と有害性評価値を比較したハザード比（HQ）は、成人期で 0.23、生涯平均値で 0.082 となった。																																														