

	インフルエンザ菌性、疑いを含む	飛沫	有効な治療開始 後24時間まで	
	リステリア	標準		
	髄膜炎菌、疑いを含む	飛沫	有効な治療開始 後24時間まで	
	肺炎球菌性	標準		
	結核性	標準		
	その他の診断された細菌性	標準		
	髄膜炎菌性肺炎	飛沫	有効な治療開始 後24時間まで	
	髄膜炎菌敗血症	飛沫	有効な治療開始 後24時間まで	
	鼠咬症	標準		
	スポロトリコーシス	標準		
せ	性器リンパ肉芽種	標準		
	赤痢(⇒胃腸炎)			
	せつ-ブドウ球菌性、乳幼児の	接触	罹病期間中	
	接合菌症(藻菌症、ムコール菌症)	標準		
	先天性風疹	接触		生後3ヶ月後の鼻咽頭及び尿のウィルス培養が陽性の場合、1歳になるまで入院中は予防策下におく
	施毛虫症	標準		
そ	創感染			
	大	接触	罹病期間中(排膿 がなくなるまで)	
	小	標準		
	ソケイリンパ肉芽種	標準		
	鼠咬症	標準		
た	帯状疱疹			
	播種性病変、免疫不全者の限局性病変	空気 接触	罹病期間中	水痘に感受性のある人は、水痘に罹患する恐れがあるため、入室は控える
	健常者の限局性病変	標準		水痘に感受性のある人は、水痘に罹患する恐れがあるため、入室は控える
	耐性菌感染症あるいは定着	標準		
	胃腸管	接触		抗生剤中止・培養陰性となるまで