

資料2-3-1

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	1日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
1	B-05023886	男性	6ヶ月	30mg	プロンルカスト水和物	痙攣	軽快	A型インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビルを6日間服用した翌日、痙攣発作が見られた。44日後にけいれん重複発作が軽快した。
2	B-07000002	男性	6月	不明		痙攣	軽快	インフルエンザ検査は陰性であったが、リン酸オセルタミビルを処方。痙攣が起きたため、入院。
3	B-07000270	女性	10月	18mg		痙攣 発育遅延	回復 不明	インフルエンザワクチン接種後、感冒様症状出現。ワクチン接種翌日、感冒様症状は軽快。ワクチン接種4日後、再び感冒様症状あり、迅速検査でインフルエンザ陰性。対症療法薬剤を1~2回服用。再度、感冒様症状発現から2日後、38.6°C発熱。リン酸オセルタミビルを服用。本剤服用約20分後、脱力、意識消失、チアノーゼ、痙攣を生じた。本剤服用45分後頃、病院にて間代性けいれん、意識障害に対しジアゼパムを投与。10分後、痙攣が止まる。約90分後、意識清明、神経学的異常なし。その後は服用なし。5日後、下肢機能不良。発達障害あり。
4	B-05005388	男性	11ヶ月	33mg	ヒベンズ酸チベピジン 塩酸アンブロキソール d-マレイン酸クロルフェニラミン 塩酸プロカテロール アセトアミノフェン	脳症(急性脳症) 肺水腫(肺水腫) 心停止(心停止)	後遺症	感冒様症状有り、受診しインフルエンザと診断。治療目的にリン酸オセルタミビル投与。2日後、覚醒した後、四肢脱力・呼吸停止となり、救急搬送される。急性脳症と診断され処置をとる。翌日肺水腫は消失。その後、人工呼吸器離脱し、リハビリ開始となる。寝たきりの状態となり、外来で通院加療となる。
5	B-05016248	女性	11ヶ月	36mg	カルボシスティン d-マレイン酸クロルフェニラミン	ヘモフィリス菌性 髄膜炎(インフルエンザ桿菌による 細菌性髄膜炎) 硬膜下ヒグローマ (硬膜下水腫)	未回復	B型インフルエンザ発症。治療目的にリン酸オセルタミビル投与。本剤投与終了後、1ヶ月後にインフルエンザ桿菌による細菌性髄膜炎発現。けいれん嘔吐のため救急搬送される。本剤投与終了後約1.5月後、硬膜下水腫発現。細菌性髄膜炎は軽快したが、硬膜下水腫は未だ回復せず。現在入院中。
6	B-07001805	男性	11月	35mg	アセトアミノフェン ジアゼパム リン酸ジメモルファン カルボシスティン 塩酸シプロヘプタジン	痙攣	回復	午後より発熱、けいれんを2回程発症。その後、インフルエンザA型治療のためリン酸オセルタミビル処方。1回目服用後もけいれんを認める。38.8°C。服用2日目、入院。 服用3日目、夜、発熱は続き、数秒~10数秒のけいれんが頻発。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽快	経過の概要
7	B-03003223	男性	1歳	不明	塩酸シプロヘプタジン ヒベンズ酸チペピジン カルボシスティン	意識レベルの低下 不機嫌	軽快	A型インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビル服用開始。本剤服用のたびに不機嫌、意識もうろう等の症状出現。症状発現後しばらく経過観察していると症状消失していたらしい。翌日夜に発熱、咳嗽も続いたため急患受診し本剤中止し入院。その後症状の出現なし。
8	B-03003783	女性	1歳	40mg	ロキタマイシン カルボシスティン 臭化水素酸フェノテロール 塩酸シプロヘプタジン	痙攣	軽快	インフルエンザB型と診断、リン酸オセルタミビル40mg/日を処方。5日目朝の服用後、投与終了。翌朝、意識なく、両手をぴくぴくさせたり、眼球上転し全身強直など、痙攣が何度か続く。他剤投薬により、午後になって意識清明。同日入院し、後遺症なし。4日後には痙攣重積回復。
9	B-04026211	男性	1歳	不明	なし	幻視	回復	B型インフルエンザ治療のため、投与量不明のリン酸オセルタミビルを服用。投与開始後3日目に、幻視及び不機嫌(軽微)の有害事象発現、入院。本剤中止後5日後に回復。
10	B-04026477	男性	1歳	40mg	カルボシスティン 塩酸シプロヘプタジン	傾眠	回復	B型インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル40mg/日を3日間服用。投与開始後4日目、活気がなくなり、傾眠傾向がみられた(けいれんはなし)。8日目、発熱及び傾眠傾向が観察されるため、入院。11日目、回復。
11	B-05024607	男性	1歳	36mg	ヒベンズ酸チペピジン 塩酸アンブロキソール 塩酸シプロヘプタジン ツロブテロール アセトアミノフェン	痙攣	回復	インフルエンザ確定診断でインフルエンザウイルスが検出されなかったものの、姉がA型インフルエンザに感染していたことと発熱が見られたことからリン酸オセルタミビルの投与開始。投与開始から約7時間後に下肢伸展の強直性痙攣が約1分半見られた。投与開始から3日目の早朝にも痙攣が見られ、リン酸オセルタミビルの投与を中止。その後、痙攣も回復。
12	B-06023781		1歳	不明	不明	痙攣	不明	本剤服用後、痙攣を起こした。詳細不明(担当医の協力が得られなかった)。
13	B-07002190	女性	1歳	180mg		嘔吐 傾眠	軽快 軽快	インフルエンザA型治療のため、リン酸オセルタミビル5日分処方するも、同日夕、5日分を1回ですべて服用。服用1時間後、嘔吐発現(数回)。嘔吐発現から1時間後、傾眠発現。救急外来受診。胃洗浄、輸液。入院。その4日後、嘔吐、傾眠軽快。
14	B-07003243	男性	1歳	114 mg		痙攣	回復	A型インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。本剤服用後10分以内に、全身性痙攣発現し、同日回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
15	B-07003702	男性	1歳	22.5mg		痙攣	軽快	インフルエンザ迅速検査陰性であったが、インフルエンザ罹患の可能性も考え、リン酸オセルタミビル処方。 また急性中耳炎治療後でもあり、滲出性中耳炎化も考慮し、抗菌薬等処方。 投与開始2日目、本剤2回目服用後、突然痙攣が始まり、緊急入院。なお、家族が本剤以外の併用薬は服用させていなかった。
16	B-02001935	男性	2歳	75mg	葛根湯 アモキシシリン 桂麻各半湯 アジスロマイシン リン酸ジヒドロコデイン／dl- 塩酸メチルエフェドリン／マレ イン酸クロルフェニラミン デキサメタゾン	幻覚	回復	発熱により受診し、インフルエンザと診断されリン酸オセルタミビル75mgを分割投与(1日)。深夜、訳のわからないことを1時間程言い続ける。投与1日後、50mgへ減量し、継続投与したが、幻覚症状なし。投与開始3日後、解熱。投与開始5日後に投与中止。
17	B-05023795	女性	2歳	22.5mg		幻覚 落ち着きのなさ	軽快 軽快	発熱(39.1°C)のため医療機関を受診し、その後リン酸オセルタミビルを服用。約3時間後に幻覚と不穏が発生し、4時間継続した。翌日の朝も発熱(39.5°C)していたものの、午前10時頃には37.5°Cに解熱していた。その後、リン酸オセルタミビルを服用し、約1時間後に幻覚が発生し、約2時間で幻覚が消失した。
18	B-05025795	男性	2歳	50mg	ジアゼパム	浮動性めまい	回復	発熱し全身性痙攣があったため近医受診、A型インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビルを夕方より服用開始(嘔吐、下痢有り、発熱39°C)。翌日再度痙攣がありジアゼパム坐剤投与。本剤服用3日目解熱(37.2°C)したが、歩行時のふらつき出現。その翌日も歩行時のふらつき改善しないため入院。入院3日目歩行時のふらつき消失。朝、本剤服用終了。翌日インフルエンザ軽快し退院。
19	B-06003837		2歳代	不明		昏睡	不明	詳細不明(担当医の協力が得られなかった。)
20	B-07001353	女性	2歳	22 mg	耐性乳酸菌製剤(2) ロートエキス散 塩化リゾチーム 塩酸シプロヘプタジン	異常行動 筋力低下	回復 回復	インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビル処方。同日昼食後に本剤内服し、程なく立って歩こうとするが、フラフラしてすぐに転ぶといった両下肢脱力、大声で叫ぶ症状が発現。熱は38~39°C。異常行動は覚醒時に発現の様子。同日夕方、これら2症状は消失し回復。その後、本剤中止。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
21	B-07003012	男性	2歳	114 mg		痙攣	回復	B型インフルエンザの診断のもと、リン酸オセルタミビル処方。夜、本剤服用。深夜、本剤服用2時間後より、興奮状態、けいれん発現。目は半開き、ボーッとした状態(意識はある様子)。 翌朝、39.3°Cで、痰がらみの咳、鼻汁、かすれ声、咽頭発赤(軽度)あり。
22	B-07010107	女性	2歳	42mg	アセトアミノフェン	異常行動	回復	B型インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル処方。夕方より本剤服用開始。夜、異常行動(夜中暴れる)発現。 服用4日目、本剤終了。 服用開始から6日目、異常行動回復。
23	B-02000900	男性	3歳	37.5mg	塩酸ツロブテロール クロモグリク酸ナトリウム 塩酸プロカテロール テオフィリン ヒベンズ酸チベピジン d-マレイン酸クロルフェニラミン	感覚鈍麻 意識レベルの低下	回復	約5ヶ月前より気管支喘息発症し、クロモグリク酸ナトリウム、塩酸プロカテロール、テオフィリンの服用歴あり。リン酸オセルタミビル服用後まもなく、手の震え、ボーッとした感じあり。処方中止し、他剤に変更。本剤服用後、24時間以内に症状消失。なお、患者には卵・牛乳アレルギーあり。
24	B-05000602	女性	3歳	50mg	ヒベンズ酸チベピジン 塩酸シプロヘプタジン フルマル酸ケトチフェン カルボシステイン ラクトミン	意識変容状態	回復	アトピー性皮膚炎、食物アレルギー等の既往あり。日本脳炎ワクチン接種の翌日38.9°Cの発熱、迅速検査でインフルエンザB型と診断されリン酸オセルタミビル投与。本剤服用開始4日後の夜突然転倒し、約10秒間意識消失、約10分間顔色不良、その後意識回復し、清明。その後2日間投与を継続したが異常なし。心電図、血液、脳波、全能MRI検査を実施するも異常を認めず。
25	B-05001648	女性	3歳	不明		譫妄(譫妄)	回復	インフルエンザ治療目的のため、リン酸オセルタミビル投与。1回分服用後、譫妄発現(重篤でないし軽微でもない)し、親の判断にて服用を中止。その後、譫妄回復。
26	B-05023472	男性	3歳	60mg	プランルカスト水和物 カルボシステイン プロピオノ酸ベクロメタゾン クロモグリク酸ナトリウム ツロブテロール アミキシシリソ アセトアミノフェン	譫妄 幻覚 眼瞼機能障害	回復	発熱(38.6°C)、咳、鼻症状、にて、本剤処方。服用後、まばたきが多くなる(体温:39.7°C)。 2回目服用後、幻覚症状発現し、30分ごとぐらに3回繰り返す。深夜、救急にて受診(体温:38.3°C)処置なし。 翌朝、幻覚、異常なまばたき、うわごと回復。本剤中止。 7日後、インフルエンザ回復

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
27	B-06006096	男性	3歳	不明		幻覚 妄想	回復 回復	A型インフルエンザで発熱(41°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。服用開始から約5時間後に幻覚及び妄想が発症し、約5分後に回復した。その後も幻覚及び妄想が見られた。
28	B-06026623	男性	3歳	27 mg		幻覚	回復	インフルエンザに対し、リン酸オセルタミビル27mg内服。遠くを見つめ、おばけが出る等の症状を訴えたため、本剤中止。
29	B-02001232	女性	4歳	75mg	アモキシシリソ ヒベンズ酸チベピジン カルボシスティイン ビフィズス菌製剤	協調運動異常	回復	インフルエンザA型陽性であったが、熱性痙攣を起こしていたためリン酸オセルタミビルを投与開始。投与2日目、目が回る、フラフラするなどの失調症状発現。投与継続し、3日目朝には、症状みられないが、5回目投与後に失調症状発現。3時間経過後、失調症状軽快し、投与中止。
30	B-06015552	男性	4歳	60mg	ヒベンズ酸チベピジン スマル酸クレマスチン 維持液(3) コハク酸メチルプレドニゾロン ナトリウム トリクロホスナトリウム 抱水クロラール カルボシスティイン	意識変容状態 痙攣	回復 回復	A型インフルエンザの治療のためにリン酸オセルタミビルの服用を開始した。服用開始から約1時間後に痙攣及び意識障害が発現。痙攣は3分程度で止まり、救急センター受診後にジアゼパム坐剤を服用し、意識障害も回復した。転院後、ぼーっとした様子が見られ、併用薬の使用も行っている。リン酸オセルタミビル服用開始から2日目以降もリン酸オセルタミビルを使用している。
31	B-06024209	女性	4歳	24mg		意識変容状態 筋骨格硬直 異常行動	回復 回復 回復	インフルエンザ発症時に発熱(39.4°C)、咳、倦怠感。リン酸オセルタミビルを服用2時間後、手のみ硬直した様子。ろれつが回らない様、赤ちゃん言葉の様なものを発していた。その約2時間後受診、意識は清明、麻痺なし、応答も明瞭。
32	B-06026808	女性	4歳	30 mg	カルボシスティイン スマル酸クレマスチン 塩酸アンブロキソール	異常行動	回復	服用後5時間、異常言動発現。再来院し、入院。脳波及びCT検査での異常はない。
33	B-07000067	女性	4歳	60 mg	乳酸リンゲル液 アセトアミノフェン	痙攣	回復	リン酸オセルタミビル27mg服用後、暫くして痙攣。2回目から服用中止。翌日、痙攣軽快。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽快	経過の概要
34	B-07000101	男性	4歳	72 mg	塩酸シプロヘプタジン ヒベンズ酸チペピジン セフォタキシムナトリウム ジアゼパム	痙攣 意識レベルの低下	不明回復	深夜、発熱。翌朝、インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル服用開始。 本剤3回目服用後、けいれん(1分くらい)発現し、入院。丸1日意識レベル低下。 けいれん、意識レベル低下(ともに非重篤)発現。 翌日、熱が下がる。翌々日、本剤服用中止。 服用中止1日後、ふらつき、頭痛あり。(意識レベルは正常)MRI異常なし。幻覚、視覚異常、ふらつき、傾眠発現。服用中止2日目、「あそこに何かいるから痛い」と言う異常行動発現。
35	B-07000152	女性	4歳	100mg		痙攣	回復	40.5°Cの発熱と腹痛のため、母親同意の下、リン酸オセルタミビル処方。一回目の本剤服用約20分後、いびきをかいて寝ているような状態であったため、心配になって確認したところ、口から泡を吹いているような状態で、再受診。その際、顔は真っ青で、唇はチアノーゼがでていたとのこと。再受診の際は、目は開けているがぼんやりとしており、両親の問いかけにも反応が悪かったとのこと。 けいれんが見られており、抗けいれん薬などの処置により回復。
36	B-07000201	女性	4歳	56 mg	塩酸シプロヘプタジン ヒベンズ酸チペピジン 塩酸アンブロキソール 塩酸ツロブテロール	譫妄 間代性痙攣	回復回復	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル服用開始。翌朝服用後、突然うわ言、痙攣発現。そのまま寝てしまう。夕方、回復し、本剤を服用すると再び同じ症状出現。嘔吐もあり。 本剤服用中止。
37	B-07000243	男性	4歳	54 mg	テオフィリン プランルカスト水和物 ジロブテロール アセトアミノフェン	異常行動 痙攣	回復回復	インフルエンザB型と診断。リン酸オセルタミビル服用1時間後、突然笑い出すが、しばらくして消失。再度、本剤及び他薬剤を服用後、両眼球が左上向きになり、口をパクパクして、呼びかけにも応じず、唇の色が悪くなつたので、指を口中へ入れて吐かせる等の対応をした。
38	B-07000285	女性	4歳	36 mg	セフトリアキソンナトリウム	痙攣	回復	インフルエンザの疑いの為、リン酸オセルタミビル投与開始。熱性痙攣発現。 インフルエンザは陰性。熱性痙攣回復。
39	B-07001669	女性	4歳	60 mg		痙攣	軽快	インフルエンザB型に対して、リン酸オセルタミビル5日分処方。同日朝、38.5°C。本剤1回目服用。同日昼、39.4°C。同日夜、2回目服用30分後、全身痙攣5分間。意識有り、やや軽い痙攣。服用1時間半後、39.5°C 全身痙攣5分間、意識有り、やや軽い痙攣。アセトアミノフェン坐剤を使用。服用2時間半後、39.2°C 痙攣5分間。服用3時間半後、38.4°C。痙攣5分間、意識有り。痙攣強。幻覚あり(ママの目が真っ赤でこわいと言う)。服用6時間半後、36.2°C。痙攣2分間、幻覚あり。本剤投与中止。 中止1日後、症状回復

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
40	B-07001747	女性	4歳	36 mg	ジヒドロコデイン・エフェドリン 配合剤 アセトアミノフェン	痙攣	回復	40°C近い発熱あり。インフルエンザB型陽性であったため、リン酸オセルタミビル処方。同日夕方、本剤1回目服用。体温:39.6°C。意味不明なことを言い出すなどの意識障害、幻覚発現。服用2時間後、痙攣発現。救急車にて搬送。到着時は意識ははっきりしていた。体温:39.4°C、解熱剤投与し、帰宅。帰宅後も頭痛、腹痛、嘔吐あり。翌朝、痙攣、意識障害、幻覚回復。1回目服用から翌朝までの記憶はなかった。
41	B-07001807	女性	4歳	60 mg	ヒベンズ酸チベピジン カルボシスティン 塩酸シプロヘプタジン 非ビリン系感冒剤(2)	痙攣	回復	体温:38.5°C。インフルエンザA型の診断にて、リン酸オセルタミビル処方。服用開始3日目、インフルエンザの軽快・回復。深夜、すでに解熱。服用開始4日目、計6回目服用後、30分くらいの発作あり。ひきつけなのか悪夢をみたのか不明。その後、就寝中にうなり声を聞いた。その翌朝、ふだんと変わらず。
42	B-07003187	女性	4歳	28.5mg	塩酸シプロヘプタジン ヒベンズ酸チベピジン セフロキサジン	痙攣 異常行動	回復 回復	インフルエンザの検査を行うが陰性のため、解熱剤、抗菌剤等処方。夕方、熱が下がらないとのことで再度受診。体温40°C。検査はしなかったがインフルエンザと判断し、リン酸オセルタミビル処方。夜、本剤服用。服用1時間以内にけいれん、うわ言、白目をむいた状態となる。けいれんに関してはそれほど長くあつたわけではないようだが、うわ言に関しては、若干長く言っていた様子。翌日、症状回復。なお、以前一度、本剤を服用したことがあったが、そのときは何もなかったとのこと。熱性けいれんは過去になし。
43	B-07004082	女性	4歳	56 mg	酒石酸アリメマジン ヒベンズ酸チベピジン 塩酸プロカテロール 塩酸プロムヘキシン	恐怖 異常行動	回復 回復	インフルエンザA型との診断にてリン酸オセルタミビル処方。服用約2時間後、壁を見て「こわい、こわい」と怯えるため再診して入院。インフルエンザの熱せん妄の可能性もあり、入院しながら服用し、経過観察する方針で本剤28mg再投与。再び2時間後、「こわい、こわい、虫がいてる、やっつけて」と15分間怯えため、本剤中止。30分後、意識清明。(熱は39°Cあった)
44	B-07010110	男性	4歳	60 mg	アセトアミノフェン	異常行動	回復	B型インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル処方。夕方より服用開始。受診時、発熱はそれほどでもなかった(36~37°C)。夜、異常行動(夜中暴れる)発現。服用2日目、異常行動回復。服用5日目、朝、服用後、本剤終了。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽帰	経過の概要
45	B-01012114	男性	5歳	75mg	テオフィリン 塩酸セフカベンピボキシル ヒベンズ酸チペビジン ツロブテロール	幻覚 恐怖	回復	体温39.1°C)、インフルエンザ疑いでリン酸オセルタミビル服用。 約2時間後、急に目を開き、タオルを取ろうとするうまく取れないといい泣き叫ぶ、この時心悸亢進2+。 約5分後、症状消失。 症状消失から5時間後、再度本剤投与。 その1時間半後、突然目を開き、意味不明のことを口走り、泣き、叫ぶ様な状況が何度も繰り返される。 約5分後、症状消失。 翌日、解熱
46	B-02000734	女性	5歳	75mg	塩酸トリメトキノール セフジニル 塩酸プロムヘキシン	構語障害 意識レベルの低下 感覚鈍磨	回復	発熱、咳嗽のためセフジニル、塩酸トリメトキノール、塩酸プロムヘキシン内服。 翌日A型インフルエンザとの診断でリン酸オセルタミビル投与開始、これまでの薬剤は中止となる。本剤服用1時間後より手の震え、意識減損、言語障害発現し受診。経過観察目的にて入院。本剤中止し塩酸アマンタジンに変更となる。 翌日、解熱し言語も可能となり、意識レベルもクリアとなった。
47	B-03000276	男性	5歳	90mg	アセトアミノフェン ドンペリドン ビフィズス菌製剤	坐骨神経痛	回復	B型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル90mg/日を投与開始。投与開始後3日目に両側下腿痛発現。翌日より本剤投与中止。有害事象発現8日目、回復。
48	B-04027244	男性	5歳	60mg	なし	浮動性めまい	回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル60mg/日を投与開始。夕食後服用、寝る前にふらつき(離体外路障害の様子)が見られたため、リン酸オセルタミビルの服用中止。翌日有害事象改善。
49	B-04027262	女性	5歳	不明	なし	痙攣 呼吸停止	不明	インフルエンザ治療のため、投与量不明のリン酸オセルタミビル投与開始。本剤服用2-3時間後痙攣発現、呼吸停止。(再々にわたり詳細調査を依頼したが担当医の協力が得られず、これ以外の詳細不明)
50	B-05000047	男性	5歳	36mg	塩酸プロカテロール フルマ酸ケトチフェン カルボシスティン	意識変容状態	回復	A型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル36mg/日を投与開始。投与1回目10秒後、嘔吐と一過性の意識障害(数秒間)が発現。すぐに回復。入院して経過観察するが、以後有害事象の発現なし。
51	B-05004406	女性	5歳	32.5mg	d-マレイン酸クロルフェニラミン ヒベンズ酸チペビジン アセトアミノフェン	痙攣(無熱性痙攣)	回復	頭痛、咽頭痛有り受診。治療目的としてリン酸オセルタミビル投与。本剤服用翌日、顔面蒼白、全身の強直性痙攣約1分が見られた後、覚醒し頭痛を訴えた。救急外来受診、本剤投与中止。翌日、解熱のため無投薬で経過観察。3日後、インフルエンザ回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
52	B-05021995	男性	5歳	34mg	塩酸ツロブテロール ヒベンズ酸チペビジン フルマ酸クレマスチン	痙攣	回復	1歳時に熱性痙攣の既往歴あり。 高熱、咳のため、確定診断後、本剤投与開始。 翌日、本剤投与5時間後、嘔吐、チアノーゼ、一点凝視が続き、救急車にて来院。頭部CT異常なし。 脳波棘波、左右差あり、てんかんと診断し入院となる。ジアゼパムを計3回使用。けいれん発作発現し、同日回復。 その後、退院。以後けいれんなし。
53	B-06001134	男性	5歳代	不明		失神	不明	詳細不明(担当医の協力が得られなかつた。)
54	B-07000090	女性	5歳	70 mg	塩酸セフカベンピボキシル ヒベンズ酸チペビジン 塩酸シプロヘプタジン 塩酸アンブロキソール 塩酸プロカテロール	異常行動	回復	リン酸オセルタミビル服用開始。 同日、「何か気分がいい」との異常言動が発現し、翌日回復するが、服用4日目まで、「何者かに追われている」との異常言動が発現。 服用4日目、本剤服用中止。中止翌日、異常言動回復。
55	B-07000110	男性	5歳	30 mg	塩酸セフカベンピボキシル 塩酸シプロヘプタジン アセトアミノフェン 耐性乳酸菌製剤(3) 塩酸アンブロキソール	痙攣	回復	リン酸オセルタミビル服用当日夜、意識障害(重篤)、痙攣が発現。翌日、意識障害回復。
56	B-07000148	男性	5歳	100 mg	アセトアミノフェン	痙攣	回復	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル投与開始。本剤投与終了2日後、意識障害、痙攣発現。同日、回復。
57	B-07000282	男性	5歳	39 mg	ヒベンズ酸チペビジン カルボシステイン 塩酸プロムヘキシン 塩化リゾチーム 塩酸アンブロキソール アセトアミノフェン アセトアミノフェン	譫妄 幻覚	回復 不明	インフルエンザA型の診断にて、リン酸オセルタミビル処方。本剤服用30後、口をもぐもぐさせるような仕草あり。元気なし。せん妄状態発現。服用3時間30分後、覚醒してから多弁、興奮、幻覚あり。服用8時間30分後、入院。脱水傾向もあり。体温38.8°C。幻覚症状としては、さかんに手を伸ばして目の前のものをつかむ様な行動を就寝まで間歇的に認めた。深夜、興奮状態で多弁が続いていたが、自然に入眠。未明、再び自然に覚醒したが、この時には普段の状態へ回復。服用から2日目、昼、せん妄状態回復。インフルエンザ軽快。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
58	B-07001738	男性	5歳	36 mg	セフジトレンビポキシル d-マレイン酸クロルフェニラ ミン トラネキサム酸 カルボシステイン フマル酸ケトチフェン メフェナム酸	異常行動	回復	39.0°Cの高熱あり。インフルエンザウイルス検出されなかつたが、インフルエンザ疑いのため、リン酸オセルタミビル処方。夕方、本剤服用30分後、踊ったり飛んだりしたず気分高揚が発現。経過観察。同日症状回復。本剤服用中止。
59	B-07002264	男性	5歳	150 mg		異常行動	回復	インフルエンザの診断にて、リン酸オセルタミビル処方。同日夕方より服用開始。 服用2日目、発熱持続。朝、夕服用。その夜、就寝していたところ急に足をバタバタさせ、その後「おしつこに行きたい」と話すトイレへ。排尿をすませた後走って戻り、何か早口で喋り(家人に内容は分からなかつたとのこと)再度就寝。異常行動ではないかと救急受診。受診時意識清明、見当識良好、神経学的異常所見なかつたが、家人の心配が強いため、入院の上、経過観察とした。本剤服用中止。入院後は何事もなく解熱。
60	B-07002947	男性	5歳	36 mg	カルボシステイン ヒベンズ酸チペピジン	痙攣	回復	インフルエンザA陽性と診断され、夕方より、リン酸オセルタミビル服用開始。服用1時間30分後、けいれん発作発現(1分程で停止)。服用2時間後、受診。けいれん発作おちついでおり処置なし。念のため本剤服用中止。 投与中止3日後、病状軽快。
61	B-07003094	男性	5歳	33 mg	フマル酸クレマスチン	振戦	回復	インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル処方。昼に本剤服用し、2時間半眠った。覚醒後に手と首にふるえがみられ、はっきりと聞き取れなかつたが歌を歌うような何を言っているかわからない発語がみられた。痙攣、手と首のふるえ、意味不明な発語発現。2-3分ではっきりとして回復。この時の体温は不明。本剤服用中止。 投与中止7日後、インフルエンザ回復。
62	B-07003968	男性	5歳	不明		幻覚 失見当識	不明 不明	インフルエンザA型に対し、リン酸オセルタミビル服用。幻覚及び失見当識(父親を判別できない状態)が数時間発現。
63	B-07013302	男性	5歳	35 mg	トラネキサム酸 カルボシステイン 塩化リゾチーム ヒベンズ酸チペピジン 酪酸菌製剤	落ち着きのなさ	回復	39.0°Cの発熱あり。インフルエンザA型の診断にて、リン酸オセルタミビル処方。翌朝、2日目服用。夕方、不隱状態、脱力感発現。前日からの発熱が続いている状態で、落ち着かない感じになり、ふらふらと体に力が入らないようになつた。その後、傾眠傾向。来院時、意識は清明で会話も問題なし。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
64	B-01007263	女性	6歳	50mg		浮動性めまい	回復	発熱(39.2°C)、近所でインフルエンザの流行があり、家族の強い希望にてリン酸オセルタミビル投与開始(確定診断せず)。この日は発熱のみで食事とっていた。投与2日目、ふらつきとともに口内痛あり、経口摂取低下。投与3日目に下痢発現(本剤投与終了)。翌日も同様の症状が続いたため来院、経口摂取不可、自力でトイレに行けず、入院(39.6°C)。症状発現から6日後失調は軽快。7日後解熱。9日後回復、退院。
65	B-03002360	男性	6歳	68mg	ヒベンズ酸チペビジン d-マレイン酸クロルフェニラミン 塩酸アンブロキソール クラリスロマイシン	譫妄	回復	B型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル68mg/日を投与開始。投与2日目夕刻、譫妄状態(母親のことが分からず、実在しないものが見える)発現。譫妄は一晩で改善したが、翌日も落ち着きがない状態が続く。脱水、肝機能障害があり入院し、同日、内服薬は全て中止。投薬中止から8日目には肝機能障害も回復。
66	B-04027499	女性	6歳	200mg	ヒベンズ酸チペビジン 塩酸シプロヘプタジン アセトアミノフェン レボフロキサシン	幻覚 痙攣	回復	A型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル200mg/日を投与開始。投与開始1日目、1回目の投与後、少しの震えを観察。2回目投与約1時間後、全身の震えるような痙攣発現、幻覚をみているような状態が1時間続いた。2日目本剤服用中止、痙攣回復も脱水症状あり、入院。3日目、有害事象回復し、退院。
67	B-05001259	男性	6歳	80mg		幻視(幻聴) 譫妄(夢遊状態)	回復	インフルエンザB治療のためリン酸オセルタミビル投与2日後突然起きだしげらげら笑い出し、つまむような手の動作をする。発熱39°C。同じ状態が解熱するまで4日間続く。平熱になり、意識正常になった2日後インフルエンザA発症、本剤を1日投与するが譫妄等なく解熱する。
68	B-05021404	男性	6歳	99mg	カルボシステイン 塩酸シプロヘプタジン ヒベンズ酸チペビジン ジアゼパム フェノバルビタール ビフィズス菌製剤(4) 酪酸菌製剤 塩酸プロカテロール カルボシステイン 塩酸アンブロキソール	意識レベルの低下(意識レベル低下)	回復	2日前から発熱(40°C)インフルエンザB診断確定後リン酸オセルタミビル投与開始。翌日夜からろれつが回らずうわ言の内容が聞き取れなくなり、手探り動作、意識レベルの低下発現。意識レベル低下発現2日後本剤投与中止と共に意識レベル徐々に回復。意識レベル低下発現8日後に回復となる。担当医によると症状発現中の頭部MRIの所見はインフルエンザ脳症として非典型的。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
69	B-05023797	男性	6歳	96mg	ヒベンズ酸チベピジン 塩酸アンプロキソール 塩酸シプロヘプタジン イブプロフェン	幻覚	回復	A型インフルエンザで高熱(39°C)のところを受診し、その後リン酸オセルタミビルを服用。約3時間後に幻覚が発現した。入眠するも、翌朝に覚醒後に再度幻覚が発現し、40°Cの高熱であった。昼過ぎには幻覚症状が消失し、体温も37°C以下であった。
70	B-05024745	男性	6歳	40mg	臭化水素酸デキストロメトルファン 塩酸アンプロキソール	幻覚	回復	以前にリン酸オセルタミビルを服用して、幻覚が発現した既往がある。A型インフルエンザで発熱(39.3°C)が見られ、リン酸オセルタミビルを服用。服用開始から約4時間後に幻覚症状が発現し、リン酸オセルタミビルの内服を中止。その後、幻覚症状は回復した。
71	B-05025712	男性	6歳	78mg		譫妄	回復	A型インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビル服用開始(39°C)。服用開始後3日目に譫妄出現し本剤投与中止。投与中止2日後に譫妄回復。その翌日にインフルエンザ軽快、回復。
72	B-05025713	女性	6歳	不明		錯乱状態	回復	A型インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビル服用開始(39.2°C)。夜、本剤2回目服用約1.5時間後に興奮状態、錯乱発現(目が据わり壁に向かって叫び、次に高笑い)。翌朝本剤服用時、味が悪いと少し嘔吐、以降本剤服用せず。夜、体温37.6°C。錯乱回復するが回復時期は不明。
73	B-05025717	男性	6歳	75mg		大発作痙攣	回復	A型インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビル服用開始。服用1時間40分後硬直・間代性痙攣出現、約5分間持続。30分後救急車にて入院。病院到着時呼び掛けには応じるが、指の不随意運動が見られていた。入院後は全く元気だが高熱は持続、本剤の投与は中止。6日後に解熱し退院。
74	B-06024210	女性	6歳	72mg	アセトアミノフェン	幻覚	回復	リン酸オセルタミビル服用後、熱が40°Cになり、アセトアミノフェンを服用し1時間位就寝。目覚めた際に幻覚症状の訴えあり。その後症状なし。4日後インフルエンザ症状回復。
75	B-07000278	男性	6歳	88 mg		異常行動	回復	インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビル投与開始。翌日、異常行動発現。その後回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽帰	経過の概要
76	B-07001808	男性	6歳	136.2mg	ドンペリドン	異常行動	回復	37°Cの発熱、咳、咽頭痛が朝よりあったため、感冒剤服用。同日夜、38.3°Cに上昇。嘔吐もあったので、救急受診し、インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル処方。本剤服用時、38.3°C。服用1~2時間後、寝たままで最初手足をピクピクさせ、ワーと大声で泣き叫び、全身の筋肉を硬直させ、眼は大きく見開いて一点を凝視した。2~3分持続。反応中は意識不明。5分後、意識回復。その後も、ぐずったり、泣いたりして熟睡している様子ではなかった。38°C台の高熱あり。服用開始2日目の朝、夕方、服用3日目の朝いずれも、38°C台~41°Cの発熱あり。いずれも本剤服用1~2時間後に、毎回、同様の異常行動が発現。本剤中止。
77	B-07002053	女性	6歳	96 mg	アセトアミノフェン ヒベンズ酸チペビジン カルボシスティイン プロピオン酸フルチカゾン	強直性痙攣	回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。痙攣、声を発するなどの異常行動が発現。5分くらいで症状治まる。
78	B-07002054	男性	6歳	40 mg		異常行動	回復	診察時から異奮気味。インフルエンザA型の診断にて、リン酸オセルタミビル処方。同日夕方、服用後、おかしな発言を繰り返す(こわいこわいと言っている)。睡眠中、夜には一度熱が下がり、症状は落ち着く。服用開始2日目、朝、再び発熱。本剤服用しないが、気分高揚し、妹と遊んでいる最中にはさみで妹の指を傷つけた。 服用開始3日目、異常行動回復、インフルエンザ軽快・回復。
79	B-03009370	男性	7歳	80mg	クラリスロマイシン 塩酸プロカテロール カルボシスティイン 塩酸プロムヘキシン	記憶障害 書字障害 異常行動	軽快	リン酸オセルタミビル80mg/日他を処方。開始3日目に、落ち着きがなく会話のつじつまがあわないことに母親が気づく。3日後、通学するも、学校で異常行動が見られ、入院。文字が書けなくなる、父親の名前を忘れる等の症状が出る。7日目に退院。翌日、質問の答えに少し正確性が増す、物の置き場所を思い出す。1ヶ月以上後、母親のはなしでは、文字、計算等は7~8割程度戻ったとのこと。
80	B-03009903	男性	7歳	72mg		譫妄	回復	リン酸オセルタミビル72mg/日投与後、うわごとが発現。本剤投与終了日にうわごと回復。
81	B-04027265	女性	7歳	80mg	塩化リゾチーム セフジトレンビポキシリル フマル酸ケトチフェン	嗜眠 低体温	不明	A型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル80mg/日を投与開始。投与2日目に嗜眠発現。3日目、低体温発現し、本剤投与中止。低体温は6時間で回復。
82	B-05001028	男性	7歳	99mg		譫妄(譫妄(意味のわからない事を言う))	軽快	インフルエンザに対してリン酸オセルタミビルを投与開始。翌日譫妄(意味のわからない事を言う)発現。本剤の投与を中止したところ翌日軽快。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
83	B-05021660	男性	7歳	不明	アセトアミノフェン	異常行動	回復	発熱(40.0°C)、咳、咽頭痛にて、本剤服用。 その後、解熱剤服用。この頃より異常行動(トイレの場所がわからない、いない人が見える等)発現。 入院し、採血、CT、MRIに異常なし。 本剤から、シンメトレルに変更するも異常行動(足をバタバタして突然歌う、急に教科書の文章を読む、いない人、物が見えるなど)翌朝まで持続。 朝以降、異常行動(意識障害)消失、解熱傾向。 3日後、退院。
84	B-05024829	女性	7歳	不明		幻覚	不明	担当医の協力が得られずに詳細不明。
85	B-05025796	女性	7歳	39mg	アセトアミノフェン リン酸ジメモルファン 塩酸シプロヘプタジン カルボシステイン	回転性めまい 幻覚	回復	A型インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビルを夕方より服用開始(38°C)。翌朝服用直後より回転性めまい、幻覚が発現し入院し本剤中止。症状は2時間程度持続した。その後症状消失したが、発熱は持続。入院5日後解熱し、インフルエンザ軽快・回復したため退院。
86	B-06025201	男性	7歳	不明	アセトアミノフェン	異常行動 意識レベルの低下	回復 回復	インフルエンザのため、本剤処方。その夜、異常行動(意味の分からないことを話したり、何もないところに手を伸ばしてつかもうとしたりする)が発現し、入院。翌日、解熱し異常言動消失。2日目、退院。
87	B-07000075	女性	7歳	90mg	アセトアミノフェン 臭化水素酸デキストロメトルファン 塩化デカリニウム 鎮咳配合剤(1) アセトアミノフェン アズレンスルホン酸ナトリウム	幻覚	回復	リン酸オセルタミビル服用開始。服用2時間後に幻覚発現。 服用5日目、幻覚は回復。
88	B-07000157	男性	7歳	90 mg	d-マレイン酸クロルフェニラミン カルボシステイン 耐性乳酸菌製剤(2)	譫妄	回復	インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビルを投与開始。熱せん妄発現。見えないものが、見えるとおびえていた(40.5°C)翌日、熱せん妄回復。5日目、本剤投与終了。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症狀事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
89	B-07000277	男性	7歳	不明	クラリスロマイシン	谵妄	回復	インフルエンザA型の診断にてリン酸オセルタミビル処方。服用6日目、昼ごろ起床し、本剤内服。約1時間後、せん妄発現。昼寝後、パッと起きて何かとろうとするしぐさをしたり、叫んだりする。「鳥があっちからもこっちからも飛んでくる」「木が歩いてきた」等の幻覚や立ってもフラフラして転ぶ等の症状があった。夜、受診。受診時には会話は可能だが、明らかに興奮状態であり、大笑い、大泣きしたり、床に転がったりする状態。入院の上、補液のみで経過観察。入院時、インフルエンザウイルスは陰性。服用7日目、朝、せん妄回復し退院。
90	B-07001360	男性	7歳	138mg		激越	回復	A型インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル投与開始。服用1時間後、約30分泣いたり、父親に殴りかかった(叩いた)という異常行動発現。その後異常行動は治まり、以後本剤2回内服したが異常行動はなかった。異常行動軽快。その後服用中止。
91	B-07001665	女性	7歳	87 mg		異常行動 幻覚	回復 回復	インフルエンザ疑いのため、リン酸オセルタミビル処方。異常言動、幻覚発現。本剤服用終了。6日後、異常言動、幻覚回復。
92	B-07001811	男性	7歳	116mg	ジアゼパム	意識変容状態	回復	発熱あり。受診し、インフルエンザB型との診断にて、リン酸オセルタミビル処方。昼、1回目服用。夜、ジアゼパム坐剤使用2時間30分後、本剤2回目服用。服用1時間30分後、意識障害が発現。寝ている時に急に起き上がり、何か意味不明のことを言う。5分位で再び入眠。1時間に1回位の頻度で繰り返した。(後から聞くと本人の記憶なし)服用2日目、朝、壁に向かって笑う。経過中けいれんはなし。服用開始から3日目、意識も完全に清明。
93	B-07001812	女性	7歳	99mg	ヒベンズ酸チペビジン 塩酸アンプロキソール 塩酸シプロヘプタジン 塩酸ツロブテロール	異常行動	回復	インフルエンザB型陽性のため、リン酸オセルタミビル処方。服用開始2日目、解熱。就寝後に手をばたばたさせ、イヤダイヤダとさわぐ。服用3日目、夜、前夜と同様のエピソードが2時間置きの頻度で発現。服用4日目、服用中止。
94	B-07002996	男性	7歳	120mg	アセトアミノフェン	異常行動	回復	インフルエンザB型と診断されリン酸オセルタミビル処方。夜、本剤服用。投与開始2日目、朝、2回目服用し、再び受診。本剤は継続。夜、3回目服用。その後熱が40℃まで上昇したので、アセトアミノフェン服用。その後、意味不明な言葉を発し、夜中、目の前がまぶしいと訴えまづげを抜き始めた。投与開始3日目、家族より連絡をうけ、本剤中止し、受診。熱は39.2度。まぶしい、暑い、えらいを繰り返した。その後、異常言動のため入院。輸液のみの処置で経過観察。血液、脳波にインフルエンザ脳炎脳症を疑う異常所見はなし。投与中止1日

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転院	経過の概要
95	B-07007903	不明	7歳	不明		痙攣	<記載なし>	インフルエンザB型の診断でリン酸オセルタミビル服用後、痙攣を認め入院。頭部MRI拡散強調画像で脳梁膨大部に高信号域を認めた。いずれも痙攣発症前に異常行動(不穏行動・言動)を認めていた。髄液検査、CTは異常なく、MRI所見は可逆性の病変であった。
96	B-02006808	男性	8歳	150mg	イブプロフェン ドンペリドン アセトアミノフェン ヒベンズ酸チベピジン カルボシスティイン メキタジン	浮動性めまい	回復	発熱(38.9°C)、大腿部痛を訴え歩行困難。同日、体温39.2°C、嘔吐でリン酸オセルタミビル投与。 翌日、頭痛、嘔気、倦怠感を訴え元気がないため点滴(ソリタT1 500ml、20%グルコース 40ml)施行。本剤を120mg/日に変更。 同日の夕刻、嘔気とめまいを訴え、ふらつき歩けなくなる。 2日後、本剤は中止となる。 めまい、ふらつきが改善しないため、他院転院。 転院2~3日後、回復退院となる。
97	B-02013074	女性	8歳	90mg		片頭痛	回復	インフルエンザ予防目的(家族がインフルエンザA発症のため)にて、リン酸オセルタミビル投与。本剤投与4回目の服用後、2~3時間後に強い右側頭部痛、嘔吐あり。カロナール坐薬を使用するも痛み軽快せず、イミグラン投与後軽快。片頭痛の既往歴有り。
98	B-03001781	男性	8歳	120mg	アセトアミノフェン レバミピド	幻視 異常行動	回復	発熱有り受診し、インフルエンザと診断される。リン酸オセルタミビル投与2日目、異常行動、痙攣発現。入院となるが、会話できる状態であったため、本剤内服継続し経過観察。脳波所見からインフルエンザ脳症と判断して、幻視、異常行動もインフルエンザ脳症と考え、本剤を投与継続。 本剤服用3日目、解熱し、本剤服用中止となる。
99	B-03003105	男性	8歳	105mg	アセトアミノフェン フマル酸クレマスチン ヒベンズ酸チベピジン カルボシスティイン	部分発作	軽快	体温40.0°Cとなり、アセトアミノフェン坐薬(200mg)使用。 翌日、体温38.7°C、鼻水、鼻づまり、咳からむ、咳時々にてリン酸オセルタミビル投与開始。 本剤2回目投与後、「こわい!」とわめく、視線合わなくなる。体温40°Cとなり、他院受診。「脳炎」ではないと言われる。 翌日、体温38.2°C。その後本剤は服用せず、ふつうとなる。
100	B-03011619	女性	8歳	180mg		精神障害 表出性言語障害 流涎過多 嚥下障害	未回復	インフルエンザA型と診断、リン酸オセルタミビル180mg/日を処方。投与3日目に、えん下障害、精神障害、言語障害、唾液分泌促進が発現し、本剤投与中止。1ヶ月以上過ぎても、大量の唾液と、少し言語障害がある。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
101	B-04026773		8歳	不明	なし	痙攣	不明	B型インフルエンザ治療のため、投与量不明のリン酸オセルタミビルを1回服用。解熱後、一過性痙攣で嘔吐。本剤投与中止。その後、症状は消失。
102	B-05000045	女性	8歳	70mg	なし	失語症 意識変容状態	回復	B型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル70mg/日を投与開始。投与開始2日目夕刻、自分の名前、年齢等が言えないことが観察されるため、入院。本剤の服用は、2日目の朝で中止。翌日、有害事象回復するも、有害事象発現時の状況に関する記憶なし。
103	B-05020337	男性	8歳	51mg	ヒベンズ酸チペビジン 塩酸アンブロキソール フルマ酸クレマスチン アセトアミノフェン	譫妄(せん妄)	回復	A型インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビルを治療目的に投与。本剤服用4時間後、異常行動、せん妄が発現。その3時間後、異常行動改善。さらにその4時間後、異常行動発現。その後、せん妄回復し退院となる。
104	B-05020702	女性	8歳	105mg	ヒベンズ酸チペビジン カルボシステイン 塩酸シプロヘプタジン シャゼンソウエキス	意識変容状態 嚥下障害 構音障害	回復	発熱、上気道炎のため消炎剤等投薬、発熱等発症後4日経過してからインフルエンザと診断しリン酸オセルタミビル投与。その翌日嚥下障害、構音障害発生、3時間後意識レベル低下、入院治療、本剤投与中止。3日後解熱し、8日後に回復退院。
105	B-05022003	男性	8歳	不明		譫妄 異常行動 落ち着きのなさ	軽快	既往歴として無菌性髄膜炎あり。 発熱(38.6°C)にて受診し、本剤処方される。本剤服用後、意味不明の言葉、意味不明の行動、不穏発現(5~10分間)。救急車にて来院、来院時は意識障害なし。点滴し、2時間経過観察するが、譫妄、異常行動、不穏軽快。帰宅
106	B-05026593	男性	8歳	50mg	カルボシステイン ヒベンズ酸チペビジン 塩酸シプロヘプタジン	譫妄	不明	A型インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。服用開始から約2時間半後にせん妄が見られ、約30分持続した。その後、リン酸オセルタミビルの服用は中止した。
107	B-06016148	男性	8歳	不明	セフジトレンピボキシル カルボシステイン	意識レベルの低下 痙攣 頭痛	回復 回復 未回復	詳細が不明。 インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビルの服用を開始した。意識レベルの低下、痙攣、頭痛はリン酸オセルタミビル服用終了後7~8日後に発現した。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
108	B-06026529	女性	8歳	75 mg		意識変容状態 大発作痙攣	回復 回復	リン酸オセルタミビル75mg内服10分後、嘔吐し、その後焦点合わず水をいじったり、靴下をいじったりして呼びかけに答えなくなり、眼球上点、全身強直間代性けいれんとなった。けいれんが止まった後も、呼びかけに応えずに四肢を動かす意識障害が持続し、当院搬送。3時間後には意識清明になった。
109	B-07000135	男性	8歳	102 mg	アセトアミノフェン	異常行動	回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル投与開始。本剤2回目服用後、ベッドの上で飛び始めた。何かにおびえてる様子。異常行動発現。38°C台。2日後、異常行動回復。
110	B-07000164	男性	8歳	130 mg	塩酸アンブロキソール カルボシステイン	痙攣 意識レベルの低下	軽快 軽快	インフルエンザウイルス感染治療の為、リン酸オセルタミビルを投与開始。同日、けいれん、自動運動発現。同日軽快。
111	B-07000293	男性	8歳	99mg	マル酸ケトチフェン アセトアミノフェン	異常行動 落ち着きのなさ	回復 回復	発熱39°C、鼻症状あり、インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル処方。夕方より服用開始。翌日、解熱。食欲もあったが良く寝ていた。本剤服用開始3日目、異常言動・行動、不隱状態発現。「現実か？夢か？」と言う。急に自分でつねる、急に泣く。本剤朝服用後投与中止。その後も不隱状態が続き受診。集中できず、突然泣き出す。その後泣いていたことは覚えているが、何故泣いていたのかは自分でもわからない状態。診察中、視線も合わない。入院して経過観察。血液検査、脳波、頭部MRIはいずれも異常なし。特に処置はせず。翌日、不隱状態軽快し、インフルエンザ罹患以前の意識状態に戻る。退院。
112	B-07001894	女性	8歳	52.5 mg	ヒベンズ酸チペジン カルボシステイン 塩酸シプロヘプタジン アセトアミノフェン	痙攣	回復	A型インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。服用3時間半後、けいれん(軽微)発現。インフルエンザによる発熱あり。けいれん軽快。
113	B-07002309	男性	8歳	75 mg	維持液(3) 酢酸リンゲル液(ブドウ糖加) チアミン・ニコチン酸アミド配合剤	異常行動 意識レベルの低下	回復 軽快	A型インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビル服用。2日で解熱。約1ヵ月後、再度、A型インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビル服用開始。ふすまをかじる、目の焦点が合っていないなどの症状が発現。入院となる。症状軽快。 翌日、解熱、輸液投与。インフルエンザ症状軽快。通常どおり受け答え。
114	B-07002855	女性	8歳	不明		痙攣	回復	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル服用開始。 夜、本剤内服後、痙攣にて夜間診療所に搬送。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
115	B-07010109	女性	8歳	84 mg	アセトアミノフェン	異常行動	回復	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル処方。夕方より服用開始。2、3分寝そべってだだをこねるように(手をつけられないほど)暴れた。服用5日目、異常行動回復。朝、服用後、本剤終了。
116	B-02000727	女性	9歳	100mg	セフテラムピボキシル	幻覚	回復	インフルエンザ様疾患のためリン酸オセルタミビルを18時頃服用開始。20時45分幻覚様症状発現。睡眠中突然目を開き一点凝視。名前を呼ぶも返答せず、何度も呼びかけて返答するようになる。5分後幻覚様症状回復、意識清明後の検温では37°Cであった。翌朝7時頃本剤2回目服用、服用2時間後より腹痛、嘔気あり。1時間程度で症状消失。19時に本剤3回目服用後腹痛、気分不良。30分程度で症状消失。
117	B-02001235	男性	9歳	75mg	カルボシスチイン セフジニル マレイン酸クロルフェニラミン リン酸ジヒドロコデイン 塩酸メチルエフェドリン ロキソプロフェンナトリウム	痙攣	回復	インフルエンザB型と診断、リン酸オセルタミビル75mg/日を処方。本剤75mgを服用。翌朝、75mgを服用し解熱。同日夜、10分程度持続する全身の痙攣が発生し、自然軽快、後遺症なし。自己判断で本剤服用中止。2日後、受診時、咽頭痛のみでその他は無症状。
118	B-03007837	男性	9歳	112.5mg	なし	意識変容状態	回復	インフルエンザと確定診断後、リン酸オセルタミビル112.5mg/日を投与開始。投与1回目直後に嘔吐、10分後再服用時の30分後に意識不明の言動を認める。有害事象発現30分後に処置なしで回復、入院して継続投与するも、その後は有害事象を発現せず。
119	B-03009909	男性	9歳			痙攣	回復	リン酸オセルタミビルを投与後、痙攣が発現。その後回復した。
120	B-04024623	男性	9歳	不明		譫妄	回復	インフルエンザA型と診断、夕方、リン酸オセルタミビル(量は不明)を服用。翌朝、2回目を服用し、解熱したが、食欲・活気不良。同日夜、異常な発言あり、倒れ込み受診、軽度意識障害が疑われた。同日夜、救急外来を受診、平熱で歩いて入室し、見当識は保たれていたが、意識清明とは言えずごく軽度の意識障害が疑われた。本剤は2回の服用で終了。事象発現から9日目に徐波消失、退院。退院から18日後、夜間に突然、強い不安と軽度の意識変容が見られ、入院。経過は前回と全く同様で、10日目に退院。
121	B-04025081	女性	9歳	不明	なし	幻覚 嘔吐	不明	インフルエンザ治療のため、投与量不明のリン酸オセルタミビルを服用後、まもなく幻覚あり、嘔吐し、泣いた。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
122	B-05022091	男性	9歳	84mg	セフジニル 酢酸維持液 ソリタT-1	異常行動	回復	発熱(38.6°C)にてインフルエンザ陰性であったが、本剤処方。投与後、嘔吐あり。2回目服用後、異常な発言を行い、救急車にて来院、入院となる。入院時、意識正常、異常言動なし。本剤は、中止とした。
123	B-06002230	男性	9歳	不明	プロピオン酸フルチカゾン	痙攣	回復	A型インフルエンザで発熱(39.5°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。服用開始から約1時間後に痙攣が発症し、約5分後に回復した。その後、リン酸オセルタミビルの服用は中止した。 痙攣の既往歴あり。
124	B-06026846	男性	9歳	60mg	臭化水素酸デキストロメトル ファン アセトアミノフェン	異常行動 痙攣	回復 軽快	インフルエンザA確定。服用30分後に奇声を発するも押さえつけ入眠。けいれん発現。入院目的に搬送時、意識クリアーになる。
125	B-06026849	女性	9歳	60 mg	アセトアミノフェン	異常行動	回復	インフルエンザの診断なし。リン酸オセルタミビル60mg1回服用。40分就寝した後、布団を蹴飛ばし「怖い」と叫び、視点が定まらず、母がつかまえていた。インフルエンザ迅速検査陰性、咽頭粘液、血液でのインフルエンザウイルス同定(PCR)陰性。
126	B-07000124	男性	9歳	不明		異常行動	回復	過去に本剤服用時に異常行動が発現(詳細不明)したことあり。インフルエンザに対し、リン酸オセルタミビル投与開始し、異常行動発現。翌日、異常行動回復。
127	B-07001281	不明	9歳	112.5mg		悪夢 睡眠驚愕	軽快 軽快	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル処方。本剤服用による幻覚がトラウマになり、悪夢、夜驚症が発現。 インフルエンザ発症から約2ヵ月後、副作用の訴えからジアゼパム処方。悪夢、夜驚症軽快。
128	B-07003013	女性	9歳	不明	セフポドキシムプロキセチル アセトアミノフェン	異常行動	回復	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル服用開始。うわごとを言う、添い寝していた家族をける等の行動が発現。 投与開始2日目、本剤服用中止。
129	B-04001019	男性	10歳	75mg		痙攣 意識変容状態	回復	39°Cの発熱で、インフルエンザA型と診断、リン酸オセルタミビル75mgを服用後1時間半で意識障害、30分のけいれんが出現。入院し点滴を受け5時間半後には意識清明となる。事象発現から2日後には意識障害、痙攣は回復し、後遺症なく退院した。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽帰	経過の概要
130	B-04027255	男性	10歳	150mg	ヒベンズ酸チペジン	幻覚 幻聴	回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル150mg/日及びヒベンズ酸チペジンを投与開始。2回目の服用の2時間後、1回の幻聴出現。服用4時間後、4回の幻覚出現。幻覚出現の5時間後、両有害事象回復。
131	B-05026626	男性	10歳	120mg	鎮咳去たん配合剤(1)	痙攣	回復	A型インフルエンザで発熱(39°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。投与開始日の夜に痙攣が生じ、回復した。投与開始から5日目にインフルエンザが軽快、回復した。
132	B-06023790	男性	10歳	36mg	カルボシスティン ザナミビル水和物	異常行動	回復	リン酸オセルタミビル内服後、30分後に異常発言あり。その30分後、異常発言回復。
133	B-06024213	男性	10歳	150 mg	カルボシスティン 塩化リゾチーム 塩酸プロムヘキシン	異常行動 意識レベルの低下	回復 回復	リン酸オセルタミビル2回目服用後、約2時間後に異常行動、意識混濁が発現。熱が高そうな状態で、寝起きに意味不明なことを言う。その5分後には回復している。さらに1時間後に息苦しさを訴え、外来受診するが異常なし。
134	B-06024320	男性	10歳	69mg	アセトアミノフェン 塩化デカリニウム	幻視	回復	4~5年前にリン酸オセルタミビルの服用歴があり、問題はなかった。39.3°C、咽頭痛、頭痛、傾眠から臨床的にインフルエンザと診断。リン酸オセルタミビル1回目服用後、2時間後に異常な発言があり、母親の問い合わせに「夢か現実かわからない」という。翌日早朝、38.0°C。幻覚様症状継続。昼前には幻覚様症状なし。
135	B-06024664	女性	10歳	不明		幻覚	軽快	リン酸オセルタミビルを服用し寝ていると、急に起きて「黒いものが見えて恐い」と言い、嘔吐し震えていた。以降服用は中止し、翌日軽快。
136	B-06025003	女性	10歳	60mg		幻覚 妄想	軽快 軽快	本剤投与開始後、悪夢(大きなクモがいる)出現。 その後に悪夢軽快。
137	B-06025580	男性	10歳	100mg	アセトアミノフェン ソルデム1(点滴) ブドウ糖(点滴)	異常行動	回復	発熱(39.2°C)、倦怠感、嘔気にて、本剤投与。 その夜異常行動(弟が誰かに首を絞められていると必死に訴える行動、うつぶせになって手足をバタつかせる)あり、同日回復。 5日後、インフルエンザ軽快

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
138	B-06026131	男性	10歳	75 mg		異常行動	回復	前夜、40°Cの高熱発現。インフルエンザB型の診断でリン酸オセルタミビル処方。朝、1回目服用。夜、本剤を飲ませようとしたところ、少しほおっとしていて意味不明な言葉を叫ぶ等、異常言動が5分くらいあり。救急車到着。表情うつろ。痙攣なし。意識レベル1。救急外来到着時、胸部X-P、頭部CT異常なし。インフルエンザ脳症の可能性も否定しきれず入院。翌朝、平熱。異常行動なし。
139	B-07000107	女性	10歳	130 mg	ヒベンズ酸チベピジン 塩酸シプロヘプタジン カルボシスティイン イブプロフェン	異常行動	回復	A型インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。 異常行動、言動(家電をなぐった)発現。 服用3日後、異常行動、言動回復。
140	B-07001663	男性	10歳	120 mg	カルボシスティイン アセトアミノフェン	譫妄	回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル5日分投与開始。服用1日目、異常な行動はなかったものの、「お父さんがお母さんを殺そうとしている」など、非現実的な事を話していた。せん妄発現。 翌日、せん妄回復。 服用5日目に服用終了。
141	B-07003787	男性	10歳	150mg	ヒベンズ酸チベピジン 塩酸アンブロキソール d-マレイン酸クロルフェニラミン ドンペリドン アセトアミノフェン	異常行動	回復	インフルエンザA型の診断にてリン酸オセルタミビル処方。本剤服用約2時間後、2回嘔吐あり。 投与開始2日目、朝、39.5°C。本剤服用。服用約4時間後から食欲低下あり。恐れる、泣くといった異常行動発現。普段はめぞめぞする性格ではないが、些細なことでめぞめぞして泣く。 投与開始4日目、再受診。35.6°C。副作用と思われる精神症状が認められたため、夕方の分より本剤投与中止。異常行動回復。
142	B-02002181	男性	11歳	150→75mg	プラノプロフェン テプレノン ドンペリドン	譫妄 幻覚	軽快	臨床症状よりインフルエンザと診断後、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与開始。投与1日目夕刻、異常な発現を観察、翌朝まで何回かのうわ言が観察される。その後投与量を75mg/日に変更して本剤投与を継続するが、有害事象の発現はなし。
143	B-06000460	男性	11歳	140mg	アセトアミノフェン カルボシスティイン 鎮咳配合剤(1)	幻覚	回復	A型インフルエンザで発熱(38.5°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。服用開始日の夜に幻覚が発現し、病院で血液検査と頭部CTで異常が見られなかった。幻覚は回復した。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽帰	経過の概要
144	B-06025414	女性	11歳	不明		聴覚過敏 錯覚 譫妄 計算力障害	軽快 未回復 軽快 軽快	本剤投与開始後、音に異常反応を示す、異常知覚、せん妄、計算障害発現。翌日、投与中止。現在、症状未回復。
145	B-07000100	男性	11歳	150 mg		幻覚 異常行動	回復 回復	A型インフルエンザ治療の為、リン酸オセルタミビル服用開始。幻覚、行動の異常発現し、同日回復。
146	B-07000200	女性	11歳	150 mg		意識消失 痙攣	回復 回復	インフルエンザBの診断のため、リン酸オセルタミビル処方。翌朝、急に目が見えないと云い意識を失い、その後眼球が上転し四肢がつっぱる様な痙攣を起こしたが、数分で回復。37.6°C。翌日、インフルエンザ軽快。
147	B-07000241	男性	11歳	135 mg	塩酸シプロヘプタジン 塩酸クロフェダノール 塩酸アンブロキソール ロキソプロフェンナトリウム	恐怖	回復	インフルエンザ治療の為、リン酸オセルタミビル投与開始。夜、2回目投与後、「恐い、恐い」とうわ言を言った。異常行動・うわ言発現。4日後、異常行動・うわ言回復。
148	B-07001737	男性	11歳	不明	セフテラムピボキシル 臭化水素酸デキストロメトルファン イブプロフェン	激越 激越	回復 回復	朝、38.5°C。インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビル処方。昼より、本剤服用開始。本剤2回目服用2~3時間後(深夜)、興奮状態発現。眠っていたが、急に起き上がり「宿題がわからん」と叫び、寝言かと思っていたが、自分の頭をドンドンとたたき始めた。髪をかきむしった(抜く程ではない)。1時間程の間に3回ほど。興奮状態は1時間で回復。服用2日目、夜、服用後3~4時間後(深夜)、興奮状態発現。前日とほぼ同様の症状であった。一度は立ち上がろうとした。興奮状態は約1時間で回復。
149	B-07007902	不明	11歳	不明		痙攣	<記載なし>	インフルエンザB型の診断でリン酸オセルタミビル服用後、痙攣を認め入院。頭部MRI拡散強調画像で脳梁膨大部に高信号域を認めた。いずれも痙攣発症前に異常行動(不適行動・言動)を認めていた。髄液検査、CTは異常なく、MRI所見は可逆性の病変であった。
150	B-02001392	女性	12歳	67.5mg	リン酸ジヒドロコデイン配合剤 ヒベンズ酸チペビジン	失神	回復	インフルエンザが疑われリン酸オセルタミビル0.9カプセル(67.5mg)を服用。服用2時間後、冷蔵庫の物を取ろうとしたときに、一瞬意識がなくなり倒れた。その時の記憶ははっきりしない。45分後に輸液を投与し、数時間後に一般状態まで回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
151	B-02002041	女性	12歳	150mg	カルボシスチーン リン酸ジメモルファン 塩酸シプロヘプタジン	譫妄	回復	腹痛あり、A型インフルエンザと診断。治療目的にてリン酸オセルタミビル投与。本剤を朝服用開始し、当日夜寝る前興奮し、変な夢を見ているようだった。本剤投与中止。翌日朝、意識が清明に戻る。
152	B-02003019	男性	12歳	150mg	アスピリン・VC配合剤 サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン/プロメタジンメチレンジサリチレート 臭化水素酸デキストロメトルファン	意識消失	回復	インフルエンザのためリン酸オセルタミビル服用開始。19時頃2回目服用後臥床。23時頃自力で立位を保てず意識を失った。そのとき失禁。すぐに下の布団に戻し、約5分後に症状回復。翌日インフルエンザ回復。
153	B-03001391	男性	12歳	37.5mg	アセトアミノフェン フマル酸クレマスチン 塩酸ツロブテロール カルボシスチーン	意識レベルの低下	回復	1998年6月から成長ホルモン分泌が低下しはじめ現在も成長ホルモンを投与している。インフルエンザ治療のため夕方よりリン酸オセルタミビル服用開始(39°C)。服用2日目の18時頃解熱していたがつらくて横になっていた。嘔気出現し嘔吐後そのまま意識が悪くなつた。意識低下は3分ほど持続。18時40分頃来院、顔色不良だが意識は清明。翌日点滴にて解熱傾向、嘔吐もなし。
154	B-03010918	女性	12歳	132mg	臭化水素酸デキストロメトルファン 塩酸チアラミド	視野欠損	回復	リン酸オセルタミビル132mg/日他を処方。3日間服用し、4日目の起床時、右目の下半分が見えなくなつたため、投薬中止。2~3時間後、回復。
155	B-04008523	男性	12歳	30mg	アジスロマイシン水和物 アセトアミノフェン	意識レベルの低下	回復	インフルエンザA型と診断、リン酸オセルタミビル60mg/日他を処方。帰宅後、本剤30mgを服用。1時間後、軽度意識混濁発現、かん高いなり声、約40分間の多弁、目が丸くなった、多動、41.7°Cの高熱が認められた。事象発現から1時間後には落ち着き、さらに1時間後に再度受診したが、意識清明、発熱38°C。翌日朝、調子が良くなり、36.8°Cに解熱。
156	B-05024490	男性	12歳	150mg	クラリスロマイシン	幻覚 激越	回復 回復	A型インフルエンザで発熱(39.0°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用開始。投与開始から3日目に幻覚及び興奮が出現した。リン酸オセルタミビルの服用を中止し、投与開始から5日目にインフルエンザが軽快し、幻覚及び興奮は発現から4日目に回復した。
157	B-05026111	男性	12歳	75mg	アセトアミノフェン	幻覚	回復	A型インフルエンザ治療のため昼食後にリン酸オセルタミビルとアセトアミノフェン服用(38.9°C)。20分後に嘔吐し幻覚発現。服用2時間後受診時、発熱(40°C)、全身倦怠感著明だが、意識清明で応答も普通であった。翌日解熱傾向(37°C台)となり意識障害、幻覚なし。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
158	B-05026114	男性	12歳	130mg	ラクトミン	妄想	軽快	A型インフルエンザで発熱(39.0°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。服用開始から2日目にインフルエンザが軽快(体温37.0°C)したもの、リン酸オセルタミビルの服用を5日間続けた。服用開始から3日目に妄想が発現し、約9日後に軽快した。
159	B-05026980	女性	12歳	150mg		痙攣 意識変容状態	軽快	A型インフルエンザで発熱(37.5°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始する。投与開始から2日目に解熱したが、リン酸オセルタミビルは4日間服用した。投与開始から5日目に意識レベルの低下と痙攣が発現し、5分程度持続した。その翌日、意識レベルの低下と痙攣が軽快した。 なお、頭蓋骨骨折と頭部外傷の既往があり、脳波異常は未回復のままであった。
160	B-07000202	男性	12歳	不明	バルプロ酸ナトリウム ゾニサミド	痙攣	回復	インフルエンザB型に対して、リン酸オセルタミビル処方。服用1時間後、痙攣発現(2分間)。CT検査異常なし。服用開始2日後、回復。
161	B-07000227	女性	12歳	75 mg		意識消失	回復	発熱38.5°C、全身倦怠感あり、咳嗽軽度、咽頭痛軽度。インフルエンザB型と診断され、リン酸オセルタミビルを処方。昼頃、自宅で本剤を服用。就寝。本剤服用約5時間後、腹痛を訴えるため、トイレに行きなさいと言ったところ、トイレと違う方向に行って倒れた。意識はもうろうとしてトイレに連れて行こうとしたが、再びトイレの前で倒れた。意識もうろう状態(非重篤)発現。強い呼びかけには応じる。点滴を受けた。その後は特変なく経過。意識もうろう状態回復。
162	B-07000267	男性	12歳	138mg		譫妄	回復	体温37.8°Cで来院。インフルエンザB型の診断にて、リン酸オセルタミビル処方。 服用開始2日目、夜から未明にかけて、うわごとが続く。服用開始3日目に中止。 服用中止翌日、うわごと軽快。
163	B-07000289	女性	12歳	150 mg	メキタジン ロキソプロフェンナトリウム	意識消失 てんかん 意識消失 てんかん	回復 回復 回復 回復	診察時38.4°C。インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビル5日分処方。服用終了後、解熱。 服用終了2日目、意識喪失し、痙攣発現。その日のうちに受診。意識喪失、痙攣回復。 服用終了3日目、再度、食事中意識喪失で2、3分倒れる。意識喪失回復。神経内科に検査のため入院(1週間)。検査では異常は認められなかった。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
164	B-07002073	女性	12歳	150mg	クラリスロマイシン 臭化水素酸デキストロメトル ファン カルボシステイン 開始液(1)	大発作痙攣	不明	インフルエンザB型治療のため、リン酸オセルタミビル処方。服用開始4日後、朝、本剤減量。外来受診時(38-39°C出現、咳も強い)胸部x-P撮影中にGTC(全身性強直間代けいれん発作)5秒。その後、1分後に意識もどした。胸部x-p上気管支影の増強はみられたが、明らかな肺炎臓はなかった。
165	B-02000098	男性	13歳	150mg	メトクロプラミド ラフチジン ロキソプロフェンナトリウム	ジスキネジー	回復	インフルエンザの治療のためリン酸オセルタミビル服用開始。投与開始3日目に解熱し本剤服用終了。投与終了1日後の18時頃、突然頭を後ろに引っ張られるような感じがあり、首を左へ回旋。眼球右共同偏視、喋り難い、目が閉じ難い等の顔面・上肢等の不随意運動発現。意識清明。22時頃急患受診、ジアゼパムにて鎮静、入院。投与終了2日後歩行など正常となり、不随意運動回復。
166	B-02003705	女性	13歳	不明		味覚異常	不明	インフルエンザにリン酸オセルタミビル投与。味覚異常発現。 転帰不明。
167	B-03008971	男性	13歳	150mg	ヒベンズ酸チペビジン	失神	軽快	臨床症状及び経過よりインフルエンザと診断後、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与開始。投与1回目後、腹痛発現、その3時間後に眼前暗黒感出現し転倒、下痢便失禁。転倒後約90分後に救急搬送、意識ほぼ清明も血圧低下及び心部と恥骨上部の軽度圧痛あり。乳酸加リングル及び酸素投与により、血圧及び脈拍回復、全身倦怠感軽快。
168	B-03012367	女性	13歳			意識変容状態	回復	リン酸オセルタミビル(量、期間不明)を服用後、意識障害が発現し、2日目に入院。入院3日目に意識障害は回復。
169	B-04008398	男性	13歳	150mg	ロキソプロフェンナトリウム 塩酸ツロブテロール メキタジン	幻覚 痙攣 意識消失	回復	診断キットでは(一)だったが、症状改善のためリン酸オセルタミビル150mg/日他を処方され、同日夕方、2回目服用後、突然、意識消失、痙攣発作出現。本剤も嘔吐。意識回復後も幻覚症状あり、治療。事象発現から7日目に回復。
170	B-05024834	女性	13歳	75mg		痙攣	回復	A型インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビルを服用。服用から約3時間後に数秒の痙攣が発現し、自然に収まり、回復した。
171	B-06024412	男性	13歳	75mg		痙攣 異常行動	回復 回復	リン酸オセルタミビル服用後、約1時間後にはうなり始め目はうつろ。突然目を見開いて泡を吹き意識なし。1~2分後に反応して舌を出す。経過観察のため入院、3日後回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
172	B-06026128	男性	13歳	75mg		幻覚 妄想 異常行動	回復 回復 回復	インフルエンザA治療の為、本剤の投与開始。幻覚、妄想、異常行動発現。
173	B-06026622	女性	13歳	75 mg	ビベンズ酸チペピジン カルボシステイン 塩酸プロメタジン トラネキサム酸	意識消失	回復	リン酸オセルタミビル服用10時間後、体に力が入らず脱力状態。母が階段の上方から両腕をかかえ、家族が階段の下方から両足を持って運んでいた。開眼していたが、昇る途中、呼名に反応しない意識消失状態が1分間あり、家族は1分ほど両足の硬直を感じた。その後硬直は消失し、呼名に開眼する状態となり救急車で当院来院した。本人は階段昇っている途中より、家に救急隊が到着するまでの間は覚えていない。
174	B-07000211	男性	13歳	150 mg		うつ病 無感情 自殺企図	未回復 未回復 回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。本剤服用後、抑うつ、無気力、自殺企図発現。 服用開始4日後、服用中止。
175	B-07000256	女性	13歳	150 mg		意識変容状態	回復	インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル服用開始。服用3日目、解熱したため、本剤服用を自己中断。服用開始から4日目、夕方、帰宅。ぼんやりしていて視線あわず、意識レベルの低下発現。服用開始5日目、学校では、一日ぼんやりしたり奇声をあげていた。帰宅時間になんでも、自宅がわからないため友人につれられて帰宅する。視線が合わず友人、家族の名前、自分の名前が言えない。体温：36.8°C。救急外来受診後入院。失見当識、健忘あるが麻痺はなく、神経学的所見なし。服用開始6日目、脳波異常なし。視線あうが、レスポンスない、記憶あいまい。服用開始8日目、活発でふだんどおり、退院となる。
176	B-07002666	男性	13歳	150 mg	ロキソプロフェンナトリウム 鎮咳配合剤(1) アセトアミノフェン	攻撃性	回復	インフルエンザB型の診断にて、リン酸オセルタミビル服用開始。 服用開始3日目、掃除機を振り廻し、食器類を破損するといった異常行動 暴力行為が発現。直ちに本剤を中止。 中止翌日、解熱し、落ち着きない状態。インフルエンザは軽快。
177	B-02000597	男性	14歳	150mg	クラリスロマイシン リン酸ジメモルファン カルボシステイン アセトアミノフェン	離人症 無表情 無関心	回復	リン酸オセルタミビル150mg/日他を処方。投与4日目に無気力、無表情、離人症発現し、本剤投与中止。事象発現後、6日目に回復。
178	B-02001391	女性	14歳	75mg	リン酸ベンプロペリン アセトアミノフェン	失神	回復	インフルエンザが疑われリン酸オセルタミビル1カプセル(75mg)を服用。投与後1時間後、トイレに行き倒れる。症状としは、ボーッとなり、強直が認められるもすぐに戻る。その間の記憶なし。服用2時間半後、意識清明。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽重	経過の概要
179	B-03009369	男性	14歳	150mg	カルボシステイン 塩酸プロムヘキシン 塩酸プロカテロール セフジトレンピボキシル	統合失調症	軽快	臨床診断からインフルエンザと診断、リン酸オセルタミビル150mg/日他を処方。夜から内服開始。4日目まで服用し、インフルエンザ様症状は改善。服用終了後5日目頃から、身体がおかしいとの訴えがあり、経過観察のため入院。妄想様言動、全身を随意的に前後に揺さぶるような震え等が認められた。入院3日目に妄想様言動等が認められず退院となつたが、翌日精神科に受診したところ統合失調症が考えられ、外来で経過観察となつた。2週間後、症状はほとんど消失。
180	B-03009543	男性	14歳	150mg	アセトアミノフェン	意識変容状態 意識変容状態	回復	自宅にあったリン酸オセルタミビル150mg/日及びアセトアミノフェンを服用。同日夜、多汗、顔面蒼白になり後方に転倒、意識不明となる。病院では意識清明でインフルエンザA型と診断され帰宅するが、脱力転倒、関連性のない発語を繰り返し、呼びかけへの応答はない。翌朝は、意識清明で、本人は転倒した記憶もあり。入院し頭部CT、腰椎穿刺を行うが異常所見なし。以降、意識障害なし。
181	B-05026848	男性	14歳	150mg	塩化リゾチーム 塩化デカリニウム	意識レベルの低下 痙攣	回復 回復	インフルエンザ確定診断で陰性だったが、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。投与開始から2日目に意識レベルの低下と痙攣が発現し、後ほど回復した。リン酸オセルタミビル服用開始から4日目に服用を中止した。
182	B-06000039	男性	14歳	75mg	セフテラムピボキシル	痙攣	回復	A型インフルエンザで発熱(39.2°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。投与開始日の夜に全身の痙攣が見られ、翌日の朝に回復した。リン酸オセルタミビルの投与は1回で中止した。
183	B-06022862	男性	14歳	150mg	なし	意識変容状態	回復	迅速キットにて陰性であったが、臨床症状に鑑み、予防目的でリン酸オセルタミビル75mg×2回/日投与開始。翌日、意識障害(意識レベルの低下)発現。6日後、意識障害回復、退院。
184	B-06025005	女性	14歳	150 mg		悪夢 幻覚	軽快 軽快	高熱(39°C)、インフルエンザB型治療の為、本剤投与開始。本剤投与後、幻覚(小さな光がたくさん見える)、幻想(光に吸い込まれそうになる)、悪夢(爆弾が仕掛けられ爆発しそうな体験)出現。投与中止後、悪夢、幻覚、幻想軽快
185	B-07000088	女性	14歳	150mg	d-マレイン酸クロルフェニラ ミン 硫酸サルブタモール	異常行動	軽快	インフルエンザウイルス感染症治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。深夜、トイレに行き、トイレの中で意味不明なことを絶叫し、その場で倒れて意識不明の状態になった。30分後、救急車で運ばれて來たが、その際は意識は回復していた。異常行動軽快。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
186	B-07000123	男性	14歳	75 mg	塩酸アンブロキソール 臭化水素酸デキストロメトルファン	異常行動	回復	来院時、体温:39.2°C。夕方、A型インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル服用。服用30分後、異常行動発現。もうろうとして意識がクリア。「俺を殺す気か?」と言った。服用4時間後、2Fから降りてきて、再び意識もうろう状態。体温:39.0°C。「死ねと言うのか?」という言葉に母の呼びかけ「どうしたの?」により意識が戻った。その後は普通。ご飯食べた。服用6時間後、2F寝室で就寝。服用8時間後、意識もうろう「何で、何で?」と言い泣いた。ベッドに戻して、うつ伏せにしたら意識が戻った。「お母さんがなんているの?」と言った。体温:37°C。服用開始2日目、朝、体温が下がって普通。
187	B-07000242	女性	14歳	不明		脳梗塞	不明	詳細不明
188	B-07000257	男性	14歳	75 mg	アセトアミノフェン	幻聴 幻覚 異常行動	回復 回復 回復	インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビル投与開始。翌日、本剤3回目を服用後様子がおかしくなり暴れだす。幻聴、幻覚、異常行動発現。他院入院。翌々日、回復。
189	B-02002384	男性	15歳	150mg	リン酸ジメモルファン 塩酸アンブロキソール 硫酸サルブタモール d-マレイン酸クロルフェニラミン アセトアミノフェン	認知不能症	回復	詳細不明
190	B-02003545	女性	15歳	75mg	リン酸ジヒドロコデイン アセトアミノフェン	浮動性めまい	回復	詳細不明
191	B-03000392	男性	15歳	150mg	セフジニル アセトアミノフェン ピペラシンナトリウム スルピリン 塩酸ミノサイクリン	傾眠	回復	発熱のため受診。臨床的にインフルエンザと診断しリン酸オセルタミビルを5日間服用。服用一日後朝、嘔吐、発熱、歩行困難(フラフラ)、傾眠がち症状あり。投与中止後23日間、副作用継続。
192	B-04007755	女性	15歳	150mg	アセトアミノフェン 塩酸アンブロキソール ヒベンズ酸チベピジン	てんかん	軽快	リン酸オセルタミビル150mg/日他を投与。投与開始3日で痙攣を発症、てんかんと診断。同日で服用終了。3ヶ月後、抗てんかん薬服用中。てんかんの症状はおさまっている。
193	B-05025715	女性	15歳	225mg	アセトアミノフェン 臭化水素酸デキストロメトルファン	意識変容状態	軽快	本剤を誤って75mg×3回/日で3日間服用後4日目1回服用し服用終了。服用開始2日目に解熱。服用開始3日目に意識障害(喋り方が緩慢になる)発現。服用終了1日後に軽度意識障害等あり入院。服用終了5日後意識障害軽快。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽快	経過の概要
194	B-06020356	女性	15歳	150mg	イブプロフェン ファロペネムナトリウム	意識変容状態	軽快	インフルエンザテストでは陰性。発熱があり、リン酸オセルタミビル、イブプロフェン、ファロペネムナトリウムを投与開始。3日後、意識混濁、尿失禁などにより入院。意識障害、不穏状態、脳波にて高振幅の徐波が全般的に認められたことから脳炎脳症と診断。12時間後ぐらいから意識回復。翌日元気になるが、脳波異常は残っている。
195	B-07000214	男性	15歳	75 mg	セフボドキシムプロキセチル 鎮咳配合剤(1) アセトアミノフェン	異常行動	回復	38.9°Cと発熱。インフルエンザB型と診断にて、リン酸オセルタミビル処方。服用後、異常言動発言。寝ていたのが起き出し、意味不明の発言あり、何かをさがす様な動きをくり返した。家族の声には全く答えず20分程で回復。その後著変なし、本人全く記憶なし。
196	B-03008278	男性	16歳	75mg	リン酸ジメモルファン カルボシステイン ツロブテロール 塩酸シプロヘプタジン	痙攣 意識変容状態	回復	インフルエンザと確定診断後、リン酸オセルタミビル75mg/日を投与開始。投与1回目の3時間後に足重感、4時間後に意識消失及び数分の痙攣。有害事象発現5分後に処置なしで回復、入院して投与中止、その後は有害事象を発現せず。
197	B-03010648	男性	16歳	150mg	鎮咳配合剤(1) 塩酸アンブロキソール ノスカピン ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミン	意識変容状態	回復	インフルエンザA、B型と診断、リン酸オセルタミビル150mg/日他を処方。夕食後75mgを服用。同日夜、3回続けて倒れ、意識喪失もあり。翌日昼、受診時は意識清明。
198	B-05021108	女性	16歳	150mg	マレイン酸フルフェナジン ロフラゼブ酸エチル 塩酸プロメタジン エチゾラム	幻覚(幻覚) 妄想(妄想)	軽快	3年前からうつ病発症。39°Cの発熱により、リン酸オセルタミビル投与。翌日幻覚、妄想が発現したため入院。観念奔逸、幻覚妄想状態が5ヶ月続き軽快退院。以後3年間脳波測定に異常所見あり。現在もうつ状態で通院中。
199	B-07000113	男性	16歳	75mg		痙攣	回復	インフルエンザB型に対して、リン酸オセルタミビル処方。自宅でうずくまっているのをおこしたときに痙攣があり、救急搬送される。熱はなく、意識もあり、身体レベルも異常なし。脳圧も正常。当日、痙攣軽快。
200	B-07002390	男性	16歳	75 mg	鎮咳配合剤(1)	異常行動 浮動性めまい 転倒	回復 回復 回復	インフルエンザA型治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。服用1日目、転倒、頭部外傷、ふらつき発現。体温:38.4°C。 服用2日目、異常行動発現。頭部外傷、4針結合。 服用5日目、朝服用。その後は、本剤服用せず。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	精神神経症の経過の概要
201	B-03009466	女性	17歳	75mg		ミオクローヌス	回復	発熱と頭痛から、自宅にあったリン酸オセルタミビル75mgを服用。4時間後、脱水予防のための点滴を受け、その30分後から不随意運動出現。熱が高くなり緊張したりすると憎悪。インフルエンザA型と診断。事象発現3日目朝に不随意運動消失。
202	B-05023787	男性	17歳	75mg		意識変容状態 譴妄	回復	発熱(38.8°C)、頭痛、咳、咽頭痛にて確認判定後本剤処方。内服開始後、ふらつき自覚。 翌日、服用しふらつきあり。 深夜、体温37.8°C意識障害(海で自分が溺れている錯覚を感じる等)発現するが1時間程度で消失。 翌朝、本剤服用中止。
203	B-05025716	男性	17歳	150mg	アセトアミノフェン 臭化水素酸デキストロメトル ファン	意識変容状態	軽快	インフルエンザ治療(確定はしていない)のためリン酸オセルタミビル服用開始(39°C)。服用開始3日後解熱、夕方より意識障害(会話が通じずボーッとしていることが多い)発現。その後も意識障害継続。本剤5日間服用終了翌日に近医で意識障害指摘され入院。やや前頭葉に優位に広汎性の高振幅θ waveが頻発。炎症性脳炎、ウイルス性脳炎の可能性のためステロイド、アシクロビル投与開始。意識障害発現後13日後に軽快、脳波異常も消失。
204	B-07000068	男性	17歳	75 mg	アセトアミノフェン 鎮咳配合剤(1)	意識消失 痙攣	回復 回復	リン酸オセルタミビル75mg服用。 約4時間後、母親が心配でトイレに付き添った所、突然意識消失し、痙攣を起こした。声をかけたところ、5秒後に回復した。しかしその後の返答もおかしくトイレに行こうとしたのにも関わらず、ご飯を食べにリビングに行こうとしたと、トンチンカンな事を言った。
205	B-07000217	男性	17歳	150 mg	一般用鼻炎薬	精神障害	回復	インフルエンザB型にて、リン酸オセルタミビル4日分処方。服用終了後、発汗量が減少し、本人が頭がボーとするとした自覚症状を訴えた。精神障害発現。翌日も同様。服用終了3日目、脳波で異常が認められ、服用終了4日目に入院。脳波では異常所見認めるが少しづつ改善。服用終了11日目に症状改善し、退院。
206	B-07000899	男性	17歳	75 mg	アセトアミノフェン 小青竜湯	激越	回復	発熱39.2°C。インフルエンザB型診断にて、リン酸オセルタミビル服用開始。本剤75mg服用した夜に興奮(興奮してあはれだした)発現。患者の家族からTELがあり、その後は本剤は服用していない。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
207	B-07002263	男性	17歳	150mg	アセトアミノフェン	統合失調症様障害	不明	インフルエンザBと診断され、リン酸オセルタミビル処方。服用6日目、朝の服用にて、服用終了。そのころから、言動に総合性が無くなつた。意識は清明、見当識ありだが、会話に混乱あり。服用終了2日後、急性混状態発現。神経学的には明らかな脱落症状なし、MRI、ルンバールを施行。脳炎、髄膜炎を示唆する所見なし。統合失調症を疑う。
208	B-07003580	男性	17歳	150 mg	非ピリン系感冒剤(4)	異常行動	回復	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル服用開始。夜間、異常行動(あはれる)発現。押さえつけていないといけない状態であった。投与開始2日目、何でも出来てしまいそうな気持ちだったらしい。異常行動回復。投与開始6日目にて本剤投与終了。
209	B-07000064	男性	18歳	75 mg	鎮咳配合剤(1) アセトアミノフェン 塩酸セフカベンピボキシル	意識消失	回復	インフルエンザ治療のため、本剤服用。1時間後、意識レベル低下。両親の呼びかけに応じないため、救急者にて他院に搬送。その後、自然回復。
210	B-02013958	女性	19歳		バルプロ酸ナトリウム	痙攣	回復	全般性てんかんの治療中(開始日:2002/02/18)。インフルエンザと診断、リン酸オセルタミビル(量不明)を5日間投与。投与終了後5日後に全身性けいれん、意識障害が発現。投薬により症状軽快。2日後には症状安定。
211	B-04001616	男性	19歳	150mg	塩酸セフカベンピボキシル 塩酸メトホルミン グリメビリド	譫妄	回復	プラダーウィリー症候群、糖尿病、中等度精神発達遅滞により治療中(開始日:不明)。発熱があり、インフルエンザと診断、リン酸オセルタミビル150mg/日を4日間服用し(5日目の朝も服用したかもしれない)、症状は治まった。投与終了後3日目(2日目かもしれない)の夕食時より、興奮、意味不明の発言、言動まとまりなく意味不明の記号を書き続ける、手を洗い続ける等の事象が発言。翌日も言動まとまらず、「誰かが来る」と怖がる。事象発現4日目、混乱がつづくため入院となる。他剤投薬により症状は軽減。事象発現から12日目に譫妄は回復し、退院した。
212	B-05017979	女性	19歳	150mg	ロキソプロフェンナトリウム 塩化リゾチーム 含嗽吸入原液ミチノ 塩酸ジフェニルピラリン インドメタシン	意識変容状態	後遺症	高熱、感冒症状にて受診しインフルエンザと判断される。治療目的にリン酸オセルタミビル投与。本剤投与2日後、症状軽快にあるも微熱、感冒症状認めるため本剤服用。就寝し翌朝応答無く容体異常に気付き、救急搬送される。意識障害重篤。その後約5ヶ月後意識が徐々に回復。現在、リハビリ入院中。意識はつきりしており、記憶の一部に喪失あるも、応答可能であるが、下半身麻痺あり。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽減	経過の概要
213	B-07000226	男性	20歳	75 mg	麻黄湯 塩化リゾチーム	うつ病	回復	インフルエンザ疑いにてリン酸オセルタミビル処方。内服して就寝。服用後、「死にたい」と訴えるなどの異常行動発現し、2回目服用中止。この時、39.1°C。翌朝、38.5°Cの発熱、全身倦怠感あり。夕方、39.3°C。再び、「死にたい」と感じたが、前日より落ち着く。その後、解熱。当時の記憶はあまりなしとのこと。
214	B-07000060	女性	21歳	150mg	プラノプロフェン ジブロフィリン・ジヒドロコディン配合剤	大発作痙攣	回復	A型インフルエンザに対し、リン酸オセルタミビル服用開始。3回目の服用4時間半後、痙攣が発現。翌日、回復。
215	B-07001419	男性	22歳	150 mg		うつ病 自殺念慮	回復 回復	風邪症状にて受診し、インフルエンザB型の診断を受け、リン酸オセルタミビル4日分処方。2回目服用開始後くらいより、気持ちが落ちて自殺したくなる感じなどのうつ状態発現。本剤服用終了4日後、気持ちも落ち着いた。本剤服用終了7日後、再び気持ちが落ち込んだ。うつ状態で自殺念慮もあるため、スルピリド処方。本剤服用終了9日後、頭部MRIは正常。本剤服用終了11日後、脳波は前頭部に徐波あり。
216	B-05000146	男性	23歳	150mg	アセトアミノフェン	意識消失	回復	B型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与開始。投与開始2日目朝の本剤服用前、意識消失発作(数分間)発現、救急受診時には意識回復したが、観察入院。夕刻、本剤を内服するが、有害事象発現せず。翌日退院。
217	B-07003777	男性	23歳	150 mg		痙攣	回復	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル服用。翌朝、本剤服用後、意識障害、痙攣発現。一過性で10秒後に回復。
218	B-01000445	女性	24歳	150mg	ロキソプロフェンナトリウム 塩酸セフカペンビポキシリテプレノン リン酸ジメモルファン	味覚異常	回復	咽頭炎疑いで、抗炎症剤・胃薬・抗菌剤処方。翌日インフルエンザ治療目的にてリン酸オセルタミビル投与。本剤投与終了後の翌日に味覚障害発現。障害程度は、味覚減退／味覚鈍麻(味覚がよわい)。貧血・舌炎は無し。その約1週間目頃より、味覚障害に対する治療無しで回復。
219	B-06024996	女性	24歳	75mg		感情不安定 譫妄	回復	本剤投与開始後、呼吸があらくなり、入院し、せん妄状態、感情失禁発現。本剤、投与中止。 投与中止後も約2時間毎にせん妄状態と覚醒状態を繰り返す。 2日後、退院
220	B-07000089	男性	25歳	150 mg		意識消失	軽快	インフルエンザ様症状を発症。発症6日後、友人からもらったリン酸オセルタミビル服用開始。翌日、車の運転中意識がなくなり、壁にぶつかり、当院のICUに入院。意識レベルバイタルは正常だが、ハンドルを腹部にぶつけ、肝臓の損傷の疑いあり。アンギオ実施。同日、意識消失は回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
221	B-05023106	女性	26歳	150mg	ドンペリドン アセトアミノフェン	脳炎	回復	嘔吐、発熱にて受診、インフルエンザ検査できないが、本剤他処方。 翌朝、奇声等精神症状発現し、精神科入院。 呼吸困難、意識混迷、脳炎として加療。半年後歩行可能となり、1年後後遺症なく退院。
222	B-03001782	男性	27歳	150mg		味覚異常	軽快	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル投与。 3日後、味覚異常発現。 発現4日後、味覚異常軽快
223	B-05000768	男性	27歳	150mg	カルマバゼピン バルプロ酸ナトリウム クロナゼパム	眼の脱臼(眼球上 転) ジスキネジー(不 随意運動(四肢))	回復	元来強剛性脳性麻痺がある患者。インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミ ビルの投与を開始。翌日眼球上転、不随意運動(四肢)が発現。本剤の投与を 中止し、翌日に回復した。
224	B-03005261	女性	28歳	150mg	硫酸セフピロム	失神 心室性期外収縮	回復	インフルエンザと確定診断後、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与開始。投 与3回目の2時間後に意識消失、入院。来院時、意識回復、血圧正常も、体温 上昇及び心電図上期外収縮の頻発を認める。投与4回目においても、全身性脱 力及びモニター上期外収縮を認める。3日目の服用中止、以後神経症状なし、 その他の有害事象も回復。
225	B-04000134	女性	28歳	150mg	塩酸テルビナфин アセトアミノフェン	意識変容状態 汎血球減少症	軽快	爪白癬の治療のため塩酸テルビナфинを服用中。また、毎年の検診で白血球 減少、貧血との由。40°Cの高熱があり、診断キットでは(ー)だったが、リン酸オ セルタミビル150mg/日とカロナールを処方される。5日間服用後、翌朝から意識 障害があり、受診したところ、汎血球減少があり、入院。搬入時は意識清明だっ たが、なぜ来たのかわからないとのこと。入院4日目、徐々に解熱、意識清明だ が記憶、記銘力障害がのこる。脳波上徐波が目立つ。12日目、汎血球減少症、 意識障害は軽快し、退院。言語リハビリへ通院。退院から1週間後のDLSTで、 リン酸オセルタミビル及びアセトアミノフェン(ー)、塩酸テルビナфин(+/- ー)。
226	B-05000873	女性	28歳	150mg	非ピリン系感冒剤(4) 鎮咳配合剤(1) 塩酸アンブロキソール	痙攣(痙攣) 失神(失神)	回復	インフルエンザB発症しリン酸オセルタミビル投与。本剤投与3日目の朝服用後 1~2時間後腹痛、嘔吐、手足のしびれあり。意識消失、失神、痙攣発現。数分 で軽快、特に処置せず。夜に本剤投与したが何事もなかった。翌日受診するが 特別な所見は認めず。
227	B-06024913	男性	28歳	75 mg	アセトアミノフェン	感覚鈍麻 振戄 無力症	回復 回復 回復	4年前に本剤内服しているが問題なし。A型インフルエンザと診断、 本剤投与2~3時間後、しびれ、手の振るえ、脱力感発現。 翌日も回復しないため、他院入院し午後症状改善。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
228	B-07000133	男性	28歳	75 mg	クラリスロマイシン ロキソプロフェンナトリウム テブレノン	谵妄	軽快	インフルエンザ疑いのため、リン酸オセルタミビル投与開始。翌日、意識もうろう、うわ言発現。本剤投与中止。投与中止8日後、意識もうろう、うわ言軽快。
229	B-07000150	男性	28歳	150 mg	アセトアミノフェン スルピリン	異常行動	軽快	40°C以上の高熱続き、インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル処方。夕方、本剤服用後、就寝。死神が襲ってくる、体がバラバラに裂かれる、殺される(色々な方法で)等の夢を見て、怖くて眠れない。眠ってもすぐ起きてしまう。 服用2日目、朝、昨晩のことを家族に話す。また、暴力的な語氣で家族にあたるなどする。異常言動発現。夕方、本剤服用。 服用3日目、朝、解熱せず受診。受診時、怒っている様に思われた。患者の希望あり、入院。インフルエンザ脳症の疑いはなし。 服用から6日目、異常言動軽快。本人は発熱している間のことはほとんど覚えていない。
230	B-07000151	男性	28歳	150 mg	塩酸セフカペンピボキシル プロセミド 炭酸水素ナトリウム コハク酸メチルプレドニゾロン ナトリウム 乾燥スルホ化人免疫グロブリン	異常行動	回復	インフルエンザB型治療のため、リン酸オセルタミビル投与開始。投与開始4日後、異常行動発現。翌日、異常行動回復。
231	B-07003016	女性	28歳	75 mg		意識変容状態	回復	インフルエンザA型治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。意識がなくなり倒れていた。 投与開始2日目、症状回復。
232	B-01000940	女性	29歳	150mg	不明	味覚異常	回復	B型インフルエンザと診断。治療目的にリン酸オセルタミビル投与。本剤投与3日目に味覚障害、嘔気、食欲不振発現し、本剤服用後3~4日間続き、対症療法の治療を行う。本症状発現3日後、味覚障害等の症状回復。
233	B-03010985	女性	29歳	150mg	プロン錠12 カルボシステイン レバミピド アセトアミノフェン	痙攣	回復	インフルエンザA型と診断、リン酸オセルタミビル150mg/日他を処方。4日目深夜、プロン錠を服用後、耳鳴り、眩暈、ふるえが出現。4時間後、全身性痙攣が発現。眩暈、振戦、心房細動を認める。治療により2時間ほどで回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽帰	経過の概要
234	B-07000105	女性	29歳	75 mg	アセトアミノフェン 塩酸エピナステイン	意識消失 異常行動	回復 軽快	夕食後、リン酸オセルタミビル服用開始。翌未明、トイレに行ったとき気を失う。顔を打つ。現在、顔の傷の治療のため通院中。
235	B-07002383	男性	29歳	150mg		痙攣	回復	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル服用開始。痙攣発現。
236	B-05024101	男性	30歳	150mg		健忘	回復	インフルエンザの治療で余ったリン酸オセルタミビルについて、頭痛に対して服用し、約40分後に区間健忘発現。数日後に記憶が戻るが、その間の記憶が消失している。記憶が戻った後は特記すべき事象が見られなかった。
237	B-07001809	男性	30歳代	不明	アトルバスタチンカルシウム 水和物	意識消失	不明	リン酸オセルタミビル服用。車の運転中に一瞬自分が何をしているのか分からないような状態に陥った。意識消失が発現。
238	B-07003701	男性	30歳代	不明		痙攣	不明	リン酸オセルタミビル服用後、意識消失、痙攣発現。
239	B-07013134	女性	30歳	150 mg		痙攣 意識変容状態 心室粗動 心室性頻脈 心室細動	回復 回復 回復 軽快 軽快	リン酸オセルタミビル服用開始。同日、心室性頻脈、心室細動によりICU。服用2日目、軽快のため、ICUより一般病棟へ移動。服用から19日目、未だ入院中も通常に生活されている。
240	B-02002740	女性	32歳	150mg	ホスホマイシンナトリウム ロキソプロフェンナトリウム セフポドキシムプロキセチル レバミピド	感覚鈍麻	不明	詳細不明
241	B-03001385	女性	32歳	150mg	レボフロキサシン 塩酸アンブロキソール テブレノン ファモチジン	味覚異常	未回復	リン酸オセルタミビル150mg/日を5日間処方。本剤投与終了8日後に口腔内違和感、無味覚症発現し、未回復。
242	B-03010917	女性	32歳	150mg	メキタジン 塩酸チアラミド リン酸コデイン	視野欠損	回復	インフルエンザA型と診断、リン酸オセルタミビル150mg/日他を処方。4日目の夜、内服後に視野が狭くなり、気分不良となった。1~2時間後には回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
243	B-03011309	女性	32歳	75mg	トラネキサム酸 塩酸アンブロキソール 塩酸クロフェドノール アセトアミノフェン	浮動性めまい 悪心	未回復	インフルエンザと診断、リン酸オセルタミビル75mg/日他を処方。夜から投与開始、翌朝の服薬まで投与中止。嘔気、ふらつきがあり動けない様子。1ヶ月弱がすぎても、浮動性めまい、嘔気は未回復。
244	B-04027258	女性	32歳	300mg	なし	顔面神経麻痺	不明	A型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル300mg/日を投与開始。投与2日目頃より、左口角下垂、唾液流出、左顔面神経麻痺(重篤でないが軽微でもない)が発現。4日目、左眼瞼下垂と違和感。7日目、左顔面神経麻痺疑いと判断、その後の転帰不明。
245	B-07000216	男性	33歳	75 mg		異常行動	回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。翌日、異常行動発現し、入院。
246	B-05000676	男性	34歳	75mg	塩酸エピナステチン ジクロフェナクナトリウム 鎮咳配合剤(1) 非ビリン系感冒剤(2) アズレンスルホン酸ナトリウム・L-アラニン 耐性乳酸菌製剤(2)	意識消失(意識消失発作)	回復	季節性アレルギーの既往歴。38.3°Cの発熱、咽頭痛、咳、軟便の自覚症状あるため、確定診断陰性であったがリン酸オセルタミビルを投与。翌朝服用1時間後に突然意識消失発作発現、5秒程度で全く後遺症残さずに回復するが、本人はその間の記憶は全くない。本剤の服用を中止し、受診するが全身状態全く異常なし。
247	B-02013961	女性	35歳	75mg	塩酸ベタキソロール オキサトミド エバスチチン ビタミンB1・B6・B12配合剤 リノゴ酸カルシウム マレイン酸フルボキサミン アトルバスタチンカルシウム フマル酸第一鉄 セフジニル ドンペリドン 総合感冒薬 テブレノン 塩酸チラアミド	大発作痙攣	回復	慢性腎不全により透析を継続中であった。てんかん、痙攣の既病歴無し。インフルエンザを疑い、リン酸オセルタミビル75mgを服用。服用約1日後、一過性の足しのしびれに続き、意識消失あり。約5時間後、てんかん大発作あり。1時間後、回復。服用10日後、脳波施行にてslow wave burst(徐波群発)1回あり。約2週間後にも同様の徐波群発を認める。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
248	B-04026769	男性	35歳	150mg	アセトアミノフェン	意識消失	不明	インフルエンザ治療のため、150mg/日のリン酸オセルタミビルを服用。投与終了後2日目、意識消失が発現。現在転帰不明。
249	B-01003997	男性	36歳	150mg	レボフロキサシン ピロミド酸 ヒベンズ酸チベピジン プロモキセフナトリウム セラペプターゼ アズレンスルホン酸ナトリウム	感覚鈍麻	軽快	39.4°C発熱あり、インフルエンザと最近の混合感染疑いリン酸オセルタミビル投与開始(確定診断は行っていない)。投与2日目に両手のしびれ、全身に発赤、かゆみが出現。本剤及び併用薬の投与中止。抗ヒスタミン剤投与開始。手足のしびれ等発症3日後両手のしびれ軽快し手根管症候群と確定診断。発疹も消失。
250	B-05018239	女性	36歳	150mg	インドメタシン アザチオプリン プレドニゾロン シクロスボリン ポビドンヨード ベンズブロマロン ファモチジン ラクトミン タンニン酸アルブミン メトクロプラミド イソプロピルウノプロストン リスペリドン メコバラミン メフェナム酸	精神症状(精神神経症状(不穏、眼右のちらつき、手足のしびれ)) 急性腎不全(急性腎不全) 下痢(下痢) 脱水(脱水)	軽快	腎不全の既往あり。発熱、寒気有りインフルエンザと診断され、治療目的にリン酸オセルタミビル投与。本剤服用翌日に水様性下痢が出現。本剤服用2日後、急性腎不全、下痢、脱水、軽度の不安感が発現。本剤服用5日後、つじつまの合わないことを話しパニック障害様症状あり、本剤服用7日後、不安感消失。約4ヶ月後、急性腎不全、下痢、脱水、精神症状回復。さらに4ヶ月後、自覚的には完全に回復。
251	B-06026181	女性	36歳	不明	アセトアミノフェン	異常行動 幻覚 幻聴	軽快 軽快 軽快	インフルエンザB型のため、リン酸オセルタミビル150mg/日投与開始。39°C台発熱時、本剤内服後、幻覚、幻聴、異常行動発現。翌日、本剤中止、入院。
252	B-04008325	女性	37歳	150mg	セフジトレンピボキシル セファゾリンナトリウム ロキソプロフェンナトリウム サリチル酸ナトリウム・カフェイン配合剤 リン酸クリンダマイシン アジスロマイシン水和物	精神障害 悪寒 悪寒 血中クレアチニンホスホキナーゼ増加	回復	リン酸オセルタミビル150mg/日及びセフジトレンピボキシル他を処方。4日目、39°Cに熱が上がり、肺炎出現のため、セフジトレンピボキシルをアジスロマイシン水和物に変更受診。帰宅後アジスロマイシン水和物を内服後、40°Cの高熱とパニックが出現。病院でも奇声を発したうち回っているため入院。翌日パニックはおさまったが、炎症、肝障害が認められたが、本人の希望で退院。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
253	B-05007134	女性	37歳	150mg	アセトアミノフェン レバミピド ジブロフィリン・ジヒドロコディン配合剤 塩化リゾチーム	頭痛(頭痛) 嘔吐(嘔吐) 恶心(嘔氣)	回復	発熱有り受診し、インフルエンザと診断される。治療目的にリン酸オセルタミビル投与。翌日は通常通り服用。その翌日、朝本剤投与した後、解熱するも、頭痛、嘔氣、嘔吐認め入院となり、点滴施行。5日後、症状軽快。
254	B-06000102	女性	37歳	75mg	トラネキサム酸 カルボシスティイン	痙攣 意識変容状態	軽快 軽快	A型インフルエンザで発熱(38.9°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。投与開始日の夜に全身痙攣及び意識障害が見られ、十数分で回復した。 熟性痙攣、てんかん等の既往歴はない。
255	B-02011509	女性	38歳	75mg		痙攣	不明	インフルエンザ感染症を疑い、リン酸オセルタミビル75mg/日を処方。帰宅後、本剤75mgを服用したところ、痙攣が発現し、病院に搬送されたがその後の詳細不明。
256	B-04026632	女性	38歳	150mg	クラリスロマイシン 非ピリン系感冒剤(4) メフェナム酸 トラネキサム酸 カルボシスティイン ヒベンズ酸チベビジン アセトアミノフェン	味覚異常	回復	発熱のため、リン酸オセルタミビル150mg/日、メフェナム酸及び非ピリン系感冒剤(4)を投与。投与開始後3日目、キットにてB型インフルエンザと確定診断、クラリスロマイシン他を追加処方(リン酸オセルタミビルは継続投与)。4日目、味覚障害(重篤でないが軽微でもない)が発現。5日目、頭痛、めまい及び発熱がみられたため、本剤投与中止。10日目にベタヒスチンメシル酸塩等による処置を行った結果、11日目に回復。
257	B-04026778	男性	38歳	150mg	塩酸エプラジノン	頭痛	回復	B型インフルエンザ治療のため、150mg/日のリン酸オセルタミビルを投与。投与開始後3日目、頭痛がひどくなるとの訴えから本剤投与中止。痛みが強いため、入院。その後、回復。
258	B-07000204	女性	38歳	150 mg	非ピリン系感冒剤(4) トリアゾラム	自傷念慮	回復	本剤服用後、腕を切りたくなるといった自傷願望発現。その後回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽快	経過の概要
259	B-07003014	女性	38歳	150 mg	コハク酸メチルプレドニゾロン ナトリウム プロポフォール パニペネム・ベタミプロン 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 塩酸ドバミン フェニトイソナトリウム 濃グリセリン・果糖 塩酸ラニチジン ヘパリンナトリウム オメプラゾール	異常行動 意識変容状態	回復 回復	40°Cの発熱で受診し、インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル処方。 投与開始2日目、夜、熱は下がってきたものの、意味不明な発言、奇声を上げる。すぐ受診するが、尿失禁などあり。1時間後、精査困難のため、救命救急に搬送。この時、MRIによる異常所見はなし。インフルエンザ脳症を疑い、入院し、ステロイドパルス療法施行。 投与開始3日目、異常行動、意識障害は回復傾向あり。 投与開始4日目、異常行動、意識障害回復。 投与開始5日目、本剤投与終了。
260	B-07001357	女性	39歳	150 mg	トラネキサム酸 カルボシステイン 麻黄湯	幻聴	回復	インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル投与開始。同日夜、首のかゆみ、幻聴(話し声、戸の開く音、スリッパの音)、殺されるようなこわい夢をずっとみていた。エチゾラム投与により回復。
261	B-04025544	女性	40歳	150mg	アセトアミノフェン テブレノン	眼振	未回復	B型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与開始。投与2回目の翌日に眼振発現、良性発作性頭位眩晕症と診断。その後継続加療中。
262	B-05021110	女性	40歳	150mg	ゾニサミド カルバマゼピン フェニトイソ アセトアミノフェン	自殺念慮(精神症状(幻覚、希死念慮)) 幻覚(精神症状(幻覚、希死念慮))	軽快	てんかんの既往ありのためゾニサミドを継続投与。今回発熱、てんかん発作で入院し、翌日インフルエンザA診断確定、リン酸オセルタミビル投与開始。その後、精神症状(幻覚、希死念慮)発現。症状最終発現日は不明だが、発現2日後には希死念慮の訴えは消失していたと考えている。その後2ヶ月間精神症状の再燃はない。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
263	B-07000092	男性	40歳	75 mg	ペラプロストナトリウム 塩酸セペラマー メチルドバ ベシル酸アムロジピン バルサルタン アルファカルシドール ポリスチレンスルホン酸カル シウム 沈降炭酸カルシウム クロナゼパム メコバラミン センノンド	異常行動	軽快	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル投与開始。 透析患者のため、本剤75mgを1回のみ投与する予定が、誤って1日1回を5日間投与してしまった。5日間服用後、夜間透析を受けており、睡眠中だったが、急に起きて透析の針を自分で抜いてまた刺したという異常行動(自己抜刺)をおこした。同日症状回復。
264	B-07000136	女性	40歳	75 mg	アセトアミノフェン	意識変容状態	回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル投与開始。意識障害(記憶)発現。
265	B-07006772	女性	40歳	150 mg	ロキソプロフェンナトリウム	痙攣	死亡	風邪気味にて受診。インフルエンザと言われ、リン酸オセルタミビル処方。2日間服用。 服用3日目、朝、急に激しい頭痛あり。その後、就寝したが、その後本人は立つて、全身の筋肉痛を訴えた。頭痛、体熱感あり、歩行困難。痛み強く、疎通性も悪いため救急要請。来院時、体温は37°C(昨夜38°C)、頭痛(4~5日前から)、爪の付け根あたりにぶつけたような痛みあり。レベル低下あり。次第に意識障害がはっきりしてきて、完全に疎通性がなくなる。脳、薬物中毒による脳障害の疑いで、入院。開眼するも、すぐ閉眼。顔色不良。体動、拒否反応強い。夕方、いびき様呼吸あり。夜、濃グリセリン投与。いびき様の呼吸あり。体交する下肢の硬直あり。口唇色不良あり。 翌朝、早朝から激しいてんかん様けいれん。日中、30数回のけいれん発作あり。夜に入っても発作続くが、次第に15分後とにあつた発作なくなる。瞳孔散大、呼吸停止あり、その後、心停止。死亡確認。
266	B-02004174	男性	41歳	150mg	塩酸ツブテロール カルボシステイン トラネキサム酸 ヒベンズ酸チベピジン 塩酸アンブロキソール	視野欠損	未回復	インフルエンザの疑いでリン酸オセルタミビルを投与(投与日数不明)。投与開始10日後、視野狭窄発現。発現後、1ヶ月以上経過後も未回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
267	B-07004165	男性	41歳	150 mg	アセトアミノフェン リン酸コデイン(1%以下)	意識消失	回復	インフルエンザA型治療のため、リン酸セルタミビル、アセトアミノフェンを服用。夕方、電車の中にて意識消失発現。目撃者の話「白眼をむいて意識なし。数分で完全回復」。救急車にて搬送。到着時回復。CT正常化。翌日、意識消失回復。
268	B-04024731	男性	42歳	150mg	非ピリン系感冒剤(4) セフジニル 塩酸プロムヘキシン 塩化デカリニウム 葛根湯	痙攣 意識消失	回復	B型インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与開始。てんかん発作の既往あり、また、インフルエンザ罹患なしの状態で、原因不明の意識消失の経験あり。最終投与(4日目)の翌日にけいれん発作及び意識消失の発現。搬送先での診断は、(側頭葉)てんかん疑い。バルプロ酸ナトリウム投与等の処置により、有害事象発現4日後回復。
269	B-05023594	男性	42歳	150mg	塩酸パロキセチン水和物	感覚鈍麻 振戦	軽快	インフルエンザため、本剤投与開始。5日後、腕のしびれ感、ふるえ発現。脳梗塞の疑いから検査を行うが所見なし。投与中止。3日後、軽快
270	B-05023888	男性	42歳	75mg	維持液(ブドウ糖加)(2) 生理食塩水 開始液(1) 塩化ナトリウム 非ピリン系感冒剤(4) アセトアミノフェン 濃グリセリン・果糖	落ち着きのなさ	回復	不眠、嘔吐、こむらがえり、全身倦怠感で入院。 著しい低Na血症(110mEq/l)で点滴にて補正試みる。 約1ヶ月後、発熱(39°C)、全身倦怠感でインフルエンザA型確定診断後、本剤投与開始。当日は著変なし。 翌日、心電図モニターを自己ではずす、採血をさせないといった行動あり。 その1時間後から不穏発現。(無表情、発話なし、食事を食べない) その翌日、不穏回復(発話等に問題ない状態となる) 入院から約3週間後、退院
271	B-05024836	女性	42歳	75mg	維持液(5) チアミンジスルフィド・B6・B12 配合剤 ゾピクロン エチゾラム	易興奮性	回復	A型インフルエンザで発熱(38°C)が見られ、リン酸オセルタミビルを服用した。服用開始から約30分後に興奮状態になる。その後、興奮状態が軽快した。
272	B-05025592	女性	42歳	150mg		うつ病	回復	流感としてリン酸オセルタミビル処方(確定診断は行っていない)。前日の10時38.1°C。服用開始2日後に解熱。3日目より抑うつ状態発現、投与開始後6日目に本剤投与中止。投与中止1日後インフルエンザ軽快、うつ状態持続。中止4日後うつ状態消失。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	主な副作用	転帰	経過の概要
273	B-07001892	女性	42歳	150mg	アセトアミノフェン	味覚異常	不明	インフルエンザB型治療のため、リン酸オセルタミビル処方。服用開始3日目、夕方、味覚障害発現。服用開始4日目、嗅覚障害発現。水様下痢もあり。
274	B-04027500	女性	44歳	75mg	なし	意識消失	回復	B型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与開始。1回目の服用30分後、意識消失発現、転倒し、前頭部を床にぶつける。5分後、意識回復。本剤服用中止。その後は有害事象発現せず。
275	B-05022245	男性	44歳	150mg	非ビリン系感冒剤 イブプロフェン	うつ病	回復	咳、発熱のため受診し、PL顆粒投与。確認診断後、本剤投与開始。服用終了1日後、自信のない感じ、不安感、不眠などのうつ状態発現。仕事内容、信号等が理解できなくなる。意欲減退。他院受診、入院となり抗うつ剤、睡眠導入剤を処方。2日間、うつ病よりも意識レベル低下か幻覚の状況であり、診断途中、異常な発言あり。その後うつ状態は回復し、退院となる。
276	B-05002258	男性	45歳	150mg		意識消失(意識消失)	回復	インフルエンザ治療目的にリン酸オセルタミビル投与。投与開始日、意識消失発現(30秒程度)。同日回復。4日後、本剤投与終了。
277	B-05024830	女性	45歳	150mg	塩酸アンブロキソール 臭化水素酸デキストロメトル ファン 塩酸エピナステイン	意識消失	回復	A型インフルエンザで発熱(37.9°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始。投与開始初日の夜に一過性の意識消失が見られた。意識消失は当日中に回復し、その後もリン酸オセルタミビルの服用を継続し、投与開始から4日目にリン酸オセルタミビルの服用を中止した。その後も特記すべき所見は認められなかった。
278	B-07000245	男性	45歳	150mg		自殺既遂	死亡	一年以上前、インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル服用。次の日、自殺。
279	B-06026807	女性	47歳	75 mg	クラリスロマイシン d-マレイン酸クロルフェニラ ミン 鎮咳配合剤(1) カルボシステイン アセトアミノフェン	痙攣	回復	38.7°Cの発熱あり。インフルエンザ陰性であったが、症状よりインフルエンザと診断。リン酸オセルタミビル処方。直ちに服用し、帰宅。夕方、洗濯物を取り込んでいた時に、意識消失して庭で倒れた。顔面に数ヶ所、擦過傷を自傷し、鼻出血も認めた。家人が発見したとき、意識消失に加えて、軽度のけいれんを顔面から両手指に認めた。その後、約5分間くらい安静にしたところ、覚醒した。意識消失、けいれん回復。本剤服用中止。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
280	B-07004341	女性	47歳	75 mg	クエン酸フェンタニル 塩酸ロピカイン水和物 ベンタゾシン 塩酸ヒドロキシジン スルバクタムナトリウム・セ フォペラゾンナトリウム	異常行動 てんかん	回復 回復	手術を予定していたが、同居の子供がインフルエンザに感染。手術日を延期できなかつたため、リン酸オセルタミビルを予防的に服用。 服用2日目、全身麻酔と硬膜外麻酔を行い、術後、覚醒ののち病室にて「てんかん様不随意運動(胸を搔き鳴る)」、「意識は呼びかけに応じるが目を開けない」等の症状が発現。 服用3日目、回復。
281	B-05024259	男性	48歳	75mg	塩酸セフカペンピボキシル 維持液(3) アセトアミノフェン レバミピド	異常行動 痙攣 失神	回復 回復 回復	A型インフルエンザで発熱(39.3°C)が見られ、リン酸オセルタミビル75mgをタ方 に服用。当日の午後7時頃、失神を起こし、検査にて重度の不整脈が確認され た。その後、症状は回復している。
282	B-07003778	女性	48歳	75 mg		異常行動	回復	A型インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル処方。 投与開始2日目、朝、自宅トイレにすわりこみ、床に頭を何度も打ちつけている が、自分で止めることが出来ない。それが2回続いた。その後、意識(記憶)なし。 家族の呼びかけで意識を取り戻す。
283	B-05000394	女性	49歳	150mg		意識変容状態 落ち着きのなさ	回復	39°Cの発熱があり受診、インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビルを投 与。4日間自宅で療養。4日目の夜、意識障害、不穏状態発現。投与を中止し翌 日インフルエンザ確定診断実施するがウイルス検出されず。意識レベルが低 かったため入院、ステロイドパルス療法により症状軽快、症状発現3日後にはほと もとの状態に回復し、7日後に回復退院。
284	B-07000129	女性	49歳	75 mg	酒石酸ゾルビデム ロキソプロフェンナトリウム 非ピリン系感冒剤(4) フルバスタチンナトリウム ピコスルファートナトリウム テブレノン	異常行動 異常行動	不明 不明	患者がインフルエンザの検査を拒否したが、リン酸オセルタミビル処方。翌日、 通勤する際、車で自損事故を3回繰り返した。来院し、インフルエンザの検査を 実施したところ陰性。
285	B-05025356	女性	50歳 代	不明		痙攣	未回復	リン酸オセルタミビル5日間処方され服用開始。眼の周りが痛い、痙攣発現。本 剤2日分服用にて中止。痛みが出てから1週間以上経過するも改善せず。副作 用の発現時期等詳細不明。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
286	B-07001423	女性	50歳	150 mg		頭痛	回復	インフルエンザAと診断され、リン酸オセルタミビル処方。体温:38.5°C。本剤4日間服用し、解熱し体調良好となる。 インフルエンザの転帰:軽快・回復。 本剤服用終了5日後、突然に左側頭～左後頭部にシビレる様な頭痛発現。以前にあった片頭痛とは異なる頭痛であった。鎮痛剤服用するも頭痛強く、入院。頭部CT所見なし。その後、処置にて軽快。
287	B-05005032	女性	51歳	不明		精神症状(精神症状)	回復	頭痛・発熱有り受診。インフルエンザと判断され、治療目的にリン酸オセルタミビル投与。5時間後、突然興奮、過換気状態となり救急搬送される。翌日、不穏状態改善。10日後、全身状態良好となり退院。
288	B-07000160	女性	51歳	150mg	臭化水素酸デキストロメトルファン 塩酸プロカテロール ラミブジン シクロスボリン	意識消失	軽快	インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビルを投与開始(5日間)。意識消失発作が発現。投与終了後、3日目、意識消失発作にて自宅で倒れているところを家族が発見した。その後、意識はすぐに回復した(生体肝移植後で病院に通院中であり、同病院の医師に相談し、本剤はそのまま内服を続行したが、その後、意識障害はなかった)。
289	B-07000229	女性	51歳	150 mg	クラリスロマイシン リン酸ジメモルファン セラペプターゼ	幻覚 幻視	軽快 軽快	A型インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。服用2時間後、気分不良、嘔気が出現。ふらつきがあり、足が倍程に太くなる等の幻覚が発現。翌々日の朝、MRI施行するも異常なし。幻覚、幻視は軽快。
290	B-01002845	男性	52歳	150mg	ジクロフェナクナトリウム 塩酸ホミノベン	糖尿病性昏睡高 浸透圧性昏睡	回復	交通事故によるL1、2脊髄損傷(下肢不全麻痺)、肥満。 発熱(37.1°C)、悪感、咽頭痛で、急性喉嚨頭炎の診断でファロム投与開始。 翌日、口渴、多尿あり。 2日後、発熱(39°C)、全身・怠感出現、インフルエンザ疑いでリン酸オセルタミビル投与開始。 その4日後、本剤投与中止。 投与中止1日後、多飲、多尿、全身・怠感持続。午後より恶心、嘔吐発現。 投与中止2日後、異常高血糖(高浸透性非ケトン性昏睡)、急性腎不全発現(呼吸困難、意識昏迷状態、コーヒーリャバニヤー残渣物嘔吐など)。同日、意識状態悪化、呼吸状態悪化、心電図異常(急性腎不全による)発現。 その2日後、心電図正常化。 その4日後、異常高血糖(高浸透性非ケトン性昏睡)、急性腎不全回復。 DMコントロール、下肢不全麻痺のリハビリの為、転院

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽快	経過の概要
291	B-04027266	男性	52歳	150mg	ファロペネムナトリウム ロキソプロフェンナトリウム 非ピリン系感冒剤(4) アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	浮動性めまい 冷汗 嘔吐 下痢 血圧上昇 心電図QRS群延長	回復	B型インフルエンザ治療のため、150mg/日のリン酸オセルタミビルを投与。投与開始3日目夜間より、冷汗、眩暈、恶心発現。3日目、完全右脚ブロック(QRSの延長)を確認。冷感、体動時眩暈、嘔氣、嘔吐あり、入院。4日目、眩暈あるも嘔氣、下痢回復。5日目眩暈続くも退院、以後転帰不明。
292	B-05000322	男性	52歳	75mg	フルオキシメステロン プレドニゾロン テブレノン ニコチニ酸トコフェロール 塩化カリウム ジビリダモール 塩酸アンブロキソール 臭化水素酸デキストロメトルファン 塩酸セフカベンピボキシル 非ピリン系感冒剤(4) レノグラスチム(遺伝子組換え) ロキソプロフェンナトリウム	痙攣(全身性痙攣)	軽快	発作性夜間血色素尿症、再生不良性貧血、慢性腎不全の既往あり。38°Cを超える発熱出現感冒薬等投与するが、2日後になんでも発熱、倦怠感持続のため受診。迅速検査でインフルエンザBと診断、リン酸オセルタミビルを投与。2回投与後全身性の硬直性痙攣が出現し、数分間持続。その後通常状態に戻るも、痙攣の前半部の記憶は定かでない。腎機能増悪のため治療。
293	B-07000155	女性	53歳	75 mg	アセトアミノフェン	意識変容状態	回復	インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビルを処方される。服用後、就寝。翌朝、服用後、腹痛のためトイレに入る。冷汗が出て気付いたら意識喪失で倒れているところを夫が発見。歯3本折る、顔の外傷、頭部血腫。自律神経系異常、意識消失発現。他院でCTをとったが異常なく、現在治療中。発見時、大きないいべきをかいていた。
294	B-07000231	女性	53歳	150 mg		意識変容状態	回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル処方。2回目服用4時間後、トイレで倒れ意識消失1分位あり。救急車で来院。応答できるがぼんやりした感じ。上肢の脱力と嘔氣がある。翌朝、症状改善し、退院。倒れたときの記憶はなく、意識消失は確かにあったものと考えられる。
295	B-07004232	女性	54歳	75 mg	塩酸フェキソフェナジン 臭化水素酸デキストロメトルファン テブレノン	血圧低下 意識変容状態	回復 回復	インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル処方。夕、本剤服用後、咳がひどく痛くなつた。体温は39°C台から36°C台に速やかに低下。夜、突然意識を失つて転倒。家族が呼んでも反応なし。救急隊到着時、血圧低下、意識障害あり。外来到着時、血圧が低下していたが、徐々に上昇。まもなく覚醒したが、見当識障害が強くベッドからころげ落ちうつになるほど。明らかに異常行動の危険があると判断されたため、入院・経過観察とした。その後、3~4時間で全く普段通りに戻つた。 服用から2日目、血圧低下、意識障害回復。インフルエンザ軽快。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
296	B-02012658	女性	55歳	150mg	五虎湯 血压降下剤	意識レベルの低下	回復	近医にて耐糖能異常と診断されたが投薬なし。低血糖発作既往、TIAの既往なし。インフルエンザ治療のため午前中より、リン酸オセルタミビル服用開始。服用開始2日目に食事の後本剤服用10分後に気分不良、冷汗、意識もうろう、全身発汗発現、トイレにて倒れる。動悸著明。約1時間半後、処置せず症状回復。
297	B-03012141	女性	55歳	150mg		痙攣	回復	インフルエンザA型と診断、リン酸オセルタミビル150mg/日を処方。夕方75mgを服用。3時間後に上肢が痙攣したが、1時間ほどで改善。
298	B-04026213	男性	55歳	75mg	なし	意識変容状態	回復	B型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル75mg/日を投与開始。投与1回目の2時間後に嘔気自覚、引き続き意識消失及び嘔吐の有害事象発現。5分後には回復。翌日外来受診するが、有害事象は認められず。
299	B-04026885	女性	55歳	150mg	なし	浮動性めまい	不明	メニエール病の既往あり。B型インフルエンザ陽性のため、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与。投与開始後2日目、めまいがひどいとの愁訴あり。4日目、本剤投与中止。体調不良の際にはめまいが発現するとの愁訴は報告時にも継続。
300	B-05001027	男性	55歳	150mg		味覚消失(味覚喪失) 無嗅覚(嗅覚喪失)	未回復	インフルエンザB治療のためリン酸オセルタミビルを投与開始。本剤投与2日目から味覚障害・嗅覚障害発現。本剤投与4日目で中止し、耳鼻科受診するが、味・嗅覚喪失改善されず、以後耳鼻科にて投薬を受けている。
301	B-04027249	女性	56歳	150mg	塩酸オロパタジン	意識消失 発疹 顔面浮腫	回復	B型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与開始。2回目の服用後、胸部背部に発疹が出現するが、未処置のまま就寝。翌朝、発疹はやや軽減するが、顔面浮腫の自覚あり、さらに排尿時にごく短時間の意識消失発現。再度リン酸オセルタミビルを服用したところ、気分不良及び発疹増悪、入院。点滴加療等により、翌日回復、退院。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
302	B-07000104	男性	57歳	75 mg	アセトアミノフェン ベシル酸アムロジピン カンデサルタンシレキセチル メシリル酸ドキサゾシン 球形吸着炭 炭酸水素ナトリウム アロブリノール ファモチジン 沈降炭酸カルシウム シロスタゾール タゾバクタムナトリウム・ピペ ラシンナトリウム バニペネム・ベタミプロン ポリエチレングリコール処理 人免疫グロブリン	痙攣	死亡	発熱(39.4°C)、湿性咳嗽あり、インフルエンザA治療のため、リン酸オセルタミビル服用。5時間後の翌未明、けいれん発症。
303	B-07000287	女性	57歳	75 mg		落ち着きのなさ	回復	インフルエンザA陽性であり、症状の訴え強いため、リン酸オセルタミビル75mg服用後、透析開始。服用20分後、息苦しさ出現。SpO2 90%。O22リットル開始後、98%に改善するが、その後起座呼吸。不穏状態となる。胸部レントゲン上(透析1時間後)うつ血を認める。服用1時間後、心不全、不穏の為、入院。
304	B-05001265	女性	59歳	150mg	セフジトレンビポキシル セラペプターゼ リン酸ジメモルファン メトクロプラミド ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 酸化マグネシウム	悪夢(悪夢)	回復	インフルエンザA治療のためリン酸オセルタミビル投与。投与開始日の夜、悪夢発現。発熱中夜睡眠時に悪夢発現。 本剤投与開始3日後平熱化し、自覚症状改善したため、当日夜の服用を中止したところ、悪夢を見なくなった。回復。
305	B-05001338	男性	59歳	150mg	セフジトレンビポキシル セラペプターゼ リン酸ジメモルファン メトクロプラミド ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	悪夢(悪夢)	回復	前日から38°C発熱、インフルエンザB治療のためリン酸オセルタミビル投与。その夜悪夢出現。飲み続けた2日間、悪夢継続。本剤投与中止により悪夢の自覚症状改善。

リン酸オセルタミビル

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	軽帰	経過の概要
306	B-05024962	女性	59歳	150mg	アセトアミノフェン	嘔吐 恶心 頭痛 頭部不快感	回復 回復 回復 回復	A型インフルエンザで発熱(36.9°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。投与開始から2日目に恶心、嘔吐、頭痛、頭部不快感が発現し、リン酸オセルタミビルの服用は投与開始から3日目の投与終了までで中止した。その後、恶心、嘔吐、頭痛、頭部不快感の発現から約20日後に症状が回復した。
307	B-07000276	女性	59歳	75 mg	ハロペリドール ゾテビン 塩酸ビベリデン ユビデカレノン フルマ酸クエチアピン 塩酸プロメタジン センノシド フルニトラゼパム	痙攣 息詰まり	不明 後遺症	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル投与開始。一回服用後、痙攣、意識レベルの低下発現。本剤投与中止。 翌朝、普段と変わらない状態を確認後、食事。その後、食事をのどに詰め倒れているところを発見。
308	B-05001125	男性	61歳	75mg	カルボシスティン ステアリン酸エリスロマイシン	意識変容状態	回復	インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビル投与。食後カルボシスティン、ステアリン酸エリスロマイシンと一緒に服用したところ5分以内に意識がなくなる。救急車到着後まもなく意識が戻ったため、自宅静養。回復する。その後、再度受診し本剤DLSTの検査を行ったところ、S.I.値217%であった。
309	B-05000880	女性	62歳	150mg		味覚異常(味覚障害) 嗅覚錯誤(嗅覚障害)	回復	インフルエンザB治療のためリン酸オセルタミビルを投与。投与開始4日後に味覚障害、嗅覚障害発現。その後も投与を続け、開始5日後に投与終了。投与終了後8日で軽快。
310	B-06025517	男性	62歳	150 mg	アセトアミノフェン	意識消失	回復	インフルエンザA型と診断され、リン酸オセルタミビル処方。本剤投与翌早朝、意識不明(トイレに目覚めたが、トイレと逆方向に行き転倒。気付いたときは頭部に4cm程度の切り傷あり)発現。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
311	B-05001513	女性	63歳	150mg	テオフィリン 非ピリン系感冒剤(2) セフボドキシムプロキセチル アセトアミノフェン アスピリン アルファカルシドール バルプロ酸ナトリウム トロキシビド トラピジル 沈降炭酸カルシウム プロチゾラム クエン酸モサプリド 塩酸チアラミド 鎮咳配合剤(1)	痙攣(けいれん重 積発作)	回復	脳梗塞、慢性腎不全、血液透析の既往あり。咳、発熱(38.5°C)嘔吐出現し、塩 酸チアラミド及び鎮咳配合剤4日間投与。その後も発熱、喘鳴が続くため、確定 検査によりインフルエンザB確定診断しリン酸オセルタミビル投与。3日後解熱 するが喘鳴改善なく、感冒薬投与。翌日全身痙攣をきたし、救急搬送。けいれ ん重積発作が3時間続く。その後回復。
312	B-05002114	女性	63歳	150mg	アジスロマイシン水和物 非ピリン系感冒剤(4) テブレノン エカベトナトリウム	味覚異常(味覚障 害)	軽快	発熱有り受診し、B型インフルエンザと診断。治療目的にリン酸オセルタミビル を投与。本剤投与後3日後、食欲不振、味覚障害発現(重篤でないし軽微でもな い)。その翌日平熱となり本剤投与中止。本剤投与中止20日後、味覚障害軽快 となる。
313	B-05000160	女性	64歳	150mg	アセトアミノフェン	筋痛(両上肢脱力 を伴う筋肉痛) 感覚障害(上半身 皮膚知覚異常)	未回復	発熱、関節痛のためインフルエンザ確定診断を実施せずリン酸オセルタミビル を投与開始。翌日両上肢脱力を伴う筋肉痛、上半身皮膚知覚異常発現。その 後の処置、転帰等については不明。
314	B-05017977	女性	64歳	75mg		意識消失(意識消 失)	回復	B型インフルエンザ治療のためリン酸オセルタミビル投与。1cap服用後、意識消 失発現。救急搬送される。翌日退院となる。回復時期は不明。
315	B-04027668	男性	65歳	150mg	メフェナム酸 非ピリン系感冒剤(4)	味覚異常	回復	B型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与開始。投 与開始2日目、味覚障害を発現。合計5日間本剤服用した後、投与中止。翌日、 味覚障害回復。その後9日目、調子が悪くなり(だるい)、悪寒、味がおかしくな るとの訴えあり。味覚障害については、報告時未回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
316	B-03003859	女性	66歳	150mg	カルベジロール レボチロキシンナトリウム グリベンクラミド アカルボース	脳血栓 血圧低下	未回復	発熱(38.6°C)にてリン酸オセルタミビル服用開始。 2日後、血圧低下。 その2日後、本剤服用中止。 服用中止21日後、右半身麻痺発症。 2日後、入院し脳血栓症の診断。 退院後も右半身麻痺症状は消失せず。
317	B-03009966	男性	66歳	75mg	テオフィリン プランルカスト水和物 テプレノン プロピオン酸フルチカゾン	痙攣 意識消失	回復	喘息のため、テオフィリン、プランルカスト水和物、テプレノン(以上開始日: 2001/07/14)、プロピオン酸フルチカゾン(開始日: 2002/05/28)を投与中。インフルエンザA型と診断、リン酸オセルタミビル150mg/日処方。同日夜、75mgを服用。その7時間後、意識消失発作あり転倒したが、1分程度で意識が戻る。その後2時間半後、眼球上転、全身痙攣出現、便失禁あり。1分程度で痙攣消失し意識清明となる。入院したが、意識清明。本剤内服は中止。7日間入院したが、その後意識消失、痙攣なし。
318	B-05001653	女性	66歳	150mg	アズレンスルホン酸ナトリウム インドメタシン 乳酸リンゲル液 メトクロプラミド	意識変容状態	回復	発熱・全身倦怠感を訴え外来受診。インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビル投与。翌日午前中嘔吐し、再度外来受診。乳酸リンゲル液+メトクロプラミド静注。手のしびれを訴えたがそのまま帰宅。翌日早朝、意識障害に気付き、救急病院に搬送され、本剤投与中止となる。翌日、家族から意識回復の電話連絡あり。
319	B-07001731	女性	66歳	75 mg	臭化水素酸デキストロメトルファン ロラゼパム クロキサゾラム	意識変容状態 痙攣	回復 回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル処方。食事中、腹痛、気分不快になり意識消失(5分間程)。尿失禁あり。その後回復。
320	B-07002262	女性	66歳	150mg	アセトアミノフェン ツロブテロール 塩酸プロカテロール クラリスロマイシン 酒石酸ゾルビデム 臭化オキシトロピウム 臭化水素酸デキストロメトルファン セラペプターゼ 塩酸アンブロキソール カルボシステイン テオフィリン	うつ病	回復	インフルエンザB型の診断にて、リン酸オセルタミビル処方。本剤を服用するうつ状態となり、死にたいという気持ちが強くなり、手首を切ろうかと思いつめた。3回目までの服用したが、あまりに症状がきついので、本剤服用中止。中止後、症状軽快するも、中止1ヵ月後、うつの症状が抜けきらず、夜も眠れないとのこと。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
321	B-05001646	女性	67歳	75mg	非ピリン系感冒剤(4) セラペプターゼ 塩化デカリニウム アセトアミノフェン 維持液(3)	意識消失(意識消失(失神))	回復	前日から38°C発熱、咽頭痛、頭痛有り、受診しインフルエンザBと診断。治療のためリン酸オセルタミビル投与。その夜、意識消失(トイレで倒れ骨折)。失神は5分以内に回復。本剤投与は継続し本剤投与4日後にインフルエンザ回復。
322	B-06026127	女性	67歳	150 mg	クラリスロマイシン 塩酸チアラミド リン酸コデイン(1%以下) 塩酸プロカテロール 塩酸セフェピム	意識消失	回復	夜、本剤服用後、医院から帰る途中、車にて事故を起こした。意識消失発現。来院し、体温36.2°C。事故について、意識がなかったことを聞く。CT異常なし。意識消失回復。
323	B-04024816	女性	68歳	150mg	テガフル・ギメラシル・オテ ラシルカリニウム アセトアミノフェン 塩酸エホニジピン メトクロプラミド	意識変容状態 痙攣	回復	B型インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与開始。最終投与(4回目)後当日中に、言語、行動異常出現。バルブロ酸ナトリウム投与等の処置により、有害事象発現16日後回復。
324	B-07000205	女性	69歳	75 mg	リン酸ジメモルファン カルボシステイン アズレンスルホン酸ナトリウム・レーグルタミン アセトアミノフェン	意識消失	回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。翌日、意識消失発現。廊下でまえのめりに転倒、顔を床にうつ。本剤服用中止。
325	B-07001524	男性	69歳	150 mg		認知症	回復	3日前、発熱あり。 インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル服用開始。 服用開始3日目、幻覚、認知症の悪化発現。幻覚の内容は「周りに女の人がいて集団見合いをしている」といったもの。その後、幻覚軽快。本剤服用後しばらくは認知症の程度が強くなった。さらに2日後、認知症の悪化も回復。
326	B-02002488	男性	71歳	150mg	アジスロマイシン水和物 非ピリン系感冒剤 セラペプターゼ	糖尿病性昏睡	未回復	悪寒、発熱(38.5°C)のためリン酸オセルタミビル投与開始。 3日後嘔吐、倦怠のため投与中止。 中止2日後、糖尿病性昏睡発現。インスリン処方。 2ヶ月後、糖尿病性昏睡軽快

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性別	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
327	B-03010065	女性	71歳		PL リン酸ジメルファン 塩酸セフカベンピボキシル ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1) 塩酸ジルチアゼム バファリン81mg トリアゾラム	妄想 幻覚	回復	インフルエンザと診断、リン酸オセルタミビル(量不明)を服用(併用薬の服用状況は不明)。翌日、解熱したが、夜間より、幻覚、妄想出現。2日後入院、本剤中止。事象発現から6日目に幻覚消失。
328	B-02001386	女性	72歳	150mg	アンピシリンナトリウム ポラプレジンク スリンダク テブレノン 塩酸エペリゾン ジアゼパム 臭化ジスチグミン プロセミド ヒトインスリン(遺伝子組換え) プロチゾラム	嗜眠	軽快	細菌性髄膜炎、敗血症発症し入院。血小板減少を認めさらに一過性の意識障害を認めた。その後、A型インフルエンザと診断され、治療目的にてリン酸オセルタミビル投与。投与3回目内服後、しばらくして傾眠状態に陥る。その後、痰つまり、血圧低下等有り。同日本剤等併用薬のほとんどを中止とし、インフルエンザ回復と判断。その後意識低下等のための処置を行い、意識消失後6日目に経口摂取可能となり、全ての副作用軽快と判断。その後も意識レベル変動あり。
329	B-07000290	男性	72歳	150 mg	クラリスロマイン 鎮咳配合剤(1) アセトアミノフェン グリクラジド 塩酸メトホルミン	妄想	回復	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル処方。翌日、精神異常(妄想)発現。常に後ろから誰かに邪魔されている、邪魔されている人から逃げる。逃げ切った後に急にその人が前に現れるといった症状が、本剤服用後に確認された。本剤服用中止。症状回復。
330	B-02001093	女性	74歳	150mg	塩酸シプロヘプタジン アセトアミノフェン 臭素水素酸デキストロメトルファン 塩酸ジフェンヒドラミン 桜皮エキス セネガ セラペプターゼ 塩酸プロモヘキシン	譫妄 不穏	回復	詳細不明。認知症あり。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
331	B-04000835	男性	74歳	150mg	麻黄湯 アスピリン シメチジン	認知症	回復	アスピリン、シメチジンを投与されていた(開始日:不明)。38°Cの発熱があり、インフルエンザA型と診断後、リン酸オセルタミビル150mg/日及び麻黄湯を5日分処方されたが、4日目に認知症が激しくなり、家の間取りも忘れる。リン酸オセルタミビルを4日分で中止後、記憶力は次第にもどり、事象発現から7日目には認知症症状も良くなった。
332	B-05001823	男性	74歳	75mg	クラリストマイシン クエン酸モサブリド センノシド 経腸成分栄養剤(2) イトラコナゾール	意識レベルの低下(意識レベルの低下)	回復	肺結核、肺真菌症の既往あり。以前より起立性低血圧の既往有ったが、意識レベルの低下歴は認められていない。38°C程度の発熱が続き、インフルエンザ確定診断テスト実施した結果、B型インフルエンザと診断され、治療目的としてリン酸オセルタミビル投与。翌早朝ベッド前に倒れ、その際に左側頭部打撲、側頭部内出血。当日朝方に意識レベル改善し、夕食後より本剤投与中止となる。翌日インフルエンザ治癒。
333	B-02000229	男性	76歳	150mg	エリストマイシン 葛根湯 ピペラシリンナトリウム	幻覚	回復	詳細不明
334	B-02001630	女性	76歳	150mg	塩酸ラニチジン ニセルゴリン プラバスタチンナトリウム カンデサルタンシレキセチル トリクロルメチアジド シルニジピン	痙攣	回復	基礎疾患として、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、高脂血症、高血圧、多発性脳梗塞を持ち、治療中(開始日:2001年頃)。臨床経過より、インフルエンザと診断、リン酸オセルタミビル150mg/日を処方。投与を開始した翌日の昼に痙攣、意識障害が発現。同日、入院し、本剤の投与中止。翌日、軽い眩暈があるが、意識清明。さらに翌日、意識清明、眩暈消失、痙攣回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
335	B-02009730	女性	76歳	150mg	プラバスタチンナトリウム クエン酸モサブリド フドステイン セフジニル トラネキサム酸 臭化水素酸デキストロメトル ファン カルボシステイン オキサトミド ジフェンヒドラミン フルオシノニド ベタメタゾン／d-マレイン酸 クロルフェニラミン 塩酸フェキシフェナジン スクラルファート	反射減弱 末梢性ニューロパシー	不明	A型インフルエンザと診断され、リン酸オセルタミビルを治療目的に投与。本剤服用終了約1月後に四肢末梢のしびれ(末梢神経障害)発現。その後、全身脱毛、腱反射減弱、神経因性膀胱、食欲不振等発現。原因精査加療目的のため入院し、処置を行い末梢神経障害や食欲も徐々に回復。転帰は不明。
336	B-05001017	女性	76歳	150mg	塩酸ドネペジル 塩酸ラニチジン スクラルファート	意識変容状態	回復	老年痴呆の既往あり。インフルエンザA,B治療のためリン酸オセルタミビルの投与を開始。6日間投与を2クール実施後4日後に意識障害が発現。終日眠つており覚醒しない。補液のみで翌日から回復に向かい、意識障害発現後5日後に意識障害は回復した。
337	B-05026500	男性	76歳	150mg		幻覚	回復	A型インフルエンザで発熱(38.9°C)が見られ、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。服用開始から3日目に不穏等が発現し、その後幻覚も見られた。服用開始から4日後に服用を中止し、幻覚は発現から5日目に回復した。
338	B-01000663	女性	78歳	150mg	グリベンクラミド ボグリボース アズレンスルホン酸ナトリウム／L-グルタミン 酒石酸イフェンプロジル 硫酸鉄 アモキシシリソン／クラブラン 酸カリウム	低血糖昏睡	回復	糖尿病の既往有り。発熱・全身倦怠感有り病院受診し、迅速診断にてA型インフルエンザと診断。翌日、朝より少し食欲無く昼食の量は少なめ。その日17時頃就寝呼びかけに対する返答無し、その後見に行ったところ昏睡のため救急搬送となる。病院到着時、血糖値38mg/dLであり、ブドウ糖静注すると完全に回復となる。担当医によると、低血糖となったのは、今回初めて。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
339	B-03010786	女性	79歳	150mg	アルファカルシドール ニフェジピン	幻覚 妄想	回復	高血圧、骨粗鬆症で投薬中(開始日:2001/10)。インフルエンザA型と診断、リン酸オセルタミビル150mg/日5日分を処方。2日間服用後の夜中、起床し、異常な発言を行い、そわそわして寝ない。翌日朝、服用後、本剤の投与中止。同日午前中に受診し、会話正常。翌日午前中まで昼夜の区別がなかったが、午後になり通常の状態に戻る。
340	B-07002949	女性	79歳	150mg	セフミノクスナトリウム ニフェジピン マレイン酸エナラブリル トリクロルメチアジド スピロノラクトン アスピリン・ダイアルミニート シンバスタチン ジクロフェナクナトリウム	幻覚 譫妄	回復 回復	高熱、咽頭痛、歩行困難あり、入院。インフルエンザ疑いのため、リン酸オセルタミビル投与開始。 翌日、朝より解熱。 投与開始5日目、深夜幻覚、譫妄発現。私服に着替え、夫の病室を訪問。「退院しよう」と誘うも、説得され帰室。本剤投与終了。 翌日深夜も独りで夫の部屋を訪れ、「退院しよう」といい、説得されて、他の病室へ入室。その後、病室を出て、約1km離れた自宅に帰り、娘宅に電話する。夫がいないことを不審に思った由。 その3日後、幻覚、譫妄回復。
341	B-05000870	女性	80歳	150mg		味覚異常(味覚障害)	回復	インフルエンザB発症しリン酸オセルタミビル5日間投与。投与終了2日後インフルエンザ軽快したが、味覚障害・嗅覚障害発現。味覚障害等発現6日後回復。
342	B-05003030	男性	80歳	150mg	アスピリン・ダイアルミニート メシリ酸ベタヒスチン 酸化マグネシウム	譫妄(譫妄)	回復	インフルエンザと診断され、治療目的にリン酸オセルタミビル投与。昼に本剤服用後、まだらボケ有ったが、夜も服用すると妄想、せん妄が発現(軽微)。翌朝も症状続くため自己中止。その後症状緩和。その日夕方本剤再度服用するも、再び記憶があいまいとなる。翌日、本剤中止。その後、症状なくなる。妄想、せん妄回復。
343	B-07001906	不明	80歳代	150mg		認知症	回復	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル服用開始。うなつたり暴れたりということが見られ、その後、訳のわからないことをいうなど痴呆症のような状態となる。精神神経異常発現。本剤投与中止。インフルエンザ発症前(本剤服用前)は、痴呆症なし。 投与中止翌日、精神神経異常回復。
344	B-01012004	男性	81歳	150mg	塩酸ミノサイクリン シメトリド・無水カフェイン ファロペネムナトリウム ロキソプロフェンナトリウム	幻覚	回復	インフルエンザに対して、リン酸オセルタミビル他処方され、経口投与開始。5日後とも、熱がおさまってから幻覚(天井に赤い花が見えるなど)、幻視発現。本剤他投与中止。 幻覚発現3日後、幻覚、幻視回復。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
345	B-07000126	女性	82歳	75 mg	ピコスルファートナトリウム 塩酸マニジピン	幻覚	回復	インフルエンザA型の診断にて、リン酸オセルタミビル処方。体温37.1℃。本剤服用し、就寝するも眼れず、近所の人の話では訳の分からないこと(入院中でいないはずの息子が手足がとれて家にいるので医師のところに連れて行かなければ、娘がバラバラになって雪にうもれているので助けなければならない等)とを話していたとのこと。 服用から2日目、受診。意味不明な事(孫が体中切れていてこわかった等)を話す。インフルエンザ脳症を疑い入院。入院後も、「私のまわりに虫がいっぱいいる。窓から外を見て実際は見えないのだが電車の人が手を振っている。自分の足元に川が流れている」などと話す。 服用から3日目、朝、大分落ち着き普通に戻った。 服用から4日目、インフルエンザ軽快
346	B-07003017	女性	82歳	150 mg	アゾセミド イブジラスト クエン酸タンドスピロン ファモチジン 非ピリン系感冒剤(4) 葛根湯 アセトアミノフェン	妄想 幻聴	回復 回復	インフルエンザAに対して、リン酸オセルタミビル服用開始。 投与開始2日目、妄想、幻聴発現。本剤投与中止。 投与中止2日後、妄想、幻聴回復。
347	B-04027318	女性	84歳	150mg	バルプロ酸ナトリウム	うつ病	回復	てんかんの既往あり、バルプロ酸ナトリウム長期投与中。B型インフルエンザ治療のため、150mg/日のリン酸オセルタミビルを投与。投与開始後7日目、異常な発言と共に意欲の低下著名、うつ症状発現。有害事象発現後7日目、回復。
348	B-06017777	女性	84歳	150mg	ゾピクロン アセトアミノフェン 塩酸アンブロキソール キヨウニン水 ベシル酸アムロジピン テルミサルタン 塩酸ジフェニドール スルバクタムナトリウム・アン ピシリソナトリウム	譫妄	回復	脳梗塞、脳腫瘍手術、不眠症の既往歴あり。インフルエンザ確定診断後、肺炎疑いで入院。翌日よりリン酸オセルタミビル投与開始。2日後夜間、つじつまの合わない会話あり、せん妄発現。4日後以降症状なし、4日後投与終了。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
349	B-02002182	女性	87歳	150mg	酸化マグネシウム マレイン酸フルボキサミン クエン酸モサプリド プラバスタチンナトリウム ファモチジン ポラボレジンク アセトアミノフェン	幻覚	軽快	幻覚の発現状況は不明。原疾患：痴呆(高脂血漿、胃潰瘍を合併)で、約3年前(1999年6月)よりアセトアミノフェン以外の併用薬剤を継続使用。
350	B-03013201	女性	87歳	150mg	塩酸プロプロロール ジアゼパム ベンフォチアミン・B6・B12配合剤 リシノブリル プラバスタチンナトリウム	譫妄	回復	30歳台から年1回程度心身症のため受診していたほか、高血圧、高脂血症のため治療中(開始日：不明)。インフルエンザA型と診断、リン酸オセルタミビル150mg/日を処方。投与開始3日後に、幻視を訴えたほか、洋服を何枚もむやみに重ねて着るなどの異常行動があった。翌日、受診時には落ち着いていた。1週間後、再診時には幻覚などの症状はなくなり、再燃はなかった。
351	B-05026235	男性	88歳	75mg	グリクラジド アスピリン・ダイアルミニート メコバラミン 非ピリン系感冒剤(4) ゲファルナート ジクロフェナクナトリウム	失神	回復	インフルエンザ発症で入院し、リン酸オセルタミビルの服用を開始した。服用開始から2日目の朝に失神が発現し、約2~3分で意識が回復した。同日の夜にはインフルエンザも軽快した。
352	B-04006355	女性	89歳	150mg	塩酸ドネペジル	落ち着きのなさ	回復	老年痴呆、骨粗鬆症、背部痛、骨関節炎で塩酸ドネペジルを投与されていた。インフルエンザA型と診断、リン酸オセルタミビル150mg/日が投与され、翌日にはほぼ解熱。投与3日目の夜、家が火事になった等の幻覚が発現。不穏状態が発現し持続するため、本剤の投与を中止。翌日には次第に不穏状態が軽快し、投与中止5日後には全く以前のとおりとなった。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
353	B-04026971	男性	92歳	150→ 225mg	塩酸チアラミド トロキシピド ニフェジピン アロブリノール アスピリン フロセミド ニコランジル 一硝酸イソルビド 酒石酸メトプロロール ファモチジン レバミピド ニトログリセリン 耐性乳酸菌配合剤(1)	ミオクローヌス	回復	B型インフルエンザ確定診断後、リン酸オセルタミビル150mg/日を投与開始。投与2日目夕刻、コンプライアンス上の問題あり(2~3カプセルを服用と推測)。同日深夜、不規則な振戦様の不随意運動出現。翌日も脱水著明、顔・体幹・四肢の不随意運動改善せず。リン酸オセルタミビルの服用中止。更にその翌日も、不随意運動改善せず、全身のミオクローヌス様不随意運動と診断、入院。有害事象発現後6日目回復、退院。
354	B-01012005	女性	95歳	150mg	テオフィリン ランソプラゾール メトクロプラミド ゾピクロン カルボシスチーン センノシンド セラペプターゼ レボフロキサン	幻覚	回復	発熱(39°C)、腰痛発現。(CRP4+)のため、クラビット処方。 翌日、インフルエンザ疑いため、リン酸オセルタミビル処方。 処方5日後、幻覚(幻視:木が倒れてくる。幻聴:ハチの発ぶ音)発現。本剤投与中止。 翌日、幻覚軽快。 投与中止3日後、幻覚完全回復
355	B-07000074	女性	小児	150 mg		異常行動	回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル75mg1日2回服用。 しゃべりまくっていた。
356	B-07006907	不明	成人	不明		嗅覚錯誤	未回復	インフルエンザ治療のため、リン酸オセルタミビル服用。服用後、嗅覚障害発現。
357	B-06000632	女性	0	不明		痙攣	不明	詳細不明
358	B-01002841	男性	不明	不明	ジクロフェナクナトリウム 塩酸ホミノベン	振戦	不明	インフルエンザに対してリン酸オセルタミビル投与を開始。投与後1~2日後、冷感、ふるえ、高熱のため他院に移送。転帰不明
359	B-07001708	男性	不明	不明		パーキンソン病	未回復	大腸ポリープの手術を行った後、インフルエンザに罹り、リン酸オセルタミビル処方。服用翌日、パーキンソン病発現。現在も治療中。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の概要(年齢順)(販売開始から平成19年9月30日まで)

No.	識別番号	性	年齢	一日用量	併用薬	副作用	転帰	経過の概要
360	B-07002665	男性	不明	78 mg	ヒベンズ酸チペビジン フル酸クレマスチン カルボシステイン アセトアミノフェン	譫妄	回復	インフルエンザの診断にて、リン酸オセルタミビル処方。同日夜半、意識が朦朧となる。呼びかけてもはつきりせず家族が「異常行動か?」と考え、本剤服薬中止させたところ、意識回復。
361	B-07003019	女性	不明	36 mg	ヒベンズ酸チペビジン フル酸クレマスチン カルボシステイン アセトアミノフェン	痙攣	回復	インフルエンザにて、リン酸オセルタミビル服用開始。朝、夜本剤服用。体温：39°C。 投与開始2日目、朝、夜、本剤服用。寝ている時、痙攣の様にピクピクする。 投与開始3日目、熱が下がったので本剤を自己中止する。その後、痙攣は出ていない。