

担当医等の意見

(血管迷走神経性失神)リレンザ: 確実  
本剤には、乳製品を含めた食物アレルギーの既往もなく、食事制限も行っていない。乳糖吸入  
というところが、非特異的に迷走神経反射をきたしたし、一過性の血圧低下を起した可能性がある  
。ティクスクヘラ一使用説明には、何も入っていないロタウイルスの方の方が安全である。

報告企業等の意見

血管迷走神経性失神は、本剤の使用上の注意においても注意喚起している通り、インフルエン  
ザに伴う発熱等の全身状態の悪化に加え、本剤の吸入行為により発現した可能性が高いと考え  
ます。

今後の対応

本剤の使用上の注意に関連事項を記載し、注意を喚起しておりますが、今後とも安全性情報の収集・伝達に努力する所存です。

送信者による診断名/症候群及び/又は副作用/有害事象の再分類

血管迷走神経性失神

第一次情報源により報告された副作用/有害事象

累積報告件数・使用上の注意記載状況等

1. 薬事法施行規則の規定に基づき、企業が報告すべき情報を入力した日は2007年4月4日です。

2. 使用上の注意の記載状況  
血管迷走神経性失神: (国内) <重要な基本的注意>本剤投与後に失神やショック症状があらわれたとの報告がある。この失神やショック症状はインフルエンザウイルス感染症に伴う発熱、  
脱水等の全身状態の悪化に加え、本剤を強く吸入したことが誘因となった可能性がある。患者には使用説明書に記載されている吸入法を十分に理解させ、くつろ  
いだ状態(例えば座位等)で吸入するよう指導すること。また、このような症状があらわれた場合には、患者に仰臥位をとらせ安静に保つとともに、補液を行うなど適切な処置を行うこと。  
3. 患者背景等を入手したので追加報告致しません。

引用文献

資料一覧