

# 整形：1～2/週

● テキスト+デジカメ画像

● 710万画素

● あまり細かい画像は必要ない

● (形成は別：神経血管)

● 島ではほとんど外傷

● 確認を得たい

● 折れているかいないか

● ギブス巻きなどの整復は正しいか

● 島で経過をみていていいのか

● 骨転移の正常組織との差

● 元レントゲンの撮影技術に依存



05.3月

件名	名前	サイズ	送信日時
よろしくお返します		2K	08.2.17 3:17 PM
紹介		3.29	08.2.24 AM
Re: 画像追加		2K	08.2.26 10:26 AM
左足内側部痛		1M	08.2.26 5:00 PM
Re(4): 左足内側部痛		2K	08.2.27 4:03 PM
Re(3): 左足内側部痛		2K	08.2.27 3:50 PM
Re(2): 左足内側部痛		2K	08.2.27 3:37 PM
Re: 左足内側部痛		2K	08.2.26 6:06 PM
左足内側部痛		2K	08.2.26 4:54 PM
Re: 画像追加: 左中指・薬指基節骨骨折		2K	08.2.7 4:58 PM

2007年 10月

差出人: Orthopedics

件名: 右内果骨折疑

宛先: Orthopedics

添付ファイル: IMG\_0017.JPG (990K), IMG\_0018.JPG (1.2M)

コンサルトお申し込み

50歳男性

件名: 昨夜10月30日、酒運転で右内果骨折を疑うので、ギブス固定の可否について御教示願えますでしょうか。よろしくお願ひします。

右手背内裂傷ほか、右内果腫脹、疼痛、擦過傷あり。

レントゲン上、右内果骨折を疑うのですが、ギブス固定のほか、手術の可能性について御教示願えますでしょうか。よろしくお願ひします。

拝見しました。御指摘の通り内果骨折を認めます。転位も大きくないのでギブス固定で大丈夫かと思いましたが、外果部も少し怪しいのではと思いましたが、身体所見ではどうですか？ギブスは2～3週はLong castが良いと思いますが、結構日常生活に支障が出るかもしれません。免荷は6週間必要と思います。1週置きにレントゲン撮影しズレが大きくなるのであれば紹介してください。また何かあれば連絡ください。