

表1 予防接種後健康状況調査—麻疹(武田、北里、微研)、風疹(武田、北里、微研、化血)、MR(武田、微研)

対象者		発熱率									
		6日まで					7-13日				
		発熱計	37.5°C以上 未満		38.5°C以上 未満		小計	37.5°C 以上 38.5°C 未満		38.5°C 以上 38.5°C 未満	
			上38.5°C	上	小計	38.5°C	以上	38.5°C 以上 38.5°C 未満	以上	38.5°C 以上 38.5°C 未満	小計
麻疹	2005年度	3,850	23.0%	8.8%	14.2%	8.2%	3.2%	5.0%	9.5%	4.1%	5.5%
風疹	2005年度	4,375	11.0%	3.9%	7.1%	4.5%	1.9%	2.5%	2.9%	1.0%	1.9%
I期MR	2006年度	5,018	22.0%	8.6%	13.4%	8.1%	3.2%	4.9%	9.0%	3.6%	5.4%
II期MR	2006年度	3,338	8.0%	3.4%	4.5%	3.0%	1.2%	1.8%	2.2%	1.0%	1.2%

表1 予防接種後健康状況調査—麻疹(武田、北里、微研)、風疹(武田、北里、微研、化血)、MR(武田、微研)

	局所反応			けいれん			尋麻疹			発疹			その他	
	局所反応 計	3日以内 内	6日以内 内	けいれん ん計	37.5°C 未満	37.5°C 以上	尋麻疹 計	13日以内 内	1日以内 内	発疹計	6日以内 内	7-13日 日	リンパ 節腫脹	関節痛
麻疹	2005年度	2.9%	1.2%	1.5%	0.4%	0.0%	0.4%	3.3%	2.8%	0.3%	9.8%	2.8%	5.8%	
風疹	2005年度	1.2%	0.9%	1.0%	0.1%	0.0%	0.1%	1.1%	0.8%	0.2%	2.5%	1.0%	0.5%	0.4% 0.2%
I期MR	2006年度	1.8%	0.8%	1.1%	0.2%	0.0%	0.2%	3.0%	2.3%	0.3%	6.6%	2.2%	2.8%	0.6% 0.1%
II期MR	2006年度	2.5%	2.4%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.5%	0.1%	1.7%	0.7%	0.4%	0.4% 1.2%