

6,7-ジヒドロ-5-メチル-5*H*-シクロペンタピラジンの食品添加物の指定に関する部会報告書(案)

今般の添加物としての新規指定並びに使用基準及び成分規格の設定の検討については、国際汎用添加物として指定の検討を進めている当該添加物について、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、添加物部会において審議を行い、以下の報告をとりまとめるものである。

1. 品目名：6,7-ジヒドロ-5-メチル-5*H*-シクロペンタピラジン

6,7-Dihydro-5-methyl-5*H*-cyclopentapyrazine


5-Methyl-6,7-dihydro-5*H*-cyclopentapyrazine

5-Methyl-6,7-dihydro-5*H*-cyclopenta(*b*)pyrazine

[CAS 番号：23747-48-0]

2. 構造式、分子式及び分子量

構造式：



分子式及び分子量：

$C_8H_{10}N_2$ 134.18

3. 用途

香料

4. 概要及び諸外国での使用状況

6,7-ジヒドロ-5-メチル-5*H*-シクロペンタピラジンは、麦芽、ビール等の食品中に存在し、また、コーヒーの焙煎及び豚肉等の加熱調理により生成する成分である。

欧米ではソフト・キャンデー類、肉製品、冷凍乳製品類、チューインガム、清涼飲料などの様々な加工食品において香りを再現し、風味を向上させるために添加されている。

5. 食品安全委員会における評価結果

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 1 項第 1 号の規定に基づき、平成 22 年 8 月 12 日付け厚生労働省発食安 0812 第 1 号により食品安全委員会あて意見

を求めた 6,7-ジヒドロ-5-メチル-5H-シクロペンタピラジンに係る食品健康影響評価については、平成 22 年 8 月 31 日に開催された添加物専門調査会の議論を踏まえ、以下の評価結果(案)が平成 22 年 11 月 18 日付けで公表されている。

評価結果：6,7-ジヒドロ-5-メチル-5H-シクロペンタピラジンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えられる。

6. 摂取量の推計

上記の食品安全委員会の評価結果によると次のとおりである。

添加物(香料)「6,7-ジヒドロ-5-メチル-5H-シクロペンタピラジン」の香料としての年間使用量の全量を人口の10%が消費していると仮定するJECFAのPCTT (Per Capita intake Times Ten) 法による1995年の米国及び欧州における一人一日あたりの推定摂取量は、それぞれ4 μ g及び5 μ gである。正確には指定後の追跡調査による確認が必要と考えられるが、既に指定されている香料物質の我が国と欧米の推定摂取量が同程度との情報があることから、我が国での本品目の推定摂取量は、およそ4 μ gから5 μ gまでの範囲になると推定される。

7. 新規指定について

6,7-ジヒドロ-5-メチル-5H-シクロペンタピラジンを食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えない。ただし、同法第11条第1項の規定に基づき、次のとおり使用基準と成分規格を定めることが適当である。

なお、IUPAC命名法に従い、名称を5-メチル-6,7-ジヒドロ-5H-シクロペンタピラジンとすることが適当である。

(使用基準案)


香料として使用される場合に限定して食品健康影響評価が行われたことから、使用基準は「着香の目的以外に使用してはならない。」とすることが適当である。

(成分規格案)

成分規格を別紙1のとおり設定することが適当である。(設定根拠は別紙2、JECFA規格等との対比表は別紙3のとおり。)

5-メチル-6,7-ジヒドロ-5*H*-シクロペンタピラジン (案)

5-Methyl-6,7-dihydro-5*H*-cyclopentapyrazine



C₈H₁₀N₂

分子量 134.18

5-Methyl-6,7-dihydro-5*H*-cyclopenta[*b*]pyrazine [23747-48-0]

含 量 本品は、5-メチル-6,7-ジヒドロ-5*H*-シクロペンタピラジン (C₈H₁₀N₂) 97.0 %以上を含む。

性 状 本品は、淡黄～褐色の透明な液体で、特有のにおいがある。

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し、本品のスペクトルを参照スペクトルと比較するとき、同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。

純度試験 (1) 屈折率 $n_D^{20} = 1.525 \sim 1.535$

(2) 比重 $d_{25}^{25} = 1.048 \sim 1.059$

定 量 法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件(1)により定量する。

6,7-ジヒドロ-5-メチル-5*H*-シクロペンタピラジンに係る成分規格等の設定根拠

名称

JECFA では、5-Methyl-6,7-dihydro-5*H*-cyclopentapyrazine、FCC では、5*H*-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopenta[b]pyrazine としている。本規格案では、IUPAC 命名法に従い、5-メチル-6,7-ジヒドロ-5*H*-シクロペンタピラジンとし、英名を 5-Methyl-6,7-dihydro-5*H*-cyclopentapyrazine とした。

含量

JECFA は「97%以上」、FCC は「98%以上」を規格値としている。本規格案では、国際整合性を考慮して JECFA 規格と同水準の規格値とするが、他の添加物の規格値との整合性を考慮して小数第 1 位までを有効数字とし「97.0%以上」とした。

性状

JECFA は「ピーナッツ臭の淡黄～こはく色の液体」、FCC は「黄～褐色の液体/ピーナッツ臭」を規格としている。

本品は特有の香気を持つが、香気は人により必ずしも同一に感ずるとは限らないことから、本規格案では「本品は、淡黄～褐色の透明な液体で、特有のにおいがある。」とした。

確認試験

JECFA は確認試験に赤外吸収スペクトル測定法を採用している。FCC は確認試験法を設定していない。本規格案は JECFA で採用している赤外吸収スペクトル測定法を採用した。

純度試験

- (1) 屈折率 JECFA, FCC ともに「1.525～1.535 (20℃)」としている。本規格案では国際整合性を考慮して JECFA, FCC が規格値としている「 $n_D^{20} = 1.525 \sim 1.535$ 」を採用した。
- (2) 比重 JECFA, FCC ともに「1.048～1.059 (25/25℃)」としている。本規格案では国際整合性を考慮して JECFA, FCC が規格値としている「 $d_{25}^{25} = 1.048 \sim 1.059$ 」を採用した。

定量法

JECFA は GC 法により含量測定を行っている。FCC は非極性キャピラリーカラムを用いた GC 法により含量測定を行っている。香料業界及び香料を利用する食品加工メーカーにおいても GC 装置が広く普及しており、測定機器を含めた測定環境に実務上問題は無いことから本規格案でも GC 法を採用することとした。

本品は、沸点が 150℃以上(200℃)であり、極性及び非極性カラムのいずれを用いてもピーク形状は問題ないことから、香料試験法の 9. 香料のガスクロマトグラフィーの面積

百分率法の操作条件(1)により定量する。

JECFA, FCC では設定されているが、本規格では採用しなかった項目

溶解性


JECFA は、「溶解性：水にわずかに溶ける；油脂，プロピレングリコール，有機溶剤に溶ける」，「エタノールへの溶解性：室温で混和する」としている。また FCC は「溶解性：プロピレングリコール，油脂に溶ける；水にわずかに溶ける」，「アルコールへの溶解性：1mL が 95%エタノール 1mL に溶ける」としている。しかしながら、本規格案では IR による確認試験、純度試験として屈折率・比重、含量を規定しており、「溶解性」の必要性は低いため、採用しないこととした。

沸点

沸点の規格を JECFA, FCC とともに「200℃」としている。一般に、香料化合物は、加熱分解臭をつけないように減圧精密蒸留により一定の範囲の留分を得たものであり、その品質管理は GC 法により実施されるため、沸点は必ずしも香料化合物の品質規格管理項目として重要ではないと考えられることから、本規格案では沸点に係る規格を採用しないこととした。

5-メチル-6,7-ジヒドロ-5H-シクロペンタピラジン

参照赤外吸収スペクトル



香料「6,7-ジヒドロ-5-メチル-5H-シクロペンタピラジン」の規格等対比表

	案	JECFA	FCC
名称	5-メチル-6,7-ジヒドロ-5H-シクロペンタピラジン	5-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine	5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopenta[b]pyrazine
含量	規格案 97.0%以上	JECFA 97%以上	FCC 98%以上
性状	本品は、淡黄～褐色の透明な液体で、特有のにおいがある。	ピーナッツ臭の淡黄～こはく色の液体	黄～褐色の液体/ピーナッツ臭
確認試験	IR法(参照スペクトル法)	IR法(参照スペクトル法)	設定せず
純度試験	屈折率	1.525～1.535(20°C)	1.525～1.535(20°C)
	比重	1.048～1.059(25/25°C)	1.048～1.059(25/25°C)
溶解性	(設定せず)	水にわずかに溶ける。油脂、プロピレングリコール、有機溶剤に溶ける。エタノールに室温で溶ける。	プロピレングリコール、油脂に溶ける。水にわずかに溶ける。1mLが95%エタノール1mLに溶ける。
沸点	(設定せず)	200°C	200°C
定量法	GC法(1)	GC法	GC法(非極性カラム)

19.978


5-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine GC測定条件

検出器: 水素炎イオン化検出器
カラム:

- 内径: 0.25mm
- 長さ: 50mケイ酸ガラスキャピラリー
- 被覆剤: ポリエチレングリコール(極性カラム)
- 膜厚: 0.25 μm

- カラム温度:
- 初期温度: 50°C
 - 保持時間: 0分
 - 昇温速度: 5°C/分
 - 到達温度: 230°C

- 注入口温度: 250°C
検出器温度: 300°C
スプリット比: 250:1
キャリアガス: ヘリウム



10

20

30

40

min

(参考)

これまでの経緯

- 平成22年8月12日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに添加物の指定に係る食品健康影響評価について依頼
- 平成22年8月19日 第344回食品安全委員会（依頼事項説明）
- 平成22年8月31日 第88回食品安全委員会添加物専門調査会
- 平成22年11月18日 第356回食品安全委員会（報告）
～平成22年12月17日 食品安全委員会における国民からの意見聴取
- 平成22年12月15日 薬事・食品衛生審議会へ諮問
- 平成22年12月22日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会
[委員]

氏名	所属
井手 速雄	東邦大学薬学部教授
井部 明広	東京都健康安全研究センター食品化学部長
小川 久美子	国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター病理部長
鎌田 洋一	国立医薬品食品衛生研究所衛生微生物部第四室長
河村 葉子	国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部長
北田 善三	畿央大学健康科学部教授
佐藤 恭子	国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部第一室長
堀江 正一	大妻女子大学家政学部食品学科食安全学教室教授
山内 明子	日本生活協同組合連合会執行役員組織推進本部本部長
山川 隆	東京大学大学院農学生命科学研究科准教授
山崎 壮	国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部第二室長
山添 康	東北大学大学院薬学研究科教授
由田 克士	大阪市立大学大学院生活科学研究科教授
若林 敬二※	静岡県立大学食品栄養科学部客員教授

※部会長

