

資料5-2-1

薬食発 1014 第 3 号
平成 23 年 10 月 14 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬食品局長

一般用医薬品の使用上の注意記載要領について

標記については、平成 11 年 8 月 12 日付け医薬発第 983 号医薬安全局長通知「一般用医薬品の使用上の注意記載要領について」（以下「旧通知」という。）により、その適切な運用に努めてきたところである。

今般、購入時の選択に資するよう外部の容器又は外部の被包への記載の見直し等を行い、旧通知の「一般用医薬品の使用上の注意記載要領」を改正し、新たに別添のとおり定めることとしたので、下記の点に御留意の上、貴管下関係業者等に対し周知徹底を図るとともに、一般用医薬品の使用上の注意に関する指導につき特段の御配慮を願いたい。

なお、本通知の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、社団法人日本医師会長、社団法人日本歯科医師会会长、社団法人日本薬剤師会会长、一般社団法人日本病院薬剤師会会长、社団法人全日本医薬品登録販売者協会会长、一般社団法人日本医薬品登録販売者協会、日本チェーンドラッグストア協会会长、社団法人日本フランチャイズチェーン協会会长、日本製薬団体連合会会长、日本一般用医薬品連合会会长、米国研究製薬工業協会会长、欧洲製薬団体連合会会长及び社団法人日本医薬品卸業連合会会长あてに発出することとしているので申し添える。

記

1. 適用の範囲

本記載要領は、一般用医薬品の添付文書等に記載される使用上の注意に適用する。

2. 実施時期等

今後記載する使用上の注意は、原則として本記載要領に基づくものとすること。

ただし、既に旧通知に基づいて記載されている使用上の注意については、平成26年5月末日までに、本記載要領に基づいた記載に改めること。

なお、添付文書に記載された使用上の注意の本記載要領に基づく変更は、平成23年10月14日付け薬食発1014第6号医薬食品局長通知「一般用医薬品の添付文書記載要領について」の一般用医薬品の添付文書記載要領に基づく添付文書の変更に併せて行うこと。

3. その他

使用上の注意において、重要な事項の記載内容を変更したときは、その変更の趣旨及び内容を薬局及び医薬品販売業者に対し周知徹底すること。

4. 既存の通知の取扱いについて

本通知の発出に伴い、旧通知は廃止する。

(別添)

一般用医薬品の使用上の注意記載要領

第1 使用上の注意記載要領の趣旨

1. 一般用医薬品の使用及び取扱い上の注意は、薬事法第52条第1号の規定に基づき、一般用医薬品の適正な使用を図り、安全を確保するために、一般使用者に対して必要な情報を提供する目的で当該医薬品の製造販売業者が医薬品の添付文書又はその容器若しくは被包に記載するものである。
2. 本要領は、添付文書又はその容器若しくは被包に記載すべき、使用及び取扱い上の注意のほか、外部の容器又は外部の被包に記載する事項についても規定した。
3. 本要領にいう「副作用」とは、当該医薬品を使用した結果、人体に発現する有害反応をいう。

第2 使用上の注意等の記載に際しての原則

1. 記載する内容
原則として、次の事項を含むこと。
 - (1) 一般用医薬品に共通の注意事項及び同一薬効群に共通の注意事項
 - (2) 当該医薬品の効能又は効果、用法及び用量、成分及び分量、副作用、剤形・形状等からみて必要な注意事項
 - (3) 当該医薬品の保管及び取扱い上の注意事項
2. 記載項目、順序及び要領
原則として第3及び第4に従うほか、次によること。
 - (1) 内容からみて重要と考えられる事項については、記載順序として前の方に配列すること。
 - (2) 原則として、記載内容は2項目以上にわたり重複しないこと。
 - (3) 各項目は、第3に掲げる項目名を明示した上で記載すること。ただし、「その他」にあっては「その他」という項目名は使用せずに、個々に項目名を設定すること。また、「してはいけないこと」、「相談すること」及び「その他の注意」については、項目名を枠で囲む、文字の色やポイントを変える、イラストを挿入する等により目立つよう記載すること。
3. 記載に当たって的一般的な留意事項
 - (1) 一般使用者が理解しやすく自ら判断できる内容とするために、分かりやすい用語を用い、平易な表現で簡潔に記載すること。
 - (2) 一般使用者に正確に情報を伝えるために、適宜、図表やイラストを用いる等の工夫をすること。
 - (3) 各注意事項の内容を理解しやすくするために適當と考えられる場合には、注意事項の記載理由を（ ）で簡単に記載しても良いこと。
 - (4) 外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項については、一般使用者の目にとまりやすい場所に記載すること。
 - (5) 既に記載されている事項の削除又は変更は、十分な根拠に基づいて行うこと。

- (6) 当該医薬品の有効性、安全性に関して重要な新しい情報が加わった場合には、添付文書の記載内容を検討して適切な内容に変更すること。

第3 記載項目及び記載順序

1. してはいけないこと

- (1) 次の人は使用（内服剤の場合には、適宜、「使用」に代えて「服用」とする。以下、本記載要領において同じ。）しないこと
- (2) 次の部位には使用しないこと
- (3) 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
- (4) その他

2. 相談すること

- (1) 次の人は使用前に医師、歯科医師（歯科医師については、歯科医師が関係する場合のみ記載する。以下、本記載要領において同じ。）、薬剤師又は登録販売者（第一類医薬品には登録販売者は記載しないこと。以下、本記載要領において同じ。）に相談すること
- (2) 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- (3) 使用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- (4) 一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- (5) その他

3. その他の注意

4. 保管及び取扱い上の注意

第4 各項目の記載要領

1. してはいけないこと

- (1) 次の人は使用しないこと
 - ア. 効能又は効果の範囲内であっても、疾病の種類、症状、合併症、既往歴、体质、妊娠の可能性の有無、授乳の有無、年齢、性別等からみて使用すべきでない人について、一般使用者が自らの判断で確認できる注意事項を記載する。
 - イ. 効能又は効果の範囲以外で、誤って使用されやすい類似の疾病や症状がある場合は、その内容を記載する。

(2) 次の部位には使用しないこと

- (1) に準じて記載する。

(3) 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

同種同効の医薬品又は相互作用を起こしやすい医薬品との併用に関する注意事項を記載する。

(4) その他

- ア. 乳汁への移行性等から乳児に対する危険性がある医薬品の場合、本剤の使用期間中は授乳しない又は授乳期間中は本剤を使用しない旨の注意を記載する。
- イ. 副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する注意事項がある場合には、その副作用の内容及びそのような作業に従事しない旨の注意を記載する。
- ウ. アルコール等の食品と相互作用を起こす可能性がある場合には、本剤の使用中には、その食品を摂取しない旨の注意を記載する。
- エ. その他、重大な副作用又は事故を防止する目的で当該項目に記載することが適当であると判断される事項があれば記載する。

2. 相談すること

- (1) 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 疾病の種類、症状、合併症、既往歴、体質、妊娠の可能性の有無、授乳の有無、年齢、性別等からみて、副作用による危険性が高い場合若しくは医師又は歯科医師の治療を受けている人であって、一般使用者の判断のみで使用することが不適当な場合について記載する。
- (2) 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - ア. 副作用のうち、本剤の使用を続けると症状が重くなったり、症状が長く続くおそれのあるものについて記載することとし、一般使用者が判断できる初期症状を主に記載する。
 - イ. 副作用の内容は一般的な副作用とまれに発生する重篤な副作用に分けて、表形式にする等わかりやすいよう工夫して記載する。
 - ウ. 副作用の記載に当たっては、最初に、一般的な副作用について発現部位別に症状を記載し、次に、まれに発生する重篤な副作用について副作用名ごとに症状を記載する。
なお、重篤な副作用の発現時には医療機関を受診する旨を記載する。
- (3) 使用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 本剤の薬理作用等から発現が予想され、容認される軽微な症状であるが、症状の持続又は増強がみられた場合は、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談する旨を記載する。
- (4) 一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談する旨を記載する。この場合、期間又は回数は、可能な限り具体的な数値で記載する。
- (5) その他
 - 上記(1)から(4)に分類されない相談すべき注意事項があれば記載する。

3. その他の注意

1又は2に分類されない使用上の注意があれば記載すること。

4. 保管及び取扱い上の注意

次のような事項を記載する。

- (1) 温度、湿度、日光等に関する注意があれば記載する。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すべき旨の注意を記載する。
- (3) 他の容器に入れかえることは、事故のもとになったり、品質保持の観点からも好ましくないので、その旨を記載する。

また、携帯容器（薬剤を移し替えても品質上、問題ないことを担保した容器）が添付されている場合は、その容器以外の容器に入れかえない旨の注意を記載する。

- (4) その他、当該項目に関して必要な事項があれば記載する。

第5 外部の容器又は外部の被包の記載項目、記載順序及び記載要領

1. 「次の人は使用しないこと」

第4の1. (1)に準じて記載する。

2. 「次の部位には使用しないこと」

第4の1. (2)に準じて記載する。

3. 乳汁への移行性等から乳児に対する危険性がある医薬品に関する注意事項

第4の1. (4)アに準じて記載する。

4. 副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する事項

第4の1. (4)イに準じて記載する。

5. 専門家への相談の勧奨に関する事項

「次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」

第4の2. (1)に準じて記載する。

ただし、外部の容器等の記載スペースが狭小なために使用前に専門家に相談すべき場合を具体的に記載できない場合は、「使用が適さない場合があるので、使用前には必ず医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」等と記載する。

6. 添付文書の必読に関する事項

7. 医薬品の保管に関する事項

第4の4.に準じて記載する。

8. 以下の項目等、その他外部の容器又は外部の被包に記載することが適当と考えられる事項

(1) リスク区分表示

薬事法施行規則第209条の2及び第210条第5号の規定に基づき、一般用医薬品のリスク区分の表示を記載すること。

(2) 医薬品副作用被害救済制度に関する表示

平成20年8月5日付け薬食総発第0805001号厚生労働省医薬食品局総務課長通知

「一般用医薬品外箱等への副作用被害救済制度の表示に関する自主申し合わせ及び質疑応答集（改訂）について」を参考とすること。なお、改正があった場合には最新の通知等に従うこと。

(3) 消費者相談窓口

一般使用者からの当該医薬品についての相談に応じることができる連絡先等を記載すること。

(参考)

○一般用医薬品の使用上の注意記載要領の新旧対照表

(傍線の部分は改正部分)

改正後	改正前
一般用医薬品の使用上の注意記載要領	一般用医薬品の使用上の注意記載要領
<u>第1 使用上の注意記載要領の趣旨</u> 1. 一般用医薬品の <u>使用及び取扱い上の注意</u> は、 <u>薬事法第52条第1号</u> の規定に基づき、一般用医薬品の適正な使用を図り、安全を確保するために、一般使用者に対して必要な情報を提供する目的で当該医薬品の <u>製造販売業者</u> が医薬品の添付文書又はその容器若しくは被包に記載するものである。 2. 本要領は、添付文書又はその容器若しくは被包に記載すべき、 <u>使用及び取扱い上の注意</u> のほか、外部の容器又は外部の被包に記載する事項についても規定した。 3. 本要領にいう「副作用」とは、当該医薬品を使用した結果、人体に発現する有害反応をいう。	<u>第1 使用上の注意の記載に際しての原則</u> 1. 一般用医薬品の「 <u>使用上の注意</u> 」は、 <u>薬事法第52条第1号</u> の規定に基づき、一般用医薬品の適正な使用を図り、安全を確保するために、一般使用者に対して必要な情報を提供する目的で当該医薬品の <u>製造業者又は輸入販売業者</u> が医薬品の添付文書又はその容器若しくは被包に記載するものであること。
<u>第2 使用上の注意等の記載に際しての原則</u> <u>1. 記載する内容</u> 原則として、次の事項を含むこと。 (1) (略) (2) 当該医薬品の効能又は効果、用法及び用量、 <u>成分及び分量</u> 、副作用、剤形・形状等からみて必要な注意事項 (3) (略)	<u>2. 「使用上の注意」に記載する内容は、原則として、次の事項を含むこと。</u> (1) (略) (2) 当該医薬品の効能又は効果、用法及び用量、副作用、剤形・形状等からみて必要な注意事項 (3) (略) <u>なお、本要領にいう「副作用」とは、当該医薬品を使用した結果、人体に発現する有害反応をいう。</u>
<u>2. 記載項目、順序及び要領</u> 原則として <u>第3及び第4</u> に従うほか、次によること。 (1) (略) (2) (略)	<u>3. 記載順序及び要領は、原則として「第2 記載項目及び記載順序」及び「第3 各項目の記載事項」に掲げるものに従うほか、次によること。</u> (1) (略) (2) (略)

<p>(3) 各項目には、<u>第3</u>に掲げる項目名を明示した上で記載する。ただし、「その他」にあっては「その他」という項目名は使用せずに、個々に項目名を設定すること。また、「してはいけないこと」、「相談すること」及び「その他の注意」については、項目名を枠で囲む、<u>文字の色やポイントを変える、イラストを挿入する等</u>により目立つように記載すること。</p>	<p>(3) 各項目は<u>第2 記載項目及び記載順序</u>に掲げる項目名を明示した上で記載すること。ただし、「その他」にあっては「その他」という項目名は使用せずに、個々に項目名を設定すること。また、「してはいけないこと」、「相談すること」及び「その他の注意」については、項目名を枠で囲む<u>等</u>により目立つように記載すること。</p>
<p><u>3. 記載に当たっての一般的な留意事項</u></p>	
<p>(1) 一般使用者が理解しやすく自ら判断できる内容とするために、<u>分かりやすい用語を用い、平易な表現で簡潔に記載すること。</u></p>	<p><u>4. 添付文書の記載に際しては、一般使用者が理解しやすく自ら判断できる内容とするために、平易な表現で簡潔に記載すること。</u></p>
<p>(2) (略)</p>	<p><u>5. (略)</u></p>
<p>(3) 各注意事項の内容を理解しやすくするために適當と考えられる場合には、注意事項の記載理由を（ ）で簡単に記載しても良いこと。</p>	
<p>(4) 外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項については、一般使用者の目にとまりやすい場所に記載すること。</p>	
<p>(5) (略)</p>	<p><u>6. (略)</u></p>
<p>(6) (略)</p>	<p><u>7. (略)</u></p>
<p></p>	<p><u>8. 次の事項については、外部の容器又は外部の被包の使用者の目にとまりやすい場所に、別途記載すること。</u></p>
<p>(1) 次の人は使用（内服剤の場合には「服用」とする。以下、本記載要領において同じ。）しないこと</p>	<p><u>(1) 次の人は使用（内服剤の場合には「服用」とする。以下、本記載要領において同じ。）しないこと</u></p>
<p>(2) 次の部位には使用しないこと</p>	<p><u>(2) 次の部位には使用しないこと</u></p>
<p>(3) 副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する事項</p>	<p><u>(3) 副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する事項</u></p>
<p>(4) 添付文書の必読に関する事項</p>	<p><u>(4) 添付文書の必読に関する事項</u></p>
<p>(5) 医薬品の保管に関する事項</p>	<p><u>(5) 医薬品の保管に関する事項</u></p>
<p>(6) 医薬品である旨</p>	<p><u>(6) 医薬品である旨</u></p>
<p>(7) その他、外部の容器又は外部の被包に記載することが適當と考えられる事項</p>	<p><u>(7) その他、外部の容器又は外部の被包に記載することが適當と考えられる事項</u></p>
<p><u>第3 記載項目及び記載順序</u></p>	<p><u>第2 記載項目及び記載順序</u></p>

<p>1. してはいけないこと</p> <p>(1) 次の人は使用 <u>(内服剤の場合には、適宜、「使用」に代えて「服用」とする。以下、本記載要領において同じ。)</u> しないこと</p> <p>(2) (略)</p> <p>(3) (略)</p> <p>(4) (略)</p>	<p>1. してはいけないこと</p> <p>(1) 次の人は使用しないこと</p> <p>(2) (略)</p> <p>(3) (略)</p> <p>(4) (略)</p>
<p>2. 相談すること</p> <p>(1) 次の人は使用前に医師、歯科医師 <u>(歯科医師については、歯科医師が関係する場合にのみ記載する。以下、本記載要領において同じ。)</u>、薬剤師又は登録販売者 <u>(第一類医薬品には登録販売者は記載しないこと。以下、本記載要領において同じ。)</u> に相談すること</p>	<p>2. 相談すること</p> <p>(1) 次の人は使用前に<u>医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること</u> <u>(歯科医師については、歯科医師が関係する場合にのみ記載すること。以下同じ。)</u></p>
<p>(2) <u>使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</u></p> <p>(3) <u>使用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</u></p>	<p>(2) <u>次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること。</u></p>
<p>(4) <u>一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</u></p> <p>(5) <u>その他</u></p>	<p>(3) <u>その他</u></p>
<p>3. (略)</p>	<p>3. (略)</p>
<p>4. (略)</p>	<p>4. (略)</p>
<p><u>第4 各項目の記載要領</u></p> <p>1. してはいけないこと</p> <p>(1) 次の人は使用しないこと</p> <p>ア. <u>効能又は効果</u>の範囲内であっても、疾病の種類、症状、合併症、既往歴、体質、妊娠の可能</p>	<p><u>第3 各項目の記載要領</u></p> <p>1. してはいけないこと</p> <p>(1) 次の人は使用しないこと</p> <p>ア. <u>適応症（効能又は効果）</u>の範囲内であっても、疾病の種類、症状、合併症、既往歴、<u>家族歴</u>、</p>

<p>性の有無、授乳の有無、年齢、性別等からみて使用すべきでない人について、一般使用者が自らの判断で確認できる注意事項を記載する。</p> <p>イ. <u>効能又は効果の範囲以外で、誤って使用されやすい類似の疾病や症状がある場合は、その内容を記載する。</u></p> <p>(2) (略)</p> <p>(3) 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 同種同効の医薬品又は相互作用を起こしやすい医薬品との併用に関する注意事項を記載する。</p> <p>(4) その他</p> <p>ア. 乳汁への移行性等から乳児に対する危険性がある医薬品の場合、本剤の使用期間中は授乳しない又は授乳期間中は本剤を使用しない旨の注意を記載する。</p> <p>イ. 副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する注意事項がある場合には、その副作用の内容及びそのような作業に従事しない旨の注意を記載する。</p> <p>ウ. アルコール等の食品と相互作用を起こす可能性がある場合には、<u>本剤</u>の使用中には、その食品を摂取しない旨の注意を記載する。</p> <p>エ. その他、重大な副作用又は事故を防止する目的で当該項目に記載することが適当であると判断される事項があれば記載する。</p> <p>2. 相談すること</p> <p>(1) 次の人は使用前に<u>医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者</u>に相談すること 疾病の種類、症状、合併症、既往歴、体質、妊娠の可能性の有無、授乳の有無、年齢、性別等からみて、副作用による危険性が高い場合若しくは医師又は歯科医師の治療を受けている人であって、一般使用者の判断のみで使用するこ</p>	<p>体質、妊娠の可能性の有無、授乳の有無、年齢、性別等からみて使用すべきでない人について、一般使用者が自らの判断で確認できる注意事項を記載すること。</p> <p>イ. <u>適応症の範囲以外で、誤って使用されやすい類似の疾病や症状がある場合には、その内容を記載すること。</u></p> <p>(2) (略)</p> <p>(3) 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 同種同効の医薬品又は相互作用を起こしやすい医薬品との併用に関する注意事項を記載すること。</p> <p>(4) その他</p> <p>ア. <u>当該医薬品の乳汁への移行性等から乳児に対する危険性がある場合には、当該医薬品の使用期間中は授乳しない又は授乳期間中に当該医薬品を使用しない旨の注意を記載すること。</u></p> <p>イ. <u>副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する注意事項がある場合には、その副作用の内容及びそのような作業に従事しない旨の注意を記載すること。</u></p> <p>ウ. <u>アルコール等の食品と相互作用を起こす可能性がある場合には、当該医薬品の使用中には、その食品を摂取しない旨の注意を記載すること。</u></p> <p>エ. <u>その他、重大な副作用又は事故を防止する目的で当該項目に記載することが適当であると判断される事項があれば記載すること。</u></p> <p>2. 相談すること</p> <p>(1) 次の人は使用前に<u>医師、歯科医師又は薬剤師</u>に相談すること 疾病の種類、症状、合併症、既往歴、<u>家族歴</u>、体質、妊娠の可能性の有無、授乳の有無、年齢、性別等からみて、副作用による危険性が高い場合若しくは医師又は歯科医師の治療を受けている人であって、一般使用者の判断のみで使用するこ</p>
---	--

	<p>とが不適当な場合について記載する。</p>
<p>(2) <u>使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</u></p>	<p>することが不適当な場合について記載すること。</p>
<p>ア. 副作用のうち、<u>本剤の使用を続けると症状が重くなったり、症状が長く続くおそれのあるものについて記載すること</u>とし、一般使用者が判断できる初期症状を主に記載する。</p> <p>イ. 副作用の内容は一般的な副作用とまれに発生する重篤な副作用に分けて、表形式にする等わかりやすいよう工夫して記載する。</p> <p>ウ. 副作用の記載に当たっては、最初に、一般的な副作用について発現部位別に症状を記載し、次に、まれに発生する重篤な副作用について副作用名ごとに症状を記載する。</p> <p>なお、重篤な副作用の発現時には医療機関を受診する旨を記載する。</p>	<p>(2) 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること</p> <p>ア. 副作用のうち、<u>当該医薬品の使用を続けると症状が重くなったり、症状が長く続く恐れのあるものについて記載すること</u>とし、一般使用者が判断できる初期症状を主に記載すること。</p> <p>イ. 副作用の内容は一般的な副作用とまれに発生する重篤な副作用に分けて、表形式にする等わかりやすいよう工夫して記載すること。</p> <p>ウ. 副作用の記載に当たっては、最初に、一般的な副作用について発現部位別に症状を記載し、次に、まれに発生する重篤な副作用について副作用名毎に症状を記載すること。</p> <p>なお、重篤な副作用の発現時には医療機関を受診する旨を記載すること。</p>
<p>(3) <u>使用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</u></p> <p><u>本剤の薬理作用等から発現が予想され、容認される軽微な症状であるが、症状の持続又は増強がみられた場合は、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談する旨を記載する。</u></p>	<p>(3) その他</p> <p>上記(1)から(4)に分類されない相談すべき注</p>
<p>(4) <u>一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</u></p> <p><u>一定の期間又は一定の回数を使用しても症状の改善がみられない場合は、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談する旨を記載する。この場合、期間又は回数は、可能な限り具体的な数値で記載する。</u></p>	<p>エ. <u>一定の期間又は回数使用しても症状の改善がみられない場合に関する注意事項も本項目に記載すること。</u>期間又は回数は、可能な限り具体的な数値で記載すること。</p>

<p>意事項があれば記載すること。</p> <p>3. その他の注意</p> <p>1又は2に分類されない使用上の注意があれば記載すること。</p> <p>4. 保管及び取扱い上の注意</p> <p>次のような事項を記載する。</p> <p>(1) 温度、湿度、日光等に関する注意があれば記載すること。</p> <p>(2) 小児の手の届かない所に保管すべき旨の注意を記載すること。</p> <p>(3) 他の容器に入れかえることは、事故のもとになったり、品質保持の観点からも好ましくないので、その旨を記載する。また、携帯容器（薬剤を移し替えても品質上、問題ないことを担保した容器）が添付されている場合は、その容器以外の容器に入れかえない旨の注意を記載すること。</p> <p>(4) その他、当該項目に関して必要な事項があれば記載すること。</p> <p><u>第5 外部の容器又は外部の被包の記載項目、記載順序及び記載要領</u></p> <p>1. 「次の人は使用しないこと」 第4の1. (1)に準じて記載する。</p> <p>2. 「次の部位には使用しないこと」 第4の1. (2)に準じて記載する。</p> <p>3. 乳汁への移行性等から乳児に対する危険性がある医薬品に関する注意事項 第4の1. (4)アに準じて記載する。</p> <p>4. 副作用が発現すると重大な事故につながるおそれがある作業等に関する事項</p>	<p>意事項があれば記載すること。</p> <p>3. その他の注意</p> <p>(1) <u>当該医薬品の薬理作用等から予想される作用であって、容認される軽微なものがある場合には、その作用が起こり得る旨を記載すること。</u></p> <p>(2) <u>その他、1及び2に分類されない使用上の注意があれば記載すること。</u></p> <p>4. 保管及び取扱い上の注意</p> <p><u>保管及び取扱いに関する一般的注意事項として、主として次のような事項を記載すること。</u></p> <p>(1) 温度、湿度、日光等に関する注意があれば記載すること。</p> <p>(2) 小児の手の届かない所に保管すべき旨の注意を記載すること。</p> <p>(3) 他の容器に入れかえることは、事故のもとになったり、品質保持の観点からも好ましくないので、その旨を記載すること。また、携帯容器が添付されている場合は、その容器以外の容器に入れかえない旨の注意を記載すること。</p> <p>(4) その他、当該項目に関して必要な事項があれば記載すること。</p>
--	--

<p><u>第4の1. (4) イに準じて記載する。</u></p> <p><u>5. 専門家への相談の勧奨に関する事項</u></p> <p>「<u>次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</u>」</p> <p><u>第4の2. (1) に準じて記載する。</u></p> <p>ただし、<u>外部の容器等の記載スペースが狭小なために使用前に専門家に相談すべき場合を具体的に記載できない場合は、「使用が適さない場合があるので、使用前には必ず医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください」等と記載する。</u></p> <p><u>6. 添付文書の必読に関する事項</u></p> <p><u>7. 医薬品の保管に関する事項</u></p> <p><u>第4の4. に準じて記載する。</u></p> <p><u>8. 以下の項目等、その他外部の容器又は外部の被包に記載することが適當と考えられる事項</u></p> <p>(1) <u>リスク区分表示</u></p> <p>薬事法施行規則第209条の2及び第210条第5号の規定に基づき、一般用医薬品のリスク区分の表示を記載すること。</p> <p>(2) <u>医薬品副作用被害救済制度に関する表示</u></p> <p>平成20年8月5日付け薬食総発第0805001号厚生労働省医薬食品局総務課長通知「一般用医薬品外箱等への副作用被害救済制度の表示に関する自主申し合わせ及び質疑応答集（改訂）について」を参考とすること。なお、改正があった場合には最新の通知等に従うこと。</p> <p>(3) <u>消費者相談窓口</u></p> <p>一般使用者からの当該医薬品についての相談に応じができる連絡先等を記載すること。</p>	
--	--