

## 資料 1-1

### トラネキサム酸配合剤のリスク区分について

### 一般用医薬品(無機薬品及び有機薬品)のリスク区分

No.	薬効群	投与経路	配合成分	現在のリスク区分	検討する理由
1	その他の女性用薬	内服	トラネキサム酸 アスコルビン酸 L-システイン パントテン酸カルシウム 塩酸ピリドキシン	第1類医薬品	トラネキサム酸配合剤の再審査の終了

#### (参考)

- ・ 本剤は、「しみ(肝斑に限る。)」を新効能とする新一般用医薬品として再審査が終了したものである。
- ・ 本剤に含まれるトラネキサム酸、アスコルビン酸、L-システイン、パントテン酸カルシウム、塩酸ピリドキシンは第3類医薬品として区分されている。

#### (調査会における議論)

- ・ トラネキサム酸とビタミンCを主とした配合剤であり、副作用の報告状況からの安全性は高いとは考えられる。
- ・ かぜ薬等に配合されているトラネキサム酸と違い、少なくとも1カ月もしくは2カ月ぐらい継続して内服されるものなので、抗プラスミン作用があり、長期投与にしたときに塞栓症のリスクの程度が、未だよく分かっていないところがあり注意が必要である。
- ・ かぜ薬等に配合されているトラネキサム酸は現在第3類医薬品に区分されているが、肝斑に使用するトラネキサム酸及びその配合剤は第2類医薬品が適当である。

販売名	製造販売業者	効能・効果
トランシーノ	ダイト株式会社	しみ(肝斑に限る。)



## 様式 2

## 新一般用医薬品製造販売後調査報告書

販 売 名	トランシーノ	承 認 番 号 ・年 月 日	21900APZ00047000 2007年6月21日
		葉 効 分 類	87319
調 査 期 間	2007年6月21日～ 2011年6月20日	報 告 次 数	第1～4次
調 査 施 設 数	718 施設	調 査 症 例 数	3,186 例
出 荷 数 量			
調査結果の概要	アンケート形式で実施した特別調査では、第1～4次調査期間中にモニター薬局718軒から3,186例のアンケートが入手され、この中の副作用発現症例は76例(2.4%)で発現件数は110件であった。副作用の程度はすべて非重篤であった。5件以上あった副作用は、消化不良、下痢各11件(0.3%)、頭痛8件(0.3%)、発疹6件(0.2%)、恶心、そう痒症各5件(0.2%)であった。一般調査においては、第1～4次調査期間中に1,000例(1,584件)の副作用発現症例が情報収集され、スティーブンス・ジョンソン症候群、肺塞栓症、気胸各1例の計3例が重篤で、他はすべて非重篤であった。種類別で多かったのは、発疹167件、そう痒症149件、恶心136件、下痢132件、頭痛87件、紅斑61件、消化不良53件などであった。		
副作用の種類別 発 現 状 況	特別調査：別紙(1)のとおり 一般調査：別紙(3)のとおり 製造販売後臨床試験：別紙(5)のとおり		
副作用の発現症例 一覧 表	特別調査：別紙(2)のとおり 一般調査：別紙(4)のとおり 製造販売後臨床試験：別紙(6)のとおり		
調査結果に関する 見解と今後の 安 全 対 策	別紙(7)のとおり		
	・新一般用医薬品 区分(3)		
備 考	所属：安全管理室 担当者名：■ ■ 連絡先：03-5294-7150		

上記により製造販売後調査の調査結果を報告します。

2011年9月13日

富山県富山市八日町326番地  
ダイト株式会社  
代表取締役社長 笹山 貞治郎

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 近藤 達也 殿

## 目 次

I. 特別調査	1
1) 副作用の種類別発現状況	1
2) 副作用の要因別解析	3
3) 副作用症例一覧表	9
4) 有効性	19
5) 有効性の要因別解析	19
II. 一般調査	22
1) 副作用の種類別発現状況	22
2) 副作用症例一覧表	26
III. 製造販売後臨床試験	112
1) 副作用の種類別発現状況	112
2) 副作用症例一覧表	112
IV. 調査結果に関する見解と今後の安全対策	114

## 別紙（1）

### I. 特別調査

#### 1)副作用の種類別発現状況

製造販売後の使用実態下における安全性および有効性を検討するため、トランシーノを使用した15歳以上の女性を対象に、承認された平成19年6月21日からの4年間で安全性解析対象症例3,000例以上を収集することを目標として、アンケート形式での特別調査を実施した。第1次（平成19年6月21日～平成20年6月20日）、第2次調査期間（平成20年6月21日～平成21年6月20日）、第3次調査期間（平成21年6月21日～平成22年6月20日）及び第4次調査期間（平成22年6月21日～平成23年6月20日）における副作用発現症例率2.3%、2.0%、2.7%、2.8%と同程度であり、第1次から第4次調査期間での累計では、3,186例中副作用発現症例は76例（110件）で、副作用発現症例率は2.4%であった。副作用の種類および件数を表1に示したが、副作用の程度はすべて非重篤であり、また累計で5件以上あったのは、消化不良11件（0.3%）、下痢11件（0.3%）、頭痛8件（0.3%）、発疹6件（0.2%）、恶心5件（0.2%）、そう痒症5件（0.2%）で、それらの中で添付文書に記載されていない副作用は頭痛であった。

表1 副作用の種類別発現状況（特別調査）

時 期	承認時迄の調査	承認時以降の累計
①調査施設数	8	718
②調査症例数	189	3,186
③副作用発現症例数	2	76
④副作用発現件数	2	110
⑤副作用発現症例率 (③÷②×100)	1.1%	2.4%
⑥出荷数量（錠）		
副作用の種類	副作用発現例数及び件数（%）	
心臓障害	0例(0.0)	4例(0.1)
* 動悸	0(0.0)	4(0.1)
眼障害	0例(0.0)	1例(0.0)
* 眼瞼浮腫	0(0.0)	1(0.0)
胃腸障害	1例(0.5)	34例(1.1)
* 腹部膨満	0(0.0)	1(0.0)
腹痛	0(0.0)	4(0.1)
上腹部痛	0(0.0)	2(0.1)
* 便秘	0(0.0)	4(0.1)
下痢	0(0.0)	11(0.3)
消化不良	1(0.5)	11(0.3)
悪心	0(0.0)	5(0.2)
* 口内炎	0(0.0)	1(0.0)
嘔吐	0(0.0)	1(0.0)
* 口唇障害	0(0.0)	1(0.0)
* 口の感覺鈍麻	0(0.0)	2(0.1)
一般・全身障害および投与部位の状態	0例(0.0)	8例(0.3)
* 焦力症	0(0.0)	1(0.0)
* 胸部不快感	0(0.0)	1(0.0)
* 胸痛	0(0.0)	1(0.0)
* 浮腫	0(0.0)	4(0.1)
* 末梢性浮腫	0(0.0)	1(0.0)
* 口渴	0(0.0)	1(0.0)
臨床検査	1例(0.5)	0例(0.0)
* 白血球数増加	1(0.5)	0(0.0)
代謝および栄養障害	0例(0.0)	5例(0.2)
* 代謝障害	0(0.0)	1(0.0)
食欲減退	0(0.0)	4(0.1)
筋骨格系および結合組織障害	0例(0.0)	6例(0.2)
* 筋痙攣	0(0.0)	1(0.0)
* 四肢痛	0(0.0)	4(0.1)
* 筋骨格硬直	0(0.0)	1(0.0)
神経系障害	0例(0.0)	9例(0.3)
* 頭痛	0(0.0)	8(0.3)
* 感覚鈍麻	0(0.0)	1(0.0)
* 会話障害	0(0.0)	1(0.0)
腎および尿路障害	0例(0.0)	4例(0.1)
* 頻尿	0(0.0)	4(0.1)
生殖系および乳房障害	0例(0.0)	8例(0.3)
* 子宮内膜増殖症	0(0.0)	1(0.0)
* 過少月経	0(0.0)	4(0.1)
* 月経過多	0(0.0)	1(0.0)
* 月経遅延	0(0.0)	1(0.0)
* 乳房不快感	0(0.0)	1(0.0)
呼吸器、胸郭および縫隔障害	0例(0.0)	4例(0.1)
* 呼吸困難	0(0.0)	4(0.1)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

( ) 内は%

\*添付文書に記載されていない副作用

表1 副作用の種類別発現状況（特別調査）

時 期	承認時迄の調査	承認時以降の累計
副作用の種類	副作用発現例数及び件数 (%)	
皮膚および皮下組織障害	0 例(0.0)	11 例(0.3)
* 紅斑	0(0.0)	1(0.0)
* 毛髪変色	0(0.0)	1(0.0)
そう痒症	0(0.0)	5(0.2)
発疹	0(0.0)	6(0.2)
* 皮膚剥脱	0(0.0)	1(0.0)
血管障害	0 例(0.0)	2 例(0.1)
* 末梢冷感	0(0.0)	1(0.0)
* ほてり	0(0.0)	1(0.0)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

( ) 内は%

\*添付文書に記載されていない副作用

## 2)副作用の要因別解析

第1次から第4次調査期間での累計3,186例の背景要因別（年齢別、服用期間別、併用薬の有無別）分布は下記のようになつた。

		例数	%
年齢	15～25歳	114	3.6%
	26～35歳	627	19.7%
	36～45歳	1344	42.2%
	46～55歳	866	27.2%
	56歳以上	214	6.7%
	不明	21	0.7%
服用期間	～15日	141	4.4%
	16～30日	1541	48.4%
	31～60日	1224	38.4%
	61日以上	190	6.0%
	不明	90	2.8%
併用薬	有	360	11.3%
	無	2788	87.5%
	不明	38	1.2%

安全性に関してさらに検討するため、これら要因別に解析を行つた。各要因別での副作用発現症例率について下記に示したが、特に安全性に影響を与えるような要因は見出されなかつた。

なお、一般使用者が自身の判断により記載された内容であるため、合併症による要因解析は難しいと判断した。また、用法・用量は1回2錠1日3回服用を原則としており、目的が「しみ（肝斑）」が3,123例（98.0%）であることから、用法用量や目的による要因解析は行わなかつた。

### ①年齢別（表2）

副作用発現症例率は、15～25歳が0.0%（0/114例）、26～35歳が1.4%（9/627例）、36～45歳が3.3%（44/1,344例）、46～55歳が2.3%（20/866例）、56歳以上が0.5%（1/214例）、不明が9.5%（2/21例）であり、不明以外では36～45歳が最も高かった。36～45歳で他の年齢層に比べて皮膚および皮下組織障害の副作用が多かったが、いずれも非重篤なものであり特に問題はないと考えられた。

### ②服用期間別（表3）

副作用発現症例率は、15日以下が8.5%（12/141例）、16～30日が2.1%（33/1,541例）、31～60日が2.1%（26/1,224例）、61日以上が1.1%（2/190例）、不明が3.3%（3/90例）で、15日以下が最も高かった。15日以下で他の服用期間層に比べて胃腸障害の副作用が多かったが、いずれも非重篤なものであり特に問題はないと考えられた。

### ③併用薬の有無別（表4）

副作用発現症例率は、併用薬有例が4.7%（17/360例）、併用薬無例が2.1%（58/2,788例）、不明が2.6%（1/38例）で、有例が無例より高かった。有例で無例に比べて胃腸障害と皮膚および皮下組織障害の副作用が多かったが、いずれも非重篤なものであり特に問題はないと考えられた。

表2 年齢別副作用発現状況(特別調査)

年齢区分	15~25歳	26~35歳	36~45歳	46~55歳	56歳以上	不明	計
調査症例数	114	627	1,344	866	214	21	3,186
副作用発現症例数(%)	0(0.0)	9(1.4)	44(3.3)	20(2.3)	1(0.5)	2(9.5)	76(2.4)
副作用発現件数	0	11	59	37	1	2	110
副作用の種類	副作用発現例数及び件数(%)						
心臓障害	0例(0.0)	1例(0.2)	2例(0.1)	1例(0.1)	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.1)
*動悸	0(0.0)	1(0.2)	2(0.1)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
眼障害	0例(0.0)	0例(0.0)	1例(0.1)	0例(0.0)	0例(0.0)	0例(0.0)	1例(0.0)
*眼瞼浮腫	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
胃腸障害	0例(0.0)	7例(1.1)	18例(1.3)	7例(0.8)	1例(0.5)	1例(4.8)	34例(1.1)
*腹部膨満	0(0.0)	1(0.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
腹痛	0(0.0)	1(0.2)	2(0.1)	0(0.0)	1(0.5)	0(0.0)	4(0.1)
上腹部痛	0(0.0)	0(0.0)	2(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(0.1)
*便秘	0(0.0)	0(0.0)	2(0.1)	2(0.2)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
下痢	0(0.0)	0(0.0)	8(0.6)	3(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	11(0.3)
消化不良	0(0.0)	3(0.5)	6(0.4)	1(0.1)	0(0.0)	1(4.8)	11(0.3)
恶心	0(0.0)	1(0.2)	2(0.1)	2(0.2)	0(0.0)	0(0.0)	5(0.2)
*口内炎	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
嘔吐	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
*口唇障害	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
*口の感覺鈍麻	0(0.0)	1(0.2)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	2(0.1)
一般・全身障害および投与部位の状態	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.3)	4例(0.5)	0例(0.0)	0例(0.0)	8例(0.3)
*無力症	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
*胸部不快感	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
*胸痛	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
*浮腫	0(0.0)	0(0.0)	3(0.2)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
*末梢性浮腫	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
*口渴	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
代謝および栄養障害	0例(0.0)	1例(0.2)	1例(0.1)	3例(0.3)	0例(0.0)	0例(0.0)	5例(0.2)
*代謝障害	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
食欲減退	0(0.0)	1(0.2)	1(0.1)	2(0.2)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
筋骨格系および結合組織障害	0例(0.0)	0例(0.0)	1例(0.1)	5例(0.6)	0例(0.0)	0例(0.0)	6例(0.2)
*筋痙攣	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
*四肢痛	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.5)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
*筋骨格硬直	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
神経系障害	0例(0.0)	1例(0.2)	3例(0.2)	5例(0.6)	0例(0.0)	0例(0.0)	9例(0.3)
*頭痛	0(0.0)	1(0.2)	3(0.2)	4(0.5)	0(0.0)	0(0.0)	8(0.3)
*感觉鈍麻	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
*会話障害	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
腎および尿路障害	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.3)	0例(0.0)	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.1)
*頻尿	0(0.0)	0(0.0)	4(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
生殖系および乳房障害	0例(0.0)	0例(0.0)	5例(0.4)	2例(0.2)	0例(0.0)	1例(4.8)	8例(0.3)
*子宮内膜増殖症	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
*過少月経	0(0.0)	0(0.0)	3(0.2)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
*月経過多	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
*月経遅延	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
*乳房不快感	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.8)	1(0.0)
呼吸器、胸郭および縫隔障害	0例(0.0)	0例(0.0)	2例(0.1)	2例(0.2)	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.1)
*呼吸困難	0(0.0)	0(0.0)	2(0.1)	2(0.2)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)

調査期間：第1~4次 2007年6月21日~2011年6月20日

( ) 内は%

\*添付文書に記載されていない副作用

表2 年齢別副作用発現状況（特別調査）

年齢区分	15~25歳	26~35歳	36~45歳	46~55歳	56歳以上	不明	計
副作用の種類	副作用発現例数及び件数 (%)						
皮膚および皮下組織障害	0例(0.0)	1例(0.2)	7例(0.5)	3例(0.3)	0例(0.0)	0例(0.0)	11例(0.3)
* 紅斑	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 毛髪変色	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
そう痒症	0(0.0)	0(0.0)	2(0.1)	3(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	5(0.2)
発疹	0(0.0)	1(0.2)	4(0.3)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	6(0.2)
* 皮膚剥脱	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
血管障害	0例(0.0)	0例(0.0)	2例(0.1)	0例(0.0)	0例(0.0)	0例(0.0)	2例(0.1)
* 末梢冷感	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* ほてり	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)

調査期間：第1~4次 2007年6月21日~2011年6月20日

( ) 内は%

\*添付文書に記載されていない副作用

表3 服用期間別副作用発現状況（特別調査）

服用期間区分	～15日	16～30日	31～60日	61日以上	不明	計
調査症例数	141	1,541	1,224	190	90	3,186
副作用発現症例数 (%)	12(8.5)	33(2.1)	26(2.1)	2(1.1)	3(3.3)	76(2.4)
副作用発現件数	19	50	34	2	5	110
副作用の種類	副作用発現例数及び件数 (%)					
心臓障害	1例(0.7)	2例(0.1)	1例(0.1)	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.1)
* 動悸	1(0.7)	2(0.1)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
眼障害	0例(0.0)	1例(0.1)	0例(0.0)	0例(0.0)	0例(0.0)	1例(0.0)
* 眼瞼浮腫	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
胃腸障害	7例(5.0)	14例(0.9)	11例(0.9)	1例(0.5)	1例(1.1)	34例(1.1)
* 腹部膨満	1(0.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
腹痛	0(0.0)	3(0.2)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
上腹部痛	1(0.7)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	2(0.1)
* 便秘	0(0.0)	1(0.1)	2(0.2)	0(0.0)	1(1.1)	4(0.1)
下痢	2(1.4)	6(0.4)	1(0.1)	1(0.5)	1(1.1)	11(0.3)
消化不良	3(2.1)	4(0.3)	4(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	11(0.3)
恶心	2(1.4)	3(0.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(0.2)
* 口内炎	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(1.1)	1(0.0)
嘔吐	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 口唇障害	1(0.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 口の感覺鈍麻	0(0.0)	0(0.0)	2(0.2)	0(0.0)	0(0.0)	2(0.1)
一般・全身障害および投与部位の状態	2例(1.4)	4例(0.3)	1例(0.1)	0例(0.0)	1例(1.1)	8例(0.3)
* 無力症	1(0.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 胸部不快感	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 胸痛	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 浮腫	0(0.0)	2(0.1)	1(0.1)	0(0.0)	1(1.1)	4(0.1)
* 末梢性浮腫	1(0.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 口渴	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
代謝および栄養障害	1例(0.7)	1例(0.1)	3例(0.2)	0例(0.0)	0例(0.0)	5例(0.2)
* 代謝障害	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
食欲減退	1(0.7)	1(0.1)	2(0.2)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)

調査期間：第1~4次 2007年6月21日~2011年6月20日

( ) 内は%

\*添付文書に記載されていない副作用

表3 服用期間別副作用発現状況（特別調査）

服用期間区分	～15日	16～30日	31～60日	61日以上	不明	計
副作用の種類	副作用発現例数及び件数(%)					
筋骨格系および結合組織障害	1例(0.7)	3例(0.2)	2例(0.2)	0例(0.0)	0例(0.0)	6例(0.2)
* 筋痙攣	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 四肢痛	1(0.7)	2(0.1)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
* 筋骨格硬直	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
神経系障害	2例(1.4)	3例(0.2)	4例(0.3)	0例(0.0)	0例(0.0)	9例(0.3)
* 頭痛	2(1.4)	3(0.2)	3(0.2)	0(0.0)	0(0.0)	8(0.3)
* 感覚鈍麻	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 会話障害	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
腎および尿路障害	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.3)	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.1)
* 頻尿	0(0.0)	0(0.0)	4(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
生殖系および乳房障害	0例(0.0)	3例(0.2)	4例(0.3)	1例(0.5)	0例(0.0)	8例(0.3)
* 子宮内膜増殖症	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 過少月経	0(0.0)	1(0.1)	2(0.2)	1(0.5)	0(0.0)	4(0.1)
* 月経過多	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 月経遅延	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 乳房不快感	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
呼吸器、胸郭および縫隔障害	1例(0.7)	2例(0.1)	1例(0.1)	0例(0.0)	0例(0.0)	4例(0.1)
* 呼吸困難	1(0.7)	2(0.1)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	4(0.1)
皮膚および皮下組織障害	0例(0.0)	8例(0.5)	2例(0.2)	0例(0.0)	1例(1.1)	11例(0.3)
* 紅斑	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 毛髪変色	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
そう痒症	0(0.0)	4(0.3)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	5(0.2)
発疹	0(0.0)	5(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(1.1)	6(0.2)
* 皮膚剥脱	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
血管障害	1例(0.7)	0例(0.0)	1例(0.1)	0例(0.0)	0例(0.0)	2例(0.1)
* 末梢冷感	0(0.0)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* ほてり	1(0.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

( ) 内は%

\*添付文書に記載されていない副作用

表4 併用薬有無別副作用発現状況（特別調査）

併用薬	有	無	不明	計
調査症例数	360	2,788	38	3,186
副作用発現症例数 (%)	17(4.7)	58(2.1)	1(2.6)	76(2.4)
副作用発現件数	19	85	6	110
副作用の種類	副作用発現例数及び件数 (%)			
心臓障害	0 例(0.0)	4 例(0.1)	0 例(0.0)	4 例(0.1)
* 動悸	0(0.0)	4(0.1)	0(0.0)	4(0.1)
眼障害	1 例(0.3)	0 例(0.0)	0 例(0.0)	1 例(0.0)
* 眼瞼浮腫	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
胃腸障害	8 例(2.2)	26 例(0.9)	0 例(0.0)	34 例(1.1)
* 腹部膨満	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
腹痛	2(0.6)	2(0.1)	0(0.0)	4(0.1)
上腹部痛	0(0.0)	2(0.1)	0(0.0)	2(0.1)
* 便秘	0(0.0)	4(0.1)	0(0.0)	4(0.1)
下痢	3(0.8)	8(0.3)	0(0.0)	11(0.3)
消化不良	2(0.6)	9(0.3)	0(0.0)	11(0.3)
恶心	0(0.0)	5(0.2)	0(0.0)	5(0.2)
* 口内炎	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
嘔吐	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 口唇障害	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 口の感覺鈍麻	0(0.0)	2(0.1)	0(0.0)	2(0.1)
一般・全身障害および投与部位の状態	0 例(0.0)	7 例(0.3)	1 例(2.6)	8 例(0.3)
* 無力症	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 胸部不快感	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 胸痛	0(0.0)	0(0.0)	1(2.6)	1(0.0)
* 浮腫	0(0.0)	3(0.1)	1(2.6)	4(0.1)
* 末梢性浮腫	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 口渴	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
代謝および栄養障害	0 例(0.0)	5 例(0.2)	0 例(0.0)	5 例(0.2)
* 代謝障害	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
食欲減退	0(0.0)	4(0.1)	0(0.0)	4(0.1)
筋骨格系および結合組織障害	1 例(0.3)	4 例(0.1)	1 例(2.6)	6 例(0.2)
* 筋痙攣	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 四肢痛	1(0.3)	2(0.1)	1(2.6)	4(0.1)
* 筋骨格硬直	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
神経系障害	1 例(0.3)	7 例(0.3)	1 例(2.6)	9 例(0.3)
* 頭痛	1(0.3)	6(0.2)	1(2.6)	8(0.3)
* 感覚鈍麻	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 会話障害	0(0.0)	0(0.0)	1(2.6)	1(0.0)
腎および尿路障害	0 例(0.0)	4 例(0.1)	0 例(0.0)	4 例(0.1)
* 頻尿	0(0.0)	4(0.1)	0(0.0)	4(0.1)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

( ) 内は%

\*添付文書に記載されていない副作用

表4 併用薬有無別副作用発現状況（特別調査）

併用薬	有	無	不明	計
副作用の種類	副作用発現例数及び件数 (%)			
生殖系および乳房障害	2例(0.6)	6例(0.2)	0例(0.0)	8例(0.3)
* 子宮内膜増殖症	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 過少月経	0(0.0)	4(0.1)	0(0.0)	4(0.1)
* 月経過多	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 月経遅延	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 乳房不快感	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	0例(0.0)	3例(0.1)	1例(2.6)	4例(0.1)
* 呼吸困難	0(0.0)	3(0.1)	1(2.6)	4(0.1)
皮膚および皮下組織障害	5例(1.4)	6例(0.2)	0例(0.0)	11例(0.3)
* 紅斑	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* 毛髪変色	1(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
そう痒症	2(0.6)	3(0.1)	0(0.0)	5(0.2)
発疹	2(0.6)	4(0.1)	0(0.0)	6(0.2)
* 皮膚剥脱	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
血管障害	0例(0.0)	2例(0.1)	0例(0.0)	2例(0.1)
* 末梢冷感	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
* ほてり	0(0.0)	1(0.0)	0(0.0)	1(0.0)

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

( ) 内は%

\*添付文書に記載されていない副作用

## 3)副作用症例一覧表

第1～4次特別調査での副作用発現症例76例における副作用の種類、番号、性、年齢、使用薬剤名（企業名）、使用方法、使用理由、副作用症状・程度・転帰、医師または薬剤師の見解、因果関係等を記載した副作用症例一覧表を別紙（2）に示した。

別紙(2) 副作用発現症例一覧表(特別調査)

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
下痢	DS07-1059 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	31日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	トラネキサム酸が体に合わなかったため下痢をしたと思われます	可能性大	第1次
発疹 そう痒症	DS07-1114 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	28日間	しみ(肝斑)	発疹・かゆみ	非重篤	回復	・可能性大と思われるのは他の薬はその前から服用していた為。・他の薬との併用であり他の薬の可能性もあります。・アレルギー反応については不明です。・偶発的に起きた可能性もあります。	可能性大	第1次
		オメプラゾール、ポリカルボフィルカルシウム、ロスマバスタチンカルシウム、ナategリニド	2回	不明							
頭痛 会話障害 四肢痛 浮腫 胸痛 呼吸困難	DS07-1213 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑改善のため	激しい頭痛、舌のもつれ、片方の足の急激な痛み、むくみ、持続的な胸の痛み、突然の呼吸困難、息切れ	非重篤	不明			第1次
恶心 嘔吐 消化不良	DS07-1301 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	恶心・嘔吐 胸やけ	非重篤 非重篤	不明 不明			第1次
恶心 上腹部痛 消化不良	DS07-1336 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	恶心 胃痛・胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復	以前コラーゲン錠剤を飲んでムカムカと気持ちが悪くなったことがある。	不明	第1次
発疹	DS08-0055 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	回復	すぐに発疹は消失しているので因果関係の可能性は低いと思われます	不明	第1次
頭痛 四肢痛	DS08-0056 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	頭痛 足の痛み	非重篤 非重篤	回復 回復	3/11当時本人体調が悪くこの様な症状が出たと思われる	不明	第1次
呼吸困難	DS08-0068 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	息切れ	非重篤	回復	体調が少し悪かったようなので、息切れが出たのかかもしれません	不明	第1次
腹痛	DS08-0069 (女) (28)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	28日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	回復	生理前だった為、トランシーノによるものかは不明	不明	第1次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
悪心	DS08-0102 (女) (33)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	悪心	非重篤	回復	服用期間30日後、そういう状態は確認時までていなかった為副作用の可能性も考えられる。	可能性小	第2次
頭痛 動悸	DS08-0103 (女) (33)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	頭痛 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復	服用を中止後、頭痛・動悸の症状が改善された為、副作用の可能性が考えられる。	可能性大	第2次
動悸 呼吸困難	DS08-0112 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	動悸 息切れ	非重篤 非重篤	回復 回復	翌日の服用にて3回とも同様の症状がでた為、副作用の可能性が考えられる。	可能性大	第2次
消化不良	DS08-0209 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	40日間	しみ(肝斑)	むねやけ	非重篤	不明	わかりません。	不明	第1次
便秘 筋弛緩 感覚鈍麻 代謝障害	DS08-0218 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑と診断されたので	便秘 ふくらはぎのつり、左手のしびれ、代謝の低下	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第2次
消化不良	DS08-0262 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~1回	10日間	しみ(肝斑)	胸やけ	非重篤	回復	トランシーノとの因果関係はほとんど無いと思われる。ストレスその他の方が大きい様にお見受けしました。	不明	第1次
	コレステロール低下剤	不明	不明								
毛髪変色	DS08-0277 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	白髪が増えた	非重篤	不明	不明。ただ、白髪化がメラニンの欠如によって発生することを考えると絶対にありえないとは言いかげないとも考えられる。しかし、本剤の服用だけで今回の事象が発生したと考えるには、判断材料が少なすぎると考えられる。	不明	第1次
動悸 胸部不快感	DS08-0337 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	軽い動悸 胸が重ぐる感じ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	1月中に2回程度であるので、本剤との因果関係はわからない。	不明	第1次
発疹 そう痒症	DS08-0339 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	24日間	しみ(肝斑)	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	服用を中止して2、3日後症状が治まつたのでトランシーノの影響が少なからずある様に思います	可能性大	第1次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
乳房不快感	DS08-0417 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	胸のはり	非重篤	回復		不明	第1次
頻尿	DS08-0418 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	トイレが近くなった	非重篤	回復	因果関係も不明で、効果が大変わったので、ご本人は、大変、満足されております。	不明	第2次
下痢	DS08-0447 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	不明	その日の体調、食事なども考えられる。トランシーノとの因果関係については不明。	不明	第2次
下痢	DS08-0492 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢	非重篤	不明			第2次
浮腫	DS08-0524 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	不明	むくみが生じたとのことでしたが、続けて服用していくといとのご本人の申し出あり。その後、むくみ等、副作用の報告がない為不明ではあるが、副作用としては軽度もしくは、本品との因果関係は少ないものと思われる。	不明	第2次
眼瞼浮腫	DS08-0560 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	回復	飲み始めた時、目・まぶたがむくんでいた(2~3回続いた)と記載があるが、「トランシーノ」にむくみを生じる成分は含まれていないので、関連は薄いのではと思われる。	可能性小	第2次
末梢性浮腫	DS08-0631 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	回復	服用中止後むくみがとれたので副作用の可能性あり。	可能性大	第2次
下痢	DS08-0681 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	下痢を発症した時期直前にトランシーノ服用していたが、因果関係は不明と思われる。	不明	第2次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
消化不良	DS08-0697 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	胸焼け	非重篤	回復	御本人さんも軽度の症状であるため、あまり気にしていなかったとのこと。服用終了後に良くなつたので、原因としては考えられるか、限定はできないと思う。御本人さんも了解の上、2本目購入でしたので、あまり副作用も気にならないのではないかと思います。	不明	第2次
		ビタミンC剤	不明	不明							
皮膚剥脱	DS08-0765 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	37日間	しみ(肝斑)	頬の皮が薄く剥れる	非重篤	回復	最初、可能性があると思ったが、よく話しを聞くと不明だと判断した為。	不明	第2次
消化不良	DS08-0769 (女) (30)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	22日間	しみ(肝斑)	胸焼け	非重篤	不明			第2次
下痢	DS08-0827 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	軟便	非重篤	回復			第2次
紅斑	DS08-0946 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	肝斑	赤み	非重篤	不明	赤みはあるが、気になるようなものではなかつた。	不明	第2次
		その他の滋養強壮薬	不明	不明							
浮腫	DS08-1177 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	不明	体調によるものが大きいのではないかと思います。	可能性小	第2次
腹部膨満	DS08-1456 (女) (32)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	お腹の張り	非重篤	回復	通常の生理期においても、腹部の張り感は起ることから、極めて因果関係は少ないと思われるが、血液の凝固に影響を与えるであろうトラネキサム酸製剤の為、完全には否定出来ない。	可能性小	第2次
		乳酸菌整腸剤	3回	5日間							

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
ほてり 無力症	DS08-1514 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝斑)	顔のほてり 手の脱力感	非重篤 非重篤	回復 回復	添付文書に記載されている様な症状ではないが、お客様の体质や服用状況を考慮しても、トランシーノによる副作用だと考えられる。	確実	第2次
口唇障害	DS08-1536 (女) (37)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝斑)	唇が紫色になった	非重篤	回復	当作用はこの薬によるものと思われます。止めた時点です直った様です。	可能性大	第2次
消化不良	DS08-1537 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	30日間	しみ(肝斑)	胸焼け	非重篤	回復	服用後すぐなので可能性大と思われる。	可能性大	第2次
頭痛	DS09-0076 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	頭痛などの症状はカゼやストレスなどでも起こるので、トランシーノとの因果関係は不明です。	不明	第2次
恶心 食欲減退	DS09-0106 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃が重い	非重篤	不明			第2次
腹痛 下痢	DS09-0107 (女) (37)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	腹痛 下痢	非重篤 非重篤	不明 不明			第2次
頭痛	DS09-0357 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	軽度の頭痛	非重篤	回復			第3次
食欲減退 消化不良	DS09-0388 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	食欲不振 胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	不明	第3次
恶心 食欲減退 消化不良	DS09-0389 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	恶心 食欲不振、胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	不明	第3次
消化不良	DS09-0390 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	60日間	しみ(肝斑)	胸やけ	非重篤	回復	特になし	不明	第3次
便秘	DS09-0391 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	54日間	しみ(肝斑)	便秘	非重篤	回復	特になし	不明	第3次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
頻尿	DS09-0392 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	トイレの回数が増えた	非重篤	回復	特記事項なし	不明	第3次
頻尿	DS09-0393 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	トイレが近くなった	非重篤	回復	特記事項なし	不明	第3次
浮腫	DS09-0394 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	不明	特記事項なし	不明	第3次
頭痛	DS09-0395 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	服用初期に軽い頭痛	非重篤	回復	なし	不明	第3次
過少月経	DS09-0396 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	生理の出血量が少なく終わるのも早かった	非重篤	回復	なし	不明	第3次
過少月経	DS09-0397 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	生理中の血液の量が少なくなった	非重篤	回復	なし。	不明	第3次
子宮内膜増殖症	DS09-0398 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	40日間	しみ(肝斑)	使用後、1ヶ月くらいから不正出血があり、使用を止めてからひどくなつた	非重篤	回復	不明(医師にはこの件を相談しなかつた。)	不明	第3次
食欲減退 消化不良	DS09-0448 (女) (27)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	60日間	しみ(肝斑)	食欲不振 胸焼け	非重篤 非重篤	回復 回復		不明	第3次
四肢痛 口渴	DS09-0473 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	片足の痛み だるさ、口渴	非重篤 非重篤	回復 回復	発売当初に服用された事があり、今回と同様の 症状があつたそうですので本品との因果関係 については可能性大と思われます。	可能性大	第3次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
腹痛	DS09-0494 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	回復	販売時、薬剤師より(当時接客)経口避妊剤服用中のため、おすすめできないと話しがあったそうですが、試してみたかったので服用したそうです。服用して開始まもないころは何も異常がなかったそうですが、6月中旬から夕方だけ痛んだそうです。現在はとくに気になることもなく、しみも改善し、体調も良いとのこと。しみもよくなつたので、トランシーノはもうやめるとのこと。経口避妊剤の服用は今現在していないそうです。トランシーノには満足しているそうです。	不明	第3次
		経口避妊剤	不明回	不明							
そう痒症	DS09-0512 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	30日間	しみ(肝斑)	かゆみ	非重篤	回復	症状(かゆみ)は軽度で、2、3日で消失したため因果関係は小さいと判断した。	可能性小	第3次
		漢方製剤	2回	不明							
腹痛	DS09-0513 (女) (57)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	25日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	回復	抗アレルギーと、降圧剤と一緒に服用していたため、飲み合わせとしては問題ないが、何らかの関係があったのかもしれない。	不明	第3次
		抗ヒスタミン剤、血圧降下剤	不明	不明							
過少月経	DS09-0516 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	120日間	しみ(肝斑)	生理の量が少なくなった	非重篤	回復	本品トランシーノにより副作用かどうかは、分からないと考える。	不明	第3次
月経過多	DS09-0517 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	生理が月2回あつたり期間が長かった。普段は月1回一週間。	非重篤	回復	不明です。(なんらかの因果関係があったのかかもしれないが、詳細は不明です。ホルモンバランスの崩れやすい年代であり、季節の変わり目などの影響があったのかもしれない)	不明	第3次
発疹	DS09-0531 (女) (33)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	30日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	回復	4/30体調がよくなかったのでは?	不明	第3次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹	DS09-0546 (女) (37)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	顔に吹出物	非重篤	未回復	健康新食品のコラーゲンも同時期に飲んでいたのでそちらによる可能性もあるため、因果関係は不明と考える。	不明	第3次
動悸	DS09-0575 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	40日間	しみ(肝斑)	動悸	非重篤	回復	因果関係はないと思われる。	不明	第3次
そう痒症	DS09-0576 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	かゆみ	非重篤	回復	可能性は否定できないが、本品とは特定できない。	不明	第3次
頭痛 呼吸困難 末梢冷感	DS09-0580 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	頭痛 呼吸困難、血液の流れが悪くなる感じ。冷え性に似た症状	非重篤 非重篤	不明 不明			第3次
筋骨格硬直 発疹 そう痒症	DS09-0640 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	首すじ、後のこわばり(重い)	非重篤	回復	服用1ヶ月後の症状の発現であり、体調や薬以外などの原因も考えられるが服用中止後に回復していることから因果関係については、可能性小と考える。	可能性小	第3次
月経遅延	DS09-0719 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	しみ(肝斑)	生理が10日ほど遅れた	非重篤	回復		不明	第3次
頻尿	DS09-0900 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	32日間	しみ(肝斑)	トイレが近くなった感覚(頻尿)	非重篤	不明	トイレが近くなったことに本人自身が日常の不安や治療の必要もなく、服用は継続している為、及び他の要因として更湯の飲料の摂取によるものかもしれないとの話もあり、因果関係は不明である。	不明	第3次
口内炎 便秘 下痢	DS09-1212 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	40日間	しみ(肝斑)	口内炎 便秘、下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	薬に対してはきちんと理解しておられ、副作用に対して特に、悪い感情を持った様には感じませんでした。	不明	第3次
下痢	DS09-1279 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	50日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	本品と副作用の因果関係はうすい。	不明	第3次
下痢	DS09-1351 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	90日間	しみ(肝斑)	軟便	非重篤	回復	トランシーノによるものかどうかは不明	不明	第3次

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
口の感觉鈍麻 四肢痛	DS09-1409 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	46日間	しみ(肝斑)	舌先のピリピリとした違和感 片足の急激な痛み	非重篤 非重篤	回復 回復	(5)、(7)より関係性は薄いと思われます。	不明	第3次
上腹部痛	DS10-0048 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	60日間	しみ(肝斑)	胃痛	非重篤	回復		可能性大	第3次
過少月経	DS10-0222 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理量の減少	非重篤	不明			第3次
頭痛	DS10-0432 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)の改善	頭痛	非重篤	不明			第4次
便秘 下痢	DS10-0433 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	しみ(肝斑)の改善	便秘 下痢	非重篤 非重篤	不明 不明			第4次
下痢	DS10-0434 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)の改善	下痢	非重篤	不明			第4次
口の感觉鈍麻	DS10-0589 (女) (27)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	舌のしづれ	非重篤	不明	ただし、これ以外の要因も思い当たらない	不明	第4次

#### 4)有効性

特別調査において、効果に関する評価を、「効いた」、「やや効いた」、「効かなかった」の3区分で行った。第1次から第4次調査期間中に収集されたしみ(肝斑)を使用目的とする有効回答3,039例における有効性評価を表5に示したが、「効いた」が25.0% (759/3,039例)、「やや効いた」が61.2% ((1,859/3,039例)、「効かなかった」が13.6% (412/3,039例)、「不明」が0.3% (9/3,039例)で、「効いた」と「やや効いた」を合わせると86.1% (2,618/3,039例)となり、高い有効率が示された。

なお、収集された全症例3,186例(使用目的がしみ(肝斑)以外及び、有効性に関する記載が未記載の症例を含む)についての有効性も参考に表5に示す。結果、「効いた」が24.0%「やや効いた」が59.5%とほぼ同様の値となった。

表5 有効性評価

時 期	承認時以降の累計	しみ(肝斑)を使用目的とする有効回答
調査症例数	3,186例	3,039例
(1)効いた	765例(24.0)	759例(25.0)
(2)やや効いた	1,896例(59.5)	1,859例(61.2)
(3)効かなかった	431例(13.5)	412例(13.6)
(4)不明	9例(0.3)	9例(0.3)
(5)未記載	85例(2.7)	-

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日 ( ) 内は%

#### 5)有効性の要因別解析

さらに有効性に関して検討するため、上記3,039例の要因別(年齢別、服用期間別、併用薬の有無別)で「効いた」と「やや効いた」を合わせた有効率の解析を行った。

なお、一般使用者が自身の判断により記載された内容であるため、合併症による要因別解析は難しいと判断した。また、用法・用量は1回2錠1日3回服用を原則としており、用法用量による要因別解析は行わなかった。

##### ①年齢別(表6)

有効率は、15～25歳が80.2% (85/106例)、26～35歳が86.0% (504/586例)、36～45歳が87.5% (1,137/1,299例)、46～55歳が85.3% (709/831例)、56歳以上が83.3% (165/198例)、年齢不明が94.7% (18/19例)であり、不明以外では36～45歳が最も高く、15～25歳と56歳以上の年齢層は他の年齢層に比べて低めであった。

## ②服用期間別（表7）

有効率は、15日以下が67.2%（84/125例）、16～30日が85.2%（1,258/1,476例）、31～60日が88.7%（1,045/1,178例）、61日以上が90.1%（164/182例）、期間不明が85.9%（67/78例）で、期間不明以外では16日以上服用した3層での有効性に大きな差はなく、15日以下の服用期間層は他の層に比べて低めであった。

## ③併用薬の有無別（表8）

有効率は、併用薬有例が80.6%（274/340例）、併用薬無例が87.0%（2,317/2,664例）、不明が77.1%（27/35例）で、無例が有例より高かった。

表6 年齢別有効率（特別調査）

判定	15~25歳	26~35歳	36~45歳	46~55歳	56歳以上	不明	計
調査症例数	106(100.0)	586(100.0)	1,299(100.0)	831(100.0)	198(100.0)	19(100.0)	3,039(100.0)
(1)効いた	20(18.9)	147(25.1)	339(26.1)	200(24.1)	48(24.2)	5(26.3)	759(25.0)
(2)やや効いた	65(61.3)	357(60.9)	798(61.4)	509(61.3)	117(59.1)	13(68.4)	1,859(61.2)
(3)効かなかった	21(19.8)	81(13.8)	159(12.2)	118(14.2)	32(16.2)	1(5.3)	412(13.6)
(4)不明	0(0.0)	1(0.2)	3(0.2)	4(0.5)	1(0.5)	0(0.0)	9(0.3)

調査期間：第1~4次 2007年6月21日～2011年6月20日

( ) 内は%

表7 服用期間別有効率（特別調査）

判定	～15日	16～30日	31～60日	61日以上	不明	計
調査症例数	125(100.0)	1,476(100.0)	1,178(100.0)	182(100.0)	78(100.0)	3,039(100.0)
(1)効いた	13(10.4)	294(19.9)	352(29.9)	79(43.4)	21(26.9)	759(25.0)
(2)やや効いた	71(56.8)	964(65.3)	693(58.8)	85(46.7)	46(59.0)	1,859(61.2)
(3)効かなかった	40(32.0)	213(14.4)	131(11.1)	18(9.9)	10(12.8)	412(13.6)
(4)不明	1(0.8)	5(0.3)	2(0.2)	0(0.0)	1(1.3)	9(0.3)

調査期間：第1~4次 2007年6月21日～2011年6月20日

( ) 内は%

表8 併用薬有無別有効率（特別調査）

判定	有	無	不明	計
調査症例数	340(100.0)	2,664(100.0)	35(100.0)	3,039(100.0)
(1)効いた	70(20.6)	680(25.5)	9(25.7)	759(25.0)
(2)やや効いた	204(60.0)	1,637(61.4)	18(51.4)	1,859(61.2)
(3)効かなかった	64(18.8)	340(12.8)	8(22.9)	412(13.6)
(4)不明	2(0.6)	7(0.3)	0(0.0)	9(0.3)

調査期間：第1~4次 2007年6月21日～2011年6月20日

( ) 内は%

## 別紙（3）

### II. 一般調査

#### 1)副作用の種類別発現状況

モニター薬局以外の薬局または直接消費者から副作用情報が収集される一般調査において、第1次から第4次調査期間中に情報収集された副作用症例は1,000例（1,584件）となり、これらの副作用の種類および件数を表9に示した。第1～4次調査期間中に収集された副作用症例のうち、自己免疫疾患患者でのスティーブンス・ジョンソン症候群1例、女性器悪性新生物患者での肺塞栓1例と、気胸で入院した医療機関先の勤務者が本剤服用を医師に伝えたものの特段の指示等を受けなかったとの本人からの電話連絡のみで副作用として報告対象とした1例の計3例が重篤であった以外、非重篤であった。

第1～4次で集積された副作用の種類別で20件以上あったのは、発疹167件、そう痒症149件、恶心136件、下痢132件、頭痛87件、紅斑61件、消化不良53件、湿疹45件、浮動性めまい44件、腹痛44件、動悸40件、腹部不快感34件、上腹部痛28件、食欲減退24件、倦怠感24件、嘔吐23件、感覺鈍麻22件、四肢痛22件、浮腫20件で、これらの中で添付文書に記載されていない副作用は、頭痛、紅斑、浮動性めまい、動悸、腹部不快感、倦怠感、感覺鈍麻、四肢痛、浮腫であった。

表9 副作用の種類別発現状況(1) (一般調査)

時 期	承認時以降の累計
①調査施設数	-
②調査症例数	-
③副作用発現症例数	1,000
④副作用発現件数	1,584
⑤出荷数量(錠)	[REDACTED]
副作用の種類	副作用発現例数及び件数
心臓障害	42例
* 不整脈	3
* 動悸	40
耳および迷路障害	3例
* 耳鳴	3
眼障害	29例
* 眼の異常感	1
* 眼瞼炎	1
* 眼瞼紅斑	1
* 眼痛	1
* 眼瞼浮腫	10
* 眼瞼下垂	1
* 眼充血	3
* 眼窩周囲浮腫	4
* 光視症	2
* 霧視	3
* 視力障害	2
* 硝子体浮遊物	1
* 眼の異物感	1
眼瞼そゝ痒症	3
胃腸障害	379例
* 腹部不快感	34
* 腹部膨満	5
腹痛	44
下腹部痛	2
上腹部痛	28
* 口唇炎	5
* 便秘	12
下痢	132
消化不良	53
* おくび	3
* 硬便	1
* 鼓腸	2
* 排便回数増加	1
* 歯肉腫脹	1
* 舌痛	1
* 血便排泄	2
* 口唇痛	1
恶心	136
* 口内炎	4
嘔吐	23
* 口唇障害	1
* 口唇のひび割れ	1
* 歯不快感	1
* 口の感覺鈍麻	6
* 口腔粘膜紅斑	1

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

\*添付文書に記載されていない副作用

表9 副作用の種類別発現状況(2) (一般調査)

時 期	承認時以降の累計
一般・全身障害および投与部位の状態	128 例
* 無力感	1
* 胸部不快感	8
* 胸痛	12
* 悪寒	2
* 隨伴疾患悪化	1
* 顔面浮腫	15
* 顔面痛	1
* 異常感	8
* 熱感	5
* 全身性浮腫	2
* 倦怠感	24
* 浮腫	20
* 末梢性浮腫	19
* 疼痛	3
* 発熱	4
* 口渴	8
* 限局性浮腫	1
* 異物感	1
肝胆道系障害	1 例
* 肝機能異常	1
感染症および寄生虫症	4 例
* 乳腺炎	2
* 膜胞性皮疹	1
* 化膿	1
傷害、中毒および処置合併症	1 例
* 転倒	1
臨床検査	9 例
* アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
* アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
* 血中コレステロール増加	1
* ギグレルタミルトランスフェラーゼ増加	2
* 肝機能検査異常	2
* 脈圧上昇	1
* 尿量減少	1
代謝および栄養障害	24 例
食欲減退	24
筋骨格系および結合組織障害	41 例
* 関節痛	3
* 背部痛	4
* 筋痙攣	2
* 筋肉痛	1
* 四肢痛	22
* 重感	1
* 筋骨格硬直	8
* 筋骨格不快感	1
* 四肢不快感	2

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

\*添付文書に記載されていない副作用

表9 副作用の種類別発現状況(3) (一般調査)

時 期	承認時以降の累計
神経系障害	158 例
* 味覚消失	1
* 浮動性めまい	44
* 体位性めまい	1
* 頭部不快感	7
* 頭痛	87
* 感覚鈍麻	22
* 片頭痛	2
* 錯覚	1
* 傾眠	5
* 振戦	4
* 第7脳神経麻痺	1
精神障害	3 例
* 不眠症	2
* 中期不眠症	1
腎および尿路障害	8 例
* 排尿困難	5
* 頻尿	2
* 尿閉	3
* 尿臭異常	1
生殖系および乳房障害	69 例
* 無月経	2
* 乳房痛	1
* 月経困難症	4
* 過少月経	11
* 月経過多	10
* 月経障害	2
* 月経遅延	9
* 不規則月経	9
* 不正子宮出血	10
* 希発月経	6
* 頻発月経	8
* 乳房不快感	2
* 性器分泌物	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	20 例
* 息詰まり感	1
* 発声障害	1
* 呼吸困難	7
* 過換気	1
* 鼻閉	3
* 気胸	1
* 肺塞栓症	1
* 鼻漏	4
* くしゃみ	4
* 咽喉絞扼感	1
* 口腔咽頭痛	1

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日

\*添付文書に記載されていない副作用

表9 副作用の種類別発現状況(4) (一般調査)

時 期	承認時以降の累計
皮膚および皮下組織障害	343 例
* ざ瘡	1
* 脱毛症	4
* 皮膚炎	4
蕁疹	1
* 皮膚乾燥	5
湿疹	45
* 紅斑	61
* 多汗症	1
* 白斑	1
* 手変色	1
* 皮膚疼痛	3
そう痒症	149
* 紫斑	2
発疹	167
全身性皮疹	2
* 皮膚変色	2
* 皮膚障害	1
* 皮膚剥脱	6
* 皮膚色素過剰	1
* 皮膚刺激	2
* 皮膚線条	1
* スティーブンス・ジョンソン症候群	1
* 顔面腫脹	1
* 荨麻疹	6
* 黄色皮膚	1
* 全身紅斑	1
* 皮膚のべとつき感	1
全身性そう痒症	7
* 顔面感覺鈍麻	1
血管障害	16 例
* 潮紅	2
* 末梢冷感	5
* 血管収縮	1
* ほてり	8

調査期間：第1～4次 2007年6月21日～2011年6月20日  
 \*添付文書に記載されていない副作用

## 2)副作用症例一覧表

第1～4次調査期間において一般調査で収集された副作用発現症例1,000例における副作用の種類、番号、性、年齢、使用薬剤名（企業名）、使用方法、使用理由、副作用の症状・程度・軽重、医師または薬剤師の見解、因果関係等を記載した副作用症例一覧表を別紙(4)に示した。

別紙(4) 副作用の発現症例一覧表(一般調査)

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
腹部不快感	DS07-0378 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	胃部不快感	非重篤	軽快			第1次
下痢 腹痛	DS07-0385 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2.5日間	しみ(肝斑)	下痢 腹痛	非重篤 非重篤	回復 回復	飲み始めて3日目に反応している 少し遅い様な気がするので本品との因果関係は不明にしました。	不明	第1次
消化不良	DS07-0389 (女) (6X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	胸焼け	非重篤	回復	待になし	可能性大	第1次
熱感	DS07-0390 (女) (65)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ	のぼせ	非重篤	回復			第1次
発疹	DS07-0394 (女) (6X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ状	発疹	非重篤	未回復			第1次
発疹 紅斑	DS07-0395 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	不明	発疹 赤くなった	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
下痢	DS07-0397 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	軽快		可能性大	第1次
頭痛	DS07-0403 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	頭痛	非重篤	回復			第1次
紅斑	DS07-0406 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	発赤	非重篤	軽快			第1次
恶心	DS07-0408 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	ムカムカして気持ち悪くなつた	非重篤	回復			第1次
腹部不快感	DS07-0409 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃もたれ	非重篤	未回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹 皮膚刺激	DS07-0410 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	水ぶくれ	非重篤	不明	受診をすすめて、最初は行くと言ったのですが領収書を持って来て下さいと言ったところ、住所、氏名、電話は事情があつてとことわられました。返品には、住所氏名を書いて下さいと言いましたがことわられました。	不明	第1次
眼瞼浮腫 そよぎ症	DS07-0416 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	その他()	片方のまぶたの腫れ	非重篤	不明	トランシーノでの副作用とは考えにくいですが、服用中の降圧剤との飲み合わせや、添加物による副作用の可能性は否定できないかと思います。	不明	第1次
		ビタミンE製剤、ビタミンB 製剤、インドクタシン外用 剤、血圧低下剤	不明	不明							
発疹 上腹部痛	DS07-0417 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑の改善	腕の発疹 胃痛	非重篤 非重篤	不明 不明			第1次
呼吸困難 感覚鈍麻 眼瞼周囲浮腫 尿量減少	DS07-0419 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	息苦しい 手足のしびれ、呼吸困難	非重篤 非重篤	回復 回復	今までどんなビタミン剤を服用されてもこのような症状が出たことがなかったということ。トランシーノの添付文書に載っていない症状も出ていることから、お客様の体調も関係してこのような症状が出来てしまったのではないかと思う。	不明	第1次
下痢	DS07-0420 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ	下痢	非重篤	回復			第1次
発疹	DS07-0421 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	発疹	非重篤	不明			第1次
発疹 そよぎ症 紅斑	DS07-0422 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑の改善	ミミズパレ 痒み、発赤	非重篤 非重篤	不明 回復			第1次
湿疹 恶心	DS07-0424 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	湿疹(お腹、口元、背中) 胃のむかつき	非重篤 非重篤	軽快 回復			第1次
発疹 そよぎ症	DS07-0425 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	不明	第1次
消化不良 腹部不快感 頭痛	DS07-0426 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	胸焼け 胃が重く、もたれたような状 態、頭痛	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
異常感 異常感	DS07-0427 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	気分が悪い 頭がボーッとする	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
下痢 腹痛	DS07-0428 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	、肝斑	下痢 腹部がしくしく痛む	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
発疹 そう痒症	DS07-0434 (女) (4X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	腹部・首に発疹 腹部にかゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	おそらく、トランシーの服用により発生したものと思われます。ビタミン剤に関して、すべて副作用がないとはいえないと思います。(体調、寝不足等)	可能性大	第1次
恶心	DS07-0435 (女) (7X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	吐き気・だるさ 胃が気持ち悪くなった。	非重篤 非重篤	回復 回復	体調不良等が重なった為と思われる。	不明	第1次
湿疹	DS07-0438 (女) (5X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	湿疹	非重篤	不明			第1次
消化不良 食欲減退	DS07-0439 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胸がムカムカする 食欲不振	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
消化不良	DS07-0441 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胸やけ	非重篤	未回復			第1次
腹部不快感 恶心 浮動性めまい 四肢痛	DS07-0444 (女) (50)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	腹部に違和感 はきけ、めまい、右半身(下半身)に痛み	非重篤 非重篤	回復 回復	腹部異和感、吐き気等に関しては他のビタミン剤でも同様の症状がある事から、本品との関係は少なからず有ると思われます。また、下半身の痛みに関しては、精神的な不安(飲み慣れた薬からの変更)もあったかとは思いますが、不明な点が多いので、調査願います。	可能性大	第1次
浮腫	DS07-0445 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑	ほほの腫れ	非重篤	未回復			第1次
発疹 恶心 消化不良	DS07-0446 (女) (40)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	発疹 気分が悪くなる	非重篤 非重篤	軽快 軽快	副作用の症状はトラネキサム酸の副作用例にあるものだということで因果関係は予想されるが、消費者より詳しい説明がききたいということでお薬相談室に説明を依頼。	可能性大	第1次
下痢 腹痛	DS07-0449 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	肝斑	下痢 腹痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
下痢	DS07-0450 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝斑らしい)	下痢	非重篤	回復	なし	不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
背部痛 倦怠感	DS07-0453 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	背中の痛み 倦怠感	非重篤 非重篤	軽快 軽快	トランシーノ服用とは考えにくいが、服用を中止したら軽減されたので因果関係は100%否定できないと考えられます。	不明	第1次
全身性うつ症 ほてり 全身紅斑 全身性浮腫	DS07-0455 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	全身のかゆみ 全身のほてり、赤み、はれ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	なし	不明	第1次
下痢 発疹 うつ症	DS07-0457 (女) (58)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	下痢 発疹(首筋、二の腕、ふともも)	非重篤 非重篤	回復 回復	私がご本人から副作用らしき症状をお聞きしたのは、服用を中止されて数日たった時だったので発疹もピークを過ぎ跡になっている所がほとんどで、いくつか赤みがある程度でした。服用を中止してからは新たな発疹はできずかゆみも治まっている点や他にも服用しているものはないという点からやはりトランシーノの副作用の可能性が高いと考えます。	可能性大	第1次
発疹	DS07-0459 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	発疹	非重篤	軽快			第1次
発疹	DS07-0464 (女) (29)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑	発疹(部位:顔)	非重篤	回復			第1次
下痢	DS07-0465 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	軟便	非重篤	回復			第1次
発疹	DS07-0468 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑	発疹	非重篤	不明			第1次
発疹 うつ症	DS07-0470 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)改善	前腕・二頭筋・頸・肩・腹部の 発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
顔面浮腫 眼窩周囲浮腫	DS07-0474 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	顔のむくみ 瞼の腫れ、目じりの腫れ、頬 の辺りの肌が少し腫れている 様な感じ	非重篤 非重篤	回復 回復	他にアレルギーはない事から体調も影響があったと思われる。	可能性大	第1次
胸痛	DS07-0475 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	胸の痛み	非重篤	回復	お客様は痛みがでもしみがとれるのを信じて服用していたとのことで、この商品に対する期待も大きいと思います。	可能性小	第1次
恶心 嘔吐 浮動性めまい 腹痛	DS07-0476 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	しみ(肝斑)	吐き気 嘔吐、めまい、腹痛	非重篤 非重篤	回復 回復		不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
湿疹 そう痒症	DS07-0477 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	11日間	肝斑らしきしみ	湿疹(足の太ももの内側) かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
発疹 そう痒症	DS07-0478 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	しみ(肝斑)	発疹 痒み	非重篤 非重篤	不明 不明	トランシーノによる副作用ではないと思った?	不明	第1次
浮動性めまい 悪心 耳鳴	DS07-0480 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	めまい 吐き気、耳鳴り	非重篤 非重篤	軽快 軽快	特になし	不明	第1次
腹痛 嘔吐 下痢	DS07-0481 (女) (64)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	老人性のしみ	腹痛 嘔吐、下痢	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
口の感覺鈍麻	DS07-0482 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	肝斑	舌の痺れ	非重篤	未回復			第1次
悪心	DS07-0488 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	吐き気	非重篤	回復	本人の体調も良いので問題ないと思います。	不明	第1次
動悸	DS07-0490 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ(肝斑)	動悸	非重篤	回復			第1次
嘔吐 下痢	DS07-0493 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	嘔吐 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
ほてり 動悸	DS07-0496 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	身体が熱くなった 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
発疹 そう痒症	DS07-0497 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	16日間	しみ(肝斑)	両腕の内側ならびに腹部に 湿疹 同部にかゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	原因は不明ですが、何らかの本人の体質によ るところが大きいかと思います。	不明	第1次
下痢 おくび 恶心	DS07-0498 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢 げっぷ、吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
四肢痛	DS07-0500 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	ふくらはぎがチクチクする	非重篤	未回復			第1次
くしゃみ そう痒症	DS07-0501 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	くしゃみ かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	服用を中止して4日以上経過しているので、薬 の成分は体から完全に排泄されています。本 剤の関連性は低いと思われます。	可能性小	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
悪心	DS07-0503 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	胃がムカムカする	非重篤	回復			第1次
下痢 浮動性めまい	DS07-0504 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	下痢 ふらつき	非重篤 非重篤	不明 不明			第1次
末梢性浮腫 関節痛	DS07-0505 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ	手のむくみ ひじ・ひざ・手指の関節痛	非重篤 非重篤	回復 回復		不明	第1次
悪心 腹痛 下痢	DS07-0506 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑の改善	気持ちが悪くなった 腹痛、下痢	非重篤 非重篤	軽快 未回復			第1次
荨麻疹	DS07-0508 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑の改善	荨麻疹(両腕・背中・胸)	非重篤	回復			第1次
末梢性浮腫 関節痛	DS07-0510 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	右足ふくらはぎのむくみ 膝の痛み	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
下痢	DS07-0513 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	下痢気味	非重篤	未回復			第1次
頭痛 悪心	DS07-0516 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	7日間	しみ(肝斑)	後頭部の重い痛み 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復	薬との因果関係は不明です。	不明	第1次
胸痛	DS07-0519 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	心臓のまわりが締め付けられる感じ	非重篤	回復			第1次
湿疹	DS07-0520 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	顔に湿疹が出た	非重篤	未回復			第1次
腹痛	DS07-0521 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	回復			第1次
関節痛	DS07-0524 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	シミ	膝の後ろの痛み	非重篤	回復			第1次
そう痒症	DS07-0525 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	痒み	非重篤	軽快			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
浮動性めまい	DS07-0526 (女) (71)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	目が回る	非重篤	回復			第1次
過換気	DS07-0528 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	1日間	しみ	過呼吸	非重篤	回復			第1次
下痢	DS07-0529 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	15日間	肝斑	下痢	非重篤	未回復			第1次
湿疹	DS07-0530 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	シミ	湿疹	非重篤	未回復			第1次
嘔吐 下痢	DS07-0531 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	嘔吐 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
下痢 皮膚炎 顔面腫脹 顔面痛	DS07-0532 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	下痢 顔の荒れ、腫れ、痛み	非重篤 非重篤	回復 未回復			第1次
頭部不快感 恶心	DS07-0533 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	頭重	非重篤	回復	使用年齢がこえられているのでやはりそれにと もない副作用が出てしまったのではないかと思 いります。 あとはたまたま成分が合わなかつたのだとは思 います。	不明	第1次
湿疹	DS07-0535 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	シミ	湿疹(腕の内側、背中)	非重篤	軽快			第1次
下痢	DS07-0539 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	下痢気味	非重篤	軽快	お客様は神経質な方で薬を飲むと下痢になる 事がよくあるそうです。トランシーノとの因果関 係は不明であると思います。	不明	第1次
発疹	DS07-0540 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	お腹の周り、二の腕にポツボ ツ	非重篤	不明			第1次
発疹	DS07-0541 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	回復	赤疹に対してはお客様のご意見のみで見た訳 ではないのですがトランシーノが原因とは考 えられず、その日の食事内容又は夏の暑さがつ づいて体調が悪くなっていたとも考えられま す。	不明	第1次
下痢 嘔吐 食欲減退	DS07-0543 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ	下痢気味 嘔吐・食欲不振	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹 そう痒症	DS07-0544 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明	今回肝斑が発売された事に付いてお客様は大変喜んでおられご来店頂き急ぐに購入していただき私もその後の結果を楽しみにしておりましたところ1週間後来店頂き副作用が有ったので(上半身の発疹)で相談しに来られたので服用を中止する旨お話し私にも原因は良くわかりませんがお客様の顔の変化(きれい)になつたのに残念です次回お医者様に行く様にお話します。	可能性大	第1次
蕁麻疹	DS07-0545 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	蕁麻疹のようになった	非重篤	軽快	なし	不明	第1次
恶心	DS07-0546 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	胃のむかむか	非重篤	回復	原因は不明ですけど必ずしも因果関係がないとは分からないです。	不明	第1次
そう痒症 紅斑	DS07-0548 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	かゆみ	非重篤	未回復			第1次
恶心	DS07-0549 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	恶心	非重篤	未回復			第1次
四肢痛 頭痛	DS07-0550 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	頭痛 足先のつっぱるような痛み	非重篤 非重篤	回復 回復	服用されていたご本人様が体格的に小柄な方で、体重も40kg前後とお見受けした為、断定ではないが多少トラネキサム酸の効果が強く出てしまったのではないかと考えられる。	可能性大	第1次
発疹	DS07-0554 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発疹	非重篤	回復			第1次
恶心 下痢 湿疹	DS07-0557 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	気持ら悪い 下痢、湿疹	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
蕁麻疹	DS07-0558 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	蕁麻疹(首のあたり)	非重篤	軽快	因果関係は不明だがトランシーノの可能性も考えられる。	不明	第1次
下痢	DS07-0559 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)が気になり使用	下痢	非重篤	回復			第1次
上腹部痛 発疹 悪寒 そう痒症	DS07-0560 (女) (28)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	しみ(肝斑)	胃痛 発疹、悪寒	非重篤 非重篤	回復 回復	できるだけ副作用が少なく効能効果の高い商品があればよい。メーカーの対応は迅速で適切だったのはさすが大企業だと思いました。	可能性大	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
紅斑	DS07-0563 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤	非重篤	未回復			第1次
頭部不快感 筋骨格硬直 呼吸困難	DS07-0564 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	頭重 肩こり、息苦しい	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
そう痒症	DS07-0569 (女) (64)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2~3日間	その他(しみ)	痒み 湿疹	非重篤 非重篤	軽快 軽快	購入後服用に至るまで期間があいているのは、 医師(内科のかかりつけ)に相談していた為。又 服用後、痒みがでたので服用は中止したが、 痒みが残っても、忙しいと軽く考えていてつ い相談が遅くなつたとの事。ただこちらとしては 痒みがいつまでもくり返したり残っている為医師 にかかる事をおすすめしたが結局時間がない という事でかかっていらっしゃらない。	可能性大	第1次
		便秘薬(医)、整腸剤(市 販)	1回	不明							
感覺鈍麻 頭痛	DS07-0572 (女) (64)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	腕の痺れ 頭痛	非重篤 非重篤	不明 不明			第1次
発疹	DS07-0575 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	湿疹(首の左側、左まぶた)	非重篤	回復	たった1日のんでそんなになるのかと不思議に 思いましたが、本当のことはわかりません。	不明	第1次
口の感覺鈍麻	DS07-0578 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	口のしづれ	非重篤	軽快			第1次
口唇炎 紅斑 湿疹	DS07-0581 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	口の周りのざらつき 発赤、湿疹	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
頭痛	DS07-0588 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	激しい頭痛	非重篤	回復			第1次
浮動性めまい 異常感	DS07-0590 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	17日間	肝斑	めまい 気分が悪くなる	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
恶心	DS07-0591 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	恶心	非重篤	回復	体調不良でないかと思われます。	不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
浮動性めまい	DS07-0593 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	眩暈	非重篤	回復	特になし	不明	第1次
顔面浮腫 発疹	DS07-0594 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	顔の腫れ 首の発疹	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	不明	第1次
発疹	DS07-0596 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ症状	吹き出物	非重篤	軽快			第1次
発疹	DS07-0598 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	発赤(瞼の上下) かゆみ(瞼の上下、頬)	非重篤 非重篤	軽快 軽快	トランシーノによるアレルギーと思われる	可能性大	第1次
そう痒症	DS07-0602 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	肝斑	かゆみ	非重篤	未回復			第1次
そう痒症 紅斑	DS07-0604 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	かゆみ 発赤(腕、肩甲骨下、頸の下)	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
過少月経	DS07-0605 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	月経量減少	非重篤	未回復			第1次
そう痒症	DS07-0607 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	5日間	肝斑	痒み	非重篤	軽快			第1次
腹痛 筋痙攣	DS07-0610 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	腹痛 薬指の痙攣	非重篤 非重篤	回復 軽快			第1次
発疹	DS07-0611 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	37日間	しみ(肝斑)	発疹、部位:足、腕、背中。	非重篤	軽快	なし	可能性大	第1次
腹部不快感	DS07-0616 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	肝斑	胃がもたれる	非重篤	未回復			第1次
浮動性めまい 視力障害 落視 振戦 感觉鈍麻	DS07-0617 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑改善のため	立ってられない位の貧血の 様な症状 ・目の前が明るくなる、・目がかすむ、・手の震え、しびれ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
不眠症	DS07-0619 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑	眠れなくなった	非重篤	不明			第1次
感覺鈍麻	DS07-0623 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	手のしびれ	非重篤	回復	なし	不明	第1次
ざ瘡 頭痛	DS07-0624 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	にきび 頭を締め付ける感じ	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
発疹	DS07-0625 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	39日間	肝斑	発疹	非重篤	未回復			第1次
嘔吐 腹部不快感 消化不良	DS07-0627 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑の改善	胃がむかつき吐いた 胃が重い、胸焼け	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
頭痛	DS07-0630 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみの改善	頭痛	非重篤	回復			第1次
発疹 そう痒症	DS07-0631 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	発疹(腕の内側) かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復	なし	不明	第1次
多汗症 倦怠感	DS07-0632 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	7日間	しみの改善	発汗 だるい	非重篤 非重篤	不明 不明			第1次
湿疹 下痢 頭痛	DS07-0635 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝斑	湿疹、下痢、頭痛	非重篤	回復			第1次
四肢痛	DS07-0637 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	足にある静脈瘤の悪化(痛 み)	非重篤	軽快	今後、販売時に静脈瘤の有無を確認した方が いいと思われます。	不明	第1次
筋肉痛	DS07-0638 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	太ももが痛い(内転筋)	非重篤	未回復			第1次
口内炎 口渦	DS07-0640 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	口内炎 口の渦き	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	不明	第1次
そう痒症 眼窩周囲浮腫	DS07-0642 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	顔がかゆい 目の下が腫れた	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
消化不良	DS07-0644 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	胸焼け	非重篤	回復			第1次
食欲減退 下痢	DS07-0645 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	食欲不振・下痢	非重篤	回復		不明	第1次
発疹 動悸 浮動性めまい	DS07-0646 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	肝斑	発疹 心臓の動悸、めまい	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
胸痛	DS07-0650 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	胸の辺りのしきしきした痛み	非重篤	回復	私がお客様と直接接客したわけではないので、なんとも言えませんが第一三共ヘルスケア(株)様の対応から薬のせいではなさそうというこのでそうなのだと思います。新しい商品ということもあり、今後もお客様の話をしっかりと聞いた上で販売してまいります。	不明	第1次
そう痒症	DS07-0651 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	痒み	非重篤	未回復	特になし	不明	第1次
悪心	DS07-0652 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝斑)	悪心	非重篤	回復	特別ありません	不明	第1次
		アスピリン	1回	不明							
薬疹	DS07-0656 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	薬疹	非重篤	未回復			第1次
感觉純麻 末梢性浮腫	DS07-0657 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明	しみ(肝斑)	手足のしびれ 手足のむくみ	非重篤 非重篤	回復 回復	原因を調べてほしい。	不明	第1次
湿疹	DS07-0660 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	湿疹	非重篤	軽快			第1次
皮膚乾燥	DS07-0661 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	肌の乾燥	非重篤	軽快			第1次
恶心 呼吸困難	DS07-0664 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみの改善	恶心 息苦しさ	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
傾眠	DS07-0665 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	3日間	しみの改善	眠気	非重篤	回復			第1次
顔面浮腫 末梢性浮腫	DS07-0666 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	顔・手足のむくみ	非重篤	回復			第1次
発疹 そう痒症	DS07-0681 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	手首・首元の発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復	・接触性皮膚炎(金属アレルギー)・薬の内服による体質の変化(体がびんかんになった)以上のことが疑われます。	不明	第1次
消化不良 腹部不快感 食欲減退 下痢 鼓脹	DS07-0683 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	不明	胸焼け 胃のもたれ、食欲不振、下痢の ような軟便、腹内ガスのたまり	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
下痢	DS07-0685 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	下痢	非重篤	回復			第1次
発疹 そう痒症	DS07-0686 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	湿疹	非重篤	回復	特になし	不明	第1次
発疹 そう痒症	DS07-0687 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	顔の湿疹	非重篤	回復	実際に発疹を確認することができなかつたので正直なんども言えません。	不明	第1次
悪心 頭痛 浮動性めまい	DS07-0688 (女) (30)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	はきけ 頭痛、めまい	非重篤 非重篤	軽快 軽快	なし	不明	第1次
発疹 そう痒症	DS07-0689 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	しみ(肝斑)	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復	なし	可能性大	第1次
上腹部痛 恶心	DS07-0691 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	胃痛	非重篤	回復	初回時は空腹時に服用したが、その後食後ににおいても服用したのにかかわらず胃に不快な症状が現れたということで本剤があわなかつたと予想される。	可能性大	第1次
動悸 感觉鈍麻 恶心 消化不良	DS07-0695 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	動悸 手足のしびれ	非重篤 非重篤	回復 回復	特に無し	不明	第1次
紅斑	DS07-0697 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	肝斑の緩和	両腕・胸に赤いほん点	非重篤	不明			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
そう痒症 熱感	DS07-0698 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	痒み(のど) 熱感(顔面)	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	不明	第1次
そう痒症 発疹	DS07-0699 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝斑	痒み 発疹	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
下痢 恶心 腹痛	DS07-0701 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	下痢 吐き気	非重篤 非重篤	軽快 軽快	本人も体調を崩していたようなので本品(トランシーノ)が原因かは不明です。	不明	第1次
歯不快感 恶心 恶心	DS07-0705 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	歯が浮くような感じ むかつき、吐き気	非重篤 非重篤	不明 不明	詳細不明のため特になし。	不明	第1次
下痢 末梢性浮腫	DS07-0706 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	10日間	しみ(肝斑)	下痢 足のむくみ	非重篤 非重篤	不明 不明	服用以前は何も無かったのでトランシーノの可能性大だと思います。	可能性大	第1次
発疹	DS07-0707 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	頬、首、腕などのボソボソ	非重篤	不明			第1次
頭痛	DS07-0708 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	頭痛	非重篤	回復			第1次
頭痛	DS07-0709 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	頭痛	非重篤	未回復			第1次
恶心 浮動性めまい	DS07-0710 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	恶心 めまい	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
口唇のひび割れ 口唇炎 全身性そう痒症	DS07-0715 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	唇のあれ 口角がわれた、全身の痒み	非重篤 非重篤	未回復 未回復	本品と副作用との関係はなさそうに思えます (10/25から服用して20日たってからというのが……)	不明	第1次
背部痛 発熱 倦怠感	DS07-0717 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみを取りたい	背中が痛い 微熱、体のだるさ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
上腹部痛	DS07-0718 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	11日間	肝斑	胃痛	非重篤	回復			第1次
湿疹 恶心	DS07-0724 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	湿疹 吐き気	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
悪心	DS07-0726 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝斑)	気分が悪くなる	非重篤	軽快	特になし	不明	第1次
湿疹	DS07-0733 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	湿疹	非重篤	未回復			第1次
腹痛	DS07-0742 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	腹痛	非重篤	不明			第1次
浮動性めまい	DS07-0743 (女) (57)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	めまい	非重篤	回復			第1次
消化不良	DS07-0744 (女) (63)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	胸やけ	非重篤	回復	不明。	不明	第1次
発疹	DS07-0745 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	顔にポツポツ	非重篤	回復		可能性大	第1次
消化不良 食欲減退	DS07-0746 (女) (70)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	胸焼け 食欲不振	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
異常感 口の感覺覚麻 頭痛	DS07-0747 (男) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	気分が悪い 舌のしびれ、頭痛	非重篤 非重篤	不明 不明		不明	第1次
悪心 消化不良	DS07-0748 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	肝斑	吐気 胸焼け	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
そう痒症	DS07-0749 (女) (4X)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	不明	7日間	肝斑	痒み(口の辺り)	非重篤	未回復			第1次
湿疹	DS07-0752 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	湿疹	非重篤	軽快			第1次
悪心 背部痛 咽喉絞扼感 消化不良	DS07-0755 (女) (53)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝斑)	みぞおちのあたりが気持ちが 悪い	非重篤	回復	特に無い	可能性大	第1次
腹痛	DS07-0756 (女) (46)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	回復	かぜ薬などでも同じような症状が起こること。 使用者自身、胃腸の弱い方と思われます。	可能性大	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
そう痒症 悪心 紅斑	DS07-0758 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑改善	はきけ 発赤	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
過少月経	DS07-0765 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	月経量が減少	非重篤	不明			第1次
不規則月経	DS07-0766 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	服用中生理がなかった	非重篤	回復	なし	不明	第1次
四肢痛 頭痛 浮動性めまい	DS07-0769 (女) (SX)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	片足のかかとの激痛 頭痛、ふらつき	非重篤 非重篤	不明 不明	因果関係は不明。2瓶目のみ返品しました。	不明	第1次
悪心 下痢	DS07-0770 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ	吐き気 下痢	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
紅斑	DS07-0771 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	発赤	非重篤	未回復			第1次
食欲減退 悪心 倦怠感	DS07-0772 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	体がだるくなった 気分が悪くなった	非重篤 非重篤	回復 回復	ある種のビタミン剤があわなかつたのだろう。	確実	第1次
頭痛	DS07-0773 (女) (SX)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	特になし。	不明	第1次
発疹 そう痒症	DS07-0774 (女) (70)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	発赤(頬) かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復	発赤と飲みはじめた日にちがほぼ一致するので服作用の可能性はかなり大きいかと思われます。	可能性大	第1次
浮動性めまい 悪心 性器分泌物	DS07-0777 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明		眩暈 吐き気	非重篤 非重篤				
		抗ヒスタミン剤、アデノシン 三リン酸二ナトリウム、ベタ ヒスチンメチル硫酸、トフイ ソバム、カリゾノゲナーゼ	不明回	不明							
下痢	DS07-0779 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	軽快		不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
下痢 消化不良	DS07-0780 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	下痢 胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復	なし	不明	第1次
恶心	DS07-0781 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	気持ち悪くなった	非重篤	回復			第1次
動悸 恶心	DS07-0783 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	動悸 恶心	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
胸痛	DS07-0784 (女) (30)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	胸の痛み	非重篤	回復			第1次
口唇炎	DS07-0785 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	口の荒れ	非重篤	未回復			第1次
限局性浮腫 そう痒症	DS07-0790 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	5日間	しみ(肝斑)	両耳が腫れた。 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	特になし	不明	第1次
発疹	DS07-0791 (女) (6X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	63日間	しみ(肝斑)	吹き出物	非重篤	回復	食べ物からくるアレルギーのようなものとも思われます。	可能性小	第1次
眼充血	DS07-0796 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	片目が充血	非重篤	回復			第1次
恶心 不正子宮出血	DS07-0800 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	吐き気 不正出血	非重篤 非重篤	軽快 軽快	特になし	不明	第1次
下痢	DS07-0801 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	下痢	非重篤	未回復			第1次
恶心 頭痛	DS07-0802 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	恶心 頭痛	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
浮動性めまい	DS07-0803 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	めまい	非重篤	回復			第1次
恶心 腹部不快感	DS07-0807 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	吐氣 腸のゴロゴロ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
頭痛 恶心 動悸 呼吸困難	DS07-0814 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	しみ(肝斑)	頭痛 気分が悪くなつた、動悸、息切れ	非重篤 非重篤	回復 回復	これまでこの様な症状が出た事は全くない。薬を中止した所症状もなくなり副作用以外考えられない。	確実	第1次
倦怠感 頭痛	DS07-0817 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑の改善	体のだるさ 頭が締付けられるように痛くなつた	非重篤 非重篤	不明 軽快			第1次
恶心	DS07-0820 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	吐き気	非重篤	回復			第1次
発疹	DS07-0821 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明	特になし	不明	第1次
湿疹	DS07-0823 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	湿疹	非重篤	未回復			第1次
消化不良	DS07-0831 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胸やけ	非重篤	回復			第1次
発疹 眼痛 疼痛	DS07-0833 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明	赤いしつしんは、トランシーノのSEと考えられるが、目の痛み体の痛みはそれによるものかわからない。	不明	第1次
発疹 そう痒症	DS07-0839 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	全身に発疹	非重篤	回復	他のサプリメント等でこのような状態になったことはなく成分によるアレルギー(トランシーノの特徴成分)の可能性は否定できないと思われますがよく見られる副作用症状であり本医薬品を否定するようなものではないと思われます	可能性大	第1次
腹部不快感	DS07-0840 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ	胃部不快感	非重篤	回復			第1次
紅斑 発疹	DS07-0842 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	発赤 発疹	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
下痢	DS07-0846 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢ぎみ	非重篤	未回復			第1次
呼吸困難 恶心	DS07-0847 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ	呼吸が苦しい 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
そう痒症 湿疹	DS07-0849 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	かゆみ オデコの湿疹	非重篤 非重篤	不明 不明			第1次
紅斑 そう痒症	DS07-0851 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	赤くなった かゆみ	非重篤 非重篤	不明 不明	しみは少しあなくなったので本人は続けて服用したかったとの事	不明	第1次
発疹	DS07-0854 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	発疹(両頬)	非重篤	回復	特になし	不明	第1次
腹部不快感 口渴	DS07-0857 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	胃部不快感 のどの渇き	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
発疹	DS07-0858 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	首周りや頬にポツポツ	非重篤	不明			第1次
上腹部痛	DS07-0864 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	胃が差し込むように痛い	非重篤	回復			第1次
頭痛 動悸	DS07-0870 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	頭痛、動悸	非重篤	回復	不明	不明	第1次
四肢痛	DS07-0871 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	足の痛み	非重篤	未回復			第1次
発疹	DS07-0872 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	湿疹	非重篤	軽快		可能性大	第1次
		サプリメント(コエンザイムQ10、コラーゲン、ビタミンC)	不明	不明							
尿閉 頻尿	DS07-0874 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	排尿障害	非重篤	回復	不明	不明	第1次
下痢 動悸	DS07-0880 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	しみ	下痢 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
下痢	DS07-0882 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	11日間	肝斑	下痢	非重篤	未回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
悪心	DS07-0884 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃がむかむかする	非重篤	不明			第1次
そう痒症 湿疹	DS07-0891 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	22日間	しみ(肝斑)	むくみ かゆみ、湿疹	非重篤 非重篤	軽快 軽快		可能性大	第1次
全身性そう痒症	DS07-0892 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	かゆみ(顔を含めて全身)	非重篤	未回復			第1次
胸部不快感	DS07-0893 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	4日間	しみ(肝斑)	胸がつまる感じで苦しくなる。	非重篤	回復	今回のケースは本品以外他剤服用しておらず、本品による軽度な副作用と考えられる。本人は本品の為に今後血栓が出来る恐れがないか?と不安がっておられた。本品オールで6Tの服用であり心配ない旨話す。メーカーにも連絡し特に今後何らかの影響がある時は連絡する旨話し了解す	可能性大	第1次
発疹 視力障害	DS07-0894 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	顔に湿疹 目が白く濁った	非重篤 非重篤	回復 回復	特に原因はわかりません	不明	第1次
そう痒症	DS07-0895 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	かゆみ	非重篤	軽快			第1次
下痢	DS07-0896 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	8日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	お客様と何らかの成分があわなかつたために下痢が生じた。	不明	第1次
発疹	DS07-0898 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	発疹	非重篤	未回復			第1次
腹部不快感 蕁麻疹	DS07-0904 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	胃部不快感 じんましん	非重篤 非重篤	不明 不明			第1次
腹部不快感 排尿困難	DS07-0906 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	胃の不快感 排尿困難	非重篤 非重篤	回復 回復	トランシーノ内容成分から、排尿時違和感との因果関係は考えにくい。ただし、他ビタミン剤との併用による尿中ビタミンにより、違和感を感じることもあるので、不明である。服用をやめたことで症状はなくなったということから、他方面からの内容接客の必要性を感じました。	不明	第1次
四肢痛	DS07-0909 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	肝斑	ふくらはぎの痛み	非重篤	未回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹 そう痒症	DS07-0910 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	発疹 痒み	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
下痢 嘔吐	DS07-0916 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	肝斑	下痢 嘔吐	非重篤 非重篤	未回復 回復			第1次
恶心	DS07-0917 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	しみ	吐き気	非重篤	未回復			第1次
消化不良	DS07-0919 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	胸焼け	非重篤	不明			第1次
恶心	DS07-0920 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃が気持ち悪くなった	非重篤	未回復			第1次
月経遅延	DS07-0925 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	生理が来なかつた	非重篤	回復	49才という年令が気になります		不明 第1次
		レボチロキシンナトリウム	不明回	不明							
発疹	DS07-0926 (女) (37)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	全身発疹	非重篤	不明			第1次
鼓膜 排便回数増加	DS07-0933 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	お腹がゴロゴロして、ガスがたまるような感じ 下痢までいかないが、トイレの回数が多くなった	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
発疹	DS07-0937 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明	しみ(肝斑)	発疹(全身)	非重篤	軽快	特になし	不明	第1次
胸部不快感 転倒	DS07-0940 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	心臓に何か引っかかる様な感じ 手・足が突っ張り時々倒れる	非重篤 非重篤	不明 未回復			第1次
月経過多	DS07-0942 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	生理不順(生理期間が通常の倍長引いた)	非重篤	不明	注意して販売に心掛ける	不明	第1次
頭痛 浮動性めまい	DS07-0943 (女) (34)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	頭痛、めまい	非重篤	回復	特になし	不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
月経遅延	DS07-0944 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理が来なかつた(2ヶ月間)	非重篤 非重篤	回復			第1次
悪心 悪心	DS07-0946 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	悪心 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
悪心	DS07-0948 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	悪心	非重篤	軽快			第1次
そう痒症	DS07-0951 (女) (56)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	かゆみ	非重篤	回復	販売する際に今迄以上に相手の声を良く聞き対応したいと思います。	不明	第1次
悪心 頭痛 消化不良	DS07-0952 (女) (36)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	吐き気・頭痛	非重篤	回復	購入者に対し副作用発現に対して継続して注意する	可能性大	第1次
発疹 紅斑 そう痒症	DS07-0953 (女) (4X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	体に発疹・発赤有り	非重篤	回復		不明	第1次
		混合ビタミン剤	不明	不明							
月経過多	DS07-0954 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	肝斑	経血量が増えた	非重篤	未回復			第1次
発疹	DS07-0955 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	顔ににきびのような発赤が出来た	非重篤	未回復			第1次
顔面浮腫 発疹	DS07-0960 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	発疹 顔が腫れてきた	非重篤 非重篤	不明 不明	服用中止後8日経っても症状が回復しないとの事ですので薬との因果関係は低いと思います。	可能性小	第1次
悪心 食欲減退 発疹	DS07-0963 (女) (40)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	発疹(顔面) 悪心、食欲不振	非重篤 非重篤	回復 回復	特にありません。本人の体調不良など	不明	第1次
下痢 恶心	DS07-0968 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	3日間	しみ	下痢 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
下痢 発疹 紅斑 そう痒症	DS07-0975 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑の改善	下痢 発疹、発赤、痒み	非重篤 非重篤	軽快 不明			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
そう痒症 発疹	DS07-0979 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	蕁麻疹 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	症状が発現した時点から時間が経過してしまつていていたことと、確認した部位(患部)が腕の内側のみであったため、症状の程度や因果関係については、判断が困難である。また、最初の服用から時間も経過しているため、(3日間以上)因果関係の可能性についても不明若しくは判断しかねる状況。	不明	第1次
恶心	DS07-0980 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	恶心	非重篤	軽快			第1次
霧視 浮動性めまい	DS07-0990 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	目のかすみ・目まい	非重篤	不明		不明	第1次
湿疹	DS07-0991 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	顔に湿疹	非重篤	未回復			第1次
ほてり	DS07-0993 (女) (70)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	頭のほてり	非重篤	不明	購入時55才以上の方で相談を受けましたが、本人の希望により本剤を購入しました。今後も55才以上の方に相談していきます。	不明	第1次
		血圧降下剤	不明回	不明							
熱感 発疹	DS07-1000 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	しみ(肝斑)	ふきでもの のぼせ	非重篤 非重篤	回復 回復	本人の意志は継続を希望しておりますが一時服用を中止して様子をみるとの事です	可能性大	第1次
末梢冷感 皮膚色変過剝	DS07-1001 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	手が浅黒くなる 手が冷たくなる	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
湿疹	DS07-1004 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑改善	湿疹	非重篤	回復			第1次
不規則月経	DS07-1006 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑	生理不順	非重篤	軽快			第1次
筋骨格硬直 頭痛	DS07-1007 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	頭痛 肩こり	非重篤 非重篤	回復 未回復			第1次
発疹 そう痒症	DS07-1008 (女) (60)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	痒み 発疹	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹 そう痒症	DS07-1015 (女) (35)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	吹出物(左側ほっぺたの下) かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
頻発月経	DS07-1017 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	生理が早くきた	非重篤	未回復			第1次
下痢	DS07-1022 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	トランシー／服用前後に他剤の服用はないこと からトランシー／の副作用と考えられる。	確実	第1次
異常感 頭痛	DS07-1026 (女) (59)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	頭痛 気分が悪い	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
発熱	DS07-1029 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	61日間	肝斑	発熱	非重篤	回復			第1次
四肢不快感	DS07-1033 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	ふくらはぎが重い(両足、特に 左側)	非重篤	回復			第1次
傾眠	DS07-1034 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明回	3日間	しみ(肝斑)	眠気	非重篤	回復	特にありません	不明	第1次
顔面浮腫 そう痒症	DS07-1037 (女) (35)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	かゆみ 肝斑部位の腫れ	非重篤 非重篤	回復 回復	他に併用薬はなかったとのことで、トランシー／ による副作用が考えられる。	可能性大	第1次
頭痛	DS07-1041 (女) (3X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	もともと頭痛症かお聞できず、因果関係ははつきり言えないと私は思います	不明	第1次
感觉鈍麻 四肢痛	DS07-1048 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	両足の指先の痺れ 両太ももの後ろの痛み	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
錯覚	DS07-1051 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	ピリピリ感(左目の下)	非重篤	回復			第1次
月経障害	DS07-1052 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	経血量が減った	非重篤	不明			第1次
悪心 腹痛	DS07-1055 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	腹痛 吐き気	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
恶心 下痢 食欲減退 不整脈	DS07-1058 (女) (61)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑の改善	不整脈 食欲不振、下痢、気持ちが悪い	非重篤 非重篤	軽快 回復			第1次
浮動性めまい うつ痒症	DS07-1063 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	15日間	しみ(肝斑)	使用後、めまいとかゆみが発現した。	非重篤	回復	なし	不明	第1次
		生薑	不明	不明							
発疹	DS07-1064 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	発疹	非重篤	回復			第1次
腹部不快感 下痢	DS07-1075 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	胃もたれ 軟便	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
下痢 腹痛	DS07-1077 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	腹痛 下痢	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
腹部不快感 下痢 消化不良	DS07-1080 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	下痢 胸やけ、胃もたれ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	一過性と思考する。	不明	第1次
		ビタミンC、カルシウム	1回	1日間							
湿疹	DS07-1081 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ	湿疹	非重篤	未回復			第1次
頭痛	DS07-1083 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	頭痛	非重篤	回復			第1次
四肢痛	DS07-1090 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	ふくろはぎの痛み	非重篤	未回復	服用中止して3、4日しても痛みが消えない事から因果関係はないかと思われますが、断定はできないため不明。		不明 第1次
恶心	DS07-1096 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑の改善	気持ちが悪くなった	非重篤	回復	食後に服用したため、食事の影響とも考えられる。服用回数が1回のみのため、因果関係については判断できかねる。	可能性小	第1次
恶心	DS07-1100 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	恶心	非重篤	回復	服用を中止したら、症状が改善したため、何らかの因果関係があると思われる。	可能性小	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)			年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	軽帰	得られたコメント	因果関係		
湿疹 動悸 そう痒症	DS07-1104 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	湿疹(全身) どうき	非重篤 非重篤	不明 不明	飲んですぐの発疹が有(体全体)、副作用のうたがい有。発疹の原因は特に無いとのことなので返品受け取りお客様の速く先書いてもらつたが、速らく先ま違いでその後の速くされずその後の経過不明。	不明	第1次	
恶心 上腹部痛 腹痛 そう痒症	DS07-1105 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	胃の痛みやむかつき 腹痛・皮膚の痒み	非重篤 非重篤	回復 回復		不明	第1次	
下痢 腹痛	DS07-1107 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	下痢 腹痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次	
発疹 そう痒症	DS07-1111 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次	
筋骨格硬直 頭痛	DS07-1113 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛 肩こり	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次	
恶心 頭痛	DS07-1120 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛 恶心	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次	
頭痛	DS07-1127 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ	頭痛	非重篤	未回復			第1次	
月経過多	DS07-1131 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	月経量が増加	非重篤	不明			第1次	
希発月経	DS07-1139 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理周期の延長	非重篤	不明			第1次	
恶心 頭痛 浮動性めまい	DS07-1144 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	4日間	肝斑	頭痛 吐き気、めまい	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次	
消化不良 動悸	DS07-1148 (女) (73)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	胸やけ	非重篤	回復	今までのサプリメントの服用では異常なかつたが、トランシーノを夕食後1回だけ服用しただけで胸やけとドゥキがおこっているので、トランシーノが疑がわれると思います。	確実	第1次	
		サプリメント、黒酢、無臭 にんにく朝	不明	不明								

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹	DS07-1150 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	21日間	肝斑	発疹	非重篤	未回復			第1次
四肢痛 四肢不快感 筋痙攣	DS07-1151 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	ふくらはぎの痛み	非重篤	回復	この方の場合美容整形科で「肝斑」と診断され、「経済的に市販薬トランシーノで治療した方が良い」と判断され、服用されていた。少しでも美しく若くありたいという女性の願望にこたえる薬であるとは思う。が、店頭で、より丁寧なカウンセリングが必要な薬であると思った。口唇ヘルペスのOTC薬のように、お客様ご自身でチェックできるシートが必要だと考える。(現在あるシートの見直し。)(外箱に添付する等して必ずチェックする等。)副作用が発現するリスクをよりなくす為に購入時のカウンセリングの強化をしたい。	不明	第1次
		アレンドロン酸ナトリウム水和物、甘麦大棗湯、モンテルカストナトリウム、加味帰脾湯	不明	不明							
うっ庠症 発疹	DS07-1158 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	かゆみ	非重篤	回復	服用を中止した時点から症状が回復しているので、トランシーノとの因果関係の可能性が大きいのでは。但し、当初3週間も服用しており、体調不良とも考えられますとコメント。	可能性大	第1次
発疹	DS07-1160 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	赤いぼつぼつ	非重篤	未回復			第1次
頭痛 腹部不快感	DS07-1161 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑	頭痛 胃のむたれ	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
恶心 嘔吐 下痢	DS07-1166 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	しみ(肝斑)	吐気 嘔吐、下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	服用開始から副作用発現までに時間が経過していることもありトランシーノとの因果関係は不明	不明	第1次
眼瞼浮腫	DS07-1173 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	まぶたのむくみ	非重篤	未回復			第1次
頭痛 恶心	DS07-1175 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	頭痛 胃がムカムカした	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
胸部不快感	DS07-1177 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	胸が苦しくなった	非重篤	回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
顔面浮腫	DS07-1189 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	顔の浮腫み	非重篤	回復	・浮腫になるような原因は他には考えられない。トランシーノに関係する文献を調べた結果浮腫の原因とは思われないが、学術へ問合せ、血栓等の症状及び、その後の体調の変化がないのでしばらく服用し、再び同じような症状があれば休薬して連絡してもらうよう指示	不明	第1次
胸痛	DS07-1194 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胸の痛み	非重篤	軽快			第1次
紅斑 そう痒症	DS07-1200 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑	顔が赤くなった 顔がかゆくなかった	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
そう痒症 紅斑	DS07-1207 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	かゆみ 発赤	非重篤 非重篤	回復 回復	医薬品ではごくまれにおこる(体質に合わないなどで)症状であり、トランシーノ特有の副作用とは考えづらい。	不明	第1次
		(サプリメント)、コラーゲン、鉄	1回	1.825日間							
倦怠感	DS07-1210 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	足がだるくなる	非重篤	回復	製剤の添加物の可能性と考えたが、明らかな根拠もないので、判断に迷う所存。	不明	第1次
頭痛	DS07-1215 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	頭がジーン痛くなった	非重篤	回復			第1次
発疹 腹痛	DS07-1219 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	吹き出物 腹痛	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
紅斑 眼瞼浮腫 眼瞼そう痒症 皮膚乾燥	DS07-1221 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	発赤 瞼の腫れ、かゆみ、カサカサ	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
腹部不快感 食欲減退 倦怠感	DS07-1222 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	胃もたれ 食欲不振、倦怠感	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
紅斑 湿疹	DS07-1224 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療	発赤 湿疹	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
悪心	DS07-1225 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝斑)	気分が悪くなる	非重篤	回復	特になし	不明	第1次
浮動性めまい 悪心 異常感	DS07-1226 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	めまい はきけ、頭がボーっとした	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
紅斑	DS07-1230 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	眼の周りが赤くなった	非重篤	未回復			第1次
下痢 血便排泄	DS07-1235 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	顔のしみ	下痢 血便	非重篤 非重篤	回復 未回復			第1次
不整脈	DS07-1237 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	不整脈みたいなもの	非重篤	未回復			第1次
悪心	DS07-1240 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	吐き気	非重篤	回復			第1次
動悸	DS07-1242 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	動悸	非重篤	回復			第1次
異常感	DS07-1244 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	気分が悪い	非重篤	回復		不明	第1次
悪心	DS07-1250 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃がムカムカする	非重篤	回復			第1次
腹部不快感 悪心	DS07-1251 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃のもたれ 悪心	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
悪心	DS07-1262 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	しみ	悪心	非重篤	回復			第1次
無月経	DS07-1265 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理が無い	非重篤	不明			第1次
頭痛	DS07-1266 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	2日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	なし	不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
そう痒症	DS07-1269 (女) (57)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	かゆみ	非重篤	軽快			第1次
胸部不快感	DS07-1270 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胸が苦しい	非重篤	未回復			第1次
そう痒症 皮膚炎	DS07-1285 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	痒み 肌がザラついた	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
脱毛症	DS07-1305 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	抜け毛が増えた	非重篤	不明			第1次
発疹 皮膚炎	DS07-1306 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	顔に赤い斑点 顔面の肌荒れ	非重篤 非重篤	不明 不明	特になし	不明	第1次
腹部不快感	DS07-1315 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	胃の辺りが不快になる	非重篤	軽快			第1次
下痢	DS07-1317 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ	下痢	非重篤	未回復			第1次
動悸 頭痛	DS07-1320 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	動悸 頭の圧迫感	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
不規則月経	DS07-1321 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	生理不順	非重篤	不明			第1次
皮膚剥脱	DS07-1322 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	手の平の皮膚が剥けた	非重篤	未回復			第1次
眼瞼浮腫 紅斑	DS07-1324 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	瞼の腫れ 発赤	非重篤 非重篤	軽快 不明			第1次
口渴	DS07-1329 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ	喉の渴き	非重篤	回復			第1次
浮動性めまい 嘔吐	DS07-1331 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	頭がフラフラする 嘔吐	非重篤 非重篤	軽快 回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
湿疹	DS07-1340 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑以外)	湿疹	非重篤	回復			第1次
全身性皮疹	DS07-1345 (女) (60)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明	服用後直後に発疹が出ている点他の薬剤を服用していない点を考えると因果関係はあると思われる。また、過去にも他の薬剤で同様の発疹もでている。	可能性大	第1次
浮動性めまい 頭痛 恶心 下痢	DS08-0002 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	眩暈 頭痛、吐き気、下痢	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
動悸	DS08-0006 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	動悸	非重篤	回復			第1次
上腹部痛	DS08-0008 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃痛	非重篤	未回復			第1次
下痢	DS08-0010 (女) (80)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	服用中下痢が続き、止めると下痢が止まるので服用をやめていただく。	不明	第1次
紅斑 眼瞼浮腫 末梢性浮腫	DS08-0013 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	顔の赤み まぶたのむくみ、手の指のむくみ	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
アスペラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 アラニン・アミノトランスクエラーゼ増加	DS08-0014 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	GOT、GPTの上昇	非重篤	未回復			第1次
下痢	DS08-0020 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	他院併用薬やサプリメント等の服用なし。服用中止後症状が治まったことから、トランシーノが原因である可能性が高いと思われる。	不明	第1次
頭痛	DS08-0025 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛	非重篤	軽快			第1次
異常感 浮動性めまい	DS08-0026 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	9日間	しみ(肝斑)	気分が悪くなった	非重篤	回復	商品を購入、服用後気分が悪くなり服用中止。すぐに回復。その後2~3日服用中止し、再度一回量服用、同様の症状が出る。以上からトランシーノが影響している可能性があると考える。	可能性大	第1次
発疹 紅斑 そう痒症	DS08-0028 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)の為	発疹 発赤、かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	可能性大	不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
動悸 胸部不快感	DS08-0034 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	動悸 胸が苦しい	非重篤 非重篤	回復 回復	お仕事をされていて疲れもあったかもしれません。	不明	第1次
全身性そう痒症	DS08-0041 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	全身のかゆみ	非重篤	軽快	初めて美白目的の薬を使用され、トランシーノを飲み始めて二日という直後に全身的痒みが発症した所からトランシーノが原因と考えました。中止後回復されております。	可能性大	第1次
動悸 浮動性めまい 異常感	DS08-0042 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	しみ(肝斑)	動悸 眩暈、気分が悪くなる	非重篤 非重篤	不明 不明	併用薬、当時の体調は不明だが、服用の都度同じ症状が出ているのでトランシーノが原因と考えられる。	可能性大	第1次
皮膚炎 皮膚変色	DS08-0046 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	シミの改善	頬のただれ 左の親指の付け根が白くなつた	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
便秘	DS08-0050 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	便秘	非重篤	回復			第1次
末梢冷感 四肢痛	DS08-0051 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2・3回	不明	肝斑	手足が冷える ふくらはぎの鈍痛	非重篤 非重篤	未回復 軽快			第1次
月経過多 頻発月経	DS08-0054 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	生理期間がいつもより長引く 生理周期が早くなつた	非重篤 非重篤	回復 未回復			第1次
恶心	DS08-0059 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	吐き気	非重篤	回復			第1次
発疹	DS08-0062 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発疹(顔にぶつぶつ)	非重篤	軽快			第1次
紅斑	DS08-0072 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝斑治療	発赤(赤斑)	非重篤	回復			第1次
胸痛	DS08-0082 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	肝斑	胸が痛くなった	非重篤	軽快			第1次
そう痒症 そう痒症	DS08-0086 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	肝斑	かゆみ	非重篤	回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
感覚鈍麻 四肢痛	DS08-0089 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	左足のしびれ、痛み	非重篤	回復	トランキサム酸の副作用歴には、余り見うけられない。本剤との因果関係はうすいと思われるお客様ご自身も、トランシーノが原因かは、良くわからないとの事。	不明	第1次
そう痒症 紅斑 顔面浮腫	DS08-0090 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	痒い 赤くなった、顔のむくみ	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
頭痛 排尿困難	DS08-0093 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑	頭痛 排尿困難	非重篤 非重篤	回復 回復	因果関係については、不明だと思います。	不明	第1次
皮膚障害 皮膚のべつつき感	DS08-0094 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	肝斑	頭皮のべたつき	非重篤	未回復			第1次
浮腫 便秘	DS08-0100 (女) (33)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	むくみ 便秘	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
浮腫 感覚鈍麻	DS08-0101 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	むくみ 手のしびれ	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
下痢 動悸	DS08-0117 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	下痢 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
腹部不快感	DS08-0118 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	胃もたれ	非重篤	回復			第1次
下痢	DS08-0122 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ	下痢	非重篤	回復			第1次
下痢 血便排泄	DS08-0123 (女) (6X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢 血便	非重篤 非重篤	軽快 回復			第1次
腹痛 下痢	DS08-0124 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	腹痛 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
倦怠感	DS08-0128 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	腕がだるい	非重篤	不明			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
動悸	DS08-0135 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	動悸	非重篤	軽快			第1次
湿疹 嘔吐 下痢 発熱	DS08-0142 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑	湿疹 嘔吐、下痢、発熱	非重篤 非重篤	回復 回復		不明	第1次
発疹	DS08-0144 (女) (60)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	発疹(両腕の内側)	非重篤	回復	因果関係は不明	不明	第1次
		コンドロイチン	不明	不明							
上腹部痛	DS08-0145 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃が痛い	非重篤	回復			第1次
そう痒症	DS08-0146 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	かゆみ	非重篤	未回復			第1次
発疹	DS08-0152 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	40日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	回復	1月頃より「トランシーノ」を服用し始めたところ右ふくらはぎ付近に広範囲に紫斑が発生したのでどうしたらよいかとの相談があり、見せて頂きました。私は医者ではないので断定的な事は申し上げられませんが確かに青紫色で径20cm以上の紫斑(血管腫)らしい異常と判断したので、心臓血管外科で受診されるよう紹介しました。又急な服用中止による副作用を防止するためビタミンC剤を服用する様にして頂きました	可能性大	第1次
下痢 顔面浮腫	DS08-0153 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	下痢 顔面右側の腫れ	非重篤 非重篤	回復 回復	医師の見解と同様、因果関係は不明と思われます。	不明	第1次
頭痛	DS08-0154 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	頭が痛い	非重篤	回復	服用中止後、症状が治まった為、お客様は返金処理で納得して頂いた。	不明	第1次
倦怠感 動悸	DS08-0156 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	体がだるくなる 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
発疹 紅斑 そう痒症	DS08-0157 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	肝斑	発疹 発赤、かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
動悸	DS08-0158 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	動悸	非重篤	回復			第1次
腹部不快感 発疹	DS08-0159 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃部不快感 吹出物	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
口唇障害 口唇痛 口の感觉鈍麻	DS08-0160 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	唇が紫色 下唇がしみる、唇のしびれ	非重篤 非重篤	未回復 回復			第1次
発疹	DS08-0161 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	発疹(顔、臀部)	非重篤	軽快	服用を中止した後に発疹が治まってきたことより、トランシーノとの因果関係は否定できない。	不明	第1次
胸痛	DS08-0162 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胸の辺りがチクチクする	非重篤	不明			第1次
眼瞼そう痒症 眼瞼浮腫	DS08-0164 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	まぶたに痒み	非重篤	回復	なし	不明	第1次
下痢	DS08-0165 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	下痢	非重篤	不明			第1次
皮膚乾燥	DS08-0167 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	顔の右側の耳の前の肌がザラザラになった	非重篤	不明	特になし。	不明	第1次
口内炎 口腔咽頭痛 歯肉腫脹	DS08-0168 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	口内炎 喉の痛み、歯ぐきの腫れ	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
頭痛	DS08-0175 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛	非重篤	回復			第1次
過少月経	DS08-0176 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	月経量の減少	非重篤	未回復			第1次
末梢性浮腫	DS08-0178 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	足のむくみ	非重篤	回復			第1次
そう痒症 紅斑	DS08-0179 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	皮膚の痒み 皮膚が少し赤くなった	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹	DS08-0184 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	軽快	御本人様の体質に合わなかったかと思われます。	不明	第1次
頭痛 悪心	DS08-0189 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛 吐き気	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
倦怠感	DS08-0192 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	体がだるい	非重篤	回復			第1次
感觉鈍麻	DS08-0193 (女) (46)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明日間	しみ(肝斑)	手のしびれ	非重篤	軽快	特になし	不明	第1次
そう痒症	DS08-0194 (女) (53)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	痒み(腕の内側、太腿)	非重篤	回復	服用後、すぐに症状が出ていた点、服用中止後、何も症状がない点等からみて、トランシー／の成分による、軽い副作用(アレルギー症状)だったと思います。	可能性大	第1次
下痢 上腹部痛	DS08-0195 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	1～3回	8日間	しみ	下痢 胃痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
片頭痛 月経困難症 過少月経	DS08-0197 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	片頭痛 生理痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
恶心 腹痛	DS08-0201 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	吐き気 腹痛	非重篤 非重篤	軽快 軽快	胃腸風邪の流行していた時ですので、本当に薬の副作用かは不明	不明	第1次
そう痒症	DS08-0202 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	かゆみ	非重篤	回復	体質に合わなかったと考えられます。	可能性大	第1次
頭痛 食欲減退 消化不良 腹痛	DS08-0204 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	しみ(肝斑)	頭痛 食欲不振、胸やけ、腹痛	非重篤 非重篤	不明 不明	因果関係は不明だが、上記の副作用と疑われる症状が出た為、服用の中止を勧めた。	不明	第1次
下痢 下痢 腹痛	DS08-0206 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	軟便 下痢、腹痛	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次
頭部不快感	DS08-0208 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭が重い	非重篤	不明			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
紅斑	DS08-0210 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑	発赤	非重篤	不明			第1次
食欲減退 末梢性浮腫 四肢痛	DS08-0220 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	食欲不振 足のむくみ、足の痛み	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
希発月経	DS08-0222 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	生理が遅れる	非重篤	未回復			第1次
発疹 そう痒症	DS08-0226 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
浮動性めまい	DS08-0231 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明	しみ(肝斑)	めまい	非重篤	回復	体力が低下していた為、症状がでたかもしれない		不明 第1次
		(不明)	不明	不明							
末梢性浮腫	DS08-0234 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	しみ(肝斑)	足のむくみ	非重篤	軽快	特になし		不明 第1次
そう痒症	DS08-0236 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	かゆみ	非重篤	未回復			第1次
そう痒症 発疹	DS08-0238 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	赤み 痒み	非重篤 非重篤	回復 回復	その方の母親もトランシーノを飲まれて、かゆみ が出たという先入観で服用されているので、起 こりやすい状況にあったと考えられる。		不明 第1次
末梢性浮腫 感觉鈍麻	DS08-0240 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	右足のむくみ 右足のしひれ	非重篤 非重篤	回復 回復			第1次
発疹	DS08-0244 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ緩和	発疹	非重篤	回復	年令が50才以上という事もあり、また本人が神 経質、またアレルギーがあったのでは?肌が弱 い為。とにかく色白を好みすぎ!		確実 第1次
末梢性浮腫 便秘	DS08-0246 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	むくみ 便秘	非重篤 非重篤	不明 不明	春はいろんな意味でストレスを感じる季節だと 聞いている。その場合最初に胃腸に影響を受 けると思っているのでそんな影響もあるのでは ないかと感じた。		可能性小 第1次
消化不良	DS08-0248 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ	胸やけ	非重篤	回復			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
四肢痛	DS08-0252 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	足の痛み	非重篤	未回復			第1次
発疹	DS08-0253 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ	発疹	非重篤	軽快			第1次
下痢	DS08-0256 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢	非重篤	回復			第1次
腹痛	DS08-0257 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	6日間	しみ(肝斑)	胃がムカムカし吐き気	非重篤	回復	多少神経質なところが垣間見えるお客様で、目立った肝斑でもなく胃腸も弱いということで一度お断わりしたが、どうしても服用したいということでお断りしたが、胃腸が痛くムカつくということでした。因果関係は無いとはいえないが、別の要因もあるのではないか	可能性小	第1次
		血圧低下剤、糖尿病用剤	不明	不明							
顔面浮腫 紅斑	DS08-0258 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	顔半分腫れた	非重篤	回復			第1次
乳腺炎	DS08-0267 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	乳腺が腫れてきた	非重篤	未回復			第1次
頭痛	DS08-0274 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	頭痛	非重篤	未回復			第1次
頭部不快感	DS08-0276 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭重	非重篤	未回復			第1次
浮動性めまい 重感 血管収縮	DS08-0278 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	めまい 足が重い、足の血管が浮き出ている	非重篤 非重篤	回復 未回復			第1次
上腹部痛	DS08-0281 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~3回	不明	しみ	胃痛	非重篤	未回復			第1次
そう痒症 眼充血 鼻閉	DS08-0286 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	かゆみ 目の黒目の周りが赤く充血、 鼻が詰まる	非重篤 非重篤	回復 回復	アレルギー体质が原因ではないかと思われます。	不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
頭痛	DS08-0289 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	不明	トランシーノ(トラネキサムサン)服用後の頭痛との事。因果関係は低いと思われ、何か他の原因だと思います。(他の商品に関してもクレームが多い方)	不明	第1次
		胃腸薬	不明	不明							
熱感 下痢 頭痛	DS08-0294 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4~5日間	しみ(肝斑)	頭ののぼせ 軟便	非重篤 非重篤	回復 回復	服用以前より、頭痛をお持ちの方なので、副作用に関する細部に至るまでは、わかりかねます。又、ご家族の方で心筋梗塞を患つた方もいると聞き、遺伝性によるものかどうかの判断もつきかねます。店側の対応としましては、やはり使用を中止して頂き、症状が続く、もしくは発現の場合は、医療機関の受診をお勧めする方法をとらざるを得ません。	不明	第1次
光視症 動悸 頭部不快感	DS08-0296 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	目がチカチカ 動悸、頭が重い	非重篤 非重篤	回復 未回復			第1次
発疹 そう痒症	DS08-0303 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	荨麻疹	非重篤	不明	ご本人に当日の体調についていたところ、生理の終わり(頃)でした。とのこと。女性はその時によって体調が変化しているため、説明の際に必要であったかも。今回は購入に際し説明をちゃんと聞いてください、納得の上だったり大事にならずよかったですと思いますが、販売に関して本人の体調にまで話を広げて接客できると副作用も減るかもしれません。	可能性大	第1次
下痢	DS08-0312 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	11日間	肝斑	下痢	非重篤	回復			第1次
浮腫	DS08-0321 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	むくみ	非重篤	未回復			第1次
上腹部痛	DS08-0322 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胃痛	非重篤	未回復			第1次
化膿	DS08-0325 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明	肝斑	頭の傷が化膿	非重篤	回復	服用した時期が偶然重なってしまったのだと思います。	可能性小	第1次
そう痒症 発疹	DS08-0329 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)の治療	痒み 発疹	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
腹部不快感	DS08-0330 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	胃もたれ	非重篤	回復	トランシーノ服用後に胃もたれの症状が出たとのことなので、服用を中止してもらった。	不明	第1次
腹痛	DS08-0335 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	急にお腹が痛くなった	非重篤	回復			第1次
発疹	DS08-0338 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	25日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明	服用後、1週間目頃より、ポツポツと発疹が出現してきたので本品による副作用の可能性が大きいと感じました。又これ以外に疑われるような原因は無いと思いました。	可能性大	第1次
四肢痛	DS08-0342 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	痛み(足首)	非重篤	不明	⑨の中に書いています。	不明	第1次
湿疹 そう痒症	DS08-0343 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明日間	しみ(肝斑)	首周りの湿疹	非重篤	不明	トランシーノ服用直後にでた症状であるため、それが原因であると思われるが、その後来店していただいてないため、くわしくは不明です。	不明	第1次
頭痛	DS08-0355 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	頭痛	非重篤	未回復			第1次
発疹 そう痒症	DS08-0358 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第1次
下痢	DS08-0361 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ	下痢	非重篤	未回復			第1次
下痢 食欲減退 腹痛	DS08-0362 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ	軟便 食欲不振、腹痛	非重篤 非重篤	回復 軽快			第1次
下痢	DS08-0364 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑治療	軟便	非重篤	未回復			第1次
湿疹 下痢 脈圧上昇 不正子宮出血 浮腫 頭痛	DS08-0373 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	湿疹 下痢、ふくらはぎとこめかみ の脈動感、不正出血、むくみ	非重篤 非重篤	不明 不明	不明ではあるが因果関係はないものと思われる。	不明	第1次
月経過多 皮膚剥脱 そう痒症	DS08-0384 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	月経量が増えた 鼻の頭の皮がめくれた、体がかゆくなつた	非重篤 非重篤	回復 回復	副作用が現れたのか服用されて、直後でないので本品が副作用かどうか疑わしい思われます。	不明	第1次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
紅斑 湿疹	DS08-0385 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	発赤 湿疹	非重篤 非重篤	回復 回復	副作用としては、胃腸障害が多く、皮膚湿疹 は、当店では、始めてです。	不明	第1次
紅斑	DS08-0390 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明	しみ(肝斑)	赤い点々	非重篤	不明	不明。	不明	第1次
下痢 腹部不快感 恶心	DS08-0391 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	下痢 胃もたれ、むかつき	非重篤 非重篤	回復 軽快			第1次
不正子宮出血	DS08-0393 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	出血	非重篤	不明			第1次
発疹	DS08-0394 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	吹き出物が増えた	非重篤	未回復			第1次
発疹	DS08-0399 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝斑)	口の周辺及び頬の上に発疹	非重篤	回復	アレルギー体質の為。	可能性大	第1次
下痢	DS08-0421 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	軟便	非重篤	未回復			第2次
そう痒症 発疹	DS08-0425 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	痒み 発疹	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
不正子宮出血	DS08-0426 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	不正月経血	非重篤	回復			第2次
消化不良	DS08-0431 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	胃もたれ	非重篤	回復			第2次
発疹	DS08-0438 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	眼の周りがカサカサ かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第2次
上腹部痛	DS08-0439 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胃痛	非重篤	回復			第2次
恶心	DS08-0440 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	気分が悪くなる めまいがする	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹	DS08-0442 (女) (59)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	5日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明	服用後5日経過後の発現なので、可能性が低いが、皆無ではない。	可能性小	第2次
消化不良 恶心	DS08-0449 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	心臓が苦しい 吐気	非重篤 非重篤	不明 不明			第2次
発疹	DS08-0451 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	顔の腫れ	非重篤	不明	カウンセリングをしっかり行い、販売し納得して購入頂きました。	不明	第2次
上腹部痛	DS08-0452 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃痛	非重篤	回復			第2次
下痢	DS08-0453 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	服用中に下痢が発生したが、ビタミンC剤服用で下痢の発生はないとの話から、本剤との因果関係は不明と考える。	不明	第2次
下痢 恶心	DS08-0458 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	軟便 吐き気	非重篤 非重篤	回復 未回復			第2次
発疹	DS08-0465 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	脇の下や胸にボンボン	非重篤	不明			第2次
恶心	DS08-0469 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	吐気	非重篤	回復	一度限りの服用で本品による頭痛がおこるとは考えにくい。ただし、吐気に関しては様々な薬でおこりうるものなので不明とした。	不明	第2次
顔面感覺鈍麻 感觉鈍麻 霧視	DS08-0473 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	左半身のしびれ 左目のかすみ	非重篤 非重篤	回復 回復	服用中に副作用の症状が発現し、服用を中止すると回復されたことから、同品との因果関係の可能性もあるかと考える。(他に併用薬もないことを合わせて)	可能性小	第2次
恶心 倦怠感	DS08-0477 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ	胃のむかつき 体がだるい	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
そう痒症 浮腫 排尿困難	DS08-0481 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	痒み 頬が赤く腫れた、尿の出が悪くなつた、むくみ	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	不明	第2次
恶心	DS08-0488 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	吐き気	非重篤	回復	服用した後、その薬に対し、疑わしいと思われ、しかも、又再度服用され、発現したことから、関係は有ると思うことが順当ではないでしょうか。	可能性大	第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹	DS08-0489 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	顔にぼつぼつ	非重篤	不明			第2次
湿疹	DS08-0491 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	腕に湿疹 顔に湿疹	非重篤 非重篤	未回復 回復			第2次
そう痒症	DS08-0495 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	顔全体のかゆみ	非重篤	回復	特になし	不明	第2次
下痢	DS08-0496 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	下痢	非重篤	軽快			第2次
耳鳴 恶心	DS08-0508 (女) (53)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	耳鳴り 恶心	非重篤 非重篤	回復 回復	医師の診断がないため、不明	不明	第2次
随伴疾患悪化 口腔粘膜紅斑 消化不良 上腹部痛	DS08-0510 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑	歯痛(歯肉内うっ血による痛 み) 口内炎様発赤、胸に締め付 けられるような痛み	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
嘔吐 下痢	DS08-0515 (女) (2X~3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	嘔吐 下痢	非重篤 非重篤	不明 不明	先にメーカーのお客様センターに連絡、その後 当店に連絡。第一三共ヘルスケア(担当者)より販取来店を伝えられ、返金した。	不明	第2次
感覺鈍麻 頭痛	DS08-0516 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑	しびれ(指先) 頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
発疹	DS08-0517 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~2回	2日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	不明		不明	第2次
下痢	DS08-0519 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	下痢	非重篤	未回復			第2次
恶心 上腹部痛 腹痛 下痢	DS08-0521 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	肝斑	吐き気 胃痛、腹痛、下痢	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第2次
下痢	DS08-0523 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢	非重篤	未回復			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
無月経	DS08-0527 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	46日間	しみ(肝斑)	生理がなくなった	非重篤	不明	トランサミンは、生理の出血量を低下させるためにもちいることが有る。そのため、トランシーノを服用すると生理の量は低下することになり、生理stopとまでは行かないと思う。でも、肝斑は女性ホルモン...と商品が云っている以上、生理がどうこうとなるとだれでも女性ホルモンとトランシーノの関係を考えてしまう。相互作用や、生活的なことも考えて、トランシーノの服用注意を考えるべきだと思う。	可能性小	第2次
		コラーゲン、その他の滋養 強壮葉	不明	不明							
発疹 そら痒症 紅斑	DS08-0532 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	発疹 痒み、赤み	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
倦怠感 熱感 食欲減退 嘔吐	DS08-0536 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	体がだるくなった 熱くなったり、食欲不振、嘔吐	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
湿疹	DS08-0540 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	32日間	肝斑	全身に湿疹	非重篤	軽快			第2次
下痢 腹痛	DS08-0544 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢 腹痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
発疹 そら痒症 浮腫	DS08-0546 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発疹 痒み、むくみ	非重篤 非重篤	回復 不明			第2次
そら痒症 希発月経	DS08-0547 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	痒み 1年振りの生理	非重篤 非重篤	回復 未回復			第2次
下痢	DS08-0553 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	お腹が張った 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
紅斑 そら痒症	DS08-0555 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	しみ	赤み かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 回復			第2次
下痢	DS08-0559 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	他の薬剤との併用はないが、トランシーノ服用後に起こる下痢症状は服用中止により改善されている。トランシーノ成分が直接関与しているかどうかは不明であるが、疑う余地はある。	不明	第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
頭痛	DS08-0561 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	特に問題ありません。	可能性小	第2次
そう痒症 腹部不快感 発疹	DS08-0564 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	搔痒感 胃部不快感、発赤	非重篤 非重篤	不明 不明	他剤との併用をしているため、直接同品と因果関係があるとは断定できない。	可能性小	第2次
		その他のビタミン剤	不明	不明							
下痢	DS08-0567 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	下痢	非重篤	不明			第2次
腹痛	DS08-0568 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	腹痛	非重篤	回復			第2次
下痢	DS08-0569 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	お腹がゆるくなった	非重篤	未回復			第2次
発疹	DS08-0570 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	湿疹	非重篤	回復	服用後すぐに湿疹が発現、中止すると回復した事から因果関係は大きいと思われる。	可能性大	第2次
湿疹 そう痒症	DS08-0575 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 回復			第2次
浮動性めまい 倦怠感 傾眠	DS08-0580 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	6日間	肝斑	ふらつき 倦怠感、眠気	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
そう痒症	DS08-0581 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝斑)	かゆみ	非重篤	軽快	因果関係は不明であり、本人は服用を続ければいい意志が十分あるが、一撃中止が良いと思われる。	不明	第2次
発疹	DS08-0585 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ	発疹	非重篤	未回復			第2次
恶心 動悸	DS08-0588 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	吐き気 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復	お客様の体調に適さず、副作用の症状が発現されたと考えられます。	不明	第2次
下痢	DS08-0590 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢	非重篤	回復			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
湿疹 下痢	DS08-0594 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	41日間	肝斑	湿しん、下痢	非重篤	回復			第2次
無力症 浮動性めまい	DS08-0595 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	力が入らない めまい	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
発疹	DS08-0603 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ改善	発疹	非重篤	未回復			第2次
消化不良 恶心	DS08-0612 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	胸焼け 胃がムカムカ	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
胸部不快感	DS08-0615 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	胸の圧迫感	非重篤	回復	だれでもその薬剤にアレルギーあることあります。	不明	第2次
下痢 頭痛	DS08-0616 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	軟便 頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
恶心	DS08-0617 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	胃がムカムカする	非重篤	回復	因果関係は不明ですがお客様の体質に合わなかった為、症状が発現したものと思われます。	不明	第2次
恶心	DS08-0625 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)改善	胃のむかつき	非重篤	回復			第2次
食欲減退 下痢 腹痛	DS08-0629 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	食欲不振 軟便、下痢	非重篤 非重篤	軽快 軽快	服用直後の副作用であることと、使用中止直後に軽快に向かったことを考え、本品との因果関係を可能性大とします。ただし、体調不良等の原因も十分に考えられます。	可能性大	第2次
潮紅	DS08-0633 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	顔のむくみ 顔全体の赤み	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
全身性そう痒症	DS08-0634 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	全身にかゆみ	非重篤	回復			第2次
恶心	DS08-0638 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ	気持ちが悪くなった	非重篤	回復			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹	DS08-0641 (男) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	水疱瘡のような湿疹	非重篤	回復			第2次
不正子宮出血	DS08-0642 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	肝斑	不正出血	非重篤	未回復			第2次
過少月経 頭痛 月経過多	DS08-0652 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	生理の際の出血量が減った	非重篤	回復	今夏、クーラーによる冷えなどの症状も強かつたという話などから、(体調も崩れていた様子)、今回の月経異常が発現したと思われる。	不明	第2次
発疹	DS08-0654 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	吹き出物	非重篤	未回復			第2次
頭痛	DS08-0655 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~2回	2日間	肝斑	頭痛	非重篤	回復			第2次
腹痛	DS08-0659 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	回復	特になし		第2次
下痢	DS08-0660 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ	下痢	非重篤	未回復			第2次
便秘 腹部不快感	DS08-0665 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	胃の調子が悪い 便秘	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
紅斑	DS08-0671 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	34日間	しみ(肝斑)	発赤	非重篤	未回復			第2次
紅斑 そう痒症 恶心 嘔吐	DS08-0675 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	嘔吐 赤くなったり、かゆみ、気持ち悪くなったり	非重篤 非重篤	回復 回復	服用中に発疹とかゆみ、嘔吐の症状から同品との因果関係が考えられる。	可能性小	第2次
そう痒症	DS08-0684 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	顔の痒み	非重篤	未回復			第2次
発疹	DS08-0695 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の緩和	吹き出物	非重篤	未回復			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
下痢	DS08-0698 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	因果関係は不明です。夏場の体力低下ほか食事の関係も否定できません。飲んで直ぐなでお薬が合わなかったとも考えられますので、服用中止をおねがいしました。	不明	第2次
発疹 そう痒症	DS08-0700 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	荨麻疹(首から胸)	非重篤	未回復			第2次
下痢	DS08-0704 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	トランシーノのいづれかの成分がお客様に合わない為、発現したと思われます。	可能性大	第2次
発疹 そう痒症	DS08-0716 (女) (34)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	私が伺ったお話では、お食事の後じんましんの様な症状ができるという事ですが、本品(トランシーノ)との因果関係は不明です。	不明	第2次
恶心 食欲減退	DS08-0720 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃が重い感じ	非重篤	未回復			第2次
消化不良 硬便	DS08-0721 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	胸の痛み 便が硬くなつた	非重篤 非重篤	回復 未回復			第2次
下痢	DS08-0725 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	お腹がゆるくなる	非重篤	不明			第2次
下腹部痛 下痢	DS08-0729 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	下腹部痛 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
発疹	DS08-0734 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	発疹	非重篤	未回復			第2次
発疹 そう痒症 浮腫	DS08-0744 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	荨麻疹 むくみ	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
過少月経	DS08-0761 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	月経量が少なめ	非重篤	未回復			第2次
発疹 そう痒症	DS08-0766 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3または1回	16日間	肝斑	痒い ブツブツ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
湿疹 全身性そ痒症	DS08-0771 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
恶心 食欲減退	DS08-0775 (女) (57)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃もたれ	非重篤	未回復			第2次
恶心 食欲減退 嘔吐	DS08-0777 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	24日間	しみ(肝斑)	恶心 食欲不振、嘔吐	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
恶心	DS08-0781 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	気分が悪い	非重篤	回復			第2次
頭部不快感 消化不良 下痢	DS08-0800 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	頭が重い感じ 脚焼け、お腹が緩くなった	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
頭痛 湿疹 そ痒症	DS08-0801 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	肝斑	頭痛 湿疹、かゆみ(両手の甲)	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
発疹 そ痒症	DS08-0802 (女) (51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	40日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	回復	お客様のご様子から、断言は出来ないが、本剤の副作用とは思われない。添付文書を読み、副作用を疑われたのではないか…その後、受診されたとの情報もない	不明	第2次
上腹部痛	DS08-0804 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝斑)	胃痛	非重篤	回復	もともと胃が弱い方だったのかもしれません。	可能性小	第2次
下痢	DS08-0813 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	今回発現した下痢の症状は体質にあわなかつたものと思われる。	不明	第2次
恶心	DS08-0816 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	ムカムカ 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復	2度とも服用後30分ほどしてから症状が発現しており、服用中止後に回復し、その後も症状がないので、可能性は高いと思います。	可能性大	第2次
消化不良	DS08-0822 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胸がキュンと痛くなるような感じ	非重篤	回復			第2次
発疹	DS08-0823 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	11日間	しみ(肝斑)	発疹(背中、胸)	非重篤	不明	本症例については、口答で確認したが、本剤が原因であるとは思えない。しかしこのような(発疹)ケースがどれ位あるか、不明であったので、御社に連絡した。	不明	第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
消化不良	DS08-0826 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胸焼け	非重篤	不明			第2次
頭痛	DS08-0829 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	頭痛	非重篤	回復			第2次
恶心	DS08-0830 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ	胃のむかつき	非重篤	未回復			第2次
湿疹	DS08-0831 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	湿疹(首から顔に)	非重篤	未回復			第2次
恶心	DS08-0833 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	恶心	非重篤	回復			第2次
下痢	DS08-0843 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	下痢	非重篤	回復			第2次
上腹部痛 消化不良	DS08-0850 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	胃の調子が悪くなった	非重篤	不明	この方は、元々胃が弱い方です。少しの胃痛なら服用しようと思っていらしたが、胸やけがガマンできなかつたとのこと。精神的な原因も考えられるのでは…	可能性大	第2次
消化不良	DS08-0857 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑	胸焼け	非重篤	回復			第2次
嘔吐	DS08-0878 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	吐いた	非重篤	回復			第2次
紅斑 そう痒症	DS08-0888 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
発疹	DS08-0889 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	発疹	非重篤	不明			第2次
恶心	DS08-0891 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑	吐気	非重篤	回復			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
そう痒症	DS08-0894 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	かゆみ(発症部位不明)	非重篤	軽快	、		第2次
腹部不快感 口内炎	DS08-0910 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	3回	17日間	肝斑	胃重 口内炎	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
希発月経	DS08-0919 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	生理が予定より遅れた	非重篤	不明			第2次
発疹 そう痒症	DS08-0922 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	軽快 軽快	体調が万全でない状態で服用されたため、因果関係については可能性小と考える。	可能性小	第2次
白斑	DS08-0926 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	肌の色が抜けて白くなった	非重篤	未回復			第2次
不正子宮出血	DS08-0930 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	不正出血	非重篤	未回復			第2次
食欲減退	DS08-0931 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	食欲不振	非重篤	回復			第2次
恶心	DS08-0937 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	気分が悪くなった	非重篤	回復			第2次
感觉鈍麻 末梢冷感	DS08-0957 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	その他(美白)	手足のしびれ 手足の冷え	非重篤 非重篤	回復 回復	エバユースホワイトを以前、服用の際は、問題なかった事を考えると、トラネキサム酸による可能性もあるが、何か他のお薬をお飲になられて、上記の症状が出たとも考えられます。	不明	第2次
下痢	DS08-0973 (女) (5X)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	軽快	今まで"その他のビタミン剤"服用時には下痢がなく、トランシー／ノ服用後に軽い下痢になったとのことです。原因は不明であるがトランシー／ノ含有成分のビタミン剤かトラネキサム酸である可能性が高いです。	可能性大	第2次
浮動性めまい	DS08-0978 (女) (66)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	めまい	非重篤	未回復			第2次
便秘	DS08-0985 (女) (不明)	トランシー／ノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	便秘	非重篤	未回復			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
上腹部痛	DS08-0986 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃痛	非重篤	回復			第2次
頭痛 恶心	DS08-0991 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	頭痛 胃がむかつく	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
発疹 そう痒症	DS08-0993 (女) (50)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	発疹 痒み	非重篤 非重篤	不明 不明	服用4回目で発現していることからみて本剤による副作用の可能性が大と考えます。(また他に服用した薬剤もなく、既往症や合併症もないというので)	可能性大	第2次
消化不良	DS08-0999 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	物が胸につかえる感じ	非重篤	未回復			第2次
動悸	DS08-1001 (女) (56)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	動悸	非重篤	回復			第2次
下痢	DS08-1003 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	下痢	非重篤	未回復			第2次
発疹 そう痒症	DS08-1007 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	荨麻疹が顔に出た	非重篤	軽快			第2次
口渴	DS08-1008 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明日間	しみ(肝斑)	口渴	非重篤	回復	口渴なので人によっては有りうる	不明	第2次
嘔吐	DS08-1015 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	肝斑	嘔吐	非重篤	回復			第2次
浮腫 感覺鈍麻 疼痛	DS08-1021 (女) (4X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝斑)	肩が重痛い	非重篤	不明	患者様、ご来店時のご相談内容が、更年期の症状を伴う冷え・多汗・のぼせであったため、漢方製剤などで考えてみたが、ヘビーな方ではなかったのと、肩こり・腰痛・冷えのポイントが高く、顔の肝斑が頗る悪かったため、OTC唯一の肝斑治療薬との併用をお勧めした。副作用とは言えず、もともとむくみをもつておられた方が四物湯を温服で水分を過度に摂取されたため、水分代謝がバランスをくずしたと考えられる。	不明	第2次
		人参四物湯	3回	6日間							

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
消化不良	DS08-1023 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	肝斑	胸焼け	非重篤	未回復			第2次
頭痛 眼充血	DS08-1030 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	頭痛 目の充血	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第2次
そう痒症 発疹	DS08-1031 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	肝斑	痒み 発疹	非重篤 非重篤	軽快 軽快		不明	第2次
頭痛 胸痛 消化不良	DS08-1034 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	頭痛 胸の痛み、胸焼け	非重篤 非重篤	軽快 回復			第2次
紅斑	DS08-1040 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	目の周りが赤くなった	非重篤	未回復			第2次
爪変色 月経困難症	DS08-1044 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	足の爪の色が青くなった 生理が重くなった	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
腹痛	DS08-1051 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	腹痛	非重篤	未回復			第2次
腹痛 便秘 腹部膨満	DS08-1065 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	お腹の張り 腹痛、便祕気味	非重篤 非重篤	不明 不明			第2次
頭痛	DS08-1069 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	頭痛	非重篤	不明			第2次
上腹部痛	DS08-1071 (女) (57)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃が痛い	非重篤	回復			第2次
腹部不快感	DS08-1077 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胃もたれ	非重篤	未回復			第2次
第7脳神経障害 眼瞼下垂	DS08-1086 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑の改善	顔面(右半分)の痺れ 瞼が垂れてきた	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第2次
頭痛 筋骨格硬直	DS08-1094 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	頭痛 肩が重い	非重篤 非重篤	回復 回復	ペラックT錠に使用されていて長期に服用している人もあり。安全面高く原因不明	可能性小	第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
肝機能異常	DS08-1105 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	肝機能悪化	非重篤	不明			第2次
下痢	DS08-1106 (女) (58)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	下痢	非重篤	回復			第2次
頭痛	DS08-1110 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	頭痛のような症状	非重篤	回復			第2次
便秘 不眠症	DS08-1117 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	便秘 不眠、肌荒れ	非重篤 非重篤	回復 未回復			第2次
消化不良	DS08-1126 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ	胸やけ	非重篤	回復			第2次
倦怠感	DS08-1130 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	だるい	非重篤	回復	50才前後と思われる所以薬が合わなかつたものと考えられる。	可能性小	第2次
上腹部痛	DS08-1162 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ改善	胃痛	非重篤	回復			第2次
胸痛	DS08-1167 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	胸が締め付けられるような感じ	非重篤	回復			第2次
頭部不快感	DS08-1168 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	頭が重い	非重篤	未回復			第2次
恶心	DS08-1172 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	吐き気	非重篤	回復			第2次
発声障害	DS08-1181 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	声が嗄れる	非重篤	未回復			第2次
浮動性めまい	DS08-1184 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝斑)	ふらつき	非重篤	未回復			第2次
下痢 嘔吐 腹痛	DS08-1191 (女) (53)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝斑)	軟便 嘔吐、腹痛、下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	特になし	不明	第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
紫斑	DS08-1198 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝班の改善	右腕の紫斑	非重篤	回復			第2次
恶心 消化不良	DS08-1202 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝班)	吐き気 胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復	使用一週間後の、副作用発現であり、体調などの原因も考えられます。因果関係は、可能性として低いと、思います。	可能性小	第2次
そう痒症 紅斑	DS08-1203 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	15日間	しみ(肝班)	搔痒感 発赤	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
頭痛	DS08-1204 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	頭痛	非重篤	回復			第2次
消化不良	DS08-1220 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝班	胸が締め付けられる感じ	非重篤	回復			第2次
浮腫	DS08-1222 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝班)	右足のむくみ 首周りの張り	非重篤 非重篤	回復 回復	もどもと、血行も悪い方で、むくみやすい体质であるという点や他のビタミン剤等も服用されている事から、トランシーノとの因果関係は可能性小と考えられます	可能性小	第2次
		その他の滋養強壮薬、ビタミンE製剤	2回	不明							
浮腫 動悸	DS08-1223 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝班)	むくみ 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復	服用後の翌日に発現した症状ではありますが、体調などの原因も否定はできませんので、トランシーノとの因果関係は可能性小と考えられます。	可能性小	第2次
動悸	DS08-1253 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝班)	心臓が痛くなった	非重篤	回復	服用2日後の症状という事ですが、その日の体調やどの程度の動悸かは不明であり、当薬との関係は不明です。	不明	第2次
発疹	DS08-1270 (女) (51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝班)	湿疹	非重篤	軽快	2回服用して発疹が発現しているので、トランシーノの可能性も疑われるが、体調の良・不良も影響されるので、原因として確認しづらい。	可能性小	第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
眼瞼浮腫	DS08-1275 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明日間	しみ(肝斑)	まぶたの腫れ	非重篤	回復	お客様曰く、以前化粧品使用時にも今回同様のまぶたのハレがあったご様子で、その際も、使用を中止して回復された様です。又、両症状発現時に共通するのは、お客様ご自身が「疲れている時期」に使用、若しくは服用されたとの事で、本剤との因果関係は不明と捉えていません。	不明	第2次
		コレステロール低下剤	不明回	不明							
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	DS08-1283 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	γ-GTP上昇	非重篤	未回復			第2次
浮動性めまい	DS08-1284 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	7日間	しみ(肝斑)	めまい	非重篤	回復	めまいは不安やストレスによっても起るので様々な原因が考えられるが丁度服用1週間目位にめまいが起き服用を中止するとなおったと云われる所以可能性は否定出来ないと思われます	不明	第2次
眼瞼炎	DS08-1290 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	まぶたのヒリヒリ感	非重篤	未回復			第2次
ほてり	DS08-1302 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	頬のほてり	非重篤	回復			第2次
発疹	DS08-1305 (女) (37)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	発疹	非重篤	回復			第2次
湿疹	DS08-1312 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	湿疹	非重篤	未回復			第2次
消化不良 感覺鈍麻	DS08-1342 (女) (33)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	胸焼け 手のしびれ	非重篤 非重篤	回復 回復	初めての服用であり、また服用後に症状が現わっている事より因果関係については可能性大と考える。	可能性大	第2次
湿疹	DS08-1360 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	湿疹	非重篤	回復			第2次
嘔吐 腹痛 下痢	DS08-1368 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	恶心、嘔吐 腹痛、下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	本人様もおっしゃっていたが、トランシーノによる副作用かどうかは分からぬ。体調が悪かつただけかもしれないが、2度症状が出たので、そういうなのかもしれない。	不明	第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
頭痛 筋骨格硬直	DS08-1401 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	頭痛 肩こり	非重篤 非重篤	不明 不明			第2次
消化不良	DS08-1418 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	胸の痛み	非重篤	回復			第2次
恶心	DS08-1423 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	むかつき	非重篤	回復			第2次
浮動性めまい 恶心	DS08-1461 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	27日間	不明	めまい 恶心	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
恶心 下痢	DS08-1482 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	気持ち悪い 下痢	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
恶心 食欲減退	DS08-1483 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃が重くなる	非重篤	回復			第2次
動悸	DS08-1500 (女) (55)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	心悸亢進	非重篤	回復			第2次
発疹	DS08-1521 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ	発疹	非重篤	未回復			第2次
不規則月経	DS08-1527 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理が止まった	非重篤	未回復			第2次
発疹 頭痛	DS08-1535 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	発疹 頭痛	非重篤 非重篤	不明 不明			第2次
倦怠感	DS09-0005 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	体のだるさ	非重篤	未回復			第2次
顔面浮腫	DS09-0006 (女) (69)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	顔のむくみ	非重篤	未回復			第2次
消化不良 下痢	DS09-0007 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	胸やけ 下痢	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
頭痛	DS09-0026 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑	頭痛	非重篤	軽快			第2次
下痢	DS09-0034 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	下痢	非重篤	未回復			第2次
不正子宮出血	DS09-0046 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理周期の乱れ	非重篤	未回復			第2次
食欲減退	DS09-0069 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	食欲不振 苦味を感じる	非重篤 非重篤	未回復 不明			第2次
恶心 食欲減退	DS09-0079 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	恶心 食欲不振	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
下痢	DS09-0091 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	下痢	非重篤	不明			第2次
上腹部痛	DS09-0108 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	胃痛	非重篤	回復			第2次
不正子宮出血	DS09-0127 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	不正出血	非重篤	未回復			第2次
そう痒症 発疹	DS09-0128 (女) (30)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	かゆみ 発疹	非重篤 非重篤	回復 回復		可能性大	第2次
胸部不快感	DS09-0129 (女) (66)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	胸が苦しい	非重篤	回復			第2次
トランシーノ 発疹	DS09-0130 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	トランシーノ 発疹	重篤	軽快	トランシーノの回復が遅い。 発疹も全く治まらない。 トランシーノの回復が遅い。 発疹も全く治まらない。 トランシーノの回復が遅い。 発疹も全く治まらない。	可能性大	第2次
下痢 腹痛	DS09-0132 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	軟便 腹痛	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
不規則月経	DS09-0133 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理不順	非重篤	未回復			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
倦怠感 傾眠 食欲減退 胸痛	DS09-0141 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	倦怠感 眼気、食欲不振、胸の痛み	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第2次
そう痒症 紅斑	DS09-0142 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ	かゆみ 発赤	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第2次
そう痒症	DS09-0143 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	かゆみ	非重篤	未回復			第2次
頭痛 消化不良	DS09-0151 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	3日間	肝斑	頭痛 胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
頭痛 恶心 そう痒症	DS09-0155 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛 吐気、皮膚の痒み	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
そう痒症 紅斑	DS09-0156 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	かゆみ 発赤	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
腹痛 下痢	DS09-0158 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	腹痛 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
顔面浮腫	DS09-0173 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明回	不明	しみ(肝斑)	顔面のむくみ	非重篤	回復	服用後症状が出て、服用を止めると症状が治まり、再度服用した所、同じ症状が出た為。	可能性小	第2次
発疹 そう痒症	DS09-0184 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
倦怠感 末梢性浮腫	DS09-0194 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	17日間	しみ	体がだるい 両足のむくみ	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
月経過多	DS09-0199 (女) (52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	生理が続く	非重篤	未回復			第2次
末梢性浮腫	DS09-0204 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	手のむくみ	非重篤	回復			第2次
発疹 そう痒症	DS09-0208 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	肌が乾燥	非重篤	未回復			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹	DS09-0209 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	発疹	非重篤	未回復			第2次
頭痛 倦怠感	DS09-0213 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛 体がだるい	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
湿疹 そう痒症	DS09-0218 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
下痢 上腹部痛	DS09-0221 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	下痢 胃痛	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
恶心 下腹部痛	DS09-0223 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	気分が悪くなる 下腹が痛い	非重篤 非重篤	回復 回復			第2次
紅斑 皮膚疼痛	DS09-0227 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	頬の発赤	非重篤	不明	季節的な事もあり、急な紫外線の増加による皮 のダメージが考えられると思います。また、お 肌を見せていただいた感想としてかなりの乾燥 肌でいらっしゃるようでスキンケア不足も重なっ ていると思います。	不明	第2次
恶心	DS09-0235 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ	恶心	非重篤	回復			第2次
浮腫 排尿困難	DS09-0236 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	むくみ 尿の出が悪い	非重篤 非重篤	不明 不明			第2次
そう痒症 発疹	DS09-0237 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	痒み 発疹	非重篤 非重篤	不明 不明	トラネキサムサンのアレルギーのようです。	可能性大	第2次
不正子宮出血 月経困難症	DS09-0241 (女) (36)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	11日間	しみ	不正出血 生理痛のような重い感じ	非重篤 非重篤	未回復 回復			第2次
頻発月経	DS09-0259 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理不順	非重篤	未回復			第2次
発疹 そう痒症	DS09-0267 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	発疹 かゆみ(部位不明)	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第2次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
紅斑	DS09-0268 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	発赤	非重篤	回復			第2次
そう痒症 発疹	DS09-0285 (女) (42)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	かゆみ(両足のふくらはぎの 辺り、両腕、お腹の辺り)	非重篤	回復	ご本人様は細身な方で、特に他薬剤の服用も ありませんでした。飲酒も特にされないので、今 回は、本製品の影響が大きいのではないかと 思われます。来店時にはじんましん等はありま せんでした。	可能性大	第2次
そう痒症 湿疹	DS09-0292 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	かゆみ(背中) 湿疹(背中)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第2次
舌痛	DS09-0297 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑	舌の縁の痛み	非重篤	軽快			第2次
アーグルタミルトランسفエラー ゼ増加	DS09-0312 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	検査値の上昇	非重篤	不明			第2次
そう痒症	DS09-0314 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	しみのかゆみ	非重篤	未回復			第2次
そう痒症 湿疹	DS09-0332 (女) (47)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	痒み 湿疹	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
腹痛	DS09-0342 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	不明	トランシー／服用による副作用かどうかは、分か らないが、念のため病院でエコー検査すること をおすすめした。	可能性小	第3次
眼瞼紅斑 眼瞼そう痒症	DS09-0360 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	瞼の発赤 瞼の痒み	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
顔面浮腫 そう痒症 発疹	DS09-0370 (女) (47)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝斑の改善	顔の腫れ 痒み、発疹	非重篤 非重篤	回復 不明			第3次
倦怠感	DS09-0374 (女) (49)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	体のだるさ	非重篤	未回復			第3次
上腹部痛	DS09-0375 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胃の痛み	非重篤	回復			第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
そう痒症	DS09-0376 (女) (47)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	痒み	非重篤	回復	今回は因果関係は可能性は小と思われます。	不明	第3次
紅斑 そう痒症	DS09-0386 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤、腕の痛み、かゆみ(首 から上、特に耳・鼻)	非重篤	軽快			第3次
そう痒症	DS09-0414 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ	痒み	非重篤	軽快			第3次
発疹 紅斑 そう痒症	DS09-0420 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭のツツツ 赤み、痒み	非重篤 非重篤	未回復 不明			第3次
アスペラギン酸アミノトランス フェラーゼ増加 アラニン・アミトランスフェ ラーーゼ増加	DS09-0423 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	GOT、GPTの上昇	非重篤	未回復			第3次
発疹	DS09-0435 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	湿疹 頭の腫れ、腹部のツツツ	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
頭痛	DS09-0437 (女) (33)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	1～3回	不明	肝斑	～頭痛	非重篤	回復			第3次
恶心	DS09-0449 (女) (35)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	恶心	非重篤	回復			第3次
恶心	DS09-0455 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	気分が悪くなった	非重篤	不明			第3次
恶心	DS09-0458 (女) (48)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	むかつき	非重篤	回復			第3次
中期不眠症	DS09-0475 (女) (5X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	夜、目が覚める	非重篤	回復			第3次
紅斑 そう痒症	DS09-0483 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	発赤 痒み	非重篤 非重篤	軽快 回復			第3次
湿疹	DS09-0489 (女) (55)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	2～3回	60日間	しみ	湿疹	非重篤	回復			第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
消化不良	DS09-0508 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胸やけ	非重篤	回復			第3次
消化不良	DS09-0509 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胸やけ	非重篤	軽快			第3次
頭痛 恶心 振戦 浮動性めまい	DS09-0511 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	頭痛 吐き気、手のふるえ、めまい	非重篤 非重篤	回復 回復	お客様の体調によるものかもしれません。	不明	第3次
発疹	DS09-0526 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	吹き出物	非重篤	未回復			第3次
恶心 食欲減退	DS09-0532 (女) (58)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	しみ(肝斑)	服用後、気分が悪くなった	非重篤	回復	服用中止後(回復しているから、因果関係については可能性小と考えられます。	可能性小	第3次
発疹	DS09-0570 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	にきび	非重篤	不明	・2錠から1錠に減らされたら症状が消えたという事なので本品と全く因果関係が無いとは言い切れないとは思う。	不明	第3次
頭痛 恶心	DS09-0573 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1-2回	2日間	しみ	頭痛 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
下痢 恶心	DS09-0578 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	下痢 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
浮腫 動悸	DS09-0579 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	むくみ 動悸	非重篤 非重篤	回復 回復	服用直後にむくみ、動悸が発生したため、トランシーノ内の成分により発生した可能性が大。	可能性大	第3次
		コレストロール低下剤	不明	不明							
恶心	DS09-0592 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1-3回	不明	しみ	気分が悪い 気が遠くなる	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
口の感覺鈍麻	DS09-0604 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑改善	唇の内側に痺れ感	非重篤	回復			第3次
発疹	DS09-0613 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	発疹(足)	非重篤	不明			第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
腹部不快感	DS09-0623 (女) (48)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ	胃のもたれ	非重篤	軽快			第3次
そう痒症	DS09-0627 (女) (3X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	皮膚のかゆみ	非重篤	回復			第3次
発疹	DS09-0633 (女) (66)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	肝斑	発疹	非重篤	未回復			第3次
腹部不快感	DS09-0645 (女) (4X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	胃部不快感	非重篤	未回復			第3次
紅斑	DS09-0659 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤	非重篤	未回復			第3次
悪心 上腹部痛 下痢	DS09-0683 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	2回	14日間	肝斑	胃の重み 胃の痛み、吐き気、下痢	非重篤 非重篤	不明 不明			第3次
乳房不快感 発疹	DS09-0684 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	胸の張り 発疹	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
発疹 そう痒症	DS09-0697 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	ポツポツ かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
湿疹 そう痒症	DS09-0718 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
下痢	DS09-0728 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復		可能性大	第3次
下痢	DS09-0741 (男) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	目の下のくま	軟便	非重篤	軽快			第3次
浮動性めまい	DS09-0744 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	めまい	非重篤	回復			第3次
顔面浮腫	DS09-0763 (女) (5X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	顔のむくみ	非重篤	不明	ご本人様も体調によるものかもしれないとは感じているようで、私自身もトランシー／服用によるものである可能性は少ないと思います。	可能性小	第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
そう痒症 発疹	DS09-0775 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑	かゆみ(耳の後から首の周り、 口の周り) 腫れ(口の周り)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
消化不良 恶心 感觉鈍麻	DS09-0776 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~2回	2日間	肝斑の改善	胸やけ 恶心、腕の痺れ	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
頭痛 嘔吐	DS09-0818 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	頭痛 嘔吐	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
下痢 月経遅延	DS09-0830 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢 生理の遅れ(3週間)	非重篤 非重篤	回復 未回復			第3次
発熱 潮紅	DS09-0845 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	発熱 顔が赤くなる	非重篤 非重篤	不明 不明			第3次
全身性皮疹 全身性そう痒症	DS09-0855 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	発疹 痒み	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
発疹	DS09-0858 (女) (32)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑の改善	吹き出物	非重篤	軽快			第3次
恶心 嘔吐	DS09-0861 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	気分が悪くなった もどした	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
恶心	DS09-0876 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	吐気	非重篤	回復			第3次
月経遅延	DS09-0886 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	生理が遅れた	非重篤	回復			第3次
下痢 腹痛 末梢冷感	DS09-0891 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	下痢 腹痛、冷えが酷くなった	非重篤 非重篤	不明 不明			第3次
口唇炎	DS09-0901 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	服用後、唇が荒れる事象が あったとの事	非重篤	回復	服用との関連性は、低いと思われます。製品そのものの品質について、お客様から調査依頼がありましたので、ご報告致しました。	不明	第3次
四肢痛	DS09-0908 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	19日間	肝斑	膝から下の痛み	非重篤	不明			第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
筋骨格硬直 感覚麻痺	DS09-0910 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	こり(肩と首筋) 筋肉の強張り(腕の上から背 の上)、手指のしびれ	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
振戦 頭痛	DS09-0935 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	体の震え 頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復	本剤の為であるとは確信できません。	不明	第3次
腹痛 下痢	DS09-0936 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑	腹痛 軟便	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
消化不良 動悸	DS09-0942 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	胸やけ 動悸	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
不規則月経	DS09-0946 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	再度生理が始まった	非重篤	未回復			第3次
光視症	DS09-0951 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	目がチラチラする	非重篤	回復			第3次
発疹	DS09-0959 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	吹き出物(鼻と口のまわり)	非重篤	不明			第3次
頭痛	DS09-0975 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ	頭痛	非重篤	未回復			第3次
恶心	DS09-0977 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	吐き気	非重篤	回復			第3次
不規則月経	DS09-1069 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	終わったばかりの生理がまた 始まった	非重篤	未回復			第3次
上腹部痛	DS09-1070 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑の改善	胃痛	非重篤	回復			第3次
肝機能障害	DS09-1073 (女) (63)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	肝機能障害	不明	不明	本剤服用中止後の出来事の検討として、 可逆性か不可逆性かの作用かを評価しない 作用で、主に肝機能障害によるものと想定 され、約1ヶ月の期間で認められた肝機能障 害は、主に肝臓への吸収が亢進したためと 考えられる。しかし、これが、必ずしも本剤に 起因するものであり、トランシーノの肝機能障 害に対するアリザマジカルな効果が、この出来事 に影響を与えた可能性がある。	可逆性大	第3次
恶心	DS09-1109 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	肝斑	吐き気	非重篤	未回復			第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
悪心 頭痛	DS09-1117 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	吐き気 頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
発疹 そよ痒症	DS09-1132 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	発疹 かゆみ	非重篤 非重篤	不明 不明	首から下に赤み(発疹のあと)がかなり強く見られた。顔に腫れ、むくみはない様子 トランシーノを服用してすぐ発疹が出たとおっしゃいました。	可能性大	第3次
発疹	DS09-1145 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	顔全体にプチプチができた	非重篤	未回復			第3次
眼窩周囲浮腫 下痢	DS09-1173 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	目の腫れ 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	本品服用後すぐに副作用がでているため本品による可能性大と思われる。本品中止後すぐに副作用はおさまっている。	可能性大	第3次
片頭痛 恶心	DS09-1195 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	偏頭痛の悪化 胃のむかつき	非重篤 非重篤	回復 回復		可能性小	第3次
便秘 恶心	DS09-1205 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	便秘 嘔気	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
頭痛 傾眠 恶心 浮動性めまい	DS09-1225 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	頭痛 眠気、気持ち悪い、めまい	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
悪寒	DS09-1229 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	悪寒	非重篤	未回復			第3次
紅斑 発疹	DS09-1230 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑の改善	発赤 発疹	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
感覚鈍麻	DS09-1239 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	15日間	肝斑の改善	手足のしびれ	非重篤	回復			第3次
そよ痒症 発疹	DS09-1263 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	痒み(首から下、太もも、お腹) 吹出物(顔)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
下痢	DS09-1297 (女) (32)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	肝斑の改善	下痢	非重篤	回復	お話を伺った限りでは、トランシーノが原因とは考えにくものでした。せっかく購入したものだからとお客様の方がもう一度飲まれて様子をみたいとはおっしゃっていました。	不明	第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
月経過多	DS09-1299 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	生理期間の延長	非重篤	未回復			第3次
消化不良	DS09-1325 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	逆流性食道炎が悪化	非重篤	未回復			第3次
そう痒症	DS09-1359 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	かゆみ	非重篤	回復			第3次
ほてり 皮膚刺激	DS09-1373 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	ほてり(顔) 刺激感(顔)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
そう痒症 発疹 眼瞼浮腫	DS09-1375 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑の改善	かゆみ(全身) 発疹(顔、腕、胸)、瞼のはれ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
動悸 呼吸困難	DS09-1407 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	動悸 息切れ	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次
発疹 紅斑	DS10-0008 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	54日間	肝斑	類のザラつき 発赤(類)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
湿疹 紅斑 そう痒症	DS10-0010 (女) (64)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑の改善	湿疹(額、腕、肩、首の裏) 発赤(頸、額など)、かゆみ (頸、額など)	非重篤 非重篤	不明 不明		可能性大	第3次
下痢	DS10-0033 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	併用薬による下痢発現の可能性は少ないと思われる。初めはVC過剰により下痢症状発現の可能性を疑ったが止まらない下痢と腹痛なのでその可能性も少ないと思われる。トランシーノが原因の可能性が大と考えられる。	可能性大	第3次
そう痒症	DS10-0041 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑の改善	痒み	非重篤	軽快			第3次
発疹	DS10-0042 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	類に赤いブツブツができる	非重篤	未回復			第3次
肝機能検査異常 腹部膨満	DS10-0052 (女) (45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	肝機能異常 肝臓が腫れた感じ	非重篤 非重篤	未回復 回復			第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
下痢	DS10-0056 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	下痢	非重篤	回復			第3次
動悸	DS10-0069 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ	胸がドキドキし意識を失いそうな感じがした	非重篤	回復			第3次
下痢	DS10-0070 (女) (28)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	下痢	非重篤	回復			第3次
末梢性浮腫	DS10-0075 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	むくみ(両足)	非重篤	未回復			第3次
紅斑 皮膚剥脱	DS10-0082 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤(頭、手足の先端の甲の部分) 皮がむけた(頭、手足の先端の甲の部分)	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第3次
発疹 そら痒症 浮腫	DS10-0090 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑	発疹(背中、腕) 痒み(背中、腕)、足の浮腫み(左足)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
そら痒症 発疹	DS10-0092 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	かゆみ 発疹	非重篤 非重篤	回復 回復	以前より外用剤に関するご相談をうけており、皮フは、もともとかゆみが出やすい方だと考えていますので因果関係は不明と思われます。		可能性小 第3次
発疹 そら痒症	DS10-0093 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間					特にありません		
便秘	DS10-0105 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	便秘	非重篤	回復			第3次
口唇炎	DS10-0130 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	口角が切れる	非重篤	未回復			第3次
月経遅延	DS10-0131 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	生理が来ない	非重篤	未回復			第3次
頭痛 倦怠感	DS10-0144 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	肝斑	痛み(頭、首の後ろ) 膝下が重い	非重篤 非重篤	回復 回復			第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
湿疹	DS10-0156 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	赤い湿疹(腹のまわり)	非重篤	回復			第3次
発疹	DS10-0161 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	発疹(類)	非重篤	未回復			第3次
頭痛	DS10-0165 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	服用直後の症状発現で、体調や薬以外の食品などの原因も考えられるが、服用中止後に回復していることから因果関係については可能性小と考える。	可能性小	第3次
紅斑 そう痒症	DS10-0186 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑	赤み(首) 痒み(首)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
そう痒症	DS10-0193 (女) (53)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	肝斑	痒み(両頬)	非重篤	未回復			第3次
倦怠感	DS10-0212 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ	倦怠感	非重篤	未回復			第3次
息詰まり感 動悸	DS10-0215 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	胸の締め付け 息苦しさ、動悸	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第3次
頭痛	DS10-0233 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	頭痛	非重篤	回復			第3次
月経過多	DS10-0239 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	生理がいつもより長引く	非重篤	回復			第3次
腹部不快感 消化不良	DS10-0247 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	胃もたれ 胸やけ	非重篤 非重篤	回復 回復	来店されたときは、すでに回復されてました。服用中の主な症状は胃もたれと胸やけとのことです。が、今の時期、胃の調子の悪い方が多く、それが重った可能性もあります。	可能性大	第3次
悪心	DS10-0298 (女) (32)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	吐き気	非重篤	回復	胃腸障害の副作用はどの薬剤でも発現しうるものだと思います。以前よりV.Cを大量に摂るとお腹の調子が良くないと話されているのでこの患者様の場合は胃腸がそれ程強くはないのかなとの印象を受けました。服用直後ではなく数日後に発現しているので薬の服用による胃粘膜の荒れの可能性もあると思います。	可能性大	第3次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹 紅斑 悪心	DS10-0314 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	水疱(口角) 発赤(口角)、痛み(口角)	非重篤 非重篤	不明 不明	トランシーノのアレルギーでは無さうな感じ	不明	第3次
黄色皮膚	DS10-0342 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	皮膚の色が黄色い感じになる(両手の平の付け根)	非重篤	未回復			第4次
発疹 そう痒症 口渴	DS10-0368 (女) (58)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	荨麻疹(頑、首の周り) のどの渇き	非重篤 非重篤	回復 回復	・副作用発現も1日目からで、併用薬もないこと から副作用であると考えられる。又、重篤に至ら なかつたのは、販売時の説明や注意することを 伝えておいたので、本人も理解をし、対応が早 かっただことが幸いしたと思う。	可能性大	第4次
そう痒症	DS10-0369 (女) (40~45)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	しみ(肝斑)	かゆみ(二の腕、胸)	非重篤	回復	原因は不明ですが、トランシーノを服用した 事により起つた症状だと思われます。	不明	第4次
尿閉 不正子宮出血	DS10-0370 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	残尿感 出血	非重篤 非重篤	未回復 回復			第4次
紅斑 発疹 そう痒症	DS10-0372 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療	真っ赤になって腫れた(頑) ブツブツと膨れた(首、両腕)、 かゆみ(首、両腕、頑)	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第4次
末梢冷感 脱毛症	DS10-0373 (女) (74)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	脚のつっぱり 脚の冷え、髪が抜ける	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
湿疹 紅斑	DS10-0374 (女) (51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	湿疹(左ふくらはぎ) 発赤(左ふくらはぎ)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
くしゃみ 鼻漏 鼻閉	DS10-0379 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	不明	くしゃみ 鼻水、鼻づまり	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第4次
紅斑 発疹	DS10-0393 (女) (2X~3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	50日間	しみ(肝斑)	赤み(目元、口元、頬) ブツブツ(目元、口元、頬、)	非重篤 非重篤	不明 不明	服用後しばらくたってからの発現であり、体調 や薬以外などの原因も考えられる。	不明	第4次
四肢痛 末梢性浮腫	DS10-0394 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑治療	痛み(左もものつけね、前も も) 腫れ(左もものつけね、前も も)	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第4次
下痢	DS10-0398 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療	下痢	非重篤	回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
腹痛	DS10-0405 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療	みぞおちの痛み	非重篤	不明			第4次
そら痒症	DS10-0406 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	皮膚のかゆみ(眼の下側、目尻あたり)	非重篤	軽快			第4次
末梢性浮腫	DS10-0407 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	脚のむくみ	非重篤	未回復			第4次
頭痛 腹部不快感 浮動性めまい	DS10-0409 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療	眩暈 胃のもたれ、重いような頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
胸痛	DS10-0421 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑改善	胸の痛み	非重篤	回復			第4次
末梢性浮腫	DS10-0427 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	むくみ(片足のふくらはぎ)	非重篤	回復			第4次
発疹	DS10-0435 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑	発疹(耳)	非重篤	不明	特になし	不明	第4次
下痢	DS10-0442 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復	体調不良や食品などの原因も考えられるが服用中止後に回復していることから因果関係については可能性は小さいと考えられる	可能性小	第4次
発疹 紅斑	DS10-0454 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみの改善	湿疹(頸) 赤み(頸)、腫れ(頸)	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第4次
湿疹	DS10-0456 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ	ポツポツとした赤い湿疹(頸)	非重篤	未回復			第4次
乳腺炎	DS10-0461 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	乳腺炎	非重篤	不明	作年の容状を聞いただけなので因果関係については不問。	不明	第4次
腹痛 下痢	DS10-0474 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	胃痛 下痢	非重篤 非重篤	回復 回復	そもそも胃腸が弱いという方だったので胃腸障害の副作用が現れやすかつたと考えられる。	可能性大	第4次
くしゃみ 鼻漏	DS10-0477 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	くしゃみ 鼻水	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
感覚鈍麻	DS10-0480 (女) (30~40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	手のしびれ(左手)	非重篤	回復	併用のサプリメント、トランシーノのSEではない可能性が高いと思われる。医療用でも報告なし。	不明	第4次
		サプリメント コラーゲン α リポ酸 アミノ酸制剤	不明	不明							
異物感	DS10-0484 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ	喉の異物感	非重篤	未回復			第4次
動悸	DS10-0485 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	不明	肝斑	動悸	非重篤	回復			第4次
湿疹	DS10-0488 (女) (65)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	湿疹	非重篤	回復			第4次
味覚消失	DS10-0490 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	不明	味を感じない	非重篤	未回復			第4次
腹部膨満	DS10-0496 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	パンパンに張る(おなか)	非重篤	未回復			第4次
月経困難症	DS10-0507 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	生理痛がいつもよりひどい	非重篤	未回復			第4次
乳房痛	DS10-0513 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	生理のときにおこるような胸の痛み	非重篤	未回復			第4次
腹痛	DS10-0517 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	8日間	しみ(肝斑)	腹痛	非重篤	軽快	お客様は胃が弱い体質だとおっしゃっているが、体質が今回の件に関係しているかは不明。	不明	第4次
紫斑	DS10-0527 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療	あざ(腕)	非重篤	未回復			第4次
四肢痛	DS10-0543 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	18日間	肝斑	ふくらはぎ痛み(左足)	非重篤	回復			第4次
発疹	DS10-0549 (女) (60)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療	発疹(両頬)	非重篤	未回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
ほてり 下痢	DS10-0565 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑の改善	ほてり 下痢、頭痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
胸部不快感	DS10-0572 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1~3回	3日間	肝斑	みぞおち上部のしめつけ	非重篤	未回復			第4次
顔面浮腫	DS10-0575 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑	浮腫み(顔)	非重篤	未回復			第4次
倦怠感	DS10-0578 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑改善	身体がだるくなる	非重篤	回復			第4次
発疹	DS10-0579 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑の改善	発疹(両腕内側・腹部)	非重篤	軽快			第4次
	DS10-0581 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間							第4次
月経遅延	DS10-0593 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療のため	生理が遅れた	非重篤	未回復			第4次
下痢	DS10-0602 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	お腹が緩くなる	非重篤	不明			第4次
そう痒症 蕁麻疹	DS10-0604 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	肝斑の治療のため	浮み(首、胸、背中の脛あたたり) 蕁麻疹(首、胸、背中の脛あたり)	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
頻発月経	DS10-0613 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	生理が早く来た	非重篤	不明			第4次
動悸 月経障害	DS10-0619 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	肝斑の改善	動悸 生理の出血の色が黒っぽい	非重篤 非重篤	未回復 不明			第4次
紅斑	DS10-0623 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	左腕上腕部内側に赤い斑点 (内出血のようなもの)	非重篤	回復	本人様、生理前で、体調が悪いと言つてました ので、因果関係については可能性小と考えら れる。	可能性小	第4次
そう痒症	DS10-0635 (女) (51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	頭皮のかゆみ	非重篤	回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹	DS10-0636 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	回復	服用中止後に症状が改善されたため何らかの関係があると思われるから	可能性小	第4次
皮膚剥脱 そう痒症	DS10-0663 (女) (41)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑の改善	目の下の皮膚がボロボロ剥けた かゆみ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
浮動性めまい	DS10-0668 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	肝斑治療	眩暈	非重篤	未回復			第4次
紅斑	DS10-0670 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	肝斑	発赤(足・腰・腕・腹)	非重篤	回復			第4次
腹痛 下痢	DS10-0683 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	腹痛 下痢	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
そう痒症	DS10-0690 (女) (62)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療	痒み(頭、手、背中)	非重篤	未回復			第4次
皮膚変色 皮膚剥脱	DS10-0702 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	61日間	肝斑の改善	皮膚の変色(目の下、口元) 皮がむけた(目の下、口元)	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第4次
動悸	DS10-0705 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	動悸	非重篤	回復			第4次
発疹	DS10-0722 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑の改善	発疹(頭)	非重篤	軽快			第4次
そう痒症 蕁麻疹 動悸	DS10-0723 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	かゆみ 蕁麻疹、動悸	非重篤 非重篤	軽快 回復			第4次
動悸	DS10-0732 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	心臓がドキドキする	非重篤	回復			第4次
四肢痛 倦怠感	DS10-0737 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	肝斑の改善	痛み(片足のふくらはぎ) だるさ(片足のふくらはぎ)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
血中コレステロール増加	DS10-0754 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	コレステロール値上昇	非重篤	不明			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
上腹部痛	DS10-0763 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	肝斑の改善	胃痛	非重篤	回復			第4次
顔面浮腫 腹部膨満	DS10-0773 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑の改善	腫れた(顔) お腹の膨れ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
消化不良 腹痛 筋骨格不快感	DS10-0779 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	胸やけ 腹痛、背中の違和感	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
口渴	DS10-0833 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑ケアのため	乾きを感じた(舌、喉)	非重篤	未回復			第4次
動悸 不整脈 消化不良	DS10-0850 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	肝斑のケアのため	動悸 脈の乱れ、胸焼け	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
発疹 紅斑 そつ痒症	DS10-0897 (女) (5X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	発疹(ウエスト部分と腕の付け根) 発赤(ウエスト部分と腕の付け根)、かゆみ(ウエスト部分と腕の付け根)	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
下痢 胸痛	DS10-0898 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝斑	下痢 痛み(胸)	非重篤 非重篤	未回復 回復			第4次
浮腫 ほてり	DS10-0907 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	むくみ 服用するとからだが温かくなる。	非重篤 非重篤	回復 回復	服用1ヶ月後の発現であり、副用中止後に回復していることから、トランシーノが原因と思います。	確実	第4次
過少月経	DS10-0934 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑のケア	生理の経血量が減った	非重篤	未回復			第4次
そつ痒症	DS10-0972 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	湿疹(部位不明)	非重篤	回復	服用日数も少なく症状消えた日数短い為。	可能性小	第4次
便秘	DS10-0993 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	便秘	非重篤	回復			第4次
浮動性めまい 嘔吐	DS10-1000 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑の改善	ふらつき めまい、嘔吐	非重篤 非重篤	回復 軽快			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
月経遅延	DS10-1014 (女) (27)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	生理の遅れ	非重篤	不明			第4次
紅斑	DS10-1023 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤(眼の下のみ)	非重篤	未回復			第4次
脱毛症	DS10-1046 (女) (34)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑の改善	抜け毛の増加	非重篤	未回復			第4次
眼瞼浮腫 皮膚乾燥	DS10-1049 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑改善	腫れ(瞼) かさつき(口、目の周り)	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
発疹 そう痒症	DS10-1052 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	ぶつぶつ(お腹、お尻、腿) かゆみ、痛み	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
頭痛	DS10-1065 (女) (42)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	頭痛	非重篤	未回復			第4次
便秘 全身性浮腫	DS10-1093 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の改善	便秘 むくみ(全身)	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
恶心 腹部不快感	DS10-1108 (女) (47)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療のため	胃のむかつき 胃が重い	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
頭痛 筋骨格硬直	DS10-1110 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2~3日間	しみ(肝斑)	頭痛 肩こり	非重篤 非重篤	回復 回復	中国人で30歳代の女性で会話に難があり、判断が遅い。症状もかなり軽度で因果関係は可能性は小と考える。	可能性小	第4次
発疹	DS10-1138 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	じんましん	非重篤	軽快	本人と詳しく話し合いをしていないし、日常の薬品に対する考え方やほかののんでいる薬などもわからないので、本品との因果関係は不明と判断する。	不明	第4次
末梢性浮腫	DS10-1172 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	むくみ(両脚)	非重篤	回復	服用1ヶ月後の症状の発現であり、体調や薬以外(食品)などの原因も考えられるが服用中止後に回復していることから因果関係については、可能性小と考える。	可能性小	第4次
おくび 腹部不快感	DS10-1187 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療のため	ゲップ 胃もたれ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹	DS10-1199 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑治療のため	赤い発疹(お腹、両手)	非重篤	軽快			第4次
過少月経	DS10-1221 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	不明	しみ	生理経血量の減少	非重篤	不明			第4次
月経遅延	DS10-1249 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	12日間	不明	生理が遅れている	非重篤	未回復			第4次
下痢	DS10-1273 (女) (62)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	下痢	非重篤	軽快			第4次
感觉鈍麻	DS10-1283 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	痺れ【手の先、足の先】	非重篤	軽快			第4次
消化不良 口渴	DS10-1304 (女) (64)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療のため	胸やけ 喉が渴く	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
頻発月経	DS10-1333 (女) (44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	生理周期が早くなる	非重篤	未回復			第4次
頭痛	DS10-1357 (女) (34)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑	頭痛	非重篤	回復			第4次
恶心 上腹部痛	DS10-1359 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	吐き気 胃痛	非重篤 非重篤	軽快 軽快	本品との因果関係は不明であるが、本人の体調に起因した可能性有り。	不明	第4次
浮腫	DS10-1368 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	浮腫み(顔、足)	非重篤	未回復			第4次
感觉鈍麻	DS10-1369 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	痺れ(右手小指の先)	非重篤	未回復			第4次
鼻漏	DS10-1372 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	不明	鼻水が出る	非重篤	未回復			第4次
動悸	DS11-0029 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	動悸	非重篤	軽快			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
皮膚疼痛	DS11-0041 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	ヒリヒリ感	非重篤	回復			第4次
嘔吐 頭痛 紅斑 眼瞼浮腫 浮腫 恶心	DS11-0062 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ	嘔吐 頭痛、赤み、腫れ、むくみ、むかつき	非重篤 非重篤	回復 軽快			第4次
動悸	DS11-0081 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	動悸 気分が悪い	非重篤 非重篤	回復 軽快	判りません。ご本人様は、薬に期待を持たれていたので、残念がられていきました。ただ不安があるので薬を飲みたくないとのことでした。	不明	第4次
浮腫 口渴	DS11-0088 (女) (48)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑の治療のため	むくみ 口が渴く	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第4次
恶心	DS11-0093 (女) (38)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑改善	胃がムカムカする	非重篤	未回復			第4次
頭痛	DS11-0102 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑の改善	頭痛	非重篤	軽快			第4次
下痢 腹痛 恶心 月経過多	DS11-0105 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑の改善	下痢 腹痛、吐き気、生理の量が多くなった	非重篤 非重篤	軽快 未回復			第4次
恶心	DS11-0122 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	気分が悪くなった	非重篤	回復			第4次
癰瘍	DS11-0123 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	湿疹 かゆみ	非重篤 非重篤	回復 回復	症状が顔だけなのでトランシーノの副作用ではないと感じます。化粧品や日光過敏症の可能性では?	可能性小	第4次
皮膚乾燥	DS11-0124 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑の改善	肌がザラザラになった	非重篤	未回復			第4次
四肢痛	DS11-0125 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	26日間	肝斑	ふくらはぎの痛み	非重篤	未回復			第4次
頭痛	DS11-0134 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑の治療のため	頭痛	非重篤	回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
浮動性めまい 嘔吐	DS11-0154 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	5日間	肝斑の治療のため	めまい 嘔吐	非重篤 非重篤	未回復 軽快			第4次
四肢痛	DS11-0155 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療のため	痛み	非重篤	軽快			第4次
恶心 下痢	DS11-0156 (女) (49)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2~3回	12日間	しみ	むかつき 軟便	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
便秘	DS11-0157 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	便秘	非重篤	回復			第4次
恶心	DS11-0158 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑の改善	吐き気	非重篤	回復			第4次
体位性めまい	DS11-0159 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	2日間	肝斑	立ちくらみ	非重篤	回復			第4次
発疹 ほてり	DS11-0161 (女) (73)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	湿疹 火照り	非重篤 非重篤	軽快 軽快	服用後7日~10日目で症状発現 皮膚科での診察を受けられたとの事ですが中止された後回復にむかっているとの事で、可能性はあるのでは…と考えております。	可能性大	第4次
発疹	DS11-0163 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	2日間	しみ(肝斑)	発疹	非重篤	回復	本品以外に思いあたる原因がないということで本品との因果関係があると思われます。	可能性大	第4次
頻発月経過少月経	DS11-0166 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療のため	生理が早くきた 生理の期間が短くなった	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
尿臭異常 尿閉 排尿困難	DS11-0177 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療のため	尿のにおいに変化 尿感、排尿痛	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
頭痛	DS11-0180 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復		可能性大	第4次
浮動性めまい	DS11-0185 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑の治療のため	めまい	非重篤	未回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
皮膚剥脱 紅斑	DS11-0194 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	顔の皮膚がむける 赤くなる	非重篤 非重篤	未回復 回復			第4次
恶心	DS11-0197 (女) (53)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑の改善	吐き気	非重篤	未回復			第4次
不規則月経	DS11-0199 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	不明	生理が止まった	非重篤	回復			第4次
頻発月経	DS11-0204 (女) (46)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	生理周期が短くなった	非重篤	未回復			第4次
腹部不快感 上腹部痛	DS11-0207 (女) (57)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	胃の不快感 胃が痛い	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
下痢	DS11-0208 (女) (中年)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療のため	下痢	非重篤	軽快			第4次
下痢	DS11-0216 (女) (成人)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	17日間	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	不明	特になし	不明	第4次
		コンドロイチンの薬(名前 不明)	不明	不明							
そう痒症 筋骨格硬直	DS11-0223 (女) (55)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	かゆみ 首の辺り	非重篤 非重篤	未回復 不明			第4次
下痢 消化不良	DS11-0224 (女) (43)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	下痢 胸焼け	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
頻発月経	DS11-0227 (女) (38)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑改善	生理周期の乱れ	非重篤	未回復			第4次
浮腫	DS11-0229 (女) (成人)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	肝斑の治療のため	むくみ	非重篤	回復			第4次
硝子体浮遊物 眼の異常感	DS11-0230 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	不明	黒い点々が見える 目の違和感	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
腹痛 四肢痛 背部痛	DS11-0232 (女) (40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑改善	脛の付け根の痛み 腹痛、背中の痛み	非重篤 非重篤	回復 未回復			第4次
そう痒症	DS11-0238 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	痒い	非重篤	未回復			第4次
皮膚疼痛	DS11-0243 (女) (3X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	ヒリヒリ痛い	非重篤	不明			第4次
肝機能検査異常	DS11-0244 (女) (46)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	肝機能の数値が悪化	非重篤	不明	他剤の服用もなく飲酒も全くしない為本剤による副作用と考えられる。また、報告時の足の裏のしびれは、腰から来るものと思われ本剤によるものと考えられない。		不明 第4次
乳房不快感	DS11-0246 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	不明	胸の張り	非重篤	不明	本剤との因果関係は分らない。		不明 第4次
疼痛	DS11-0249 (女) (35)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	痛み	非重篤	回復			第4次
腹部不快感 腹部膨満	DS11-0259 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	みぞおちが重苦しい みぞおちが腫れる	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
希発月経	DS11-0263 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	シミのケアのため	生理が遅れた	非重篤	回復			第4次
膿疱性皮疹	DS11-0269 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑	出来物	非重篤	未回復			第4次
下痢 食欲減退	DS11-0273 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ	軟便 食欲不振	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
動悸	DS11-0275 (女) (56)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	肝斑改善	動悸	非重篤	回復			第4次
消化不良 おくび 振戦 呼吸困難	DS11-0276 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	しみ	胸やけ げっぷ、手の震え、息切れ	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
発疹	DS11-0277 (女) (中年)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	発疹	非重篤	不明			第4次
頭痛 浮動性めまい 過少月経 不規則月経	DS11-0279 (女) (50)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	2～3回	41日間	肝斑の治療のため	頭痛 眩暈、生理の経血減少、生 理不順	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
下痢	DS11-0280 (女) (7X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	下痢	非重篤	回復			第4次
皮膚線条	DS11-0287 (女) (39)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑改善	太ももの凹み 太ももの凹み下が硬い	非重篤 非重篤	未回復 未回復			第4次
そら痒症	DS11-0288 (女) (52)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑改善	体が痒い	非重篤	回復			第4次
過少月経	DS11-0289 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	経血量の減少	非重篤	未回復			第4次
そら痒症 発疹	DS11-0293 (女) (40)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	かゆみ 赤い発疹	非重篤 非重篤	軽快 軽快			第4次
頻尿 口の感覺鈍麻	DS11-0300 (女) (4X)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ	頻尿 舌がしびれたような違和感	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
月経遅延	DS11-0308 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑改善	生理の遅れ	非重篤	回復			第4次
脱毛症 鼻漏 鼻閉 くしゃみ 眼の異物感	DS11-0310 (女) (57)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑改善	髪が抜ける 鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目 がゴロゴロする	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
倦怠感	DS11-0313 (女) (不明)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	だるい	非重篤	未回復			第4次
そら痒症 浮動性めまい 動悸	DS11-0315 (女) (成人)	トランシー／ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑のケアのため	痒み 眩暈、動悸	非重篤 非重篤	軽快 回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
浮動性めまい	DS11-0319 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑の治療のため	眩暈	非重篤	回復			第4次
下痢 恶心	DS11-0321 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	下痢 吐き気	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
頭痛	DS11-0322 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	頭痛	非重篤	軽快			第4次
そう痒症 発疹	DS11-0323 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療のため	痒み 発疹	非重篤 非重篤	回復 回復			第4次
口内炎	DS11-0324 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	肝斑の治療のため	口内炎	非重篤	未回復			第4次
耳鳴	DS11-0376 (女) (50)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	25日間	肝斑の治療のため	耳鳴り	非重篤	軽快			第4次
恶心	DS11-0380 (女) (71)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	シミの改善	気持ち悪い	非重篤	回復			第4次
消化不良	DS11-0384 (女) (4X)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑のため	胸焼け	非重篤	回復			第4次
恶心	DS11-0395 (女) (54)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療のため	恶心	非重篤	回復			第4次
そう痒症 発疹	DS11-0398 (女) (中年)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の治療のため	痒み 発疹	非重篤 非重篤	回復 軽快			第4次
希発月経	DS11-0399 (女) (39)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	生理の遅れ	非重篤	回復			第4次
浮腫	DS11-0400 (女) (成人)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑の治療のため	むくみ	非重篤	未回復			第4次
末梢性浮腫	DS11-0401 (女) (不明)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑の改善	両脚がむくむ	非重篤	未回復			第4次

副作用の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
浮動性めまい	DS11-0408 (女) (43)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	肝斑改善	めまい	非重篤	未回復			第4次

## 別紙（5）

### III. 製造販売後臨床試験

#### 1)副作用の種類別発現状況

肝斑に対するトランシーノの有効性および安全性について検討するため、2009年1月から15歳以上の肝斑を有する患者（目標症例数：100症例）を対象とし、トランシーノの8週間服用と最低8週間の観察期間を1クールとし、観察期間中に肝斑の再発が認められた場合は、最大3クールまで行う製造販売後臨床試験が開始された。1クール目にエントリーされた118例が、効果なし・再発なし等の理由による中止・脱落で、2クール目は94例、3クール目は33例がエントリーされ、全ての服薬・検査・観察等は終了し、調査期間中に報告された有害事象50例80件のうち、副作用は表10の通り7例（5.9%）11件（同一症例での別クールでの同一事象を重複集計）であった。

表10 副作用の種類別発現状況（製造販売後臨床試験）

終了した製造販売後臨床試験における副作用発現状況	
①調査施設数	6
②調査症例数	118
③副作用発現症例数	7
④副作用発現件数	11※
⑤副作用発現症例率 (③÷②×100)	5.9%
副作用の種類	発現例数（%）及び件数
胃腸障害	5例(4.2)
* 腹部不快感	4件※
上腹部痛	1件
下痢	3件※
* 胃腸の炎症	1件
臨床検査	2例(1.7)
* アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1件
* 尿中ブドウ糖陽性	1件

※同一症例で同一事象を別クールで再発したものも重複集計した

\*添付文書に記載されていない副作用

#### 2)副作用症例一覧表

製造販売後臨床試験で収集された上記の副作用症例7例11件の有害事象の種類、番号、性、年齢、使用薬剤名（企業名）、使用方法、使用理由、有害事象の症状・程度・転帰、医師の見解、因果関係等を記載した有害事象症例一覧表を別紙(6)に示した。

## 別紙(6) 副作用の発現症例一覧表(製造販売後臨床試験)

有害事象の種類	番号 (性) (年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)		年次
			1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	
腹部不快感	DS08-1502 <EM-103> (女)(52)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	製造販売後臨床 試験	胃部不快感	非重篤	回復		関連あり	第2次
腹部不快感 下痢	DS08-1504 <EM-111> (女)(26)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	57日間	製造販売後臨床 試験	胃部不快感 軟便	非重篤 非重篤	回復 回復		可能性あり 可能性あり	第2次
腹部不快感 (鼻咽頭炎) (浮動性めまい) (白血球数増加)	DS08-1505 <EM-113> (女)(40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	58日間	製造販売後臨床 試験	胃部不快感 感冒 めまいの悪化 白血球増加	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復		関連あり 関連なし 関連なし 関連なし	第2次
下痢	DS09-0043 <EM-115> (女)(51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	57日間	製造販売後臨床 試験	軟便	非重篤	回復		可能性あり	第2次
アスピラギン酸アミノ トランスフェラーゼ増加	DS09-0362 <TB-112> (女)(40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	58日間	製造販売後臨床 試験	ASTの上昇	非重篤	回復		可能性あり	第3次
胃腸の炎症	DS09-0655 <GN-118> (女)(61)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	57日間	製造販売後臨床 試験	急性胃腸炎	非重篤	回復		可能性あり	第3次
腹部不快感	DS09-0692 <EM-103> (女)(53)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	53日間	製造販売後臨床 試験	胃部不快感	非重篤	回復		関連あり	第3次
尿中ブドウ糖陽性	DS09-0857 <HR-117> (女)(44)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	57日間	製造販売後臨床 試験	尿糖陽性	非重篤	回復		可能性あり	第3次
上腹部痛	DS09-1107 <EM-113> (女)(40)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	53日間	製造販売後臨床 試験	胃痛	非重篤	回復		可能性あり	第3次
下痢	DS09-1108 <EM-115> (女)(51)	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	56日間	製造販売後臨床 試験	軟便	非重篤	回復		可能性あり	第3次

## 別紙（7）

### IV. 調査結果に関する見解と今後の安全対策

特別調査では、第1次から第4次調査期間において収集症例3,186例中副作用発現症例は76例(2.4%)であり、副作用発現症例率が特に高いという傾向は見られず、また副作用の程度がすべて非重篤であったことから、特に問題はないと考えられた。

一般調査では、第1次から第4次調査期間において1,000例(1,584件)の副作用発現症例が収集され、副作用の種類別で多かったものは、発疹167件、そう痒症149件、恶心136件、下痢132件、頭痛87件、紅斑61件、消化不良53件、湿疹45件、浮動性めまい44件、腹痛44件、動悸40件、腹部不快感34件、上腹部痛28件、食欲減退24件、倦怠感24件、嘔吐23件、感覺鈍麻22件、四肢痛22件、浮腫20件などであった。副作用の程度では、自己免疫疾患患者でのスティーブンス・ジョンソン症候群1例、女性器悪性新生物患者での肺塞栓1例と前述の評価不能の気胸入院1例が重篤であった他は、すべて非重篤であった。

重篤3症例の詳細は以下の通り再掲する。

1. スティーブンス・ジョンソン症候群症例：報告医は基礎疾患として自己免疫疾患（全身性エリテマトーデス）があり、薬疹が出現しやすい患者であると考え、そのうえで臨床・病理検査結果から、本剤によるスティーブンス・ジョンソン症候群の可能性は否定できないとしている。

企業の見解としては、自己免疫疾患に対しプレドニゾロン及びアスピリン服薬治療中の患者が本剤服用後にスティーブンス・ジョンソン症候群を発症したことではあるが、自己免疫疾患やNSAIDの長期使用により重篤な薬疹の発症頻度が高くなっていた可能性も考え、またトラネキサム酸のDLST検査結果が陰性であったことからも、可能性は低いと考えているが、関連は否定せず報告対象とした。

2. 肺塞栓症例：報告医は本剤服用から症状の出現までの経過を考えると可能性は高く、薬剤の作用からも矛盾しない副作用であるが、症状出現から医療機関への受診まで約1年間の期間があるため因果関係を完全に証明するのは困難とし、また発症以前に医療機関への受診が無く、血栓に関する既往歴は不明であるが、トラネキサム酸の作用を考えると以前から何らかの血栓傾向があったことから可能性があったと考えている。

使用者は本剤を1週間服用した際に、動悸及び呼吸困難を認めたとのことで、服用中止後も呼吸困難は継続したという。そして約1年後に医療機関を受診したことで、その後に肺血栓塞栓症と診断された。

企業の見解としては、本剤服用1週間後に起きたとされる動悸及び呼吸困難については情報も不足しており、本剤の関与については判断し難く、仮にその時点より血栓が形成されていたとしても、その後1年9ヶ月間も本剤により血栓を安定化させていたとは考え難い。加えて症状発現から診断までの経過が不明であること、また患者は子宮筋腫・卵巣新生物を合併していることから、本剤との因果関係を評価することは困難であるが、本剤服用による副作用として報告対象とした。

3. 気胸入院症例：気胸で入院した医療機関先の勤務者が本剤服用を医師に伝えたものの特段の指示等を受けなかったとの患者本人からの電話連絡のみで副作用として報告対象とした。担当医師への問い合わせを患者本人が拒否したことにより、医師の見解も得られず、また臨床経過等の情報が不足しているため因果関係の評価は困難であると考える。

これらから、本剤との因果関係を断定できる情報が得られていないと考え、直ちに添付文書改訂等の措置が必要とは思われない。引き続き、販売時の服薬指導・情報提供を徹底し、今後の状況・推移を注視していきたい。

製造販売後臨床試験（3 クール：最大延べ 168 日服用）118 例において、7 例（5.9%）11 件の副作用が報告され、その内訳は腹部不快感 4 件、下痢 3 件、上腹部痛 1 件、胃腸の炎症 1 件、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 1 件、尿中ブドウ糖陽性 1 件で、すべて非重篤であり、特に問題はないと考えられた。副作用発生頻度も特別調査と大差ないものと考える。

特別調査および一般調査から収集された副作用で、先に述べたスティーブンス・ジョンソン症候群 1 例、肺塞栓 1 例、気胸 1 例の重篤副作用症例 3 例を除く未知非重篤副作用症例定期報告対象となつた 610 例 826 件のうち、医師・薬剤師から「関連あり・可能性大・確実」等の評価があつた症例は補足資料（1）に示す 43 例 62 件であった。これらの内訳は、動悸 7 例 7 件、頭痛 6 例 6 件、浮動性めまい 4 例 4 件、四肢痛 3 例 3 件、ほてり 3 例 3 件、紅斑 3 例 3 件などである。なお、全ての未知の副作用症例を補足資料（2）に示した。

報告された未知の事象は、本剤の使用が多くは成人女性のため、1 ヶ月を超える長期使用されることより、月経前後や更年期の生理的変動・愁訴（例えば、月経周期・経血量の変化、ほてり、頭痛、めまい、浮腫、筋肉痛、動悸、息切れ、しづれ・知覚異常、疲労感など）等が副作用・有害事象として報告されている可能性も想定される。実際に使用者からだけではなく、販売店薬剤師からも問合せとして連絡されてきた事象もかなりあった。その様な状況からマスコミ等による種々情報の影響や、本来安全に服用してもらうことを目的とし記載した「使用上の注意」の内容を読み、逆に過度な不安を感じてしまうことなど解消し、また特別調査と一般調査で入手された相談とも捉えられる女性特有の症状をより詳細・正確に聞き取り、より正確な情報を伝えるため、販売業者の協力で平成 20 年 11 月 17 日に「トランシーノ相談室」を設置し、情報収集対応能力を向上した結果、発売当初から比べてもより詳細な情報が入手されるようになり、現在ではトランシーノ相談室で全相談件数の 74% を対応しており、より詳細な情報収集を入手する環境を整備した。しかしながら報告を受ける有害事象の殆どが製造販売後臨床試験では報告されていない事象や配合成分の医療用添付文書には記載されていない事象であることから、未だにより正確な因果関係の評価判断に苦慮している現状であり、以前と比較し格段に上がつたといえ、依然として女性特有の症状に対し評価・検討するのに十分な情報を入手することは困難である。これら全てを軽視することはできないが、多くは十分な判定根拠となる発現時及び経過の情報が不足している症例であるため、継続して詳細な情報入手に努めるよう販売店に協力を求める必要があると考える。また、引き続き販売店に対して販売時服薬指導の徹底に、販売業者共々、一層働きかけていく所存である。

以上のことから、医師・薬剤師から「関連あり・可能性大・確実」と比較的多く評価をされた動悸、頭痛、浮動性めまいについては、全ての事象がトランシーノが原因であるかは不明であるが、使用者への注意喚起のため添付文書への記載の見直しを検討する。そして今後一層、高質な副作用情報の収集・検討に努め、トランシーノの適正使用を推進していく所存である。

## 補足資料(1) 「関連あり」とされる未知非重篤事象一覧

副作用の種類 (PT)	番号	性別	年齢	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)			年次
					1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	判定者	
浮腫	DS09-0579	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	回復	服用直後にむくみ、動悸が発生したため、本剤内の成分により発生した可能性が大。	可能性大	薬剤師	第3次
浮腫	DS10-0907	女	42	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	回復	服用1ヵ月後の発現であり、服用中止後に回復していることから、本剤が原因だと思います。	確実	薬剤師	第4次
眼瞼浮腫	DS09-1375	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	不明	肝斑の改善	瞼のはれ	非重篤	未回復	(医師)本剤が原因の可能性がある。	可能性あり	医師	第3次
眼窩周囲浮腫	DS07-0474	女	4X	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	瞼の腫れ、目じりの腫れ、頬の辺りの肌が少し潤れている様な感じ	非重篤	回復・	他にアレルギーはないことから、体調も影響があったと思われた。	可能性大	薬剤師	第1次
眼窩周囲浮腫	DS09-1173	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	目の腫れ	非重篤	回復	本剤服用後すぐに副作用が出ているため、本剤による可能性大と思われる。本剤中止後すぐに副作用は治まっている。	可能性大	薬剤師	第3次
顔面浮腫	DS07-0474	女	4X	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	4日間	しみ(肝斑)	顔のむくみ	非重篤	回復	他にアレルギーはないことから、体調も影響があったと思われた。	可能性大	薬剤師	第1次
顔面浮腫	DS07-1037	女	35	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	10日間	しみ(肝斑)	肝斑部位の腫れ	非重篤	回復	他に併用薬はなかったとのことで、本剤による副作用が考えられる。	可能性大	薬剤師	第1次
末梢性浮腫	DS07-0706	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	10日間	しみ(肝斑)	足のむくみ	非重篤	不明	服用以前は何もなかつたので、本剤の可能性大だと思う。	可能性大	薬剤師	第1次
末梢性浮腫	DS08-0631	女	47	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	5日間	しみ(肝斑)	むくみ	非重篤	回復	服用中止後むくみがとれたので副作用の可能性あり	可能性大	薬剤師	第2次
動悸	DS07-0814	女	50	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	しみ(肝斑)	動悸	非重篤	回復	これまでこのような症状が出たことは全くない。薬を中止したところ、症状もなくなり副作用以外考えられない。	確実	薬剤師	第1次
動悸	DS07-1148	女	73	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	どうき	非重篤	回復	今までのサプリメントの服用では異常なかつたが、本剤を夕食後1回だけ服用しただけで胸やけと動悸がおこっているので、本剤が疑われると思う。	確実	薬剤師	第1次
動悸	DS08-0042	女	59	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	しみ(肝斑)	動悸	非重篤	不明	併用薬、当時の体調は不明だが、服用の都度同じ症状が出ているので本剤が原因と考えられる。	可能性大	薬剤師	第1次
動悸	DS08-0158	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	動悸	非重篤	回復	(医師)本剤が原因でしょう。	可能性あり	医師	第1次
動悸	DS08-0103	女	33	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	動悸	非重篤	回復	服用を中止後、頭痛と動悸の症状が改善されたため、副作用の可能性が考えられる。	可能性大	薬剤師	第2次
動悸	DS08-0112	女	44	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	動悸	非重篤	回復	翌日の服用にて3回とも同様の症状が出たため、副作用の可能性が考えられる。	可能性大	薬剤師	第2次
動悸	DS09-0579	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	動悸	非重篤	回復	服用直後にむくみ、動悸が発生したため、本剤内の成分により発生した可能性が大。	可能性大	薬剤師	第3次
頭痛	DS07-0550	女	4X	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	服用されていたご本人様が体格的に小柄な方で、体重も40kg前後とお見受けした為、断定ではないが多少トラネキサム酸の効果が強く出てしまったのではないかと考えられる。	可能性大	薬剤師	第1次
頭痛	DS07-0814	女	50	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	これまでこのような症状が出たことは全くない。薬を中止したところ、症状もなくなり副作用以外考えられない。	確実	薬剤師	第1次

副作用の種類 (PT)	番号	性別	年齢	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)			年次
					1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	判定者	
頭痛	DS07-0952	女	36	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復		可能性大	薬剤師	第1次
頭痛	DS08-0103	女	33	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	20日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	服用を中止後、頭痛と動悸の症状が改善されたため、副作用の可能性が考えられる。	可能性大	薬剤師	第2次
頭痛	DS09-0511	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復	(医師)本剤が原因であると否定できない。(薬剤師)お客様の体調によるものかも知れない。	可能性あり/ 不明	医師/薬 剤師	第3次
頭痛	DS11-0180	女	35	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	頭痛	非重篤	回復		可能性大	薬剤師	第4次
浮動性めまい	DS07-0444	女	50	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	めまい	非重篤	回復	腹部異和感、吐き気等に関しては他のビタミン剤でも同様の症例があることから、本剤との関係は少なからずあると思われた。また、下半身の痛みに関しては、精神的な不安(飲み慣れた薬からの変更)もあったかとは思うが、不明な点が多いので調査願います。	可能性大	薬剤師	第1次
浮動性めまい	DS08-0026	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	9日間	しみ(肝斑)	めまい	非重篤	回復	本剤を服用後に気分が悪くなり服用中止。すぐに回復その後2~3日服用中止し、再度一回量服用同症状が出た。以上から本剤が影響している可能性があると考える。	可能性大	薬剤師	第1次
浮動性めまい	DS08-0042	女	59	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	しみ(肝斑)	眩晕	非重篤	不明	併用薬、当時の体調は不明だが、服用の都度同じ症状がでているので本剤が原因と考えられる。	可能性大	薬剤師	第1次
浮動性めまい	DS09-0511	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	めまい	非重篤	回復	(医師)本剤が原因であると否定できない。(薬剤師)お客様の体調によるものかも知れない。	可能性あり/ 不明	医師/薬 剤師	第3次
四肢痛	DS07-0444	女	50	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	右半身(下半身)に痛み	非重篤	回復	腹部異和感、吐き気等に関しては他のビタミン剤でも同様の症例があることから、本剤との関係は少なからずあると思われた。また、下半身の痛みに関しては、精神的な不安(飲み慣れた薬からの変更)もあったかとは思うが、不明な点が多いので調査願います。	可能性大	薬剤師	第1次
四肢痛	DS07-0550	女	4X	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	足先のつっぱるような痛み	非重篤	回復	服用されていたご本人様が体格的に小柄な方で、体重も40kg前後とお見受けした為、判断ではないが多少トラネキサム酸の効果が強く出てしまったのではないかと考えられる。	可能性大	薬剤師	第1次
四肢痛	DS09-0473	女	47	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	片足の痛み	非重篤	回復	発売当初に服用されたことがあり、今回と同様の症状があったそうですので、本剤との因果関係については可能性大と思われます。	可能性大	薬剤師	第3次
背部痛	DS07-0755	女	53	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝斑)	背中の痛み	非重篤	回復		可能性大	薬剤師	第1次
ほてり	DS08-1514	女	43	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝斑)	顔のほてり	非重篤	回復	添付文書に記載されているような症状ではないが、お客様の体質や服用状況を考慮しても、本剤による副作用だと考えられる。	確実	薬剤師	第2次
ほてり	DS10-0907	女	42	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	60日間	しみ(肝斑)	服用するとからだが温かくなる。	非重篤	回復	服用1ヵ月後の発現であり、服用中止後に回復していることから、本剤が原因だと思います。	確実	薬剤師	第4次
ほてり	DS11-0161	女	73	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	しみ(肝斑)	火照り	非重篤	軽快	服用後7~10日目で症状発現。皮膚科での診察を受けられたとの事ですが、中止された後回復に向かっているとの事で、可能性はあるのでは…と考えております。	可能性大	薬剤師	第4次
紅斑	DS09-0659	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	発赤	非重篤	未回復	(医師)発症時期を考慮するとビタミンEあるいは本剤の服用が原因と思われる。なお、確定するためには負荷試験が必要である。	可能性あり	医師	第3次

副作用の種類 (PT)	番号	性別	年齢	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)			年次	
					1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	判定者		
紅斑	DS10-0010	女	64	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	肝斑の改善	発赤(頬、額など)	非重篤	不明			可能性大	薬剤師	第3次
紅斑	DS10-0897	女	5X	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑の改善	発赤(ウエスト部分と 腕の付け根)	非重篤	回復			関連を否定 できない	医師	第4次
蕁麻疹	DS07-0508	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	7日間	肝斑の改善	蕁麻疹(両腕・背中・ 胸)	非重篤	回復			関連あり	医師	第1次
皮膚剥脱	DS10-0663	女	41	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	肝斑の改善	目の下の皮膚がボロ ボロ剥けた	非重篤	未回復	(医師)トランシーノがあわなかつんですね。服用を中 止してください。		関連を否定 できない	医師	第4次
皮膚剥脱	DS10-0702	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	61日間	肝斑の改善	皮がむけた(目の下、 口元)	非重篤	軽快			関連を否定 できない	医師	第4次
白斑	DS08-0926	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	肝斑	肌の色が抜けて白く なった	非重篤	未回復	(医師)本剤による副作用		関連あり	医師	第2次
皮膚変色	DS10-0702	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	61日間	肝斑の改善	皮膚の変色(目の 下、口元)	非重篤	軽快			関連を否定 できない	医師	第4次
腹部不快感	DS07-0444	女	50	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	腹部に違和感	非重篤	回復	腹部異和感、吐き気等に関しては他のビタミン剤でも同 様の症例があることから、本剤との関係は少なからずある と思われた。また、下半身の痛みに関しては、精神的な 不安(飲み慣れた薬からの変更)もあったかとは思うが、 不明な点が多いので調査願います。		可能性大	薬剤師	第1次
腹部不快感	DS10-0247	女	5X	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	しみ(肝斑)	胃もたれ	非重篤	回復	来店されたときはすでに回復されてました。服用中の主 な症状は胃もたれと胸やけとのことですが、今の時期、胃 の調子の悪い方も多く、それが重なった可能性もあります。		可能性大	薬剤師	第3次
口渴	DS09-0473	女	47	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	30日間	しみ(肝斑)	口渴	非重篤	回復	発売当初に服用されたことがあります、今回と同様の症状が あったそうですので、本剤との因果関係については可能 性大と思われます。		可能性大	薬剤師	第3次
口渴	DS10-0368	女	58	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	14日間	しみ(肝斑)	のどの渇き	非重篤	回復	副作用発現も1日目からで、併用薬もないことから副作用 であると考えられる。又、重篤に至らなかったのは、販売 時の説明や注意することを伝えておいたので、本人も理 解をし、対応が早かったことが幸いしたと思う。		可能性大	薬剤師	第4次
口唇障害	DS08-1536	女	37	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	6日間	しみ(肝斑)	唇が紫色になった	非重篤	回復	当作用は本剤によるものと思われる。止めた時点で治つ たようです。		可能性大	薬剤師	第2次
呼吸困難	DS07-0814	女	50	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	3日間	しみ(肝斑)	息切れ	非重篤	回復	これまでこのような症状が出たことは全くない。薬を中止 したところ、症状もなくなり副作用以外考えられない。		確実	薬剤師	第1次
呼吸困難	DS08-0112	女	44	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	2日間	しみ(肝斑)	息切れ	非重篤	回復	翌日の服用にて3回とも同様の症状が出たため、副作用 の可能性が考えられる。		可能性大	薬剤師	第2次
胸部不快感	DS07-0893	女	49	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	4日間	しみ(肝斑)	胸がつまる感じで苦 しくなる。	非重篤	回復	今回のケースは本品以外他剤服用しておらず、本品によ る軽度な副作用と考えられる。本人は本品の為に今後血 栓ができる恐れがないか?と不安がっておられた。本品 オールで6錠の服用であり、心配ない旨話す。メーカーに も連絡し、特に今後何らかの影響がある時は連絡する旨 話して解す。		可能性大	薬剤師	第1次
過換気	DS07-0528	女	3X	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	1日間	しみ	過呼吸	非重篤	回復	(医師)本剤服用による一過性のものである。		可能性あり	医師	第1次

副作用の種類 (PT)	番号	性別	年齢	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		使用理由	有害事象			備考 (医師又は薬剤師の見解)			年次
					1日 使用量	使用 期間		症状	程度	転帰	得られたコメント	因果関係	判定者	
咽喉絞扼感	DS07-0755	女	53	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝斑)	のどがしめつけられる	非重篤	回復		可能性大	薬剤師	第1次
異常感	DS08-0026	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	9日間	しみ(肝斑)	気分が悪くなった	非重篤	回復	本剤を服用後に気分が悪くなり服用中止。すぐに回復その後2~3日服用中止し、再度一回量服用同症状が出た。以上から本剤が影響している可能性があると考える。	可能性大	薬剤師	第1次
異常感	DS08-0042	女	59	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	9日間	しみ(肝斑)	気分が悪くなる	非重篤	不明	併用薬、当時の体調は不明だが、服用の都度同じ症状が出ているので本剤が原因と考えられる。	可能性大	薬剤師	第1次
感觉鈍麻	DS08-1342	女	33	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	1回	1日間	しみ(肝斑)	手のしびれ	非重篤	回復	初めての服用であり、また服用後に症状が現れていることより因果関係については可能性大と考える。	可能性大	薬剤師	第2次
感觉鈍麻	DS10-1283	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	不明	不明	肝斑	痺れ(手の先、足の先)	非重篤	軽快	(しびれは)トランシーノに入っているトラネキサム酸が原因かもしれないで飲むのはやめるように	関連を否定できない	医師	第4次
無力症	DS08-1514	女	43	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	2日間	しみ(肝斑)	手の脱力感	非重篤	回復	添付文書に記載されているような症状ではないが、お客様の体質や服用状況を考慮しても、本剤による副作用だと考えられる。	確実	薬剤師	第2次
倦怠感	DS07-0772	女	55	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	2回	1日間	しみ(肝斑)	体がだるくなった	非重篤	回復	ある種のビタミン剤が合わなかつたのだろう。	確実	薬剤師	第1次
振戦	DS09-0511	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	3日間	しみ(肝斑)	手のふるえ	非重篤	回復	(医師)本剤が原因であると否定できない。(薬剤師)お客様の体調によるものかも知れない。	可能性あり/ 不明	医師/薬剤師	第3次
悪寒	DS07-0560	女	28	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	12日間	しみ(肝斑)	悪寒	非重篤	回復		可能性大	薬剤師	第1次
熱感	DS07-1000	女	42	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	8日間	しみ(肝斑)	のぼせ	非重篤	回復		可能性大	薬剤師	第1次
不正子宮出血	DS08-0426	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	不明	肝斑	不正月経血	非重篤	回復	(医師)本剤が原因かもしれないで、服用を中止するよう。	可能性あり	医師	第2次
随伴疾患悪化	DS08-0510	女	不明	トランシーノ (第一三共ヘルスケア)	3回	1日間	肝斑	歯痛(歯肉内うっ血による痛み)	非重篤	回復	(医師)歯周病の出血がトラネキサム酸によって止血され歯肉内にうっ血したとの診断。	可能性あり	医師	第2次

補足資料(2) 未知事象の分析結果【一般調査+特別調査 累計】

時 期	【第1次】	【第2次】	【第3次】	【第4次】	【累計】	医師または薬剤師の見解が得られた症例	内訳		内訳		
	2007年6月21日 ~ 2008年6月20日	2008年6月21日 ~ 2009年6月20日	2009年6月21日 ~ 2010年6月20日	2010年6月21日 ~ 2011年6月20日	2007年6月21日 ~ 2011年6月20日		医師	薬剤師	医師	薬剤師	
副作用発現症例数	487	261	151	177	1076	383	41	353	106	25	81
副作用発現件数	814	391	227	262	1694	641	68	595	182	38	144
副作用発現件数(未知)	397	156	106	170	829	291	33	267	64	18	46
<副作用の種類>					副作用発現件数						
不整脈	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
動悸	21	7	6	10	44	17	1	16	7	1	6
耳鳴	1	1	0	1	3	2	0	2	0	0	0
眼の異常感	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
眼瞼炎	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
眼瞼紅斑	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
眼痛	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
眼瞼浮腫	6	2	1	2	11	6	2	4	1	1	0
眼瞼下垂	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
眼充血	2	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0
光視症	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
癡視	2	1	0	0	3	3	0	3	0	0	0
視力障害	2	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0
硝子体浮遊物	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
眼の異物感	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
腹部不快感	22	4	3	5	34	6	0	6	2	0	2
腹部膨満	0	2	1	3	6	1	0	1	0	0	0
口唇炎	3	0	2	0	5	2	0	2	0	0	0
便秘	3	5	4	4	16	5	1	5	0	0	0
おくび	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
硬便	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
鼓腸	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
排便回数増加	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
歯肉腫脹	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
舌痛	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
血便排泄	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
口唇痛	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
口内炎	2	1	1	1	5	2	0	2	0	0	0
口腔粘膜紅斑	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
口唇障害	1	1	0	0	2	1	0	1	1	0	1
口唇のひび割れ	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
由不快感	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
口の感覺鈍麻	4	0	2	2	8	3	0	3	0	0	0
無力症	0	2	0	0	2	1	0	1	1	0	1
胸部不快感	6	2	0	1	9	4	0	4	1	0	1
胸痛	8	3	0	2	13	2	0	2	0	0	0
悪寒	1	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1
随伴疾患悪化	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
顔面浮腫	9	2	2	2	15	8	2	8	2	0	2
顔面痛	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
異常感	8	0	0	0	8	4	0	4	2	0	2
熱感	4	1	0	0	5	3	0	3	1	0	1
全身性浮腫	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0
倦怠感	10	8	3	3	24	4	0	4	1	0	1
浮腫	6	9	3	6	24	11	1	10	2	0	2
末梢性浮腫	11	3	1	5	20	7	1	7	2	0	2
疼痛	1	1	0	1	3	2	0	2	0	0	0
発熱	3	0	1	0	4	1	0	1	0	0	0
口渴	3	1	1	4	9	4	0	4	2	0	2
限局性浮腫	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
異物感	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
肝機能異常	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
乳腺炎	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0
膿瘍性皮疹	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
化膿	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
転倒	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

時期	【第1次】 2007年6月21日 ~ 2008年6月20日	【第2次】 2008年6月21日 ~ 2009年6月20日	【第3次】 2009年6月21日 ~ 2010年6月20日	【第4次】 2010年6月21日 ~ 2011年6月20日	【累計】 2007年6月21日 ~ 2011年6月20日	医師または薬剤師の見解が得られた症例	内訳		内訳	
	医師	薬剤師	確実、関連性あり及び可能性大とされた症例	医師	薬剤師		医師	薬剤師	医師	薬剤師
ブラン・アミトランスフェラーゼ増加	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
アスペラギン酸アミトランスフェラーゼ増加	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
血中コレステロール増加	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
γ-グルタミトランスフェラーゼ増加	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
肝機能検査異常	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0
脈圧上昇	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
尿量減少	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
代謝障害	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
関節痛	3	0	0	0	3	1	1	1	0	0
背骨痛	3	0	0	1	4	2	0	2	1	0
筋痙攣	2	1	0	0	3	2	0	2	0	0
筋肉痛	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
四肢痛	17	0	3	6	26	11	0	11	3	0
重感	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
筋骨格硬直	3	2	2	2	9	3	0	3	0	0
筋骨格不快感	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
四肢不快感	2	0	0	0	2	1	0	1	0	0
浮動性めまい	26	6	3	9	44	15	1	15	4	1
体位性めまい	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
第7脳神経麻痺	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
頭部不快感	5	2	0	0	7	1	0	1	0	0
頭痛	48	22	14	11	95	34	2	33	6	1
感覺鈍麻	11	6	3	3	23	14	1	13	2	1
片頭痛	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0
錯覚	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
味覚消失	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
傾眠	2	2	1	0	5	1	0	1	0	0
会話障害	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
振戻	1	0	2	1	4	3	1	3	1	1
不眠症	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0
中期不眠症	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
排尿困難	2	2	0	1	5	4	1	3	0	0
頻尿	1	1	3	1	6	5	0	5	0	0
尿臭異常	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
尿閉	1	0	0	2	3	2	1	1	0	0
無月経	1	1	0	0	2	1	0	1	0	0
月経困難症	1	2	0	1	4	0	0	0	0	0
子宮内膜増殖症	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
過少月経	4	2	4	5	15	4	0	4	0	0
月経過多	5	2	3	1	11	4	0	4	0	0
月経障害	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
月経遅延	2	0	4	4	10	2	0	2	0	0
不規則月経	3	2	2	2	9	1	0	1	0	0
不正子宮出血	3	6	0	1	10	3	1	2	1	1
希発月経	2	2	0	2	6	0	0	0	0	0
頻発月経	2	1	0	5	8	0	0	0	0	0
乳房不快感	1	0	1	1	3	2	0	2	0	0
乳房痛	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
性器分泌物	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
息苦まり感	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
発声障害	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
呼吸困難	7	1	2	1	11	5	0	5	2	0
過換気	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
鼻閉	1	0	0	2	3	1	0	1	0	0
※ 気旋	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
※ 肺嚢栓症	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
くしゃみ	1	0	0	3	4	1	0	1	0	0
咽喉絞扼感	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
鼻漏	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
口腔咽頭痛	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ざ瘡	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
脱毛症	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0

時期	【第1次】 2007年6月21日 ~ 2008年6月20日	【第2次】 2008年6月21日 ~ 2009年6月20日	【第3次】 2009年6月21日 ~ 2010年6月20日	【第4次】 2010年6月21日 ~ 2011年6月20日	【累計】 2007年6月21日 ~ 2011年6月20日	医師または薬剤師の見解が得られた症例	内訳		内訳	
	医師	薬剤師	医師	薬剤師	医師		医師	薬剤師	医師	薬剤師
皮膚炎	4	0	0	0	4	1	0	1	0	0
皮膚乾燥	3	0	0	2	5	1	0	1	0	0
紅斑	30	12	10	10	62	17	4	13	3	2
毛髪変色	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
多汗症	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
白斑	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
爪変色	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
皮膚疼痛	0	1	0	2	3	1	0	1	0	0
眼瞼周囲浮腫	3	0	1	0	4	3	0	3	2	0
紫斑	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0
皮膚変色	1	0	0	1	2	1	1	0	1	1
皮膚障害	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
皮膚剥脱	2	1	1	3	7	5	3	2	2	0
皮膚色素過剰	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
皮膚刺激	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0
※スティーブンス・ジョンソン症候群	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1
顔面紅腫	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
擦麻疹	4	0	0	2	6	3	1	2	1	1
黄色皮膚	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
全身紅斑	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
皮膚のべとつき感	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
皮膚線条	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
顔面感覺鈍麻	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0
潮紅	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0
末梢冷感	2	1	2	1	6	2	0	2	0	0
血管収縮	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ほてり	3	2	1	3	9	5	0	5	3	0


※：関連が否定されなかつた重篤な副作用症例



使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## しみ(肝斑に限る)改善薬

第1類医薬品



トランシーノ®  
TRANSINO®

肝斑に  
トラネキサム酸配合

使用前にこの説明文書  
を必ずお読み下さい

トランシーノ®  
肝斑に  
トラネキサム酸配合



### 特徴

トランシーノ®は、肝斑に効くトラネキサム酸を、肝斑改善成分として配合した医薬品です。

## 使用上の注意

 してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります）

次の人は服用しないで下さい

トランキサン酸を含有する内服薬を服用している人



### 相談すること

#### ① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 授乳中の人
- (3) 55歳以上の人
- (4) 本人又は家族がアレルギー体质の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 血栓症のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎、肺塞栓症等)
- (7) 血栓症を起こすおそれのある人(以前に血栓症にかかったことがある人、家族が血栓症を起こした人、医師から先天性の凝固異常症を指摘されたことがある人、経口避妊薬・ホルモン補充療法などの血栓症を起こすおそれのある薬を服用している人)
- (8) 次の診断を受けた人  
腎臓病

#### ② 服用後、次の症状があらわれた場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

関係部位	症状
皮ふ	発疹、かゆみ
消化器	恶心・嘔吐、腹痛、食欲不振、胸やけ

#### ③ 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

下痢

#### ④ ご自分のしみが、本剤の効能効果である肝斑かどうかの識別が難しい場合、また、色が黒ずんでおり、色調が不均一で、表面が隆起したようなしみ状のものがある場合は専門の皮膚科医に相談して下さい

### その他の注意

#### ① 本剤は、血栓(血液が固まったもの)を溶けにくくする作用があります。そのため、血栓症の初期症状(激しい頭痛・舌のもつれ、10分以上続く締め付けられるような胸の痛み・突然の息切れ、片足のふくらはぎの痛み・むくみ、原因不明の突然の呼吸困難・胸の痛みを伴う一過性の意識消失等)に注意して下さい

#### ② 2カ月間を超えて続けて服用しないで下さい

#### ③ 服用中止後に再発した場合は、また服用を始めてもよいですが、再開までに最低2カ月はあけて下さい。また、服用を再開してからも2カ月間を超えて続けて服用しないで下さい

#### ④ しみの改善の程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。また、効果があった場合も、しみが完全に消えるわけではありません

((((( 効能・効果 )))) ) かんばん  
しみ(肝斑に限る)

((((( 用法・用量 )))) ) 次の量を食後に服用して下さい

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠 ○○	3回
15歳未満	服用しないで下さい	

#### <用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



((((( 成分・分量 )))) ) 1日量(6錠)中

成 分	分 量
トラネキサム酸	750mg
L-システイン	240mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	6mg
パントテン酸カルシウム	24mg

添加物：乳酸Ca、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ

#### <成分・分量に関連する注意>

- 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。  
医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

((((( 保管及び取扱い上の注意 )))) )

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. ぬれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。また、使用期限内であっても内袋(アルミ袋)開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。
6. 内袋(アルミ袋)の中に活性炭シートを入れてありますので、間違って食べないよう注意して下さい。

## しみを効果的に改善するため

- お薬の効果がわかるようになるまで、少なくとも1ヶ月間は服用しましょう。
- 紫外線を慢性的に浴びることはしみ、しわ等の皮膚の老化につながります。夏でも長袖のシャツを着たり、帽子やサングラス、日傘を利用しましょう。また、日焼け止めクリームを使用する等、紫外線に注意しましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 トランシーノ相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電話 0120-013-416(フリーダイヤル)


受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

### かんばん 肝斑とは

肝斑(かんばん)とは、女性の顔面に多く生じるしみで、妊娠、経口避妊薬などにより誘発あるいは悪化するので、女性ホルモンが関連して発症するといわれています。

紫外線で少し悪化します。薄い褐色でやや大きく、ほほ骨に沿って左右対称にできるのが特徴的です。高齢者ではほとんど見られないといわれています。また、レーザー治療で悪化するといわれています。

かんばん  
肝斑




典型的な例




広範囲に出た例

そばかす(雀卵斑)



子どものころからある  
小さい色素斑です。  
肝斑ではありません。



典型的な例

肝斑ではありません。

対称性真皮メラノサイトーシス



軽症例1



軽症例2

小さな丸い色素斑が散在性に見えます。  
季節によって薄くなったり  
濃くなったり等の変動が少ない  
色素斑です。そばかすに似ています。  
肝斑ではありません。

小さな丸い色素斑が  
集まって見えます。  
季節による変動は少なく  
加齢により悪化します。  
肝斑ではありません。

\*その他、肝斑に似ているしみとして、リール黒皮症といわれる、化粧品のくり返し使用ができる色素沈着等もありますが、肝斑ではありません。

トランシーノについて詳しくは [www.transino.jp](http://www.transino.jp)

03 ®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

- 4 -

製造販売元

ダイト株式会社

富山県富山市八日町326番地

