

表24 1年間慢性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
800 ppm	・T <sub>3</sub> 增加、TSH增加 ・T.Bil減少 ・肝腫大 ・甲状腺コロイド変化	・体重増加抑制 ・T.Bil減少 ・TSH增加 ・両側副腎の褐色化 ・甲状腺ろ胞細胞肥大及びコロイド変化、副腎束状帶の細胞質好酸性化
300 ppm 以上	・甲状腺ろ胞細胞肥大	300 ppm 以下
125 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

### （3）2年間発がん性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 50 匹）を用いた混餌（原体：0、50、125、300 及び 800 ppm；平均検体摂取量は表 25 参照）投与による 2 年間発がん性試験が実施された。

表 25 2 年間発がん性試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群	50 ppm	125 ppm	300 ppm	800 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	2.5	6.1	14.8
	雌	3.3	8.2	19.5

検体投与に関連した死亡率の増加は認められなかった。

各投与群で認められた毒性所見は表 26 に示されている。

剖検により、800 ppm 投与群の雄で肺の部分的暗赤色化が認められたが、病理組織学的検査において関連所見がないこと、用量相関性がないことから、偶発的なものと考えられた。また、800 ppm 投与群の雄で精巣に少数の結節が認められたが、病理組織学的検査においてライディッヒ細胞腺腫の増加が認められないとため、毒性学的な意義があるとは考えられなかった。

剖検及び病理組織学的検査において 800 ppm 投与群の雌で子宮拡張及び子宮の結節が増加し、それに伴う腹部膨満が認められた。子宮内腔拡張を示した多くの例では、分泌物貯留、大きな囊胞、子宮内膜間質ポリープ等の所見を伴っていた。これらの病変は加齢ラットで好発することが知られているが、これらの病変の発生頻度には用量相関性は認められなかった。さらに、関連性のある変化が卵巣、卵管、腟及び乳腺で認められていないことから、子宮の変化は偶発的なものであると考えられた。

白内障の発現率が雄において対照群よりも僅かに高かったが、用量相関性が認められず、自然発生的な加齢に伴う病変であると考えられた。

検体投与に関連して発生頻度が増加した腫瘍はなかった。

本試験において、800 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は雌雄とも 300 ppm（雄：14.8 mg/kg 体重/日、雌：19.5 mg/kg 体重/

日) であると考えられた。発がん性は認められなかつた。(参照 38)

表 26 2年間発がん性試験(ラット)で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
800 ppm	・体重増加抑制 ・TSH 増加 ・甲状腺コロイド変化	
300 ppm 以下	毒性所見なし	毒性所見なし

#### (4) 18か月間発がん性試験(マウス)

ICR マウス(一群雌雄各 50 匹)を用いた混餌(原体: 0、20、140、1,000 及び 2,000 ppm: 平均検体摂取量は表 27 参照)投与による 18 か月間発がん性試験が実施された。

表 27 18 か月間発がん性試験(マウス)の平均検体摂取量

投与群	20 ppm	140 ppm	1,000 ppm	2,000 ppm
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	3.3	21.7	157
	雌	3.8	29.9	201

各投与群とも死亡率に影響はみられなかつた。

各投与群で認められた主な所見は表 28 に示されている。

2,000 ppm 投与群の雌では、子宮の硬さの変化が認められ、対応する病理組織学的变化として子宮内膜囊胞状過形成が認められた。また、2,000 ppm 投与群の雄 4 例で腎臓の小結節が認められ、顕微鏡学的には腎アミロイドーシスとして、腎表面に認められた結節様変化は慢性腎症として観察された。しかし、これらの病変には統計学的有意差がなく投与に関連した影響とは考えられなかつた。

1,000 ppm 以上投与群の雌で副腎比重量増加が認められ、副腎皮質のアミロイドーシスに関連しているものと考えられた。アミロイドーシスは加齢性病変であり、本系統のマウスでは自然発生的に認められる全身性疾患である。アミロイドーシスを発症した個体数の比較においては有意差が認められなかつたことから、検体の影響とは考えられなかつた。

腫瘍性病変について、傾向検定で統計学的な有意差がいくつか認められたが、対照群との違いは僅かであり、背景データの範囲内にあるか、又は群間比較では統計学的有意差が認められないことから、投与に関連した影響とは考えられなかつた。

本試験において、140 ppm 以上投与群の雌雄で副腎束状細胞質好酸性化等が認められたので、無毒性量は、20 ppm(雄: 3.3 mg/kg 体重/日、雌: 3.8 mg/kg 体重/日)であると考えられた。発がん性は認められなかつた。(参照 39)

表 28 18か月間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見

投与群	雄	雌
2,000 ppm	・体重増加抑制	
1,000 ppm 以上		
140 ppm 以上	・副腎束状帯細胞質好酸性化 ・副腎皮質び漫性脂肪滴減少	・副腎の変色 ・副腎束状帯細胞質好酸性化 ・副腎皮質び漫性脂肪滴減少
20 ppm	毒性所見なし	毒性所見なし

## 12. 生殖発生毒性試験

### (1) 2世代繁殖試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌雄各 25 匹）を用いた混餌（原体：0、30、120 及び 500 ppm：平均検体摂取量は表 29 参照）投与による 2 世代繁殖試験が実施された。

表 29 2 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量

投与群	30 ppm		120 ppm	500 ppm
	P 世代	雄		
平均検体摂取量 (mg/kg 体重/日)	雄	2.2	8.8	36.6
	雌	3.8	14.2	64.2
F <sub>1</sub> 世代	雄	3.3	13.2	76.2
	雌	4.6	18.0	90.9

各投与群で認められた毒性所見は表 30 に示されている。

500 ppm 投与群の F<sub>1</sub> 世代雌において、原始卵胞数增加が認められたが、全身性の毒性による二次的反応であるか、又は発育卵胞、成熟卵胞に生物学的意義のある変動はみられないこと、繁殖にも変動が認められることから、検体投与に関連した変化とは考えられなかった。

500 ppm 投与群の F<sub>1</sub> 離乳児において、包皮分離及び陰門開口の遅延が認められたが、この用量において体重が低下したことの結果であると考えられた。

本試験において、親動物では 120 ppm 以上投与群の雌雄 (F<sub>1</sub>) で体重増加抑制等、児動物では 120 ppm 以上投与群の雌雄 (F<sub>1</sub>、F<sub>2</sub>) で体重増加抑制等が認められたので、無毒性量は親動物及び児動物で 30 ppm (P 雄 : 2.2 mg/kg 体重/日、P 雌 : 3.8 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 雄 : 3.3 mg/kg 体重/日、F<sub>1</sub> 雌 : 4.6 mg/kg 体重/日) であると考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照 40）

表 30 2世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見

投与群	親:P、児:F <sub>1</sub>		親:F <sub>1</sub> 、児:F <sub>2</sub>	
	雄	雌	雄	雌
親動物	500 ppm 毒性所見なし	・体重増加抑制 ・甲状腺比重量増加 ・脾絶対及び比重量減少	・甲状腺比重量増加 ・肝絶対重量減少 ・甲状腺コロイド変化（凝集）	・肝比重量増加 ・脾絶対重量減少 ・甲状腺ろ胞細胞肥大及びコロイド変化（凝集）、小葉中心性肝細胞肥大
	120 ppm 以上 毒性所見なし	120 ppm 以下 毒性所見なし	・体重増加抑制 ・脾絶対重量減少	・体重増加抑制
	30 ppm 毒性所見なし		毒性所見なし	毒性所見なし
児動物	500 ppm ・脾比重量増加 ・包皮分離遅延	・脾比重量増加 ・脾及び胸腺絶対重量減少 ・腫開口遅延	・脾比重量増加 ・脾及び胸腺絶対重量減少	・脾比重量増加 ・脾及び胸腺絶対重量減少
	120 ppm 以上 毒性所見なし	・体重増加抑制 ・脾及び胸腺絶対重量減少	・体重増加抑制	・体重増加抑制
	30 ppm 毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし	毒性所見なし

## （2）発生毒性試験（ラット）

Wistar ラット（一群雌 25 匹）の妊娠 6～19 日に強制経口（原体：0、10、70 及び 500 mg/kg 体重/日）投与して発生毒性試験が実施された。

500 mg/kg 体重/日投与群の 4 例に跳躍性痙攣がみられ、その内の 1 例が妊娠 15 日に死亡した。頭部打撲による頭蓋腔出血が死亡の原因と考えられた。

70 mg/kg 体重/日以上投与群で摂餌量減少及び体重増加抑制が認められた。

生存児を有する母動物の割合、着床後死胚、胎児数、性比、胎盤重量及び外観に検体投与の影響は認められなかった。

胎児では、毒性所見は認められなかった。

本試験において、母動物では 70 mg/kg 体重/日以上投与群で体重増加抑制等が認められ、胎児では毒性所見が認められなかつたので、無毒性量は母動物で 10 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 500 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかつた。（参照 41）

## （3）発生毒性試験（ウサギ）

ヒマラヤンウサギ（一群雌 22 匹）の妊娠 6～28 日に強制経口（原体：0、5、35 及び 250 mg/kg 体重/日）投与して発生毒性試験が実施された。

母動物では、35 mg/kg 体重/日以上投与群で摂餌量減少、糞量減少及び体重増加抑制がみられた。250 mg/kg 体重/日投与群の 4 例では、耳介の冷感、摂餌量、体重、飲水量、糞便及び尿量の減少を示した後、妊娠 20～25 日の間に流産した。

これらの雌の剖検では、2 例に膨満した胃がみられ、このうち 1 例に小腸の淡明

化(病理組織学的検査: 級毛先端の著明な空胞形成)が認められた。その他では、耳介の冷感、脱毛、尿量減少とそれに伴う尿の赤色化及び飲水量減少が認められた。

250 mg/kg 体重/日投与群では流産(4例)及び総吸収胚(2例)により、生存胎児を有する母動物数の割合の低下がみられた。

胎盤重量及び外観、着床後死胚数、生存胎児数、胎児の性比及び胎児体重に投与の影響は認められなかった。

胎児では、毒性所見は認められなかった。

本試験において、母動物では 35 mg/kg 体重/日以上投与群で体重増加抑制等が認められ、胎児では毒性所見が認められなかつたので、無毒性量は母動物で 5 mg/kg 体重/日、胎児で本試験の最高用量 250 mg/kg 体重/日であると考えられた。催奇形性は認められなかつた。(参照 42)

### 13. 遺伝毒性試験

スピロメシフェンの細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター肺由来培養細胞(V79)を用いた染色体異常試験及び前進突然変異試験並びにマウスを用いた小核試験が実施された。

結果は表 31 に示されているとおり、すべて陰性であった。スピロメシフェンに遺伝毒性はないと考えられた。(参照 43~46)

表 31 遺伝毒性試験概要(原体)

試験	対象	処理濃度・投与量	結果
in vitro	復帰突然変異試験 <i>Salmonella typhimurium</i> (TA98、TA100、TA102、 TA1535、TA1537 株)	16~5,000 µg/plate (+/-S9)	陰性
	染色体異常試験 チャイニーズハムスター肺由来培養細胞(V79)	1~10 µg/mL (-S9) 10~40 µg/mL (+S9)	陰性
	前進突然変異試験 チャイニーズハムスター肺由来培養細胞(V79)	1~25 µg/mL (-S9) 10~95 µg/mL (+S9)	陰性
in vivo	小核試験 NMRI マウス(骨髄細胞) (一群雄 5匹)	100、200、400 mg/kg 体重/日 (腹腔内投与、1日1回、2日間)	陰性

注) +/-S9: 代謝活性化系存在下及び非存在下

代謝物 M1 及び原体混在物 MA の細菌を用いた復帰突然変異試験が実施された。結果は表 32 に示されており、すべて陰性であった。(参照 47、48)

表 32 遺伝毒性試験概要(代謝物及び原体混在物)

被験物質	試験	対象	処理濃度	結果
代謝物 M1	復帰突然変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA102、 TA1535、TA1537 株)	16~5,000 µg/plate (+/-S9)	陰性

原体混在物 MA	復帰突然 変異試験	<i>S. typhimurium</i> (TA98、TA100、TA102、 TA1535、TA1537 株)	16~5,000 µg/7°V→↑ (+/-S9)	陰性
-------------	--------------	---	---------------------------	----

注) +/-S9 : 代謝活性化系存在下及び非存在下

### III. 食品健康影響評価

参考に挙げた資料を用いて農薬「スピロメシフェン」の食品健康影響評価を実施した。なお、今回、国内作物残留試験成績（しとう、甘長とうがらし）、海外作物残留試験成績（セロリ、未成熟いんげん等）等が新たに提出された。

$^{14}\text{C}$ で標識されたスピロメシフェンを用いた動物体内運動試験の結果、ラットに経口投与されたスピロメシフェンの大部分が投与後24時間に速やかに排泄され、雌雄ともに主要排泄経路は糞中であった。低用量投与群における吸収率は約48%と算出された。最も高濃度の残留放射能は肝臓で検出された。糞中からは、親化合物とM1のみが検出され、ほとんどすべてが親化合物であった。

$^{14}\text{C}$ で標識されたスピロメシフェンを用い、トマト、りんご、レタス及びわたにおける植物体内運動試験が実施された。残留放射能の主要成分は親化合物であり、主要代謝物として、わたの種子においてM1が38%TRR(0.019 mg/kg)、レタスの茎葉においてM9(M2のグルコース抱合体)が13%TRR(0.053 mg/kg)認められた。

果実、野菜、茶等を用いて、スピロメシフェン並びに代謝物M1及びM2+M9を分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。国内でのスピロメシフェン、代謝物M1及びM2+M9(含量)の最大残留値は、それぞれ最終散布7日後に収穫された茶(荒茶)の14.8 mg/kg、8.05 mg/kg、及び最終散布14日後に収穫された茶(荒茶)の12.0 mg/kgであった。海外でのスピロメシフェン及び代謝物M1の最大残留値は、それぞれ最終散布7日後に収穫したミントの17.1 mg/kg及び最終散布7日後に収穫したセロリの3.71 mg/kgであった。後作物残留試験におけるスピロメシフェン及び代謝物M1の最大残留値は、いずれもたまねぎにおける前作収穫後期間(PBI)30日の0.0061 mg/kg及び0.0479 mg/kgであった。また、魚介類におけるスピロメシフェンの最大推定残留値(スピロメシフェン+代謝物M1)は0.052 mg/kgであった。

各種毒性試験結果から、スピロメシフェン投与による影響は主に肝臓(重量増加等)、甲状腺(ろ胞細胞肥大)、副腎(皮質細胞質好酸性化等)並びに十二指腸及び空腸(粘膜上皮細胞質空胞化)に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。

作物における主要代謝物はM1及びM2+M9であったが、M2+M9の残留量は茶のみで高かったこと、M1の急性経口毒性試験の結果は親化合物に比べ僅かに強かつたことから、農産物及び魚介類中における暴露評価対象物質をスピロメシフェン及び代謝物M1と設定した。

各試験における無毒性量等は表33に示されている。

食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量のうち最小値がラットを用いた2世代繁殖試験の2.2 mg/kg体重/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した0.022 mg/kg体重/日を一日摂取許容量(ADI)と設定した。

ADI (ADI 設定根拠資料)	0.022 mg/kg 体重/日 繁殖試験
---------------------	--------------------------

(動物種)	ラット
(期間)	2世代
(投与方法)	混餌
(無毒性量)	2.2 mg/kg 体重/日
(安全係数)	100

表 33 各試験における無毒性量及び最小毒性量

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日)	最小毒性量 (mg/kg 体重/日)	備考 ①
ラット	90 日間 亜急性 毒性試験	0、100、500、3,000、 3,000 <sup>2)</sup> ppm	雄: 31.7 雌: 7.7	雄: 204 雌: 36.6	雄: 体重增加抑制等 雌: 空腸粘膜上皮細胞 質空胞化等
		雄: 0、6.3、31.7、204、 209 <sup>2)</sup> 雌: 0、7.7、36.6、232、 246 <sup>2)</sup>			
		0、100、500、2,000 ppm	雄: 31.8 雌: 38.3	雄: 123 雌: 149	雌雄: 体重增加抑制等
	90 日間 亜急性神経 毒性試験	雄: 0、6.4、31.8、123 雌: 0、7.9、38.3、149			
		0、50、125、300、 800 ppm	雄: 6.5 雌: 19.3	雄: 15.9 雌: 51.7	雌雄: 甲状腺ろ胞細胞 肥大等
	1 年間慢性 毒性試験	雄: 0、2.6、6.5、15.9、 42.4 雌: 0、3.0、7.6、19.3、 51.7			
		0、50、125、300、 800 ppm	雄: 14.8 雌: 19.5	雄: 40.0 雌: 53.6	雌雄: 体重增加抑制等 (発がん性は認められ ない)
	2 年間 発がん性 試験	雄: 0、2.5、6.1、14.8、 40.0 雌: 0、3.3、8.2、19.5、 53.6			
		0、30、120、500 ppm P 雄: 0、2.2、8.8、 36.6 P 雌: 0、3.8、14.2、 64.2 F <sub>1</sub> 雄: 0、3.3、13.2、 76.2 F <sub>1</sub> 雌: 0、4.6、18.0、 90.9	親動物及び児動物 P 雄: 2.2 P 雌: 3.8 F <sub>1</sub> 雄: 3.3 F <sub>1</sub> 雌: 4.6	親動物及び児動物 P 雄: 8.8 P 雌: 14.2 F <sub>1</sub> 雄: 13.2 F <sub>1</sub> 雌: 18.0	親動物及び児動物: 体 重增加抑制等 (繁殖能に対する影響 は認められない)
	発生毒性 試験	0、10、70、500	母動物: 10 胎児: 500	母動物: 70 胎児: -	母動物: 体重增加抑制 等 胎児: 毒性所見なし (催奇形性は認められ ない)
		0、20、140、1,000、 2,000 ppm 雄: 0、3.3、21.7、157、 335 雌: 0、3.8、29.9、201、 401	雄: 3.3 雌: 3.8	雄: 21.7 雌: 29.9	雌雄: 副腎束状帶細胞 質好酸性化等 (発がん性は認められ ない)
ウサギ	発生毒性 試験	0、5、35、250	母動物: 5 胎児: 250	母動物: 35 胎児: -	母動物: 体重增加抑制 等 (催奇形性は認められ ない)

動物種	試験	投与量 (mg/kg 体重/日)	無毒性量 (mg/kg 体重/日)	最小毒性量 (mg/kg 体重/日)	備考 ①
イヌ	90日間 亜急性 毒性試験①	0、20、50、250、2,000 ppm	雄: 9.19 雌: 9.29	雄: 70.9 雌: 71.4	雌雄: 小葉中心性肝細胞変化等
		雄: 0、0.71、1.81、 9.19、70.9 雌: 0、0.78、1.88、 9.29、71.4			
	90日間 亜急性 毒性試験②	0、3,000、5,000 ppm 雄: 98.4、173 雌: 103、171	雄: — 雌: —	雄: 98.4 雌: 103	雌雄: ALP 増加等
	1年間慢性 毒性試験	0、50、400、4,000 ppm 雄: 0、1.4、11.5、109 雌: 0、1.4、10.8、117	雄: 11.5 雌: 10.8	雄: 109 雌: 117	雌雄: 肝細胞質均質化/ 密度増加等

1) 備考に最小毒性量で認められた所見の概要を示す。

2) 回復群

—: 無毒性量又は最小毒性量が設定できなかった。

<別紙1：代謝物/分解物/原体混在物略称>

略称	名称、化学名
M1	4-ヒドロキシ-3-メチル-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-4-イル 3,3-ジメチルブチラート
M2	4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシメチル-2,6-ジメチルフェニル)-1-オキサスピロ[4,4]ノナ-3-エン-2-オン
M3	4-(4-ヒドロキシ-2-オキソ-1-オキサスピロ[4,4]ノナ-3-エン-3-イル)-3,5-ジメチル-安息香酸
M4	4,7-ジヒドロキシ-3-メチル-1-オキサスピロ[4,4]ノナ-3-エン-2-オン
M5	4-ヒドロキシ-3-メチル-1-オキサスピロ[4,4]ノナ-3-エン-2,7-ジオン 又は 4-ヒドロキシ-3-メチル-1-オキサスピロ[4,4]ノナ-3-エン-2,6-ジオン
M6	4,7-ジヒドロキシ-3,4-(ヒドロキシメチル-2,6-ジメチルフェニル)-1-オキサスピロ[4,4]ノナ-3-エン-2-オン
M7	4-(4,7-ジヒドロキシ-2-オキソ-1-オキサスピロ[4,4]ノナ-3-エン-3-イル)-3,5-ジメチル-安息香酸
M8	原体のジヒドロキシエノール体
M9	代謝物 M2 のグルコース抱合体 (4-ヒドロキシメチルグルコシド)
M10	1-[2-オキソ-2-(2,4,6-トリメチルフェニル)-アセトキシ]-シクロペンタンカルボン酸
M11	オキソ-(2,4,6-トリメチルフェニル)-酢酸
M12	4-ヒドロキシ-3-(2-ヒドロキシメチル-4,6-ジメチルフェニル)-1-オキサスピロ[4,4]ノナ-3-エン
M13	スピロ[ビサイクル[4.2.0]オクタ-1,3,5-トリエン-7,8'(2H)-フラン]-2'-オン,4',5'-ジヒドロ-3,5-ジメチル-4'-3,3-ジメチルブチル-カルボニル-オキシ]-5'-スピロ-シクロペンチル
M14	3H-インデノ[1,2-c]フラン-3-オン,1,3a,8,8a-テトラヒドロ-1-スピロシクロペンチル-4,6-ジメチル-8-ヒドロキシ
MA <sup>1)</sup>	(原体混在物)

1) 原体混在物

<別紙2：検査値等略称>

略称	名称
ai	有効成分量
ALD	アルドリンエポキシダーゼ
ALP	アルカリフオスファターゼ
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ (GPT) ]
AST	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ [=グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ (GOT) ]
AUC	薬物濃度曲線下面積
CD2 <sup>total</sup>	T細胞表面マーカ
CD4 <sup>total</sup>	ヘルパーT細胞表面マーカ
CD5 <sup>total</sup>	T細胞表面マーカ
C <sub>max</sub>	最高濃度
Cre	クレアチニン
ECOD	チトクロム P450 依存性モノオキシゲナーゼ (7-エトキシクマリンデエチラーゼ)
EH	エポキシヒドラーーゼ
GGT	γ-グルタミルトランスフェラーゼ [=γ-グルタミルトランスペプチダーゼ (γ-GTP) ]
GST	グルタチオン-S-トランスフェラーゼ
IgA	免疫グロブリン A
IgG	免疫グロブリン G
Lym	リンパ球数
N-DEM	アミノピリン N-デメチラーゼ
Neu	好中球数
O-DEM	(p-ニトロアニソール) O-デメチラーゼ
P450	チトクローム P450
TAR	総投与(処理)放射能
TBC	チロキシン-結合能
T.Bil	総ビリルビン
T.Chol	総コレステロール
TG	トリグリセリド
T <sub>max</sub>	最高濃度到達時間
TP	トロンボプラスチン時間
TRR	総残留放射能

TSH	甲状腺刺激ホルモン
T <sub>1/2</sub>	消失半減期
T <sub>3</sub>	トリヨードサイロニン
T <sub>4</sub>	サイロキシン
UDPGT	ビリルビン抱合酵素（ウリジンニリン酸グルクロニルトランスフェラーゼ）
WBC	白血球数

## &lt;別紙3：作物残留試験成績（国内）&gt;

作物名 [栽培形態] 〔分析部位〕 実施年	試験圃場数	使用量 (g ai/ha)	回数(回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)															
					公的分析機関								社内分析機関							
					スピロメッシュ		M1		M2+M9		合計 <sup>1)</sup>	スピロメッシュ		M1		M2+M9		合計 <sup>1)</sup>		
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値			
トマト [施設] 〔果実〕 2003年	1	143 SC	2	1	0.05	0.04	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.05*	0.08	0.08	0.01	0.01	0.02	0.02	0.09		
				3	0.05	0.05	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.06*	0.08	0.08	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.09*		
				7	0.07	0.06	0.01	0.01	0.04	0.04	0.07	0.06	0.05	0.01	0.01	0.03	0.03	0.06		
	1	123 SC	2	1	0.13	0.12	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.13*	0.22	0.20	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.21*		
				3	0.11	0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.11*	0.19	0.18	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.19*		
				7	0.14	0.14	0.01	0.01	0.01	0.01	0.15	0.16	0.15	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.16*		
	1	358 SC	2	1	0.13	0.12	0.01	0.01	0.02	0.02	0.13	0.11	0.11	0.01	0.01	0.02	0.02	0.12		
				3	0.13	0.12	0.01	0.01	0.03	0.03	0.13	0.07	0.07	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.08*		
				7	0.12	0.12	0.01	0.01	0.04	0.04	0.13	0.10	0.10	0.01	0.01	0.05	0.05	0.11		
	1	308 SC	2	1	0.30	0.30	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.31	0.25	0.24	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.25		
				3	0.36	0.35	0.01	0.01	0.01	0.01	0.36	0.27	0.26	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.27*		
				7	0.29	0.29	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.30*	0.24	0.23	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.24*		
ミニトマト [施設] 〔果実〕 2005年	1	375～450 SC	2	1	1.06	1.06	0.03	0.03			1.09	0.65	0.64	0.03	0.03			0.67		
				3	1.00	0.97	0.03	0.03			1.00	0.76	0.74	0.03	0.03			0.77		
				7	0.92	0.90	0.03	0.03			0.93	0.61	0.60	0.03	0.03			0.63		
				14	1.02	1.01	<0.02	<0.02			1.03*	0.67	0.66	0.02	0.02			0.68		
	1	375 WP	2	1	0.82	0.79	0.03	0.03			0.82	0.77	0.75	0.02	0.02			0.77		
				3	0.76	0.74	0.03	0.02			0.76	0.71	0.68	0.03	0.03			0.71		
				7	0.74	0.74	0.03	0.03			0.77	0.67	0.64	0.02	0.02			0.66		
				14	0.51	0.51	0.03	0.03			0.54	0.51	0.50	0.02	0.02			0.52		
ピーマン [施設] 〔果実〕 2006年	1	375 WP	2	1	1.38	1.36	0.02	0.02			1.38	1.14	1.12	0.03	0.03			1.15		
				3	0.94	0.92	0.02	0.02			0.94	0.81	0.79	<0.02	<0.02			0.81*		
				7	0.19	0.18	<0.02	<0.02			0.20*	0.18	0.18	<0.02	<0.02			0.20*		
	1	375 WP	2	1	0.76	0.75	0.02	0.02			0.77	0.51	0.50	<0.02	<0.02			0.52*		
				3	0.46	0.44	<0.02	<0.02			0.46*	0.54	0.52	0.02	0.02			0.54		
				7	0.26	0.26	<0.02	<0.02			0.28*	0.32	0.32	<0.02	<0.02			0.34*		

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年	試験圃場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)															
					公的分析機関						社内分析機関									
					スピロメッシュ		M1		M2+M9		合計 <sup>1)</sup>	スピロメッシュ		M1		M2+M9		合計 <sup>1)</sup>		
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値			
なす [施設] (果実) 2005年	1	195~330 SC	4	1	0.60	0.56	0.10	0.10			0.66	0.46	0.46	0.08	0.08			0.54		
				3	0.27	0.26	0.10	0.10			0.36	0.32	0.32	0.08	0.08			0.40		
				7	0.11	0.10	0.08	0.08			0.18	0.09	0.09	0.07	0.07			0.16		
	1			1	0.79	0.78	0.23	0.22			1.00	0.41	0.40	0.16	0.16			0.56		
				4	0.31	0.31	0.19	0.19			0.50	0.26	0.25	0.19	0.18			0.43		
				7	0.13	0.12	0.10	0.10			0.22	0.12	0.12	0.08	0.08			0.20		
すいか [施設] (果実) 2006年	1	300~375 WP	2	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03		
				3	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	0.05	0.04	<0.02	<0.02			0.06*		
				7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03		
	1			1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03		
				3	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03		
				7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03		
りんご [露地] (果実) 2004年	1	900 SC	1	1	0.79	0.76	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.78*	0.88	0.84	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.86*		
				3	0.61	0.61	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.63*	0.72	0.72	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.74*		
				7	0.70	0.68	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.70*	0.53	0.52	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.54*		
	1			14	0.38	0.32	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.34*	0.26	0.26	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.28*		
				21	0.24	0.24	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.26*	0.25	0.24	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.26*		
				1	0.24	0.23	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.25*	0.36	0.35	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.37		
なし [露地] (果実) 2004年	1	750 SC	1	1	0.24	0.24	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.26*	0.27	0.26	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.28		
				3	0.24	0.24	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.15*	0.11	0.10	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.12		
				7	0.13	0.13	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03		
	1			14	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03		
				21	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.03		
				1	0.45	0.44	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.46*	0.55	0.54	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.56*		
なし [露地] (果実) 2004年	1	750 SC	1	1	0.38	0.30	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.32*	0.37	0.36	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.38*		
				7	0.41	0.40	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.42*	0.40	0.40	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.42*		
				14	0.14	0.14	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.16*	0.22	0.22	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.24*		
	1			21	0.13	0.12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.14*	0.18	0.18	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.20*		
				1	0.32	0.31	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.33*	0.29	0.28	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.30*		
				3	0.20	0.20	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.22*	0.33	0.32	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.34*		
				7	0.17	0.16	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.18*	0.24	0.23	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.25*		
				14	0.18	0.18	<0.02	<0.02	0.04	0.04	0.20*	0.13	0.12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.14*		
				21	0.13	0.12	<0.02	<0.02	0.05	0.05	0.14*	0.11	0.10	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.12*		

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年	試験圃場数	使用量 (g ai/ha)	回数(回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)													
					公的分析機関						社内分析機関							
					スピーロメッシュ		M1		M2+M9		合計 <sup>1)</sup>	スピーロメッシュ		M1		M2+M9		合計 <sup>1)</sup>
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	
もも [露地・無袋] (果肉) 2006年	1	600～900 SC	1	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02		<0.03	
				3	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02		<0.03	
				7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02		<0.03	
	1		1	1	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02		<0.03	
				3	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02		<0.03	
				7	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02			<0.03	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02		<0.03	
もも [露地・無袋] (果皮) 2006年	1	600～900 SC	1	1	7.97	7.97	0.07	0.07			8.04	4.55	4.50	0.02	0.02		4.52	
				3	4.35	4.30	0.03	0.03			4.33	2.83	2.81	<0.02	<0.02		2.83*	
				7	5.34	5.32	0.05	0.04			5.36	2.09	2.08	0.02	0.02		2.10	
	1		1	1	6.92	6.80	0.08	0.08			6.88	3.13	3.06	0.02	0.02		3.08	
				3	7.70	7.36	0.11	0.11			7.48	4.48	4.39	0.04	0.04		4.43	
				7	5.25	5.20	0.08	0.08			5.28	2.43	2.38	0.03	0.03		2.41	
ネクタリン [露地・無袋] (果実) 2006年	1	600～750 SC	1	1	0.48	0.48	<0.02	<0.02			0.50*							
				3	0.47	0.46	<0.02	<0.02			0.48*							
				7	0.47	0.46	0.02	0.02			0.48							
	1		1	1	0.43	0.42	<0.02	<0.02			0.44*							
				3	0.22	0.21	<0.02	<0.02			0.23*							
				7	0.33	0.33	<0.02	<0.02			0.35*							
すもも [露地・無袋] (果実) 2006年	1	450～1,050 SC	1	1	0.13	0.13	<0.02	<0.02			0.15*							
				3	0.22	0.22	<0.02	<0.02			0.24*							
				7	0.07	0.07	<0.02	<0.02			0.09*							
	1		1	1	0.07	0.07	<0.02	<0.02			0.09*							
				3	0.06	0.06	<0.02	<0.02			0.08*							
				7	0.07	0.06	<0.02	<0.02			0.08*							
うめ [露地] (果実) 2006年	1	450～600 SC	1	1	2.13	2.12	<0.02	<0.02			2.14*	1.28	1.28	<0.02	<0.02		1.80*	
				3	1.32	1.31	<0.02	<0.02			1.33*	1.52	1.49	<0.02	<0.02		1.51*	
				7	0.52	0.52	<0.02	<0.02			0.54*	0.71	0.69	<0.02	<0.02		0.71*	
	1		1	1	0.86	0.84	<0.02	<0.02			0.86*	0.69	0.68	<0.02	<0.02		0.70*	
				3	0.49	0.48	<0.02	<0.02			0.50*	0.44	0.42	<0.02	<0.02		0.44*	
				7	0.23	0.22	<0.02	<0.02			0.24*	0.18	0.17	<0.02	<0.02		0.19*	

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年	試験圃場数	使用量 (g ai/ha)	回数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)														
					公的分析機関						社内分析機関						合計 <sup>1)</sup>		
					スピロメトラン		M1		M2+M9		スピロメトラン		M1		M2+M9				
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値			
とうとう [施設] (果実) 2004年	1	750 SC	1	1	2.72	2.61	0.02	0.02	<0.02	<0.02	2.63	1.88	1.87	0.03	0.03	<0.02	<0.02	1.90	
				3	1.95	1.90	0.04	0.04	<0.02	<0.02	1.94	2.58	2.56	0.07	0.07	<0.02	<0.02	2.63	
				7	2.53	2.44	0.04	0.03	0.03	0.03	2.47	1.93	1.90	0.19	0.19	0.03	0.03	2.09	
				14	1.28	1.27	0.39	0.39	0.09	0.09	1.66	1.54	1.50	0.44	0.43	0.09	0.09	1.93	
	1		1	1	2.67	2.64	0.02	0.02	<0.02	<0.02	2.66	2.00	1.90	0.02	0.02	<0.02	<0.02	1.92	
				3	0.89	0.88	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.91	0.91	0.88	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.91	
				7	0.67	0.65	0.08	0.08	<0.02	<0.02	0.73	0.69	0.67	0.10	0.09	<0.02	<0.02	0.76	
				14	0.77	0.77	0.20	0.19	0.05	0.05	0.96	0.86	0.84	0.23	0.22	0.05	0.05	1.06	
ぶどう [施設] (果実) 2007年	1	750 SC	1	1	0.90	0.89	<0.02	<0.02	/	/	0.91	1.15	1.13	<0.02	<0.02	/	/	1.15	
				3	0.62	0.62	<0.02	<0.02	/	/	0.64	0.68	0.66	<0.02	<0.02	/	/	0.68	
				7	0.42	0.42	<0.02	<0.02	/	/	0.44	0.77	0.76	<0.02	<0.02	/	/	0.78	
				14	0.57	0.56	<0.02	<0.02	/	/	0.58	0.71	0.69	<0.02	<0.02	/	/	0.71	
	1		1	1	3.44	3.42	<0.02	<0.02	/	/	3.44	2.03	2.02	<0.02	<0.02	/	/	2.04	
				3	4.15	4.12	0.02	0.02	/	/	4.14	2.84	2.76	<0.02	<0.02	/	/	2.78	
				7	4.20	4.15	0.03	0.03	/	/	4.18	2.83	2.82	<0.02	<0.02	/	/	2.84	
				14	2.20	2.15	0.02	0.02	/	/	2.17	1.40	1.40	<0.02	<0.02	/	/	1.42	
ししどう [施設] (果実) 2009年	2	375~378 SC	2	1	2.87	2.72	0.08	0.08	/	/	2.80	/	/	/	/	/	/		
甘長とうが らし [施設] (果実) 2009年	2	317~405 SC	2	1	0.985	0.609	0.081	0.025	/	/	0.685	/	/	/	/	/	/		
				3	0.608	0.363	0.020	0.015	/	/	0.380	/	/	/	/	/	/		
				7	0.368	0.198	0.011	0.008	/	/	0.205	/	/	/	/	/	/		
茶 [露地] (荒茶) 2004年	1	600 SC	1	7	14.8	14.7	6.26	6.23	5.94	5.91	21.0	13.7	13.6	8.05	7.88	5.76	5.73	21.5	
				14	3.87	3.31	1.65	1.63	12.0	11.8	4.9	2.89	2.86	1.89	1.85	8.51	8.49	4.7	
	1		1	7	2.86	2.84	3.55	3.52	4.20	4.13	6.4	2.89	2.73	3.75	3.67	3.89	3.82	6.4	
				14	0.92	0.92	2.49	2.48	8.71	8.65	3.4	0.64	0.63	2.88	2.80	7.96	7.94	3.4	

作物名 [栽培形態] (分析部位) 実施年	試験圃 場数	使用量 (g ai/ha)	回 数 (回)	PHI (日)	残留値(mg/kg)													
					公的分析機関						社内分析機関							
					スピロメシフエン		M1		M2+M9		合計 <sup>1)</sup>	スピロメシフエン		M1		M2+M9		合計 <sup>1)</sup>
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値		最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	
茶 [露地] (浸出液) 2004年	1		1	7 14								0.13 <0.05	0.12 <0.05	7.38 1.73	7.24 1.72	4.28 8.08	4.26 8.06	7.4 1.8
			1	7 14								<0.05	<0.05	8.03 2.19	2.97 2.12	8.84 7.73	8.80 7.70	3.0 2.2

1) スピロメシフエン及びM1の平均値の合計値。

注) ai : 有効成分量、PHI : 最終使用から収穫までの日数、SC : フロアブル、WP : 水和剤

・一部に定量限界未満を含むデータの合計を計算する場合は定量限界値を検出したものとして計算し、\*印を付した。

・すべてのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に<を付して記載した。

<別紙4：作物残留試験成績（海外）>

作物名	試験圃場数	処理量 (Ib ai/A)	処理回数	PHI (日)	残留値 (mg/kg)					
					スピロメシフェン		M1		合計	
					(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
豆類	10	0.187 ～ 0.217	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	10 9 <sup>a</sup> 9 <sup>a</sup> 10 10 10 9 <sup>a</sup> 9 <sup>a</sup> 10 10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02
					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02
セロリ	8	0.131 ～ 0.139	3 3 3 3 3 3 3	185 0.166 0.0047 0.173 0.500 0.335 0.305	0.185	0.176	0.393	0.411	0.578	0.587
					0.166	0.223	0.415	0.577	0.582	0.801
					0.0047	0.0049	0.0146	0.0182	0.0193	0.028
					0.173	0.133	0.850	0.514	1.02	0.646
					0.500	0.532	3.65	3.71	4.15	4.24
					0.335	0.297	1.56	1.23	1.89	1.53
					0.305	0.367	2.59	3.21	2.90	3.58
			3 3 7 10 14	0 0.195 0.224 0.105 0.176	0	0.241	1.29	1.44	1.48	1.68
					0.202	0.233	1.20	1.41	1.40	1.65
					0.224	0.233	1.27	1.34	1.49	1.57
					0.105	0.108	0.264	0.294	0.369	0.402
					0.176	0.159	0.685	0.464	0.861	0.622
未成熟 いんげん	4	0.072 ～ 0.144	4	0 1 <sup>a</sup> 3 7 10	0	0.094	0.054		0.148	
					1 <sup>a</sup>	0.061	0.035		0.096	
					3	0.047	0.022		0.069	
					7	0.036	0.019		0.055	
					10	0.018	<0.010		0.018	
			4	0 3 6 0	0	0.093	0.024		0.117	
					3	0.031	0.01		0.041	
					6	0.017	<0.010		0.017	
					0	0.225	0.076		0.225	
			4	1 <sup>a</sup> 3 7 10	1 <sup>a</sup>	0.168	0.074		0.242	
					3	0.160	0.072		0.232	
					7	0.104	0.055		0.159	
					10	0.064	0.027		0.091	

			4	0	0.088		0.039		0.127	
				3	0.054		0.032		0.086	
				7	0.028		0.017		0.045	
いちご	8	0.238 ～ 0.260	3	3	0.426	0.384	0.0633	0.0688	0.489	0.453
				9	0.15	0.331	0.0506	0.0902	0.201	0.421
				14	0.258	0.179	0.105	0.0829	0.363	0.262
		0.250 ～ 0.252	3	3	1.3	1.51	0.147	0.134	1.45	1.64
				7	1.13	0.812	0.151	0.161	1.28	0.973
				14	0.322	0.353	0.136	0.126	0.458	0.479
		0.246 ～ 0.255	3	3	0.737	0.492	0.0868	0.0799	0.824	0.572
				7	0.345	0.366	0.0772	0.0821	0.422	0.448
				15	0.253	0.182	0.0796	0.0837	0.333	0.266
		0.248 ～ 0.257	3	4	0.289	0.19	0.044	0.0403	0.283	0.280
				7	0.17	0.241	0.0429	0.0451	0.213	0.286
				12	0.141	0.268	0.038	0.0447	0.179	0.313
		0.252 ～ 0.253	3	3	1.44	1.52	0.11	0.102	1.55	1.62
				8	1	0.765	0.128	0.141	1.13	0.906
				15	0.264	0.328	0.0894	0.0845	0.353	0.413
		0.248 ～ 0.259	3	3	0.341	0.439	0.0784	0.0783	0.419	0.517
				7	0.288	0.172	0.117	0.102	0.4	0.274
				14	0.158	0.208	0.118	0.123	0.276	0.331
		0.250 ～ 0.257	3	2*	0.207	0.169	0.0775	0.0844	0.285	0.253
				7	0.134	0.185	0.0957	0.0949	0.230	0.280
				13	0.175	0.191	0.118	0.107	0.293	0.298
		0.254 ～ 0.259	3	0	1.12	1.42	0.088	0.11	1.21	1.53
				3	0.472	0.489	0.0901	0.0944	0.562	0.583
				7	0.183	0.402	0.0902	0.0825	0.273	0.485
				14	0.152	0.124	0.117	0.103	0.269	0.227
				22	0.0335	0.0265	0.0726	0.0818	0.106	0.108
				28	0.0684	0.0954	0.0586	0.0611	0.127	0.157

作物名	試験圃場数	処理量 (Tb ai/A)	処理回数	PHI (日)	残留量 (mg/kg)						
					スピロメシフェン		M1		合計**		
					(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	
えんどう	6	0.185 ～ 0.204	3	9*	実測値	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.087	0.055
					補正值*	0.027	0.054				
			3	10	実測値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.037	<0.037
					補正值*	<0.027	<0.027				
			3	9*	実測値	0.01	0.02	0.01	0.02	0.087	0.074
					補正值*	0.027	0.054				

			3	10	実測値 補正值*	<0.01 <0.027	<0.01 <0.027	<0.01 / /	<0.01 / /	<0.037	<0.087
			3	11	実測値 補正值*	0.02 0.054	0.03 0.081	0.02 / /	0.03 / /	0.074	0.111
			3	9 <sup>a</sup>	実測値 補正值*	0.01 0.027	0.03 0.081	<0.01 / /	0.02 / /	0.037	0.101
		0.247 ～ 0.256	3	6 <sup>a</sup>	測定値 補正值*	1.41 2.82	1.28 2.56	0.444 / /	0.442 / /	3.26	3.00
ミント	5	0.247 ～ 0.254	3	1 <sup>a</sup>	測定値	10.1	10.6	1.92	1.83	12.0	12.4
				3 <sup>a</sup>	測定値	8.94	6.74	1.58	1.1	10.5	7.84
				7	測定値 補正值*	3.68 7.36	4.06 8.12	0.98 / /	1.03 / /	8.34	9.15
				14	測定値	1.71	1.74	0.405	0.468	2.12	2.21
		0.251 ～ 0.254	3	8	測定値 補正值*	3.32 6.64	3.6 7.2	1.54 / /	1.59 / /	8.18	8.79
		0.251 ～ 0.263	3	7	測定値 補正值*	8 16	6.59 13.18	2.97 / /	2.41 / /	19.0	15.6
		0.248 ～ 0.255	3	7	測定値 補正值*	8.53 17.1	6.58 13.2	1.42 / /	1.08 / /	18.5	14.2

\*EPA の評価法に基づき、保存安定性で補正した値を申請者が計算

\*\*補正值が計算されている場合は、補正值と M1 の合計

・散布にはフロアブル剤を使用

・農薬の使用時期 (PHI) が、登録又は申請された使用方法から逸脱している場合は、PHI に<sup>a</sup>を付した

<別紙5：後作物残留試験（海外）>

作物名	試験圃場数	処理量 (Ib ai/A)	処理回数	PBI (日)	残留値 (mg/kg)					
					スピロメシフェン		M1		合計	
					(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
たまねぎ	6	0.248 ～ 0.258	3	31	<0.0035	<0.0035	0.0062	0.0058	0.008	0.0075
			3	28	<0.0035	<0.0035	0.005	0.0044	0.0068	0.0061
			3	29	<0.0035	<0.0035	<0.0038	<0.0038	<0.0038	<0.0038
			3	30	<0.0035	<0.0035	0.0038	0.0041	0.0056	0.0059
			3	30	<0.0035	<0.0035	0.0479	0.0179	0.0496	0.0197
			3	30	0.0061	<0.0035	0.006	<0.0038	0.0121	<0.0038
ねぎ	3	0.247 ～ 0.256	3	28	<0.0035	<0.0035	<0.0038	<0.0038	<0.0038	<0.0038
			3	30	<0.0035	<0.0035	0.036	0.0416	0.0378	0.0433
			3	30	<0.0035	<0.0035	<0.0038	0.0076	<0.0038	0.0093

<別紙6：推定摂取量>

作物名	残留値 (mg/kg)	国民平均 (平均体重:53.3kg)		小児(1~6歳) (平均体重:15.8kg)		妊婦 (平均体重:55.6kg)		高齢者(65歳以上) (平均体重:54.2kg)	
		ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)	ff (g/人/日)	摂取量 (μg/人/日)
トマト	1.09	24.3	26.5	16.9	18.4	24.5	26.7	18.9	20.6
ピーマン	1.38	4.4	6.1	2	2.8	1.9	2.6	3.7	5.1
なす	1.00	4	4.0	0.9	0.9	3.3	3.3	5.7	5.7
その他なす科野菜	2.8	0.2	0.56	0.1	0.28	0.1	0.28	0.3	0.84
すいか	0.06	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
りんご	0.86	35.3	30.4	36.2	31.1	30.0	25.8	35.6	30.6
なし	0.56	5.1	2.9	4.4	2.5	5.3	3.0	5.1	2.9
ネクタリン	0.50	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
すもも	0.24	0.2	0.1	0.1	0.0	1.4	0.3	0.2	0.1
うめ	2.14	1.1	2.4	0.3	0.6	1.4	8.0	1.6	3.4
おうとう	2.66	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3
ぶどう	4.18	5.8	24.2	4.4	18.4	1.6	6.7	3.8	15.9
茶	21.5	3.0	64.5	1.4	30.1	3.5	75.3	4.3	92.5
魚介類	0.052	94.1	4.9	42.8	2.2	94.1	4.9	94.1	4.9
合計			167		108		152		183

- 注) ・ 残留値は、申請されている使用時期・回数による各試験区のスピロメシフェン及び代謝物M1の合量の最大値を用いた(別紙3参照)。
- ・ 「ff」: 平成10~12年の国民栄養調査(参照64~66)の結果に基づく農産物摂取量(g/人/日)。
  - ・ 妊婦及び高齢者の魚介類のffは国民平均のffを用いた。
  - ・ 「摂取量」: 残留値及び農産物摂取量から求めたスピロメシフェン及び代謝物M1の推定摂取量(μg/人/日)。
  - ・ トマトの残留値はミニトマトの値を用いた。
  - ・ その他なす科野菜は、ししとう及び甘長とうがらしのうち、残留量の高いししとうの値を用いた。
  - ・ ももは、可食部(果肉)における全データが定量限界未満であったため、摂取量の計算はしていない。

<参考>

- 1 農薬抄録スピロメシフェン：バイエルクロップサイエンス株式会社、2005年、一部公表
- 2 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェン：ラットにおける代謝（GLP 対応）：ハンティンドンライフサイエンス社（英）、2000年、未公表
- 3 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェン：雌雄ラットにおける定量的全身オートグラフィー（QWBA）（GLP 対応）：バイエルクロップサイエンス社 代謝/環境動態研（独）、2003年、未公表
- 4 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェン：ラットの血漿、尿、腎臓及び肝臓における残留及び代謝物の消長（GLP 対応）：バイエルクロップサイエンス社 代謝/環境動態研（独）、2003年、未公表
- 5 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンのトマトにおける代謝（GLP 対応）：ハンティンドンライフサイエンス社（英）、2001年、未公表
- 6 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンのりんごにおける代謝（GLP 対応）：バイエルクロップサイエンス社 代謝/環境動態研（独）、2004年、未公表
- 7 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンのレタスにおける代謝（GLP 対応）：ハンティンドンライフサイエンス社（英）、2001年、未公表
- 8 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンの棉における代謝（GLP 対応）：ハンティンドンライフサイエンス社（英）、2001年、未公表
- 9 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンの好気土壤中の分解・代謝（GLP 対応）：バイエル社 代謝・残留研（独）、2001年、未公表
- 10 [フェニル-UL-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンの好気土壤中の分解・代謝（GLP 対応）：バイエル社 代謝・残留研（独）、2001年、未公表
- 11 [シクロペンチル-1-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンの好気土壤中の分解・代謝（GLP 対応）：バイエルコーポレーション環境研究部（米）、2001年、未公表
- 12 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンの土壤表面光分解（GLP 対応）：バイエルコーポレーション環境研究部（米）、2001年、未公表
- 13 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンの土壤吸着試験（GLP 対応）：バイエルコーポレーション環境研究部（米）、2004年、未公表
- 14 スピロメシフェン代謝物エノール体の土壤吸着試験（GLP 対応）：バイエルクロップサイエンス社 環境安全研究部、2004年、未公表
- 15 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンの滅菌緩衝液中における加水分解（GLP 対応）：バイエルコーポレーション環境研究部（米）、2001年、未公表
- 16 [ジヒドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンの水中光分解（自然水）（GLP 対応）：バイエルクロップサイエンス社 代謝環境動態研（独）、2004年、未公表
- 17 [フェニル-UL-<sup>14</sup>C]スピロメシフェン及び [シクロペンチル-1-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンの水中光分解（自然水）（GLP 対応）：バイエルクロップサイエンス社 代謝環境動態研（独）、2004年、未公表

- 18 [ジビドロフラノン-3-<sup>14</sup>C]スピロメシフェンの水中光分解(緩衝液)(GLP対応) :バイエルコーポレーション環境研究部(米)、2001年、未公表
- 19 土壌残留試験成績:バイエルクロップサイエンス株式会社、2003年、未公表
- 20 スピロメシフェン 作物残留試験成績:日本植物防疫協会研究所、2003-2004年、未公表
- 21 スピロメシフェン 作物残留試験成績:バイエルクロップサイエンス株式会社、2003-2004年、未公表
- 22 スピロメシフェンの薬理試験: (財)食品農医薬品安全性評価センター、2003年、未公表
- 23 スピロメシフェンのラットを用いた急性経口毒性試験(GLP対応):バイエル社 毒性研究所(独)、1997年、未公表
- 24 スピロメシフェンのラットを用いた急性経皮毒性試験(GLP対応):バイエル社 毒性研究所(独)、1999年、未公表
- 25 スピロメシフェンのラットを用いた急性吸入毒性試験(GLP対応):バイエル社 毒性研究所(独)、1999年、未公表
- 26 動植物土壌代謝物:エノール体[M1]のラットを用いた急性経口毒性試験(GLP対応):バイエル社 毒性研究所(独)、2003年、未公表
- 27 原体混在物:メシチル酔酸エステル体のラットを用いた急性経口毒性試験(GLP対応):バイエル社 毒性研究所(独)、2003年、未公表
- 28 スピロメシフェンのラットを用いた急性経口神経毒性(GLP対応):バイエルコーポレーション(米)、2001年、未公表
- 29 スピロメシフェンのウサギの皮膚に対する一次刺激性試験(GLP対応):LPT社(独)、1997年、未公表
- 30 スピロメシフェンのウサギの眼に対する一次刺激性試験(GLP対応):LPT社(独)、1997年、未公表
- 31 スピロメシフェンのモルモットを用いた皮膚感作性試験(Maximization法)(GLP対応):バイエル社 毒性研究所(独)、1998年、未公表
- 32 スピロメシフェンのラットを用いた飼料混入投与による90日間反復経口投与毒性試験(GLP対応):バイエル社 毒性研究所(独)、2000年、未公表
- 33 スピロメシフェンのイヌにおける90日間反復経口投与毒性試験(GLP対応):バイエル社 毒性研究所(独)、2001年、未公表
- 34 スピロメシフェンのイヌにおける90日間反復経口投与毒性試験(GLP対応):バイエル社 毒性研究所(独)、2001年、未公表
- 35 スピロメシフェンのラットにおける反復経口投与神経毒性試験(13週間混餌投与)(GLP対応):バイエルコーポレーション(米)、2002年、未公表
- 36 スピロメシフェンのイヌにおける1年間反復経口投与毒性試験(GLP対応):バイエル社 毒性研究所(独)、2002年、未公表
- 37 スピロメシフェンのラットを用いた混餌投与による1年間反復経口投与毒性試験(GLP対応):バイエル社 毒性研究所(独)、2001年、未公表
- 38 スピロメシフェンのラットを用いた混餌投与による発がん性試験(GLP対応):バイエル社 毒性

研究所（独）、2001年、未公表

- 39 スピロメシフェンのマウスを用いた発がん性試験（GLP 対応）：バイエル社 毒性研究所（独）、2001年、未公表
- 40 スピロメシフェンのラットの繁殖性に及ぼす影響（GLP 対応）：バイエル社 毒性研究所（独）、2002年、未公表
- 41 スピロメシフェンのラットを用いた催奇形性試験（GLP 対応）：バイエル社 毒性研究所（独）、2001年、未公表
- 42 スピロメシフェンのウサギを用いた催奇形性試験（GLP 対応）：バイエル社 毒性研究所（独）、2001年、未公表
- 43 スピロメシフェンの細菌を用いた復帰突然変異試験（GLP 対応）：バイエル社 毒性研究所（独）、1997年、未公表
- 44 スピロメシフェンのチャイニーズハムスター由来 V79 培養細胞を用いた *in vitro* 染色体異常試験（GLP 対応）：バイエル社 毒性研究所（独）、1997年、未公表
- 45 スピロメシフェンのマウスにおける小核試験（GLP 対応）：バイエル社 毒性研究所（独）、1999年、未公表
- 46 スピロメシフェンの V79-HPRT（前進突然変異）法による *in vitro* 変異原性誘発試験（GLP 対応）：バイエル社 毒性研究所（独）、1999年、未公表
- 47 動植物土壌代謝物：エノール体[M1]の細菌を用いた復帰突然変異性試験（GLP 対応）：バイエル社 毒性研究所（独）、2003年、未公表
- 48 原体混在物：メチル酢酸エステル体の細菌を用いた復帰突然変異性試験（GLP 対応）：バイエル社 毒性研究所（独）、2003年、未公表
- 49 食品健康影響評価について（平成 17 年 8 月 23 日付け厚生労働省発食安第 0823003 号）
- 50 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 17 年 11 月 29 日付け平成 17 年厚生労働省告示第 499 号）
- 51 食品健康影響評価について（平成 18 年 7 月 18 日付け厚生労働省発食安第 0718017 号）
- 52 スピロメシフェンの食品健康影響評価に係る追加資料の提出について：バイエルクロップサイエンス、2006年、未公表
- 53 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 19 年 6 月 28 日付け府食第 637 号）
- 54 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 19 年 12 月 28 日付け平成 19 年厚生労働省告示第 433 号）
- 55 食品健康影響評価について（平成 21 年 1 月 20 日付け厚生労働省発食安第 0120004 号）
- 56 農薬抄録スピロメシフェン：バイエルクロップサイエンス株式会社、2008年 11 月 27 日改訂、一部公表
- 57 スピロメシフェン 作物残留試験成績：バイエルクロップサイエンス株式会社、2008年、未公表
- 58 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 21 年 6 月 25 日付け府食第 612 号）
- 59 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）の一部を改正する件（平成 22 年 11 月 9 日付け平成 22 年厚生労働省告示第 381 号）
- 60 農薬抄録 スピロメシフェン（殺虫剤）：バイエルクロップサイエンス株式会社、平成 22 年 5

月 7 日改訂、一部公表

- 61 スピロメシフェン 作物残留試験成績（ぶどう）：バイエルクロップサイエンス株式会社、2007年、未公表
- 62 スピロメシフェンの魚介類における最大推定残留値に係る資料
- 63 食品健康影響評価について（平成 22 年 8 月 11 日付け厚生労働省発食安 0811 第 6 号）
- 64 国民栄養の現状－平成 10 年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2000 年
- 65 国民栄養の現状－平成 11 年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2001 年
- 66 国民栄養の現状－平成 12 年国民栄養調査結果－：健康・栄養情報研究会編、2002 年
- 67 食品健康影響評価の結果の通知について（平成 23 年 6 月 30 日付け府食第 540 号）
- 68 食品健康影響評価について（平成 23 年 11 月 15 日付け厚生労働省発食安 1115 第 4 号）
- 69 農薬抄録 スピロメシフェン（殺虫剤）：バイエルクロップサイエンス株式会社、平成 23 年 6 月 6 日改訂、一部公表予定
- 70 スピロメシフェン 作物残留試験成績（しとう、甘長とうがらし）：バイエルクロップサイエンス株式会社、2010 年、未公表
- 71 スピロメシフェン インポートトレランス申請資料：バイエルクロップサイエンス株式会社、2011 年、未公表