

## 第3部 身体状況調査の結果

第 20 表 身長・体重の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

年齢(歳)	男 性						女 性					
	身 長 (cm)			体 重 (kg)			身 長 (cm)			体 重 (kg)		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
1	24	79.5	3.7	24	10.7	1.4	26	77.8	4.2	26	9.9	0.9
2	28	88.9	5.5	29	12.9	1.8	26	87.8	4.0	26	12.0	1.6
3	34	96.1	4.4	34	14.3	1.7	42	94.7	3.9	42	14.1	1.5
4	41	103.2	3.9	41	17.0	2.7	42	103.1	4.5	42	16.2	2.0
5	51	109.6	5.4	51	18.6	2.7	36	109.7	3.7	36	19.0	2.2
6	39	115.8	5.5	39	21.2	2.7	41	115.5	4.8	41	20.8	2.9
7	39	121.7	5.0	39	22.9	3.8	53	120.5	5.5	53	23.1	3.6
8	57	128.3	5.6	57	26.6	4.7	39	127.6	5.4	39	26.7	4.6
9	40	133.7	5.4	40	30.4	7.2	52	133.4	7.5	52	30.8	8.2
10	41	139.7	6.8	41	35.3	8.4	48	139.0	6.9	48	33.7	8.0
11	34	144.5	7.0	34	37.0	6.7	36	147.6	8.7	36	39.1	9.5
12	40	150.7	7.6	40	42.7	9.0	45	150.8	6.0	45	41.6	8.3
13	47	157.4	10.1	45	46.6	10.7	49	155.7	5.7	48	47.4	7.2
14	33	163.8	6.9	33	53.9	11.3	37	156.5	4.5	36	50.2	8.3
15	41	168.0	6.7	41	58.0	10.2	41	159.1	4.9	41	50.1	6.6
16	33	168.7	5.8	32	59.9	8.6	41	157.3	5.6	40	52.1	6.7
17	38	171.1	5.0	38	61.9	9.2	33	157.5	4.3	32	50.4	5.8
18	31	170.7	4.4	31	64.0	12.2	23	157.8	4.8	22	51.3	6.5
19	30	171.5	5.7	29	62.5	8.7	27	159.0	5.0	27	53.0	7.0
20	25	173.3	5.1	25	63.2	8.6	17	156.5	4.4	17	49.0	10.1
21	25	170.9	6.9	25	61.8	8.7	32	158.5	4.3	32	51.4	7.4
22	21	172.4	5.6	20	63.5	12.3	29	157.6	5.8	29	50.6	8.0
23	23	173.4	7.2	21	69.0	11.9	29	157.7	5.9	29	50.7	8.7
24	23	172.5	7.4	23	70.1	12.6	30	157.7	6.6	29	50.4	7.9
25	29	172.6	5.6	29	69.6	17.4	30	157.6	4.9	29	50.1	5.6
26 29	92	170.5	6.9	92	64.8	8.7	136	158.1	4.8	125	50.9	7.5
30 39	453	171.4	5.9	448	70.0	12.7	603	158.0	5.6	584	53.0	8.3
40 49	467	170.3	5.7	466	69.5	10.3	534	157.5	5.6	533	54.3	9.1
50 59	537	167.8	5.5	536	67.1	10.2	646	154.5	5.3	646	54.8	8.4
60 69	620	164.6	5.6	620	64.5	8.8	724	151.9	5.5	724	53.7	8.7
70歳以上	625	160.7	6.6	625	60.3	10.7	782	147.4	6.0	790	49.8	8.8
(再掲)												
20歳以上	2940	166.9	7.2	2930	65.8	11.1	3592	153.8	6.9	3567	52.7	8.8
20 29歳	238	171.7	6.6	235	65.7	11.3	303	157.9	5.1	290	50.6	7.7
60 64	330	165.1	5.7	330	64.4	9.3	374	152.3	5.6	374	53.5	8.8
65 69	290	164.1	5.4	290	64.5	8.1	350	151.4	5.3	350	53.9	8.7
70 74	262	162.3	6.5	262	62.7	9.4	286	150.1	5.1	286	51.8	8.1
75 79	208	160.4	6.1	208	59.9	12.1	248	146.9	5.7	249	50.2	8.2
80歳以上	155	158.4	6.6	155	56.8	9.6	248	144.9	6.1	255	47.1	9.3

注) 体重は妊婦除外

第21表 BMIの平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

年齢(歳)	男性			女性		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	3101	23.46	3.49	3720	22.26	3.57
15-19歳	171	21.14	3.13	162	20.53	2.40
20-29	235	22.25	3.42	290	20.28	2.72
30-39	448	23.79	4.07	584	21.24	3.13
40-49	466	23.93	3.30	533	21.89	3.57
50-59	536	23.81	3.27	646	22.93	3.34
60-69	620	23.78	2.88	723	23.28	3.73
70歳以上	625	23.32	3.67	782	22.89	3.76
(再掲)						
20歳以上	2930	23.59	3.46	3558	22.34	3.60
20-69歳	2305	23.66	3.40	2776	22.19	3.54
40-69	1622	23.83	3.13	1902	22.77	3.60
65-69	290	23.95	2.64	349	23.50	3.69
70-74	262	23.79	3.14	286	22.99	3.36
75-79	208	23.26	4.41	248	23.23	3.79
80-84	105	22.83	3.34	153	23.04	4.12
80歳以上	155	22.59	3.30	248	22.43	4.13
85歳以上	50	22.10	3.18	95	21.46	3.98

注) 妊婦除外

第22表 BMIの分布(15歳以上)

	総数		男性		女性	
	人数	%	人数	%	人数	%
総数	6821	100	3101	100	3720	100
<15	20	0.3	4	0.1	16	0.4
15-15.9	37	0.5	9	0.3	28	0.8
16-16.9	98	1.4	22	0.7	76	2.0
17-17.9	220	3.2	61	2.0	159	4.3
18-18.9	472	6.9	141	4.5	331	8.9
19-19.9	631	9.3	199	6.4	432	11.6
20-20.9	736	10.8	258	8.3	478	12.8
21-21.9	855	12.5	399	12.9	456	12.3
22-22.9	790	11.6	373	12.0	417	11.2
23-23.9	740	10.8	396	12.8	344	9.2
24-24.9	589	8.6	330	10.6	259	7.0
25-25.9	510	7.5	303	9.8	207	5.6
26-26.9	380	5.6	219	7.1	161	4.3
27-27.9	248	3.6	135	4.4	113	3.0
28-28.9	156	2.3	80	2.6	76	2.0
29-29.9	118	1.7	69	2.2	49	1.3
30-30.9	71	1.0	32	1.0	39	1.0
31-31.9	50	0.7	31	1.0	19	0.5
32-32.9	28	0.4	10	0.3	18	0.5
33-33.9	26	0.4	8	0.3	18	0.5
34-34.9	12	0.2	5	0.2	7	0.2
35	34	0.5	17	0.5	17	0.5

注) 妊婦除外

第 23 表 BMI の状況 (性・年齢階級別)

		総 数		肥満区分					
				や せ		普 通		肥 満	
		人 数	%	人 数	%	人 数	%	人 数	%
性 別	総 数	3101	100.0	155	5.0	2037	65.7	909	29.3
男 性	15 19歳	171	100.0	32	18.7	121	70.8	18	10.5
	20 29歳	235	100.0	25	10.6	160	68.1	50	21.3
	30 39歳	448	100.0	9	2.0	311	69.4	128	28.6
	40 49歳	466	100.0	12	2.6	300	64.4	154	33.0
	50 59歳	536	100.0	23	4.3	329	61.4	184	34.3
	60 69歳	620	100.0	13	2.1	404	65.2	203	32.7
	70歳以上	625	100.0	41	6.6	412	65.9	172	27.5
	(再掲)20歳以上	2930	100.0	123	4.2	1916	65.4	891	30.4
	(再掲)20 69歳	2305	100.0	82	3.6	1504	65.2	719	31.2
	(再掲)40 69歳	1622	100.0	48	3.0	1033	63.7	541	33.4
	(再掲)65 69歳	290	100.0	5	1.7	179	61.7	106	36.6
	(再掲)70 74歳	262	100.0	8	3.1	171	65.3	83	31.7
	(再掲)75 79歳	208	100.0	15	7.2	138	66.3	55	26.4
	(再掲)80 84歳	105	100.0	11	10.5	71	67.6	23	21.9
(再掲)85歳以上	50	100.0	7	14.0	32	64.0	11	22.0	
女 性	総 数	3720	100.0	408	11.0	2588	69.6	724	19.5
15 19歳	15 19歳	162	100.0	27	16.7	129	79.6	6	3.7
	20 29歳	290	100.0	73	25.2	200	69.0	17	5.9
	30 39歳	584	100.0	82	14.0	437	74.8	65	11.1
	40 49歳	533	100.0	61	11.4	385	72.2	87	16.3
	50 59歳	646	100.0	29	4.5	480	74.3	137	21.2
	60 69歳	723	100.0	45	6.2	465	64.3	213	29.5
	70歳以上	782	100.0	91	11.6	492	62.9	199	25.4
	(再掲)20歳以上	3558	100.0	381	10.7	2459	69.1	718	20.2
	(再掲)20 69歳	2776	100.0	290	10.4	1967	70.9	519	18.7
	(再掲)40 69歳	1902	100.0	135	7.1	1330	69.9	437	23.0
	(再掲)65 69歳	349	100.0	22	6.3	212	60.7	115	33.0
	(再掲)70 74歳	286	100.0	22	7.7	186	65.0	78	27.3
	(再掲)75 79歳	248	100.0	28	11.3	147	59.3	73	29.4
	(再掲)80 84歳	153	100.0	19	12.4	98	64.1	36	23.5
(再掲)85歳以上	95	100.0	22	23.2	61	64.2	12	12.6	

注) 妊婦除外 BMI による肥満の判定は p. 17 参照

第24表 日比式による肥満区分(6-14歳, 性・年齢階級別)

	肥満度(日比式)	年 齢 階 級							
		総 数		6-8歳		9-11歳		12-14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	- 30%未満	1	0.3	1	0.7	0	0	0	0
	- 30%以上 ~ - 20%未満	10	2.7	1	0.7	1	0.9	8	6.8
	- 20%以上 ~ - 10%未満	69	18.8	21	15.6	17	14.8	31	26.3
	- 10%以上 ~ 0%未満	141	38.3	57	42.2	45	39.1	39	33.1
	0%以上 ~ + 10%未満	76	20.7	33	24.4	25	21.7	18	15.3
	+ 10%以上 ~ + 20%未満	35	9.5	11	8.1	12	10.4	12	10.2
	+ 20%以上 ~ + 30%未満	21	5.7	9	6.7	8	7.0	4	3.4
	+ 30%以上 ~ + 40%未満	7	1.9	2	1.5	2	1.7	3	2.5
	+ 40%以上	8	2.2	0	0	5	4.3	3	2.5
	総 数	368	100	135	100	115	100	118	100
女 性	- 30%未満	1	0.3	0	0	1	0.7	0	0
	- 30%以上 ~ - 20%未満	14	3.5	0	0	8	5.9	6	4.7
	- 20%以上 ~ - 10%未満	66	16.6	7	5.3	24	17.6	35	27.1
	- 10%以上 ~ 0%未満	117	29.4	55	41.4	33	24.3	29	22.5
	0%以上 ~ + 10%未満	104	26.1	38	28.6	38	27.9	28	21.7
	+ 10%以上 ~ + 20%未満	54	13.6	25	18.8	15	11.0	14	10.9
	+ 20%以上 ~ + 30%未満	20	5.0	4	3.0	6	4.4	10	7.8
	+ 30%以上 ~ + 40%未満	12	3.0	3	2.3	5	3.7	4	3.1
	+ 40%以上	10	2.5	1	0.8	6	4.4	3	2.3
	総 数	398	100	133	100	136	100	129	100
総 数	- 30%未満	2	0.3	1	0.4	1	0.4	0	0
	- 30%以上 ~ - 20%未満	24	3.1	1	0.4	9	3.6	14	5.7
	- 20%以上 ~ - 10%未満	135	17.6	28	10.4	41	16.3	66	26.7
	- 10%以上 ~ 0%未満	258	33.7	112	41.8	78	31.1	68	27.5
	0%以上 ~ + 10%未満	180	23.5	71	26.5	63	25.1	46	18.6
	+ 10%以上 ~ + 20%未満	89	11.6	36	13.4	27	10.8	26	10.5
	+ 20%以上 ~ + 30%未満	41	5.4	13	4.9	14	5.6	14	5.7
	+ 30%以上 ~ + 40%未満	19	2.5	5	1.9	7	2.8	7	2.8
	+ 40%以上	18	2.3	1	0.4	11	4.4	6	2.4
	総 数	766	100	268	100	251	100	247	100

注) 日比式による区分は p. 17 参照

第25表 学校保健統計調査方式による肥満区分(6-14歳, 性・年齢階級別)

	肥満度(学校保健統計調査方式)	年 齢 階 級							
		総 数		6-8歳		9-11歳		12-14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	- 30%以下	1	0.3	1	0.7	0	0	0	0
	- 30%未満 ~ - 20%以下	8	2.2	3	2.2	2	1.7	3	2.5
	- 20%未満 ~ - 10%以上	71	19.3	22	16.3	24	20.9	25	21.2
	- 10%未満 ~ 0%未満	152	41.3	57	42.2	49	42.6	46	39.0
	0%以上 ~ + 10%未満	68	18.5	30	22.2	20	17.4	18	15.3
	+ 10%以上 ~ + 20%未満	33	9.0	12	8.9	10	8.7	11	9.3
	+ 20%以上 ~ + 30%未満	21	5.7	8	5.9	3	2.6	10	8.5
	+ 30%以上 ~ + 40%未満	6	1.6	1	0.7	3	2.6	2	1.7
	+ 40%以上 ~ + 50%未満	6	1.6	1	0.7	4	3.5	1	0.8
	+ 50%以上	2	0.5	0	0	0	0	2	1.7
総 数	368	100	135	100	115	100	118	100	
女 性	- 30%以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 30%未満 ~ - 20%以下	14	3.5	0	0	8	5.9	6	4.7
	- 20%未満 ~ - 10%以上	90	22.6	21	15.8	28	20.6	41	31.8
	- 10%未満 ~ 0%未満	117	29.4	53	39.8	35	25.7	29	22.5
	0%以上 ~ + 10%未満	99	24.9	37	27.8	37	27.2	25	19.4
	+ 10%以上 ~ + 20%未満	43	10.8	14	10.5	12	8.8	17	13.2
	+ 20%以上 ~ + 30%未満	18	4.5	6	4.5	8	5.9	4	3.1
	+ 30%以上 ~ + 40%未満	8	2.0	1	0.8	3	2.2	4	3.1
	+ 40%以上 ~ + 50%未満	7	1.8	1	0.8	3	2.2	3	2.3
	+ 50%以上	2	0.5	0	0	2	1.5	0	0
総 数	398	100	133	100	136	100	129	100	
総 数	- 30%以下	1	0.1	1	0.4	0	0	0	0
	- 30%未満 ~ - 20%以下	22	2.9	3	1.1	10	4.0	9	3.6
	- 20%未満 ~ - 10%以上	161	21.0	43	16.0	52	20.7	66	26.7
	- 10%未満 ~ 0%未満	269	35.1	110	41.0	84	33.5	75	30.4
	0%以上 ~ + 10%未満	167	21.8	67	25.0	57	22.7	43	17.4
	+ 10%以上 ~ + 20%未満	76	9.9	26	9.7	22	8.8	28	11.3
	+ 20%以上 ~ + 30%未満	39	5.1	14	5.2	11	4.4	14	5.7
	+ 30%以上 ~ + 40%未満	14	1.8	2	0.7	6	2.4	6	2.4
	+ 40%以上 ~ + 50%未満	13	1.7	2	0.7	7	2.8	4	1.6
	+ 50%以上	4	0.5	0	0	2	0.8	2	0.8
総 数	766	100	268	100	251	100	247	100	

注) 学校保健統計調査方式による区分は p. 18 参照



第27表 腹囲の区分（性・年齢階級別）

		年 齢 階 級												(再掲) 40-74歳			
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
性別	腹囲の区分																
	<85cm(男) / <90cm(女)	1261	47.1	152	73.1	232	57.6	204	48.0	210	44.4	216	37.5	247	41.9	712	41.3
男性	85cm(男) / 90cm(女)	1414	52.9	56	26.9	171	42.4	221	52.0	263	55.6	360	62.5	343	58.1	1014	58.7
	総数	2675	100	208	100	403	100	425	100	473	100	576	100	590	100	1726	100
女性	腹囲の区分																
	<85cm(男) / <90cm(女)	2739	82.1	241	95.6	515	95.4	448	90.1	518	84.9	513	73.4	504	68.4	1669	80.2
女性	85cm(男) / 90cm(女)	596	17.9	11	4.4	25	4.6	49	9.9	92	15.1	186	26.6	233	31.6	411	19.8
	総数	3335	100	252	100	540	100	497	100	610	100	699	100	737	100	2080	100
総数	腹囲の区分																
	<85cm(男) / <90cm(女)	4000	66.6	393	85.4	747	79.2	652	70.7	728	67.2	729	57.2	751	56.6	2381	62.6
総数	85cm(男) / 90cm(女)	2010	33.4	67	14.6	196	20.8	270	29.3	355	32.8	546	42.8	576	43.4	1425	37.4
	総数	6010	100	460	100	943	100	922	100	1083	100	1275	100	1327	100	3806	100

注) 妊婦除外

第28表 BMI・腹囲の区分（性・年齢階級別）

		年 齢 階 級												(再掲) 40-74歳			
		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
性別	BMI・腹囲の区分																
	BMI<25, 腹囲<85cm	1202	44.9	145	69.7	223	55.3	192	45.2	193	40.8	209	36.3	240	40.7	675	39.1
男性	BMI≥25, 腹囲<85cm	59	2.2	7	3.4	9	2.2	12	2.8	17	3.6	7	1.2	7	1.2	37	2.1
	BMI<25, 腹囲≥85cm	645	24.1	18	8.7	65	16.1	91	21.4	112	23.7	174	30.2	185	31.4	465	26.9
男性	BMI≥25, 腹囲≥85cm	769	28.7	38	18.3	106	26.3	130	30.6	151	31.9	186	32.3	158	26.8	549	31.8
	総数	2675	100	208	100	403	100	425	100	473	100	576	100	590	100	1726	100
女性	BMI・腹囲の区分																
	BMI<25, 腹囲<90cm	2490	74.7	235	93.3	479	88.7	408	82.1	453	74.3	450	64.4	465	63.1	1482	71.3
女性	BMI≥25, 腹囲<90cm	249	7.5	6	2.4	36	6.7	40	8	65	10.7	63	9	39	5.3	187	9
	BMI<25, 腹囲≥90cm	173	5.2	1	0.4	3	0.6	6	1.2	28	4.6	47	6.7	88	11.9	111	5.3
女性	BMI≥25, 腹囲≥90cm	423	12.7	10	4	22	4.1	43	8.7	64	10.5	139	19.9	145	19.7	300	14.4
	総数	3335	100	252	100	540	100	497	100	610	100	699	100	737	100	2080	100
総数	BMI・腹囲の区分																
	BMI<25, 腹囲<85/90cm	3692	61.4	380	82.6	702	74.4	600	65.1	646	59.6	659	51.7	705	53.1	2157	56.7
総数	BMI≥25, 腹囲<85/90cm	308	5.1	13	2.8	45	4.8	52	5.6	82	7.6	70	5.5	46	3.5	224	5.9
	BMI<25, 腹囲≥85/90cm	818	13.6	19	4.1	68	7.2	97	10.5	140	12.9	221	17.3	273	20.6	576	15.1
総数	BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	1192	19.8	48	10.4	128	13.6	173	18.8	215	19.9	325	25.5	303	22.8	849	22.3
	総数	6010	100	460	100	943	100	922	100	1083	100	1275	100	1327	100	3806	100

注) 妊婦除外

第 29 表の 1 血圧を下げる薬の服用状況  
(性・年齢階級別)

		総数		服用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	年齢(歳)						
	20 29歳	128	100.0	1	0.8	127	99.2
	30 39歳	265	100.0	0	0	265	100.0
	40 49歳	269	100.0	16	5.9	253	94.1
	50 59歳	341	100.0	77	22.6	264	77.4
	60 69歳	463	100.0	146	31.5	317	68.5
	70歳	511	100.0	235	46.0	276	54.0
	総数	1977	100.0	475	24.0	1502	76.0
女性	年齢(歳)						
	20 29歳	156	100.0	0	0	156	100.0
	30 39歳	430	100.0	2	0.5	428	99.5
	40 49歳	395	100.0	15	3.8	380	96.2
	50 59歳	508	100.0	78	15.4	430	84.6
	60 69歳	595	100.0	196	32.9	399	67.1
	70歳	650	100.0	331	50.9	319	49.1
	総数	2734	100.0	622	22.8	2112	77.2
総数	年齢(歳)						
	20 29歳	284	100.0	1	0.4	283	99.6
	30 39歳	695	100.0	2	0.3	693	99.7
	40 49歳	664	100.0	31	4.7	633	95.3
	50 59歳	849	100.0	155	18.3	694	81.7
	60 69歳	1058	100.0	342	32.3	716	67.7
	70歳	1161	100.0	566	48.8	595	51.2
	総数	4711	100.0	1097	23.3	3614	76.7

注) 妊婦除外

第 29 表の 2 脈の乱れを治す薬の服用状況  
(性・年齢階級別)

		総数		服用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	年齢(歳)						
	20 29歳	128	100.0	0	0	128	100.0
	30 39歳	265	100.0	0	0	265	100.0
	40 49歳	269	100.0	2	0.7	267	99.3
	50 59歳	341	100.0	7	2.1	334	97.9
	60 69歳	463	100.0	18	3.9	445	96.1
	70歳	510	100.0	55	10.8	455	89.2
	総数	1976	100.0	82	4.1	1894	95.9
女性	年齢(歳)						
	20 29歳	156	100.0	0	0	156	100.0
	30 39歳	430	100.0	0	0	430	100.0
	40 49歳	395	100.0	2	0.5	393	99.5
	50 59歳	508	100.0	11	2.2	497	97.8
	60 69歳	595	100.0	17	2.9	578	97.1
	70歳	650	100.0	67	10.3	583	89.7
	総数	2734	100.0	97	3.5	2637	96.5
総数	年齢(歳)						
	20 29歳	284	100.0	0	0	284	100.0
	30 39歳	695	100.0	0	0	695	100.0
	40 49歳	664	100.0	4	0.6	660	99.4
	50 59歳	849	100.0	18	2.1	831	97.9
	60 69歳	1058	100.0	35	3.3	1023	96.7
	70歳	1160	100.0	122	10.5	1038	89.5
	総数	4710	100.0	179	3.8	4531	96.2

注) 妊婦除外

第 29 表の 3 インスリン注射または血糖を下げる薬の服用状況  
(性・年齢階級別)

		総数		薬使用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	年齢(歳)						
	20 29歳	128	100.0	1	0.8	127	99.2
	30 39歳	265	100.0	3	1.1	262	98.9
	40 49歳	269	100.0	9	3.3	260	96.7
	50 59歳	341	100.0	10	2.9	331	97.1
	60 69歳	464	100.0	57	12.3	407	87.7
	70歳	510	100.0	59	11.6	451	88.4
	総数	1977	100.0	139	7.0	1838	93.0
女性	年齢(歳)						
	20 29歳	156	100.0	0	0	156	100.0
	30 39歳	430	100.0	0	0	430	100.0
	40 49歳	395	100.0	4	1.0	391	99.0
	50 59歳	508	100.0	11	2.2	497	97.8
	60 69歳	595	100.0	48	8.1	547	91.9
	70歳	650	100.0	45	6.9	605	93.1
	総数	2734	100.0	108	4.0	2626	96.0
総数	年齢(歳)						
	20 29歳	284	100.0	1	0.4	283	99.6
	30 39歳	695	100.0	3	0.4	692	99.6
	40 49歳	664	100.0	13	2.0	651	98.0
	50 59歳	849	100.0	21	2.5	828	97.5
	60 69歳	1059	100.0	105	9.9	954	90.1
	70歳	1160	100.0	104	9.0	1056	91.0
	総数	4711	100.0	247	5.2	4464	94.8

注) 妊婦除外

第 29 表の 4 コレステロールを下げる薬の服用状況  
(性・年齢階級別)

		総数		服用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	年齢(歳)						
	20 29歳	128	100.0	0	0	128	100.0
	30 39歳	265	100.0	1	0.4	264	99.6
	40 49歳	269	100.0	9	3.3	260	96.7
	50 59歳	341	100.0	19	5.6	322	94.4
	60 69歳	463	100.0	53	11.4	410	88.6
	70歳	509	100.0	74	14.5	435	85.5
	総数	1975	100.0	156	7.9	1819	92.1
女性	年齢(歳)						
	20 29歳	156	100.0	0	0	156	100.0
	30 39歳	430	100.0	1	0.2	429	99.8
	40 49歳	395	100.0	6	1.5	389	98.5
	50 59歳	508	100.0	53	10.4	455	89.6
	60 69歳	595	100.0	107	18.0	488	82.0
	70歳	649	100.0	148	22.8	501	77.2
	総数	2733	100.0	315	11.5	2418	88.5
総数	年齢(歳)						
	20 29歳	284	100.0	0	0	284	100.0
	30 39歳	695	100.0	2	0.3	693	99.7
	40 49歳	664	100.0	15	2.3	649	97.7
	50 59歳	849	100.0	72	8.5	777	91.5
	60 69歳	1058	100.0	160	15.1	898	84.9
	70歳	1158	100.0	222	19.2	936	80.8
	総数	4708	100.0	471	10.0	4237	90.0

注) 妊婦除外



第29表の5 中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況(性・年齢階級別)

		総数		服用状況			
				使用あり		使用無し	
		人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	年齢(歳)						
	20-29歳	128	100.0	0	0	128	100.0
	30-39歳	265	100.0	3	1.1	262	98.9
	40-49歳	269	100.0	5	1.9	264	98.1
	50-59歳	341	100.0	6	1.8	335	98.2
	60-69歳	463	100.0	20	4.3	443	95.7
	70歳	509	100.0	32	6.3	477	93.7
	総数	1975	100.0	66	3.3	1909	96.7
女性	年齢(歳)						
	20-29歳	156	100.0	0	0	156	100.0
	30-39歳	430	100.0	0	0	430	100.0
	40-49歳	395	100.0	2	0.5	393	99.5
	50-59歳	508	100.0	15	3.0	493	97.0
	60-69歳	595	100.0	22	3.7	573	96.3
	70歳	649	100.0	32	4.9	617	95.1
	総数	2733	100.0	71	2.6	2662	97.4
総数	年齢(歳)						
	20-29歳	284	100.0	0	0	284	100.0
	30-39歳	695	100.0	3	0.4	692	99.6
	40-49歳	664	100.0	7	1.1	657	98.9
	50-59歳	849	100.0	21	2.5	828	97.5
	60-69歳	1058	100.0	42	4.0	1016	96.0
	70歳	1158	100.0	64	5.5	1094	94.5
	総数	4708	100.0	137	2.9	4571	97.1

注) 妊婦除外

第 30 表の 1 血圧の状況（性・年齢階級別）

性別	総数	総数		高血圧学会(2回測定値の平均値)												(再掲)	
				至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		度高血圧		度高血圧		度高血圧		収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別	総数	1791	100.0	296	16.5	327	18.3	401	22.4	493	27.5	216	12.1	58	3.2	356	19.9
男性	15 19歳	56	100.0	44	78.6	8	14.3	3	5.4	1	1.8	0	0	0	0	0	0
	20 29歳	96	100.0	40	41.7	31	32.3	18	18.8	5	5.2	2	2.1	0	0	1	1.0
	30 39歳	217	100.0	65	30.0	72	33.2	45	20.7	28	12.9	6	2.8	1	0.5	7	3.2
	40 49歳	224	100.0	51	22.8	52	23.2	58	25.9	38	17.0	21	9.4	4	1.8	11	4.9
	50 59歳	286	100.0	28	9.8	46	16.1	62	21.7	100	35.0	38	13.3	12	4.2	44	15.4
	60 69歳	431	100.0	28	6.5	60	13.9	105	24.4	152	35.3	64	14.8	22	5.1	111	25.8
	70歳以上	481	100.0	40	8.3	58	12.1	110	22.9	169	35.1	85	17.7	19	4.0	182	37.8
	(再掲)65 74歳	413	100.0	26	6.3	49	11.9	103	24.9	155	37.5	59	14.3	21	5.1	136	32.9
	(再掲)75歳以上	274	100.0	28	10.2	32	11.7	59	21.5	95	34.7	51	18.6	9	3.3	111	40.5
女性	総数	2634	100.0	934	35.5	443	16.8	427	16.2	574	21.8	203	7.7	53	2.0	488	18.5
	15 19歳	72	100.0	71	98.6	0	0	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 29歳	135	100.0	114	84.4	15	11.1	4	3.0	1	0.7	0	0	1	0.7	0	0
	30 39歳	409	100.0	300	73.3	68	16.6	24	5.9	11	2.7	4	1.0	2	0.5	5	1.2
	40 49歳	371	100.0	194	52.3	70	18.9	47	12.7	39	10.5	15	4.0	6	1.6	20	5.4
	50 59歳	476	100.0	126	26.5	95	20.0	90	18.9	122	25.6	32	6.7	11	2.3	70	14.7
	60 69歳	564	100.0	79	14.0	102	18.1	132	23.4	170	30.1	66	11.7	15	2.7	134	23.8
	70歳以上	607	100.0	50	8.2	93	15.3	129	21.3	231	38.1	86	14.2	18	3.0	259	42.7
	(再掲)65 74歳	491	100.0	54	11.0	80	16.3	114	23.2	170	34.6	59	12.0	14	2.9	154	31.4
(再掲)75歳以上	369	100.0	20	5.4	55	14.9	75	20.3	152	41.2	56	15.2	11	3.0	178	48.2	
総数	総数	4425	100.0	1230	27.8	770	17.4	828	18.7	1067	24.1	419	9.5	111	2.5	844	19.1
総数	15 19歳	128	100.0	115	89.8	8	6.3	4	3.1	1	0.8	0	0	0	0	0	0
	20 29歳	231	100.0	154	66.7	46	19.9	22	9.5	6	2.6	2	0.9	1	0.4	1	0.4
	30 39歳	626	100.0	365	58.3	140	22.4	69	11.0	39	6.2	10	1.6	3	0.5	12	1.9
	40 49歳	595	100.0	245	41.2	122	20.5	105	17.6	77	12.9	36	6.1	10	1.7	31	5.2
	50 59歳	762	100.0	154	20.2	141	18.5	152	19.9	222	29.1	70	9.2	23	3.0	114	15.0
	60 69歳	995	100.0	107	10.8	162	16.3	237	23.8	322	32.4	130	13.1	37	3.7	245	24.6
	70歳以上	1088	100.0	90	8.3	151	13.9	239	22.0	400	36.8	171	15.7	37	3.4	441	40.5
	(再掲)65 74歳	904	100.0	80	8.8	129	14.3	217	24.0	325	36.0	118	13.1	35	3.9	290	32.1
	(再掲)75歳以上	643	100.0	48	7.5	87	13.5	134	20.8	247	38.4	107	16.6	20	3.1	289	44.9

注) 日本高血圧学会による血圧の分類は p. 16 参照  
総数に対する割合

第30表の2 血圧の状況(性・年齢階級別)

性別	総数	総数		高血圧学会(2回測定値の平均値)												(再掲) 収縮期高血圧	
				至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		度高血圧		度高血圧		度高血圧			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
	総数	1791	100.0	296	16.5	327	18.3	401	22.4	493	27.5	216	12.1	58	3.2	356	19.9
男性	15 19歳	56	100.0	44	78.6	8	14.3	3	5.4	1	1.8	0	0	0	0	0	0
	20 29歳	96	100.0	40	41.7	31	32.3	18	18.8	5	5.2	2	2.1	0	0	1	1.0
	30 39歳	217	100.0	65	30.0	72	33.2	45	20.7	28	12.9	6	2.8	1	0.5	7	3.2
	40 49歳	224	100.0	51	22.8	52	23.2	58	25.9	38	17.0	21	9.4	4	1.8	11	4.9
	50 59歳	286	100.0	28	9.8	46	16.1	62	21.7	100	35.0	38	13.3	12	4.2	44	15.4
	60 69歳	431	100.0	28	6.5	60	13.9	105	24.4	152	35.3	64	14.8	22	5.1	111	25.8
	70歳以上	481	100.0	40	8.3	58	12.1	110	22.9	169	35.1	85	17.7	19	4.0	182	37.8
	(再掲)65 74歳	413	100.0	26	6.3	49	11.9	103	24.9	155	37.5	59	14.3	21	5.1	136	32.9
	(再掲)75歳以上	274	100.0	28	10.2	32	11.7	59	21.5	95	34.7	51	18.6	9	3.3	111	40.5
女性	総数	2615	100.0	918	35.1	441	16.9	427	16.3	574	22.0	203	7.8	52	2.0	488	18.7
	15 19歳	72	100.0	71	98.6	0	0	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 29歳	128	100.0	108	84.4	14	10.9	4	3.1	1	0.8	0	0	1	0.8	0	0
	30 39歳	397	100.0	290	73.0	67	16.9	24	6.0	11	2.8	4	1.0	1	0.3	5	1.3
	40 49歳	371	100.0	194	52.3	70	18.9	47	12.7	39	10.5	15	4.0	6	1.6	20	5.4
	50 59歳	476	100.0	126	26.5	95	20.0	90	18.9	122	25.6	32	6.7	11	2.3	70	14.7
	60 69歳	564	100.0	79	14.0	102	18.1	132	23.4	170	30.1	66	11.7	15	2.7	134	23.8
	70歳以上	607	100.0	50	8.2	93	15.3	129	21.3	231	38.1	86	14.2	18	3.0	259	42.7
	(再掲)65 74歳	491	100.0	54	11.0	80	16.3	114	23.2	170	34.6	59	12.0	14	2.9	154	31.4
(再掲)75歳以上	369	100.0	20	5.4	55	14.9	75	20.3	152	41.2	56	15.2	11	3.0	178	48.2	
総数	総数	4406	100.0	1214	27.6	768	17.4	828	18.8	1067	24.2	419	9.5	110	2.5	844	19.2
	15 19歳	128	100.0	115	89.8	8	6.3	4	3.1	1	0.8	0	0	0	0	0	0
	20 29歳	224	100.0	148	66.1	45	20.1	22	9.8	6	2.7	2	0.9	1	0.4	1	0.4
	30 39歳	614	100.0	355	57.8	139	22.6	69	11.2	39	6.4	10	1.6	2	0.3	12	2.0
	40 49歳	595	100.0	245	41.2	122	20.5	105	17.6	77	12.9	36	6.1	10	1.7	31	5.2
	50 59歳	762	100.0	154	20.2	141	18.5	152	19.9	222	29.1	70	9.2	23	3.0	114	15.0
	60 69歳	995	100.0	107	10.8	162	16.3	237	23.8	322	32.4	130	13.1	37	3.7	245	24.6
	70歳以上	1088	100.0	90	8.3	151	13.9	239	22.0	400	36.8	171	15.7	37	3.4	441	40.5
	(再掲)65 74歳	904	100.0	80	8.8	129	14.3	217	24.0	325	36.0	118	13.1	35	3.9	290	32.1
	(再掲)75歳以上	643	100.0	48	7.5	87	13.5	134	20.8	247	38.4	107	16.6	20	3.1	289	44.9

注) 妊婦除外  
総数に対する割合

第 30 表の 3 血圧の状況（性・年齢階級別）

性別	総数	総数		高血圧学会(2回測定値の平均値)												(再掲)	
				至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		度高血圧		度高血圧		度高血圧		収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
	総数	1351	100.0	283	20.9	280	20.7	302	22.4	321	23.8	130	9.6	35	2.6	190	14.1
男性	15 19歳	56	100.0	44	78.6	8	14.3	3	5.4	1	1.8	0	0	0	0	0	0
	20 29歳	95	100.0	40	42.1	31	32.6	17	17.9	5	5.3	2	2.1	0	0	1	1.1
	30 39歳	217	100.0	65	30.0	72	33.2	45	20.7	28	12.9	6	2.8	1	0.5	7	3.2
	40 49歳	208	100.0	50	24.0	50	24.0	53	25.5	33	15.9	19	9.1	3	1.4	10	4.8
	50 59歳	220	100.0	28	12.7	41	18.6	47	21.4	69	31.4	26	11.8	9	4.1	25	11.4
	60 69歳	299	100.0	27	9.0	51	17.1	74	24.7	94	31.4	38	12.7	15	5.0	65	21.7
	70歳以上	256	100.0	29	11.3	27	10.5	63	24.6	91	35.5	39	15.2	7	2.7	82	32.0
	(再掲)65 74歳	249	100.0	22	8.8	30	12.0	70	28.1	88	35.3	30	12.0	9	3.6	70	28.1
	(再掲)75歳以上	141	100.0	20	14.2	15	10.6	31	22.0	49	34.8	22	15.6	4	2.8	49	34.8
女性	総数	2034	100.0	898	44.1	377	18.5	293	14.4	336	16.5	102	5.0	28	1.4	248	12.2
	15 19歳	72	100.0	71	98.6	0	0	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 29歳	128	100.0	108	84.4	14	10.9	4	3.1	1	0.8	0	0	1	0.8	0	0
	30 39歳	395	100.0	290	73.4	67	17.0	23	5.8	11	2.8	4	1.0	0	0	5	1.3
	40 49歳	356	100.0	193	54.2	68	19.1	42	11.8	35	9.8	13	3.7	5	1.4	19	5.3
	50 59歳	402	100.0	123	30.6	86	21.4	75	18.7	92	22.9	20	5.0	6	1.5	52	12.9
	60 69歳	382	100.0	78	20.4	84	22.0	88	23.0	93	24.3	31	8.1	8	2.1	64	16.8
	70歳以上	299	100.0	35	11.7	58	19.4	60	20.1	104	34.8	34	11.4	8	2.7	108	36.1
	(再掲)65 74歳	290	100.0	45	15.5	63	21.7	61	21.0	82	28.3	30	10.3	9	3.1	69	23.8
(再掲)75歳以上	160	100.0	13	8.1	29	18.1	30	18.8	67	41.9	17	10.6	4	2.5	72	45.0	
総数	総数	3385	100.0	1181	34.9	657	19.4	595	17.6	657	19.4	232	6.9	63	1.9	438	12.9
	15 19歳	128	100.0	115	89.8	8	6.3	4	3.1	1	0.8	0	0	0	0	0	0
	20 29歳	223	100.0	148	66.4	45	20.2	21	9.4	6	2.7	2	0.9	1	0.4	1	0.4
	30 39歳	612	100.0	355	58.0	139	22.7	68	11.1	39	6.4	10	1.6	1	0.2	12	2.0
	40 49歳	564	100.0	243	43.1	118	20.9	95	16.8	68	12.1	32	5.7	8	1.4	29	5.1
	50 59歳	622	100.0	151	24.3	127	20.4	122	19.6	161	25.9	46	7.4	15	2.4	77	12.4
	60 69歳	681	100.0	105	15.4	135	19.8	162	23.8	187	27.5	69	10.1	23	3.4	129	18.9
	70歳以上	555	100.0	64	11.5	85	15.3	123	22.2	195	35.1	73	13.2	15	2.7	190	34.2
	(再掲)65 74歳	539	100.0	67	12.4	93	17.3	131	24.3	170	31.5	60	11.1	18	3.3	139	25.8
	(再掲)75歳以上	301	100.0	33	11.0	44	14.6	61	20.3	116	38.5	39	13.0	8	2.7	121	40.2

注) 妊婦・血圧を下げる薬服用者除外  
総数に対する割合

第31表の1-1 最低血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢（歳）															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
性別	2回の平均値 (mmHg)	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	39	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4
	40 49	5	0.3	0	0	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.8
	50 59	43	2.4	11	19.6	8	8.3	5	2.3	0	0	1	0.3	0	0	18	3.7
	60 69	194	10.8	26	46.4	26	27.1	28	12.9	20	8.9	8	2.8	21	4.9	65	13.5
	70 79	495	27.6	17	30.4	35	36.5	74	34.1	59	26.3	55	19.2	111	25.8	144	29.9
	80 89	641	35.8	1	1.8	20	20.8	82	37.8	93	41.5	116	40.6	172	39.9	157	32.6
	90 99	289	16.1	1	1.8	5	5.2	21	9.7	32	14.3	70	24.5	89	20.6	71	14.8
	100 109	98	5.5	0	0	1	1.0	6	2.8	16	7.1	27	9.4	29	6.7	19	4.0
	110 119	21	1.2	0	0	0	0	1	0.5	4	1.8	8	2.8	8	1.9	0	0
	120 129	3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	1	0.2
	130 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	1791	100	56	100	96	100	217	100	224	100	286	100	431	100	481	100
女性	39	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0
	40 49	15	0.6	4	5.6	2	1.5	3	0.7	1	0.3	2	0.4	0	0	3	0.5
	50 59	122	4.6	28	38.9	21	15.6	40	9.8	12	3.2	4	0.8	6	1.1	11	1.8
	60 69	577	21.9	24	33.3	59	43.7	155	37.9	94	25.3	72	15.1	70	12.4	103	17.0
	70 79	887	33.7	15	20.8	43	31.9	143	35.0	143	38.5	146	30.7	167	29.6	230	37.9
	80 89	690	26.2	1	1.4	8	5.9	56	13.7	81	21.8	156	32.8	204	36.2	184	30.3
	90 99	245	9.3	0	0	1	0.7	6	1.5	26	7.0	69	14.5	85	15.1	58	9.6
	100 109	73	2.8	0	0	0	0	4	1.0	8	2.2	20	4.2	27	4.8	14	2.3
	110 119	20	0.8	0	0	0	0	2	0.5	5	1.3	4	0.8	5	0.9	4	0.7
	120 129	3	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.4	0	0	0	0
	130 139	1	0.0	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	2634	100	72	100	135	100	409	100	371	100	476	100	564	100	607	100

第31表の1-1 最低血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢（歳）															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
性別	最低血圧 (mmHg)	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	81.7	11.8	65.8	7.9	73.4	10.3	79.0	10.1	83.4	11.0	87.2	10.7	84.9	10.3	79.6	12.0	
女性	76.7	11.8	61.7	8.3	67.5	10.2	70.4	9.8	76.1	11.4	80.5	11.6	81.3	10.7	78.1	10.4	

注) 2回測定値の平均値

第31表の1-2 最高血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢（歳）															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
性別	2回の平均値 (mmHg)	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	89	1	0.1	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90 99	22	1.2	6	10.7	5	5.2	2	0.9	2	0.9	3	1.0	1	0.2	3	0.6
	100 109	98	5.5	16	28.6	17	17.7	21	9.7	19	8.5	10	3.5	7	1.6	8	1.7
	110 119	239	13.3	22	39.3	27	28.1	59	27.2	44	19.6	26	9.1	27	6.3	34	7.1
	120 129	359	20.0	7	12.5	26	27.1	73	33.6	59	26.3	63	22.0	67	15.5	64	13.3
	130 139	405	22.6	3	5.4	16	16.7	44	20.3	56	25.0	60	21.0	116	26.9	110	22.9
	140 149	260	14.5	1	1.8	1	1.0	8	3.7	21	9.4	60	21.0	83	19.3	86	17.9
	150 159	195	10.9	0	0	3	3.1	7	3.2	10	4.5	33	11.5	59	13.7	83	17.3
	160 169	119	6.6	0	0	1	1.0	3	1.4	12	5.4	18	6.3	35	8.1	50	10.4
	170 179	50	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2.4	19	4.4	24	5.0
	180	43	2.4	0	0	0	0	0	0	1	0.4	6	2.1	17	3.9	19	4.0
	総数	1791	100	56	100	96	100	217	100	224	100	286	100	431	100	481	100
女性	89	15	0.6	4	5.6	2	1.5	6	1.5	0	0	1	0.2	2	0.4	0	0
	90 99	140	5.3	29	40.3	21	15.6	49	12.0	27	7.3	8	1.7	6	1.1	0	0
	100 109	407	15.5	28	38.9	50	37.0	146	35.7	93	25.1	48	10.1	25	4.4	17	2.8
	110 119	462	17.5	11	15.3	44	32.6	118	28.9	90	24.3	93	19.5	61	10.8	45	7.4
	120 129	425	16.1	0	0	14	10.4	63	15.4	67	18.1	90	18.9	102	18.1	89	14.7
	130 139	413	15.7	0	0	3	2.2	14	3.4	46	12.4	93	19.5	129	22.9	128	21.1
	140 149	320	12.1	0	0	0	0	6	1.5	21	5.7	60	12.6	94	16.7	139	22.9
	150 159	230	8.7	0	0	0	0	4	1.0	12	3.2	46	9.7	75	13.3	93	15.3
	160 169	140	5.3	0	0	0	0	3	0.7	10	2.7	21	4.4	44	7.8	62	10.2
	170 179	47	1.8	0	0	1	0.7	0	0	4	1.1	9	1.9	15	2.7	18	3.0
	180	35	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.3	7	1.5	11	2.0	16	2.6
	総数	2634	100	72	100	135	100	409	100	371	100	476	100	564	100	607	100

第31表の1-2 最高血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢（歳）															
		総数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
性別	最高血圧 (mmHg)	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	135.8	19.4	111.7	10.8	120.0	13.7	124.0	12.6	128.6	15.4	137.5	18.1	142.1	18.2	143.7	19.5	
女性	128.2	21.1	101.0	7.6	108.8	11.8	111.4	12.6	119.9	17.5	131.1	19.6	137.2	18.6	141.6	17.8	

注) 2回測定値の平均値

第 31 表の 2-1 最低血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢（歳）															
		総 数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男 性	2回の平均値（mmHg）																
	39	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4
	40 49	5	0.3	0	0	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.8
	50 59	43	2.4	11	19.6	8	8.3	5	2.3	0	0	1	0.3	0	0	18	3.7
	60 69	194	10.8	26	46.4	26	27.1	28	12.9	20	8.9	8	2.8	21	4.9	65	13.5
	70 79	495	27.6	17	30.4	35	36.5	74	34.1	59	26.3	55	19.2	111	25.8	144	29.9
	80 89	641	35.8	1	1.8	20	20.8	82	37.8	93	41.5	116	40.6	172	39.9	157	32.6
	90 99	289	16.1	1	1.8	5	5.2	21	9.7	32	14.3	70	24.5	89	20.6	71	14.8
	100 109	98	5.5	0	0	1	1.0	6	2.8	16	7.1	27	9.4	29	6.7	19	4.0
	110 119	21	1.2	0	0	0	0	1	0.5	4	1.8	8	2.8	8	1.9	0	0
	120 129	3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	1	0.2
	130 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総 数		1791	100	56	100	96	100	217	100	224	100	286	100	431	100	481
女 性	2回の平均値（mmHg）																
	39	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 49	13	0.5	4	5.6	2	1.6	1	0.3	1	0.3	2	0.4	0	0	3	0.5
	50 59	114	4.4	28	38.9	18	14.1	35	8.8	12	3.2	4	0.8	6	1.1	11	1.8
	60 69	571	21.8	24	33.3	56	43.8	152	38.3	94	25.3	72	15.1	70	12.4	103	17.0
	70 79	885	33.8	15	20.8	42	32.8	142	35.8	143	38.5	146	30.7	167	29.6	230	37.9
	80 89	690	26.4	1	1.4	8	6.3	56	14.1	81	21.8	156	32.8	204	36.2	184	30.3
	90 99	245	9.4	0	0	1	0.8	6	1.5	26	7.0	69	14.5	85	15.1	58	9.6
	100 109	73	2.8	0	0	0	0	4	1.0	8	2.2	20	4.2	27	4.8	14	2.3
	110 119	19	0.7	0	0	0	0	1	0.3	5	1.3	4	0.8	5	0.9	4	0.7
	120 129	3	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.4	0	0	0	0
	130 139	1	0.0	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総 数		2615	100	72	100	128	100	397	100	371	100	476	100	564	100	607

注）妊婦除外

第 31 表の 2-1 最低血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢（歳）															
		総 数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		最低血圧（mmHg）		最低血圧（mmHg）		最低血圧（mmHg）		最低血圧（mmHg）		最低血圧（mmHg）		最低血圧（mmHg）		最低血圧（mmHg）		最低血圧（mmHg）	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別		81.7	11.8	65.8	7.9	73.4	10.3	79.0	10.1	83.4	11.0	87.2	10.7	84.9	10.3	79.6	12.0
男 性		81.7	11.8	65.8	7.9	73.4	10.3	79.0	10.1	83.4	11.0	87.2	10.7	84.9	10.3	79.6	12.0
女 性		76.9	11.7	61.7	8.3	67.8	10.2	70.6	9.4	76.1	11.4	80.5	11.6	81.3	10.7	78.1	10.4

注）妊婦除外 2回測定値の平均値

第 31 表の 2-2 最高血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢（歳）																
		総 数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
性別 男 性	2回の平均値（mmHg）																	
	89	1	0.1	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90 99	22	1.2	6	10.7	5	5.2	2	0.9	2	0.9	3	1.0	1	0.2	3	0.6	
	100 109	98	5.5	16	28.6	17	17.7	21	9.7	19	8.5	10	3.5	7	1.6	8	1.7	
	110 119	239	13.3	22	39.3	27	28.1	59	27.2	44	19.6	26	9.1	27	6.3	34	7.1	
	120 129	359	20.0	7	12.5	26	27.1	73	33.6	59	26.3	63	22.0	67	15.5	64	13.3	
	130 139	405	22.6	3	5.4	16	16.7	44	20.3	56	25.0	60	21.0	116	26.9	110	22.9	
	140 149	260	14.5	1	1.8	1	1.0	8	3.7	21	9.4	60	21.0	83	19.3	86	17.9	
	150 159	195	10.9	0	0	3	3.1	7	3.2	10	4.5	33	11.5	59	13.7	83	17.3	
	160 169	119	6.6	0	0	1	1.0	3	1.4	12	5.4	18	6.3	35	8.1	50	10.4	
	170 179	50	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2.4	19	4.4	24	5.0	
	180	43	2.4	0	0	0	0	0	0	1	0.4	6	2.1	17	3.9	19	4.0	
	総 数		1791	100	56	100	96	100	217	100	224	100	286	100	431	100	481	100
	女 性	2回の平均値（mmHg）																
89		14	0.5	4	5.6	2	1.6	5	1.3	0	0	1	0.2	2	0.4	0	0	
90 99		138	5.3	29	40.3	20	15.6	48	12.1	27	7.3	8	1.7	6	1.1	0	0	
100 109		396	15.1	28	38.9	47	36.7	138	34.8	93	25.1	48	10.1	25	4.4	17	2.8	
110 119		460	17.6	11	15.3	42	32.8	118	29.7	90	24.3	93	19.5	61	10.8	45	7.4	
120 129		423	16.2	0	0	13	10.2	62	15.6	67	18.1	90	18.9	102	18.1	89	14.7	
130 139		413	15.8	0	0	3	2.3	14	3.5	46	12.4	93	19.5	129	22.9	128	21.1	
140 149		319	12.2	0	0	0	0	5	1.3	21	5.7	60	12.6	94	16.7	139	22.9	
150 159		230	8.8	0	0	0	0	4	1.0	12	3.2	46	9.7	75	13.3	93	15.3	
160 169		140	5.4	0	0	0	0	3	0.8	10	2.7	21	4.4	44	7.8	62	10.2	
170 179		47	1.8	0	0	1	0.8	0	0	4	1.1	9	1.9	15	2.7	18	3.0	
180		35	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.3	7	1.5	11	2.0	16	2.6	
総 数		2615	100	72	100	128	100	397	100	371	100	476	100	564	100	607	100	

注）妊婦除外

第 31 表の 2-2 最高血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢（歳）															
		総 数		15 19歳		20 29歳		30 39歳		40 49歳		50 59歳		60 69歳		70歳	
		最高血圧（mmHg）		最高血圧（mmHg）		最高血圧（mmHg）		最高血圧（mmHg）		最高血圧（mmHg）		最高血圧（mmHg）		最高血圧（mmHg）		最高血圧（mmHg）	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別		135.8	19.4	111.7	10.8	120.0	13.7	124.0	12.6	128.6	15.4	137.5	18.1	142.1	18.2	143.7	19.5
男 性		135.8	19.4	111.7	10.8	120.0	13.7	124.0	12.6	128.6	15.4	137.5	18.1	142.1	18.2	143.7	19.5
女 性		128.4	21.1	101.0	7.6	108.7	12.0	111.5	12.5	119.9	17.5	131.1	19.6	137.2	18.6	141.6	17.8

注）妊婦除外 2回測定値の平均値

第31表の3-1 最低血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																	
		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性別	2回の平均値(mmHg)	39	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	
		40-49	2	0.1	0	0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	
		50-59	35	2.6	11	19.6	8	8.4	5	2.3	0	0	1	0.5	0	0	10	3.9	
		60-69	153	11.3	26	46.4	26	27.4	28	12.9	20	9.6	7	3.2	16	5.4	30	11.7	
		70-79	384	28.4	17	30.4	34	35.8	74	34.1	56	26.9	46	20.9	84	28.1	73	28.5	
		80-89	480	35.5	1	1.8	20	21.1	82	37.8	87	41.8	87	39.5	117	39.1	86	33.6	
		90-99	210	15.5	1	1.8	5	5.3	21	9.7	28	13.5	55	25.0	57	19.1	43	16.8	
		100-109	68	5.0	0	0	1	1.1	6	2.8	14	6.7	18	8.2	18	6.0	11	4.3	
		110-119	16	1.2	0	0	0	0	1	0.5	3	1.4	6	2.7	6	2.0	0	0	
		120-129	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.4	
		130-139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		総数		1351	100	56	100	95	100	217	100	208	100	220	100	299	100	256	100
		女性	2回の平均値(mmHg)	39	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0
				40-49	10	0.5	4	5.6	2	1.6	1	0.3	1	0.3	2	0.5	0	0	0
50-59	106			5.2	28	38.9	18	14.1	35	8.9	12	3.4	4	1.0	6	1.6	3	1.0	
60-69	504			24.8	24	33.3	56	43.8	152	38.5	94	26.4	69	17.2	58	15.2	51	17.1	
70-79	711			35.0	15	20.8	42	32.8	142	35.9	138	38.8	128	31.8	120	31.4	126	42.1	
80-89	484			23.8	1	1.4	8	6.3	55	13.9	77	21.6	132	32.8	130	34.0	81	27.1	
90-99	151			7.4	0	0	1	0.8	6	1.5	22	6.2	47	11.7	47	12.3	28	9.4	
100-109	51			2.5	0	0	0	0	4	1.0	7	2.0	14	3.5	18	4.7	8	2.7	
110-119	14			0.7	0	0	0	0	0	0	5	1.4	4	1.0	3	0.8	2	0.7	
120-129	1			0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	
130-139	1			0.0	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数				2034	100	72	100	128	100	395	100	356	100	402	100	382	100	299	100

注) 妊婦・血圧を下げる薬服用者除外

第31表の3-1 最低血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳	
		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)		最低血圧(mmHg)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別	男性	81.4	11.8	65.8	7.9	73.4	10.3	79.0	10.1	83.0	10.9	86.6	10.6	84.3	10.6	80.7	12.2
		女性	75.6	11.5	61.7	8.3	67.8	10.2	70.4	9.1	75.5	11.1	79.5	11.4	80.1	10.9	78.2

注) 妊婦・血圧を下げる薬服用者除外 2回測定値の平均値

第31表の3-2 最高血圧の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																		
		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳				
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
性別	2回の平均値(mmHg)	89	1	0.1	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		90-99	22	1.6	6	10.7	5	5.3	2	0.9	2	1.0	3	1.4	1	0.3	3	1.2		
		100-109	96	7.1	16	28.6	17	17.9	21	9.7	19	9.1	10	4.5	7	2.3	6	2.3		
		110-119	220	16.3	22	39.3	27	28.4	59	27.2	42	20.2	25	11.4	24	8.0	21	8.2		
		120-129	305	22.6	7	12.5	26	27.4	73	33.6	57	27.4	51	23.2	57	19.1	34	13.3		
		130-139	305	22.6	3	5.4	15	15.8	44	20.3	50	24.0	50	22.7	81	27.1	62	24.2		
		140-149	161	11.9	1	1.8	1	1.1	8	3.7	17	8.2	39	17.7	51	17.1	44	17.2		
		150-159	121	9.0	0	0	3	3.2	7	3.2	10	4.8	22	10.0	32	10.7	47	18.4		
		160-169	66	4.9	0	0	1	1.1	3	1.4	10	4.8	10	4.5	22	7.4	20	7.8		
		170-179	29	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.8	13	4.3	12	4.7		
		180	25	1.9	0	0	0	0	0	0	1	0.5	6	2.7	11	3.7	7	2.7		
		総数		1351	100	56	100	95	100	217	100	208	100	220	100	299	100	256	100	
		女性	2回の平均値(mmHg)	89	14	0.7	4	5.6	2	1.6	5	1.3	0	0	1	0.2	2	0.5	0	0
				90-99	138	6.8	29	40.3	20	15.6	48	12.2	27	7.6	8	2.0	6	1.6	0	0
				100-109	392	19.3	28	38.9	47	36.7	138	34.9	92	25.8	48	11.9	25	6.5	14	4.7
110-119	438			21.5	11	15.3	42	32.8	118	29.9	90	25.3	88	21.9	60	15.7	29	9.7		
120-129	357			17.6	0	0	13	10.2	61	15.4	64	18.0	81	20.1	83	21.7	55	18.4		
130-139	274			13.5	0	0	3	2.3	14	3.5	41	11.5	74	18.4	82	21.5	60	20.1		
140-149	176			8.7	0	0	0	0	5	1.3	19	5.3	42	10.4	46	12.0	64	21.4		
150-159	133			6.5	0	0	0	0	3	0.8	10	2.8	38	9.5	44	11.5	38	12.7		
160-169	68			3.3	0	0	0	0	3	0.8	10	2.8	13	3.2	20	5.2	22	7.4		
170-179	28			1.4	0	0	1	0.8	0	0	3	0.8	6	1.5	8	2.1	10	3.3		
180	16			0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.7	6	1.6	7	2.3		
総数				2034	100	72	100	128	100	395	100	356	100	402	100	382	100	299	100	

注) 妊婦・血圧を下げる薬服用者除外

第31表の3-2 最高血圧の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢(歳)															
		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳	
		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)		最高血圧(mmHg)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別	男性	132.5	18.7	111.7	10.8	119.8	13.7	124.0	12.6	127.8	15.2	135.4	18.7	139.9	18.3	141.6	19.0
		女性	123.6	19.9	101.0	7.6	108.7	12.0	111.4	12.3	119.0	16.9	128.6	18.9	132.9	18.7	138.7

注) 妊婦・血圧を下げる薬服用者除外 2回測定値の平均値

第 32 表 血色素量の分布 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	血色素量(g/dl)																								
	<10	12	0.7	0	0	0	0	0	0	2	0.8	4	1.0	6	1.4	3	1.5	1	0.5	0	0	2	2.8	3	8.6
	10-<11	19	1.2	0	0	0	0	1	0.5	1	0.4	5	1.2	12	2.7	2	1.0	5	2.6	4	2.8	3	4.2	0	0
	11-<12	31	1.9	0	0	1	0.5	1	0.5	0	0	4	1.0	25	5.6	3	1.5	7	3.6	6	4.3	6	8.3	6	17.1
	12-<13	88	5.4	1	1.1	2	1.0	1	0.5	9	3.4	29	7.1	46	10.4	16	8.2	16	8.2	14	9.9	10	13.9	6	17.1
	13-<14	268	16.6	3	3.4	13	6.5	26	12.4	33	12.5	66	16.1	127	28.6	33	17.0	53	27.0	41	29.1	22	30.6	11	31.4
	14-<15	501	31.0	18	20.5	60	30.0	59	28.1	89	33.7	146	35.5	129	29.1	79	40.7	56	28.6	46	32.6	21	29.2	6	17.1
	15-<16	453	28.0	44	50.0	69	34.5	74	35.2	84	31.8	111	27.0	71	16.0	43	22.2	43	21.9	20	14.2	5	6.9	3	8.6
	16-<17	189	11.7	16	18.2	46	23.0	38	18.1	31	11.7	36	8.8	22	5.0	12	6.2	14	7.1	7	5.0	1	1.4	0	0
	17-<18	52	3.2	6	6.8	8	4.0	9	4.3	14	5.3	9	2.2	6	1.4	3	1.5	1	0.5	3	2.1	2	2.8	0	0
18-	4	0.2	0	0	1	0.5	1	0.5	1	0.4	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数		1617	100	88	100	200	100	210	100	264	100	411	100	444	100	194	100	196	100	141	100	72	100	35	100
性別 女性	血色素量(g/dl)																								
	<10	49	2.1	2	1.7	10	2.6	21	6.1	7	1.6	2	0.4	7	1.2	1	0.4	1	0.4	0	0	3	3.2	3	5.0
	10-<11	91	3.8	1	0.9	19	4.9	29	8.4	7	1.6	4	0.8	31	5.5	2	0.9	7	3.1	12	6.6	6	6.4	6	10.0
	11-<12	281	11.8	10	8.6	51	13.1	44	12.8	37	8.3	41	7.8	98	17.5	21	9.1	25	11.1	36	19.8	25	26.6	12	20.0
	12-<13	765	32.1	43	37.1	145	37.3	96	27.8	125	28.0	151	28.9	205	36.5	60	25.9	89	39.6	68	37.4	26	27.7	22	36.7
	13-<14	824	34.6	46	39.7	121	31.1	111	32.2	165	36.9	225	43.0	156	27.8	105	45.3	69	30.7	47	25.8	25	26.6	15	25.0
	14-<15	314	13.2	11	9.5	35	9.0	38	11.0	89	19.9	85	16.3	56	10.0	35	15.1	31	13.8	16	8.8	7	7.4	2	3.3
	15-<16	51	2.1	2	1.7	8	2.1	6	1.7	16	3.6	13	2.5	6	1.1	6	2.6	2	0.9	2	1.1	2	2.1	0	0
	16-<17	5	0.2	1	0.9	0	0	0	0	1	0.2	2	0.4	1	0.2	2	0.9	1	0.4	0	0	0	0	0	0
	17-<18	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0
18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数		2381	100	116	100	389	100	345	100	447	100	523	100	561	100	232	100	225	100	182	100	94	100	60	100

第 32 表 血色素量の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		血色素量 (g/dl)		血色素量 (g/dl)		血色素量 (g/dl)		血色素量 (g/dl)		血色素量 (g/dl)		血色素量 (g/dl)		血色素量 (g/dl)		血色素量 (g/dl)		血色素量 (g/dl)		血色素量 (g/dl)		血色素量 (g/dl)		血色素量 (g/dl)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別 男性		14.7	1.4	15.4	0.9	15.3	1.0	15.1	1.1	14.9	1.2	14.5	1.3	13.9	1.5	14.4	1.3	14.2	1.4	14.0	1.4	13.5	1.6	12.9	1.7
性別 女性		12.9	1.2	13.0	1.0	12.7	1.2	12.5	1.5	13.1	1.2	13.2	1.0	12.6	1.2	13.2	1.0	12.9	1.0	12.6	1.1	12.4	1.3	12.2	1.3



第33表 赤血球数の分布(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )																								
	<<400	111	6.9	0	0	0	0	2	1.0	9	3.4	30	7.3	70	15.8	16	8.2	24	12.2	17	12.1	14	19.4	15	42.9
	400-<450	380	23.5	4	4.5	17	8.5	35	16.7	46	17.4	105	25.5	173	39.0	57	29.4	71	36.2	60	42.6	31	43.1	11	31.4
	450-<500	677	41.9	25	28.4	76	38.0	94	44.8	133	50.4	197	47.9	152	34.2	91	46.9	73	37.2	48	34.0	23	31.9	8	22.9
	500-<550	402	24.9	51	58.0	98	49.0	70	33.3	64	24.2	75	18.2	44	9.9	28	14.4	25	12.8	15	10.6	3	4.2	1	2.9
	550-<600	46	2.8	8	9.1	9	4.5	8	3.8	12	4.5	4	1.0	5	1.1	2	1.0	3	1.5	1	0.7	1	1.4	0	0
	600-<650	1	0.1	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	650-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(再掲)<410	145	9.0	0	0	0	0	6	2.9	11	4.2	39	9.5	89	20.0	21	10.8	29	14.8	25	17.7	17	23.6	18	51.4
	(再掲)530	146	9.0	24	27.3	36	18.0	29	13.8	31	11.7	18	4.4	8	1.8	6	3.1	6	3.1	1	0.7	1	1.4	0	0
総数	1617	100	88	100	200	100	210	100	264	100	411	100	444	100	194	100	196	100	141	100	72	100	35	100	
性別 女性	赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )																								
	<<400	362	15.2	8	6.9	34	8.7	35	10.1	45	10.1	60	11.5	180	32.1	28	12.1	58	25.8	55	30.2	41	43.6	26	43.3
	400-<450	1267	53.2	59	50.9	230	59.1	196	56.8	228	51.0	276	52.8	278	49.6	134	57.8	116	51.6	94	51.6	40	42.6	28	46.7
	450-<500	686	28.8	42	36.2	115	29.6	106	30.7	156	34.9	173	33.1	94	16.8	63	27.2	47	20.9	30	16.5	11	11.7	6	10.0
	500-<550	63	2.6	7	6.0	10	2.6	6	1.7	17	3.8	14	2.7	9	1.6	7	3.0	4	1.8	3	1.6	2	2.1	0	0
	550-<600	2	0.1	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600-<650	1	0.0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	650-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(再掲)<380	152	6.4	3	2.6	13	3.3	13	3.8	14	3.1	17	3.3	92	16.4	11	4.7	23	10.2	31	17.0	25	26.6	13	21.7
	(再掲)480	213	8.9	17	14.7	33	8.5	24	7.0	59	13.2	47	9.0	33	5.9	17	7.3	17	7.6	11	6.0	5	5.3	0	0
総数	2381	100	116	100	389	100	345	100	447	100	523	100	561	100	232	100	225	100	182	100	94	100	60	100	

第33表 赤血球数の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )		赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )		赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )		赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )		赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )		赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )		赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )		赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )		赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )		赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )		赤血球数(万個/mm <sup>3</sup> )			
性別	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	
男性	470.5	47.1	509.8	30.4	499.8	32.2	486.0	38.6	478.2	42.8	464.6	43.7	443.0	47.5	459.3	43.0	451.4	45.9	444.7	43.1	433.2	49.0	408.7	52.7	
女性	433.4	36.5	441.9	36.8	436.8	32.1	436.7	34.1	441.3	34.9	437.8	32.2	416.7	40.4	435.7	32.4	424.5	35.7	417.2	37.0	406.5	46.4	401.5	48.9	

第 34 表 ヘマトクリット値の分布 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																									
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	ヘマトクリット(%)																										
	<25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-<30	7	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	5	1.1	1	0.5	1	0.5	0	0	0	0	1	1.4	3	8.6
	30-<35	25	1.5	0	0	0	0	1	0.5	2	0.8	7	1.7	15	3.4	5	2.6	5	2.6	5	3.5	4	5.6	1	2.9		
	35-<40	136	8.4	0	0	3	1.5	3	1.4	11	4.2	38	9.2	81	18.2	19	9.8	27	13.8	23	16.3	17	23.6	14	40.0		
	40-<45	668	41.3	19	21.6	70	35.0	84	40.0	109	41.3	167	40.6	219	49.3	91	46.9	97	49.5	77	54.6	34	47.2	11	31.4		
	45-<50	680	42.1	62	70.5	109	54.5	97	46.2	123	46.6	177	43.1	112	25.2	72	37.1	59	30.1	33	23.4	14	19.4	6	17.1		
	50-<55	101	6.2	7	8.0	18	9.0	25	11.9	19	7.2	20	4.9	12	2.7	6	3.1	7	3.6	3	2.1	2	2.8	0	0		
	55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(再掲)<39.8	159	9.8	0	0	2	1.0	4	1.9	12	4.5	44	10.7	97	21.8	22	11.3	32	16.3	27	19.1	21	29.2	17	48.6		
(再掲) 51.9	37	2.3	2	2.3	5	2.5	9	4.3	8	3.0	10	2.4	3	0.7	3	1.5	2	1.0	1	0.7	0	0	0	0			
総 数	1617	100	88	100	200	100	210	100	264	100	411	100	444	100	194	100	196	100	141	100	72	100	35	100			
女 性	ヘマトクリット(%)																										
	<25	6	0.3	0	0	0	0	3	0.9	1	0.2	0	0	2	0.4	0	0	0	0	0	0	1	1.1	1	1.7		
	25-<30	16	0.7	2	1.7	2	0.5	5	1.4	4	0.9	1	0.2	2	0.4	1	0.4	0	0	0	0	0	0	2	3.3		
	30-<35	134	5.6	3	2.6	29	7.5	36	10.4	9	2.0	9	1.7	48	8.6	3	1.3	12	5.3	15	8.2	12	12.8	9	15.0		
	35-<40	983	41.3	52	44.8	190	48.8	152	44.1	161	36.0	169	32.3	259	46.2	69	29.7	98	43.6	90	49.5	48	51.1	23	38.3		
	40-<45	1103	46.3	53	45.7	151	38.8	139	40.3	236	52.8	305	58.3	219	39.0	144	62.1	99	44.0	68	37.4	29	30.9	23	38.3		
	45-<50	137	5.8	6	5.2	17	4.4	10	2.9	35	7.8	39	7.5	30	5.3	15	6.5	16	7.1	8	4.4	4	4.3	2	3.3		
	50-<55	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0		
	55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(再掲)<33.4	67	2.8	2	1.7	14	3.6	23	6.7	6	1.3	4	0.8	18	3.2	3	1.3	4	1.8	3	1.6	6	6.4	5	8.3		
(再掲) 45.0	139	5.8	6	5.2	17	4.4	10	2.9	36	8.1	39	7.5	31	5.5	15	6.5	16	7.1	9	4.9	4	4.3	2	3.3			
総 数	2381	100	116	100	389	100	345	100	447	100	523	100	561	100	232	100	225	100	182	100	94	100	60	100			

第 34 表 ヘマトクリット値の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		ヘマトクリット(%)	標準偏差	ヘマトクリット(%)	標準偏差	ヘマトクリット(%)	標準偏差	ヘマトクリット(%)	標準偏差	ヘマトクリット(%)	標準偏差	ヘマトクリット(%)	標準偏差	ヘマトクリット(%)	標準偏差	ヘマトクリット(%)	標準偏差	ヘマトクリット(%)	標準偏差	ヘマトクリット(%)	標準偏差	ヘマトクリット(%)	標準偏差	ヘマトクリット(%)	標準偏差
性 別																									
男 性	44.5	3.8	46.5	2.4	46.1	2.9	45.7	3.3	45.2	3.4	44.4	3.8	42.6	4.1	43.9	3.8	43.3	3.9	42.7	3.8	41.6	4.3	39.6	4.7	
女 性	40.0	3.4	40.0	3.2	39.5	3.3	39.1	3.8	40.8	3.3	41.0	2.8	39.4	3.5	41.0	2.9	40.0	3.1	39.5	3.3	38.7	3.8	38.3	4.2	

第35表 平均赤血球容積 ( MCV ) の分布 ( 性・年齢階級別 )

		年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	MCV(fl)																										
	-<70	1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-<75	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75-<80	10	0.6	1	1.1	2	1.0	2	1.0	0	0	1	0.2	4	0.9	0	0	3	1.5	0	0	1	1.4	0	0	0	0
	80-<85	26	1.6	4	4.5	5	2.5	5	2.4	4	1.5	3	0.7	5	1.1	2	1.0	2	1.0	2	1.4	1	1.4	0	0	0	0
	85-<90	189	11.7	26	29.5	44	22.0	27	12.9	30	11.4	35	8.5	27	6.1	14	7.2	10	5.1	9	6.4	7	9.7	1	2.9		
	90-<95	627	38.8	43	48.9	98	49.0	99	47.1	105	39.8	157	38.2	125	28.2	71	36.6	65	33.2	36	25.5	14	19.4	10	28.6		
	95-<100	515	31.8	13	14.8	43	21.5	48	22.9	92	34.8	142	34.5	177	39.9	67	34.5	66	33.7	62	44.0	34	47.2	15	42.9		
	100-<105	201	12.4	1	1.1	8	4.0	24	11.4	25	9.5	52	12.7	91	20.5	30	15.5	41	20.9	28	19.9	15	20.8	7	20.0		
	105-<110	37	2.3	0	0	0	0	5	2.4	5	1.9	13	3.2	14	3.2	5	2.6	8	4.1	4	2.8	0	0	2	5.7		
	110-<115	9	0.6	0	0	0	0	0	0	2	0.8	6	1.5	1	0.2	4	2.1	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
	120-	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数		1617	100	88	100	200	100	210	100	264	100	411	100	444	100	194	100	196	100	141	100	72	100	35	100		
性別 女性	MCV(fl)																										
	-<70	18	0.8	0	0	3	0.8	12	3.5	2	0.4	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-<75	21	0.9	0	0	6	1.5	13	3.8	1	0.2	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75-<80	36	1.5	1	0.9	15	3.9	13	3.8	3	0.7	2	0.4	2	0.4	1	0.4	0	0	2	1.1	0	0	0	0	0	0
	80-<85	93	3.9	10	8.6	26	6.7	27	7.8	17	3.8	4	0.8	9	1.6	2	0.9	4	1.8	3	1.6	2	2.1	0	0	0	0
	85-<90	452	19.0	37	31.9	100	25.7	89	25.8	91	20.4	76	14.5	59	10.5	23	9.9	28	12.4	16	8.8	7	7.4	8	13.3		
	90-<95	1004	42.2	51	44.0	166	42.7	112	32.5	209	46.8	239	45.7	227	40.5	107	46.1	97	43.1	72	39.6	39	41.5	19	31.7		
	95-<100	595	25.0	15	12.9	60	15.4	59	17.1	106	23.7	167	31.9	188	33.5	84	36.2	73	32.4	67	36.8	25	26.6	23	38.3		
	100-<105	139	5.8	2	1.7	11	2.8	16	4.6	16	3.6	29	5.5	65	11.6	11	4.7	22	9.8	18	9.9	18	19.1	7	11.7		
	105-<110	20	0.8	0	0	2	0.5	3	0.9	2	0.4	3	0.6	10	1.8	2	0.9	1	0.4	4	2.2	3	3.2	2	3.3		
	110-<115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	115-<120	3	0.1	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.7
120-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総数		2381	100	116	100	389	100	345	100	447	100	523	100	561	100	232	100	225	100	182	100	94	100	60	100		

第35表 平均赤血球容積 ( MCV ) の平均値及び標準偏差 ( 性・年齢階級別 )

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)		MCV(fl)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別 男性		94.9	5.2	91.4	4.0	92.3	4.4	94.2	5.0	94.8	5.1	95.7	5.4	96.4	5.0	95.8	5.5	96.3	5.2	96.3	4.8	96.3	5.0	97.2	4.3
性別 女性		92.5	5.8	90.7	4.3	90.5	6.0	89.8	8.1	92.5	4.9	93.8	4.4	94.9	4.6	94.3	4.5	94.5	4.3	94.7	4.5	95.5	4.9	95.8	5.2

第 36 表 平均赤血球血色素量 (MCH) の分布 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	MCH(pg)																										
	<20	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.4	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-<25	8	0.5	1	1.1	1	0.5	1	0.5	0	0	1	0.2	4	0.9	1	0.5	2	1.0	1	0.7	1	1.4	0	0	0	0
	25-<29	24	1.5	1	1.1	2	1.0	2	1.0	4	1.5	6	1.5	9	2.0	3	1.5	5	2.6	1	0.7	3	4.2	0	0	0	0
	27-<29	92	5.7	14	15.9	18	9.0	8	3.8	11	4.2	23	5.6	18	4.1	16	8.2	5	2.6	8	5.7	4	5.6	1	2.9	0	0
	29-<31	589	36.4	45	51.1	101	50.5	88	41.9	96	36.4	140	34.1	119	26.8	62	32.0	50	25.5	36	25.5	22	30.6	11	31.4	0	0
	31-<33	694	42.9	24	27.3	70	35.0	90	42.9	110	41.7	179	43.6	221	49.8	84	43.3	104	53.1	67	47.5	34	47.2	16	45.7	0	0
	33-<35	176	10.9	3	3.4	8	4.0	19	9.0	34	12.9	46	11.2	66	14.9	19	9.8	26	13.3	26	18.4	7	9.7	7	20.0	0	0
	35-<40	31	1.9	0	0	0	0	2	1.0	8	3.0	14	3.4	7	1.6	8	4.1	4	2.0	2	1.4	1	1.4	0	0	0	0
	40-	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数		1617	100	88	100	200	100	210	100	264	100	411	100	444	100	194	100	196	100	141	100	72	100	35	100	0	0
性別 女性	MCH(pg)																										
	<20	17	0.7	0	0	3	0.8	10	2.9	2	0.4	2	0.4	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-<25	68	2.9	1	0.9	26	6.7	31	9.0	5	1.1	2	0.4	3	0.5	1	0.4	1	0.4	1	0.5	1	1.1	0	0	0	0
	25-<29	94	3.9	5	4.3	24	6.2	29	8.4	17	3.8	9	1.7	10	1.8	3	1.3	3	1.3	3	1.6	2	2.1	2	3.3	0	0
	27-<29	407	17.1	36	31.0	91	23.4	78	22.6	76	17.0	60	11.5	66	11.8	20	8.6	27	12.0	21	11.5	10	10.6	8	13.3	0	0
	29-<31	1239	52.0	59	50.9	187	48.1	130	37.7	257	57.5	308	58.9	298	53.1	138	59.5	124	55.1	97	53.3	47	50.0	30	50.0	0	0
	31-<33	505	21.2	15	12.9	55	14.1	57	16.5	85	19.0	134	25.6	159	28.3	64	27.6	60	26.7	52	28.6	30	31.9	17	28.3	0	0
	33-<35	47	2.0	0	0	3	0.8	9	2.6	4	0.9	8	1.5	23	4.1	5	2.2	10	4.4	7	3.8	4	4.3	2	3.3	0	0
	35-<40	3	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	2	0.4	0	0	0	0	1	0.5	0	0	1	1.7	0	0
	40-	1	0.0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総数		2381	100	116	100	389	100	345	100	447	100	523	100	561	100	232	100	225	100	182	100	94	100	60	100	0	0

第 36 表 平均赤血球血色素量 (MCH) の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)		MCH(pg)	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別																									
男性		31.2	1.8	30.3	1.4	30.6	1.5	31.2	1.6	31.3	1.9	31.4	2.0	31.4	1.8	31.3	2.1	31.5	1.9	31.5	1.8	31.2	1.9	31.6	1.4
女性		29.7	2.2	29.4	1.5	29.1	2.4	28.7	3.4	29.8	1.8	30.2	1.6	30.4	1.5	30.3	1.6	30.4	1.4	30.3	1.6	30.5	1.6	30.4	1.7

第 37 表 平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の分布 (性・年齢階級別)

性別	MCHC (%)	年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	<24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-<26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26-<28	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.4	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28-<30	13	0.8	1	1.1	0	0	0	0	3	1.1	4	1.0	5	1.1	3	1.5	3	1.5	1	0.7	1	1.4	0	0	0	0
	30-<32	275	17.0	9	10.2	19	9.5	39	18.6	30	11.4	75	18.2	103	23.2	43	22.2	40	20.4	29	20.6	25	34.7	9	25.7		
	32-<34	1101	68.1	62	70.5	149	74.5	129	61.4	184	69.7	284	69.1	293	66.0	128	66.0	132	67.3	97	68.8	40	55.6	24	68.6		
	34-	226	14.0	16	18.2	32	16.0	42	20.0	46	17.4	47	11.4	43	9.7	19	9.8	21	10.7	14	9.9	6	8.3	2	5.7		
	総数	1617	100	88	100	200	100	210	100	264	100	411	100	444	100	194	100	196	100	141	100	72	100	35	100		
女性	<24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-<26	4	0.2	0	0	1	0.3	2	0.6	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26-<28	11	0.5	0	0	2	0.5	6	1.7	2	0.4	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28-<30	90	3.8	1	0.9	24	6.2	28	8.1	14	3.1	12	2.3	11	2.0	5	2.2	2	0.9	5	2.7	1	1.1	3	5.0		
	30-<32	824	34.6	33	28.4	116	29.8	118	34.2	142	31.8	180	34.4	235	41.9	80	34.5	84	37.3	81	44.5	41	43.6	29	48.3		
	32-<34	1409	59.2	79	68.1	236	60.7	182	52.8	281	62.9	322	61.6	309	55.1	145	62.5	137	60.9	94	51.6	51	54.3	27	45.0		
	34-	43	1.8	3	2.6	10	2.6	9	2.6	8	1.8	7	1.3	6	1.1	1	0.4	2	0.9	2	1.1	1	1.1	1	1.7		
	総数	2381	100	116	100	389	100	345	100	447	100	523	100	561	100	232	100	225	100	182	100	94	100	60	100		

第 37 表 平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	MCHC (%)		MCHC (%)		MCHC (%)		MCHC (%)		MCHC (%)		MCHC (%)		MCHC (%)		MCHC (%)		MCHC (%)		MCHC (%)		MCHC (%)		MCHC (%)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	32.9	1.1	33.2	1.0	33.1	0.9	33.1	1.1	33.1	1.1	32.8	1.1	32.6	1.0	32.7	1.1	32.7	1.1	32.8	1.0	32.4	1.1	32.5	0.9
女性	32.1	1.1	32.5	0.9	32.1	1.3	31.9	1.5	32.2	1.1	32.2	1.0	32.1	0.9	32.1	1.1	32.2	0.9	32.0	0.9	32.0	1.0	31.8	1.0

第 38 表 フェリチンの分布 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	フェリチン(ng/ml)																								
	<-1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1-<5	4	0.2	0	0	1	0.5	0	0	2	0.8	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	
	5-<10	25	1.5	2	2.2	0	0	1	0.5	3	1.1	7	1.7	12	2.7	4	2.1	6	3.0	3	2.1	3	4.1	0	0
	10-<15	31	1.9	0	0	1	0.5	3	1.4	7	2.6	11	2.7	9	2.0	5	2.6	1	0.5	1	0.7	6	8.2	1	2.9
	15-<20	37	2.3	0	0	0	0	0	0	7	2.6	7	1.7	23	5.1	5	2.6	8	4.1	7	4.9	4	5.5	4	11.4
	20-<25	21	1.3	0	0	0	0	0	0	5	1.9	7	1.7	9	2.0	4	2.1	5	2.5	4	2.8	0	0	0	0
	25-<30	25	1.5	1	1.1	1	0.5	5	2.4	1	0.4	5	1.2	12	2.7	3	1.5	6	3.0	5	3.5	0	0	1	2.9
	30-<35	37	2.3	2	2.2	4	2.0	2	1.0	5	1.9	4	1.0	20	4.5	0	0	10	5.1	7	4.9	3	4.1	0	0
	35-<40	31	1.9	0	0	4	2.0	2	1.0	3	1.1	10	2.4	12	2.7	3	1.5	5	2.5	5	3.5	1	1.4	1	2.9
	40-<45	32	2.0	2	2.2	1	0.5	0	0	6	2.3	9	2.2	14	3.1	3	1.5	3	1.5	7	4.9	2	2.7	2	5.7
	45-<50	34	2.1	1	1.1	3	1.5	4	1.9	6	2.3	9	2.2	11	2.5	6	3.1	3	1.5	6	4.2	2	2.7	0	0
	50-<60	70	4.3	6	6.7	2	1.0	17	8.1	13	4.9	15	3.6	17	3.8	4	2.1	6	3.0	5	3.5	1	1.4	5	14.3
	60-<70	76	4.7	4	4.5	14	7.0	6	2.9	13	4.9	19	4.6	20	4.5	13	6.7	6	3.0	8	5.6	4	5.5	2	5.7
	70-<80	89	5.5	5	5.6	16	8.0	13	6.2	13	4.9	17	4.1	25	5.6	10	5.1	14	7.1	5	3.5	4	5.5	2	5.7
	80-<90	73	4.5	5	5.6	10	5.0	11	5.2	8	3.0	18	4.4	21	4.7	9	4.6	6	3.0	5	3.5	10	13.7	0	0
	90-<100	87	5.4	7	7.9	14	7.0	7	3.3	14	5.3	26	6.3	19	4.2	13	6.7	12	6.1	4	2.8	2	2.7	1	2.9
	100-<150	353	21.7	28	31.5	45	22.5	40	19.0	66	24.9	86	20.8	88	19.6	32	16.4	41	20.8	28	19.6	14	19.2	5	14.3
	150-<200	254	15.6	15	16.9	36	18.0	38	18.1	47	17.7	63	15.3	55	12.3	33	16.9	27	13.7	18	12.6	6	8.2	4	11.4
	200- (再掲)<27 (再掲) 320	346	21.3	11	12.4	48	24.0	61	29.0	46	17.4	100	24.2	80	17.9	48	24.6	37	18.8	25	17.5	11	15.1	7	20.0
		122	7.5	3	3.4	2	1.0	6	2.9	24	9.1	33	8.0	54	12.1	18	9.2	21	10.7	15	10.5	13	17.8	5	14.3
		98	6.0	1	1.1	12	6.0	13	6.2	13	4.9	37	9.0	22	4.9	16	8.2	10	5.1	10	7.0	1	1.4	1	2.9
	総数	1625	100	89	100	200	100	210	100	265	100	413	100	448	100	195	100	197	100	143	100	73	100	35	100
性別 女性	フェリチン(ng/ml)																								
	<-1.1	1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1-<5	164	6.9	7	6.0	51	13.1	79	22.7	19	4.2	3	0.6	5	0.9	2	0.9	3	1.3	1	0.5	0	0	1	1.7
	5-<10	184	7.7	21	17.9	56	14.4	66	19.0	13	2.9	9	1.7	19	3.4	2	0.9	6	2.7	4	2.2	4	4.3	5	8.3
	10-<15	145	6.1	16	13.7	38	9.7	44	12.6	8	1.8	12	2.3	27	4.8	6	2.6	9	4.0	7	3.8	5	5.3	6	10.0
	15-<20	133	5.6	9	7.7	52	13.3	21	6.0	10	2.2	16	3.1	25	4.4	3	1.3	8	3.6	9	4.9	4	4.3	4	6.7
	20-<25	142	5.9	16	13.7	52	13.3	18	5.2	7	1.6	18	3.4	31	5.5	9	3.9	13	5.8	10	5.4	5	5.3	3	5.0
	25-<30	137	5.7	10	8.5	34	8.7	22	6.3	17	3.8	23	4.4	31	5.5	10	4.3	16	7.1	8	4.3	4	4.3	3	5.0
	30-<35	119	5.0	13	11.1	18	4.6	22	6.3	18	4.0	20	3.8	28	5.0	14	6.0	8	3.6	10	5.4	6	6.4	4	6.7
	35-<40	106	4.4	7	6.0	17	4.4	11	3.2	20	4.5	24	4.6	27	4.8	12	5.2	12	5.3	7	3.8	8	8.5	0	0
	40-<45	93	3.9	6	5.1	15	3.8	12	3.4	23	5.1	19	3.6	18	3.2	6	2.6	7	3.1	9	4.9	1	1.1	1	1.7
	45-<50	103	4.3	2	1.7	12	3.1	5	1.4	24	5.3	27	5.2	33	5.9	11	4.7	12	5.3	15	8.1	5	5.3	1	1.7
	50-<60	180	7.5	2	1.7	24	6.2	15	4.3	44	9.8	44	8.4	51	9.0	20	8.6	14	6.2	22	11.9	11	11.7	4	6.7
	60-<70	135	5.6	4	3.4	9	2.3	8	2.3	38	8.5	41	7.8	35	6.2	21	9.1	15	6.7	6	3.2	8	8.5	6	10.0
	70-<80	147	6.1	2	1.7	2	0.5	6	1.7	52	11.6	53	10.1	32	5.7	25	10.8	14	6.2	10	5.4	3	3.2	5	8.3
	80-<90	100	4.2	0	0	5	1.3	3	0.9	23	5.1	34	6.5	35	6.2	19	8.2	16	7.1	12	6.5	7	7.4	0	0
	90-<100	88	3.7	0	0	1	0.3	2	0.6	25	5.6	28	5.4	32	5.7	14	6.0	13	5.8	11	5.9	5	5.3	3	5.0
	100-<150	263	11.0	2	1.7	2	0.5	9	2.6	79	17.6	102	19.5	69	12.2	38	16.4	34	15.1	22	11.9	7	7.4	6	10.0
	150-<200	87	3.6	0	0	0	0	2	0.6	24	5.3	26	5.0	35	6.2	9	3.9	13	5.8	13	7.0	6	6.4	3	5.0
	200- (再掲)<3.4 (再掲) 89	64	2.7	0	0	2	0.5	3	0.9	4	0.9	24	4.6	31	5.5	11	4.7	12	5.3	9	4.9	5	5.3	5	8.3
		67	2.8	1	0.9	25	6.4	34	9.8	5	1.1	2	0.4	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		510	21.3	2	1.7	6	1.5	16	4.6	135	30.1	183	35.0	168	29.8	73	31.5	73	32.4	55	29.7	23	24.5	17	28.3
	総数	2391	100	117	100	390	100	348	100	449	100	523	100	564	100	232	100	225	100	185	100	94	100	60	100

第 38 表 フェリチンの平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		フェリチン (ng/ml)	標準 偏差	フェリチン (ng/ml)	標準 偏差	フェリチン (ng/ml)	標準 偏差	フェリチン (ng/ml)	標準 偏差	フェリチン (ng/ml)	標準 偏差	フェリチン (ng/ml)	標準 偏差	フェリチン (ng/ml)	標準 偏差	フェリチン (ng/ml)	標準 偏差	フェリチン (ng/ml)	標準 偏差	フェリチン (ng/ml)	標準 偏差	フェリチン (ng/ml)	標準 偏差	フェリチン (ng/ml)	標準 偏差
性別																									
男性	141.7	110.0	125.1	66.6	149.0	89.3	160.0	108.5	136.2	102.6	154.8	132.3	124.4	104.7	152.5	126.5	131.5	106.6	124.1	111.3	110.0	90.5	116.1	94.1	
女性	59.2	66.5	25.2	20.1	24.9	23.7	26.0	38.6	75.5	92.8	81.0	54.6	77.1	71.0	79.0	52.7	82.2	79.5	77.2	67.8	68.4	53.3	71.5	71.1	

第39表 総たんぱく質値の分布(性・年齢階級別)

性別	総たんぱく質(g/dl)	年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	<6.0	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.0-6.5	22	1.4	0	0	0	0	1	0.5	3	1.1	8	1.9	10	2.2	5	2.6	3	1.5	3	2.1	1	1.4	3	8.6		
	6.5-7.0	204	12.6	4	4.5	14	7.0	23	11.0	36	13.6	52	12.6	75	16.7	21	10.8	30	15.2	23	16.1	14	19.2	8	22.9		
	7.0-7.5	676	41.6	29	32.6	72	36.0	85	40.5	109	41.1	194	47.0	187	41.7	91	46.7	93	47.2	53	37.1	28	38.4	13	37.1		
	7.5-8.0	583	35.9	44	49.4	96	48.0	80	38.1	95	35.8	125	30.3	143	31.9	57	29.2	60	30.5	47	32.9	26	35.6	10	28.6		
	8.0-8.5	118	7.3	11	12.4	14	7.0	19	9.0	20	7.5	26	6.3	28	6.3	17	8.7	9	4.6	15	10.5	3	4.1	1	2.9		
	8.5-	21	1.3	1	1.1	4	2.0	2	1.0	2	0.8	7	1.7	5	1.1	3	1.5	2	1.0	2	1.4	1	1.4	0	0		
	総数	1625	100	89	100	200	100	210	100	265	100	413	100	448	100	195	100	197	100	143	100	73	100	35	100		
女性	<6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.0-6.5	20	0.8	3	2.5	3	0.8	2	0.6	0	0	2	0.4	10	1.8	0	0	2	0.9	4	2.2	1	1.1	3	5.0		
	6.5-7.0	293	12.2	10	8.5	42	10.8	44	12.6	43	9.6	56	10.7	98	17.4	24	10.3	31	13.8	34	18.4	22	23.4	11	18.3		
	7.0-7.5	983	41.1	36	30.5	164	42.1	150	43.1	193	43.0	216	41.3	224	39.7	100	43.1	101	44.9	72	38.9	28	29.8	23	38.3		
	7.5-8.0	822	34.4	47	39.8	142	36.4	117	33.6	161	35.9	177	33.8	178	31.6	71	30.6	68	30.2	60	32.4	29	30.9	21	35.0		
	8.0-8.5	242	10.1	21	17.8	34	8.7	32	9.2	45	10.0	62	11.9	48	8.5	31	13.4	22	9.8	12	6.5	12	12.8	2	3.3		
	8.5-	32	1.3	1	0.8	5	1.3	3	0.9	7	1.6	10	1.9	6	1.1	6	2.6	1	0.4	3	1.6	2	2.1	0	0		
	総数	2392	100	118	100	390	100	348	100	449	100	523	100	564	100	232	100	225	100	185	100	94	100	60	100		

第39表 総たんぱく質値の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	7.4	0.4	7.5	0.4	7.5	0.4	7.4	0.4	7.4	0.4	7.4	0.5	7.3	0.4	7.4	0.5	7.3	0.4	7.4	0.5	7.3	0.4	7.2	0.5
女性	7.4	0.5	7.5	0.5	7.4	0.4	7.4	0.4	7.5	0.4	7.5	0.4	7.4	0.5	7.5	0.5	7.4	0.4	7.3	0.5	7.4	0.8	7.3	0.5

第 40 表 アルブミン値の分布（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																								
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数
性別 男性	アルブミン(g/dl)																									
	<3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.0-3.2	3	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.8	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0
	3.2-3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4-3.6	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	1	0.5	1	0.7	0	0	0	0	0
	3.6-3.8	13	0.8	0	0	0	0	2	1.0	1	0.4	4	1.0	6	1.3	2	1.0	1	0.5	1	0.7	2	2.7	2	5.7	
	3.8-4.0	51	3.1	0	0	0	0	2	1.0	3	1.1	17	4.1	29	6.5	9	4.6	9	4.6	7	4.9	6	8.2	7	20.0	
	4.0-4.2	142	8.7	0	0	2	1.0	1	0.5	11	4.2	38	9.2	90	20.1	18	9.2	29	14.7	32	22.4	22	30.1	7	20.0	
	4.2-4.4	315	19.4	2	2.2	10	5.0	19	9.0	46	17.4	96	23.2	142	31.7	55	28.2	68	34.5	42	29.4	20	27.4	12	34.3	
	4.4-4.6	397	24.4	8	9.0	24	12.0	53	25.2	81	30.6	124	30.0	107	23.9	65	33.3	60	30.5	29	20.3	15	20.5	3	8.6	
	4.6-4.8	391	24.1	23	25.8	73	36.5	69	32.9	71	26.8	100	24.2	55	12.3	31	15.9	20	10.2	27	18.9	4	5.5	4	11.4	
	4.8-5.0	215	13.2	35	39.3	55	27.5	47	22.4	35	13.2	30	7.3	13	2.9	13	6.7	7	3.6	4	2.8	2	2.7	0	0	
	5.0-5.2	80	4.9	14	15.7	33	16.5	14	6.7	13	4.9	4	1.0	2	0.4	2	1.0	1	0.5	0	0	1	1.4	0	0	
	5.2- (再掲) 3.5	16	1.0	7	7.9	3	1.5	3	1.4	2	0.8	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1.4	0	0	
	5	0.3	0	0	0	0	0	0	2	0.8	0	0	3	0.7	0	0	2	1.0	1	0.7	0	0	0	0		
	総数	1625	100	89	100	200	100	210	100	265	100	413	100	448	100	195	100	197	100	143	100	73	100	35	100	
性別 女性	アルブミン(g/dl)																									
	<3.0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1.1	0	0	
	3.0-3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2-3.4	3	0.1	0	0	2	0.5	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.4-3.6	5	0.2	2	1.7	1	0.3	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.3	
	3.6-3.8	16	0.7	1	0.8	4	1.0	1	0.3	0	0	2	0.4	8	1.4	1	0.4	2	0.9	3	1.6	2	2.1	1	1.7	
	3.8-4.0	49	2.0	0	0	3	0.8	3	0.9	4	0.9	7	1.3	32	5.7	6	2.6	9	4.0	4	2.2	9	9.6	10	16.7	
	4.0-4.2	225	9.4	6	5.1	15	3.8	23	6.6	38	8.5	48	9.2	95	16.8	28	12.1	37	16.4	31	16.8	17	18.1	10	16.7	
	4.2-4.4	534	22.3	13	11.0	65	16.7	83	23.9	88	19.6	114	21.8	171	30.3	46	19.8	64	28.4	59	31.9	31	33.0	17	28.3	
	4.4-4.6	742	31.0	25	21.2	133	34.1	129	37.1	130	29.0	167	31.9	158	28.0	78	33.6	72	32.0	51	27.6	21	22.3	14	23.3	
	4.6-4.8	592	24.7	36	30.5	119	30.5	85	24.4	133	29.6	146	27.9	73	12.9	55	23.7	28	12.4	30	16.2	11	11.7	4	6.7	
	4.8-5.0	184	7.7	28	23.7	37	9.5	21	6.0	45	10.0	31	5.9	22	3.9	12	5.2	12	5.3	7	3.8	1	1.1	2	3.3	
	5.0-5.2	34	1.4	6	5.1	8	2.1	2	0.6	10	2.2	6	1.1	2	0.4	4	1.7	1	0.4	0	0	1	1.1	0	0	
	5.2- (再掲) 3.5	7	0.3	1	0.8	3	0.8	1	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	0.4	2	1.7	3	0.8	0	0	0	0	1	0.2	3	0.5	1	0.4	0	0	0	0	1	1.1	2	3.3		
	総数	2392	100	118	100	390	100	348	100	449	100	523	100	564	100	232	100	225	100	185	100	94	100	60	100	

第 40 表 アルブミン値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別	アルブミン(g/dl)																								
男性		4.5	0.3	4.8	0.2	4.7	0.2	4.6	0.2	4.5	0.3	4.4	0.3	4.3	0.3	4.4	0.3	4.3	0.3	4.3	0.3	4.2	0.3	4.2	0.3
女性		4.4	0.3	4.6	0.3	4.5	0.3	4.4	0.2	4.5	0.2	4.4	0.2	4.3	0.3	4.4	0.3	4.4	0.2	4.3	0.2	4.3	0.3	4.2	0.3



第41表の1 ヘモグロビンA<sub>1c</sub>の分布(性・年齢階級別)

性別	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	-3.9	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	1	0.1	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	8	0.5	3	3.4	1	0.5	1	0.5	0	0	2	0.5	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	4.4-4.5	27	1.7	8	9.1	7	3.5	4	1.9	6	2.3	2	0.5	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.6-4.7	98	6.1	6	6.8	24	12.0	20	9.5	14	5.3	18	4.4	16	3.6	14	7.2	3	1.5	10	7.0	2	2.8	1	2.9
	4.8-4.9	204	12.6	26	29.5	42	21.0	43	20.5	32	12.1	29	7.1	32	7.2	10	5.2	9	4.6	15	10.6	5	6.9	3	8.6
	5.0-5.1	318	19.6	26	29.5	59	29.5	53	25.2	49	18.6	64	15.6	67	15.0	26	13.4	37	18.8	13	9.2	10	13.9	7	20.0
	5.2	149	9.2	7	8.0	19	9.5	12	5.7	25	9.5	46	11.2	40	9.0	15	7.7	23	11.7	10	7.0	4	5.6	3	8.6
	5.3	139	8.6	7	8.0	19	9.5	18	8.6	22	8.3	38	9.2	35	7.8	19	9.8	16	8.1	14	9.9	3	4.2	2	5.7
	5.4	121	7.5	2	2.3	8	4.0	12	5.7	25	9.5	30	7.3	44	9.9	14	7.2	22	11.2	7	4.9	12	16.7	3	8.6
	5.5	93	5.7	1	1.1	9	4.5	10	4.8	16	6.1	22	5.4	35	7.8	5	2.6	12	6.1	14	9.9	5	6.9	4	11.4
	5.6	82	5.1	0	0	3	1.5	12	5.7	20	7.6	21	5.1	26	5.8	14	7.2	9	4.6	8	5.6	5	6.9	4	11.4
	5.7	68	4.2	0	0	1	0.5	7	3.3	8	3.0	27	6.6	25	5.6	17	8.8	8	4.1	11	7.7	5	6.9	1	2.9
	5.8	32	2.0	0	0	0	0	1	0.5	6	2.3	9	2.2	16	3.6	4	2.1	9	4.6	4	2.8	3	4.2	0	0
	5.9	38	2.3	0	0	1	0.5	2	1.0	6	2.3	11	2.7	18	4.0	4	2.1	6	3.0	5	3.5	4	5.6	3	8.6
	6.0	26	1.6	0	0	1	0.5	1	0.5	7	2.7	12	2.9	5	1.1	4	2.1	2	1.0	2	1.4	1	1.4	0	0
	6.1	27	1.7	0	0	0	0	2	1.0	8	3.0	6	1.5	11	2.5	4	2.1	4	2.0	3	2.1	3	4.2	1	2.9
	6.2-6.3	39	2.4	0	0	1	0.5	1	0.5	3	1.1	14	3.4	20	4.5	9	4.6	8	4.1	7	4.9	4	5.6	1	2.9
	6.4-6.5	29	1.8	0	0	0	0	1	0.5	4	1.5	13	3.2	11	2.5	5	2.6	6	3.0	4	2.8	1	1.4	0	0
	6.6-6.7	29	1.8	0	0	1	0.5	1	0.5	4	1.5	11	2.7	12	2.7	5	2.6	3	1.5	6	4.2	2	2.8	1	2.9
	6.8-6.9	13	0.8	1	1.1	0	0	1	0.5	0	0	5	1.2	6	1.3	2	1.0	3	1.5	3	2.1	0	0	0	0
	7.0-7.1	14	0.9	0	0	0	0	1	0.5	1	0.4	7	1.7	5	1.1	3	1.5	4	2.0	0	0	1	1.4	0	0
	7.2-7.3	13	0.8	0	0	0	0	1	0.5	2	0.8	5	1.2	5	1.1	3	1.5	3	1.5	1	0.7	1	1.4	0	0
	7.4-7.5	10	0.6	0	0	0	0	1	0.5	2	0.8	3	0.7	4	0.9	3	1.5	3	1.5	0	0	0	0	1	2.9
	7.6-7.7	7	0.4	0	0	1	0.5	0	0	0	0	5	1.2	1	0.2	4	2.1	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	7.8-7.9	3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	2	0.4	1	0.5	1	0.5	1	0.7	0	0	0	0
	8.0-8.1	6	0.4	0	0	0	0	2	1.0	0	0	2	0.5	2	0.4	2	1.0	2	1.0	0	0	0	0	0	0
	8.2-8.3	7	0.4	0	0	0	0	1	0.5	2	0.8	2	0.5	2	0.4	1	0.5	0	0	2	1.4	0	0	0	0
	8.4-8.5	3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	2	0.4	1	0.5	1	0.5	0	0	1	1.4	0	0
	8.6-8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.8-8.9	5	0.3	0	0	0	0	2	1.0	0	0	2	0.5	1	0.2	1	0.5	0	0	1	0.7	0	0	0	0
	9.0-	9	0.6	0	0	3	1.5	0	0	2	0.8	3	0.7	1	0.2	3	1.5	0	0	1	0.7	0	0	0	0
	総数	1619	100	88	100	200	100	210	100	264	100	411	100	446	100	194	100	197	100	142	100	72	100	35	100

		年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)																										
	-3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	2	0.1	0	0	0	0	2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	7	0.3	0	0	5	1.3	1	0.3	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4-4.5	47	2.0	4	3.4	18	4.6	13	3.7	6	1.3	3	0.6	3	0.5	1	0.4	2	0.9	0	0	0	0	0	0	1	1.7
	4.6-4.7	128	5.4	17	14.7	48	12.3	24	6.9	18	4.0	12	2.3	9	1.6	6	2.6	6	2.7	2	1.1	1	1.1	1	1.1	0	0
	4.8-4.9	301	12.6	29	25.0	95	24.4	54	15.6	41	9.2	38	7.3	44	7.8	13	5.6	17	7.6	11	6.0	12	12.8	4	6.7		
	5.0-5.1	448	18.8	35	30.2	95	24.4	76	21.9	83	18.6	82	15.7	77	13.7	31	13.4	30	13.3	23	12.6	17	18.1	7	11.7		
	5.2	273	11.5	15	12.9	43	11.1	42	12.1	50	11.2	63	12.0	60	10.7	27	11.6	21	9.3	24	13.1	8	8.5	7	11.7		
	5.3	247	10.4	9	7.8	27	6.9	44	12.7	52	11.6	54	10.3	61	10.9	25	10.8	28	12.4	19	10.4	7	7.4	7	11.7		
	5.4	230	9.6	5	4.3	25	6.4	28	8.1	52	11.6	57	10.9	63	11.2	24	10.3	25	11.1	32	17.5	4	4.3	2	3.3		
	5.5	151	6.3	1	0.9	10	2.6	17	4.9	27	6.0	47	9.0	49	8.7	21	9.1	24	10.7	15	8.2	7	7.4	3	5.0		
	5.6	142	6.0	1	0.9	12	3.1	11	3.2	31	6.9	39	7.5	48	8.5	13	5.6	16	7.1	16	8.7	8	8.5	8	13.3		
	5.7	112	4.7	0	0	4	1.0	10	2.9	27	6.0	27	5.2	44	7.8	15	6.5	14	6.2	14	7.7	9	9.6	7	11.7		
	5.8	51	2.1	0	0	1	0.3	6	1.7	15	3.4	12	2.3	17	3.0	5	2.2	7	3.1	4	2.2	3	3.2	3	5.0		
	5.9	51	2.1	0	0	2	0.5	7	2.0	12	2.7	9	1.7	21	3.7	6	2.6	7	3.1	4	2.2	7	7.4	3	5.0		
	6.0	40	1.7	0	0	3	0.8	2	0.6	11	2.5	15	2.9	9	1.6	9	3.9	7	3.1	1	0.5	0	0	1	1.7		
	6.1	24	1.0	0	0	0	0	3	0.9	2	0.4	8	1.5	11	2.0	6	2.6	4	1.8	4	2.2	2	2.1	1	1.7		
	6.2-6.3	14	0.6	0	0	0	0	1	0.3	2	0.4	8	1.5	3	0.5	4	1.7	0	0	1	0.5	1	1.1	1	1.7		
	6.4-6.5	23	1.0	0	0	0	0	2	0.6	3	0.7	11	2.1	7	1.2	9	3.9	6	2.7	0	0	1	1.1	0	0		
	6.6-6.7	11	0.5	0	0	0	0	0	0	3	0.7	2	0.4	6	1.1	1	0.4	1	0.4	2	1.1	1	1.1	2	3.3		
	6.8-6.9	17	0.7	0	0	0	0	0	0	1	0.2	10	1.9	6	1.1	5	2.2	3	1.3	1	0.5	0	0	2	3.3		
	7.0-7.1	14	0.6	0	0	0	0	0	0	2	0.4	7	1.3	5	0.9	1	0.4	2	0.9	1	0.5	2	2.1	0	0		
	7.2-7.3	9	0.4	0	0	0	0	2	0.6	0	0	1	0.2	6	1.1	0	0	0	0	4	2.2	1	1.1	1	1.7		
	7.4-7.5	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	0	0	0	1	0.5	1	1.1	0	0		
	7.6-7.7	7	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.2	5	1.0	1	0.2	5	2.2	1	0.4	0	0	0	0	0	0		
7.8-7.9	5	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.6	2	0.4	0	0	1	0.4	1	0.5	0	0	0	0			
8.0-8.1	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0	1	0.5	0	0	0	0			
8.2-8.3	4	0.2	0	0	0	0	0	0	3	0.7	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1.1	0	0			
8.4-8.5	3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	2	0.4	0	0	0	0	2	1.1	0	0	0	0			
8.6-8.7	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.8-8.9	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1.1	0	0			
9.0-	16	0.7	0	0	1	0.3	2	0.6	3	0.7	7	1.3	3	0.5	3	1.3	3	1.3	0	0	0	0	0	0			
総数		2384	100	116	100	389	100	347	100	447	100	523	100	562	100	232	100	225	100	183	100	94	100	60	100		

		年齢(歳)																									
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)																										
	-3.9	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	3	0.1	1	0.5	0	0	2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	15	0.4	3	1.5	6	1.0	2	0.4	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4-4.5	74	1.8	12	5.9	25	4.2	17	3.1	12	1.7	5	0.5	3	0.3	2	0.5	2	0.5	0	0	0	0	0	0	1	1.1
	4.6-4.7	226	5.6	23	11.3	72	12.2	44	7.9	32	4.5	30	3.2	25	2.5	20	4.7	9	2.1	12	3.7	3	1.8	1	1.1		
	4.8-4.9	505	12.6	55	27.0	137	23.3	97	17.4	73	10.3	67	7.2	76	7.5	23	5.4	26	6.2	26	8.0	17	10.2	7	7.4		
	5.0-5.1	766	19.1	61	29.9	154	26.1	129	23.2	132	18.6	146	15.6	144	14.3	57	13.4	67	15.9	36	11.1	27	16.3	14	14.7		
	5.2	422	10.5	22	10.8	62	10.5	54	9.7	75	10.5	109	11.7	100	9.9	42	9.9	44	10.4	34	10.5	12	7.2	10	10.5		
	5.3	386	9.6	16	7.8	46	7.8	62	11.1	74	10.4	92	9.9	96	9.5	44	10.3	44	10.4	33	10.2	10	6.0	9	9.5		
	5.4	351	8.8	7	3.4	33	5.6	40	7.2	77	10.8	87	9.3	107	10.6	38	8.9	47	11.1	39	12.0	16	9.6	5	5.3		
	5.5	244	6.1	2	1.0	19	3.2	27	4.8	43	6.0	69	7.4	84	8.3	26	6.1	36	8.5	29	8.9	12	7.2	7	7.4		
	5.6	224	5.6	1	0.5	15	2.5	23	4.1	51	7.2	60	6.4	74	7.3	27	6.3	25	5.9	24	7.4	13	7.8	12	12.6		
	5.7	180	4.5	0	0	5	0.8	17	3.1	35	4.9	54	5.8	69	6.8	32	7.5	22	5.2	25	7.7	14	8.4	8	8.4		
	5.8	83	2.1	0	0	1	0.2	7	1.3	21	3.0	21	2.2	33	3.3	9	2.1	16	3.8	8	2.5	6	3.6	3	3.2		
	5.9	89	2.2	0	0	3	0.5	9	1.6	18	2.5	20	2.1	39	3.9	10	2.3	13	3.1	9	2.8	11	6.6	6	6.3		
	6.0	66	1.6	0	0	4	0.7	3	0.5	18	2.5	27	2.9	14	1.4	13	3.1	9	2.1	3	0.9	1	0.6	1	1.1		
	6.1	51	1.3	0	0	0	0	5	0.9	10	1.4	14	1.5	22	2.2	10	2.3	8	1.9	7	2.2	5	3.0	2	2.1		
	6.2-6.3	53	1.3	0	0	1	0.2	2	0.4	5	0.7	22	2.4	23	2.3	13	3.1	8	1.9	8	2.5	5	3.0	2	2.1		
	6.4-6.5	52	1.3	0	0	0	0	3	0.5	7	1.0	24	2.6	18	1.8	14	3.3	12	2.8	4	1.2	2	1.2	0	0		
	6.6-6.7	40	1.0	0	0	1	0.2	1	0.2	7	1.0	13	1.4	18	1.8	6	1.4	4	0.9	8	2.5	3	1.8	3	3.2		
	6.8-6.9	30	0.7	1	0.5	0	0	1	0.2	1	0.1	15	1.6	12	1.2	7	1.6	6	1.4	4	1.2	0	0	2	2.1		
	7.0-7.1	28	0.7	0	0	0	0	1	0.2	3	0.4	14	1.5	10	1.0	4	0.9	6	1.4	1	0.3	3	1.8	0	0		
	7.2-7.3	22	0.5	0	0	0	0	3	0.5	2	0.3	6	0.6	11	1.1	3	0.7	3	0.7	5	1.5	2	1.2	1	1.1		
	7.4-7.5	12	0.3	0	0	0	0	1	0.2	2	0.3	3	0.3	6	0.6	3	0.7	3	0.7	1	0.3	1	0.6	1	1.1		
	7.6-7.7	14	0.3	0	0	1	0.2	0	0	1	0.1	10	1.1	2	0.2	9	2.1	2	0.5	0	0	0	0	0	0		
7.8-7.9	8	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.4	4	0.4	1	0.2	2	0.5	2	0.6	0	0	0	0			
8.0-8.1	8	0.2	0	0	0	0	2	0.4	0	0	3	0.3	3	0.3	3	0.7	2	0.5	1	0.3	0	0	0	0			
8.2-8.3	11	0.3	0	0	0	0	1	0.2	5	0.7	2	0.2	3	0.3	1	0.2	0	0	2	0.6	1	0.6	0	0			
8.4-8.5	6	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.2	4	0.4	1	0.2	1	0.2	2	0.6	1	0.6	0	0			
8.6-8.7	2	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.8-8.9	6	0.1	0	0	0	0	2	0.4	0	0	2	0.2	2	0.2	1	0.2	0	0	1	0.3	1	0.6	0	0			
9.0-	25	0.6	0	0	4	0.7	2	0.4	5	0.7	10	1.1	4	0.4	6	1.4	3	0.7	1	0.3	0	0	0	0			
総 数		4003	100	204	100	589	100	557	100	711	100	934	100	1008	100	426	100	422	100	325	100	166	100	95	100		

第 41 表の 1 ヘモグロビン A<sub>1c</sub> の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)		
性 別	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	
男 性	5.4	0.8	4.9	0.3	5.2	1.1	5.3	0.7	5.4	0.7	5.6	0.9	5.6	0.7	5.8	1.1	5.6	0.7	5.6	0.8	5.6	0.6	5.5	0.5	
女 性	5.4	0.7	5.0	0.2	5.0	0.4	5.2	0.6	5.4	0.8	5.5	0.8	5.5	0.7	5.6	0.8	5.5	0.9	5.5	0.6	5.5	0.7	5.5	0.5	
総 数	5.4	0.8	5.0	0.3	5.1	0.7	5.2	0.6	5.4	0.7	5.6	0.8	5.6	0.7	5.7	0.9	5.6	0.8	5.6	0.7	5.6	0.7	5.5	0.5	

第 41 表の 2 ヘモグロビン A<sub>1c</sub> の分布 (性・年齢階級別)

性別	ヘモグロビン A <sub>1c</sub> (%)	年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	-3.9	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	1	0.1	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	8	0.5	3	3.4	1	0.5	1	0.5	0	0	2	0.6	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	4.4-4.5	27	1.8	8	9.2	7	3.5	4	2.0	6	2.4	2	0.6	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.6-4.7	98	6.5	6	6.9	24	12.1	20	9.9	14	5.5	18	5.0	16	4.1	14	8.4	3	1.8	10	8.0	2	3.0	1	2.9
	4.8-4.9	204	13.6	26	29.9	42	21.2	43	21.3	32	12.5	29	8.1	32	8.1	10	6.0	9	5.3	15	12.0	5	7.5	3	8.8
	5.0-5.1	317	21.2	26	29.9	59	29.8	52	25.7	49	19.2	64	17.8	67	17.0	26	15.7	37	21.9	13	10.4	10	14.9	7	20.6
	5.2	148	9.9	7	8.0	19	9.6	12	5.9	24	9.4	46	12.8	40	10.1	15	9.0	23	13.6	10	8.0	4	6.0	3	8.8
	5.3	139	9.3	7	8.0	19	9.6	18	8.9	22	8.6	38	10.6	35	8.9	19	11.4	16	9.5	14	11.2	3	4.5	2	5.9
	5.4	119	7.9	2	2.3	8	4.0	12	5.9	25	9.8	30	8.3	42	10.6	14	8.4	20	11.8	7	5.6	12	17.9	3	8.8
	5.5	90	6.0	1	1.1	9	4.5	10	5.0	16	6.3	22	6.1	32	8.1	5	3.0	10	5.9	13	10.4	5	7.5	4	11.8
	5.6	81	5.4	0	0	3	1.5	12	5.9	20	7.8	20	5.6	26	6.6	13	7.8	9	5.3	8	6.4	5	7.5	4	11.8
	5.7	66	4.4	0	0	1	0.5	7	3.5	8	3.1	25	6.9	25	6.3	16	9.6	8	4.7	11	8.8	5	7.5	1	2.9
	5.8	28	1.9	0	0	0	0	1	0.5	5	2.0	7	1.9	15	3.8	4	2.4	9	5.3	3	2.4	3	4.5	0	0
	5.9	32	2.1	0	0	1	0.5	2	1.0	6	2.4	10	2.8	13	3.3	3	1.8	4	2.4	2	1.6	4	6.0	3	8.8
	6.0	24	1.6	0	0	1	0.5	1	0.5	6	2.4	12	3.3	4	1.0	4	2.4	2	1.2	2	1.6	0	0	0	0
	6.1	21	1.4	0	0	0	0	2	1.0	7	2.7	4	1.1	8	2.0	3	1.8	4	2.4	2	1.6	1	1.5	1	2.9
	6.2-6.3	27	1.8	0	0	1	0.5	1	0.5	3	1.2	8	2.2	14	3.5	4	2.4	6	3.6	4	3.2	3	4.5	1	2.9
	6.4-6.5	15	1.0	0	0	0	0	1	0.5	2	0.8	7	1.9	5	1.3	3	1.8	2	1.2	2	1.6	1	1.5	0	0
	6.6-6.7	16	1.1	0	0	1	0.5	0	0	3	1.2	5	1.4	7	1.8	4	2.4	2	1.2	3	2.4	1	1.5	1	2.9
	6.8-6.9	4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	3	0.8	0	0	1	0.6	2	1.6	0	0	0	0
	7.0-7.1	6	0.4	0	0	0	0	1	0.5	1	0.4	3	0.8	1	0.3	3	1.8	0	0	0	0	1	1.5	0	0
	7.2-7.3	5	0.3	0	0	0	0	0	0	2	0.8	1	0.3	2	0.5	0	0	0	0	1	0.8	1	1.5	0	0
	7.4-7.5	2	0.1	0	0	0	0	1	0.5	0	0	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.6-7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.8-7.9	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	8.0-8.1	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	1	0.6	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	8.2-8.3	4	0.3	0	0	0	0	1	0.5	2	0.8	0	0	1	0.3	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0
	8.4-8.5	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	1	0.6	0	0	0	0	1	1.5	0	0
	8.6-8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.8-8.9	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0
	9.0-	7	0.5	0	0	2	1.0	0	0	2	0.8	2	0.6	1	0.3	2	1.2	0	0	1	0.8	0	0	0	0
	総数	1497	100	87	100	198	100	202	100	255	100	360	100	395	100	166	100	169	100	125	100	67	100	34	100

注) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外

		年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	ヘモグロビンA1c(%)																										
	-3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.0-4.1	2	0.1	0	0	0	0	2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	7	0.3	0	0	5	1.3	1	0.3	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4-4.5	47	2.0	4	3.4	18	4.6	13	3.8	6	1.4	3	0.6	3	0.6	1	0.5	2	0.9	0	0	0	0	0	0	1	1.8
	4.6-4.7	128	5.6	17	14.7	48	12.3	24	7.0	18	4.1	12	2.5	9	1.7	6	2.9	6	2.8	2	1.2	1	1.1	1	1.1	0	0
	4.8-4.9	301	13.1	29	25.0	95	24.4	54	15.7	41	9.3	38	7.8	44	8.3	13	6.2	17	8.0	11	6.4	12	13.8	4	7.0	4	7.0
	5.0-5.1	446	19.4	35	30.2	95	24.4	76	22.2	83	18.8	81	16.7	76	14.4	31	14.8	29	13.6	23	13.4	17	19.5	7	12.3	7	12.3
	5.2	272	11.8	15	12.9	43	11.1	42	12.2	50	11.3	62	12.8	60	11.3	27	12.9	21	9.9	24	14.0	8	9.2	7	12.3	7	12.3
	5.3	247	10.7	9	7.8	27	6.9	44	12.8	52	11.8	54	11.1	61	11.5	25	11.9	28	13.1	19	11.0	7	8.0	7	12.3	7	12.3
	5.4	227	9.9	5	4.3	25	6.4	28	8.2	51	11.6	57	11.8	61	11.5	24	11.4	25	11.7	31	18.0	3	3.4	2	3.5	2	3.5
	5.5	149	6.5	1	0.9	10	2.6	17	5.0	27	6.1	47	9.7	47	8.9	21	10.0	23	10.8	14	8.1	7	8.0	3	5.3	3	5.3
	5.6	142	6.2	1	0.9	12	3.1	11	3.2	31	7.0	39	8.0	48	9.1	13	6.2	16	7.5	16	9.3	8	9.2	8	14.0	8	14.0
	5.7	110	4.8	0	0	4	1.0	10	2.9	27	6.1	26	5.4	43	8.1	14	6.7	13	6.1	14	8.1	9	10.3	7	12.3	7	12.3
	5.8	50	2.2	0	0	1	0.3	6	1.7	15	3.4	12	2.5	16	3.0	5	2.4	7	3.3	4	2.3	3	3.4	2	3.5	2	3.5
	5.9	45	2.0	0	0	2	0.5	6	1.7	12	2.7	7	1.4	18	3.4	5	2.4	6	2.8	3	1.7	6	6.9	3	5.3	3	5.3
	6.0	37	1.6	0	0	3	0.8	2	0.6	10	2.3	14	2.9	8	1.5	8	3.8	6	2.8	1	0.6	0	0	1	1.8	1	1.8
	6.1	21	0.9	0	0	0	0	2	0.6	2	0.5	7	1.4	10	1.9	6	2.9	3	1.4	4	2.3	2	2.3	1	1.8	1	1.8
	6.2-6.3	12	0.5	0	0	0	0	1	0.3	2	0.5	8	1.6	1	0.2	4	1.9	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	6.4-6.5	17	0.7	0	0	0	0	2	0.6	3	0.7	7	1.4	5	0.9	5	2.4	4	1.9	0	0	1	1.1	0	0	0	0
	6.6-6.7	7	0.3	0	0	0	0	0	0	3	0.7	0	0	4	0.8	0	0	1	0.5	1	0.6	1	1.1	1	1.8	1	1.8
	6.8-6.9	9	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.2	2	0.4	6	1.1	1	0.5	3	1.4	1	0.6	0	0	2	3.5	2	3.5
	7.0-7.1	4	0.2	0	0	0	0	0	0	1	0.2	2	0.4	1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1.1	0	0	0	0
	7.2-7.3	7	0.3	0	0	0	0	2	0.6	0	0	1	0.2	4	0.8	0	0	0	0	2	1.2	1	1.1	1	1.8	1	1.8
	7.4-7.5	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0
	7.6-7.7	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.8-7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.0-8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2-8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.4-8.5	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.6-8.7	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.8-8.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.0-	10	0.4	0	0	1	0.3	0	0	3	0.7	4	0.8	2	0.4	0	0	2	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総数	2303	100	116	100	389	100	343	100	441	100	485	100	529	100	210	100	213	100	172	100	87	100	57	100	57	100

注) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外

		年齢(歳)																													
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
総数	ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)																														
	-3.9	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.0-4.1	3	0.1	1	0.5	0	0	2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2-4.3	15	0.4	3	1.5	6	1.0	2	0.4	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4-4.5	74	1.9	12	5.9	25	4.3	17	3.1	12	1.7	5	0.6	3	0.3	2	0.5	2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1		
	4.6-4.7	226	5.9	23	11.3	72	12.3	44	8.1	32	4.6	30	3.6	25	2.7	20	5.3	9	2.4	12	4.0	3	1.9	1	1.1	1	1.1				
	4.8-4.9	505	13.3	55	27.1	137	23.3	97	17.8	73	10.5	67	7.9	76	8.2	23	6.1	26	6.8	26	8.8	17	11.0	7	7.7						
	5.0-5.1	763	20.1	61	30.0	154	26.2	128	23.5	132	19.0	145	17.2	143	15.5	57	15.2	66	17.3	36	12.1	27	17.5	14	15.4						
	5.2	420	11.1	22	10.8	62	10.6	54	9.9	74	10.6	108	12.8	100	10.8	42	11.2	44	11.5	34	11.4	12	7.8	10	11.0						
	5.3	386	10.2	16	7.9	46	7.8	62	11.4	74	10.6	92	10.9	96	10.4	44	11.7	44	11.5	33	11.1	10	6.5	9	9.9						
	5.4	346	9.1	7	3.4	33	5.6	40	7.3	76	10.9	87	10.3	103	11.1	38	10.1	45	11.8	38	12.8	15	9.7	5	5.5						
	5.5	239	6.3	2	1.0	19	3.2	27	5.0	43	6.2	69	8.2	79	8.5	26	6.9	33	8.6	27	9.1	12	7.8	7	7.7						
	5.6	223	5.9	1	0.5	15	2.6	23	4.2	51	7.3	59	7.0	74	8.0	26	6.9	25	6.5	24	8.1	13	8.4	12	13.2						
	5.7	176	4.6	0	0	5	0.9	17	3.1	35	5.0	51	6.0	68	7.4	30	8.0	21	5.5	25	8.4	14	9.1	8	8.8						
	5.8	78	2.1	0	0	1	0.2	7	1.3	20	2.9	19	2.2	31	3.4	9	2.4	16	4.2	7	2.4	6	3.9	2	2.2						
	5.9	77	2.0	0	0	3	0.5	8	1.5	18	2.6	17	2.0	31	3.4	8	2.1	10	2.6	5	1.7	10	6.5	6	6.6						
	6.0	61	1.6	0	0	4	0.7	3	0.6	16	2.3	26	3.1	12	1.3	12	3.2	8	2.1	3	1.0	0	0	1	1.1						
	6.1	42	1.1	0	0	0	0	4	0.7	9	1.3	11	1.3	18	1.9	9	2.4	7	1.8	6	2.0	3	1.9	2	2.2						
	6.2-6.3	39	1.0	0	0	1	0.2	2	0.4	5	0.7	16	1.9	15	1.6	8	2.1	6	1.6	5	1.7	3	1.9	1	1.1						
	6.4-6.5	32	0.8	0	0	0	0	3	0.6	5	0.7	14	1.7	10	1.1	8	2.1	6	1.6	2	0.7	2	1.3	0	0						
	6.6-6.7	23	0.6	0	0	1	0.2	0	0	6	0.9	5	0.6	11	1.2	4	1.1	3	0.8	4	1.3	2	1.3	2	2.2						
	6.8-6.9	13	0.3	0	0	0	0	0	0	1	0.1	3	0.4	9	1.0	1	0.3	4	1.0	3	1.0	0	0	2	2.2						
	7.0-7.1	10	0.3	0	0	0	0	1	0.2	2	0.3	5	0.6	2	0.2	3	0.8	0	0	0	0	2	1.3	0	0						
	7.2-7.3	12	0.3	0	0	0	0	2	0.4	2	0.3	2	0.2	6	0.6	0	0	0	0	3	1.0	2	1.3	1	1.1						
	7.4-7.5	3	0.1	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0	1	0.3	0	0	0	0						
	7.6-7.7	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0	0	1	0.1	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0						
	7.8-7.9	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0						
8.0-8.1	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	1	0.3	1	0.3	0	0	0	0	0	0							
8.2-8.3	4	0.1	0	0	0	0	1	0.2	2	0.3	0	0	1	0.1	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0							
8.4-8.5	3	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.2	1	0.1	1	0.3	0	0	0	0	1	0.6	0	0							
8.6-8.7	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0							
8.8-8.9	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0							
9.0-	17	0.4	0	0	3	0.5	0	0	5	0.7	6	0.7	3	0.3	2	0.5	2	0.5	1	0.3	0	0	0	0							
総数	3800	100	203	100	587	100	545	100	696	100	845	100	924	100	376	100	382	100	297	100	154	100	91	100							

注) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外

第41表の2 ヘモグロビンA<sub>1c</sub>の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)		ヘモグロビンA <sub>1c</sub> (%)			
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差		
性別																									
男性		5.3	0.7	4.9	0.3	5.1	1.0	5.2	0.5	5.4	0.7	5.4	0.7	5.5	0.6	5.5	0.8	5.4	0.5	5.5	0.7	5.5	0.6	5.4	0.4
女性		5.3	0.6	5.0	0.2	5.0	0.4	5.2	0.4	5.4	0.7	5.4	0.6	5.4	0.6	5.4	0.5	5.5	0.8	5.4	0.4	5.4	0.5	5.5	0.5
総数		5.3	0.6	5.0	0.3	5.1	0.7	5.2	0.4	5.4	0.7	5.4	0.6	5.5	0.6	5.5	0.6	5.4	0.7	5.4	0.6	5.5	0.6	5.5	0.5

注) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外

第42表の1 血糖値の分布（食後3時間以上，性・年齢階級別）

性別	血糖値(mg/dl)	年齢(歳)																									
		総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		(再掲) 65~69歳		(再掲) 70~74歳		(再掲) 75~79歳		(再掲) 80~84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	~<40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40~<59	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60~<79	40	3.3	4	6.6	9	5.7	11	7.2	7	3.3	4	1.3	5	1.5	3	2.0	3	2.0	0	0.0	1	2.1	1	3.6		
	80~<99	664	54.0	49	80.3	116	73.9	103	67.3	133	63.0	138	44.2	125	37.2	64	43.0	60	39.5	42	38.9	15	31.3	8	28.6		
	100~<119	325	26.4	8	13.1	24	15.3	28	18.3	50	23.7	97	31.1	118	35.1	43	28.9	50	32.9	40	37.0	15	31.3	13	46.4		
	120~<140	94	7.6	0	0.0	5	3.2	5	3.3	12	5.7	35	11.2	37	11.0	12	8.1	15	9.9	11	10.2	7	14.6	4	14.3		
	140~<160	45	3.7	0	0.0	1	0.6	1	0.7	4	1.9	15	4.8	24	7.1	9	6.0	11	7.2	7	6.5	5	10.4	1	3.6		
	160~<180	18	1.5	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	0.9	6	1.9	8	2.4	4	2.7	3	2.0	4	3.7	0	0.0	1	3.6		
	180~<200	13	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	5	1.6	7	2.1	3	2.0	5	3.3	2	1.9	0	0.0	0	0.0		
	200~<220	10	0.8	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	5	1.6	3	0.9	5	3.4	1	0.7	1	0.9	1	2.1	0	0.0		
	220~<240	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	4	1.2	1	0.7	1	0.7	0	0.0	3	6.3	0	0.0		
	240~<260	3	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0		
	260~	11	0.9	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	0.9	3	1.0	4	1.2	3	2.0	3	2.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0		
	(再掲) ≥110	294	23.9	2	3.3	19	12.1	17	11.1	35	16.6	95	30.4	126	37.5	50	33.6	52	34.2	39	36.1	25	52.1	10	35.7		
	総数	1,230	100.0	61	100.0	157	100.0	153	100.0	211	100.0	312	100.0	336	100.0	149	100.0	152	100.0	108	100.0	48	100.0	28	100.0		
女性	血糖値(mg/dl)																										
	~<40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40~<59	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	60~<79	60	3.5	11	14.1	15	5.7	9	3.6	12	3.7	8	2.0	5	1.2	4	2.2	2	1.3	3	2.1	0	0.0	0	0.0		
	80~<99	921	53.4	55	70.5	203	76.6	189	74.7	185	56.7	150	38.3	139	33.7	52	29.1	56	35.2	47	32.4	20	31.3	16	36.4		
	100~<119	534	30.9	9	11.5	41	15.5	45	17.8	104	31.9	164	41.8	171	41.5	84	46.9	72	45.3	57	39.3	20	31.3	22	50.0		
	120~<140	123	7.1	2	2.6	4	1.5	6	2.4	16	4.9	38	9.7	57	13.8	19	10.6	16	10.1	24	16.6	15	23.4	2	4.5		
	140~<160	40	2.3	1	1.3	0	0.0	2	0.8	3	0.9	11	2.8	23	5.6	7	3.9	8	5.0	8	5.5	4	6.3	3	6.8		
	160~<180	17	1.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	8	2.0	8	1.9	5	2.8	2	1.3	2	1.4	4	6.3	0	0.0		
	180~<200	7	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.6	2	0.5	2	0.5	2	1.1	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0		
	200~<220	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.5	2	0.5	1	0.6	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	2.3		
	220~<240	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	1	0.6	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0		
	240~<260	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	260~	11	0.6	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	0.3	5	1.3	3	0.7	3	1.7	1	0.6	1	0.7	1	1.6	0	0.0		
	(再掲) ≥110	383	22.2	4	5.1	17	6.4	23	9.1	56	17.2	120	30.6	163	39.6	66	36.9	58	36.5	58	40.0	34	53.1	13	29.5		
	総数	1,726	100.0	78	100.0	265	100.0	253	100.0	326	100.0	392	100.0	412	100.0	179	100.0	159	100.0	145	100.0	64	100.0	44	100.0		

第42表の1 血糖値の平均値及び標準偏差（食後3時間以上，性・年齢階級別）

性別	年齢(歳)																							
	総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		(再掲) 65~69歳		(再掲) 70~74歳		(再掲) 75~79歳		(再掲) 80~84歳		(再掲) 85歳以上	
	血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	105.7	30.8	92.0	9.2	96.0	19.1	98.7	27.7	101.1	26.8	110.2	33.0	114.4	35.9	115.3	41.2	114.5	39.8	112.5	30.4	122.0	40.5	108.0	20.3
女性	103.0	26.7	91.3	11.8	93.0	12.1	96.7	27.1	101.1	25.4	109.2	31.7	111.2	27.0	112.0	31.4	108.4	24.4	112.6	28.2	117.5	32.1	107.4	21.8

第42表の2 血糖値の分布（食後3時間以上，性・年齢階級別）

性別	血糖値(mg/dl)	年齢(歳)																											
		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)65～69歳		(再掲)70～74歳		(再掲)75～79歳		(再掲)80～84歳		(再掲)85歳以上					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	～<40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～<59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60～<79	38	3.3	4	6.7	9	5.8	10	6.8	7	3.4	3	1.1	5	1.7	2	1.6	3	2.3	0	0.0	1	2.3	1	3.7	1	3.7		
	80～<99	650	57.0	49	81.7	116	74.4	102	68.9	132	64.1	130	47.4	121	40.9	60	47.2	60	45.8	38	40.4	15	34.1	8	29.6	8	29.6		
	100～<119	308	27.0	7	11.7	24	15.4	27	18.2	47	22.8	92	33.6	111	37.5	39	30.7	48	36.6	36	38.3	14	31.8	13	48.1	13	48.1		
	120～<140	78	6.8	0	0.0	5	3.2	5	3.4	11	5.3	26	9.5	31	10.5	9	7.1	11	8.4	11	11.7	6	13.6	3	11.1	3	11.1		
	140～<160	31	2.7	0	0.0	1	0.6	1	0.7	4	1.9	8	2.9	17	5.7	4	3.1	6	4.6	6	6.4	4	9.1	1	3.7	1	3.7		
	160～<180	10	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.0	5	1.8	2	0.7	4	3.1	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	3.7	1	3.7		
	180～<200	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.7	2	0.7	2	1.6	1	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	200～<220	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	1.5	2	0.7	4	3.1	0	0.0	1	1.1	1	2.3	0	0.0	0	0.0		
	220～<240	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0		
	240～<260	3	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0		
	260～	7	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.0	2	0.7	2	0.7	2	1.6	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	(再掲)≥110	234	20.5	1	1.7	18	11.5	15	10.1	34	16.5	70	25.5	96	32.4	37	29.1	33	25.2	32	34.0	22	50.0	9	33.3	9	33.3		
総数	1,140	100.0	60	100.0	156	100.0	148	100.0	206	100.0	274	100.0	296	100.0	127	100.0	131	100.0	94	100.0	44	100.0	27	100.0	27	100.0			
女性	～<40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～<59	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	60～<79	59	3.5	11	14.1	15	5.7	9	3.6	12	3.7	8	2.2	4	1.0	4	2.5	1	0.7	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	80～<99	911	54.7	55	70.5	203	76.6	189	75.9	183	57.0	145	39.9	136	34.9	50	31.3	54	36.0	46	33.6	20	32.8	16	38.1	16	38.1		
	100～<119	524	31.5	9	11.5	41	15.5	43	17.3	103	32.1	160	44.1	168	43.1	81	50.6	71	47.3	57	41.6	19	31.1	21	50.0	21	50.0		
	120～<140	114	6.8	2	2.6	4	1.5	6	2.4	16	5.0	33	9.1	53	13.6	16	10.0	14	9.3	23	16.8	15	24.6	1	2.4	1	2.4		
	140～<160	33	2.0	1	1.3	0	0.0	2	0.8	3	0.9	8	2.2	19	4.9	4	2.5	7	4.7	6	4.4	3	4.9	3	7.1	3	7.1		
	160～<180	11	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.8	7	1.8	3	1.9	1	0.7	2	1.5	4	6.6	0	0.0	0	0.0		
	180～<200	3	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	200～<220	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4		
	220～<240	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	240～<260	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	260～	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.8	1	0.3	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	(再掲)≥110	340	20.4	4	5.1	17	6.4	21	8.4	53	16.5	99	27.3	146	37.4	51	31.9	53	35.3	51	37.2	31	50.8	11	26.2	11	26.2		
総数	1,666	100.0	78	100.0	265	100.0	249	100.0	321	100.0	363	100.0	390	100.0	160	100.0	150	100.0	137	100.0	61	100.0	42	100.0	42	100.0			

注)インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外

第42表の2 血糖値の平均値及び標準偏差（食後3時間以上，性・年齢階級別）

性別	年齢(歳)																							
	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)65～69歳		(再掲)70～74歳		(再掲)75～79歳		(再掲)80～84歳		(再掲)85歳以上	
	血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)		血糖値(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	102.7	26.1	91.6	8.6	95.3	16.8	97.1	21.7	101.0	27.0	107.1	29.7	108.7	28.0	111.9	37.9	105.6	28.1	108.6	22.2	119.6	39.0	107.1	20.1
女性	101.2	21.5	91.3	11.8	93.0	12.1	94.5	10.8	100.6	24.4	106.0	26.7	109.1	21.3	106.7	21.8	108.1	23.3	108.6	17.8	114.1	22.5	106.9	22.0

注)インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外



第43表の1 総コレステロール値の分布(性・年齢階級別)

性別	総コレステロール(mg/dl)	年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	<120	8	0.5	2	2.2	0	0	0	0	1	0.4	2	0.5	3	0.7	0	0	2	1.0	0	0	0	0	1	2.9
	120-140	51	3.1	9	10.1	4	2.0	0	0	3	1.1	13	3.1	22	4.9	7	3.6	7	3.6	9	6.3	2	2.7	4	11.4
	140-160	131	8.1	9	10.1	17	8.5	6	2.9	17	6.4	37	9.0	45	10.0	23	11.8	18	9.1	16	11.2	9	12.3	2	5.7
	160-180	314	19.3	20	22.5	36	18.0	30	14.3	41	15.5	84	20.3	103	23.0	43	22.1	41	20.8	34	23.8	17	23.3	11	31.4
	180-200	377	23.2	22	24.7	41	20.5	48	22.9	57	21.5	97	23.5	112	25.0	51	26.2	47	23.9	38	26.6	21	28.8	6	17.1
	200-220	349	21.5	19	21.3	49	24.5	56	26.7	63	23.8	76	18.4	86	19.2	31	15.9	46	23.4	23	16.1	11	15.1	6	17.1
	220-240	220	13.5	5	5.6	30	15.0	39	18.6	41	15.5	54	13.1	51	11.4	20	10.3	20	10.2	19	13.3	9	12.3	3	8.6
	240-260	98	6.0	3	3.4	11	5.5	17	8.1	22	8.3	30	7.3	15	3.3	15	7.7	8	4.1	3	2.1	4	5.5	0	0
	260-280	49	3.0	0	0	9	4.5	7	3.3	14	5.3	13	3.1	6	1.3	2	1.0	4	2.0	0	0	0	0	2	5.7
	280-300	18	1.1	0	0	1	0.5	6	2.9	4	1.5	3	0.7	4	0.9	1	0.5	4	2.0	0	0	0	0	0	0
	300-	10	0.6	0	0	2	1.0	1	0.5	2	0.8	4	1.0	1	0.2	2	1.0	0	0	1	0.7	0	0	0	0
総数	1625	100	89	100	200	100	210	100	265	100	413	100	448	100	195	100	197	100	143	100	73	100	35	100	
女性	<120	5	0.2	0	0	1	0.3	0	0	0	0	2	0.4	2	0.4	1	0.4	0	0	0	0	2	2.1	0	0
	120-140	30	1.3	6	5.1	11	2.8	6	1.7	1	0.2	1	0.2	5	0.9	1	0.4	3	1.3	1	0.5	0	0	1	1.7
	140-160	145	6.1	20	16.9	37	9.5	20	5.7	14	3.1	19	3.6	35	6.2	13	5.6	12	5.3	11	5.9	5	5.3	7	11.7
	160-180	349	14.6	37	31.4	98	25.1	58	16.7	42	9.4	45	8.6	69	12.2	23	9.9	26	11.6	17	9.2	16	17.0	10	16.7
	180-200	529	22.1	32	27.1	123	31.5	89	25.6	70	15.6	83	15.9	132	23.4	35	15.1	47	20.9	44	23.8	26	27.7	15	25.0
	200-220	520	21.7	16	13.6	62	15.9	81	23.3	93	20.7	131	25.0	137	24.3	61	26.3	61	27.1	47	25.4	22	23.4	7	11.7
	220-240	405	16.9	4	3.4	33	8.5	52	14.9	112	24.9	110	21.0	94	16.7	39	16.8	42	18.7	33	17.8	10	10.6	9	15.0
	240-260	227	9.5	2	1.7	13	3.3	23	6.6	64	14.3	72	13.8	53	9.4	31	13.4	24	10.7	16	8.6	9	9.6	4	6.7
	260-280	117	4.9	1	0.8	7	1.8	13	3.7	40	8.9	28	5.4	28	5.0	12	5.2	8	3.6	13	7.0	3	3.2	4	6.7
	280-300	45	1.9	0	0	3	0.8	4	1.1	10	2.2	20	3.8	8	1.4	12	5.2	1	0.4	3	1.6	1	1.1	3	5.0
	300-	20	0.8	0	0	2	0.5	2	0.6	3	0.7	12	2.3	1	0.2	4	1.7	1	0.4	0	0	0	0	0	0
総数	2392	100	118	100	390	100	348	100	449	100	523	100	564	100	232	100	225	100	185	100	94	100	60	100	

第43表の1 総コレステロール値の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	197.9	34.4	181.4	31.2	201.0	33.9	209.5	31.0	205.8	35.5	197.2	35.6	190.4	31.8	192.3	33.3	194.1	33.1	187.4	29.8	189.0	28.2	184.9	38.1
女性	206.9	35.0	178.9	25.9	190.1	30.5	202.0	32.6	219.4	33.0	219.0	36.0	206.3	32.7	216.7	38.0	207.5	31.1	209.0	32.4	200.0	32.6	203.0	38.4

第 43 表の 2 総コレステロール値の分布（性・年齢階級別）

性別	総コレステロール(mg/dl)	年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	<120	8	0.5	2	2.2	0	0	0	0	1	0.4	2	0.6	3	0.8	0	0	2	1.2	0	0	0	0	1	3.3
	120-<140	50	3.4	9	10.1	4	2.0	0	0	3	1.2	12	3.3	22	5.8	6	3.6	7	4.1	9	7.6	2	3.4	4	13.3
	140-<160	117	7.9	9	10.1	17	8.6	5	2.5	17	6.8	32	8.9	37	9.8	18	10.8	16	9.4	13	10.9	6	10.2	2	6.7
	160-<180	282	19.1	20	22.5	36	18.3	29	14.5	38	15.1	71	19.8	88	23.2	34	20.4	38	22.2	27	22.7	14	23.7	9	30.0
	180-<200	335	22.7	22	24.7	41	20.8	47	23.5	53	21.1	81	22.6	91	24.0	45	26.9	36	21.1	34	28.6	18	30.5	3	10.0
	200-<220	318	21.6	19	21.3	47	23.9	50	25.0	59	23.5	69	19.2	74	19.5	30	18.0	40	23.4	17	14.3	11	18.6	6	20.0
	220-<240	205	13.9	5	5.6	30	15.2	38	19.0	40	15.9	49	13.6	43	11.3	18	10.8	17	9.9	16	13.4	7	11.9	3	10.0
	240-<260	87	5.9	3	3.4	11	5.6	17	8.5	21	8.4	24	6.7	11	2.9	11	6.6	8	4.7	2	1.7	1	1.7	0	0
	260-<280	46	3.1	0	0	8	4.1	7	3.5	13	5.2	12	3.3	6	1.6	2	1.2	4	2.3	0	0	0	0	2	6.7
	280-<300	17	1.2	0	0	1	0.5	6	3.0	4	1.6	3	0.8	3	0.8	1	0.6	3	1.8	0	0	0	0	0	0
	300-	10	0.7	0	0	2	1.0	1	0.5	2	0.8	4	1.1	1	0.3	2	1.2	0	0	1	0.8	0	0	0	0
総数	1475	100	89	100	197	100	200	100	251	100	359	100	379	100	167	100	171	100	119	100	59	100	30	100	
女性	<120	4	0.2	0	0	1	0.3	0	0	0	0	1	0.2	2	0.5	1	0.6	0	0	0	0	2	2.8	0	0
	120-<140	30	1.4	6	5.1	11	2.8	6	1.8	1	0.3	1	0.2	5	1.2	1	0.6	3	1.8	1	0.7	0	0	1	2.0
	140-<160	128	6.1	20	16.9	37	9.5	20	5.8	12	3.0	14	3.3	25	5.9	8	4.5	8	4.9	8	5.6	3	4.2	6	12.2
	160-<180	316	15.1	37	31.4	97	24.9	58	17.0	38	9.6	32	7.6	54	12.7	16	9.1	21	12.9	13	9.1	12	16.9	8	16.3
	180-<200	455	21.8	32	27.1	123	31.6	87	25.4	57	14.5	61	14.5	95	22.3	24	13.6	30	18.4	35	24.5	18	25.4	12	24.5
	200-<220	443	21.2	16	13.6	62	15.9	81	23.7	84	21.3	101	24.0	99	23.2	42	23.9	42	25.8	36	25.2	16	22.5	5	10.2
	220-<240	353	16.9	4	3.4	33	8.5	51	14.9	95	24.1	95	22.6	75	17.6	35	19.9	33	20.2	27	18.9	8	11.3	7	14.3
	240-<260	196	9.4	2	1.7	13	3.3	23	6.7	58	14.7	59	14.0	41	9.6	24	13.6	18	11.0	11	7.7	8	11.3	4	8.2
	260-<280	105	5.0	1	0.8	7	1.8	11	3.2	38	9.6	26	6.2	22	5.2	10	5.7	6	3.7	10	7.0	3	4.2	3	6.1
	280-<300	42	2.0	0	0	3	0.8	4	1.2	8	2.0	20	4.8	7	1.6	12	6.8	1	0.6	2	1.4	1	1.4	3	6.1
	300-	18	0.9	0	0	2	0.5	1	0.3	3	0.8	11	2.6	1	0.2	3	1.7	1	0.6	0	0	0	0	0	0
総数	2090	100	118	100	389	100	342	100	394	100	421	100	426	100	176	100	163	100	143	100	71	100	49	100	

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用者除外

第 43 表の 2 総コレステロール値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	198.1	34.9	181.4	31.2	200.6	33.7	209.8	31.5	205.8	35.9	197.7	36.5	189.7	32.4	193.4	33.8	193.6	33.9	186.4	30.5	187.1	25.5	185.4	41.1
女性	206.8	35.5	178.9	25.9	190.2	30.5	201.2	31.9	220.0	33.2	222.0	36.3	206.9	33.5	219.8	38.6	208.4	32.2	208.5	32.2	202.4	34.3	203.8	39.7

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用者除外

第44表の1 トリグリセリド値の分布(性・年齢階級別)

性別	トリグリセリド(mg/dl)	年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	-<20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-<50	64	3.9	7	7.9	10	5.0	8	3.8	9	3.4	7	1.7	23	5.1	3	1.5	7	3.6	9	6.3	3	4.1	4	11.4		
	50-<80	269	16.6	22	24.7	30	15.0	28	13.3	43	16.2	55	13.3	91	20.3	29	14.9	35	17.8	37	25.9	12	16.4	7	20.0		
	80-<110	335	20.6	16	18.0	36	18.0	34	16.2	56	21.1	94	22.8	99	22.1	40	20.5	45	22.8	22	15.4	19	26.0	13	37.1		
	110-<140	265	16.3	17	19.1	34	17.0	33	15.7	42	15.8	64	15.5	75	16.7	33	16.9	30	15.2	23	16.1	17	23.3	5	14.3		
	140-<170	221	13.6	12	13.5	25	12.5	33	15.7	29	10.9	60	14.5	62	13.8	29	14.9	30	15.2	18	12.6	11	15.1	3	8.6		
	170-<200	140	8.6	4	4.5	17	8.5	16	7.6	28	10.6	41	9.9	34	7.6	19	9.7	16	8.1	12	8.4	4	5.5	2	5.7		
	200-	331	20.4	11	12.4	48	24.0	58	27.6	58	21.9	92	22.3	64	14.3	42	21.5	34	17.3	22	15.4	7	9.6	1	2.9		
	(再掲)150	613	37.7	23	25.8	82	41.0	97	46.2	106	40.0	165	40.0	140	31.3	73	37.4	68	34.5	48	33.6	18	24.7	6	17.1		
総数	1625	100	89	100	200	100	210	100	265	100	413	100	448	100	195	100	197	100	143	100	73	100	35	100			
女性	-<20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	20-<50	176	7.4	23	19.5	54	13.8	37	10.6	25	5.6	18	3.4	19	3.4	8	3.4	5	2.2	10	5.4	1	1.1	3	5.0		
	50-<80	660	27.6	52	44.1	147	37.7	127	36.5	108	24.1	111	21.2	115	20.4	46	19.8	53	23.6	35	18.9	16	17.0	11	18.3		
	80-<110	581	24.3	24	20.3	91	23.3	71	20.4	110	24.5	131	25.0	154	27.3	59	25.4	57	25.3	52	28.1	27	28.7	18	30.0		
	110-<140	374	15.6	11	9.3	38	9.7	53	15.2	76	16.9	97	18.5	99	17.6	44	19.0	40	17.8	27	14.6	21	22.3	11	18.3		
	140-<170	214	8.9	3	2.5	19	4.9	25	7.2	52	11.6	51	9.8	64	11.3	20	8.6	25	11.1	21	11.4	13	13.8	5	8.3		
	170-<200	134	5.6	2	1.7	17	4.4	16	4.6	25	5.6	29	5.5	45	8.0	12	5.2	20	8.9	15	8.1	5	5.3	5	8.3		
	200-	253	10.6	3	2.5	24	6.2	19	5.5	53	11.8	86	16.4	68	12.1	43	18.5	25	11.1	25	13.5	11	11.7	7	11.7		
	(再掲)150	516	21.6	7	5.9	49	12.6	53	15.2	108	24.1	146	27.9	153	27.1	68	29.3	63	28.0	48	25.9	25	26.6	17	28.3		
総数	2392	100	118	100	390	100	348	100	449	100	523	100	564	100	232	100	225	100	185	100	94	100	60	100			

第44表の1 トリグリセリド値の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
	トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	149.6	103.9	123.7	76.1	169.6	137.8	170.7	136.2	149.3	96.6	157.4	101.7	128.9	70.0	156.8	107.3	136.4	72.0	129.9	77.4	121.4	54.6	98.2	42.5
女性	116.4	74.8	86.0	73.6	95.1	60.2	99.9	57.5	121.5	71.7	135.9	95.6	125.6	66.2	140.2	107.4	124.1	63.9	126.2	70.5	126.7	57.5	128.2	75.0

第 44 表の 2 トリグリセリド値の分布（性・年齢階級別）

性別	トリグリセリド(mg/dl)	年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	-<20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-<50	63	4.3	7	7.9	10	5.1	8	4.0	9	3.6	6	1.7	23	6.1	2	1.2	7	4.1	9	7.6	3	5.1	4	13.3		
	50-<80	249	16.9	22	24.7	30	15.2	28	14.0	43	17.1	48	13.4	78	20.6	28	16.8	33	19.3	31	26.1	9	15.3	5	16.7		
	80-<110	310	21.0	16	18.0	36	18.3	34	17.0	54	21.5	83	23.1	87	23.0	35	21.0	37	21.6	21	17.6	17	28.8	12	40.0		
	110-<140	233	15.8	17	19.1	34	17.3	31	15.5	36	14.3	57	15.9	58	15.3	28	16.8	23	13.5	16	13.4	15	25.4	4	13.3		
	140-<170	201	13.6	12	13.5	25	12.7	29	14.5	27	10.8	55	15.3	53	14.0	26	15.6	28	16.4	14	11.8	8	13.6	3	10.0		
	170-<200	131	8.9	4	4.5	17	8.6	15	7.5	27	10.8	38	10.6	30	7.9	18	10.8	15	8.8	10	8.4	3	5.1	2	6.7		
	200-	288	19.5	11	12.4	45	22.8	55	27.5	55	21.9	72	20.1	50	13.2	30	18.0	28	16.4	18	15.1	4	6.8	0	0		
	(再掲) 150	546	37.0	23	25.8	79	40.1	90	45.0	101	40.2	139	38.7	114	30.1	58	34.7	59	34.5	38	31.9	12	20.3	5	16.7		
総数	1475	100	89	100	197	100	200	100	251	100	359	100	379	100	167	100	171	100	119	100	59	100	30	100			
女性	-<20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-<50	171	8.2	23	19.5	53	13.6	37	10.8	23	5.8	16	3.8	19	4.5	7	4.0	5	3.1	10	7.0	1	1.4	3	6.1		
	50-<80	605	28.9	52	44.1	147	37.8	126	36.8	99	25.1	93	22.1	88	20.7	36	20.5	40	24.5	24	16.8	15	21.1	9	18.4		
	80-<110	517	24.7	24	20.3	91	23.4	71	20.8	100	25.4	112	26.6	119	27.9	47	26.7	38	23.3	45	31.5	22	31.0	14	28.6		
	110-<140	315	15.1	11	9.3	38	9.8	50	14.6	66	16.8	81	19.2	69	16.2	34	19.3	30	18.4	20	14.0	11	15.5	8	16.3		
	140-<170	172	8.2	3	2.5	19	4.9	24	7.0	43	10.9	33	7.8	50	11.7	14	8.0	18	11.0	17	11.9	11	15.5	4	8.2		
	170-<200	103	4.9	2	1.7	17	4.4	15	4.4	18	4.6	23	5.5	28	6.6	10	5.7	11	6.7	10	7.0	3	4.2	4	8.2		
	200-	207	9.9	3	2.5	24	6.2	19	5.6	45	11.4	63	15.0	53	12.4	28	15.9	21	12.9	17	11.9	8	11.3	7	14.3		
	(再掲) 150	409	19.6	7	5.9	49	12.6	51	14.9	88	22.3	103	24.5	111	26.1	45	25.6	43	26.4	34	23.8	19	26.8	15	30.6		
総数	2090	100	118	100	389	100	342	100	394	100	421	100	426	100	176	100	163	100	143	100	71	100	49	100			

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用者除外

第 44 表の 2 トリグリセリド値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)		トリグリセリド(mg/dl)	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	148.5	105.5	123.7	76.1	167.3	137.4	170.7	139.3	149.5	98.8	154.0	100.6	127.1	70.2	149.0	104.2	134.7	70.6	128.5	80.7	117.5	51.5	96.8	40.5
女性	112.7	72.1	86.0	73.6	95.3	60.1	99.3	57.7	118.6	70.3	130.2	89.5	123.9	67.3	134.5	108.2	123.3	65.3	122.3	69.4	122.7	58.0	131.9	80.9

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用者除外

第 45 表の 1 HDL-コレステロール値の分布 (性・年齢階級別)

性別	HDLコレステロール値(mg/dl)	年齢(歳)																											
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上					
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	<30	21	1.3	2	2.2	2	1.0	3	1.4	2	0.8	10	2.4	2	0.4	6	3.1	0	0	2	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-<40	140	8.6	3	3.4	16	8.0	13	6.2	24	9.1	37	9.0	47	10.5	21	10.8	22	11.2	16	11.2	9	12.3	0	0	0	0	0	0
	40-<50	378	23.3	17	19.1	45	22.5	44	21.0	63	23.8	99	24.0	110	24.6	51	26.2	52	26.4	33	23.1	17	23.3	8	22.9	8	22.9	8	22.9
	50-<60	437	26.9	29	32.6	48	24.0	49	23.3	72	27.2	106	25.7	133	29.7	47	24.1	60	30.5	39	27.3	22	30.1	12	34.3	12	34.3	12	34.3
	60-<70	327	20.1	21	23.6	47	23.5	45	21.4	54	20.4	78	18.9	82	18.3	36	18.5	36	18.3	29	20.3	11	15.1	6	17.1	6	17.1	6	17.1
	70-<80	168	10.3	11	12.4	23	11.5	30	14.3	22	8.3	46	11.1	36	8.0	18	9.2	15	7.6	12	8.4	5	6.8	4	11.4	4	11.4	4	11.4
	80-<90	93	5.7	4	4.5	14	7.0	14	6.7	13	4.9	23	5.6	25	5.6	11	5.6	7	3.6	7	4.9	8	11.0	3	8.6	3	8.6	3	8.6
	90-<100	39	2.4	1	1.1	3	1.5	7	3.3	9	3.4	9	2.2	10	2.2	3	1.5	5	2.5	3	2.1	0	0	0	0	2	5.7	2	5.7
	100-	22	1.4	1	1.1	2	1.0	5	2.4	6	2.3	5	1.2	3	0.7	2	1.0	0	0	2	1.4	1	1.4	0	0	0	0	0	0
	総数	1625	100	89	100	200	100	210	100	265	100	413	100	448	100	195	100	197	100	143	100	73	100	35	100	35	100	35	100
女性	<30	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-<40	55	2.3	0	0	3	0.8	1	0.3	5	1.1	17	3.3	29	5.1	10	4.3	16	7.1	6	3.2	6	6.4	1	1.7	1	1.7	1	1.7
	40-<50	222	9.3	4	3.4	16	4.1	18	5.2	38	8.5	58	11.1	88	15.6	27	11.6	27	12.0	28	15.1	20	21.3	13	21.7	13	21.7		
	50-<60	464	19.4	20	16.9	62	15.9	43	12.4	91	20.3	118	22.6	130	23.0	53	22.8	48	21.3	46	24.9	22	23.4	14	23.3	14	23.3		
	60-<70	602	25.2	34	28.8	103	26.4	97	27.9	101	22.5	141	27.0	126	22.3	70	30.2	45	20.0	41	22.2	22	23.4	18	30.0	18	30.0		
	70-<80	526	22.0	37	31.4	103	26.4	90	25.9	94	20.9	94	18.0	108	19.1	38	16.4	46	20.4	42	22.7	14	14.9	6	10.0	6	10.0		
	80-<90	277	11.6	11	9.3	55	14.1	54	15.5	61	13.6	51	9.8	45	8.0	15	6.5	24	10.7	10	5.4	5	5.3	6	10.0	6	10.0		
	90-<100	151	6.3	7	5.9	32	8.2	29	8.3	35	7.8	25	4.8	23	4.1	13	5.6	14	6.2	4	2.2	4	4.3	1	1.7	1	1.7		
	100-	94	3.9	5	4.2	16	4.1	16	4.6	24	5.3	18	3.4	15	2.7	5	2.2	5	2.2	8	4.3	1	1.1	1	1.7	1	1.7		
	総数	2392	100	118	100	390	100	348	100	449	100	523	100	564	100	232	100	225	100	185	100	94	100	60	100	60	100	60	100

第 45 表の 1 HDL-コレステロール値の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																									
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上			
	HDLコレステロール値(mg/dl)		HDLコレステロール値(mg/dl)		HDLコレステロール値(mg/dl)		HDLコレステロール値(mg/dl)		HDLコレステロール値(mg/dl)		HDLコレステロール値(mg/dl)		HDLコレステロール値(mg/dl)		HDLコレステロール値(mg/dl)		HDLコレステロール値(mg/dl)		HDLコレステロール値(mg/dl)		HDLコレステロール値(mg/dl)		HDLコレステロール値(mg/dl)			
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	57.6	15.9	58.4	14.0	58.3	14.9	60.4	18.3	58.1	16.3	56.9	16.3	56.2	14.8	55.8	17.0	55.1	13.5	56.2	15.4	57.0	16.6	60.9	14.6	60.9	14.6
女性	68.3	16.3	70.6	13.6	71.7	15.0	72.6	14.9	70.2	17.2	65.8	16.5	63.6	16.3	64.2	15.9	64.9	17.0	64.1	15.9	60.8	15.7	61.6	14.9	61.6	14.9

第 45 表の 2 HDL-コレステロール値の分布（性・年齢階級別）

性別	HDLコレステロール(mg/dl)	年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	<30	20	1.4	2	2.2	2	1.0	3	1.5	2	0.8	9	2.5	2	0.5	5	3.0	0	0	2	1.7	0	0	0	0	0	0
	30-<40	129	8.7	3	3.4	16	8.1	13	6.5	24	9.6	32	8.9	41	10.8	17	10.2	19	11.1	14	11.8	8	13.6	0	0		
	40-<50	339	23.0	17	19.1	43	21.8	40	20.0	58	23.1	88	24.5	93	24.5	45	26.9	43	25.1	28	23.5	15	25.4	7	23.3		
	50-<60	395	26.8	29	32.6	47	23.9	47	23.5	69	27.5	88	24.5	115	30.3	35	21.0	53	31.0	34	28.6	17	28.8	11	36.7		
	60-<70	305	20.7	21	23.6	47	23.9	42	21.0	51	20.3	71	19.8	73	19.3	35	21.0	33	19.3	25	21.0	11	18.6	4	13.3		
	70-<80	150	10.2	11	12.4	23	11.7	30	15.0	21	8.4	39	10.9	26	6.9	16	9.6	12	7.0	8	6.7	3	5.1	3	10.0		
	80-<90	79	5.4	4	4.5	14	7.1	13	6.5	11	4.4	19	5.3	18	4.7	9	5.4	6	3.5	4	3.4	5	8.5	3	10.0		
	90-<100	37	2.5	1	1.1	3	1.5	7	3.5	9	3.6	8	2.2	9	2.4	3	1.8	5	2.9	2	1.7	0	0	2	6.7		
	100-	21	1.4	1	1.1	2	1.0	5	2.5	6	2.4	5	1.4	2	0.5	2	1.2	0	0	2	1.7	0	0	0	0		
		総数	1475	100	89	100	197	100	200	100	251	100	359	100	379	100	167	100	171	100	119	100	59	100	30	100	
女性	<30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	30-<40	42	2.0	0	0	3	0.8	1	0.3	4	1.0	14	3.3	20	4.7	8	4.5	11	6.7	4	2.8	4	5.6	1	2.0		
	40-<50	183	8.8	4	3.4	16	4.1	17	5.0	35	8.9	43	10.2	68	16.0	19	10.8	21	12.9	22	15.4	15	21.1	10	20.4		
	50-<60	398	19.0	20	16.9	62	15.9	41	12.0	78	19.8	95	22.6	102	23.9	41	23.3	36	22.1	38	26.6	16	22.5	12	24.5		
	60-<70	531	25.4	34	28.8	102	26.2	96	28.1	90	22.8	107	25.4	102	23.9	49	27.8	33	20.2	35	24.5	17	23.9	17	34.7		
	70-<80	474	22.7	37	31.4	103	26.5	88	25.7	86	21.8	82	19.5	78	18.3	33	18.8	35	21.5	29	20.3	10	14.1	4	8.2		
	80-<90	248	11.9	11	9.3	55	14.1	54	15.8	51	12.9	43	10.2	34	8.0	13	7.4	18	11.0	7	4.9	4	5.6	5	10.2		
	90-<100	134	6.4	7	5.9	32	8.2	29	8.5	30	7.6	22	5.2	14	3.3	10	5.7	7	4.3	3	2.1	4	5.6	0	0		
	100-	80	3.8	5	4.2	16	4.1	16	4.7	20	5.1	15	3.6	8	1.9	3	1.7	2	1.2	5	3.5	1	1.4	0	0		
		総数	2090	100	118	100	389	100	342	100	394	100	421	100	426	100	176	100	163	100	143	100	71	100	49	100	

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用者除外

第 45 表の 2 HDL-コレステロール値の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	57.6	15.9	58.4	14.0	58.5	14.9	60.6	18.5	58.0	16.4	57.0	16.4	55.7	14.2	56.4	17.3	55.3	13.6	55.3	15.2	54.7	13.0	61.1	15.1
女性	68.7	16.1	70.6	13.6	71.7	15.0	72.8	14.9	70.0	16.8	66.3	16.7	63.0	15.5	64.6	15.7	64.0	16.1	63.4	15.3	61.8	16.4	60.4	12.4

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用者除外

第 46 表の 1-1 LDL-コレステロール値 ( Friedewald の式 ) の分布 ( 性・年齢階級別 )

		年齢 ( 歳 )																									
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	LDLコレステロール ( mg/dl )																										
	<-40	11	0.7	2	2.3	0	0	1	0.5	1	0.4	7	1.7	0	0	2	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-<50	11	0.7	1	1.1	2	1.1	0	0	2	0.8	4	1.0	2	0.5	3	1.6	1	0.5	0	0	0	0	0	0	1	2.9
	50-<60	35	2.2	4	4.6	5	2.6	2	1.0	1	0.4	10	2.5	13	2.9	3	1.6	7	3.6	1	0.7	2	2.7	3	8.6		
	60-<70	63	4.0	5	5.7	10	5.3	8	3.9	6	2.3	16	4.0	18	4.1	12	6.3	5	2.6	9	6.4	3	4.1	1	2.9		
	70-<80	126	7.9	10	11.5	17	8.9	9	4.4	17	6.5	35	8.7	38	8.6	18	9.4	13	6.7	16	11.3	6	8.2	3	8.6		
	80-<90	147	9.3	15	17.2	22	11.6	14	6.9	23	8.7	39	9.7	34	7.7	20	10.5	17	8.7	12	8.5	3	4.1	2	5.7		
	90-<100	200	12.6	7	8.0	21	11.1	27	13.3	31	11.8	46	11.4	68	15.3	22	11.5	26	13.3	24	17.0	13	17.8	5	14.3		
	100-<110	227	14.3	14	16.1	23	12.1	30	14.8	33	12.5	58	14.4	69	15.5	29	15.2	30	15.4	19	13.5	12	16.4	8	22.9		
	110-<120	202	12.7	8	9.2	24	12.6	31	15.3	30	11.4	49	12.2	60	13.5	27	14.1	27	13.8	20	14.2	10	13.7	3	8.6		
	120-<130	164	10.3	11	12.6	15	7.9	22	10.8	32	12.2	37	9.2	47	10.6	17	8.9	21	10.8	15	10.6	10	13.7	1	2.9		
	130-<140	146	9.2	5	5.7	16	8.4	18	8.9	31	11.8	37	9.2	39	8.8	16	8.4	18	9.2	12	8.5	6	8.2	3	8.6		
	140-<150	87	5.5	2	2.3	10	5.3	19	9.4	14	5.3	19	4.7	23	5.2	8	4.2	7	3.6	9	6.4	6	8.2	1	2.9		
	150-<160	63	4.0	2	2.3	11	5.8	7	3.4	16	6.1	14	3.5	13	2.9	5	2.6	8	4.1	2	1.4	2	2.7	1	2.9		
	160-<170	43	2.7	1	1.1	8	4.2	5	2.5	6	2.3	15	3.7	8	1.8	6	3.1	5	2.6	1	0.7	0	0	2	5.7		
	170-<180	28	1.8	0	0	3	1.6	4	2.0	9	3.4	6	1.5	6	1.4	1	0.5	5	2.6	0	0	0	0	1	2.9		
	180-<190	13	0.8	0	0	3	1.6	3	1.5	4	1.5	3	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	190-<200	11	0.7	0	0	0	0	2	1.0	1	0.4	5	1.2	3	0.7	1	0.5	2	1.0	1	0.7	0	0	0	0		
	200-<210	5	0.3	0	0	0	0	0	0	3	1.1	0	0	2	0.5	0	0	2	1.0	0	0	0	0	0	0		
	210-<220	7	0.4	0	0	0	0	1	0.5	3	1.1	2	0.5	1	0.2	1	0.5	1	0.5	0	0	0	0	0	0		
	220-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	総 数	1589	100	87	100	190	100	203	100	263	100	402	100	444	100	191	100	195	100	141	100	73	100	35	100		
女 性	LDLコレステロール ( mg/dl )																										
	<-40	2	0.1	0	0	0	0	2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40-<50	9	0.4	1	0.9	3	0.8	0	0	0	0	2	0.4	3	0.5	1	0.4	1	0.4	0	0	2	2.1	0	0		
	50-<60	29	1.2	5	4.3	10	2.6	6	1.7	1	0.2	2	0.4	5	0.9	1	0.4	2	0.9	3	1.6	0	0	0	0		
	60-<70	87	3.7	10	8.6	28	7.2	16	4.6	9	2.0	9	1.8	15	2.7	4	1.8	3	1.3	6	3.3	4	4.3	2	3.4		
	70-<80	153	6.5	21	18.1	34	8.8	32	9.2	20	4.5	19	3.7	27	4.8	13	5.7	15	6.7	6	3.3	2	2.1	4	6.8		
	80-<90	227	9.6	20	17.2	77	19.9	36	10.4	18	4.0	34	6.6	42	7.5	13	5.7	12	5.4	11	6.0	13	13.8	6	10.2		
	90-<100	275	11.6	15	12.9	66	17.1	47	13.5	43	9.6	36	7.0	68	12.1	20	8.8	24	10.7	22	12.0	16	17.0	6	10.2		
	100-<110	319	13.5	20	17.2	61	15.8	57	16.4	48	10.8	59	11.5	74	13.2	25	11.0	33	14.7	24	13.1	9	9.6	8	13.6		
	110-<120	264	11.1	13	11.2	33	8.5	36	10.4	53	11.9	63	12.3	66	11.8	28	12.3	27	12.1	26	14.2	4	4.3	9	15.3		
	120-<130	315	13.3	9	7.8	28	7.2	40	11.5	67	15.0	83	16.1	88	15.7	33	14.5	37	16.5	27	14.8	16	17.0	8	13.6		
	130-<140	208	8.8	1	0.9	19	4.9	22	6.3	57	12.8	49	9.5	60	10.7	23	10.1	27	12.1	13	7.1	14	14.9	6	10.2		
	140-<150	164	6.9	1	0.9	16	4.1	16	4.6	46	10.3	48	9.3	37	6.6	18	7.9	19	8.5	11	6.0	4	4.3	3	5.1		
	150-<160	115	4.9	0	0	4	1.0	17	4.9	29	6.5	35	6.8	30	5.4	15	6.6	12	5.4	11	6.0	4	4.3	3	5.1		
	160-<170	78	3.3	0	0	4	1.0	6	1.7	24	5.4	27	5.3	17	3.0	12	5.3	4	1.8	12	6.6	1	1.1	0	0		
	170-<180	49	2.1	0	0	1	0.3	3	0.9	12	2.7	16	3.1	17	3.0	8	3.5	3	1.3	7	3.8	3	3.2	4	6.8		
	180-<190	32	1.4	0	0	2	0.5	4	1.2	11	2.5	10	1.9	5	0.9	3	1.3	3	1.3	0	0	2	2.1	0	0		
	190-<200	24	1.0	0	0	0	0	5	1.4	6	1.3	9	1.8	4	0.7	7	3.1	1	0.4	3	1.6	0	0	0	0		
	200-<210	6	0.3	0	0	1	0.3	0	0	1	0.2	3	0.6	1	0.2	1	0.4	0	0	1	0.5	0	0	0	0		
	210-<220	3	0.1	0	0	0	0	1	0.3	0	0	2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	220-	11	0.5	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	8	1.6	1	0.2	3	1.3	1	0.4	0	0	0	0	0	0		
	総 数	2370	100	116	100	387	100	347	100	446	100	514	100	560	100	228	100	224	100	183	100	94	100	59	100		

第 46 表の 1-1 LDL-コレステロール値 ( Friedewald の式 ) の平均値及び標準偏差 ( 性・年齢階級別 )

		年齢 ( 歳 )																							
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性 別	LDLコレステロール ( mg/dl )																								
	LDLコレステロール ( mg/dl )	111.0	30.9	98.7	27.4	109.9	31.2	116.0	29.1	118.3	32.3	109.4	33.1	108.7	28.2	105.8	29.9	112.1	30.9	105.6	24.9	107.8	24.1	104.3	31.4
女 性	LDLコレステロール ( mg/dl )	115.6	31.1	92.0	21.0	99.4	25.4	109.5	30.5	125.2	29.2	126.7	32.6	117.6	28.8	125.4	33.3	117.7	27.4	120.2	30.4	113.8	29.2	115.3	28.1

Friedewald の式 LDLコレステロール = 総コレステロール - HDLコレステロール - 中性脂肪/5  
( 中性脂肪 ( トリグリセライド ) が 400mg/dl 未満の場合。 )

第 46 表の 1-2 LDL-コレステロール値 (Friedewald の式) の分布 (性・年齢階級別)

性別	LDLコレステロール(mg/dl)	年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	<<40	11	0.8	2	2.3	0	0	1	0.5	1	0.4	7	2.0	0	0	2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-<50	11	0.8	1	1.1	2	1.1	0	0	2	0.8	4	1.1	2	0.5	3	1.8	1	0.6	0	0	0	0	1	3.3		
	50-<60	33	2.3	4	4.6	5	2.7	2	1.0	1	0.4	9	2.6	12	3.2	2	1.2	7	4.1	1	0.9	1	1.7	3	10.0		
	60-<70	55	3.8	5	5.7	10	5.3	7	3.6	6	2.4	10	2.9	17	4.5	6	3.7	5	3.0	8	6.8	3	5.1	1	3.3		
	70-<80	115	8.0	10	11.5	17	9.1	7	3.6	17	6.8	33	9.4	31	8.3	16	9.8	11	6.5	12	10.3	5	8.5	3	10.0		
	80-<90	128	8.9	15	17.2	22	11.8	14	7.3	21	8.4	29	8.3	27	7.2	16	9.8	15	8.9	9	7.7	1	1.7	2	6.7		
	90-<100	182	12.6	7	8.0	21	11.2	27	14.0	29	11.6	40	11.4	58	15.5	20	12.2	23	13.6	23	19.7	9	15.3	3	10.0		
	100-<110	195	13.5	14	16.1	21	11.2	29	15.0	28	11.2	49	14.0	54	14.4	25	15.2	24	14.2	14	12.0	10	16.9	6	20.0		
	110-<120	186	12.9	8	9.2	24	12.8	30	15.5	30	12.0	42	12.0	52	13.9	24	14.6	24	14.2	17	14.5	9	15.3	2	6.7		
	120-<130	148	10.3	11	12.6	15	8.0	20	10.4	30	12.0	34	9.7	38	10.1	15	9.1	15	8.9	12	10.3	10	16.9	1	3.3		
	130-<140	135	9.4	5	5.7	16	8.6	16	8.3	31	12.4	33	9.4	34	9.1	14	8.5	16	9.5	9	7.7	6	10.2	3	10.0		
	140-<150	80	5.6	2	2.3	10	5.3	18	9.3	13	5.2	18	5.1	19	5.1	7	4.3	6	3.6	8	6.8	4	6.8	1	3.3		
	150-<160	60	4.2	2	2.3	10	5.3	7	3.6	16	6.4	13	3.7	12	3.2	5	3.0	8	4.7	2	1.7	1	1.7	1	3.3		
	160-<170	43	3.0	1	1.1	8	4.3	5	2.6	6	2.4	15	4.3	8	2.1	6	3.7	5	3.0	1	0.9	0	0	2	6.7		
	170-<180	26	1.8	0	0	3	1.6	4	2.1	8	3.2	5	1.4	6	1.6	1	0.6	5	3.0	0	0	0	0	1	3.3		
	180-<190	11	0.8	0	0	3	1.6	3	1.6	3	1.2	2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	190-<200	11	0.8	0	0	0	0	2	1.0	1	0.4	5	1.4	3	0.8	1	0.6	2	1.2	1	0.9	0	0	0	0		
	200-<210	4	0.3	0	0	0	0	0	0	3	1.2	0	0	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0		
	210-<220	7	0.5	0	0	0	0	1	0.5	3	1.2	2	0.6	1	0.3	1	0.6	1	0.6	0	0	0	0	0	0		
	220-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	総数	1441	100	87	100	187	100	193	100	249	100	350	100	375	100	164	100	169	100	117	100	59	100	30	100		
女性	<<40	2	0.1	0	0	0	0	2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40-<50	8	0.4	1	0.9	3	0.8	0	0	0	0	1	0.2	3	0.7	1	0.6	1	0.6	0	0	2	2.8	0	0		
	50-<60	25	1.2	5	4.3	10	2.6	6	1.8	0	0	1	0.2	3	0.7	0	0	1	0.6	2	1.4	0	0	0	0		
	60-<70	78	3.8	10	8.6	28	7.3	16	4.7	9	2.3	6	1.4	9	2.1	3	1.7	2	1.2	4	2.8	1	1.4	2	4.2		
	70-<80	135	6.5	21	18.1	34	8.8	32	9.4	14	3.6	13	3.1	21	5.0	9	5.2	12	7.4	4	2.8	2	2.8	3	6.3		
	80-<90	201	9.7	20	17.2	76	19.7	36	10.6	14	3.6	26	6.3	29	6.9	9	5.2	7	4.3	8	5.7	9	12.7	5	10.4		
	90-<100	242	11.7	15	12.9	66	17.1	47	13.8	37	9.5	27	6.5	50	11.8	12	6.9	16	9.9	15	10.6	14	19.7	5	10.4		
	100-<110	268	12.9	20	17.2	61	15.8	56	16.4	42	10.7	41	9.9	48	11.4	18	10.3	21	13.0	18	12.8	4	5.6	5	10.4		
	110-<120	229	11.1	13	11.2	33	8.5	34	10.0	44	11.3	49	11.8	56	13.3	19	10.9	20	12.3	24	17.0	3	4.2	9	18.8		
	120-<130	269	13.0	9	7.8	28	7.3	40	11.7	59	15.1	67	16.1	66	15.6	25	14.4	25	15.4	21	14.9	14	19.7	6	12.5		
	130-<140	178	8.6	1	0.9	19	4.9	22	6.5	54	13.8	40	9.6	42	10.0	18	10.3	20	12.3	10	7.1	9	12.7	3	6.3		
	140-<150	149	7.2	1	0.9	16	4.1	16	4.7	40	10.2	42	10.1	34	8.1	15	8.6	18	11.1	9	6.4	4	5.6	3	6.3		
	150-<160	102	4.9	0	0	4	1.0	17	5.0	27	6.9	31	7.5	23	5.5	13	7.5	10	6.2	6	4.3	4	5.6	3	6.3		
	160-<170	71	3.4	0	0	4	1.0	6	1.8	22	5.6	25	6.0	14	3.3	11	6.3	2	1.2	11	7.8	1	1.4	0	0		
	170-<180	46	2.2	0	0	1	0.3	3	0.9	11	2.8	16	3.8	15	3.6	8	4.6	3	1.9	6	4.3	2	2.8	4	8.3		
	180-<190	29	1.4	0	0	2	0.5	3	0.9	10	2.6	10	2.4	4	0.9	3	1.7	2	1.2	0	0	2	2.8	0	0		
	190-<200	22	1.1	0	0	0	0	4	1.2	6	1.5	9	2.2	3	0.7	7	4.0	1	0.6	2	1.4	0	0	0	0		
	200-<210	6	0.3	0	0	1	0.3	0	0	1	0.3	3	0.7	1	0.2	1	0.6	0	0	1	0.7	0	0	0	0		
	210-<220	3	0.1	0	0	0	0	1	0.3	0	0	2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	220-	9	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.3	7	1.7	1	0.2	2	1.1	1	0.6	0	0	0	0	0	0		
	総数	2072	100	116	100	386	100	341	100	391	100	416	100	422	100	174	100	162	100	141	100	71	100	48	100		

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用者除外

第 46 表の 1-2 LDL-コレステロール値 (Friedewald の式) の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																							
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
男性	111.4	31.3	98.7	27.4	109.7	31.3	116.2	29.2	118.3	32.4	110.4	33.7	109.0	28.8	107.7	30.2	111.8	31.7	105.9	25.2	108.9	23.0	104.9	33.8
女性	115.8	31.5	92.0	21.0	99.4	25.4	108.7	29.6	126.5	29.1	130.1	33.1	119.2	29.2	129.1	34.1	119.5	28.4	121.3	30.0	116.0	29.8	116.4	29.5

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用者除外



(参考) 第46表の2-1 LDL-コレステロール値(直接測定法)の分布(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																									
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	LDLコレステロール(mg/dl)																										
	--<40	5	0.3	1	1.1	0	0	0	0	0	0	4	1.0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-<50	4	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	2	0.4	1	0.5	1	0.5	0	0	0	0	0	1	2.9	
	50-<60	12	0.7	2	2.2	2	1.0	0	0	1	0.4	3	0.7	4	0.9	0	0	1	0.5	1	0.7	0	0	0	2	5.7	
	60-<70	31	1.9	2	2.2	3	1.5	3	1.4	2	0.8	12	2.9	9	2.0	8	4.1	4	2.0	3	2.1	1	1.4	1	1.4	2.9	
	70-<80	65	4.0	5	5.6	6	3.0	4	1.9	8	3.0	17	4.1	25	5.6	5	2.6	7	3.6	10	7.0	7	9.6	1	2.9		
	80-<90	107	6.6	9	10.1	11	5.5	9	4.3	13	4.9	27	6.5	38	8.5	17	8.7	15	7.6	17	11.9	1	1.4	5	14.3		
	90-<100	147	9.0	13	14.6	20	10.0	12	5.7	25	9.4	33	8.0	44	9.8	21	10.8	21	10.7	12	8.4	6	8.2	5	14.3		
	100-<110	190	11.7	12	13.5	16	8.0	20	9.5	27	10.2	54	13.1	61	13.6	25	12.8	27	13.7	15	10.5	14	19.2	5	14.3		
	110-<120	230	14.2	9	10.1	29	14.5	31	14.8	35	13.2	63	15.3	63	14.1	32	16.4	23	11.7	23	16.1	13	17.8	4	11.4		
	120-<130	218	13.4	9	10.1	30	15.0	28	13.3	35	13.2	49	11.9	67	15.0	25	12.8	29	14.7	24	16.8	13	17.8	1	2.9		
	130-<140	192	11.8	10	11.2	27	13.5	30	14.3	27	10.2	44	10.7	54	12.1	17	8.7	27	13.7	18	12.6	5	6.8	4	11.4		
	140-<150	134	8.2	9	10.1	12	6.0	23	11.0	30	11.3	32	7.7	28	6.3	16	8.2	11	5.6	9	6.3	6	8.2	2	5.7		
	150-<160	104	6.4	4	4.5	13	6.5	18	8.6	19	7.2	28	6.8	22	4.9	14	7.2	10	5.1	6	4.2	6	8.2	0	0		
	160-<170	76	4.7	1	1.1	12	6.0	12	5.7	12	4.5	20	4.8	19	4.2	10	5.1	10	5.1	4	2.8	1	1.4	4	11.4		
	170-<180	48	3.0	3	3.4	11	5.5	10	4.8	8	3.0	12	2.9	4	0.9	1	0.5	4	2.0	0	0	0	0	0	0	0	
	180-<190	24	1.5	0	0	4	2.0	4	1.9	11	4.2	3	0.7	2	0.4	0	0	2	1.0	0	0	0	0	0	0	0	
	190-<200	14	0.9	0	0	2	1.0	2	1.0	4	1.5	4	1.0	2	0.4	0	0	2	1.0	0	0	0	0	0	0	0	
	200-<210	11	0.7	0	0	2	1.0	2	1.0	3	1.1	3	0.7	1	0.2	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	
	210-<220	8	0.5	0	0	0	0	1	0.5	3	1.1	2	0.5	2	0.4	2	1.0	2	1.0	0	0	0	0	0	0	0	
	220-	5	0.3	0	0	0	0	1	0.5	2	0.8	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
		総数	1625	100	89	100	200	100	210	100	265	100	413	100	448	100	195	100	197	100	143	100	73	100	35	100	
性別 女性	LDLコレステロール(mg/dl)																										
	--<40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40-<50	6	0.3	2	1.7	1	0.3	2	0.6	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50-<60	10	0.4	0	0	3	0.8	2	0.6	0	0	1	0.2	4	0.7	0	0	1	0.4	0	0	3	3.2	0	0		
	60-<70	31	1.3	4	3.4	11	2.8	5	1.4	3	0.7	3	0.6	5	0.9	1	0.4	2	0.9	2	1.1	0	0	1	1.7		
	70-<80	88	3.7	17	14.4	25	6.4	17	4.9	8	1.8	6	1.1	15	2.7	4	1.7	7	3.1	4	2.2	1	1.1	3	5.0		
	80-<90	157	6.6	15	12.7	43	11.0	25	7.2	16	3.6	20	3.8	38	6.7	14	6.0	14	6.2	14	7.6	5	5.3	5	8.3		
	90-<100	214	8.9	20	16.9	58	14.9	42	12.1	23	5.1	26	5.0	45	8.0	10	4.3	15	6.7	15	8.1	11	11.7	4	6.7		
	100-<110	293	12.2	16	13.6	73	18.7	48	13.8	39	8.7	47	9.0	70	12.4	21	9.1	24	10.7	22	11.9	16	17.0	8	13.3		
	110-<120	313	13.1	17	14.4	54	13.8	47	13.5	52	11.6	64	12.2	79	14.0	30	12.9	35	15.6	24	13.0	13	13.8	7	11.7		
	120-<130	296	12.4	13	11.0	39	10.0	35	10.1	59	13.1	73	14.0	77	13.7	30	12.9	31	13.8	26	14.1	9	9.6	11	18.3		
	130-<140	268	11.2	7	5.9	27	6.9	40	11.5	60	13.4	73	14.0	61	10.8	29	12.5	28	12.4	19	10.3	8	8.5	6	10.0		
	140-<150	238	9.9	6	5.1	28	7.2	28	8.0	62	13.8	52	9.9	62	11.0	22	9.5	31	13.8	14	7.6	15	16.0	2	3.3		
	150-<160	156	6.5	0	0	11	2.8	22	6.3	37	8.2	50	9.6	36	6.4	24	10.3	14	6.2	14	7.6	4	4.3	4	6.7		
	160-<170	120	5.0	1	0.8	5	1.3	13	3.7	34	7.6	37	7.1	30	5.3	14	6.0	12	5.3	12	6.5	4	4.3	2	3.3		
	170-<180	86	3.6	0	0	5	1.3	7	2.0	27	6.0	26	5.0	21	3.7	12	5.2	5	2.2	10	5.4	2	2.1	4	6.7		
	180-<190	48	2.0	0	0	3	0.8	4	1.1	13	2.9	17	3.3	11	2.0	8	3.4	3	1.3	4	2.2	1	1.1	3	5.0		
	190-<200	30	1.3	0	0	2	0.5	4	1.1	8	1.8	9	1.7	7	1.2	5	2.2	2	0.9	3	1.6	2	2.1	0	0		
	200-<210	17	0.7	0	0	1	0.3	2	0.6	5	1.1	7	1.3	2	0.4	3	1.3	0	0	2	1.1	0	0	0	0		
	210-<220	9	0.4	0	0	1	0.3	3	0.9	2	0.4	3	0.6	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	220-	12	0.5	0	0	0	0	2	0.6	1	0.2	8	1.5	1	0.2	3	1.3	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	
		総数	2392	100	118	100	390	100	348	100	449	100	523	100	564	100	232	100	225	100	185	100	94	100	60	100	

(参考) 第46表の2-1 LDL-コレステロール値(直接測定法)の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																							
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-69歳		(再掲)70-74歳		(再掲)75-79歳		(再掲)80-84歳		(再掲)85歳以上	
		平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
性別	LDLコレステロール(mg/dl)																								
男性	LDLコレステロール(mg/dl)	122.2	30.7	112.2	28.4	125.4	30.1	130.5	29.2	129.2	32.4	120.3	31.8	116.5	28.0	116.9	28.1	120.6	30.3	113.4	25.1	115.2	22.8	108.7	32.3
女性	LDLコレステロール(mg/dl)	124.9	31.1	101.8	22.6	110.5	26.6	120.4	31.4	134.6	29.5	135.4	31.6	125.1	28.8	134.0	32.9	125.1	27.4	127.3	30.1	122.0	28.8	123.3	30.4

(参考) 第 46 表の 2-2 LDL-コレステロール値 (直接測定法) の分布 (性・年齢階級別)

性別	LDLコレステロール(mg/dl)	年齢(歳)																								
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数
男性	<<40	5	0.3	1	1.1	0	0	0	0	0	0	4	1.1	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-<50	4	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.6	2	0.5	1	0.6	1	0.6	0	0	0	0	0	1	3.3
	50-<60	12	0.8	2	2.2	2	1.0	0	0	1	0.4	3	0.8	4	1.1	0	0	1	0.6	1	0.8	0	0	0	2	6.7
	60-<70	28	1.9	2	2.2	3	1.5	3	1.5	2	0.8	11	3.1	7	1.8	7	4.2	4	2.3	2	1.7	0	0	0	1	3.3
	70-<80	61	4.1	5	5.6	6	3.0	4	2.0	8	3.2	15	4.2	23	6.1	3	1.8	6	3.5	10	8.4	6	10.2	1	3.3	
	80-<90	94	6.4	9	10.1	11	5.6	9	4.5	13	5.2	20	5.6	32	8.4	12	7.2	14	8.2	14	11.8	0	0	4	13.3	
	90-<100	134	9.1	13	14.6	20	10.2	10	5.0	24	9.6	28	7.8	39	10.3	19	11.4	21	12.3	9	7.6	5	8.5	4	13.3	
	100-<110	168	11.4	12	13.5	16	8.1	19	9.5	25	10.0	45	12.5	51	13.5	20	12.0	22	12.9	13	10.9	11	18.6	5	16.7	
	110-<120	202	13.7	9	10.1	29	14.7	31	15.5	30	12.0	53	14.8	50	13.2	27	16.2	19	11.1	19	16.0	10	16.9	2	6.7	
	120-<130	195	13.2	9	10.1	30	15.2	27	13.5	33	13.1	41	11.4	55	14.5	23	13.8	24	14.0	18	15.1	12	20.3	1	3.3	
	130-<140	172	11.7	10	11.2	25	12.7	27	13.5	26	10.4	41	11.4	43	11.3	15	9.0	20	11.7	15	12.6	5	8.5	3	10.0	
	140-<150	127	8.6	9	10.1	12	6.1	22	11.0	30	12.0	29	8.1	25	6.6	14	8.4	9	5.3	8	6.7	6	10.2	2	6.7	
	150-<160	96	6.5	4	4.5	13	6.6	17	8.5	18	7.2	24	6.7	20	5.3	12	7.2	10	5.8	6	5.0	4	6.8	0	0	
	160-<170	73	4.9	1	1.1	12	6.1	11	5.5	12	4.8	20	5.6	17	4.5	10	6.0	10	5.8	3	2.5	0	0	4	13.3	
	170-<180	46	3.1	3	3.4	10	5.1	10	5.0	8	3.2	11	3.1	4	1.1	1	0.6	4	2.3	0	0	0	0	0	0	0
	180-<190	22	1.5	0	0	4	2.0	4	2.0	10	4.0	2	0.6	2	0.5	0	0	2	1.2	0	0	0	0	0	0	0
	190-<200	13	0.9	0	0	2	1.0	2	1.0	3	1.2	4	1.1	2	0.5	0	0	2	1.2	0	0	0	0	0	0	0
	200-<210	11	0.7	0	0	2	1.0	2	1.0	3	1.2	3	0.8	1	0.3	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0
	210-<220	7	0.5	0	0	0	0	1	0.5	3	1.2	2	0.6	1	0.3	2	1.2	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0
	220-	5	0.3	0	0	0	0	1	0.5	2	0.8	1	0.3	1	0.3	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0
総数		1475	100	89	100	197	100	200	100	251	100	359	100	379	100	167	100	171	100	119	100	59	100	30	100	
女性	<<40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40-<50	6	0.3	2	1.7	1	0.3	2	0.6	0	0	1	0.2	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-<60	9	0.4	0	0	3	0.8	2	0.6	0	0	0	0	4	0.9	0	0	1	0.6	0	0	3	4.2	0	0	
	60-<70	31	1.5	4	3.4	11	2.8	5	1.5	3	0.8	3	0.7	5	1.2	1	0.6	2	1.2	2	1.4	0	0	1	2.0	
	70-<80	79	3.8	17	14.4	25	6.4	17	5.0	6	1.5	3	0.7	11	2.6	2	1.1	5	3.1	3	2.1	0	0	3	6.1	
	80-<90	138	6.6	15	12.7	42	10.8	25	7.3	16	4.1	13	3.1	27	6.3	9	5.1	10	6.1	9	6.3	4	5.6	4	8.2	
	90-<100	182	8.7	20	16.9	58	14.9	42	12.3	17	4.3	16	3.8	29	6.8	6	3.4	11	6.7	9	6.3	6	8.5	3	6.1	
	100-<110	257	12.3	16	13.6	73	18.8	48	14.0	32	8.1	39	9.3	49	11.5	16	9.1	14	8.6	18	12.6	11	15.5	6	12.2	
	110-<120	271	13.0	17	14.4	54	13.9	46	13.5	43	10.9	52	12.4	59	13.8	25	14.2	22	13.5	20	14.0	11	15.5	6	12.2	
	120-<130	246	11.8	13	11.0	39	10.0	33	9.6	50	12.7	52	12.4	59	13.8	15	8.5	23	14.1	20	14.0	7	9.9	9	18.4	
	130-<140	224	10.7	7	5.9	27	6.9	40	11.7	52	13.2	54	12.8	44	10.3	22	12.5	18	11.0	16	11.2	7	9.9	3	6.1	
	140-<150	214	10.2	6	5.1	28	7.2	28	8.2	59	15.0	44	10.5	49	11.5	17	9.7	26	16.0	11	7.7	10	14.1	2	4.1	
	150-<160	137	6.6	0	0	11	2.8	22	6.4	32	8.1	43	10.2	29	6.8	19	10.8	12	7.4	10	7.0	4	5.6	3	6.1	
	160-<170	112	5.4	1	0.8	5	1.3	13	3.8	33	8.4	35	8.3	25	5.9	13	7.4	9	5.5	10	7.0	4	5.6	2	4.1	
	170-<180	78	3.7	0	0	5	1.3	7	2.0	25	6.3	23	5.5	18	4.2	11	6.3	5	3.1	8	5.6	1	1.4	4	8.2	
	180-<190	44	2.1	0	0	3	0.8	3	0.9	11	2.8	17	4.0	10	2.3	8	4.5	3	1.8	3	2.1	1	1.4	3	6.1	
	190-<200	28	1.3	0	0	2	0.5	4	1.2	7	1.8	9	2.1	6	1.4	5	2.8	1	0.6	3	2.1	2	2.8	0	0	
	200-<210	15	0.7	0	0	1	0.3	1	0.3	5	1.3	7	1.7	1	0.2	3	1.7	0	0	1	0.7	0	0	0	0	
	210-<220	9	0.4	0	0	1	0.3	3	0.9	2	0.5	3	0.7	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	220-	10	0.5	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	7	1.7	1	0.2	2	1.1	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0
総数		2090	100	118	100	389	100	342	100	394	100	421	100	426	100	176	100	163	100	143	100	71	100	49	100	

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用者除外

(参考) 第 46 表の 2-2 LDL-コレステロール値 (直接測定法) の平均値及び標準偏差 (性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)																								
	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上		
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均
男性	122.6	31.1	112.2	28.4	125.1	30.2	130.6	29.5	129.2	32.7	121.1	32.5	116.6	28.6	118.3	28.6	120.3	31.1	113.5	25.7	116.1	21.4	108.8	34.3	
女性	125.1	31.5	101.8	22.6	110.5	26.6	119.5	30.4	135.7	29.7	138.4	32.0	126.6	29.5	137.2	33.8	126.9	28.6	128.2	29.5	124.1	29.9	124.3	32.2	

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用者除外

第47表の1 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	434	26.9	3	3.4	17	8.5	35	16.7	66	25.0	149	36.4	164	36.9	327	30.3	159	40.7	87	35.2
	腹囲異常+項目1つ該当	364	22.5	5	5.7	48	24.0	52	24.8	68	25.8	103	25.2	88	19.8	280	25.9	104	26.6	31	12.6
	上記以外	817	50.6	80	90.9	135	67.5	123	58.6	130	49.2	157	38.4	192	43.2	473	43.8	128	32.7	129	52.2
	総数	1615	100	88	100	200	100	210	100	264	100	409	100	444	100	1080	100	391	100	247	100
女性	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	232	9.9	0	0	2	0.5	12	3.5	30	6.7	85	16.3	103	18.7	169	11.0	94	20.8	61	18.5
	腹囲異常+項目1つ該当	172	7.3	0	0	6	1.6	16	4.7	33	7.4	54	10.4	63	11.4	125	8.2	44	9.7	41	12.5
	上記以外	1945	82.8	110	100	370	97.9	315	91.8	384	85.9	381	73.3	385	69.9	1238	80.8	314	69.5	227	69.0
	総数	2349	100	110	100	378	100	343	100	447	100	520	100	551	100	1532	100	452	100	329	100
総数	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	666	16.8	3	1.5	19	3.3	47	8.5	96	13.5	234	25.2	267	26.8	496	19.0	253	30.0	148	25.7
	腹囲異常+項目1つ該当	536	13.5	5	2.5	54	9.3	68	12.3	101	14.2	157	16.9	151	15.2	405	15.5	148	17.6	72	12.5
	上記以外	2762	69.7	190	96.0	505	87.4	438	79.2	514	72.3	538	57.9	577	58.0	1711	65.5	442	52.4	356	61.8
	総数	3964	100	198	100	578	100	553	100	711	100	929	100	995	100	2612	100	843	100	576	100

注) 妊婦除外, ヘモグロビン A1c 5.5%の場合 項目の基準は p.55 参照

第47表の2 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	399	24.7	3	3.4	13	6.5	31	14.8	64	24.2	138	33.7	150	33.8	303	28.1	150	38.4	80	32.4
	腹囲異常+項目1つ該当	390	24.1	5	5.7	49	24.5	54	25.7	68	25.8	114	27.9	100	22.5	299	27.7	112	28.6	37	15.0
	上記以外	826	51.1	80	90.9	138	69.0	125	59.5	132	50.0	157	38.4	194	43.7	478	44.3	129	33.0	130	52.6
	総数	1615	100	88	100	200	100	210	100	264	100	409	100	444	100	1080	100	391	100	247	100
女性	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	220	9.4	0	0	2	0.5	10	2.9	28	6.3	82	15.8	98	17.8	160	10.4	89	19.7	58	17.6
	腹囲異常+項目1つ該当	179	7.6	0	0	5	1.3	18	5.2	35	7.8	54	10.4	67	12.2	130	8.5	48	10.6	44	13.4
	上記以外	1950	83.0	110	100	371	98.1	315	91.8	384	85.9	384	73.8	386	70.1	1242	81.1	315	69.7	227	69.0
	総数	2349	100	110	100	378	100	343	100	447	100	520	100	551	100	1532	100	452	100	329	100
総数	メタボリックシンドローム																				
	腹囲異常+項目2つ以上該当	619	15.6	3	1.5	15	2.6	41	7.4	92	12.9	220	23.7	248	24.9	463	17.7	239	28.4	138	24.0
	腹囲異常+項目1つ該当	569	14.4	5	2.5	54	9.3	72	13.0	103	14.5	168	18.1	167	16.8	429	16.4	160	19.0	81	14.1
	上記以外	2776	70.0	190	96.0	509	88.1	440	79.6	516	72.6	541	58.2	580	58.3	1720	65.8	444	52.7	357	62.0
	総数	3964	100	198	100	578	100	553	100	711	100	929	100	995	100	2612	100	843	100	576	100

注) 妊婦除外, ヘモグロビン A1c 5.6%の場合 項目の基準は p.55 参照

第 48 表の 1 腹囲区分別，血中脂質，血圧，血糖のいずれかのリスクを有する割合（性・年齢階級別）

性別	年齢(歳)	腹囲異常 < 85 cm(男) / < 90 cm(女) 85 cm(男) / 90 cm(女)	リスク保有数									
			総数		0		1		2		3	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	723	100.0	249	34.4	314	43.4	133	18.4	27	3.7
		85 cm(男) / 90 cm(女)	892	100.0	94	10.5	364	40.8	336	37.7	98	11.0
	20-29歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	71	100.0	54	76.1	16	22.5	1	1.4	0	0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	17	100.0	9	52.9	5	29.4	2	11.8	1	5.9
	30-39歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	111	100.0	83	74.8	25	22.5	3	2.7	0	0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	89	100.0	24	27.0	48	53.9	14	15.7	3	3.4
	40-49歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	99	100.0	48	48.5	43	43.4	7	7.1	1	1.0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	111	100.0	24	21.6	52	46.8	29	26.1	6	5.4
	50-59歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	117	100.0	27	23.1	61	52.1	27	23.1	2	1.7
		85 cm(男) / 90 cm(女)	147	100.0	13	8.8	68	46.3	57	38.8	9	6.1
	60-69歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	146	100.0	26	17.8	75	51.4	36	24.7	9	6.2
		85 cm(男) / 90 cm(女)	263	100.0	11	4.2	103	39.2	115	43.7	34	12.9
	70歳以上	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	179	100.0	11	6.1	94	52.5	59	33.0	15	8.4
		85 cm(男) / 90 cm(女)	265	100.0	13	4.9	88	33.2	119	44.9	45	17.0
(再掲) 40-74歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	420	100.0	107	25.5	211	50.2	88	21.0	14	3.3	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	660	100.0	53	8.0	280	42.4	255	38.6	72	10.9	
(再掲) 65-74歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	120	100.0	14	11.7	64	53.3	37	30.8	5	4.2	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	271	100.0	8	3.0	104	38.4	117	43.2	42	15.5	
(再掲) 75歳以上	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	121	100.0	5	4.1	62	51.2	41	33.9	13	10.7	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	126	100.0	8	6.3	31	24.6	65	51.6	22	17.5	
女性	総数	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	1880	100.0	824	43.8	648	34.5	313	16.6	95	5.1
		85 cm(男) / 90 cm(女)	469	100.0	65	13.9	172	36.7	170	36.2	62	13.2
	20-29歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	103	100.0	97	94.2	6	5.8	0	0	0	0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	7	100.0	7	100.0	0	0	0	0	0	0
	30-39歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	359	100.0	305	85.0	49	13.6	4	1.1	1	0.3
		85 cm(男) / 90 cm(女)	19	100.0	11	57.9	6	31.6	2	10.5	0	0
	40-49歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	299	100.0	189	63.2	95	31.8	14	4.7	1	0.3
		85 cm(男) / 90 cm(女)	44	100.0	16	36.4	16	36.4	10	22.7	2	4.5
	50-59歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	372	100.0	123	33.1	166	44.6	65	17.5	18	4.8
		85 cm(男) / 90 cm(女)	75	100.0	12	16.0	33	44.0	23	30.7	7	9.3
	60-69歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	372	100.0	82	22.0	161	43.3	100	26.9	29	7.8
		85 cm(男) / 90 cm(女)	148	100.0	9	6.1	54	36.5	60	40.5	25	16.9
	70歳以上	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	375	100.0	28	7.5	171	45.6	130	34.7	46	12.3
		85 cm(男) / 90 cm(女)	176	100.0	10	5.7	63	35.8	75	42.6	28	15.9
(再掲) 40-74歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	1195	100.0	413	34.6	485	40.6	229	19.2	68	5.7	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	337	100.0	43	12.8	125	37.1	123	36.5	46	13.6	
(再掲) 65-74歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	303	100.0	45	14.9	126	41.6	96	31.7	36	11.9	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	149	100.0	11	7.4	44	29.5	66	44.3	28	18.8	
(再掲) 75歳以上	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	223	100.0	9	4.0	108	48.4	80	35.9	26	11.7	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	106	100.0	4	3.8	41	38.7	45	42.5	16	15.1	
総数	総数	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	2603	100.0	1073	41.2	962	37.0	446	17.1	122	4.7
		85 cm(男) / 90 cm(女)	1361	100.0	159	11.7	536	39.4	506	37.2	160	11.8
	20-29歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	174	100.0	151	86.8	22	12.6	1	0.6	0	0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	24	100.0	16	66.7	5	20.8	2	8.3	1	4.2
	30-39歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	470	100.0	388	82.6	74	15.7	7	1.5	1	0.2
		85 cm(男) / 90 cm(女)	108	100.0	35	32.4	54	50.0	16	14.8	3	2.8
	40-49歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	398	100.0	237	59.5	138	34.7	21	5.3	2	0.5
		85 cm(男) / 90 cm(女)	155	100.0	40	25.8	68	43.9	39	25.2	8	5.2
	50-59歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	489	100.0	150	30.7	227	46.4	92	18.8	20	4.1
		85 cm(男) / 90 cm(女)	222	100.0	25	11.3	101	45.5	80	36.0	16	7.2
	60-69歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	518	100.0	108	20.8	236	45.6	136	26.3	38	7.3
		85 cm(男) / 90 cm(女)	411	100.0	20	4.9	157	38.2	175	42.6	59	14.4
	70歳以上	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	554	100.0	39	7.0	265	47.8	189	34.1	61	11.0
		85 cm(男) / 90 cm(女)	441	100.0	23	5.2	151	34.2	194	44.0	73	16.6
(再掲) 40-74歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	1615	100.0	520	32.2	696	43.1	317	19.6	82	5.1	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	997	100.0	96	9.6	405	40.6	378	37.9	118	11.8	
(再掲) 65-74歳	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	423	100.0	59	13.9	190	44.9	133	31.4	41	9.7	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	420	100.0	19	4.5	148	35.2	183	43.6	70	16.7	
(再掲) 75歳以上	< 85 cm(男) / < 90 cm(女)	344	100.0	14	4.1	170	49.4	121	35.2	39	11.3	
	85 cm(男) / 90 cm(女)	232	100.0	12	5.2	72	31.0	110	47.4	38	16.4	

注) 妊婦除外，ヘモグロビン A<sub>1c</sub> 5.5%の場合 項目の基準は p.55 参照

第48表の2 腹囲区分別，血中脂質，血圧，血糖のリスクの保有状況 [すべての組み合わせ 血中脂質 血圧 血糖] (性・年齢階級別)

性別	年齢(歳)	腹囲異常	リスク保有組み合わせ																	
			総数		有有有		有有無		無有有		有無有		有無無		無有無		無無有		無無無	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	<85cm(男) / <90cm(女)	723	100.0	27	3.7	30	4.1	97	13.4	6	0.8	13	1.8	264	36.5	37	5.1	249	34.4
		85cm(男) / 90cm(女)	892	100.0	98	11.0	86	9.6	236	26.5	14	1.6	23	2.6	300	33.6	41	4.6	94	10.5
20-29歳		<85cm(男) / <90cm(女)	71	100.0	0	0	0	0	0	0	1	1.4	0	0	16	22.5	0	0	54	76.1
		85cm(男) / 90cm(女)	17	100.0	1	5.9	2	11.8	0	0	0	0	1	5.9	4	23.5	0	0	9	52.9
30-39歳		<85cm(男) / <90cm(女)	111	100.0	0	0	1	0.9	2	1.8	0	0	2	1.8	22	19.8	1	0.9	83	74.8
		85cm(男) / 90cm(女)	89	100.0	3	3.4	5	5.6	9	10.1	0	0	10	11.2	32	36.0	6	6.7	24	27.0
40-49歳		<85cm(男) / <90cm(女)	99	100.0	1	1.0	3	3.0	4	4.0	0	0	4	4.0	33	33.3	6	6.1	48	48.5
		85cm(男) / 90cm(女)	111	100.0	6	5.4	5	4.5	21	18.9	3	2.7	4	3.6	41	36.9	7	6.3	24	21.6
50-59歳		<85cm(男) / <90cm(女)	117	100.0	2	1.7	7	6.0	18	15.4	2	1.7	2	1.7	49	41.9	10	8.5	27	23.1
		85cm(男) / 90cm(女)	147	100.0	9	6.1	16	10.9	40	27.2	1	0.7	1	0.7	57	38.8	10	6.8	13	8.8
60-69歳		<85cm(男) / <90cm(女)	146	100.0	9	6.2	8	5.5	26	17.8	2	1.4	1	0.7	62	42.5	12	8.2	26	17.8
		85cm(男) / 90cm(女)	263	100.0	34	12.9	26	9.9	82	31.2	7	2.7	6	2.3	88	33.5	9	3.4	11	4.2
70歳以上		<85cm(男) / <90cm(女)	179	100.0	15	8.4	11	6.1	47	26.3	1	0.6	4	2.2	82	45.8	8	4.5	11	6.1
		85cm(男) / 90cm(女)	265	100.0	45	17.0	32	12.1	84	31.7	3	1.1	1	0.4	78	29.4	9	3.4	13	4.9
(再掲)40-74歳		<85cm(男) / <90cm(女)	420	100.0	14	3.3	19	4.5	64	15.2	5	1.2	9	2.1	171	40.7	31	7.4	107	25.5
		85cm(男) / 90cm(女)	660	100.0	72	10.9	62	9.4	182	27.6	11	1.7	12	1.8	239	36.2	29	4.4	53	8.0
(再掲)65-74歳		<85cm(男) / <90cm(女)	120	100.0	5	4.2	6	5.0	28	23.3	3	2.5	2	1.7	51	42.5	11	9.2	14	11.7
		85cm(男) / 90cm(女)	271	100.0	42	15.5	30	11.1	85	31.4	2	0.7	4	1.5	94	34.7	6	2.2	8	3.0
(再掲)75歳以上		<85cm(男) / <90cm(女)	121	100.0	13	10.7	10	8.3	31	25.6	0	0	2	1.7	55	45.5	5	4.1	5	4.1
		85cm(男) / 90cm(女)	126	100.0	22	17.5	17	13.5	45	35.7	3	2.4	0	0	25	19.8	6	4.8	8	6.3
女性	総数	<85cm(男) / <90cm(女)	1880	100.0	95	5.1	84	4.5	207	11.0	22	1.2	23	1.2	472	25.1	153	8.1	824	43.8
		85cm(男) / 90cm(女)	469	100.0	62	13.2	42	9.0	122	26.0	6	1.3	5	1.1	141	30.1	26	5.5	65	13.9
20-29歳		<85cm(男) / <90cm(女)	103	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4.9	1	1.0	97	94.2
		85cm(男) / 90cm(女)	7	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳		<85cm(男) / <90cm(女)	359	100.0	1	0.3	0	0	4	1.1	0	0	2	0.6	25	7.0	22	6.1	305	85.0
		85cm(男) / 90cm(女)	19	100.0	0	0	1	5.3	1	5.3	0	0	0	0	3	15.8	3	15.8	11	57.9
40-49歳		<85cm(男) / <90cm(女)	299	100.0	1	0.3	0	0	14	4.7	0	0	2	0.7	59	19.7	34	11.4	189	63.2
		85cm(男) / 90cm(女)	44	100.0	2	4.5	1	2.3	9	20.5	0	0	1	2.3	12	27.3	3	6.8	16	36.4
50-59歳		<85cm(男) / <90cm(女)	372	100.0	18	4.8	15	4.0	42	11.3	8	2.2	6	1.6	113	30.4	47	12.6	123	33.1
		85cm(男) / 90cm(女)	75	100.0	7	9.3	4	5.3	19	25.3	0	0	0	0	29	38.7	4	5.3	12	16.0
60-69歳		<85cm(男) / <90cm(女)	372	100.0	29	7.8	28	7.5	63	16.9	9	2.4	6	1.6	123	33.1	32	8.6	82	22.0
		85cm(男) / 90cm(女)	148	100.0	25	16.9	14	9.5	42	28.4	4	2.7	0	0	45	30.4	9	6.1	9	6.1
70歳以上		<85cm(男) / <90cm(女)	375	100.0	46	12.3	41	10.9	84	22.4	5	1.3	7	1.9	147	39.2	17	4.5	28	7.5
		85cm(男) / 90cm(女)	176	100.0	28	15.9	22	12.5	51	29.0	2	1.1	4	2.3	52	29.5	7	4.0	10	5.7
(再掲)40-74歳		<85cm(男) / <90cm(女)	1195	100.0	68	5.7	59	4.9	148	12.4	22	1.8	18	1.5	347	29.0	120	10.0	413	34.6
		85cm(男) / 90cm(女)	337	100.0	46	13.6	30	8.9	87	25.8	6	1.8	3	0.9	104	30.9	18	5.3	43	12.8
(再掲)65-74歳		<85cm(男) / <90cm(女)	303	100.0	36	11.9	29	9.6	57	18.8	10	3.3	6	2.0	105	34.7	15	5.0	45	14.9
		85cm(男) / 90cm(女)	149	100.0	28	18.8	19	12.8	41	27.5	6	4.0	2	1.3	38	25.5	4	2.7	11	7.4
(再掲)75歳以上		<85cm(男) / <90cm(女)	223	100.0	26	11.7	25	11.2	55	24.7	0	0	3	1.3	95	42.6	10	4.5	9	4.0
		85cm(男) / 90cm(女)	106	100.0	16	15.1	11	10.4	34	32.1	0	0	2	1.9	34	32.1	5	4.7	4	3.8
総数	総数	<85cm(男) / <90cm(女)	2603	100.0	122	4.7	114	4.4	304	11.7	28	1.1	36	1.4	736	28.3	190	7.3	1073	41.2
		85cm(男) / 90cm(女)	1361	100.0	160	11.8	128	9.4	358	26.3	20	1.5	28	2.1	441	32.4	67	4.9	159	11.7
20-29歳		<85cm(男) / <90cm(女)	174	100.0	0	0	0	0	0	0	1	0.6	0	0	21	12.1	1	0.6	151	86.8
		85cm(男) / 90cm(女)	24	100.0	1	4.2	2	8.3	0	0	0	0	1	4.2	4	16.7	0	0	16	66.7
30-39歳		<85cm(男) / <90cm(女)	470	100.0	1	0.2	1	0.2	6	1.3	0	0	4	0.9	47	10.0	23	4.9	388	82.6
		85cm(男) / 90cm(女)	108	100.0	3	2.8	6	5.6	10	9.3	0	0	10	9.3	35	32.4	9	8.3	35	32.4
40-49歳		<85cm(男) / <90cm(女)	398	100.0	2	0.5	3	0.8	18	4.5	0	0	6	1.5	92	23.1	40	10.1	237	59.5
		85cm(男) / 90cm(女)	155	100.0	8	5.2	6	3.9	30	19.4	3	1.9	5	3.2	53	34.2	10	6.5	40	25.8
50-59歳		<85cm(男) / <90cm(女)	489	100.0	20	4.1	22	4.5	60	12.3	10	2.0	8	1.6	162	33.1	57	11.7	150	30.7
		85cm(男) / 90cm(女)	222	100.0	16	7.2	20	9.0	59	26.6	1	0.5	1	0.5	86	38.7	14	6.3	25	11.3
60-69歳		<85cm(男) / <90cm(女)	518	100.0	38	7.3	36	6.9	89	17.2	11	2.1	7	1.4	185	35.7	44	8.5	108	20.8
		85cm(男) / 90cm(女)	411	100.0	59	14.4	40	9.7	124	30.2	11	2.7	6	1.5	133	32.4	18	4.4	20	4.9
70歳以上		<85cm(男) / <90cm(女)	554	100.0	61	11.0	52	9.4	131	23.6	6	1.1	11	2.0	229	41.3	25	4.5	39	7.0
		85cm(男) / 90cm(女)	441	100.0	73	16.6	54	12.2	135	30.6	5	1.1	5	1.1	130	29.5	16	3.6	23	5.2
(再掲)40-74歳		<85cm(男) / <90cm(女)	1615	100.0	82	5.1	78	4.8	212	13.1	27	1.7	27	1.7	518	32.1	151	9.3	520	32.2
		85cm(男) / 90cm(女)	997	100.0	118	11.8	92	9.2	269	27.0	17	1.7	15	1.5	343	34.4	47	4.7	96	9.6
(再掲)65-74歳		<85cm(男) / <90cm(女)	423	100.0	41	9.7	35	8.3	85	20.1	13	3.1	8	1.9	156	36.9	26	6.1	59	13.9
		85cm(男) / 90cm(女)	420	100.0	70	16.7	49	11.7	126	30.0	8	1.9	6	1.4	132	31.4	10	2.4	19	4.5
(再掲)75歳以上		<85cm(男) / <90cm(女)	344	100.0	39	11.3	35	10.2	86	25.0	0	0	5	1.5	150	43.6	15	4.4	14	4.1
		85cm(男) / 90cm(女)	232	100.0	38	16.4	28	12.1	79	34.1	3	1.3	2	0.9	59	25.4	11	4.7	12	5.2

注) 妊婦除外，ヘモグロビン A1c 5.5%の場合 リスクの項目の基準は p.55 参照

第 49 表の 1-1 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定できない人」の状況  
(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																				
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
性別 男性	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	247	15.3	1	1.1	6	3.0	16	7.6	32	12.1	91	22.1	101	22.6	186	17.2	99	25.3	54	21.7	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	120	7.4	1	1.1	2	1.0	8	3.8	8	3.0	50	12.2	51	11.4	94	8.7	55	14.1	23	9.2	
	糖尿病の可能性を否定できない人	226	14.0	0	0	6	3.0	23	11.0	44	16.7	71	17.3	82	18.4	170	15.7	71	18.2	50	20.1	
	上記以外	1146	70.8	87	98.9	188	94.0	171	81.4	188	71.2	249	60.6	263	59.0	726	67.1	221	56.5	145	58.2	
	総数	1619	100	88	100	200	100	210	100	264	100	411	100	446	100	1082	100	391	100	249	100	
女性	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	173	7.3	0	0	2	0.5	10	2.9	25	5.6	74	14.1	62	11.0	132	8.6	65	14.2	39	11.6	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	73	3.1	0	0	0	0	3	0.9	5	1.1	38	7.3	27	4.8	55	3.6	31	6.8	18	5.3	
	糖尿病の可能性を否定できない人	380	15.9	1	0.9	21	5.4	36	10.4	93	20.8	95	18.2	134	23.8	273	17.7	91	19.9	85	25.2	
	上記以外	1831	76.8	115	99.1	366	94.1	301	86.7	329	73.6	354	67.7	366	65.1	1137	73.7	301	65.9	213	63.2	
	総数	2384	100	116	100	389	100	347	100	447	100	523	100	562	100	1542	100	457	100	337	100	
総数	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	420	10.5	1	0.5	8	1.4	26	4.7	57	8.0	165	17.7	163	16.2	318	12.1	164	19.3	93	15.9	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	193	4.8	1	0.5	2	0.3	11	2.0	13	1.8	88	9.4	78	7.7	149	5.7	86	10.1	41	7.0	
	糖尿病の可能性を否定できない人	606	15.1	1	0.5	27	4.6	59	10.6	137	19.3	166	17.8	216	21.4	443	16.9	162	19.1	135	23.0	
	上記以外	2977	74.4	202	99.0	554	94.1	472	84.7	517	72.7	603	64.6	629	62.4	1863	71.0	522	61.6	358	61.1	
	総数	4003	100	204	100	589	100	557	100	711	100	934	100	1008	100	2624	100	848	100	586	100	

注) ヘモグロビン A<sub>1c</sub> 5.6%の場合 判定の基準は p.44 参照  
「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

第 49 表の 1-2 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定できない人」の状況  
(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																				
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
性別 男性	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	247	15.3	1	1.1	6	3.0	16	7.6	32	12.1	91	22.1	101	22.6	186	17.2	99	25.3	54	21.7	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	120	7.4	1	1.1	2	1.0	8	3.8	8	3.0	50	12.2	51	11.4	94	8.7	55	14.1	23	9.2	
	糖尿病の可能性を否定できない人	226	14.0	0	0	6	3.0	23	11.0	44	16.7	71	17.3	82	18.4	170	15.7	71	18.2	50	20.1	
	上記以外	1146	70.8	87	98.9	188	94.0	171	81.4	188	71.2	249	60.6	263	59.0	726	67.1	221	56.5	145	58.2	
	総数	1619	100	88	100	200	100	210	100	264	100	411	100	446	100	1082	100	391	100	249	100	
女性	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	173	7.3	0	0	2	0.5	10	2.9	25	5.6	74	14.1	62	11.0	132	8.6	65	14.2	39	11.6	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	73	3.1	0	0	0	0	3	0.9	5	1.1	38	7.3	27	4.8	55	3.6	31	6.8	18	5.3	
	糖尿病の可能性を否定できない人	379	16.0	0	0	21	5.6	36	10.4	93	20.8	95	18.2	134	23.8	273	17.7	91	19.9	85	25.2	
	上記以外	1816	76.7	111	100	355	93.9	301	86.7	329	73.6	354	67.7	366	65.1	1137	73.7	301	65.9	213	63.2	
	総数	2368	100	111	100	378	100	347	100	447	100	523	100	562	100	1542	100	457	100	337	100	
総数	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	420	10.5	1	0.5	8	1.4	26	4.7	57	8.0	165	17.7	163	16.2	318	12.1	164	19.3	93	15.9	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	193	4.8	1	0.5	2	0.3	11	2.0	13	1.8	88	9.4	78	7.7	149	5.7	86	10.1	41	7.0	
	糖尿病の可能性を否定できない人	605	15.2	0	0	27	4.7	59	10.6	137	19.3	166	17.8	216	21.4	443	16.9	162	19.1	135	23.0	
	上記以外	2962	74.3	198	99.5	543	93.9	472	84.7	517	72.7	603	64.6	629	62.4	1863	71.0	522	61.6	358	61.1	
	総数	3987	100	199	100	578	100	557	100	711	100	934	100	1008	100	2624	100	848	100	586	100	

注) 妊婦除外、ヘモグロビン A<sub>1c</sub> 5.6%の場合  
「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

第49表の2-1 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定できない人」の状況（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																				
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
性別 男性	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	247	15.3	1	1.1	6	3.0	16	7.6	32	12.1	91	22.1	101	22.6	186	17.2	99	25.3	54	21.7	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	120	7.4	1	1.1	2	1.0	8	3.8	8	3.0	50	12.2	51	11.4	94	8.7	55	14.1	23	9.2	
	糖尿病の可能性を否定できない人	314	19.4	1	1.1	15	7.5	33	15.7	60	22.7	92	22.4	113	25.3	227	21.0	85	21.7	71	28.5	
	上記以外	1058	65.3	86	97.7	179	89.5	161	76.7	172	65.2	228	55.5	232	52.0	669	61.8	207	52.9	124	49.8	
	総数	1619	100	88	100	200	100	210	100	264	100	411	100	446	100	1082	100	391	100	249	100	
女性	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	173	7.3	0	0	2	0.5	10	2.9	25	5.6	74	14.1	62	11.0	132	8.6	65	14.2	39	11.6	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	73	3.1	0	0	0	0	3	0.9	5	1.1	38	7.3	27	4.8	55	3.6	31	6.8	18	5.3	
	糖尿病の可能性を否定できない人	530	22.2	2	1.7	31	8.0	53	15.3	119	26.6	142	27.2	183	32.6	387	25.1	136	29.8	110	32.6	
	上記以外	1681	70.5	114	98.3	356	91.5	284	81.8	303	67.8	307	58.7	317	56.4	1023	66.3	256	56.0	188	55.8	
	総数	2384	100	116	100	389	100	347	100	447	100	523	100	562	100	1542	100	457	100	337	100	
総数	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	420	10.5	1	0.5	8	1.4	26	4.7	57	8.0	165	17.7	163	16.2	318	12.1	164	19.3	93	15.9	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	193	4.8	1	0.5	2	0.3	11	2.0	13	1.8	88	9.4	78	7.7	149	5.7	86	10.1	41	7.0	
	糖尿病の可能性を否定できない人	844	21.1	3	1.5	46	7.8	86	15.4	179	25.2	234	25.1	296	29.4	614	23.4	221	26.1	181	30.9	
	上記以外	2739	68.4	200	98.0	535	90.8	445	79.9	475	66.8	535	57.3	549	54.5	1692	64.5	463	54.6	312	53.2	
	総数	4003	100	204	100	589	100	557	100	711	100	934	100	1008	100	2624	100	848	100	586	100	

注) ヘモグロビン A<sub>1c</sub> 5.5%の場合

「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

第49表の2-2 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定できない人」の状況（性・年齢階級別）

		年齢(歳)																				
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
性別 男性	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	247	15.3	1	1.1	6	3.0	16	7.6	32	12.1	91	22.1	101	22.6	186	17.2	99	25.3	54	21.7	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	120	7.4	1	1.1	2	1.0	8	3.8	8	3.0	50	12.2	51	11.4	94	8.7	55	14.1	23	9.2	
	糖尿病の可能性を否定できない人	314	19.4	1	1.1	15	7.5	33	15.7	60	22.7	92	22.4	113	25.3	227	21.0	85	21.7	71	28.5	
	上記以外	1058	65.3	86	97.7	179	89.5	161	76.7	172	65.2	228	55.5	232	52.0	669	61.8	207	52.9	124	49.8	
	総数	1619	100	88	100	200	100	210	100	264	100	411	100	446	100	1082	100	391	100	249	100	
女性	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	173	7.3	0	0	2	0.5	10	2.9	25	5.6	74	14.1	62	11.0	132	8.6	65	14.2	39	11.6	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	73	3.1	0	0	0	0	3	0.9	5	1.1	38	7.3	27	4.8	55	3.6	31	6.8	18	5.3	
	糖尿病の可能性を否定できない人	527	22.3	1	0.9	29	7.7	53	15.3	119	26.6	142	27.2	183	32.6	387	25.1	136	29.8	110	32.6	
	上記以外	1668	70.4	110	99.1	347	91.8	284	81.8	303	67.8	307	58.7	317	56.4	1023	66.3	256	56.0	188	55.8	
	総数	2368	100	111	100	378	100	347	100	447	100	523	100	562	100	1542	100	457	100	337	100	
総数	糖尿病状況																					
	糖尿病が強く疑われる人	420	10.5	1	0.5	8	1.4	26	4.7	57	8.0	165	17.7	163	16.2	318	12.1	164	19.3	93	15.9	
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者	193	4.8	1	0.5	2	0.3	11	2.0	13	1.8	88	9.4	78	7.7	149	5.7	86	10.1	41	7.0	
	糖尿病の可能性を否定できない人	841	21.1	2	1.0	44	7.6	86	15.4	179	25.2	234	25.1	296	29.4	614	23.4	221	26.1	181	30.9	
	上記以外	2726	68.4	196	98.5	526	91.0	445	79.9	475	66.8	535	57.3	549	54.5	1692	64.5	463	54.6	312	53.2	
	総数	3987	100	199	100	578	100	557	100	711	100	934	100	1008	100	2624	100	848	100	586	100	

注) 妊婦除外、ヘモグロビン A<sub>1c</sub> 5.5%の場合

「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

第 50 表の 1 高血圧症有病者の状況（性・年齢階級別）

		年齢（歳）																			
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲） 40-74歳		（再掲） 65-74歳		（再掲） 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	高血圧症																				
	高血圧症有病者	921	53.4	8	8.3	35	16.3	71	31.8	168	59.4	278	65.0	361	75.4	671	58.8	291	70.6	207	76.1
	（再掲）高血圧症有病者のうち 服薬者	440	25.5	1	1.0	0	0	16	7.2	66	23.3	132	30.8	225	47.0	306	26.8	164	39.8	133	48.9
	正常高値血圧者	297	17.2	17	17.7	45	20.9	53	23.8	47	16.6	72	16.8	63	13.2	204	17.9	69	16.7	31	11.4
	上記以外	506	29.4	71	74.0	135	62.8	99	44.4	68	24.0	78	18.2	55	11.5	266	23.3	52	12.6	34	12.5
	総 数	1724	100	96	100	215	100	223	100	283	100	428	100	479	100	1141	100	412	100	272	100
女 性	高血圧症																				
	高血圧症有病者	1046	41.1	2	1.5	18	4.4	68	18.4	191	40.3	314	55.9	453	75.1	730	44.5	322	66.0	296	80.7
	（再掲）高血圧症有病者のうち 服薬者	581	22.8	0	0	2	0.5	15	4.1	74	15.6	182	32.4	308	51.1	370	22.5	201	41.2	209	56.9
	正常高値血圧者	290	11.4	4	3.0	23	5.7	42	11.4	75	15.8	87	15.5	59	9.8	233	14.2	60	12.3	30	8.2
	上記以外	1212	47.6	128	95.5	365	89.9	259	70.2	208	43.9	161	28.6	91	15.1	678	41.3	106	21.7	41	11.2
	総 数	2548	100	134	100	406	100	369	100	474	100	562	100	603	100	1641	100	488	100	367	100
総 数	高血圧症																				
	高血圧症有病者	1967	46.0	10	4.3	53	8.5	139	23.5	359	47.4	592	59.8	814	75.2	1401	50.4	613	68.1	503	78.7
	（再掲）高血圧症有病者のうち 服薬者	1021	23.9	1	0.4	2	0.3	31	5.2	140	18.5	314	31.7	533	49.3	676	24.3	365	40.6	342	53.5
	正常高値血圧者	587	13.7	21	9.1	68	11.0	95	16.0	122	16.1	159	16.1	122	11.3	437	15.7	129	14.3	61	9.5
	上記以外	1718	40.2	199	86.5	500	80.5	358	60.5	276	36.5	239	24.1	146	13.5	944	33.9	158	17.6	75	11.7
	総 数	4272	100	230	100	621	100	592	100	757	100	990	100	1082	100	2782	100	900	100	639	100

注) 判定の基準は p. 16 参照  
「服薬者」とは、質問票で「血圧を下げる薬」の使用有と回答した者

第 50 表の 2 高血圧症有病者の状況（性・年齢階級別）

		年齢（歳）																			
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲） 40-74歳		（再掲） 65-74歳		（再掲） 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	高血圧症																				
	高血圧症有病者	921	53.4	8	8.3	35	16.3	71	31.8	168	59.4	278	65.0	361	75.4	671	58.8	291	70.6	207	76.1
	（再掲）高血圧症有病者のうち 服薬者	440	25.5	1	1.0	0	0	16	7.2	66	23.3	132	30.8	225	47.0	306	26.8	164	39.8	133	48.9
	正常高値血圧者	297	17.2	17	17.7	45	20.9	53	23.8	47	16.6	72	16.8	63	13.2	204	17.9	69	16.7	31	11.4
	上記以外	506	29.4	71	74.0	135	62.8	99	44.4	68	24.0	78	18.2	55	11.5	266	23.3	52	12.6	34	12.5
	総 数	1724	100	96	100	215	100	223	100	283	100	428	100	479	100	1141	100	412	100	272	100
女 性	高血圧症																				
	高血圧症有病者	1045	41.3	2	1.6	17	4.3	68	18.4	191	40.3	314	55.9	453	75.1	730	44.5	322	66.0	296	80.7
	（再掲）高血圧症有病者のうち 服薬者	581	23.0	0	0	2	0.5	15	4.1	74	15.6	182	32.4	308	51.1	370	22.5	201	41.2	209	56.9
	正常高値血圧者	290	11.5	4	3.1	23	5.8	42	11.4	75	15.8	87	15.5	59	9.8	233	14.2	60	12.3	30	8.2
	上記以外	1194	47.2	121	95.3	354	89.8	259	70.2	208	43.9	161	28.6	91	15.1	678	41.3	106	21.7	41	11.2
	総 数	2529	100	127	100	394	100	369	100	474	100	562	100	603	100	1641	100	488	100	367	100
総 数	高血圧症																				
	高血圧症有病者	1966	46.2	10	4.5	52	8.5	139	23.5	359	47.4	592	59.8	814	75.2	1401	50.4	613	68.1	503	78.7
	（再掲）高血圧症有病者のうち 服薬者	1021	24.0	1	0.4	2	0.3	31	5.2	140	18.5	314	31.7	533	49.3	676	24.3	365	40.6	342	53.5
	正常高値血圧者	587	13.8	21	9.4	68	11.2	95	16.0	122	16.1	159	16.1	122	11.3	437	15.7	129	14.3	61	9.5
	上記以外	1700	40.0	192	86.1	489	80.3	358	60.5	276	36.5	239	24.1	146	13.5	944	33.9	158	17.6	75	11.7
	総 数	4253	100	223	100	609	100	592	100	757	100	990	100	1082	100	2782	100	900	100	639	100

注) 妊婦除外  
「服薬者」とは、質問票で「血圧を下げる薬」の使用有と回答した者



第51表の1-1 「脂質異常症が疑われる人」の状況（採血時間によらず，性・年齢階級別）

性別	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外	年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	脂質異常症	299	18.4	5	5.6	21	10.5	26	12.4	40	15.1	95	23.1	112	25.1	206	19.0	95	24.2	67	26.8
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	150	9.2	0	0	3	1.5	10	4.8	14	5.3	54	13.1	69	15.4	104	9.6	54	13.8	43	17.2
	上記以外	1324	81.6	84	94.4	179	89.5	184	87.6	225	84.9	317	76.9	335	74.9	878	81.0	297	75.8	183	73.2
	総数	1623	100	89	100	200	100	210	100	265	100	412	100	447	100	1084	100	392	100	250	100
女性	脂質異常症	344	14.4	0	0	4	1.0	7	2.0	59	13.1	116	22.2	158	28.1	255	16.5	137	30.0	85	25.1
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	302	12.6	0	0	1	0.3	6	1.7	55	12.2	102	19.5	138	24.6	225	14.6	118	25.9	76	22.5
	上記以外	2044	85.6	118	100	386	99.0	339	98.0	390	86.9	407	77.8	404	71.9	1287	83.5	319	70.0	253	74.9
	総数	2388	100	118	100	390	100	346	100	449	100	523	100	562	100	1542	100	456	100	338	100
総数	脂質異常症	643	16.0	5	2.4	25	4.2	33	5.9	99	13.9	211	22.6	270	26.8	461	17.6	232	27.4	152	25.9
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	452	11.3	0	0	4	0.7	16	2.9	69	9.7	156	16.7	207	20.5	329	12.5	172	20.3	119	20.2
	上記以外	3368	84.0	202	97.6	565	95.8	523	94.1	615	86.1	724	77.4	739	73.2	2165	82.4	616	72.6	436	74.1
	総数	4011	100	207	100	590	100	556	100	714	100	935	100	1009	100	2626	100	848	100	588	100

「服薬者」とは、質問票で「コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬」の使用有と回答した者

「脂質異常症が疑われる人」の判定

国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記の通りとした。

・「脂質異常症が疑われる人」

HDL コレステロールが40mg/dl未滿、もしくはコレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬を服用している者。

第51表の1-2 「脂質異常症が疑われる人」の状況（採血時間によらず，性・年齢階級別）

性別	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外	年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	脂質異常症	299	18.4	5	5.6	21	10.5	26	12.4	40	15.1	95	23.1	112	25.1	206	19.0	95	24.2	67	26.8
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	150	9.2	0	0	3	1.5	10	4.8	14	5.3	54	13.1	69	15.4	104	9.6	54	13.8	43	17.2
	上記以外	1324	81.6	84	94.4	179	89.5	184	87.6	225	84.9	317	76.9	335	74.9	878	81.0	297	75.8	183	73.2
	総数	1623	100	89	100	200	100	210	100	265	100	412	100	447	100	1084	100	392	100	250	100
女性	脂質異常症	344	14.5	0	0	4	1.1	7	2.0	59	13.1	116	22.2	158	28.1	255	16.5	137	30.0	85	25.1
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	302	12.7	0	0	1	0.3	6	1.7	55	12.2	102	19.5	138	24.6	225	14.6	118	25.9	76	22.5
	上記以外	2028	85.5	113	100	375	98.9	339	98.0	390	86.9	407	77.8	404	71.9	1287	83.5	319	70.0	253	74.9
	総数	2372	100	113	100	379	100	346	100	449	100	523	100	562	100	1542	100	456	100	338	100
総数	脂質異常症	643	16.1	5	2.5	25	4.3	33	5.9	99	13.9	211	22.6	270	26.8	461	17.6	232	27.4	152	25.9
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	452	11.3	0	0	4	0.7	16	2.9	69	9.7	156	16.7	207	20.5	329	12.5	172	20.3	119	20.2
	上記以外	3352	83.9	197	97.5	554	95.7	523	94.1	615	86.1	724	77.4	739	73.2	2165	82.4	616	72.6	436	74.1
	総数	3995	100	202	100	579	100	556	100	714	100	935	100	1009	100	2626	100	848	100	588	100

注) 妊婦除外

「服薬者」とは、質問票で「コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬」の使用有と回答した者

第 51 表の 2-1 「脂質異常症が疑われる人」の状況（採血時間によらず，動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007 年版の基準，Friedewald の式，性・年齢階級別）

性別	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外 総 数	年齢(歳)																			
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外 総 数	758	47.8	26	29.9	94	49.5	116	57.1	144	54.8	197	49.1	181	40.9	547	51.5	179	46.4	91	36.7
女性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外 総 数	848	35.8	6	5.2	65	16.8	97	28.1	193	43.3	254	49.4	233	41.8	641	42.0	209	46.3	136	40.6
総 数	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外 総 数	1606	40.6	32	15.8	159	27.6	213	38.9	337	47.5	451	49.3	414	41.4	1188	45.9	388	46.4	227	38.9

「服薬者」とは，質問票で「コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬」の使用有と回答した者

「脂質異常症が疑われる人」の判定（定義）「動脈硬化性疾患予防ガイドライン（2007 年版）」の基準  
LDL コレステロール（Friedewald の式で算出）140mg/dl 以上，または，中性脂肪（トリグリセライド）150mg/dl 以上，または，HDL コレステロール 40mg/dl 未満

Friedewald の式 LDL コレステロール = 総コレステロール - HDL コレステロール - 中性脂肪 / 5  
(中性脂肪（トリグリセライド）が 400mg/dl 未満の場合。)

第 51 表の 2-2 「脂質異常症が疑われる人」の状況（採血時間によらず，動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007 年版の基準，Friedewald の式，性・年齢階級別）

性別	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外 総 数	年齢(歳)																			
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外 総 数	758	47.8	26	29.9	94	49.5	116	57.1	144	54.8	197	49.1	181	40.9	547	51.5	179	46.4	91	36.7
女性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外 総 数	840	35.7	5	4.5	58	15.4	97	28.1	193	43.3	254	49.4	233	41.8	641	42.0	209	46.3	136	40.6
総 数	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外 総 数	1598	40.6	31	15.7	152	26.8	213	38.9	337	47.5	451	49.3	414	41.4	1188	45.9	388	46.4	227	38.9

注) 妊婦除外

「服薬者」とは，質問票で「コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬」の使用有と回答した者

第51表の3-1 「脂質異常症が疑われる人」の状況（食後6時間以上の者のみ、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版の基準、Friedewaldの式、性・年齢階級別）

性別	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外 総数	年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	327	49.4	9	22.5	50	47.6	53	49.1	76	52.4	90	54.9	49	49.0	245	52.4	60	48.8	23	46.9
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	58	8.8	0	0	0	0	6	5.6	9	6.2	25	15.2	18	18.0	47	10.0	16	13.0	11	22.4
	上記以外	335	50.6	31	77.5	55	52.4	55	50.9	69	47.6	74	45.1	51	51.0	223	47.6	63	51.2	26	53.1
	総数	662	100	40	100	105	100	108	100	145	100	164	100	100	100	468	100	123	100	49	100
女性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	313	39.7	3	6.4	22	15.1	40	29.9	90	52.9	83	53.2	75	55.1	241	47.6	67	57.3	47	52.2
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	82	10.4	0	0	1	0.7	3	2.2	25	14.7	21	13.5	32	23.5	63	12.5	27	23.1	18	20.0
	上記以外	476	60.3	44	93.6	124	84.9	94	70.1	80	47.1	73	46.8	61	44.9	265	52.4	50	42.7	43	47.8
	総数	789	100	47	100	146	100	134	100	170	100	156	100	136	100	506	100	117	100	90	100
総数	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	640	44.1	12	13.8	72	28.7	93	38.4	166	52.7	173	54.1	124	52.5	486	49.9	127	52.9	70	50.4
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	140	9.6	0	0	1	0.4	9	3.7	34	10.8	46	14.4	50	21.2	110	11.3	43	17.9	29	20.9
	上記以外	811	55.9	75	86.2	179	71.3	149	61.6	149	47.3	147	45.9	112	47.5	488	50.1	113	47.1	69	49.6
	総数	1451	100	87	100	251	100	242	100	315	100	320	100	236	100	974	100	240	100	139	100

「服薬者」とは、質問票で「コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬」の使用有と回答した者

「脂質異常症が疑われる人」の判定（定義）「動脈硬化性疾患予防ガイドライン（2007年版）」の基準

LDL コレステロール（Friedewaldの式で算出）140mg/dl以上、または、中性脂肪（トリグリセライド）150mg/dl以上、または、HDL コレステロール40mg/dl未満

Friedewaldの式 LDL コレステロール = 総コレステロール - HDL コレステロール - 中性脂肪/5  
（中性脂肪（トリグリセライド）が400mg/dl未満の場合。）

第51表の3-2 「脂質異常症が疑われる人」の状況（食後6時間以上の者のみ、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版の基準、Friedewaldの式、性・年齢階級別）

性別	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者 上記以外 総数	年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	327	49.4	9	22.5	50	47.6	53	49.1	76	52.4	90	54.9	49	49.0	245	52.4	60	48.8	23	46.9
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	58	8.8	0	0	0	0	6	5.6	9	6.2	25	15.2	18	18.0	47	10.0	16	13.0	11	22.4
	上記以外	335	50.6	31	77.5	55	52.4	55	50.9	69	47.6	74	45.1	51	51.0	223	47.6	63	51.2	26	53.1
	総数	662	100	40	100	105	100	108	100	145	100	164	100	100	100	468	100	123	100	49	100
女性	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	311	39.7	3	6.7	20	14.0	40	29.9	90	52.9	83	53.2	75	55.1	241	47.6	67	57.3	47	52.2
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	82	10.5	0	0	1	0.7	3	2.2	25	14.7	21	13.5	32	23.5	63	12.5	27	23.1	18	20.0
	上記以外	473	60.3	42	93.3	123	86.0	94	70.1	80	47.1	73	46.8	61	44.9	265	52.4	50	42.7	43	47.8
	総数	784	100	45	100	143	100	134	100	170	100	156	100	136	100	506	100	117	100	90	100
総数	脂質異常症 脂質異常症が疑われる人	638	44.1	12	14.1	70	28.2	93	38.4	166	52.7	173	54.1	124	52.5	486	49.9	127	52.9	70	50.4
	(再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	140	9.7	0	0	1	0.4	9	3.7	34	10.8	46	14.4	50	21.2	110	11.3	43	17.9	29	20.9
	上記以外	808	55.9	73	85.9	178	71.8	149	61.6	149	47.3	147	45.9	112	47.5	488	50.1	113	47.1	69	49.6
	総数	1446	100	85	100	248	100	242	100	315	100	320	100	236	100	974	100	240	100	139	100

注) 妊婦除外

「服薬者」とは、質問票で「コレステロールを下げる薬または中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬」の使用有と回答した者

(参考) 第 51 表の 4-1 「脂質異常症が疑われる人」の状況 (採血時間によらず, 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007 年版の基準, 直接測定法, 性・年齢階級別)

		年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	脂質異常症	839	51.7	32	36.0	110	55.0	131	62.4	159	60.0	217	52.7	190	42.5	602	55.5	195	49.7	95	38.0
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	78	4.8	0	0	3	1.5	9	4.3	8	3.0	29	7.0	29	6.5	58	5.4	28	7.1	17	6.8
	上記以外	784	48.3	57	64.0	90	45.0	79	37.6	106	40.0	195	47.3	257	57.5	482	44.5	197	50.3	155	62.0
	総数	1623	100	89	100	200	100	210	100	265	100	412	100	447	100	1084	100	392	100	250	100
女性	脂質異常症	996	41.7	10	8.5	80	20.5	118	34.1	233	51.9	289	55.3	266	47.3	750	48.6	235	51.5	156	46.2
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	143	6.0	0	0	0	0	4	1.2	28	6.2	50	9.6	61	10.9	109	7.1	53	11.6	34	10.1
	上記以外	1392	58.3	108	91.5	310	79.5	228	65.9	216	48.1	234	44.7	296	52.7	792	51.4	221	48.5	182	53.8
	総数	2388	100	118	100	390	100	346	100	449	100	523	100	562	100	1542	100	456	100	338	100
総数	脂質異常症	1835	45.7	42	20.3	190	32.2	249	44.8	392	54.9	506	54.1	456	45.2	1352	51.5	430	50.7	251	42.7
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	221	5.5	0	0	3	0.5	13	2.3	36	5.0	79	8.4	90	8.9	167	6.4	81	9.6	51	8.7
	上記以外	2176	54.3	165	79.7	400	67.8	307	55.2	322	45.1	429	45.9	553	54.8	1274	48.5	418	49.3	337	57.3
	総数	4011	100	207	100	590	100	556	100	714	100	935	100	1009	100	2626	100	848	100	588	100

「服薬者」とは、質問票で「コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用有と回答した者

「脂質異常症が疑われる人」の判定(定義)「動脈硬化性疾患予防ガイドライン(2007年版)」の基準  
LDL コレステロール(Friedewaldの式で算出)140mg/dl以上,または,中性脂肪(トリグリセライド)150mg/dl以上,または,HDL コレステロール40mg/dl未満

(参考) 第 51 表の 4-2 「脂質異常症が疑われる人」の状況 (採血時間によらず, 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007 年版の基準, 直接測定法, 性・年齢階級別)

		年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	脂質異常症	839	51.7	32	36.0	110	55.0	131	62.4	159	60.0	217	52.7	190	42.5	602	55.5	195	49.7	95	38.0
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	78	4.8	0	0	3	1.5	9	4.3	8	3.0	29	7.0	29	6.5	58	5.4	28	7.1	17	6.8
	上記以外	784	48.3	57	64.0	90	45.0	79	37.6	106	40.0	195	47.3	257	57.5	482	44.5	197	50.3	155	62.0
	総数	1623	100	89	100	200	100	210	100	265	100	412	100	447	100	1084	100	392	100	250	100
女性	脂質異常症	987	41.6	9	8.0	72	19.0	118	34.1	233	51.9	289	55.3	266	47.3	750	48.6	235	51.5	156	46.2
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	143	6.0	0	0	0	0	4	1.2	28	6.2	50	9.6	61	10.9	109	7.1	53	11.6	34	10.1
	上記以外	1385	58.4	104	92.0	307	81.0	228	65.9	216	48.1	234	44.7	296	52.7	792	51.4	221	48.5	182	53.8
	総数	2372	100	113	100	379	100	346	100	449	100	523	100	562	100	1542	100	456	100	338	100
総数	脂質異常症	1826	45.7	41	20.3	182	31.4	249	44.8	392	54.9	506	54.1	456	45.2	1352	51.5	430	50.7	251	42.7
	脂質異常症が疑われる人 (再掲)脂質異常症が疑われる 人のうち服薬者	221	5.5	0	0	3	0.5	13	2.3	36	5.0	79	8.4	90	8.9	167	6.4	81	9.6	51	8.7
	上記以外	2169	54.3	161	79.7	397	68.6	307	55.2	322	45.1	429	45.9	553	54.8	1274	48.5	418	49.3	337	57.3
	総数	3995	100	202	100	579	100	556	100	714	100	935	100	1009	100	2626	100	848	100	588	100

注) 妊婦除外

「服薬者」とは、質問票で「コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用有と回答した者

(参考) 第51表の5-1 「脂質異常症が疑われる人」の状況(食後6時間以上の者のみ,動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版の基準,直接測定法,性・年齢階級別)

		年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性別 男性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	360	53.5	11	27.5	57	52.3	60	54.5	85	57.8	95	57.6	52	51.0	267	56.4	64	52.0	25	49.0
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	58	8.6	0	0	0	0	6	5.5	9	6.1	25	15.2	18	17.6	47	9.9	16	13.0	11	21.6
	上記以外	313	46.5	29	72.5	52	47.7	50	45.5	62	42.2	70	42.4	50	49.0	206	43.6	59	48.0	26	51.0
	総数	673	100	40	100	109	100	110	100	147	100	165	100	102	100	473	100	123	100	51	100
女性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	358	44.9	4	8.3	29	19.9	47	34.8	104	60.8	92	57.9	82	59.4	274	53.5	74	62.2	51	56.0
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	82	10.3	0	0	1	0.7	3	2.2	25	14.6	21	13.2	32	23.2	63	12.3	27	22.7	18	19.8
	上記以外	439	55.1	44	91.7	117	80.1	88	65.2	67	39.2	67	42.1	56	40.6	238	46.5	45	37.8	40	44.0
	総数	797	100	48	100	146	100	135	100	171	100	159	100	138	100	512	100	119	100	91	100
総数	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	718	48.8	15	17.0	86	33.7	107	43.7	189	59.4	187	57.7	134	55.8	541	54.9	138	57.0	76	53.5
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	140	9.5	0	0	1	0.4	9	3.7	34	10.7	46	14.2	50	20.8	110	11.2	43	17.8	29	20.4
	上記以外	752	51.2	73	83.0	169	66.3	138	56.3	129	40.6	137	42.3	106	44.2	444	45.1	104	43.0	66	46.5
	総数	1470	100	88	100	255	100	245	100	318	100	324	100	240	100	985	100	242	100	142	100

「服薬者」とは、質問票で「コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用有と回答した者

(参考) 第51表の5-2 「脂質異常症が疑われる人」の状況(食後6時間以上の者のみ,動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007年版の基準,直接測定法,性・年齢階級別)

		年齢(歳)																			
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
性別 男性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	360	53.5	11	27.5	57	52.3	60	54.5	85	57.8	95	57.6	52	51.0	267	56.4	64	52.0	25	49.0
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	58	8.6	0	0	0	0	6	5.5	9	6.1	25	15.2	18	17.6	47	9.9	16	13.0	11	21.6
	上記以外	313	46.5	29	72.5	52	47.7	50	45.5	62	42.2	70	42.4	50	49.0	206	43.6	59	48.0	26	51.0
	総数	673	100	40	100	109	100	110	100	147	100	165	100	102	100	473	100	123	100	51	100
女性	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	356	44.9	4	8.7	27	18.9	47	34.8	104	60.8	92	57.9	82	59.4	274	53.5	74	62.2	51	56.0
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	82	10.4	0	0	1	0.7	3	2.2	25	14.6	21	13.2	32	23.2	63	12.3	27	22.7	18	19.8
	上記以外	436	55.1	42	91.3	116	81.1	88	65.2	67	39.2	67	42.1	56	40.6	238	46.5	45	37.8	40	44.0
	総数	792	100	46	100	143	100	135	100	171	100	159	100	138	100	512	100	119	100	91	100
総数	脂質異常症																				
	脂質異常症が疑われる人	716	48.9	15	17.4	84	33.3	107	43.7	189	59.4	187	57.7	134	55.8	541	54.9	138	57.0	76	53.5
	(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	140	9.6	0	0	1	0.4	9	3.7	34	10.7	46	14.2	50	20.8	110	11.2	43	17.8	29	20.4
	上記以外	749	51.1	71	82.6	168	66.7	138	56.3	129	40.6	137	42.3	106	44.2	444	45.1	104	43.0	66	46.5
	総数	1465	100	86	100	252	100	245	100	318	100	324	100	240	100	985	100	242	100	142	100

注) 妊婦除外

「服薬者」とは、質問票で「コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用有と回答した者

第 52 表 運動習慣の状況（性・年齢階級別）

		年齢（歳）																	
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲） 65-74歳		（再掲） 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	運動習慣																		
	習慣無（健康上の理由）	110	5.4	0	0	2	0.7	4	1.5	10	2.8	23	4.9	71	13.8	34	7.8	52	17.6
	習慣無（その他）	1321	65.4	102	77.3	219	80.5	210	76.9	272	76.2	277	58.8	241	46.9	200	45.7	144	48.6
	運動の習慣有	588	29.1	30	22.7	51	18.8	59	21.6	75	21.0	171	36.3	202	39.3	204	46.6	100	33.8
	総 数	2019	100	132	100	272	100	273	100	357	100	471	100	514	100	438	100	296	100
女 性	運動習慣																		
	習慣無（健康上の理由）	225	8.0	2	1.2	4	0.9	8	2.0	24	4.6	43	7.2	144	21.8	69	13.3	104	25.1
	習慣無（その他）	1856	66.3	144	84.7	370	82.8	331	81.9	366	70.7	316	52.8	329	49.8	246	47.4	208	50.2
	運動の習慣有	717	25.6	24	14.1	73	16.3	65	16.1	128	24.7	239	40.0	188	28.4	204	39.3	102	24.6
	総 数	2798	100	170	100	447	100	404	100	518	100	598	100	661	100	519	100	414	100
総 数	運動習慣																		
	習慣無（健康上の理由）	335	7.0	2	0.7	6	0.8	12	1.8	34	3.9	66	6.2	215	18.3	103	10.8	156	22.0
	習慣無（その他）	3177	66.0	246	81.5	589	81.9	541	79.9	638	72.9	593	55.5	570	48.5	446	46.6	352	49.6
	運動の習慣有	1305	27.1	54	17.9	124	17.2	124	18.3	203	23.2	410	38.4	390	33.2	408	42.6	202	28.5
	総 数	4817	100	302	100	719	100	677	100	875	100	1069	100	1175	100	957	100	710	100

第 53 表 1 週間の運動日数（性・年齢階級別）

		年齢（歳）																	
		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲） 65-74歳		（再掲） 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性 別 男 性	運動日数																		
	運動無し	1431	70.9	102	77.3	221	81.3	214	78.4	282	79.0	300	63.7	312	60.7	234	53.4	196	66.2
	2日/週	136	6.7	12	9.1	21	7.7	25	9.2	23	6.4	27	5.7	28	5.4	33	7.5	13	4.4
	3日/週	81	4.0	3	2.3	6	2.2	9	3.3	8	2.2	32	6.8	23	4.5	26	5.9	14	4.7
	4日/週	70	3.5	6	4.5	10	3.7	3	1.1	12	3.4	21	4.5	18	3.5	24	5.5	7	2.4
	5日/週	78	3.9	4	3.0	8	2.9	8	2.9	11	3.1	22	4.7	25	4.9	27	6.2	9	3.0
	6日/週	45	2.2	1	0.8	3	1.1	2	0.7	1	0.3	16	3.4	22	4.3	15	3.4	13	4.4
	7日/週	178	8.8	4	3.0	3	1.1	12	4.4	20	5.6	53	11.3	86	16.7	79	18.0	44	14.9
		総 数	2019	100	132	100	272	100	273	100	357	100	471	100	514	100	438	100	296
女 性	運動日数																		
	運動無し	2081	74.4	146	85.9	374	83.7	339	83.9	390	75.3	359	60.0	473	71.6	315	60.7	312	75.4
	2日/週	179	6.4	11	6.5	29	6.5	21	5.2	34	6.6	48	8.0	36	5.4	38	7.3	19	4.6
	3日/週	121	4.3	2	1.2	13	2.9	8	2.0	20	3.9	30	5.0	48	7.3	41	7.9	23	5.6
	4日/週	68	2.4	2	1.2	5	1.1	2	0.5	17	3.3	33	5.5	9	1.4	21	4.0	5	1.2
	5日/週	73	2.6	6	3.5	9	2.0	6	1.5	17	3.3	25	4.2	10	1.5	15	2.9	5	1.2
	6日/週	42	1.5	1	0.6	4	0.9	5	1.2	6	1.2	15	2.5	11	1.7	14	2.7	4	1.0
	7日/週	234	8.4	2	1.2	13	2.9	23	5.7	34	6.6	88	14.7	74	11.2	75	14.5	46	11.1
	総 数	2798	100	170	100	447	100	404	100	518	100	598	100	661	100	519	100	414	100
総 数	運動日数																		
	運動無し	3512	72.9	248	82.1	595	82.8	553	81.7	672	76.8	659	61.6	785	66.8	549	57.4	508	71.5
	2日/週	315	6.5	23	7.6	50	7.0	46	6.8	57	6.5	75	7.0	64	5.4	71	7.4	32	4.5
	3日/週	202	4.2	5	1.7	19	2.6	17	2.5	28	3.2	62	5.8	71	6.0	67	7.0	37	5.2
	4日/週	138	2.9	8	2.6	15	2.1	5	0.7	29	3.3	54	5.1	27	2.3	45	4.7	12	1.7
	5日/週	151	3.1	10	3.3	17	2.4	14	2.1	28	3.2	47	4.4	35	3.0	42	4.4	14	2.0
	6日/週	87	1.8	2	0.7	7	1.0	7	1.0	7	0.8	31	2.9	33	2.8	29	3.0	17	2.4
	7日/週	412	8.6	6	2.0	16	2.2	35	5.2	54	6.2	141	13.2	160	13.6	154	16.1	90	12.7
	総 数	4817	100	302	100	719	100	677	100	875	100	1069	100	1175	100	957	100	710	100

第54表 運動を行う日の平均運動時間(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																	
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	運動時間(分)																		
	運動無し	1431	70.9	102	77.3	221	81.3	214	78.4	282	79.0	300	63.7	312	60.7	234	53.4	196	66.2
	30-<60分/日	228	11.3	4	3.0	15	5.5	22	8.1	34	9.5	59	12.5	94	18.3	74	16.9	55	18.6
	60-<120分/日	229	11.3	13	9.8	19	7.0	18	6.6	33	9.2	74	15.7	72	14.0	90	20.5	29	9.8
	120-<180分/日	92	4.6	10	7.6	13	4.8	13	4.8	3	0.8	25	5.3	28	5.4	28	6.4	13	4.4
	180分以上/日	39	1.9	3	2.3	4	1.5	6	2.2	5	1.4	13	2.8	8	1.6	12	2.7	3	1.0
	総数	2019	100	132	100	272	100	273	100	357	100	471	100	514	100	438	100	296	100
女性	運動時間(分)																		
	運動無し	2081	74.4	146	85.9	374	83.7	339	83.9	390	75.3	359	60.0	473	71.6	315	60.7	312	75.4
	30-<60分/日	307	11.0	6	3.5	28	6.3	19	4.7	53	10.2	109	18.2	92	13.9	88	17.0	56	13.5
	60-<120分/日	286	10.2	11	6.5	27	6.0	28	6.9	59	11.4	93	15.6	68	10.3	82	15.8	31	7.5
	120-<180分/日	96	3.4	6	3.5	13	2.9	13	3.2	13	2.5	28	4.7	23	3.5	28	5.4	13	3.1
	180分以上/日	28	1.0	1	0.6	5	1.1	5	1.2	3	0.6	9	1.5	5	0.8	6	1.2	2	0.5
	総数	2798	100	170	100	447	100	404	100	518	100	598	100	661	100	519	100	414	100
総数	運動時間(分)																		
	運動無し	3512	72.9	248	82.1	595	82.8	553	81.7	672	76.8	659	61.6	785	66.8	549	57.4	508	71.5
	30-<60分/日	535	11.1	10	3.3	43	6.0	41	6.1	87	9.9	168	15.7	186	15.8	162	16.9	111	15.6
	60-<120分/日	515	10.7	24	7.9	46	6.4	46	6.8	92	10.5	167	15.6	140	11.9	172	18.0	60	8.5
	120-<180分/日	188	3.9	16	5.3	26	3.6	26	3.8	16	1.8	53	5.0	51	4.3	56	5.9	26	3.7
	180分以上/日	67	1.4	4	1.3	9	1.3	11	1.6	8	0.9	22	2.1	13	1.1	18	1.9	5	0.7
	総数	4817	100	302	100	719	100	677	100	875	100	1069	100	1175	100	957	100	710	100

第55表 運動強度の状況(性・年齢階級別)

		年齢(歳)																	
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	運動強度																		
	運動無し	1431	70.9	102	77.3	221	81.3	214	78.4	282	79.0	300	63.7	312	60.7	234	53.4	196	66.2
	高強度	62	3.1	8	6.1	12	4.4	17	6.2	7	2.0	12	2.5	6	1.2	12	2.7	2	0.7
	中強度	196	9.7	14	10.6	23	8.5	20	7.3	33	9.2	62	13.2	44	8.6	63	14.4	14	4.7
	低強度	329	16.3	8	6.1	16	5.9	22	8.1	34	9.5	97	20.6	152	29.6	129	29.5	84	28.4
	運動有・ 強度不明	1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	2019	100	132	100	272	100	273	100	357	100	471	100	514	100	438	100	296	100
女性	運動強度																		
	運動無し	2081	74.4	146	85.9	374	83.7	339	83.9	390	75.3	359	60.0	473	71.6	315	60.7	312	75.4
	高強度	70	2.5	7	4.1	19	4.3	17	4.2	8	1.5	16	2.7	3	0.5	6	1.2	2	0.5
	中強度	240	8.6	10	5.9	31	6.9	30	7.4	47	9.1	85	14.2	37	5.6	66	12.7	13	3.1
	低強度	406	14.5	7	4.1	23	5.1	18	4.5	72	13.9	138	23.1	148	22.4	132	25.4	87	21.0
	運動有・ 強度不明	1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	2798	100	170	100	447	100	404	100	518	100	598	100	661	100	519	100	414	100
総数	運動強度																		
	運動無し	3512	72.9	248	82.1	595	82.8	553	81.7	672	76.8	659	61.6	785	66.8	549	57.4	508	71.5
	高強度	132	2.7	15	5.0	31	4.3	34	5.0	15	1.7	28	2.6	9	0.8	18	1.9	4	0.6
	中強度	436	9.1	24	7.9	54	7.5	50	7.4	80	9.1	147	13.8	81	6.9	129	13.5	27	3.8
	低強度	735	15.3	15	5.0	39	5.4	40	5.9	106	12.1	235	22.0	300	25.5	261	27.3	171	24.1
	運動有・ 強度不明	2	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
	総数	4817	100	302	100	719	100	677	100	875	100	1069	100	1175	100	957	100	710	100

第 56 表 運動習慣別栄養素等摂取量

		総 数		性 別			
				男 性		女 性	
		運動習慣		運動習慣		運動習慣	
		習慣無(その他)	運動の習慣有	習慣無(その他)	運動の習慣有	習慣無(その他)	運動の習慣有
対象者数		3060	1261	1260	565	1800	696
エネルギー	kcal	1942	1941	2223	2168	1746	1758
たんぱく質	g	70.6	74.0	78.5	80.8	65.2	68.5
うち動物性	g	37.4	39.3	42.2	43.7	34.0	35.8
脂質	g	54.7	53.4	59.8	57.3	51.1	50.2
うち動物性	g	26.8	26.7	30.1	29.1	24.4	24.7
炭水化物	g	271.9	273.4	307.0	301.0	247.3	251.1
カリウム	mg	2367	2676	2485	2758	2285	2609
カルシウム	mg	523	597	527	583	521	608
マグネシウム	mg	256	284	276	299	242	272
リン	mg	1005	1074	1095	1152	943	1011
鉄	mg	8.4	8.9	8.7	9.2	8.1	8.7
亜鉛	mg	8.3	8.4	9.3	9.2	7.6	7.8
銅	mg	1.21	1.28	1.33	1.38	1.12	1.20
ビタミンA	μgRE <sup>*1</sup>	630	680	670	730	602	639
ビタミンD	μg	8.0	9.4	8.8	9.9	7.5	8.9
ビタミンE	mg <sup>*2</sup>	9.2	10.4	8.2	10.5	9.8	10.4
ビタミンK	μg	253	283	260	287	248	280
ビタミンB <sub>1</sub>	mg	1.61	1.75	1.46	1.56	1.71	1.90
ビタミンB <sub>2</sub>	mg	1.54	1.63	1.49	1.51	1.58	1.74
ナイアシン	mgNE <sup>*3</sup>	15.7	16.6	17.8	18.4	14.3	15.2
ビタミンB <sub>6</sub>	mg	1.83	2.18	1.75	2.24	1.88	2.14
ビタミンB <sub>12</sub>	μg	7.5	8.1	8.4	9.2	6.8	7.2
葉酸	μg	318	358	333	365	307	352
パントテン酸	mg	5.48	5.83	5.96	6.20	5.14	5.53
ビタミンC	mg	124	145	111	130	133	157
コレステロール	mg	325	309	360	338	301	286
食物繊維	g	15.2	17.3	15.6	17.6	15.0	17.0
水溶性	g	3.5	3.9	3.5	4.0	3.4	3.8
不溶性	g	11.1	12.6	11.4	12.8	10.9	12.4
食塩(ナトリウム×2.54/1000)	g	11.1	11.5	12.1	12.4	10.3	10.9
脂肪エネルギー比率 <sup>*4</sup>	%	25.1	24.6	24.0	23.5	25.9	25.4
炭水化物エネルギー比率 <sup>*4</sup>	%	60.2	60.1	61.8	61.5	59.1	59.0
動物性たんぱく質比率 <sup>*4</sup>	%	51.0	51.3	51.9	51.9	50.4	50.8

注) 20歳以上 妊婦・「健康上の理由」により運動習慣の無い者除外

\*1 RE: レチノール当量 \*2 α トコフェロール量。α トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない \*3 NE: ナイアシン当量

\*4 これらの比率は個々人の計算値を平均したものである



第57表 歩行数の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

	年齢(歳)																					
	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)		歩行数 (歩/日)	
	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差	平均	標準 偏差
性別																						
女性	7398	4578	8756	4194	8562	5187	8366	5262	8147	4389	7896	3944	7162	4435	4948	3596	7321	4588	6562	4106	4114	3298
男性	6369	3858	8367	3948	6845	3847	6820	3501	7373	3807	7063	3484	6559	3882	3809	3246	6267	3827	5657	3718	3184	2999
総数	6839	4233	8556	4068	7605	4566	7508	4438	7735	4106	7444	3723	6839	4158	4321	3453	6747	4223	6079	3928	3584	3163

第58表 歩行数の分布（性・年齢階級別）

	歩行数(歩/日)	年齢(歳)																					
		総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	1-1999	264	8.1	6	3.4	17	6.2	16	3.2	18	3.7	18	3.2	51	8.1	138	22.0	258	8.4	59	10.4	104	28.8
	2000-3999	514	15.8	9	5.1	27	9.9	71	14.0	62	12.9	68	12.1	120	19.0	157	25.0	505	16.4	110	19.5	106	29.4
	4000-5999	632	19.4	36	20.5	45	16.4	108	21.3	86	17.8	109	19.4	124	19.7	124	19.7	596	19.3	120	21.2	66	18.3
	6000-7999	562	17.2	30	17.0	51	18.6	82	16.2	92	19.1	117	20.9	102	16.2	88	14.0	532	17.3	99	17.5	36	10.0
	8000-9999	505	15.5	32	18.2	49	17.9	72	14.2	83	17.2	111	19.8	90	14.3	68	10.8	473	15.3	81	14.3	27	7.5
	10000-	781	24.0	63	35.8	85	31.0	157	31.0	141	29.3	138	24.6	144	22.8	53	8.4	718	23.3	96	17.0	22	6.1
	総数	3258	100	176	100	274	100	506	100	482	100	561	100	631	100	628	100	3082	100	565	100	361	100
女性	1-1999	431	11.1	3	1.6	19	5.5	32	5.1	19	3.5	22	3.3	63	8.7	273	35.4	428	11.6	99	15.3	211	44.1
	2000-3999	717	18.5	16	8.6	67	19.4	95	15.1	77	14.1	108	16.2	137	18.9	217	28.1	701	19.0	156	24.2	131	27.4
	4000-5999	875	22.6	38	20.3	84	24.3	164	26.0	133	24.3	165	24.8	177	24.4	114	14.8	837	22.7	136	21.1	64	13.4
	6000-7999	679	17.5	42	22.5	61	17.7	137	21.7	107	19.5	128	19.2	123	17.0	81	10.5	637	17.3	102	15.8	39	8.2
	8000-9999	527	13.6	35	18.7	44	12.8	85	13.5	95	17.3	123	18.5	101	13.9	44	5.7	492	13.3	75	11.6	14	2.9
	10000-	644	16.6	53	28.3	70	20.3	118	18.7	117	21.4	120	18.0	124	17.1	42	5.4	591	16.0	77	11.9	19	4.0
	総数	3873	100	187	100	345	100	631	100	548	100	666	100	725	100	771	100	3686	100	645	100	478	100
総数	1-1999	695	9.7	9	2.5	36	5.8	48	4.2	37	3.6	40	3.3	114	8.4	411	29.4	686	10.1	158	13.1	315	37.5
	2000-3999	1231	17.3	25	6.9	94	15.2	166	14.6	139	13.5	176	14.3	257	19.0	374	26.7	1206	17.8	266	22.0	237	28.2
	4000-5999	1507	21.1	74	20.4	129	20.8	272	23.9	219	21.3	274	22.3	301	22.2	238	17.0	1433	21.2	256	21.2	130	15.5
	6000-7999	1241	17.4	72	19.8	112	18.1	219	19.3	199	19.3	245	20.0	225	16.6	169	12.1	1169	17.3	201	16.6	75	8.9
	8000-9999	1032	14.5	67	18.5	93	15.0	157	13.8	178	17.3	234	19.1	191	14.1	112	8.0	965	14.3	156	12.9	41	4.9
	10000-	1425	20.0	116	32.0	155	25.0	275	24.2	258	25.0	258	21.0	268	19.8	95	6.8	1309	19.3	173	14.3	41	4.9
	総数	7131	100	363	100	619	100	1137	100	1030	100	1227	100	1356	100	1399	100	6768	100	1210	100	839	100

第58表 (再掲) 歩行数の区分（性・年齢階級別）

	歩行数(歩/日)	年齢(歳)																	
		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
性別 男性	-9200(男)/-8300(女)	2199	71.3	170	62.0	325	64.2	307	63.7	384	68.4	460	72.9	553	88.1	441	78.1	328	90.9
	9200-(男)/8300-(女)	883	28.7	104	38.0	181	35.8	175	36.3	177	31.6	171	27.1	75	11.9	124	21.9	33	9.1
	総数	3082	100	274	100	506	100	482	100	561	100	631	100	628	100	565	100	361	100
女性	-9200(男)/-8300(女)	2691	73.0	244	70.7	443	70.2	352	64.2	442	66.4	515	71.0	695	90.1	505	78.3	448	93.7
	9200-(男)/8300-(女)	995	27.0	101	29.3	188	29.8	196	35.8	224	33.6	210	29.0	76	9.9	140	21.7	30	6.3
	総数	3686	100	345	100	631	100	548	100	666	100	725	100	771	100	645	100	478	100
総数	-9200(男)/-8300(女)	4890	72.3	414	66.9	768	67.5	659	64.0	826	67.3	975	71.9	1248	89.2	946	78.2	776	92.5
	9200-(男)/8300-(女)	1878	27.7	205	33.1	369	32.5	371	36.0	401	32.7	381	28.1	151	10.8	264	21.8	63	7.5
	総数	6768	100	619	100	1137	100	1030	100	1227	100	1356	100	1399	100	1210	100	839	100

