

表1


CKDのステージ分類(CKD診療ガイドより)

ステージ	説明	進行度による分類 GFR mL/min/1.73m ²
	ハイリスク群(糖尿病、高血圧、メタボリック症候群、家族歴など)	≥90(CKDのリスクファクターを有する状態で)
1	腎障害は存在するが、GFRは正常または増加	≥90
2	腎障害が存在し、GFR軽度低下	60~89
3	GFR中等度低下	30~59
4	GFR高度低下	15~29
5	腎不全	<15

- ・ CKD 1-3期は自覚症状に乏しく、本人が気づいていないことが多い。
- ・ 他の疾患(糖尿病、高血圧など)で治療されていてもCKDは見逃されやすい。

図1


慢性透析患者数の推移



出典: 我が国の慢性透析療法の現状(日本透析医学会)

図2

年別透析導入患者の主要原疾患の推移



出典: 我が国の慢性透析療法の現状(日本透析医学会)

表2

我が国の主要な死因(平成18年)

順位	死因(上位10疾患)	死亡率(人口10万対)
1位	悪性新生物	261.0
2位	心疾患	137.2
3位	脳血管疾患	101.7
4位	肺炎	85.0
5位	不慮の事故	30.3
6位	自殺	23.7
7位	老衰	22.0
8位	腎不全	16.8
9位	肝疾患	12.9
10位	慢性閉塞性肺疾患	11.4

出典: 人口動態調査(平成18年)

