

(5) 間食として甘味食品・飲料を頻回飲食する習慣のある乳児の減少

分野	6. 歯の健康					
目標	6.3 間食として甘味食品・飲料を頻回飲食する習慣のある幼児の減少					
指標の目安	習慣のある幼児の割合(1歳6ヶ月児)					
ベースライン値 中間実績値 目標値	データ対象	ベースライン値	中間実績値	目標値		
	a)全国平均	29.9% (参考値)	22.6%	15.0%以上		
調査・研究名	ベースライン調査		中間実績値調査			
	H3年久保田らによる調査		H16年国民健康・栄養調査			
実施主体	久保田節子ら		厚生労働省(生活習慣病対策室)			
調査対象	1歳5ヶ月～1歳7ヶ月児	1歳～5歳				
目標設定 の詳細	<p>1、国全体を対象とした調査がなされていなかったため、当初、ベースライン値を参考値として示した。今回、国民の現状を明らかにした国民健康・栄養調査結果を踏まえ、目標値を設定した。</p> <p>2、目標値・データ対象年齢等の根拠：中間実績値の約2／3の数値である15.0%を目標値とした。これは、目標値を設定している地域の数値ともおおよそ合致しており、実現可能であると考えられる。また、対象年齢は生活習慣が形成される幼児期とした。</p>					