

「脳卒中治療ガイドライン2004」篠原幸人、吉本高志、福内靖男他  
共著、協和企画(2004)

A randomized, double-blind study comparing the safety and efficacy of clopidogrel versus ticlopidine in Japanese patients with noncardioembolic cerebral infarction.  
Fukuuchi Y, Tohgi H, Okudera T, Ikeda Y, Miyanaga Y, Uchiyama S, Hirano M, Shinohara Y, Matsumoto M, Yamaguchi T, Cerebrovasc Dis. 2008;25(1-2):40-9.

松尾 宣武	国立成育医療センター名誉総長
小児科学 内分泌・代謝学 生殖内分泌	
Standardized centile curves of body mass index for Japanese children and adolescents based on the 1978–1981 national survey data · Mikako Inokuchi, Tomonobu Hasegawa, Makoto Anzo, Nobutake Matsuo · Annals of Human Biology · 33(4) :444–453, 2006	
Body mass index reference values (mean and SD) for Japanese children · Inokuchi Mikako, Nobutake Matsuo, Makoto Anzo, Tomonobu Hasegawa · Acta Paediatrica · 96(11) :1674–1676, 2007	
Age-dependent percentile for waist circumference for Japanese children based on the 1992–1994 cross-sectional national survey data · European Journal of Paediatrics · 166:655–661, 2007	

宮崎 久義	国立病院機構熊本医療センター名誉院長
麻酔、病院管理、地域医療、生活習慣病	
糖尿病へのクリティカルパスの応用. 小堀祥三, 高橋毅, 東輝一朗, 蟻原賢司, 宮村信博, 山田和範, 後藤嘉樹, 吉成元孝, 平松真祐, 東堂龍平, <u>宮崎久義</u> . 医療マネジメント学会雑誌 4(2) :292–296, 2003	