

لقاح صنع من قبل شركة فايزر
(يناير/ كانون الثاني 2022)

إرشادات خاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد (الجرعة التنشيطية (الثالثة))

نبذة عن لقاح فيروس كورونا المستجد

يدخل هذا اللقاح في إطار برنامج الحكومات الوطنية والمحلية الخاص بمحاربة فيروس كورونا (السارس-كوفي-2)، بحيث تتكف الصناديق العمومية بتمويل هذا اللقاح، وهو متاح مجاناً لجميع الأشخاص الذين يرغبون في التلقيح به. الجرعة التنشيطية (الثالثة) من هذا اللقاح مخصصة للأشخاص الذين يبلغون 12 عاماً فما فوق.

الأثار الجانبية لهذا اللقاح وطريقة تدبيره

تم تصنيع هذا اللقاح من قبل شركة فايزر، وله دور هام في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. إن عيار الأجسام المضادة بعد شهر واحد من تلقي الجرعة التنشيطية من هذا اللقاح هو أعلى من عيار الأجسام المضادة بعد شهر واحد من الجرعة الثانية حسب التقارير.

اسم المنتج	كوميوناتى. الحقن العضلي
الفعالية والآثار الجانبية 2	الوقاية من الأمراض المعدية التي يتسبب فيها السارس-كوفي-2
تكرار التلقيح والفواصل الزمني	مرة واحدة (بعد مرور فترة زمنية محددة على تلقي الجرعة الثانية) *حقن عضلي
الفئات المستهدفة بالتلقيح	البالغون 12 عاماً فما فوق
مقدار الجرعة	جرعة واحدة 0.3 مل (مرة واحدة)

- تختلف الفترة الفاصلة قبل الجرعة التنشيطية بموجب قانون التطعيم الوقائي من شخص إلى آخر (تبلغ الفترة من 6 إلى 8 أشهر حالياً). الرجاء مراجعة إشعارات بلديتك.
- يمكن إعطاء هذا اللقاح بغض النظر عن نوع اللقاح المستخدم في الجرعتين الأولى والثانية.
- إن تلقي الجرعة التنشيطية من هذا اللقاح لا يحول دون الإصابة بالعدوى بشكل تام. كما يتوجب عليكم متابعة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة سواء تلقيتم اللقاح أم لا.

الأشخاص الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح

- يستثنى من التلقيح الأشخاص المشار إليهم أسفله، لذا يرجى التأكد من استشارة الطبيب إن كانت لديكم إحدى الحالات التالية قبل عملية التلقيح:
- أشخاص لديهم حمى واضحة (*1)
 - أشخاص يعانون من أمراض حادة
 - أشخاص لهم تاريخ مرضي مع الحساسية المفرطة تجاه أي عنصر مكون لهذا اللقاح (*2)
 - أشخاص بحالات أخرى لم نتطرق إليها أعلاه، والتي تجعل تلقي هذا اللقاح غير مناسب
- (*1) تُعرّف الحمى الواضحة بأنها 37.5 د أو أعلى. ومع ذلك فهذا لا ينطبق على الحالات التي يُحكّم فيها على أنها حمى بالنسبة لدرجة حرارة الجسم العادية حتى ولو كانت تحت 37.5 درجة مئوية
- (*2) الحساسية المفرطة والأعراض المشيرة إليها، بما في ذلك من أعراض التهاب الغشاء المخاطي، والصفير، وضيق التنفس، وانعدام انتظام دقات القلب، وضغط الدم المنخفض. لا يمكن لمن ظهرت عليهم هذه الأعراض بعد الجرعة الأولى أو الثانية أن يتلقوا الجرعة التنشيطية من نفس اللقاح.

الأشخاص الذين عليهم توخي الحذر بشأن تلقي اللقاح

- يجب على الأشخاص الذين لديهم أي من الحالات التالية توخي الحذر بشأن تلقي هذا اللقاح. إن كنت تعتقد أن إحدى الحالات تنطبق عليك، فتأكد من إطلاع الطبيب على حالتك أثناء استشارة ما قبل التلقيح
- أشخاص يخضعون للعلاج المضاد للتخثر، الأشخاص الذين يعانون من قلة الصفائح أو اضطرابات التخثر
 - أشخاص تم تشخيص إصابتهم بنقص المناعة في الماضي، أو أشخاص لهم أقارب مصابين بنقص المناعة الخلقي
 - أشخاص مصابون بأمراض رئيسية أو مزمنة، مثل القلب أو الكلى أو الكبد أو اضطرابات دموية أو اضطرابات في النمو
 - أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحساسية مثل الحمى أو الطفح الجلدي المعمم في غضون يومين من تلقيهم لقاحات في الماضي
 - أشخاص عانوا من تشنجات في الماضي
 - أشخاص يحتمل أن تكون لديهم حساسية من مكونات هذا اللقاح

في حالة الحمل أو احتمالية الحمل أو الرضاعة، يرجى التأكد من إبلاغ الطبيب أثناء استشارة ما قبل التلقيح. وفي حالة تعذر استشارة طبيب النسائية والتوليد فإن التطعيم يكون ممكناً إذا رأى طبيب الفحص الطبي المسبق إمكانية ذلك. يحتوي هذا المنتج على مادة مضافة لم يسبق استخدامها من قبل في إنتاج اللقاحات. في حالة ظهور حساسية مفرطة أو كانت لديكم حساسية تجاه الأدوية في الماضي، تأكدوا من إبلاغ الطبيب أثناء استشارة ما قبل التلقيح.

(يُتبع على الوجه الخلفي)

ما يجب القيام به بعد تلقي التلقيح

- بعد التلقيح، يرجى الانتظار في نفس المكان لمدة 15 دقيقة على الأقل (30 دقيقة على الأقل لأشخاص ظهرت عليهم أعراض الحساسية الشديدة بما في ذلك الحساسية المفرطة في الماضي، أو أشخاص ظهر عليهم المرض، أو أصيبوا بالإغماء، إلخ.)، وفي حالة الإصابة بتوَعَك، يرجى إبلاغ الطبيب فوراً. (هذا يفسح المجال أمام الاستجابة السريعة للأثار الجانبية المفاجئة)
- يجب المحافظة على نظافة المنطقة المحقونة. بينما لا يشكل الاستحمام أي عائق في نفس يوم التلقيح، يرجى تفادي فرك أو حك المنطقة المحقونة
- يرجى الامتناع عن ممارسة التمارين الشاقّة يوم إجراء التلقيح

الآثار الجانبية

- من الآثار الجانبية الرئيسية التي تظهر على متلقي اللقاح نجد: الألم في منطقة الحقن، والصداع، وآلام المفاصل والعضلات، والإرهاق، والقشعريرة، والحمى. ومن الآثار الجانبية النادرة والخطيرة نجد كذلك الصدمة أو الحساسية المفرطة. بما أنّ هذا اللقاح هو نوع جديد من اللقاحات، فهناك احتمال ظهور أعراض لم يتم توضيحها حتى الآن. في حالة ملاحظة أي أعراض مقلقة بعد التلقيح، ينصح استشارة الطبيب الذي أجرى التلقيح، أو طبيب الأسرة
- تم الإبلاغ عن حالات يشبه فيها بالإصابة بالتهاب في عضلة القلب والتامور بعد التطعيم الأول (الجرعتان الأولى والثانية) وهي بعض الحالات النادرة (*). إذا عانيت من أعراض مثل آلام الصدر أو الخفقان أو ضيق التنفس أو التورم في غضون بضعة أيام من التطعيم، يرجى استشارة إحدى المؤسسات الطبية على الفور.
- (* تكون أكثر شيوعاً بين الشباب وخاصة الرجال بعد الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من الجرعة الأولى.
- تم الإبلاغ عن أن الجرعة التنشيطية تؤدي إلى كثير من حالات التورم في الغدد للمفاوية في الإبط بشكل رئيسي (حوالي 5%) مقارنة بالجرعتين الأولى والثانية. غالباً ما تكون الأعراض خفيفة وتخف في غضون أيام قليلة، ولكن يرجى استشارة الطبيب إذا كان التورم شديداً أو استمر لفترة طويلة.

معلومات حول نظام الإغاثة الخاص بالحالات المرضية الناجمة عن التلقيح

يمكن للتطعيمات أن تسبب مشاكل صحية (مرض أو إعاقة). رغم أن مثل هذه المشاكل الصحية نادرة للغاية، إلا أنه يستحيل وضع حدٍّ للمخاطر المصاحبة، ولهذا السبب قد تم إنشاء نظام إغاثة للتعاطي مع أي أمر طارئ في حالة حدوث أضرار صحية ناجمة عن لقاح فيروس كورونا، فالإعانة متاحة أيضاً بموجب قانون التحصين الخاص بالمناعة (وتشمل هذه الإعانة، النفقات الطبية، تعويضات معاش العجز، وما شابه). للاستفسار أكثر عن الإجراءات اللازمة لتقديم الطلب، يرجى استشارة بلدية مكان إقامتكم

معلومات حول عدوى فيروس كورونا المستجد

حين تتقدّم عدوى ناجمة عن فيروس السارس-كوفي-2، تظهر أعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد، كالحُمى والسعال. بينما يتعافى العديد من الأشخاص ذوي الأعراض الخفيفة من المرض، تتفاقم أوضاع الأشخاص ذوي الأعراض الشديدة بظهور أعراض الالتهاب الرئوي، التي تتجلى في صعوبة التنفس، وقد تؤدي حتى إلى الوفاة

خصائص لقاح فيروس كورونا المستجد (لقاح من صنع شركة فايزر) الذي سيستعمل هذه المرة

هذا الدواء هو لقاح مرسل الحمض النووي الريبوزي أو "إم آر إن إيه mRNA"، وهو عبارة عن تركيبة يتم فيها تغليف الرنا المرسل في غشاء دهني، والرنا المرسل هو مخطط بروتين سبايك لفيروس السارس-كوفي-2 (وهو بروتين ضروري لدخول الفيروس إلى الخلايا البشرية). عندما يدخل الرنا المرسل في الخلايا البشرية من خلال التلقيح بهذا الدواء، يتم إنتاج بروتينات سبايك الفيروسيّة في الخلايا بناءً على الرنا المرسل، وبالتالي يتم تحفيز الأجسام المضادة ضد البروتينات الشوكية والاستجابات المناعية الخلوية، والتي يُعتقد أنها تمنع العدوى التي يسببها السارس-كوفي-2

يحتوي هذا الدواء على العناصر المكونة التالية

العنصر النشط	توزيناميران (الرنا المرسل الذي يشفر الجسم الكامل لبروتين سبايك الذي يرتبط بغشاء الخلية البشرية)
المواد المضافة	-أل-س-0315: [(هيدروكسي بيوتيل) أزيديل] مكرر (هكسان-6، 1-دييل) مكرر (2-هيكسيديكانوات) -أل-س-0159: [(بولي إيثيلين جلايكول) -2000] ن-ديتيراديسيل أسيتاميد -دي-إس-بي-سي: 1، 2-ديستارويل-إس-إن-جليسرول-3-فسفتيديل كولين -الكوليسترول -كلوريد البوتاسيوم -فوسفات البوتاسيوم أحادي القاعدة -كلوريد الصوديوم -ثنائي هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة -السكروز

لمزيد من المعلومات حول فعالية وسلامة لقاح فيروس كورونا، يرجى زيارة صفحة لقاحات فيروس كورونا المستجد على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والعمل والرفاهية

وزارة الصحة والعمل والرفاهية لقاحات فيروس كورونا المستجد

Search



إذا كنت لا تستطيع تصفح الموقع، يرجى الاتصال بمقر بلديتك.