

إرشادات خاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد (الجرعة التنشيطية (الثالثة))

نبذة عن لقاح فيروس كورونا المستجد

يدخل هذا اللقاح في إطار برنامج الحكومات الوطنية والمحلية الخاص بحمائية فيروس كورونا (السارس-كوفي-2)، بحيث تتكف الصناديق العمومية بتمويل هذا اللقاح، وهو متاح مجاناً لجميع الأشخاص الذين يرغون في التلقيح به، خصوصاً الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق

الأثار الجانبية لهذا اللقاح وطريقة تدبيره

تم تصنيع هذا اللقاح من قبل شركة تاكيدا باستلامها لتكنولوجيا التصنيع من شركة نوفافاكس، وله دور هام في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. على الرغم من أن هذه البيانات تسبق انتشار سلالة أوميكرون، إلا أن التجارب السريرية على أشخاص يبلغ عمرهم 18 عاماً أو أكثر أوضحت أن قيمة الأجسام المضادة المحايدة بعد 28 يوماً من تلقي الجرعة التنشيطية من هذا الدواء تكون أعلى بحوالي 4 مرات من قيمة الأجسام المضادة المحايدة بعد 14 يوماً من تلقي الجرعة الثانية من هذا الدواء، ولهذا فإنه من المتوقع أن يحقق درجة معينة من الفعالية. لا تزال المعلومات المتاحة محدودة فيما يتعلق بتلقي دواء آخر غير هذا الدواء في التطعيم الأول (الجرعتان الأولى والثانية) ثم تلقي هذا الدواء في الجرعة التنشيطية (التطعيم بلقاحات مختلفة). علينا الإشارة إلى أن الفترة اللازمة بين الجرعات تختلف في الدراسات التي أجريت في بلاد الخارج عن الفترة المعتمدة للدوائيات في اليابان، إلا أنه تم الإبلاغ عن ازدياد قيمة الأجسام المضادة بشكل كبير عند التطعيم بلقاحات مختلفة. ومع أن المعلومات المتوفرة حول سلالة أوميكرون لا تزال محدودة، إلا أن قيمة الأجسام المضادة المحايدة ترتفع نتيجة التطعيم بالجرعة الثالثة من هذا الدواء حسب التقارير.

اسم المنتج	نوفاكسوفيد® الحقن العضلي
الفعالية والآثار الجانبية 2	الوقاية من الأمراض المعدية التي يتسبب فيها السارس-كوفي-2
تكرار التلقيح والفاصل الزمني	مرة واحدة (بعد مرور فترة محددة من التطعيم بالجرعة الثانية) *حقن عضلي
الفئات المستهدفة بالتلقيح	الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة أو فما فوق
مقدار الجرعة	0.5 مل جرعة واحدة

- الفترة الفاصلة قبل الجرعة الثالثة تبلغ 6 أشهر أو أكثر بعد الجرعة الثانية بموجب قانون التطعيم الوقائي.
- يمكن تلقي هذا اللقاح بغض النظر عن نوع اللقاح المستخدم في الجرعتين الأولى والثانية.
- لا يمكن الوقاية من ظهور الأعراض بشكل تام حتى إذا تم تلقي الجرعة التنشيطية من هذا اللقاح، ولهذا عليكم اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة سواء تلقيتم اللقاح أم لا.

الأشخاص الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح

- يستثنى من التلقيح الأشخاص المشار إليهم أسفله، لذا يرجى التأكد من استشارة الطبيب إن كانت لديكم إحدى الحالات التالية قبل عملية التلقيح:
- أشخاص لديهم حمى واضحة (*1)
- أشخاص يعانون من أمراض حادة
- أشخاص لهم تاريخ مرضي مع الحساسية المفرطة تجاه أي عنصر مكون لهذا اللقاح (*2)
- أشخاص بحالات أخرى لم تنطرق إليها أعلاه، والتي تجعل تلقي هذا اللقاح غير مناسب

(*1) تُعرّف الحمى الواضحة بأنها 37.5 د أو أعلى. ومع ذلك فهذا لا ينطبق على الحالات التي يُحكم فيها على أنها حمى بالنسبة لدرجة حرارة الجسم العادية حتى ولو كانت تحت 37.5 درجة مئوية

(*2) الحساسية المفرطة والأعراض المشيرة إليها، بما في ذلك من أعراض التهاب الغشاء المخاطي، والصفير، وضيق التنفس، وانعدام انتظام دقات القلب، وضغط الدم المنخفض. لا يمكن لمن ظهرت عليهم هذه الأعراض بعد الجرعة الأولى أو الثانية أن يتلقوا الجرعة التنشيطية من نفس اللقاح.

الأشخاص الذين عليهم توخي الحذر بشأن تلقي اللقاح

- يجب على الأشخاص الذين لديهم أي من الحالات التالية توخي الحذر بشأن تلقي هذا اللقاح. إن كنت تعتقد أن إحدى الحالات تنطبق عليك، فتأكد من إطلاع الطبيب على حالتك أثناء استشارة ما قبل التلقيح
- أشخاص يخضعون للعلاج المضاد للتخثر، الأشخاص الذين يعانون من قلة الصفائح أو اضطرابات التخثر
- أشخاص تم تشخيص إصابتهم بنقص المناعة في الماضي، أو أشخاص لهم أقارب مصابين بنقص المناعة الخلقي
- أشخاص مصابون بأمراض رئيسية أو مزمنة، مثل القلب أو الكلى أو الكبد أو اضطرابات دموية أو اضطرابات في النمو
- أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحساسية مثل الحمى أو الطفح الجلدي المعمم في غضون يومين من تلقيهم لقاحات في الماضي
- أشخاص عانوا من تشنجات في الماضي
- أشخاص يحتمل أن تكون لديهم حساسية من مكونات هذا اللقاح

في حالة الحمل أو احتمالية الحمل أو الرضاعة، يرجى التأكد من إبلاغ الطبيب أثناء استشارة ما قبل التلقيح. حتى إذا لم تستشيري طبيب النسائية والتوليد المعتاد، فإنه يمكنك تلقي اللقاح إذا ارتأى طبيب الفحص الأولي إمكانية ذلك.

يحتوي هذا المنتج على مادة مضافة لم يسبق استخدامها من قبل في إنتاج اللقاحات. في حالة ظهور حساسية مفرطة أو كانت لديكم حساسية تجاه الأدوية في الماضي، تأكدوا من إبلاغ الطبيب أثناء استشارة ما قبل التلقيح.

(يُتبع على الوجه الخلفي)

ما يجب القيام به بعد تلقي التلقيح

- بعد التلقيح، يرجى الانتظار في نفس المكان لمدة 15 دقيقة على الأقل (30 دقيقة على الأقل لأشخاص ظهرت عليهم أعراض الحساسية الشديدة بما في ذلك الحساسية المفرطة في الماضي، أو أشخاص ظهر عليهم المرض، أو أصيبوا بالإغماء، إلخ.)، وفي حالة الإصابة بتوعك، يرجى إبلاغ الطبيب فوراً. (هذا يفسح المجال أمام الاستجابة السريعة للأثار الجانبية المفاجئة)
- يجب المحافظة على نظافة المنطقة المحقونة. بينما لا يشكل الاستحمام أي عائق في نفس يوم التلقيح، يرجى تفادي فرك أو حك المنطقة المحقونة. وإذا شعرت بتوعك بعد اللقاح فإنه يرجى مراقبة الوضع وعدم إجهاد نفسك والامتناع عن الاستحمام وسوى ذلك
- لا مشكلة في ممارسة الأنشطة المعتادة، ولكن يرجى الامتناع عن ممارسة التمارين الشاقة أو الإفراط في تناول المشروبات الكحولية يوم إجراء التلقيح

الآثار الجانبية

- من الآثار الجانبية الرئيسية التي تظهر على متلقي اللقاح نجد: الألم في منطقة الحقن، والصداع، وآلام المفاصل والعضلات، والإرهاق، والقشعريرة، والحمى. ومن الآثار الجانبية النادرة والخطيرة نجد كذلك الصدمة أو الحساسية المفرطة. بما أن هذا اللقاح هو نوع جديد من اللقاحات، فهناك احتمال ظهور أعراض لم يتم توضيحها حتى الآن. في حالة ملاحظة أي أعراض مقلقة بعد التلقيح، ينصح استشارة الطبيب الذي أجرى التلقيح، أو طبيب الأسرة
- تم الإبلاغ عن الإصابة بالتهاب خفيف في عضلة القلب والتامور بعد التطعيم في بعض الحالات النادرة (*). إذا عانيت من أعراض مثل آلام الصدر أو الخفقان أو ضيق التنفس أو التورم في غضون بضعة أيام من التطعيم، فيرجى استشارة إحدى المؤسسات الطبية على الفور. (* تكون أكثر شيوعاً بين الشباب وخاصة الرجال بعد الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من الجرعة الأولى.

معلومات حول نظام الإغاثة الخاص بالحالات المرضية الناجمة عن التلقيح

يمكن للتطعيمات أن تسبب مشاكل صحية (مرض أو إعاقة). رغم أن مثل هذه المشاكل الصحية نادرة للغاية، إلا أنه يستحيل وضع حد للمخاطر المصاحبة، ولهذا السبب قد تم إنشاء نظام إغاثة للتعاظم مع أي أمر طارئ في حالة حدوث أضرار صحية ناجمة عن لقاح فيروس كورونا، فالإغاثة متاحة أيضاً بموجب قانون التحصين الخاص بالمناعة (وتشمل هذه الإغاثة، النفقات الطبية، تعويضات معاش العجز، وما شابه). للاستفسار أكثر عن الإجراءات اللازمة لتقديم الطلب، يرجى استشارة بلدية مكان إقامتكم

معلومات حول عدوى فيروس كورونا المستجد

حين تتقدم عدوى ناجمة عن فيروس السارس-كوفي-2، تظهر أعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد، كالحمى والسعال. بينما يتعافى العديد من الأشخاص ذوي الأعراض الخفيفة من المرض، تتفاقم أوضاع الأشخاص ذوي الأعراض الشديدة بظهور أعراض الالتهاب الرئوي، التي تتجلى في صعوبة التنفس، وقد تؤدي حتى إلى الوفاة

خصائص لقاح فيروس كورونا المستجد (لقاح من صنع شركة تاكيدا) الذي سيستعمل هذه المرة

هذا الدواء هو لقاح بروتينات مصنعة، وهو عبارة عن تركيبة يتم فيها تحويل البروتينات المصنعة بالاستناد إلى جينات بروتين سبايك لفيروس السارس-كوفي-2 (وهو بروتين ضروري لدخول الفيروس إلى الخلايا البشرية) إلى جزيئات نانوية، كما يضم مواد إضافية مساعدة لتعزيز تنشيط المناعة. عندما تدخل البروتينات المصنعة في الخلايا البشرية من خلال التلقيح بهذا الدواء، يتم تحفيز الأجسام المضادة ضد البروتينات الشوكية والاستجابات المناعية الخلوية، والتي يُعتقد أنها تمنع العدوى التي يسببها السارس-كوفي-2

يحتوي هذا الدواء على العناصر المكونة التالية

العنصر النشط	سارس-كوفي-2 آر-إس (بروتين سبايك المصنع لفيروس سارس-كوفي-2)
المواد المضافة	-ماتريكس-أ* -ماتريكس-ب* -هيدرات فوسفات ثنائي الصوديوم سباعي الهيدرات -ثنائي هيدرات فوسفات الصوديوم أحادي الهيدرات -كلوريد البوتاسيوم -بوليسوربات 80 -منظم حموضة

* تشمل المواد المضافة على الكوليسترول وفوسفاتيديل كولين وهيدرات فوسفات ثنائي الصوديوم ثنائي الهيدرات وثنائي هيدرات فوسفات الصوديوم ثنائي الهيدرات وكلوريد البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم.

لمزيد من المعلومات حول فعالية وسلامة لقاح فيروس كورونا، يرجى زيارة صفحة لقاحات فيروس كورونا المستجد على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والعمل والرفاهية

وزارة الصحة والعمل والرفاهية لقاحات فيروس كورونا المستجد

بحث



إذا كنت لا تستطيع تصفح الموقع، يرجى الاتصال بمقر بلديتك.