

សេចក្តីណែនាំអំពីវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូរ៉ូណា

អំពីវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូរ៉ូណា

វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាថ្នាំបង្ការមេរោគកូរ៉ូណាដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Takeda ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាថ្នាំបង្ការមេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2)។ វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយថវិកាសាធារណៈ ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងមិនគិតថ្លៃឡើយ។ វ៉ាក់សាំងនេះគឺសម្រាប់បុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ។

ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង និងវិធីសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំង

វ៉ាក់សាំងដែលនឹងផ្តល់ជូនលើកនេះគឺបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Takeda ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាថ្នាំបង្ការមេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2)។ វ៉ាក់សាំងនេះ នឹងបង្ការការចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺឆ្លងកូរ៉ូណា 19។ គេបានរកឃើញថា អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងមានឱកាសឆ្លងទាបជាងអ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំង។ (ថ្វីត្បិតជាទិន្នន័យមុនការរីករាលដាលនៃវីរុសប្លែងថ្មីមួយក្រុង តាមរយៈគេស្តុក្តីនិក គេបានបញ្ជាក់ថាប្រសិទ្ធភាពបង្ការការចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺឆ្លងកូរ៉ូណាមានប្រមាណ 90.4% ជាដើម។ ម្យ៉ាងទៀត ថ្វីត្បិតចំណេះដឹងអំពីវីរុសប្លែងថ្មីមួយក្រុងគឺនៅមានកម្រិត មានការរាយការណ៍ថាបរិមាណអង់ទីកូរ៉ូណាបានកើនឡើងតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំង។)

ឈ្មោះវ៉ាក់សាំង	ថ្នាំចាក់សាច់ដុំ Nuvaxovoid®
ប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាព	ការបង្ការជំងឺឆ្លងដែលបង្កឡើងដោយវីរុស SARS-CoV-2
ភាពញឹកញាប់ និងចន្លោះពេល វេលានៃការចាក់វ៉ាក់សាំង	2 ដង (ជាធម្មតារៀងរាល់ 3 សប្តាហ៍) *ការចាក់សាច់ដុំ
បុគ្គលដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន	បុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
បរិមាណវ៉ាក់សាំង	0.5 mL ក្នុងមួយលើក, សរុបមាន 2 លើក

- បន្ទាប់ពីធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងរួច ការចាក់ថ្នាំលើកទី 2 ជាទូទៅនឹងធ្វើឡើងនៅ 3 សប្តាហ៍ក្រោយ។ (សូមចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី 2 ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប្រសិនបើ 3 សប្តាហ៍បានកន្លងផុតបន្ទាប់ពីអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី 1។)
- ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះ សម្រាប់ដូសទី១ របស់អ្នកសូមប្រាកដថាអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូចគ្នាសម្រាប់ការចាក់ដូសទី 2។
- គេជឿថារាងកាយរបស់យើងនឹងមិនទាន់ទទួលបានការការពារគ្រប់គ្រាន់រហូតទាល់តែ 7 ថ្ងៃបានឆ្លងផុតបន្ទាប់ពីការចាក់ដូសទី 2 របស់វ៉ាក់សាំងនេះ។ ម្យ៉ាងទៀត វាមិនមានន័យថាអាចការពារការចេញរោគសញ្ញាជាដើមបានទាំងស្រុងនោះទេ។ អ្នកគួរតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នដោយអនុវត្តទៅតាមវិធានការបង្ការឱ្យបានត្រឹមត្រូវទោះជាអ្នកបាន ឬមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយ។

បុគ្គលដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន

វ៉ាក់សាំងនេះមិនអាចផ្តល់ជូនបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមឡើយ។ សូមផ្តល់ដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើអ្នកគិតថាលក្ខណៈមួយត្រូវនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នក។

- បុគ្គលដែលមានគ្រុនក្តៅ (*1)
 - បុគ្គលដែលមានជំងឺស្រួចស្រាលធ្ងន់ធ្ងរ
 - បុគ្គលដែលធ្លាប់មានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ (*2) ជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំនៃវ៉ាក់សាំងនេះ។
 - បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដទៃក្រៅពីលក្ខណៈខាងលើដែលមានលក្ខណៈមិនសមស្របក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះ។
- (*1) គ្រុនក្តៅជាទូទៅមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី 37.5 អង្សារសេ ឡើងទៅ។ ប៉ុន្តែ លក្ខណៈនេះមិនសមស្របសម្រាប់ករណីដែលជំងឺនេះត្រូវបានវាយតម្លៃជាគ្រុនក្តៅដោយពិចារណាលើសីតុណ្ហភាពរាងកាយធម្មតាឡើយ ទោះបីជាវាមានសីតុណ្ហភាពទាបជាង 37.5 អង្សាក៏ដោយ។
- (*2) ជំងឺប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទាន់ហាន់ និងរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីជំងឺប្រតិកម្មថ្នាំនេះ រួមមានដូចជា រហកស្បែក និងរោគសញ្ញាមានភ្នាសរមិល ពិបាកដកដង្ហើម ដង្ហើមខ្លី បេះដូងលោតញាប់ និងសម្ពាធឈាមខ្សោយ ជាដើម។

បុគ្គលដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង

បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាខ្លួនមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះ សូមផ្តល់ដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង។

- បុគ្គលដែលកំពុងព្យាបាលការកកឈាម បុគ្គលដែលមានប្រព័ន្ធភ្នែកចម្រុះ ឬជំងឺកកឈាម។
- បុគ្គលដែលធ្លាប់ពិនិត្យឃើញថាខ្លះភាពស្អុយ ឬបុគ្គលដែលមានសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធខ្លះភាពស្អុយពិក្រោះ។
- បុគ្គលដែលមានជំងឺជាប់ខ្លួនស្រាប់ដូចជា ជំងឺបេះដូង តម្រងនោម ថ្លើម ជំងឺឈាម ឬ ជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលូតលាស់ ជាដើម។
- បុគ្គលដែលធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនមក ហើយកើតមានរោគសញ្ញាអាឡាក់ស៊ី ដូចជា គ្រុនក្តៅ ឬរមាស់ស្បែកនៅក្នុងអំឡុងពេល 2 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង។
- បុគ្គលដែលធ្លាប់មានជំងឺប្រកាច់កាលពីមុន
- បុគ្គលដែលអាចនឹងអាឡាក់ស៊ីជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំនៃវ៉ាក់សាំងនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ឬអាចមានផ្ទៃពោះ ឬក៏ពុំដឹងប្រាកដថា កូនដោយទឹកដោះ សូមផ្តល់ដំណឹងជូនដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុង អង្គការពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំង។ យ៉ាងណាមិញ អាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រសិនបើត្រូវបានវិនិច្ឆ័យថាអាចចាក់បាន ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យសុខភាពជាមុន ទោះបីក្នុងករណីមិនបានបញ្ជាក់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសម្ពាធនិងរោគស្រ្តីប្រចាំខ្លួនក៏ដោយ។ វ៉ាក់សាំងនេះមានផ្ទុកសារធាតុបន្ថែមដែលមិនធ្លាប់មានប្រើនៅក្នុងវ៉ាក់សាំងពីមុនទៀតឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានប្រតិកម្ម ធ្ងន់ធ្ងរ ឬអាចក្លាយជាមួយនឹងថ្នាំពីមុនមក សូមផ្តល់ដំណឹងជូនដល់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនៅក្នុងអង្គការពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេល ចាក់វ៉ាក់សាំង។

សកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំង

- បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួច សូមរង់ចាំនៅទីកន្លែងដែលអ្នកចាក់ថ្នាំនោះឱ្យបានយ៉ាងហោច 15 នាទី (យ៉ាងហោច 30 នាទីសម្រាប់ បុគ្គលដែលធ្លាប់មានរោគសញ្ញាអាណាឡិកាធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាជំងឺប្រតិកម្មថ្នាំ ឬបុគ្គលដែលមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន ឬស្លាប់ ជាដើម)។ ប្រសិនបើអ្នក មានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន សូមទាក់ទងទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកភ្លាមៗ។ (ធ្វើបែបនេះអាចជួយឱ្យ អ្នកអាចឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងមួយនាទីនោះ)
- កន្លែងដែលចាក់ថ្នាំត្រូវតែរក្សាឱ្យស្អាត។ ទោះបីជាការអ្នកអាចដកដៃចេញពីកន្លែងចាក់ថ្នាំនោះបានក៏ដោយ ក៏អ្នកមិនត្រូវដុស កន្លែងដែលចាក់ថ្នាំនោះដែរ។ ម្យ៉ាងទៀត ពេលមិនស្រួលខ្លួនក្រោយចាក់រួច ត្រូវជៀសវាងដកដៃចេញពីកន្លែងចាក់ថ្នាំនោះដោយដៃដាច់ដៃ ហើយតាមដានមើលសភាព។
- សកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺមិនមានបញ្ហាឡើយ ប៉ុន្តែសូមកុំធ្វើការហាត់ប្រាណខ្លាំងឬពិសេសគ្រឿងស្រវឹងជាដើមច្រើនពេកនៅថ្ងៃ ចាក់ថ្នាំនោះ។

ផលប៉ះពាល់

- ផលប៉ះពាល់ចម្បងមានដូចជា ការឈឺចាប់នៅកន្លែងដែលចាក់ថ្នាំនោះ ឈឺក្បាល ឈឺសន្លាក់ និងឈឺសាច់ដុំ អស់កម្លាំង រងារ និងគ្រុនក្តៅ។ ផលប៉ះពាល់ដែលកម្រនឹងកើតឡើង ហើយមានភាពធ្ងន់ធ្ងរមានដូចជា ជំងឺចុះសង្ហារិយ (shock) ឬប្រតិកម្ម ថ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកកត់សម្គាល់ឃើញមានរោគសញ្ញាណាមួយបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរួច សូមពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដែល ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះ ឬវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់អ្នក។

អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំង

ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចបង្កឱ្យមានបញ្ហាសុខភាព (ជំងឺ ឬពិការភាព)។ ទោះបីជាករណីទាំងនោះកម្រកើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិន អាចជាក់ចោលហានិភ័យបានដែរ ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺសម្រាប់ហេតុផលនេះហើយ។ នៅក្នុងករណីដែលមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំង ជំនួយ (ចំណាយលើការព្យាបាល ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ ជនពិការ ជាដើម) ក៏មានផ្តល់ជូនផងដែរនៅក្រោមច្បាប់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង។ សូមពិគ្រោះជាមួយនឹងសាលាក្រុងរបស់អ្នកអំពីនីតិវិធី ចាំបាច់សម្រាប់ការបំពេញបែបបទ។

អំពីការឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា

នៅពេលដែលឆ្លងវីរុស SARS-CoV-2 អ្នកអាចនឹងមានរោគសញ្ញាស្រដៀងនឹងជំងឺផ្តាសាយ ដូចជា គ្រុនក្តៅ និងក្អក ជាដើម។ ទោះបីជា មានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើស្រាវជ្រាវពីជំងឺនេះដោយមានរោគសញ្ញាតិចតួចក្តី នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន រោគសញ្ញារលាកសួត ដូច ជាពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងទៅៗ ហើយថែមទាំងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតថែមទៀត។


លក្ខណៈសម្គាល់របស់វ៉ាក់សាំងមេរោគកូរ៉ូណា (វ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Takeda) ដែលនឹងយកមកប្រើប្រាស់នៅលើកន្លែងនេះ

ថ្នាំនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងប្រូតេអ៊ីនរួមផ្សំហ្សែន ដែលជាថ្នាំដែលបង្កើតជាភាគល្អិតកម្រិតណាមួយប្រូតេអ៊ីនរួមផ្សំហ្សែនដែលបង្កើតឡើង ដោយផ្អែកលើហ្សែនរបស់ប្រូតេអ៊ីនបន្លា (spike protein) របស់វីរុស SARS-CoV-2 (ប្រូតេអ៊ីនដែលវីរុសត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីចូលទៅក្នុង កោសិកាមនុស្ស) ហើយមានបន្ថែមនូវសារធាតុជំនួយដែលជំរុញភាពសកម្មនៃប្រព័ន្ធភាពសុំ។ នៅពេលដែលប្រូតេអ៊ីនបន្លារួមផ្សំហ្សែន ចូលក្នុងកោសិការបស់មនុស្សតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ តាមរយៈការដឹកនាំឱ្យបង្កើតអង់ទីកូរ៉ូណាទៅនឹងប្រូតេអ៊ីនបន្លាព្រម ទាំងឆ្លើយតបដោយប្រព័ន្ធភាពសុំកោសិកា គេជឿថានឹងអាចបង្ការការឆ្លងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីវីរុស SARS-CoV-2 បាន។

ថ្នាំនេះមានផ្សំឡើងពីគ្រឿងដូចខាងក្រោម៖

សារធាតុផ្សំសកម្ម	◇ SARS-CoV-2 rS (ប្រូតេអ៊ីនបន្លារួមផ្សំហ្សែននៃSARS-CoV-2)
ធាតុផ្សំបន្ថែម	◇ Matrix-A ^(សំគាល់) ◇ Matrix-C ^(សំគាល់) ◇ Disodium hydrogen phosphate heptahydrate ◇ Sodium dihydrogen phosphate monohydrate ◇ សូដ្យូមក្លរួ ◇ Polysorbate 80 ◇ ថ្នាំកែសម្រួលpH

- សំគាល់) រួមបញ្ចូល កូឡេស្តេរ៉ូល, Phosphatidylcholine, Disodium hydrogen phosphate dehydrate, Potassium dihydrogen phosphate, ប៉ូតាស្យូម មក្លរួ និង សូដ្យូមក្លរួ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំង សម្រាប់មេរោគកូរ៉ូណា សូមចូលទៅកាន់ទំព័រវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មេរោគកូរ៉ូណានៅលើវេបសាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព។	ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព វ៉ាក់សាំងមេរោគកូរ៉ូណា	ស្វែងរក	
ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចលើកវេបសាយនោះបានទេ សូមទាក់ទងទៅកាន់សាលាក្រុងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។			