

(正)

第23表の3 血清総コレステロール値の分布 - 血清総コレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	3,944	100.0	194	100.0	395	100.0	562	100.0	518	100.0	1,032	100.0	1,243	100.0	2,961	100.0	1,081	100.0	786	100.0
	120mg/dL未満	33	0.6	3	2.4	3	0.4	1	0.6	4	0.4	7	0.3	15	0.7	22	0.4	8	0.3	13	1.0
	120-139	102	2.7	7	2.2	10	1.6	5	0.8	1	0.1	22	2.2	57	5.1	55	1.9	28	2.7	45	6.5
	140-159	356	9.1	35	23.3	33	6.6	21	3.8	29	6.2	66	6.0	172	13.1	216	7.4	88	7.6	127	15.2
	160-179	681	17.2	47	23.1	71	19.5	79	12.9	70	14.9	146	14.2	268	20.7	468	15.3	185	15.6	176	22.7
	180-199	962	23.3	47	23.6	95	25.3	139	21.5	119	21.4	253	23.6	309	23.8	723	23.1	249	23.1	209	24.6
	200-219	817	22.3	30	11.2	81	21.1	139	31.4	116	24.6	232	24.8	219	17.6	657	24.8	238	24.2	117	14.2
	220-239	561	14.4	13	9.3	69	15.1	95	17.2	91	16.4	173	16.3	120	11.5	447	15.4	160	15.7	64	9.9
	240-259	268	6.7	9	3.4	17	5.8	42	5.2	52	10.0	91	8.4	57	5.5	230	7.3	84	7.3	26	5.1
	260-279	106	2.6	3	1.5	10	2.9	28	4.8	26	4.1	23	2.3	16	1.4	92	3.0	25	2.4	4	0.4
	280-299	33	0.7	0	0.0	1	0.1	7	0.9	4	0.6	11	1.1	10	0.7	31	0.9	9	0.8	5	0.4
	300mg/dL以上	25	0.6	0	0.0	5	1.3	6	1.0	6	1.3	8	0.6	0	0.0	20	0.6	7	0.4	0	0.0
	(再掲)240mg/dL未満	3,512	89.5	182	95.1	362	89.8	479	88.1	430	84.1	899	87.6	1,160	92.4	2,588	88.3	956	89.1	751	94.2
	(再掲)240mg/dL以上	432	10.5	12	4.9	33	10.2	83	11.9	88	15.9	133	12.4	83	7.6	373	11.7	125	10.9	35	5.8
女 性	総数	5,422	100.0	268	100.0	690	100.0	920	100.0	861	100.0	1,316	100.0	1,367	100.0	3,996	100.0	1,229	100.0	879	100.0
	120mg/dL未満	8	0.1	0	0.0	4	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.2	1	0.0	3	0.1	2	0.1	1	0.0
	120-139	60	1.0	12	3.4	23	3.5	10	0.9	1	0.0	1	0.1	13	0.8	16	0.4	1	0.1	13	1.3
	140-159	313	5.7	53	18.0	94	15.4	63	5.6	22	2.1	25	1.9	56	3.9	136	3.2	22	1.8	46	5.1
	160-179	738	13.4	78	26.7	187	26.4	175	19.5	51	4.6	96	7.3	151	9.9	408	10.2	105	8.8	105	10.0
	180-199	1,041	19.5	59	25.5	176	22.7	222	25.3	118	14.7	180	13.3	286	20.9	691	17.7	195	16.0	193	21.2
	200-219	1,223	23.2	31	13.7	116	17.3	226	25.1	211	27.1	301	23.8	338	23.8	971	25.5	285	24.6	221	23.3
	220-239	967	17.7	22	6.5	48	7.7	131	13.8	190	21.1	313	23.9	263	20.6	826	20.1	296	22.8	150	20.2
	240-259	628	11.9	8	4.3	24	4.6	60	7.0	163	19.0	221	16.4	152	12.4	553	13.9	186	15.2	93	12.4
	260-279	262	4.5	2	1.3	10	1.1	20	1.6	62	7.0	96	7.3	72	4.8	226	5.2	72	4.8	45	5.2
	280-299	123	2.0	1	0.1	5	0.4	7	0.3	27	2.8	57	4.1	26	2.0	112	2.5	46	4.1	10	1.1
	300mg/dL以上	59	1.1	2	0.4	3	0.6	6	0.9	16	1.5	23	1.7	9	0.8	54	1.4	19	1.8	2	0.2
	(再掲)240mg/dL未満	4,350	80.6	255	93.9	648	93.3	827	90.2	593	69.7	919	70.5	1108	79.9	3051	77.0	906	74.2	729	81.1
	(再掲)240mg/dL以上	1,072	19.4	13	6.1	42	6.7	93	9.8	268	30.3	397	29.5	259	20.1	945	23.0	323	25.8	150	18.9

注1)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

注2)血清総コレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第23表の3 血清総コレステロール値の分布 - 血清総コレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上(コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	3,947	100.0	195	100.0	395	100.0	562	100.0	520	100.0	1,032	100.0	1,243	100.0	2,963	100.0	1,081	100.0	786	100.0
	120mg/dL未満	33	0.6	3	2.4	3	0.4	1	0.6	4	0.4	7	0.3	15	0.7	22	0.4	8	0.3	13	1.0
	120-139	102	2.7	7	2.2	10	1.6	5	0.8	1	0.1	22	2.2	57	5.1	55	1.9	28	2.7	45	6.5
	140-159	356	9.0	35	23.3	33	6.6	21	3.8	29	6.2	66	6.0	172	13.1	216	7.4	88	7.6	127	15.2
	160-179	681	17.2	47	23.0	71	19.5	79	12.9	70	14.8	146	14.2	268	20.7	468	15.2	185	15.6	176	22.7
	180-199	963	23.2	48	23.7	95	25.3	139	21.5	119	21.2	253	23.6	309	23.8	723	23.1	249	23.1	209	24.6
	200-219	817	22.2	30	11.2	81	21.1	139	31.4	116	24.5	232	24.8	219	17.6	657	24.8	238	24.2	117	14.2
	220-239	561	14.4	13	9.3	69	15.1	95	17.2	91	16.3	173	16.3	120	11.5	447	15.4	160	15.7	64	9.9
	240-259	269	6.7	9	3.4	17	5.8	42	5.2	53	10.4	91	8.4	57	5.5	231	7.4	84	7.3	26	5.1
	260-279	107	2.6	3	1.5	10	2.9	28	4.8	27	4.2	23	2.3	16	1.4	93	3.0	25	2.4	4	0.4
	280-299	33	0.7	0	0.0	1	0.1	7	0.9	4	0.6	11	1.1	10	0.7	31	0.9	9	0.8	5	0.4
	300mg/dL以上	25	0.6	0	0.0	5	1.3	6	1.0	6	1.3	8	0.6	0	0.0	20	0.6	7	0.4	0	0.0
	(再掲)240mg/dL未満	434	10.6	12	4.9	33	10.2	83	11.9	90	16.5	133	12.4	83	7.6	375	11.8	125	10.9	35	5.8
	(再掲)240mg/dL以上	3,513	89.4	183	95.1	362	89.8	479	88.1	430	83.5	899	87.6	1160	92.4	2,588	88.2	956	89.1	751	94.2
女 性	総数	5,432	100.0	269	100.0	692	100.0	922	100.0	862	100.0	1,318	100.0	1,369	100.0	4,002	100.0	1,232	100.0	880	100.0
	120mg/dL未満	8	0.1	0	0.0	4	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.2	1	0.0	3	0.1	2	0.1	1	0.0
	120-139	60	1.0	12	3.4	23	3.5	10	0.9	1	0.0	1	0.1	13	0.8	16	0.4	1	0.1	13	1.3
	140-159	313	5.7	53	18.0	94	15.4	63	5.5	22	2.1	25	1.9	56	3.9	136	3.1	22	1.7	46	5.1
	160-179	742	13.3	78	26.7	189	26.5	175	19.3	51	4.6	97	7.3	152	9.9	409	10.1	106	8.8	106	10.0
	180-199	1045	19.6	60	25.7	176	22.7	223	25.6	118	14.7	181	13.5	287	20.9	694	17.9	197	16.2	193	21.2
	200-219	1,225	23.2	31	13.7	116	17.3	227	25.2	212	27.3	301	23.8	338	23.8	973	25.5	285	24.5	221	23.3
	220-239	967	17.7	22	6.5	48	7.7	131	13.7	190	21.1	313	23.8	263	20.6	826	20.0	296	22.8	150	20.1
	240-259	628	11.8	8	4.3	24	4.6	60	7.0	163	18.9	221	16.3	152	12.4	553	13.8	186	15.1	93	12.4
	260-279	262	4.4	2	1.2	10	1.1	20	1.6	62	7.0	96	7.3	72	4.8	226	5.2	72	4.8	45	5.2
	280-299	123	2.0	1	0.1	5	0.4	7	0.3	27	2.8	57	4.1	26	2.0	112	2.5	46	4.1	10	1.1
	300mg/dL以上	59	1.1	2	0.4	3	0.6	6	0.9	16	1.5	23	1.7	9	0.8	54	1.4	19	1.8	2	0.2
	(再掲)240mg/dL未満	1,072	19.4	13	6.0	42	6.7	93	9.7	268	30.3	397	29.5	259	20.1	945	22.9	323	25.8	150	18.9
	(再掲)240mg/dL以上	4,360	80.6	256	94.0	650	93.3	829	90.3	594	69.7	921	70.5	1110	79.9	3057	77.1	909	74.2	730	81.1

注1)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

注2)血清総コレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第23表の4 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,944	198.0	30.2	194	181.6	29.0	395	200.0	29.4	562	206.5	29.7	518	206.3	27.8	1,032	203.0	28.5	1,243	189.7	30.7	2,961	201.5	29.5	1,081	200.4	29.7	786	184.3	29.6
女性	5,422	209.8	31.7	268	184.4	28.5	690	187.3	29.4	920	200.3	28.6	861	223.7	27.9	1,316	223.6	30.4	1,367	212.9	29.0	3,996	216.0	30.3	1,229	220.5	29.5	879	210.5	28.6

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)
注2) 血清総コレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第23表の4 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,947	198.1	30.2	195	181.6	29.0	395	200.0	29.4	562	206.5	29.7	520	206.6	27.9	1,032	203.0	28.5	1,243	189.7	30.7	2,963	201.5	29.6	1,081	200.4	29.7	786	184.3	29.6
女性	5,432	209.7	31.7	269	184.4	28.4	692	187.3	29.3	922	200.3	28.6	862	223.6	27.9	1,318	223.6	30.4	1,369	212.9	29.0	4,002	215.9	30.3	1,232	220.5	29.5	880	210.4	28.6

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)
注2) 血清総コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第24表の3 血清HDLコレステロール値の分布－血清HDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合
－全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	3,944	100.0	194	100.0	395	100.0	562	100.0	518	100.0	1,032	100.0	1,243	100.0	2,961	100.0	1,081	100.0	786	100.0
	30mg/dl未満	37	0.8	1	0.5	4	0.6	4	0.9	3	0.3	10	0.8	15	1.2	28	0.9	10	1.2	12	1.1
	30-39	412	10.0	15	9.5	41	9.1	50	7.4	56	11.8	109	9.8	141	10.9	306	10.0	104	10.0	104	12.0
	40-49	996	26.1	56	32.2	97	27.1	142	24.1	114	24.2	268	26.4	319	26.1	739	25.9	277	25.9	207	26.3
	50-59	999	24.3	58	27.5	109	26.5	134	25.1	132	22.1	245	23.4	321	24.2	728	23.1	282	24.4	193	24.5
	60-69	756	19.5	36	17.5	76	21.1	110	20.3	102	19.7	196	17.9	236	20.2	576	19.6	205	19.9	138	18.6
	70-79	418	10.6	17	6.6	46	11.3	71	13.4	59	11.4	99	9.6	126	10.2	308	10.4	99	8.6	86	11.3
	80-89	184	4.7	9	5.3	12	2.2	27	4.1	26	5.0	58	6.5	52	4.3	155	5.5	63	5.7	25	3.2
	90-99	81	2.2	2	0.8	6	1.2	12	2.2	13	2.5	25	3.0	23	2.1	66	2.5	23	2.8	16	2.5
	100mg/dl以上	61	1.7	0	0.0	4	0.9	12	2.5	13	2.9	22	2.6	10	0.8	55	2.1	18	1.6	5	0.5
女 性	総数	5,422	100.0	268	100.0	690	100.0	920	100.0	861	100.0	1,316	100.0	1,367	100.0	3,996	100.0	1,229	100.0	879	100.0
	30mg/dl未満	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.4	5	0.1	3	0.1	4	0.5
	30-39	128	2.0	7	2.5	13	2.1	13	0.8	13	1.1	34	2.3	48	3.2	85	1.9	35	2.8	34	3.2
	40-49	536	9.0	21	8.1	45	5.1	65	5.8	64	7.8	154	9.8	187	13.6	392	8.9	143	10.3	137	15.3
	50-59	1,127	20.2	49	16.9	146	23.0	155	16.7	154	16.4	286	21.4	337	23.3	806	19.6	279	23.0	231	24.7
	60-69	1,369	24.7	94	33.3	203	28.0	235	24.7	172	17.9	321	24.2	344	25.8	956	23.0	318	25.1	208	25.2
	70-79	1,095	21.2	46	19.8	144	20.8	228	26.7	197	24.0	252	19.7	228	17.3	838	22.1	218	18.4	137	16.0
	80-89	686	13.1	36	12.4	94	15.4	141	14.1	132	17.3	160	12.7	123	9.1	526	13.5	144	12.1	68	7.9
	90-99	288	5.8	9	3.1	28	3.0	57	9.0	70	8.3	62	5.2	62	4.3	235	6.8	55	4.6	40	4.4
	100mg/dl以上	186	3.9	6	3.9	17	2.7	26	2.2	59	7.1	47	4.7	31	3.0	153	4.2	34	3.6	20	2.9

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2) 血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第24表の3 血清HDLコレステロール値の分布－血清HDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合
－全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	3,947	100.0	37	0.8	412	10.0	996	26.1	999	24.2	757	19.5	419	10.6	185	4.7	81	2.2	61	1.7
	30mg/dl未満	195	100.0	1	0.5	15	9.5	56	32.2	58	27.5	37	17.7	17	6.6	9	5.3	2	0.8	0	0.0
	30-39	395	100.0	4	0.6	41	9.1	97	27.1	109	26.5	76	21.1	46	11.3	12	2.2	6	1.2	4	0.9
	40-49	562	100.0	4	0.9	50	7.4	142	24.1	134	25.1	110	20.3	71	13.4	27	4.1	12	2.2	12	2.5
	50-59	520	100.0	3	0.3	56	11.7	114	24.1	132	22.0	102	19.6	60	11.9	27	5.0	13	2.5	13	2.9
	60-69	1,032	100.0	10	0.8	109	9.8	268	26.4	245	23.4	196	17.9	99	9.6	58	6.5	25	3.0	22	2.6
	70-79	1,243	100.0	15	1.2	141	10.9	319	26.1	321	24.2	236	20.2	126	10.2	52	4.3	23	2.1	10	0.8
	80-89	2,963	100.0	28	0.9	306	10.0	739	25.8	728	23.1	576	19.6	309	10.5	156	5.5	66	2.5	55	2.1
	90-99	1,081	100.0	10	1.2	104	10.0	277	25.9	282	24.4	205	19.9	99	8.6	63	5.7	23	2.8	18	1.6
	100mg/dl以上	786	100.0	12	1.1	104	12.0	207	26.3	193	24.5	138	18.6	86	11.3	25	3.2	16	2.5	5	0.5
女 性	総数	5,432	100.0	7	0.1	128	2.0	538	8.9	1,128	20.1	1,372	24.7	1,098	21.3	686	13.1	289	5.8	186	3.9
	30mg/dl未満	269	100.0	0	0.0	7	2.5	21	8.1	49	16.9	94	33.2	46	19.7	36	12.3	10	3.3	6	3.8
	30-39	692	100.0	0	0.0	13	2.1	45	5.1	146	23.0	204	28.0	145	20.8	94	15.3	28	3.0	17	2.7
	40-49	922	100.0	0	0.0	13	0.8	65	5.8	155	16.5	235	24.5	230	27.2	141	14.0	57	8.9	26	2.2
	50-59	862	100.0	0	0.0	13	1.1	64	7.8	154	16.4	173	18.1	197	23.9	132	17.2	70	8.3	59	7.1
	60-69	1,318	100.0	0	0.0	34	2.2	154	9.8	287	21.4	322	24.4	252	19.7	160	12.7	62	5.2	47	4.7
	70-79	1,369	100.0	7	0.4	48	3.2	189	13.7	337	23.3	344	25.8	228	17.2	123	9.1	62	4.3	31	3.0
	80-89	4,002	100.0	5	0.1	85	1.9	393	8.9	807	19.5	958	23.0	840	22.2	526	13.5	235	6.8	153	4.2
	90-99	1,232	100.0	3	0.1	35	2.8	144	10.3	280	22.9	319	25.2	218	18.4	144	12.0	55	4.6	34	3.6
	100mg/dl以上	880	100.0	4	0.5	34	3.2	138	15.4	231	24.6	208	25.2	137	16.0	68	7.9	40	4.4	20	2.9

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2) 血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第24表の4 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上			(mg/dl)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
男性	3,944	56.9	14.0	194	54.3	11.8	395	55.4	11.6	562	58.5	14.3	518	58.3	14.7	1032	57.7	14.9	1243	56.0	13.8	2,961	57.5	14.6	1081	57.1	14.7	786	55.4	13.6			
女性	5,422	68.2	14.4	268	67.6	13.5	690	67.6	12.9	920	70.5	14.0	861	72.6	15.5	1316	67.8	14.5	1367	64.2	14.1	3,996	68.9	14.7	1229	66.5	14.0	879	63.3	14.1			

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)
注2) 血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第24表の4 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上			(mg/dl)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
男性	3,947	57.0	14.0	195	54.3	11.8	395	55.4	11.6	562	58.5	14.3	520	58.4	14.8	1032	57.7	14.9	1243	56.0	13.8	2,963	57.5	14.6	1081	57.1	14.7	786	55.4	13.6			
女性	5,432	68.2	14.4	269	67.6	13.5	692	67.6	12.9	922	70.5	14.0	862	72.6	15.5	1318	67.8	14.5	1369	64.2	14.1	4,002	68.9	14.7	1232	66.5	14.0	880	63.3	14.1			

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)
注2) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第25の3表 血清LDLコレステロール値(直接法)の分布 - 血清LDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	3,944	100.0	194	100.0	395	100.0	562	100.0	518	100.0	1,032	100.0	1,243	100.0	2,961	100.0	1,081	100.0	786	100.0
	40mg/dL未満	11	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	0.3	4	0.2	10	0.2	6	0.2	2	0.2
	40-49	18	0.3	0	0.0	1	0.2	2	0.2	3	0.5	5	0.3	7	0.3	14	0.3	7	0.3	5	0.4
	50-59	62	1.6	8	5.5	3	0.5	3	0.7	4	0.3	22	1.5	22	2.1	41	1.2	19	1.1	19	3.1
	60-69	103	2.6	6	1.4	8	1.0	10	2.1	10	1.7	21	2.9	48	3.4	74	2.5	32	2.4	29	3.6
	70-79	201	4.9	9	5.1	21	4.1	21	2.4	10	2.6	31	2.8	109	8.7	122	3.9	51	4.5	79	10.1
	80-89	318	7.8	21	15.6	33	8.0	27	4.5	44	7.5	64	5.1	129	10.1	213	6.4	85	7.4	84	10.3
	90-99	421	11.1	23	11.7	37	9.4	51	9.8	49	9.3	114	13.8	147	10.6	311	11.2	126	12.4	100	12.0
	100-109	515	12.3	29	13.0	44	9.2	67	12.1	57	11.0	136	12.0	182	13.7	377	12.4	135	11.3	124	14.6
	110-119	528	13.8	29	13.0	56	15.2	70	11.3	78	18.9	122	10.8	173	14.9	395	13.7	130	11.6	113	16.1
	120-129	482	12.8	22	11.2	50	11.0	79	16.8	50	9.5	137	14.5	144	11.7	370	13.6	136	15.1	93	10.6
	130-139	399	10.1	18	8.1	45	13.6	64	12.0	53	9.2	120	12.2	99	7.2	309	10.4	116	11.3	55	6.3
	140-149	347	9.3	4	1.5	41	13.4	63	12.1	56	11.2	104	9.7	79	7.1	284	9.8	89	8.3	41	5.5
	150-159	229	5.9	11	5.8	26	5.9	35	5.3	43	6.7	67	6.8	47	5.1	186	6.3	75	7.5	19	4.1
	160-169	111	2.9	6	4.5	10	3.3	26	3.7	25	6.2	22	2.1	22	1.8	90	3.0	24	2.1	8	0.9
	170-179	91	2.2	5	2.2	8	1.5	18	2.7	20	2.8	23	2.3	17	1.9	73	2.4	22	2.6	9	1.5
	180-189	41	0.8	0	0.0	6	1.4	8	1.4	7	0.8	15	0.9	5	0.3	35	0.8	10	0.6	2	0.2
	190-199	35	0.9	3	1.4	4	1.7	10	1.7	3	0.4	11	1.1	4	0.4	28	0.9	7	0.6	1	0.1
	200-209	14	0.3	0	0.0	1	0.2	4	0.8	2	0.5	5	0.3	2	0.2	13	0.4	3	0.2	1	0.2
	210-219	7	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	1	0.1	3	0.2	6	0.2	2	0.3	2	0.1
	220mg/dL以上	11	0.2	0	0.0	1	0.3	2	0.3	2	0.5	6	0.4	0	0.0	10	0.3	6	0.4	0	0.0
	(再掲)160mg/dL 未満	3,634	92.5	180	91.9	365	91.6	492	89.3	458	88.6	949	92.8	1,190	95.2	2,706	91.9	1,007	93.3	763	97.1
	(再掲)160mg/dL 以上	310	7.5	14	8.1	30	8.4	70	10.7	60	11.4	83	7.2	53	4.8	255	8.1	74	6.7	23	2.9
女 性	総数	5,422	100.0	268	100.0	690	100.0	920	100.0	861	100.0	1,316	100.0	1,367	100.0	3,996	100.0	1,229	100.0	879	100.0
	40mg/dL未満	4	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	40-49	6	0.2	0	0.0	2	0.3	2	0.5	1	0.1	0	0.0	1	0.2	4	0.2	0	0.0	1	0.3
	50-59	55	0.9	3	1.6	17	2.0	15	1.1	3	0.3	5	0.2	12	0.8	26	0.5	6	0.3	11	1.1
	60-69	105	2.1	13	4.9	21	3.8	22	2.5	8	0.9	17	1.3	24	1.6	60	1.5	14	1.0	18	1.8
	70-79	229	4.1	28	7.9	75	10.6	49	4.9	17	1.5	16	1.4	44	3.0	114	2.8	26	2.3	28	2.9
	80-89	365	6.6	44	16.1	90	13.0	82	7.0	30	2.8	47	4.1	72	5.5	196	4.7	47	4.9	54	6.1
	90-99	511	9.2	48	15.3	92	11.0	101	12.2	72	7.8	77	5.8	121	8.7	323	8.5	70	6.8	90	9.2
	100-109	624	11.8	39	13.6	104	16.6	135	14.5	62	7.7	120	9.8	164	11.3	417	10.5	132	10.8	102	11.0
	110-119	691	12.9	27	16.6	90	12.2	133	15.8	96	9.5	144	11.2	201	14.1	507	12.9	150	12.2	123	12.4
	120-129	678	12.6	24	6.8	73	11.4	104	12.0	114	16.2	192	14.0	171	11.4	531	13.5	172	12.6	111	11.6
	130-139	628	11.8	12	6.5	44	6.0	105	12.7	115	13.5	173	12.7	179	13.5	516	13.1	171	13.9	116	13.9
	140-149	493	8.9	10	4.5	28	5.6	65	5.3	112	13.9	150	10.4	128	9.7	418	10.0	133	10.3	75	9.0
	150-159	394	8.2	9	3.0	19	3.7	48	5.9	86	10.8	125	10.4	107	9.6	322	8.7	109	9.6	70	10.7
	160-169	262	4.6	5	1.4	14	1.7	19	1.5	59	6.2	95	7.5	70	5.7	226	5.5	80	5.8	41	6.0
	170-179	140	2.1	2	0.3	5	0.4	22	2.7	31	3.1	49	2.7	31	1.6	121	2.5	38	2.4	20	1.7
	180-189	96	1.5	2	1.2	4	0.4	8	0.4	22	1.9	40	2.8	20	1.5	87	1.8	27	2.2	11	1.5
	190-199	58	1.0	0	0.0	4	0.3	4	0.2	12	1.4	29	2.5	9	0.6	53	1.3	22	1.9	3	0.2
	200-209	37	0.7	1	0.2	1	0.1	3	0.4	12	1.4	14	1.1	6	0.5	33	0.9	12	1.2	3	0.2
	210-219	23	0.4	1	0.1	2	0.1	1	0.0	5	0.6	11	0.9	3	0.2	20	0.5	9	0.6	1	0.2
	220mg/dL以上	23	0.5	0	0.0	2	0.6	2	0.4	4	0.3	12	1.1	3	0.2	21	0.6	11	1.1	0	0.0
	(再掲)160mg/dL 未満	4,783	89.2	257	96.7	658	96.4	861	94.4	716	85.1	1,066	81.6	1,225	89.6	3,435	86.9	1,030	84.8	800	90.2
	(再掲)160mg/dL 以上	639	10.8	11	3.3	32	3.6	59	5.6	145	14.9	250	18.4	142	10.4	561	13.1	199	15.2	79	9.8

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

注2) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第25の3表 血清LDLコレステロール値(直接法)の分布 - 血清LDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	3,947	100.0	195	100.0	395	100.0	562	100.0	520	100.0	1,032	100.0	1,243	100.0	2,963	100.0	1,081	100.0	786	100.0
	40mg/dL未満	11	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	0.3	4	0.2	10	0.2	6	0.2	2	0.2
	40-49	18	0.3	0	0.0	1	0.2	2	0.2	3	0.5	5	0.3	7	0.3	14	0.3	7	0.3	5	0.4
	50-59	62	1.6	8	5.5	3	0.5	3	0.7	4	0.3	22	1.5	22	2.1	41	1.2	19	1.1	19	3.1
	60-69	103	2.6	6	1.4	8	1.0	10	2.1	10	1.7	21	2.9	48	3.4	74	2.5	32	2.4	29	3.6
	70-79	201	4.9	9	5.1	21	4.1	21	2.4	10	2.6	31	2.8	109	8.7	122	3.9	51	4.5	79	10.1
	80-89	318	7.8	21	15.5	33	8.0	27	4.5	44	7.4	64	5.1	129	10.1	213	6.4	85	7.4	84	10.3
	90-99	421	11.1	23	11.7	37	9.4	51	9.8	49	9.2	114	13.8	147	10.6	311	11.2	126	12.4	100	12.0
	100-109	515	12.3	29	12.9	44	9.2	67	12.1	57	10.9	136	12.0	182	13.7	377	12.3	135	11.3	124	14.6
	110-119	529	13.8	30	13.1	56	15.2	70	11.3	78	18.8	122	10.8	173	14.9	395	13.7	130	11.6	113	16.1
	120-129	482	12.8	22	11.2	50	11.0	79	16.8	50	9.4	137	14.5	144	11.7	370	13.5	136	15.1	93	10.6
	130-139	400	10.1	18	8.1	45	13.6	64	12.0	54	9.3	120	12.2	99	7.2	310	10.4	116	11.3	55	6.3
	140-149	347	9.3	4	1.5	41	13.4	63	12.1	56	11.1	104	9.7	79	7.1	284	9.8	89	8.3	41	5.5
	150-159	230	5.9	11	5.8	26	5.9	35	5.3	44	7.2	67	6.8	47	5.1	187	6.4	75	7.5	19	4.1
	160-169	111	2.9	6	4.5	10	3.3	26	3.7	25	6.2	22	2.1	22	1.8	90	3.0	24	2.1	8	0.9
	170-179	91	2.2	5	2.1	8	1.5	18	2.7	20	2.8	23	2.3	17	1.9	73	2.4	22	2.6	9	1.5
	180-189	41	0.8	0	0.0	6	1.4	8	1.4	7	0.8	15	0.9	5	0.3	35	0.8	10	0.6	2	0.2
190-199	35	0.9	3	1.4	4	1.7	10	1.7	3	0.4	11	1.1	4	0.4	28	0.9	7	0.6	1	0.1	
200-209	14	0.3	0	0.0	1	0.2	4	0.8	2	0.5	5	0.3	2	0.2	13	0.4	3	0.2	1	0.2	
210-219	7	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	1	0.1	3	0.2	6	0.2	2	0.3	2	0.1	
220mg/dL以上	11	0.2	0	0.0	1	0.3	2	0.3	2	0.5	6	0.4	0	0.0	10	0.3	6	0.4	0	0.0	
(再掲)160mg/dL 未満	3,637	92.5	181	91.9	365	91.6	492	89.3	460	88.6	949	92.8	1,190	95.2	2,708	91.9	1,007	93.3	763	97.1	
(再掲)160mg/dL 以上	310	7.5	14	8.1	30	8.4	70	10.7	60	11.4	83	7.2	53	4.8	255	8.1	74	6.7	23	2.9	
女 性	総数	5,432	100.0	269	100.0	692	100.0	922	100.0	862	100.0	1,318	100.0	1,369	100.0	4,002	100.0	1,232	100.0	880	100.0
	40mg/dL未満	4	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0
	40-49	6	0.2	0	0.0	2	0.3	2	0.5	1	0.1	0	0.0	1	0.2	4	0.2	0	0.0	1	0.3
	50-59	55	0.9	3	1.6	17	2.0	15	1.1	3	0.3	5	0.2	12	0.8	26	0.5	6	0.3	11	1.1
	60-69	105	2.1	13	4.9	21	3.8	22	2.4	8	0.9	17	1.3	24	1.6	60	1.5	14	1.0	18	1.8
	70-79	231	4.1	29	8.2	76	10.7	49	4.9	17	1.5	16	1.4	44	3.0	114	2.8	26	2.3	28	2.9
	80-89	365	6.6	44	16.0	90	12.9	82	7.0	30	2.8	47	4.0	72	5.5	196	4.7	47	4.9	54	6.1
	90-99	511	9.2	48	15.2	92	11.0	101	12.1	72	7.8	77	5.8	121	8.7	323	8.5	70	6.7	90	9.2
	100-109	628	11.9	39	13.6	105	16.6	136	14.9	62	7.7	121	9.8	165	11.4	420	10.6	134	10.9	102	11.0
	110-119	693	13.0	27	16.5	90	12.2	133	15.7	97	9.8	144	11.2	202	14.1	508	12.9	150	12.2	124	12.5
	120-129	679	12.6	24	6.7	73	11.4	104	11.9	114	16.2	193	14.2	171	11.4	532	13.5	173	12.7	111	11.6
	130-139	629	11.8	12	6.5	44	6.0	106	12.8	115	13.5	173	12.7	179	13.5	517	13.1	171	13.8	116	13.9
	140-149	493	8.8	10	4.4	28	5.6	65	5.2	112	13.8	150	10.4	128	9.7	418	10.0	133	10.3	75	9.0
	150-159	394	8.1	9	3.0	19	3.7	48	5.9	86	10.8	125	10.4	107	9.6	322	8.7	109	9.6	70	10.7
	160-169	262	4.6	5	1.4	14	1.7	19	1.4	59	6.1	95	7.4	70	5.7	226	5.5	80	5.8	41	6.0
	170-179	140	2.1	2	0.3	5	0.4	22	2.7	31	3.1	49	2.7	31	1.6	121	2.5	38	2.4	20	1.7
	180-189	96	1.5	2	1.2	4	0.4	8	0.4	22	1.9	40	2.8	20	1.5	87	1.8	27	2.2	11	1.5
190-199	58	1.0	0	0.0	4	0.3	4	0.2	12	1.4	29	2.5	9	0.6	53	1.3	22	1.9	3	0.2	
200-209	37	0.7	1	0.2	1	0.1	3	0.4	12	1.4	14	1.1	6	0.5	33	0.9	12	1.2	3	0.2	
210-219	23	0.4	1	0.1	2	0.1	1	0.0	5	0.6	11	0.8	3	0.2	20	0.5	9	0.6	1	0.2	
220mg/dL以上	23	0.5	0	0.0	2	0.6	2	0.4	4	0.3	12	1.0	3	0.2	21	0.6	11	1.1	0	0.0	
(再掲)160mg/dL 未満	4,793	89.3	258	96.7	660	96.4	863	94.4	717	85.2	1,068	81.6	1,227	89.6	3,441	87.0	1,033	84.8	801	90.2	
(再掲)160mg/dL 以上	639	10.7	11	3.3	32	3.6	59	5.6	145	14.8	250	18.4	142	10.4	561	13.0	199	15.2	79	9.8	

(正)

第25表の4 血清LDLコレステロール値(直接法)の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差 - 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除々

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,944	117.4	26.6	194	110.4	27.9	395	123.0	25.4	562	124.2	26.1	518	122.3	25.2	1,032	119.3	26.1	1,243	110.9	26.5	2,961	119.2	26.4	1,081	118.2	26.9	786	106.8	25.0
女性	5,422	122.7	27.8	268	104.8	24.3	690	107.1	26.6	920	115.7	26.6	861	132.4	25.6	1,316	133.5	27.7	1,367	124.1	25.4	3,996	127.0	27.2	1,229	130.4	27.0	879	123.1	25.1

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)
注2) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第25表の4 血清LDLコレステロール値(直接法)の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差 - 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除々

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,947	117.4	26.6	195	110.4	27.8	395	123.0	25.4	562	124.2	26.1	520	122.5	25.3	1032	119.3	26.1	1243	110.9	26.5	2,963	119.2	26.4	1,081	118.2	26.9	786	106.8	25.0
女性	5,432	122.6	27.8	269	104.8	24.2	692	107.0	26.6	922	115.7	26.6	862	132.3	25.6	1318	133.4	27.7	1369	124.1	25.4	4,002	127.0	27.2	1,232	130.4	27.0	880	123.1	25.1

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)
注2) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第26表の3 血清non HDLコレステロール値の分布－血清non HDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合
－全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	3,944	100.0	194	100.0	395	100.0	562	100.0	518	100.0	1,032	100.0	1,243	100.0	2,961	100.0	1,081	100.0	786	100.0
	70mg/dl未満	30	0.6	4	2.9	2	0.3	0	0.0	3	0.3	8	0.5	13	0.9	19	0.4	9	0.5	11	1.3
	70-80未満	56	1.4	5	2.2	4	0.8	4	1.1	5	0.5	11	0.7	27	2.4	37	1.2	15	1.0	20	3.1
	80-90未満	130	3.4	10	4.3	16	2.7	13	2.0	6	1.9	22	2.4	63	5.2	76	2.7	27	2.5	49	6.7
	90-100未満	205	5.2	20	15.2	27	6.6	21	2.8	15	3.1	30	3.0	92	6.9	120	3.7	50	3.9	63	7.8
	100-110未満	302	7.8	25	14.1	26	6.0	40	7.6	35	6.1	63	7.4	113	8.4	206	7.0	77	7.0	74	8.8
	110-120未満	382	9.8	18	8.0	32	9.3	36	6.5	50	9.6	102	10.0	144	11.5	279	9.6	106	9.9	103	12.9
	120-130未満	464	11.2	31	13.9	41	9.4	53	7.8	48	9.8	119	11.0	172	13.3	336	10.8	142	12.3	108	13.7
	130-140未満	429	10.9	19	10.5	43	10.9	75	13.6	53	12.9	103	8.6	136	10.7	320	10.9	93	8.5	93	10.8
	140-150未満	431	11.2	12	3.1	45	11.9	67	14.2	59	10.6	116	11.7	132	10.9	344	12.2	121	12.5	82	10.1
	150-160未満	391	10.8	14	5.8	35	13.4	58	13.5	56	11.2	123	12.4	105	8.2	311	11.3	117	11.8	61	6.7
	160-170未満	342	8.6	11	5.4	43	8.8	50	8.9	47	8.9	103	11.6	88	6.6	272	9.6	104	11.0	44	4.8
	170-180未満	267	6.5	9	5.5	27	5.9	42	6.4	44	8.3	84	7.2	61	5.9	215	6.8	81	6.5	34	6.2
	180-190未満	172	4.3	6	2.2	22	4.0	28	4.6	32	5.2	41	3.5	43	5.0	134	4.7	46	3.9	21	4.9
	190-200未満	137	3.4	3	3.3	13	2.5	28	3.8	25	4.7	44	4.8	24	2.0	116	3.9	39	4.4	12	1.0
	200-210未満	66	1.6	2	0.6	4	2.1	12	1.7	13	2.0	23	2.0	12	1.2	59	1.8	21	2.0	3	0.5
	210-220未満	49	1.4	4	2.9	6	3.6	11	2.1	8	2.2	17	1.3	3	0.1	37	1.2	12	0.7	2	0.1
	220mg/dl以上	91	1.9	1	0.2	9	2.0	24	3.4	19	2.8	23	1.8	15	1.1	80	2.2	21	1.6	6	0.5
女 性	総数	5,422	100.0	268	100.0	690	100.0	920	100.0	861	100.0	1,316	100.0	1,367	100.0	3,996	100.0	1,229	100.0	879	100.0
	70mg/dl未満	33	0.6	2	0.5	15	1.6	6	1.2	3	0.3	2	0.1	5	0.4	13	0.4	1	0.1	5	0.7
	70-80未満	73	1.3	17	4.9	21	2.9	23	2.1	1	0.2	6	0.4	5	0.6	30	0.7	4	0.2	5	1.0
	80-90未満	171	3.2	26	9.8	60	10.0	47	3.9	14	1.4	10	0.9	14	0.7	78	1.8	9	0.5	10	0.8
	90-100未満	282	5.2	46	15.6	95	13.1	66	7.0	15	1.4	20	1.8	40	2.7	124	3.2	21	2.5	28	2.4
	100-110未満	423	7.5	45	15.0	101	13.1	104	11.9	41	3.3	56	3.9	76	5.2	243	6.0	48	3.9	62	6.7
	110-120未満	495	9.9	36	13.3	81	11.5	119	13.9	73	9.6	70	6.1	116	9.0	330	9.1	67	6.4	84	9.7
	120-130未満	568	10.8	26	12.7	111	17.3	118	13.5	67	7.6	105	7.7	141	9.7	382	9.6	112	9.1	85	9.0
	130-140未満	619	11.9	21	8.7	68	9.6	105	11.2	99	14.2	145	12.6	181	12.4	470	12.8	142	12.2	117	11.4
	140-150未満	630	11.6	15	6.9	39	5.1	109	11.7	111	12.3	178	14.8	178	12.5	511	12.8	177	14.5	113	12.7
	150-160未満	538	9.9	12	5.1	32	5.5	84	9.8	88	10.0	151	10.0	171	13.4	446	11.0	162	12.6	104	12.5
	160-170未満	451	8.3	9	2.7	21	4.9	53	5.3	112	13.8	136	9.0	120	9.5	386	9.2	116	9.2	75	9.1
	170-180未満	361	6.7	5	2.3	17	2.2	29	3.2	86	10.9	123	10.0	101	7.2	304	7.8	111	8.2	65	8.3
	180-190未満	271	4.6	1	0.4	8	0.9	17	1.7	51	5.2	104	8.0	90	6.2	235	5.4	90	7.4	55	6.3
	190-200未満	169	2.7	3	0.7	6	0.5	15	1.4	33	2.8	63	4.1	49	3.9	144	3.2	55	4.4	28	3.2
	200-210未満	109	1.9	0	0.0	5	0.6	9	0.8	22	2.7	43	3.6	30	1.9	99	2.4	36	2.9	17	1.8
	210-220未満	82	1.4	2	1.1	2	0.2	4	0.2	15	1.3	43	2.9	16	1.6	73	1.6	29	2.0	11	2.0
	220mg/dl以上	147	2.5	2	0.4	8	0.9	12	1.2	30	3.0	61	4.2	34	2.9	128	3.0	49	3.9	15	2.3

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2) 血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

non HDL コレステロール(mg/dL)＝総コレステロール(mg/dL)－HDLコレステロール(mg/dL)

(誤)

第26表の3 血清non HDLコレステロール値の分布－血清non HDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合
－全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	総数	3,947	100.0	195	100.0	395	100.0	562	100.0	520	100.0	1,032	100.0	1,243	100.0	2,963	100.0	1,081	100.0	786	100.0
	70mg/dl未満	30	0.6	4	2.9	2	0.3	0	0.0	3	0.3	8	0.5	13	0.9	19	0.4	9	0.5	11	1.3
	70-80未満	56	1.4	5	2.2	4	0.8	4	1.1	5	0.5	11	0.7	27	2.4	37	1.2	15	1.0	20	3.1
	80-90未満	130	3.4	10	4.3	16	2.7	13	2.0	6	1.9	22	2.4	63	5.2	76	2.7	27	2.5	49	6.7
	90-100未満	205	5.2	20	15.1	27	6.6	21	2.8	15	3.0	30	3.0	92	6.9	120	3.7	50	3.9	63	7.8
	100-110未満	302	7.8	25	14.1	26	6.0	40	7.6	35	6.1	63	7.4	113	8.4	206	7.0	77	7.0	74	8.8
	110-120未満	382	9.8	18	8.0	32	9.3	36	6.5	50	9.5	102	10.0	144	11.5	279	9.6	106	9.9	103	12.9
	120-130未満	464	11.2	31	13.9	41	9.4	53	7.8	48	9.7	119	11.0	172	13.3	336	10.8	142	12.3	108	13.7
	130-140未満	430	10.9	20	10.7	43	10.9	75	13.6	53	12.8	103	8.6	136	10.7	320	10.9	93	8.5	93	10.8
	140-150未満	431	11.2	12	3.1	45	11.9	67	14.2	59	10.5	116	11.7	132	10.9	344	12.2	121	12.5	82	10.1
	150-160未満	391	10.7	14	5.7	35	13.4	58	13.5	56	11.1	123	12.4	105	8.2	311	11.3	117	11.8	61	6.7
	160-170未満	342	8.6	11	5.4	43	8.8	50	8.9	47	8.8	103	11.6	88	6.6	272	9.6	104	11.0	44	4.8
	170-180未満	268	6.6	9	5.4	27	5.9	42	6.4	45	8.8	84	7.2	61	5.9	216	6.8	81	6.5	34	6.2
	180-190未満	173	4.4	6	2.2	22	4.0	28	4.6	33	5.3	41	3.5	43	5.0	135	4.7	46	3.9	21	4.9
	190-200未満	137	3.4	3	3.3	13	2.5	28	3.8	25	4.6	44	4.8	24	2.0	116	3.9	39	4.4	12	1.0
	200-210未満	66	1.6	2	0.6	4	2.1	12	1.7	13	2.0	23	2.0	12	1.2	59	1.8	21	2.0	3	0.5
210-220未満	49	1.4	4	2.9	6	3.6	11	2.1	8	2.2	17	1.3	3	0.1	37	1.2	12	0.7	2	0.1	
220mg/dl以上	91	1.9	1	0.2	9	2.0	24	3.4	19	2.8	23	1.8	15	1.1	80	2.2	21	1.6	6	0.5	
女 性	総数	5,432	100.0	269	100.0	692	100.0	922	100.0	862	100.0	1,318	100.0	1,369	100.0	4,002	100.0	1,232	100.0	880	100.0
	70mg/dl未満	33	0.6	2	0.5	15	1.6	6	1.2	3	0.3	2	0.1	5	0.4	13	0.4	1	0.1	5	0.7
	70-80未満	73	1.3	17	4.9	21	2.9	23	2.1	1	0.2	6	0.4	5	0.6	30	0.7	4	0.2	5	1.0
	80-90未満	173	3.2	27	10.1	61	10.0	47	3.9	14	1.4	10	0.9	14	0.7	78	1.8	9	0.5	10	0.8
	90-100未満	282	5.1	46	15.5	95	13.1	66	6.9	15	1.4	20	1.8	40	2.7	124	3.2	21	2.5	28	2.4
	100-110未満	423	7.4	45	14.9	101	13.1	104	11.8	41	3.3	56	3.9	76	5.2	243	6.0	48	3.9	62	6.7
	110-120未満	497	10.0	36	13.3	82	11.6	120	14.3	73	9.6	70	6.0	116	9.0	331	9.2	67	6.4	84	9.7
	120-130未満	570	10.8	26	12.7	111	17.3	118	13.4	67	7.6	106	7.7	142	9.7	383	9.6	113	9.1	86	9.1
	130-140未満	620	11.9	21	8.6	68	9.6	105	11.1	99	14.1	146	12.7	181	12.4	471	12.8	143	12.4	117	11.4
	140-150未満	633	11.6	15	6.9	39	5.1	110	11.8	112	12.5	178	14.8	179	12.5	514	12.9	178	14.5	113	12.7
	150-160未満	538	9.9	12	5.1	32	5.5	84	9.7	88	9.9	151	10.0	171	13.4	446	11.0	162	12.5	104	12.5
	160-170未満	451	8.2	9	2.7	21	4.9	53	5.2	112	13.8	136	8.9	120	9.5	386	9.1	116	9.2	75	9.1
	170-180未満	361	6.7	5	2.3	17	2.2	29	3.2	86	10.9	123	9.9	101	7.2	304	7.8	111	8.2	65	8.3
	180-190未満	271	4.6	1	0.4	8	0.9	17	1.7	51	5.2	104	8.0	90	6.2	235	5.4	90	7.4	55	6.3
	190-200未満	169	2.7	3	0.7	6	0.5	15	1.4	33	2.8	63	4.1	49	3.9	144	3.2	55	4.4	28	3.2
	200-210未満	109	1.9	0	0.0	5	0.6	9	0.8	22	2.7	43	3.6	30	1.9	99	2.4	36	2.9	17	1.8
210-220未満	82	1.4	2	1.1	2	0.2	4	0.2	15	1.2	43	2.9	16	1.6	73	1.6	29	2.0	11	2.0	
220mg/dl以上	147	2.5	2	0.4	8	0.9	12	1.2	30	3.0	61	4.2	34	2.9	128	2.9	49	3.9	15	2.3	

(正)

第26表の4 血清non LDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,944	141.1	30.8	194	127.3	31.9	395	144.6	31.5	562	148.0	32.4	518	148.0	29.4	1032	145.2	29.0	1243	133.7	29.9	2,961	144.0	30.3	1081	143.3	29.5	786	128.9	28.8
女性	5,422	141.6	31.3	268	116.8	26.6	690	119.7	27.9	920	129.8	28.9	861	151.1	27.8	1316	155.8	30.2	1367	148.7	28.5	3,996	147.0	30.3	1229	154.0	29.2	879	147.2	28.2

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。
注2) 血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(誤)

第26表の4 血清non LDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
- 全国補正值、男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	3,947	141.1	30.8	195	127.3	31.9	395	144.6	31.5	562	148.0	32.4	520	148.2	29.4	1032	145.2	29.0	1243	133.7	29.9	2,963	144.0	30.3	1081	143.3	29.5	786	128.9	28.8
女性	5,432	141.6	31.3	269	116.7	26.5	692	119.6	27.9	922	129.7	28.9	862	151.0	27.8	1318	155.8	30.2	1369	148.6	28.4	4,002	147.0	30.3	1232	154.0	29.2	880	147.2	28.2

注1) 平均値及び標準偏差は全国補正值である(p.8参照)。
注2) 血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(正)

第47表 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 - 年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	25,607	100.0	1,861	100.0	3,060	100.0	4,120	100.0	3,819	100.0	5,678	100.0	7,069	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	2,850	11.6	123	7.0	405	13.3	735	18.2	617	17.4	708	12.9	262	3.8
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	22,757	88.4	1,738	93.0	2,655	86.7	3,385	81.8	3,202	82.6	4,970	87.1	6,807	96.2
男性	総数	11,802	100.0	893	100.0	1,470	100.0	1,939	100.0	1,770	100.0	2,665	100.0	3,065	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	1,754	14.6	62	6.7	242	16.8	408	20.3	389	22.7	462	16.2	191	6.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	10,048	85.4	831	93.3	1,228	83.2	1,531	79.7	1,381	77.3	2,203	83.8	2,874	94.0
女性	総数	13,805	100.0	968	100.0	1,590	100.0	2,181	100.0	2,049	100.0	3,013	100.0	4,004	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	1,096	9.1	61	7.3	163	10.1	327	16.4	228	12.9	246	9.9	71	2.1
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	12,709	90.9	907	92.7	1,427	89.9	1,854	83.6	1,821	87.1	2,767	90.1	3,933	97.9

注1)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2)生活習慣調査票の間8(飲酒の頻度)、および間8で月に1〜3回以上飲酒すると回答した場合は間8-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。
※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。
①男性:「毎日×2合以上」+「週5〜6日×2合以上」+「週3〜4日×3合以上」+「週1〜2日×5合以上」+「月1〜3日×5合以上」
②女性:「毎日×1合以上」+「週5〜6日×1合以上」+「週3〜4日×1合以上」+「週1〜2日×3合以上」+「月1〜3日×5合以上」

(参考表) 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の年次比較 - 年齢階級、人数、割合 - 男性・女性、20歳以上

		22年		23年		24年		26年		27年		28年		P値
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	562	15.3	527	16.3	1,993	14.7	564	15.8	453	13.9	1,754	14.6	0.15
	年齢調整値	-	15.3	-	16.5	-	14.6	-	15.7	-	13.6	-	14.7	0.26
	20-29歳	40	11.3	35	12.5	110	8.2	20	7.7	14	5.5	62	6.7	<0.01
	30-39歳	98	17.5	97	19.8	329	15.6	68	15.1	62	15.3	242	16.8	0.58
	40-49歳	124	21.9	103	20.2	396	19.0	118	21.9	97	17.5	408	20.3	0.84
	50-59歳	112	18.6	128	23.5	476	22.6	129	23.8	96	18.5	389	22.7	0.57
	60-69歳	129	16.1	119	19.3	486	17.0	159	18.9	131	18.4	462	16.2	0.71
	70歳以上	59	7.5	45	5.7	196	6.4	70	7.6	53	6.5	191	6.0	0.51
女性	総数	317	7.5	311	8.2	1,128	7.6	357	8.8	309	8.1	1,096	9.1	<0.01
	年齢調整値	-	8.0	-	8.9	-	7.9	-	9.5	-	8.6	-	9.5	<0.01
	20-29歳	26	6.9	38	10.9	70	5.2	19	5.9	24	8.1	61	7.3	0.85
	30-39歳	78	12.6	68	12.6	252	10.6	62	12.8	40	9.3	163	10.1	0.15
	40-49歳	82	13.3	72	12.5	300	13.4	104	16.9	92	14	327	16.4	0.02
	50-59歳	72	10.5	71	12.2	255	10.6	79	12.9	79	13.5	228	12.9	0.06
	60-69歳	42	4.7	51	6.6	181	6.7	70	7.8	59	7.1	246	9.9	<0.01
	70歳以上	17	1.7	11	1.1	70	2.0	23	2.0	15	1.5	71	2.1	0.40

注)平成24年、28年は抽出率を考慮した全国補正值である。

(誤)

第47表 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 - 年齢階級別、人数、割合 - 全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	25,607	100.0	1,861	100.0	3,060	100.0	4,120	100.0	3,819	100.0	5,678	100.0	7,069	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	2,850	11.6	123	7.0	405	13.3	735	18.2	617	17.4	708	12.9	262	3.8
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	22,757	88.4	1,738	93.0	2,655	86.7	3,385	81.8	3,202	82.6	4,970	87.1	6,807	96.2
男性	総数	11,802	100.0	893	100.0	1,470	100.0	1,939	100.0	1,770	100.0	2,665	100.0	3,065	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	1,754	14.6	62	6.7	242	16.8	408	20.3	389	22.7	462	16.2	191	6.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	10,048	85.4	831	93.3	1,228	83.2	1,531	79.7	1,381	77.3	2,203	83.8	2,874	94.0
女性	総数	13,805	100.0	968	100.0	1,590	100.0	2,181	100.0	2,049	100.0	3,013	100.0	4,004	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	1,096	9.1	61	7.3	163	10.1	327	16.4	228	12.9	246	9.9	71	2.1
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	12,709	90.9	907	92.7	1,427	89.9	1,854	83.6	1,821	87.1	2,767	90.1	3,933	97.9

注1)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2)生活習慣調査票の間8(飲酒の頻度)、および間8で月に1〜3回以上飲酒すると回答した場合は間8-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。
※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。
①男性:「毎日×2合以上」+「週5〜6日×2合以上」+「週3〜4日×3合以上」+「週1〜2日×5合以上」+「月1〜3日×5合以上」
②女性:「毎日×1合以上」+「週5〜6日×1合以上」+「週3〜4日×1合以上」+「週1〜2日×3合以上」+「月1〜3日×5合以上」

(参考表) 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の年次比較 - 年齢階級、人数、割合 - 男性・女性、20歳以上

		22年		23年		24年		26年		27年		28年		P値
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	562	15.3	527	16.3	1,993	14.7	562	15.8	453	13.9	1,754	14.6	0.15
	年齢調整値	-	15.3	-	16.5	-	14.6	-	15.7	-	13.6	-	14.7	0.26
	20-29歳	40	11.3	35	12.5	110	8.2	259	7.7	256	5.5	62	6.7	<0.01
	30-39歳	98	17.5	97	19.8	329	15.6	450	15.1	404	15.3	242	16.8	0.58
	40-49歳	124	21.9	103	20.2	396	19.0	540	21.9	553	17.5	408	20.3	0.84
	50-59歳	112	18.6	128	23.5	476	22.6	543	23.8	519	18.5	389	22.7	0.57
	60-69歳	129	16.1	119	19.3	486	17.0	843	18.9	713	18.4	462	16.2	0.71
	70歳以上	59	7.5	45	5.7	196	6.4	927	7.6	811	6.5	191	6.0	0.51
女性	総数	317	7.5	311	8.2	1,128	7.6	4,066	8.8	3,802	8.1	1,096	9.1	<0.01
	年齢調整値	-	8.0	-	8.9	-	7.9	-	9.5	-	8.6	-	9.5	<0.01
	20-29歳	26	6.9	38	10.9	70	5.2	324	5.9	296	8.1	61	7.3	0.85
	30-39歳	78	12.6	68	12.6	252	10.6	483	12.8	428	9.3	163	10.1	0.15
	40-49歳	82	13.3	72	12.5	300	13.4	617	16.9	659	14	327	16.4	0.02
	50-59歳	72	10.5	71	12.2	255	10.6	613	12.9	586	13.5	228	12.9	0.06
	60-69歳	42	4.7	51	6.6	181	6.7	902	7.8	828	7.1	246	9.9	<0.01
	70歳以上	17	1.7	11	1.1	70	2.0	1,127	2.0	1,005	1.5	71	2.1	0.40

注)平成24年、28年は抽出率を考慮した全国補正值である。

(正)

第48表 歯の本数の分布－歯の本数の区分、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	25,398	100.0	1,846	100.0	3,043	100.0	4,090	100.0	3,793	100.0	5,628	100.0	6,998	100.0
	0本	1,591	5.1	1	0.0	3	0.1	12	0.3	40	1.1	233	3.5	1,302	15.5
	1-9本	1,913	6.9	0	0.0	6	0.2	22	0.6	96	2.2	474	7.5	1,315	18.2
	10-19本	3,277	12.3	6	0.4	37	1.2	130	3.3	373	8.7	1,124	19.3	1,607	23.4
	20-27本	9,486	37.8	281	15.0	730	23.3	1,527	36.8	1,978	52.7	2,814	51.1	2,156	32.9
	28本以上	9,131	37.9	1,558	84.6	2,267	75.3	2,399	59.0	1,306	35.4	983	18.6	618	10.0
	(再掲)20本以上 (再掲)24本以上	18,617	75.7	1,839	99.6	2,997	98.6	3,926	95.8	3,284	88.1	3,797	69.8	2,774	42.9
男性	総数	11,690	100.0	880	100.0	1,456	100.0	1,920	100.0	1,758	100.0	2,643	100.0	3,033	100.0
	0本	729	5.3	1	0.0	2	0.1	9	0.4	27	1.3	141	4.9	549	15.7
	1-9本	902	7.1	0	0.0	6	0.3	14	0.7	59	2.9	250	8.2	573	19.0
	10-19本	1,467	11.8	4	0.8	25	1.8	76	3.9	180	9.0	522	19.2	660	20.9
	20-27本	4,345	37.8	125	15.3	358	23.1	698	35.7	909	52.7	1,291	50.6	964	33.9
	28本以上	4,247	38.0	750	83.9	1,065	74.7	1,123	59.2	583	34.2	439	17.1	287	10.5
	(再掲)20本以上 (再掲)24本以上	8,592	75.8	875	99.2	1,423	97.8	1,821	94.9	1,492	86.9	1,730	67.7	1,251	44.3
女性	総数	13,708	100.0	966	100.0	1,587	100.0	2,170	100.0	2,035	100.0	2,985	100.0	3,965	100.0
	0本	862	4.9	0	0.0	1	0.0	3	0.2	13	0.9	92	2.2	753	15.3
	1-9本	1,011	6.6	0	0.0	0	0.0	8	0.4	37	1.6	224	6.8	742	17.6
	10-19本	1,810	12.8	2	0.1	12	0.7	54	2.7	193	8.4	602	19.4	947	25.2
	20-27本	5,141	37.8	156	14.7	372	23.5	829	37.8	1,069	52.7	1,523	51.7	1,192	32.2
	28本以上	4,884	37.8	808	85.2	1,202	75.8	1,276	58.8	723	36.4	544	19.9	331	9.6
	(再掲)20本以上 (再掲)24本以上	10,025	75.6	964	99.9	1,574	99.3	2,105	96.6	1,792	89.1	2,067	71.6	1,523	41.8

注1)割合は全国補正値であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

注2)生活習慣調査票の間4に回答した者を集計対象とした。

問4:自分の歯は何本ありますか。

※「自分の歯」には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。

親知らずを除くと全部で28本が正常ですが、28本より多かったり少なかったりすることもあります。

0本の場合は0と書いて下さい。

(誤)

第48表 歯の本数の分布－歯の本数の区分、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	25,398	100.0	1,846	100.0	3,043	100.0	4,090	100.0	3,793	100.0	5,628	100.0	6,998	100.0
	0本	1,591	5.1	1	0.0	3	0.1	12	0.3	40	1.1	233	3.5	1,302	15.5
	1-9本	1,913	6.9			6	0.2	22	0.6	96	2.2	474	7.5	1,315	18.2
	10-19本	3,277	12.3	6	0.4	37	1.2	130	3.3	373	8.7	1,124	19.3	1,607	23.4
	20-27本	9,486	37.8	281	15.0	730	23.3	1,527	36.8	1,978	52.7	2,814	51.1	2,156	32.9
	28本以上	9,131	37.9	1,558	84.6	2,267	75.3	2,399	59.0	1,306	35.4	983	18.6	618	10.0
	(再掲)20本以上 (再掲)24本以上	18,617	75.7	1,839	99.6	2,997	98.6	3,926	95.8	3,284	88.1	3,797	69.8	2,774	42.9
男性	総数	11,690	100.0	880	100.0	1,456	100.0	1,920	100.0	1,758	100.0	2,643	100.0	3,033	100.0
	0本	729	5.3	1	0.0	2	0.1	9	0.4	27	1.3	141	4.9	549	15.7
	1-9本	902	7.1			6	0.3	14	0.7	59	2.9	250	8.2	573	19.0
	10-19本	1,467	11.8	4	0.8	25	1.8	76	3.9	180	9.0	522	19.2	660	20.9
	20-27本	4,345	37.8	125	15.3	358	23.1	698	35.7	909	52.7	1,291	50.6	964	33.9
	28本以上	4,247	38.0	750	83.9	1,065	74.7	1,123	59.2	583	34.2	439	17.1	287	10.5
	(再掲)20本以上 (再掲)24本以上	8,592	75.8	875	99.2	1,423	97.8	1,821	94.9	1,492	86.9	1,730	67.7	1,251	44.3
女性	総数	13,708	100.0	966	100.0	1,587	100.0	2,170	100.0	2,035	100.0	2,985	100.0	3,965	100.0
	0本	862	4.9			1	0.0	3	0.2	13	0.9	92	2.2	753	15.3
	1-9本	1,011	6.6			8	0.4	37	1.6	224	6.8	742	17.6		
	10-19本	1,810	12.8	2	0.1	12	0.7	54	2.7	193	8.4	602	19.4	947	25.2
	20-27本	5,141	37.8	156	14.7	372	23.5	829	37.8	1,069	52.7	1,523	51.7	1,192	32.2
	28本以上	4,884	37.8	808	85.2	1,202	75.8	1,276	58.8	723	36.4	544	19.9	331	9.6
	(再掲)20本以上 (再掲)24本以上	10,025	75.6	964	99.9	1,574	99.3	2,105	96.6	1,792	89.1	2,067	71.6	1,523	41.8

注1)割合は全国補正値であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

注2)生活習慣調査票の間4に回答した者を集計対象とした。

問4:自分の歯は何本ありますか。

※「自分の歯」には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。

親知らずを除くと全部で28本が正常ですが、28本より多かったり少なかったりすることもあります。

0本の場合は0と書いて下さい。

(正)

第50表 睡眠の質の状況－睡眠の質の状況、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	25,523	100.0	1,850	100.0	3,038	100.0	4,107	100.0	3,810	100.0	5,666	100.0	7,052	100.0
	充分とれている	7,424	28.2	432	24.4	616	18.8	804	19.6	770	18.8	1,802	32.0	3,000	41.3
	まあまあとれている	13,175	52.2	993	52.6	1,622	54.4	2,204	53.8	2,063	55.0	3,003	53.4	3,290	47.5
	あまりとれていない	4,543	18.2	377	20.4	733	24.7	999	24.7	903	24.5	813	13.7	718	10.4
	まったくとれていない	381	1.5	48	2.6	67	2.1	100	1.9	74	1.7	48	0.9	44	0.8
男性	総数	11,769	100.0	888	100.0	1,454	100.0	1,930	100.0	1,768	100.0	2,667	100.0	3,062	100.0
	充分とれている	3,668	29.6	199	22.0	302	18.3	366	18.0	408	20.7	953	35.0	1,440	46.1
	まあまあとれている	5,860	50.7	465	52.5	757	53.3	1,044	54.6	895	52.7	1,337	50.7	1,362	44.9
	あまりとれていない	2,039	17.9	201	22.5	354	25.8	467	24.9	420	24.3	350	13.1	247	8.3
	まったくとれていない	202	1.8	23	3.0	41	2.6	53	2.5	45	2.2	27	1.3	13	0.6
女性	総数	13,754	100.0	962	100.0	1,584	100.0	2,177	100.0	2,042	100.0	2,999	100.0	3,990	100.0
	充分とれている	3,756	27.0	233	26.6	314	19.3	438	20.9	362	17.1	849	29.3	1,560	37.5
	まあまあとれている	7,315	53.5	528	52.7	865	55.4	1,160	53.1	1,168	56.9	1,666	55.9	1,928	49.5
	あまりとれていない	2,504	18.4	176	18.5	379	23.6	532	24.5	483	24.7	463	14.3	471	12.0
	まったくとれていない	179	1.2	25	2.2	26	1.7	47	1.5	29	1.3	21	0.5	31	1.0

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

注2) 生活習慣調査票の間6に回答した者を集計対象とした。

問5:ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

(参考表) 睡眠で休養が十分にとれていない者の割合の年次比較－年齢階級、人数、割合－男女計、20歳以上

	21年		24年		26年		28年		P値
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,474	18.4	4,486	15.6	1,524	20.0	4,924	19.7	<0.01
年齢調整値	－	19.4	－	16.3	－	21.7	－	20.9	<0.01
20～29歳	180	24.5	453	17.7	143	24.5	425	23.0	<0.01
30～39歳	336	28.5	925	22	257	27.5	800	26.8	<0.01
40～49歳	355	27.9	1,029	24.1	376	32.5	1,099	26.6	0.04
50～59歳	270	19.9	811	17.6	299	25.9	977	26.2	<0.01
60～69歳	191	11.9	663	10.9	246	14.0	861	14.6	<0.01
70歳以上	142	7.6	605	8.0	203	9.9	762	11.2	<0.01

注) 平成24年、28年は抽出率を考慮した全国補正值である。

(誤)

第50表 睡眠の質の状況－睡眠の質の状況、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	25,523	100.0	1,850	100.0	3,038	100.0	4,107	100.0	3,810	100.0	5,666	100.0	7,052	100.0
	充分とれている	7,424	28.2	432	24.4	616	18.8	804	19.6	770	18.8	1,802	32.0	3,000	41.3
	まあまあとれている	13,175	52.2	993	52.6	1,622	54.4	2,204	53.8	2,063	55.0	3,003	53.4	3,290	47.5
	あまりとれていない	4,543	18.2	377	20.4	733	24.7	999	24.7	903	24.5	813	13.7	718	10.4
	まったくとれていない	381	1.5	48	2.6	67	2.1	100	1.9	74	1.7	48	0.9	44	0.8
男性	総数	11,769	100.0	888	100.0	1,454	100.0	1,930	100.0	1,768	100.0	2,667	100.0	3,062	100.0
	充分とれている	3,668	29.6	199	22.0	302	18.3	366	18.0	408	20.7	953	35.0	1,440	46.1
	まあまあとれている	5,860	50.7	465	52.5	757	53.3	1,044	54.6	895	52.7	1,337	50.7	1,362	44.9
	あまりとれていない	2,039	17.9	201	22.5	354	25.8	467	24.9	420	24.3	350	13.1	247	8.3
	まったくとれていない	202	1.8	23	3.0	41	2.6	53	2.5	45	2.2	27	1.3	13	0.6
女性	総数	13,754	100.0	962	100.0	1,584	100.0	2,177	100.0	2,042	100.0	2,999	100.0	3,990	100.0
	充分とれている	3,756	27.0	233	26.6	314	19.3	438	20.9	362	17.1	849	29.3	1,560	37.5
	まあまあとれている	7,315	53.5	528	52.7	865	55.4	1,160	53.1	1,168	56.9	1,666	55.9	1,928	49.5
	あまりとれていない	2,504	18.4	176	18.5	379	23.6	532	24.5	483	24.7	463	14.3	471	12.0
	まったくとれていない	179	1.2	25	2.2	26	1.7	47	1.5	29	1.3	21	0.5	31	1.0

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。

注2) 生活習慣調査票の間6に回答した者を集計対象とした。

問5:ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

(参考表) 睡眠で休養が十分にとれていない者の割合の年次比較－年齢階級、人数、割合－男女計、20歳以上

	21年		24年		26年		28年		P値
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,474	18.4	4,486	15.8	1,524	20.0	4,924	19.7	<0.01
年齢調整値	－	19.4	－	16.3	－	21.7	－	20.9	<0.01
20～29歳	180	24.5	4	17.7	143	24.5	425	23.0	<0.01
30～39歳	336	28.5	925	22	257	27.5	800	26.8	<0.01
40～49歳	355	27.9	1,029	24.1	376	32.5	1,099	26.6	0.04
50～59歳	270	19.9	811	17.6	299	25.9	977	26.2	<0.01
60～69歳	191	11.9	663	10.9	246	14.0	861	14.6	<0.01
70歳以上	142	7.6	605	8.0	203	9.9	762	11.2	<0.01

注) 平成24年、28年は抽出率を考慮した全国補正值である。