

(正)

第19表 薬の服用状況－薬の服用状況、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総 数	13,778	100.0	656	100.0	1,353	100.0	1,865	100.0	1,907	100.0	3,608	100.0	4,389	100.0
	使用なし	8,420	62.1	650	99.0	1,329	98.8	1,712	91.9	1,371	73.5	1,890	53.1	1,468	34.0
	使用あり(一つ以上)	5,358	37.9	6	1.0	24	1.2	153	8.1	536	26.5	1,718	46.9	2,921	66.0
	血圧を下げる薬	4,084	29.1	5	0.9	17	0.9	99	5.1	351	17.8	1,237	33.9	2,375	53.8
	脈の乱れを治す薬	521	3.4	1	0.3	3	0.2	12	0.5	28	1.2	126	3.3	351	7.2
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	1,007	7.0	2	0.7	0	0.0	34	1.6	91	4.4	357	9.5	523	11.7
	コレステロールを下げる薬	2,152	15.0	2	0.3	5	0.3	47	2.4	205	9.5	756	20.8	1,137	25.2
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	637	4.7	1	0.3	4	0.3	27	1.0	81	3.9	210	6.0	314	7.5
男性	総 数	5,819	100.0	297	100.0	540	100.0	770	100.0	751	100.0	1,563	100.0	1,898	100.0
	使用なし	3,387	58.4	296	99.4	522	97.4	665	85.8	489	65.8	752	48.2	663	36.0
	使用あり(一つ以上)	2,432	41.6	1	0.6	18	2.6	105	14.2	262	34.2	811	51.8	1,235	64.0
	血圧を下げる薬	1,907	32.7	1	0.6	14	2.0	73	9.2	191	26.0	604	38.2	1,024	53.3
	脈の乱れを治す薬	291	4.9	1	0.6	1	0.1	9	1.0	12	1.2	78	4.9	190	9.6
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	582	9.7	1	0.6	0	0.0	21	2.6	62	7.7	211	12.9	287	14.8
	コレステロールを下げる薬	734	12.3	1	0.6	4	0.7	29	4.0	76	8.8	265	17.7	359	17.4
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	333	5.9	1	0.6	4	0.8	19	1.9	50	6.4	120	8.9	139	7.2
女性	総 数	7,959	100.0	359	100.0	813	100.0	1,095	100.0	1,156	100.0	2,045	100.0	2,491	100.0
	使用なし	5,033	64.8	354	98.7	807	99.6	1,047	95.9	882	78.5	1,138	57.0	805	32.4
	使用あり(一つ以上)	2,926	35.2	5	1.3	6	0.4	48	4.1	274	21.5	907	43.0	1,686	67.6
	血圧を下げる薬	2,177	26.4	4	1.2	3	0.2	26	2.6	160	12.6	633	30.6	1,351	54.1
	脈の乱れを治す薬	230	2.4	0	0.0	2	0.2	3	0.2	16	1.2	48	2.0	161	5.4
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	425	5.0	1	0.9	0	0.0	13	1.0	29	2.3	146	6.9	236	9.2
	コレステロールを下げる薬	1,418	17.0	1	0.1	1	0.0	18	1.4	129	10.0	491	23.2	778	31.4
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	304	3.7	0	0.0	0	0.0	8	0.5	31	2.4	90	3.8	175	7.8

注1)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2)血圧を下げる薬、脈の乱れを治す薬、インスリン注射又は血糖を下げる薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬のすべての服用状況に回答した者を集計対象とした。
注3)複数回答。

(誤)

第19表 薬の服用状況－薬の服用状況、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総 数	13,778	100.0	656	100.0	1,353	100.0	1,865	100.0	1,907	100.0	3,608	100.0	4,389	100.0
	使用なし	5,358	37.9	6	1.0	24	1.2	153	8.1	536	26.5	1,718	46.9	2,921	66.0
	使用あり(一つ以上)	8,420	62.1	650	99.0	1,329	98.8	1,712	91.9	1,371	73.5	1,890	53.1	1,468	34.0
	血圧を下げる薬	4,084	29.1	5	0.9	17	0.9	99	5.1	351	17.8	1,237	33.9	2,375	53.8
	脈の乱れを治す薬	521	3.4	1	0.3	3	0.2	12	0.5	28	1.2	126	3.3	351	7.2
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	1,007	7.0	2	0.7	0	0.0	34	1.6	91	4.4	357	9.5	523	11.7
	コレステロールを下げる薬	2,152	15.0	2	0.3	5	0.3	47	2.4	205	9.5	756	20.8	1,137	25.2
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	637	4.7	1	0.3	4	0.3	27	1.0	81	3.9	210	6.0	314	7.5
男性	総 数	5,819	100.0	297	100.0	540	100.0	770	100.0	751	100.0	1,563	100.0	1,898	100.0
	使用なし	2,432	41.6	1	0.6	18	2.6	105	14.2	262	34.2	811	51.8	1,235	64.0
	使用あり(一つ以上)	3,387	58.4	296	99.4	522	97.4	665	85.8	489	65.8	752	48.2	663	36.0
	血圧を下げる薬	1,907	32.7	1	0.6	14	2.0	73	9.2	191	26.0	604	38.2	1,024	53.3
	脈の乱れを治す薬	291	4.9	1	0.6	1	0.1	9	1.0	12	1.2	78	4.9	190	9.6
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	582	9.7	1	0.6	0	0.0	21	2.6	62	7.7	211	12.9	287	14.8
	コレステロールを下げる薬	734	12.3	1	0.6	4	0.7	29	4.0	76	8.8	265	17.7	359	17.4
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	333	5.9	1	0.6	4	0.8	19	1.9	50	6.4	120	8.9	139	7.2
女性	総 数	7,959	100.0	359	100.0	813	100.0	1,095	100.0	1,156	100.0	2,045	100.0	2,491	100.0
	使用なし	2,926	35.2	5	1.3	6	0.4	48	4.1	274	21.5	907	43.0	1,686	67.6
	使用あり(一つ以上)	5,033	64.8	354	98.7	807	99.6	1,047	95.9	882	78.5	1,138	57.0	805	32.4
	血圧を下げる薬	2,177	26.4	4	1.2	3	0.2	26	2.6	160	12.6	633	30.6	1,351	54.1
	脈の乱れを治す薬	230	2.4	0	0.0	2	0.2	3	0.2	16	1.2	48	2.0	161	5.4
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	425	5.0	1	0.9	0	0.0	13	1.0	29	2.3	146	6.9	236	9.2
	コレステロールを下げる薬	1,418	17.0	1	0.1	1	0.0	18	1.4	129	10.0	491	23.2	778	31.4
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	304	3.7	0	0.0	0	0.0	8	0.5	31	2.4	90	3.8	175	7.8

注1)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2)血圧を下げる薬、脈の乱れを治す薬、インスリン注射又は血糖を下げる薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬のすべての服用状況に回答した者を集計対象とした。
注3)複数回答。

「平成28年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(正)

第33表 高血圧症有病者の状況－高血圧症有病者の状況、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総 数	12,110	100.0	499	100.0	1,133	100.0	1,591	100.0	1,671	100.0	3,279	100.0	3,937	100.0	7,994	100.0	3,407	100.0	2,484	100.0
	高血圧症有病者	5,969	48.3	33	6.7	104	6.9	323	20.2	705	40.1	1,973	59.3	2,831	72.3	3,968	48.6	2,224	65.8	1,864	75.3
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者＊	3,624	61.1	5	17.8	16	14.5	77	23.4	306	44.1	1,116	57.0	2,104	73.7	2164	54.7	1,411	62.5	1,439	76.9
	正常高値血圧者	1,578	12.4	44	11.2	138	13.2	223	11.9	256	14.3	496	14.5	421	10.1	1155	13.5	474	13.4	241	8.9
	上記以外	4,563	39.3	422	82.0	891	80.0	1,045	67.9	710	45.6	810	26.1	685	17.6	2871	37.9	709	20.8	379	15.8
男性	総 数	4,971	100.0	205	100.0	419	100.0	616	100.0	628	100.0	1,396	100.0	1,707	100.0	3,281	100.0	1,495	100.0	1,066	100.0
	高血圧症有病者	2,823	57.4	21	12.8	73	13.6	202	35.0	359	56.0	930	66.9	1,238	73.1	1,935	60.0	1,023	70.1	794	73.8
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者＊	1,674	59.1	1	7.0	13	18.1	55	23.8	162	46.4	532	56.4	911	72.8	1,053	53.5	656	61.4	607	77.2
	正常高値血圧者	752	14.9	31	20.7	88	25.2	125	16.5	89	13.6	211	14.8	208	12.0	509	14.8	207	14.1	124	10.6
	上記以外	1,396	27.7	153	66.6	258	61.2	289	48.5	180	30.4	255	18.3	261	14.9	837	25.2	265	15.8	148	15.5
女性	総 数	7,139	100.0	294	100.0	714	100.0	975	100.0	1,043	100.0	1,883	100.0	2,230	100.0	4,713	100.0	1,912	100.0	1,418	100.0
	高血圧症有病者	3,146	42.1	12	2.7	31	3.5	121	11.9	346	31.2	1,043	53.6	1,593	71.7	2,033	40.6	1,201	62.1	1,070	76.5
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者＊	1,950	62.9	4	52.8	3	7.1	22	22.7	144	41.8	584	57.7	1,193	74.5	1,111	55.8	755	63.6	832	76.7
	正常高値血圧者	826	10.7	13	4.8	50	7.1	98	9.3	167	14.8	285	14.3	213	8.7	646	12.6	267	12.7	117	7.6
	上記以外	3,167	47.2	269	92.5	633	89.4	756	78.8	530	54.0	555	32.1	424	19.7	2034	46.7	444	25.1	231	15.9

注1)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.8参照)。
注2)血圧を測定をし、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に回答をしている者を集計対象とした。
注3)判定の基準はp.15参照
＊「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に「有」と回答した者

「高血圧症有病者」の判定
収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者

(誤)

第33表 高血圧症有病者の状況－高血圧症有病者の状況、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、20歳以上

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総 数	12,110	100.0	499	100.0	1133	100.0	1591	100.0	1671	100.0	3279	100.0	3,937	100.0	7,994	100.0	3,407	100.0	2484	100.0
	高血圧症有病者	5,969	48.3	33	6.7	104	6.9	323	20.2	705	40.1	1973	59.3	2831	72.3	3,968	48.6	2224	65.8	1864	75.3
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者＊	3,624	61.1	5	17.8	16	14.5	77	23.4	306	44.1	1116	57.0	2104	73.7	2164	54.7	1411	62.5	1439	76.9
	正常高値血圧者	1,578	12.4	44	11.2	138	13.2	223	11.9	256	14.3	496	14.5	421	10.1	1155	13.5	474	13.4	241	8.9
	上記以外	4,563	39.3	422	82.0	891	80.0	1045	67.9	710	45.6	810	26.1	685	17.6	2871	37.9	709	20.8	379	15.8
男性	総 数	4,971	100.0	205	100.0	419	100.0	616	100.0	628	100.0	1396	100.0	1707	100.0	3,281	100.0	1,495	100.0	1066	100.0
	高血圧症有病者	2,823	57.4	21	12.8	73	13.6	202	35.0	359	56.0	930	66.9	1238	73.1	1935	60.0	1023	70.1	794	73.8
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者＊	1,149	40.9	20	93.0	60	81.9	147	76.2	197	53.6	398	43.6	327	27.2	882	46.5	367	38.6	187	22.8
	正常高値血圧者	752	14.9	31	20.7	88	25.2	125	16.5	89	13.6	211	14.8	208	12.0	509	14.8	207	14.1	124	10.6
	上記以外	1,396	27.7	153	66.6	258	61.2	289	48.5	180	30.4	255	18.3	261	14.9	837	25.2	265	15.8	148	15.5
女性	総 数	7,139	100.0	294	100.0	714	100.0	975	100.0	1043	100.0	1883	100.0	2230	100.0	4,713	100.0	1912	100.0	1418	100.0
	高血圧症有病者	3,146	42.1	12	2.7	31	3.5	121	11.9	346	31.2	1043	53.6	1593	71.7	2033	40.6	1201	62.1	1070	76.5
	(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者＊	1,950	62.9	4	52.8	3	7.1	22	22.7	144	41.8	584	57.7	1193	74.5	1111	55.8	755	63.6	832	76.7
	正常高値血圧者	826	10.7	13	4.8	50	7.1	98	9.3	167	14.8	285	14.3	213	8.7	646	12.6	267	12.7	117	7.6
	上記以外	3,167	47.2	269	92.5	633	89.4	756	78.8	530	54.0	555	32.1	424	19.7	2034	46.7	444	25.1	231	15.9

注1)割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる(p.○参照)。
注2)血圧を測定をし、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に回答をしている者を集計対象とした。
注3)判定の基準はp.○参照
＊「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に「有」と回答した者

「高血圧症有病者」の判定
収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者