

平成 20 年国民健康・栄養調査報告訂正一覧

第 3 部 身体状況調査の結果

p.227 : 第 48 表の 1

(誤) 注) 妊婦除外、ヘモグロビン A1c $\geq$ 5.5%の場合 項目の基準は p.55 参照

(正) 注) 妊婦除外、ヘモグロビン A1c $\geq$ 5.5%の場合 項目の基準は p.81 参照

p.227 : 第 48 表の 2

(誤) 注) 妊婦除外、ヘモグロビン A1c $\geq$ 5.6%の場合 項目の基準は p.55 参照

(正) 注) 妊婦除外、ヘモグロビン A1c $\geq$ 5.6%の場合 項目の基準は p.81 参照

p.230 : 第 50 表

(誤) 注) ヘモグロビン A1c $\geq$ 5.6%の場合 判定の基準は p.44 参照

(正) 注) ヘモグロビン A1c $\geq$ 5.6%の場合

判定の基準

- ①「糖尿病が強く疑われる人」とは、ヘモグロビン A1c の値が 6.1%以上、または、質問票で「現在糖尿病の治療を受けている」と答えた人である。
- ②「糖尿病の可能性を否定できない人」とは、ヘモグロビン A1c の値が 5.6%以上、6.1%未満で、①以外の人である。

p.230 : 第 51 表

(誤) 注) ヘモグロビン A1c $\geq$ 5.5%の場合

(正) 注) ヘモグロビン A1c $\geq$ 5.5%の場合

判定の基準

- ①「糖尿病が強く疑われる人」とは、ヘモグロビン A1c の値が 6.1%以上、または、質問票で「現在糖尿病の治療を受けている」と答えた人である。
- ②「糖尿病の可能性を否定できない人」とは、ヘモグロビン A1c の値が 5.5%以上、6.1%未満で、①以外の人である。

第 6 部 年次別結果

p.333 : 第 146 表

平成 20 年 2008 野菜類 その他の野菜

(誤) 166.4

(正) 189.4

(誤) 第42表の1 血糖値の分布(食後3時間以上, 性・年齢階級別)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳	(再掲) 70-74歳	(再掲) 75-79歳	(再掲) 80-84歳	(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	40mg/d未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-60	3	0.2	1	1.1	0	0	0	0	1	0.4	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0
	60-80	76	4.7	6	6.9	13	8.1	13	8.3	8	3.1	16	3.6	20	3.8	10	4.3	11	5.0	6	3.5
	80-100	865	53.2	70	80.5	126	78.8	105	67.3	147	57.2	227	51.5	190	36.1	106	45.5	87	39.4	63	37.1
	100-120	401	24.6	9	10.3	19	11.9	23	14.7	62	24.1	118	26.8	170	32.3	74	31.8	70	31.7	49	28.8
	120-140	142	8.7	0	0	1	0.6	7	4.5	17	6.6	47	10.7	70	13.3	27	11.6	22	10.0	30	17.6
	140-160	53	3.3	0	0	0	0	3	1.9	8	3.1	11	2.5	31	5.9	5	2.1	11	5.0	12	7.1
	160-180	33	2.0	1	1.1	0	0	2	1.3	3	1.2	6	1.4	21	4.0	2	0.9	8	3.6	4	2.4
	180-200	14	0.9	0	0	0	0	0	0	3	1.2	5	1.1	6	1.1	1	0.4	1	0.5	4	2.4
	200-220	12	0.7	0	0	0	0	1	0.6	0	0	2	0.5	9	1.7	0	0	6	2.7	0	0
	220-240	6	0.4	0	0	0	0	1	0.6	2	0.8	3	0.7	0	0	2	0.9	0	0	0	0
	240-260	7	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.4	2	0.5	4	0.8	2	0.9	2	0.9	1	0.6
	260mg/d以上	15	0.9	0	0	1	0.6	1	0.6	5	1.9	3	0.7	5	1.0	3	1.3	3	1.4	1	0.6
	(再掲)110mg/d以上	391	24.0	6	6.9	5	3.1	19	12.2	52	20.2	111	25.2	198	37.6	62	26.6	80	36.2	59	34.7
	総 数	1,627	100	87	100	160	100	156	100	257	100	441	100	526	100	233	100	221	100	170	100
女 性	40mg/d未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-60	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0
	60-80	104	4.5	13	11.1	33	11.4	14	5.5	18	4.0	13	2.4	13	2.1	6	2.2	6	2.4	4	2.0
	80-100	1,199	52.4	88	75.2	200	69.2	166	65.1	254	55.9	279	50.7	212	33.9	125	46.1	88	34.8	72	35.6
	100-120	680	29.7	13	11.1	43	14.9	65	25.5	147	32.4	165	30.0	247	39.5	88	32.5	95	37.5	75	37.1
	120-140	177	7.7	2	1.7	8	2.8	8	3.1	19	4.2	50	9.1	90	14.4	23	8.5	38	15.0	32	15.8
	140-160	65	2.8	1	0.9	2	0.7	1	0.4	8	1.8	20	3.6	33	5.3	14	5.2	6	2.4	14	6.9
	160-180	23	1.0	0	0	3	1.0	0	0	2	0.4	7	1.3	11	1.8	5	1.8	6	2.4	3	1.5
	180-200	12	0.5	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	10	1.6	0	0	8	3.2	1	0.5
	200-220	5	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	3	0.5	2	0.7	2	0.8	0	0
	220-240	6	0.3	0	0	0	0	1	0.4	0	0	2	0.4	3	0.5	1	0.4	3	1.2	0	0
	240-260	10	0.4	0	0	0	0	0	0	2	0.4	6	1.1	2	0.3	3	1.1	1	0.4	0	0
	260mg/d以上	8	0.3	0	0	0	0	0	0	3	0.7	4	0.7	1	0.2	3	1.1	0	0	1	0.5
	(再掲)110mg/d以上	520	22.7	7	6.0	22	7.6	29	11.4	74	16.3	144	26.2	244	39.0	76	28.0	99	39.1	73	36.1
	総 数	2,290	100	117	100	289	100	255	100	454	100	550	100	625	100	271	100	253	100	202	100

(誤) 第42表の1 血糖値の平均値及び標準偏差(食後3時間以上, 性・年齢階級別)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳		(再掲) 70-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80-84歳		(再掲) 85歳以上	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男 性	105.8	33.6	91.7	11.9	92.1	15.9	98.9	27.4	107.5	44.7	106.1	32.9	113.2	33.6	107.7	37.9	112.8	36.6	111.3	29.8	113.3	28.9	110.0	28.9	
	102.8	25.1	91.0	11.5	93.0	14.1	95.3	14.7	100.5	22.3	106.3	30.5	111.2	27.4	108.8	34.7	111.9	29.2	110.1	27.7	112.5	26.6	110.0	18.1	
女 性	104.8	31.6	92.4	11.2	92.2	16.0	98.5	28.4	105.8	40.3	104.6	29.7	112.5	33.6	106.5	33.8	111.5	34.1	111.2	30.8	113.3	28.9	110.0	28.9	
	101.2	22.7	90.0	9.9	92.4	13.2	94.8	11.4	99.6	21.0	104.3	27.1	108.8	25.3	106.7	31.3	109.4	25.8	107.7	28.2	112.5	26.6	110.0	18.1	

(正) 第42表の1 血糖値の分布(食後3時間以上, 性・年齢階級別)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳	(再掲) 70-74歳	(再掲) 75-79歳	(再掲) 80-84歳	(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	40mg/d未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-60	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.4	1	0.3	0	0	1	0.5	0	0	0	0
	60-80	60	4.1	3	3.9	10	6.6	12	8.5	5	2.1	14	3.5	16	3.5	9	4.2	8	4.0	2	2.4
	80-100	915	56.0	65	85.5	122	89.8	102	71.8	139	59.1	215	54.4	172	37.6	104	48.1	81	40.9	55	36.9
	100-120	345	23.7	7	9.2	17	11.3	15	10.6	57	24.3	102	25.8	147	32.2	64	29.6	64	32.3	44	29.5
	120-140	116	8.0	0	0	1	0.7	5	3.5	16	6.8	36	9.1	58	12.7	24	11.1	20	10.1	25	16.8
	140-160	46	3.2	0	0	0	0	3	2.1	6	2.6	11	2.8	26	5.7	5	2.3	9	4.5	10	6.7
	160-180	27	1.9	1	1.3	0	0	2	1.4	3	1.3	4	1.0	17	3.7	2	0.9	6	3.0	3	2.0
	180-200	12	0.8	0	0	0	0	0	0	2	0.9	4	1.0	6	1.3	1	0.5	1	0.5	4	2.7
	200-220	11	0.8	0	0	0	0	1	0.7	0	0	2	0.5	8	1.8	0	0	6	3.0	0	0
	220-240	5	0.3	0	0	0	0	1	0.7	2	0.9	2	0.5	0	0	2	0.9	0	0	0	0
	240-260	7	0.5	0	0	0	0	0	0	1	0.4	2	0.5	4	0.9	2	0.9	2	1.0	1	0.7
	260mg/d以上	10	0.7	0	0	1	0.7	1	0.7	3	1.3	2	0.5	3	0.7	2	0.9	1	0.5	1	0.7
(再掲)110mg/d以上		326	22.4	5	6.6	4	2.6	15	10.6	45	19.1	91	23.0	166	36.3	55	25.5	70	35.4	50	33.6
総 数		1,456	100	76	100	151	100	142	100	235	100	395	100	457	100	216	100	198	100	149	100
女 性	40mg/d未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0
	60-80	93	4.6	12	11.9	29	11.5	11	4.7	16	4.0	12	2.5	13	2.4	5	2.1	6	2.8	4	2.3
	80-100	1,099	54.9	77	76.2	179	71.0	155	66.5	230	58.1	260	53.6	198	37.0	115	48.7	79	36.7	69	40.4
	100-120	585	29.2	10	9.9	35	13.9	59	25.3	124	31.3	145	29.9	212	39.6	78	33.1	82	38.1	63	36.8
	120-140	135	6.7	2	2.0	5	2.0	7	3.0	16	4.0	35	7.2	70	13.3	15	6.4	30	14.0	24	14.0
	140-160	49	2.4	0	0	2	0.8	1	0.4	4	1.0	17	3.5	25	4.7	13	5.5	6	2.8	8	4.7
	160-180	13	0.6	0	0	2	0.8	0	0	2	0.5	4	0.8	5	0.9	2	0.8	3	1.4	1	0.6
	180-200	8	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	7	1.3	0	0	6	2.8	1	0.6
	200-220	4	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	2	0.4	2	0.8	1	0.5	0	0
	220-240	4	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	2	0.4	1	0.4	2	0.9	0	0
	240-260	6	0.3	0	0	0	0	0	0	2	0.5	4	0.8	0	0	2	0.8	0	0	0	0
	260mg/d以上	5	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.5	2	0.4	1	0.2	2	0.8	0	0	1	0.6
(再掲)110mg/d以上		404	20.2	4	4.0	15	6.0	25	10.7	61	15.4	111	22.9	188	35.1	58	24.6	78	36.3	53	31.0
総 数		2,002	100	101	100	252	100	233	100	396	100	485	100	535	100	236	100	215	100	171	100

(誤) 第42表の2 血糖値の分布(食後3時間以上、性・年齢階級別)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳	(再掲) 70-74歳	(再掲) 75-79歳	(再掲) 80-84歳	(再掲) 85歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男 性	40mg/d未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40-60	3	0.2	1	1.1	0	0	0	0	1	0.4	1	0.3	0	0	1	0.5	0	0	0	0	
	60-80	74	4.9	6	6.9	13	8.2	13	8.6	8	3.3	15	3.8	19	4.1	9	4.3	10	5.2	6	3.9	
	80-100	844	56.0	70	80.5	126	79.2	104	68.4	144	59.3	220	55.0	180	38.7	104	49.5	84	44.0	59	38.3	
	100-120	386	25.2	9	10.3	18	11.3	22	14.5	59	24.3	110	27.5	162	34.3	69	32.9	67	35.1	45	29.2	
	120-140	119	7.9	0	0	1	0.6	7	4.6	13	5.3	37	9.3	61	13.1	20	9.5	19	28	18.2	13	14.0
	140-160	39	2.6	0	0	0	0	3	2.0	7	2.9	7	1.8	22	4.7	3	1.4	6	3.1	10	6.5	
	160-180	19	1.3	1	1.1	0	0	1	0.7	1	0.4	3	0.8	13	2.8	0	0	3	1.6	3	1.9	
	180-200	11	0.7	0	0	0	0	0	0	3	1.2	3	0.8	5	1.1	1	0.5	1	0.5	3	1.9	
	200-220	3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.4	0	0	0	0	2	2.2	
	220-240	3	0.2	0	0	0	0	1	0.7	1	0.4	1	0.3	0	0	1	0.5	0	0	0	0	
	240-260	1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	260mg/d以上	10	0.7	0	0	1	0.6	1	0.7	5	2.1	2	0.5	1	0.2	2	1.0	1	0.5	0	0	
	(再掲)110mg/d以上	306	20.3	6	6.9	5	3.1	16	10.5	43	17.7	82	20.5	154	33.1	44	21.0	56	29.3	50	32.5	
	総 数	1,506	100	87	100	150	100	152	100	243	100	400	100	465	100	210	100	191	100	154	100	
女 性	40mg/d未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40-60	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	0	0	
	60-80	102	4.6	13	11.2	33	11.5	14	5.5	18	4.1	13	2.5	11	1.9	6	2.4	4	1.7	4	2.0	
	80-100	1,184	53.9	88	75.9	200	69.4	165	65.2	252	57.1	272	52.8	207	35.4	121	48.6	85	36.6	71	36.2	
	100-120	660	30.0	13	11.2	42	14.6	65	25.7	143	32.4	162	31.5	235	40.2	86	34.5	91	39.2	74	37.8	
	120-140	164	7.5	1	0.9	8	2.8	8	3.2	16	3.6	46	8.9	85	14.6	22	8.8	34	14.7	32	16.3	
	140-160	47	2.1	1	0.9	2	0.7	1	0.4	7	1.6	9	1.7	27	4.6	5	2.0	4	1.7	13	6.6	
	160-180	20	0.9	0	0	3	1.0	0	0	2	0.5	6	1.2	9	1.5	5	2.0	6	2.6	1	0.5	
	180-200	9	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	7	1.2	0	0	5	2.2	1	0.5	
	200-220	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.4	1	0.4	0	0	
	220-240	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	
	240-260	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.4	0	0	
	260mg/d以上	5	0.2	0	0	0	0	0	0	2	0.5	3	0.6	0	0	2	0.8	0	0	0	0	
	(再掲)110mg/d以上	454	20.7	6	5.2	21	7.3	28	11.1	65	14.7	117	22.7	217	37.2	59	23.7	86	37.1	69	35.2	
	総 数	2,197	100	116	100	288	100	253	100	441	100	515	100	584	100	249	100	232	100	196	100	

注)インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外

(誤) 第42表の2 血糖値の平均値及び標準偏差(食後3時間以上、性・年齢階級別)

	総 数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳	(再掲) 70-74歳	(再掲) 75-79歳	(再掲) 80-84歳	(再掲) 85歳以上						
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差					
男 性	1023	28.4	91.7	11.9	92.0	15.9	97.6	25.4	106.1	44.6	102.1	25.7	107.6	24.3	103.0	29.1	104.4	23.2	108.3	23.0	112.5	27.1	109.7	26.1
女 性	1008	20.3	90.7	10.9	93.0	14.1	94.7	11.7	99.2	18.4	102.8	23.9	109.0	21.8	104.2	27.5	109.6	25.5	108.1	18.5	108.9	20.2	109.7	18.7

注)インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外

(正) 第42表の2 血糖値の分布(食後3時間以上、性・年齢階級別)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-69歳	(再掲) 70-74歳	(再掲) 75-79歳	(再掲) 80-84歳	(再掲) 85歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	40mg/d未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-60	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.5	1	0.3	0	0	1	0.5	0	0	0	0
	60-80	59	4.4	3	3.9	10	6.7	12	8.7	5	2.3	13	3.6	16	4.0	8	4.1	8	4.7	6	4.3
	80-100	797	59.2	65	85.5	122	81.3	101	73.2	136	61.5	209	58.2	164	40.8	102	52.6	78	45.6	52	38.8
	100-120	324	24.1	7	9.2	16	10.7	14	10.1	54	24.4	94	26.2	139	34.6	59	30.4	61	35.7	40	29.9
	120-140	94	7.0	0	0	1	0.7	5	3.6	12	5.4	27	7.5	49	12.2	17	8.8	17	9.9	23	17.2
	140-160	33	2.5	0	0	0	0	3	2.2	5	2.3	7	1.9	18	4.5	3	1.5	4	2.3	8	6.0
	160-180	15	1.1	1	1.3	0	0	1	0.7	1	0.5	2	0.6	10	2.5	0	0	2	1.2	2	1.5
	180-200	9	0.7	0	0	0	0	0	0	2	0.9	2	0.6	5	1.2	1	0.5	1	0.6	3	2.2
	200-220	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	0	0	0	0	1	1.4
	220-240	3	0.2	0	0	0	0	1	0.7	1	0.5	1	0.3	0	0	1	0.5	0	0	0	0
	240-260	1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260mg/d以上	7	0.5	0	0	1	0.7	1	0.7	3	1.4	2	0.6	0	0	2	1.0	0	0	0	0	
(再掲)110mg/d以上		248	18.4	5	6.6	4	2.7	12	8.7	36	16.3	66	18.4	125	31.1	38	19.6	48	28.1	41	30.6
総 数		1,346	100	76	100	150	100	138	100	221	100	359	100	492	100	194	100	171	100	134	100
女 性	40mg/d未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-60	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0
	60-80	91	4.7	12	12.0	29	11.6	11	4.7	16	4.2	12	2.7	11	2.2	5	2.3	4	2.0	4	2.4
	80-100	1,084	56.4	77	77.0	179	71.3	154	66.4	228	59.5	253	56.0	193	38.4	111	51.6	76	38.6	68	40.7
	100-120	569	29.6	10	10.0	34	13.5	59	25.4	120	31.3	142	31.4	204	40.6	76	35.3	80	40.6	62	37.1
	120-140	123	6.4	1	1.0	5	2.0	7	3.0	13	3.4	31	6.9	66	13.1	14	6.5	26	13.2	24	14.4
	140-160	32	1.7	0	0	2	0.8	1	0.4	3	0.8	6	1.3	20	4.0	4	1.9	4	2.0	8	4.8
	160-180	11	0.6	0	0	2	0.8	0	0	2	0.5	3	0.7	4	0.8	2	0.9	3	1.5	0	0
	180-200	5	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	4	0.8	0	0	3	1.5	1	0.6
	200-220	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0
	220-240	2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0
	240-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260mg/d以上	2	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	1	0.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0	
(再掲)110mg/d以上		349	18.2	3	3.0	14	5.6	25	10.8	52	13.6	86	19.0	169	33.6	42	19.5	67	34.0	51	30.5
総 数		1,921	100	100	100	251	100	232	100	383	100	452	100	503	100	215	100	197	100	167	100

注)インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外

(正) 第42表の2 血糖値の平均値及び標準偏差(食後3時間以上、性・年齢階級別)

		総 数		20-29歳	
--	--	-----	--	--------	--

(誤) 第50表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定できない人」の状況
(性・年齢階級別)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	糖尿病が強く疑われる人	211	11.6	0	0	2	1.1	9	4.9	34	11.6	67	13.8	99	17.3	151	12.6	78	15.6	58	17.5
	(再掲)糖尿病が強く疑われる 人のうち服薬者*	99	46.9	0	0	0	0	3	33.3	13	38.2	32	47.8	51	51.5	76	50.3	47	60.3	23	39.7
	糖尿病の可能性を否定できない人 上記以外	273	15.1	2	2.0	8	4.5	16	8.6	41	14.0	95	19.6	111	19.4	192	16.0	93	18.6	71	21.4
		1,329	73.3	99	98.0	168	94.4	160	86.5	217	74.3	322	66.5	363	63.4	859	71.5	328	65.7	203	61.1
	総 数	1,813	100	101	100	178	100	185	100	292	100	484	100	573	100	1,202	100	499	100	332	100
女 性	糖尿病が強く疑われる人	168	6.4	1	0.7	3	0.9	7	2.2	30	6.0	62	10.0	65	9.2	136	7.9	72	12.4	28	6.7
	(再掲)糖尿病が強く疑われる 人のうち服薬者*	82	48.8	1	100	1	33.3	1	14.3	14	46.7	31	50.0	34	52.3	68	50.0	41	56.9	12	42.9
	糖尿病の可能性を否定できない人 上記以外	375	14.3	2	1.4	14	4.1	30	9.5	75	15.0	99	16.0	155	22.0	264	15.3	119	20.4	95	22.6
		2,078	79.3	138	97.9	321	95.0	279	88.3	395	79.0	459	74.0	486	68.8	1,321	76.8	391	67.2	298	70.8
	総 数	2,621	100	141	100	338	100	316	100	500	100	620	100	706	100	1,721	100	582	100	421	100
総 数	糖尿病が強く疑われる人	379	8.5	1	0.4	5	1.0	16	3.2	64	8.1	129	11.7	164	12.8	287	9.8	150	13.9	86	11.4
	(再掲)糖尿病が強く疑われる 人のうち服薬者*	181	47.8	1	100	1	20.0	4	25.0	27	42.2	63	48.8	85	51.8	144	50.2	88	58.7	35	40.7
	糖尿病の可能性を否定できない人 上記以外	648	14.6	4	1.7	22	4.3	46	9.2	116	14.6	194	17.6	266	20.8	456	15.6	212	19.6	166	22.0
		3,407	76.8	237	97.9	489	94.8	439	87.6	612	77.3	781	70.7	849	66.4	2,180	74.6	719	66.5	501	66.5
	総 数	4,434	100	242	100	516	100	501	100	792	100	1,104	100	1,279	100	2,923	100	1,081	100	753	100

注)ヘモグロビンA1c $\geq$ 5.6%の場合

*「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

(正) 第50表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定できない人」の状況
(性・年齢階級別)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	糖尿病が強く疑われる人	248	13.7	0	0	2	1.1	11	5.9	39	13.4	81	16.7	115	20.1	177	14.7	93	18.6	69	20.8
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち 服薬者*	120	48.4	0	0	0	0	4	36.4	16	41.0	39	48.1	61	53.0	91	51.4	56	60.2	29	42.0
	糖尿病の可能性を否定できない人 上記以外	252	13.9	2	2.0	8	4.5	15	8.1	38	13.0	85	17.6	104	18.2	175	14.6	82	16.4	67	20.2
		1,313	72.4	99	98.0	168	94.4	159	85.9	215	73.6	318	65.7	354	61.8	850	70.7	324	64.9	196	59.0
	総 数	1,813	100	101	100	178	100	185	100	292	100	484	100	573	100	1,202	100	499	100	332	100
女 性	糖尿病が強く疑われる人	193	7.4	1	0.7	3	0.9	7	2.2	30	6.0	69	11.1	83	11.8	151	8.8	86	14.8	38	9.0
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち 服薬者*	101	52.3	1	100	1	33.3	1	14.3	14	46.7	36	52.2	48	57.8	78	51.7	50	58.1	21	55.3
	糖尿病の可能性を否定できない人 上記以外	355	13.5	2	1.4	14	4.1	30	9.5	75	15.0	93	15.0	141	20.0	252	14.6	108	18.6	87	20.7
		2,073	79.1	138	97.9	321	95.0	279	88.3	395	79.0	458	73.9	482	68.3	1,318	76.6	388	66.7	296	70.3
	総 数	2,621	100	141	100	338	100	316	100	500	100	620	100	706	100	1,721	100	582	100	421	100
総 数	糖尿病が強く疑われる人	441	9.9	1	0.4	5	1.0	18	3.6	69	8.7	150	13.6	198	15.5	328	11.2	179	16.6	107	14.2
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち 服薬者*	221	50.1	1	100	1	20.0	5	27.8	30	43.5	75	50.0	109	55.1	169	51.5	106	59.2	50	46.7
	糖尿病の可能性を否定できない人 上記以外	607	13.7	4	1.7	22	4.3	45	9.0	113	14.3	178	16.1	245	19.2	427	14.6	190	17.6	154	20.5
		3,386	76.4	237	97.9	489	94.8	438	87.4	610	77.0	776	70.3	836	65.4	2,168	74.2	712	65.9	492	65.3
	総 数	4,434	100	242	100	516	100	501	100	792	100	1,104	100	1,279	100	2,923	100	1,081	100	753	100

注)ヘモグロビンA1c $\geq$ 5.6%の場合

*「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

(誤) 第51表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定できない人」の状況
(性・年齢階級別)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	糖尿病が強く疑われる人	211	11.6	0	0	2	1.1	9	4.9	34	11.6	67	13.8	99	17.3	151	12.6	78	15.6	58	17.5
	(再掲)糖尿病が強く疑われる 人のうち服薬者 [※]	99	46.9	0	0	0	0	3	33.3	13	38.2	32	47.8	51	51.5	76	50.3	47	60.3	23	39.7
	糖尿病の可能性を否定できない人 上記以外	384	21.2	3	3.0	11	6.2	25	13.5	59	20.2	126	26.0	160	27.9	270	22.5	132	26.5	100	30.1
		1,218	67.2	98	97.0	165	92.7	151	81.6	199	68.2	291	60.1	314	54.8	781	65.0	289	57.9	174	52.4
	総 数	1,813	100	101	100	178	100	185	100	292	100	484	100	573	100	1,202	100	499	100	332	100
女 性	糖尿病が強く疑われる人	168	6.4	1	0.7	3	0.9	7	2.2	30	6.0	62	10.0	65	9.2	136	7.9	72	12.4	28	6.7
	(再掲)糖尿病が強く疑われる 人のうち服薬者 [※]	82	48.8	1	100	1	33.3	1	14.3	14	46.7	31	50.0	34	52.3	68	50.0	41	56.9	12	42.9
	糖尿病の可能性を否定できない人 上記以外	576	22.0	10	7.1	24	7.1	48	15.2	120	24.0	156	25.2	218	30.9	408	23.7	164	28.2	134	31.8
		1,877	71.6	130	92.2	311	92.0	261	82.6	350	70.0	402	64.8	423	59.9	1,177	68.4	346	59.5	259	61.5
	総 数	2,621	100	141	100	338	100	316	100	500	100	620	100	706	100	1,721	100	582	100	421	100
総 数	糖尿病が強く疑われる人	379	8.5	1	0.4	5	1.0	16	3.2	64	8.1	129	11.7	164	12.8	287	9.8	150	13.9	86	11.4
	(再掲)糖尿病が強く疑われる 人のうち服薬者 [※]	181	47.8	1	100	1	20.0	4	25.0	27	42.2	63	48.8	85	51.8	144	50.2	88	58.7	35	40.7
	糖尿病の可能性を否定できない人 上記以外	960	21.7	13	5.4	35	6.8	73	14.6	179	22.6	282	25.5	378	29.6	678	23.2	296	27.4	234	31.1
		3,095	69.8	228	94.2	476	92.2	412	82.2	549	69.3	693	62.8	737	57.6	1,958	67.0	635	58.7	433	57.5
	総 数	4,434	100	242	100	516	100	501	100	792	100	1,104	100	1,279	100	2,923	100	1,081	100	753	100

注)ヘモグロビンA1c $\geq$ 5.5%の場合

*「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

(正) 第51表 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定できない人」の状況
(性・年齢階級別)

		総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男 性	糖尿病が強く疑われる人	248	13.7	0	0	2	1.1	11	5.9	39	13.4	81	16.7	115	20.1	177	14.7	93	18.6	69	20.8
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者*	120	48.4	0	0	0	0	4	36.4	16	41.0	39	48.1	61	53.0	91	51.4	56	60.2	29	42.0
	糖尿病の可能性を否定できない人	359	19.8	3	3.0	11	6.2	24	13.0	56	19.2	115	23.8	150	26.2	251	20.9	119	23.8	94	28.3
	上記以外	1,206	66.5	98	97.0	165	92.7	150	81.1	197	67.5	288	59.5	308	53.8	774	64.4	287	57.5	169	50.9
	総 数	1,813	100	101	100	178	100	185	100	292	100	484	100	573	100	1,202	100	499	100	332	100
女 性	糖尿病が強く疑われる人	193	7.4	1	0.7	3	0.9	7	2.2	30	6.0	69	11.1	83	11.8	151	8.8	86	14.8	38	9.0
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者*	101	52.3	1	100	1	33.3	1	14.3	14	46.7	36	52.2	48	57.8	78	51.7	50	58.1	21	55.3
	糖尿病の可能性を否定できない人	555	21.2	10	7.1	24	7.1	48	15.2	120	24.0	150	24.2	203	28.8	395	23.0	152	26.1	126	29.9
	上記以外	1,873	71.5	130	92.2	311	92.0	261	82.6	350	70.0	401	64.7	420	59.5	1,175	68.3	344	59.1	257	61.0
	総 数	2,621	100.0	141	100	338	100	316	100	500	100	620	100	706	100	1,721	100	582	100	421	100
総 数	糖尿病が強く疑われる人	441	9.9	1	0.4	5	1.0	18	3.6	69	8.7	150	13.6	198	15.5	328	11.2	179	16.6	107	14.2
	(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち服薬者*	221	50.1	1	100	1	20.0	5	27.8	30	43.5	75	50.0	109	55.1	169	51.5	106	59.2	50	46.7
	糖尿病の可能性を否定できない人	914	20.6	13	5.4	35	6.8	72	14.4	176	22.2	265	24.0	353	27.6	646	22.1	271	25.1	220	29.2
	上記以外	3,079	69.4	228	94.2	476	92.2	411	82.0	547	69.1	689	62.4	728	56.9	1,949	66.7	631	58.4	426	56.6
	総 数	4,434	100.0	242	100	516	100	501	100	792	100	1,104	100	1,279	100	2,923	100	1,081	100	753	100

注)ヘモグロビンA1c $\geq$ 5.5%の場合

*「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者

(誤) 第154表の1 肥満者(BMI $\geq$ 25)の割合の年次推移(性・年齢階級別)Trends in Prevalence of Overweight and Obesity (BMI $\geq$ 25), 1980 to 2008

(%)

		20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
男	昭和55年 1980	10.6	19.3	23.3	20.0	14.7	11.4
	56年 1981	12.0	18.6	24.3	20.3	19.9	13.1
	57年 1982	9.8	19.1	22.0	22.0	21.0	14.9
	58年 1983	13.8	20.5	26.7	23.1	17.4	12.3
	59年 1984	9.4	18.0	25.3	22.2	19.7	14.0
	60年 1985	13.6	18.3	21.4	19.8	19.5	12.8
	61年 1986	13.1	19.3	24.4	24.2	16.6	12.5
	62年 1987	12.9	21.6	23.7	25.0	19.0	14.8
	63年 1988	10.2	20.7	21.6	27.3	23.9	16.1
	平成元年 1989	14.2	21.3	23.9	28.0	21.7	15.5
	2年 1990	16.4	23.1	27.5	25.8	18.8	17.1
	3年 1991	16.5	23.4	26.2	29.0	23.7	16.2
	4年 1992	17.1	26.6	26.8	28.4	21.5	16.8
	5年 1993	16.9	28.2	24.5	27.9	23.8	18.1
	6年 1994	16.9	22.8	26.4	24.6	23.8	15.2
	7年 1995	17.7	24.4	28.5	27.6	24.1	16.4
	8年 1996	13.5	24.0	27.2	28.1	25.1	17.7
	9年 1997	16.6	24.2	28.0	24.1	26.9	17.2
	10年 1998	19.0	30.6	29.0	29.0	29.8	20.1
	11年 1999	19.2	30.0	31.4	29.6	24.2	21.3
女	12年 2000	18.6	27.3	28.9	29.9	30.7	21.7
	13年 2001	18.1	29.0	31.8	31.6	31.3	21.0
	14年 2002	17.5	31.2	31.6	32.4	30.1	26.3
	15年 2003	14.8	32.7	34.4	30.9	30.7	20.9
	16年 2004	19.9	28.9	32.7	30.8	29.7	25.5
	17年 2005	19.8	26.7	34.1	31.4	30.7	26.0
	18年 2006	19.6	34.0	33.7	32.5	33.0	23.1
	19年 2007	21.3	28.6	33.0	34.3	32.7	27.5
	20年 2008	14.6	29.5	35.9	32.4	29.4	25.5
	昭和55年 1980	11.1	14.7	24.6	29.2	24.3	21.4
	56年 1981	9.2	17.9	25.7	29.6	28.1	26.0
	57年 1982	7.2	14.9	25.8	31.2	30.0	24.1
	58年 1983	8.7	13.5	22.8	28.5	30.6	22.5
	59年 1984	7.7	13.2	20.4	28.4	29.7	24.6
	60年 1985	8.2	13.1	22.8	30.4	32.1	22.5
	61年 1986	8.2	12.7	23.5	29.3	30.4	24.1
	62年 1987	6.3	13.7	22.0	30.0	30.7	24.6
	63年 1988	6.4	12.7	20.5	28.3	28.6	23.0
	平成元年 1989	6.1	11.5	19.3	26.7	30.0	26.2
	2年 1990	8.3	13.5	20.9	28.7	31.9	25.4
	3年 1991	7.2	13.3	21.7	28.9	28.9	28.4
	4年 1992	6.1	14.1	22.5	28.3	31.5	25.7
	5年 1993	6.8	12.0	22.2	26.6	35.3	26.4
	6年 1994	7.3	13.0	22.4	25.7	30.1	24.5
	7年 1995	6.6	11.7	21.3	27.1	31.0	27.6
	8年 1996	7.2	11.6	20.5	24.4	31.2	28.2
	9年 1997	6.9	12.5	20.4	26.0	30.0	27.5
	10年 1998	7.0	13.9	19.5	26.3	31.3	27.1
	11年 1999	7.3	13.3	18.8	27.5	30.4	25.7
	12年 2000	6.9	12.9	20.2	23.6	31.0	27.3
	13年 2001	7.3	14.1	17.2	24.9	30.5	28.8
	14年 2002	7.0	11.0	19.0	25.6	33.3	30.8
	15年 2003	8.1	12.6	19.8	23.8	30.3	28.3
	16年 2004	5.4	8.3	17.9	24.1	29.9	26.7
	17年 2005	5.6	14.3	19.3	23.9	29.0	26.5
	18年 2006	7.7	12.6	16.4	25.7	28.2	26.6
	19年 2007	5.9	11.1	16.3	21.2	29.5	25.4
	20年 2008	7.7	11.8	18.0	21.1	24.4	26.8

注) 妊婦除外

(正) 第154表の1 肥満者(BMI $\geq$ 25)の割合の年次推移(性・年齢階級別)Trends in Prevalence of Overweight and Obesity (BMI $\geq$ 25), 1980 to 2008

(%)

		20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
男	昭和55年 1980	10.6	19.3	23.3	20.0	14.7	11.4
	56年 1981	12.0	18.6	24.3	20.3	19.9	13.1
	57年 1982	9.8	19.1	22.0	22.0	21.0	14.9
	58年 1983	13.8	20.5	26.7	23.1	17.4	12.3
	59年 1984	9.4	18.0	25.3	22.2	19.7	14.0
	60年 1985	13.6	18.3	21.4	19.8	19.5	12.8
	61年 1986	13.1	19.3	24.4	24.2	16.6	12.5
	62年 1987	12.8	21.6	23.7	25.0	19.0	14.8
	63年 1988	10.2	20.7	21.6	27.3	23.9	16.1
	平成元年 1989	14.2	21.3	23.9	28.0	21.7	15.5
	2年 1990	16.4	23.1	27.5	25.8	18.8	17.1
	3年 1991	16.5	23.4	26.2	29.0	23.7	16.2
	4年 1992	17.1	26.6	26.8	28.4	21.5	16.8
	5年 1993	16.9	28.2	24.5	27.9	23.8	18.1
	6年 1994	16.9	22.8	26.4	24.6	23.8	15.2
	7年 1995	17.7	24.4	28.5	27.6	24.1	16.4
	8年 1996	13.5	24.0	27.2	28.1	25.1	17.7
	9年 1997	16.6	24.2	28.0	24.1	26.9	17.2
	10年 1998	18.8	30.3	28.7	28.1	29.1	19.6
	11年 1999	19.0	29.7	30.9	28.7	23.5	21.1
	12年 2000	18.6	27.3	28.9	29.9	30.7	21.7
女	13年 2001	18.1	29.3	31.8	31.9	31.2	21.0
	14年 2002	17.5	31.2	31.6	32.4	30.1	26.3
	15年 2003	14.8	32.7	34.4	30.9	30.7	20.9
	16年 2004	19.9	28.9	32.7	30.8	29.7	25.5
	17年 2005	19.8	26.7	34.1	31.4	30.7	26.0
	18年 2006	19.6	34.0	33.7	32.5	33.0	23.1
	19年 2007	21.3	28.6	33.0	34.3	32.7	27.5
	20年 2008	14.6	29.5	35.9	32.4	29.4	25.5
	昭和55年 1980	10.1	14.2	24.6	29.2	24.3	21.4
	56年 1981	8.1	17.6	25.7	29.6	28.0	26.0
	57年 1982	6.3	14.5	25.8	31.2	30.0	24.1
	58年 1983	7.1	13.0	22.8	28.4	30.6	22.5
	59年 1984	7.0	13.0	20.4	28.4	29.7	24.6
	60年 1985	7.5	12.7	22.8	30.4	32.1	22.5
	61年 1986	6.5	12.3	23.5	29.3	30.4	24.1
	62年 1987	5.8	13.3	21.9	30.0	30.7	24.6
	63年 1988	5.9	12.6	20.4	28.3	28.6	23.0
	平成元年 1989	5.8	11.3	19.3	26.7	30.0	26.2
	2年 1990	7.4	13.2	20.9	28.7	31.9	25.4
	3年 1991	6.6	13.1	21.7	28.9	28.9	28.4
	4年 1992	5.5	13.5	22.5	28.3	31.5	25.7
	5年 1993	6.5	11.7	22.2	26.6	35.3	26.4
	6年 1994	6.8	12.9	22.4	25.7	30.1	24.4
	7年 1995	5.6	11.7	21.2	27.1	31.0	27.6
	8年 1996	6.7	11.1	20.5	24.4	31.2	28.2
	9年 1997	5.5	12.8	20.4	26.0	30.0	27.5
	10年 1998	7.0	13.7	19.3	25.7	31.0	26.5
	11年 1999	7.2	12.4	18.2	27.1	30.1	25.1
	12年 2000	6.7	12.9	20.1	23.6	31.0	27.3
	13年 2001	7.0	14.3	17.1	25.1	30.5	28.8
	14年 2002	6.4	11.3	19.0	25.6	33.3	30.8
	15年 2003	8.1	12.6	19.8	23.8	30.3	28.3
	16年 2004	5.4	8.3	17.9	24.1	29.9	26.7
	17年 2005	5.6	14.3	19.3	23.9	29.0	26.5
	18年 2006	7.7	12.6	16.4	25.7	28.2	26.6
	19年 2007	5.9	11.1	16.3	21.2	29.5	25.4
	20年 2008	7.7	11.8	18.0	21.1	24.4	26.8

注) 妊婦除外

(誤) 第154表の2 低体重(やせ)の者(BMI<18.5)の割合の年次推移(性・年齢階級別)

Trends in Prevalence of Underweight (BMI<18.5), 1980 to 2008

(%)

		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
男	昭和55年 1980	9.3	5.0	4.3	5.1	10.1	16.4
	56年 1981	7.9	3.8	3.8	4.7	6.4	15.8
	57年 1982	6.1	6.0	3.5	5.3	8.9	13.2
	58年 1983	6.9	4.4	3.6	4.5	6.7	12.9
	59年 1984	6.7	5.6	2.3	5.6	8.3	16.3
	60年 1985	7.5	4.2	3.0	4.7	7.0	5.3
	61年 1986	9.4	4.4	2.6	4.2	7.8	17.0
	62年 1987	7.8	5.2	3.0	4.3	7.4	15.8
	63年 1988	8.2	4.9	2.3	3.7	6.6	13.0
	平成元年 1989	10.5	5.5	3.5	4.5	7.0	12.5
	2年 1990	8.6	4.5	2.8	4.0	8.1	13.6
	3年 1991	7.0	5.1	3.7	3.4	8.6	10.2
	4年 1992	6.4	5.5	3.7	2.4	7.8	11.7
	5年 1993	7.9	4.2	4.5	3.2	6.5	12.4
	6年 1994	10.3	4.7	3.1	3.2	7.5	13.5
	7年 1995	7.5	4.4	2.7	2.6	4.9	14.4
	8年 1996	9.9	3.4	3.9	4.3	4.3	11.5
	9年 1997	8.0	3.7	3.4	3.5	4.2	10.8
	10年 1998	8.3	3.8	3.6	2.8	4.0	11.6
	11年 1999	9.8	3.6	3.8	3.8	4.0	7.2
女	12年 2000	6.3	4.1	2.7	3.9	3.2	9.6
	13年 2001	7.7	2.6	3.8	2.9	4.0	9.7
	14年 2002	8.1	2.6	2.5	2.6	3.6	8.2
	15年 2003	8.0	5.1	1.6	2.8	3.2	11.2
	16年 2004	8.4	3.8	2.1	2.0	3.0	9.9
	17年 2005	7.2	5.1	2.4	4.3	2.7	5.0
	18年 2006	9.5	3.7	2.4	3.9	3.7	6.6
	19年 2007	10.6	2.0	2.6	4.3	2.1	6.6
	20年 2008	9.6	2.3	2.5	3.3	4.3	5.3
	昭和55年 1980	12.4	7.8	4.9	6.8	9.5	12.2
	56年 1981	14.0	6.9	3.5	6.2	9.4	12.6
	57年 1982	11.4	8.1	3.5	5.8	7.0	13.3
	58年 1983	14.6	7.8	3.8	4.8	9.3	11.7
	59年 1984	14.8	9.1	4.1	5.9	7.7	12.9
	60年 1985	16.8	7.8	3.8	4.5	6.8	12.6
	61年 1986	18.2	8.4	3.9	5.4	8.5	14.0
	62年 1987	17.7	9.4	4.1	4.6	7.5	12.6
	63年 1988	21.2	9.7	5.8	4.0	5.8	14.1
	平成元年 1989	18.0	11.5	5.6	4.1	5.3	11.0
	2年 1990	17.7	9.9	5.2	3.9	6.8	11.0
	3年 1991	19.3	9.6	5.0	3.8	6.5	10.2
	4年 1992	25.2	9.9	5.6	3.2	6.2	12.4
	5年 1993	17.1	8.6	6.1	5.8	6.5	8.4
	6年 1994	19.0	11.2	4.9	3.6	7.3	13.6
	7年 1995	24.5	12.0	6.1	4.7	4.7	12.8
	8年 1996	21.4	13.6	5.2	4.8	5.6	11.3
	9年 1997	23.3	11.9	6.0	5.2	5.0	9.2
	10年 1998	20.3	12.8	4.5	4.3	3.7	10.6
	11年 1999	23.1	13.5	6.7	2.9	4.3	10.7
	12年 2000	24.2	17.5	5.5	5.4	5.8	9.2
	13年 2001	20.0	16.0	6.3	5.2	6.8	10.1
	14年 2002	26.0	15.1	7.0	6.0	4.1	9.9
	15年 2003	23.4	14.7	7.2	6.6	6.4	8.9
	16年 2004	21.4	15.6	6.6	5.4	6.3	9.7
	17年 2005	22.6	20.0	8.0	4.7	5.4	9.0
	18年 2006	21.7	13.3	8.0	4.4	6.1	8.4
	19年 2007	25.2	14.0	11.4	4.5	6.2	11.6
	20年 2008	22.5	16.8	10.5	8.2	7.0	9.2

注) 妊婦除外

(正) 第154表の2 低体重(やせ)の者(BMI<18.5)の割合の年次推移(性・年齢階級別)

Trends in Prevalence of Underweight (BMI<18.5), 1980 to 2008

(%)

		20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
男	昭和55年 1980	9.3	5.0	4.3	5.1	10.1	16.4
	56年 1981	7.9	3.8	3.8	4.7	6.4	15.8
	57年 1982	6.1	6.0	3.5	5.3	8.9	13.2
	58年 1983	6.9	4.4	3.6	4.5	6.7	12.9
	59年 1984	6.7	5.6	2.3	5.6	8.2	16.3
	60年 1985	7.5	4.1	3.0	4.7	7.0	15.3
	61年 1986	9.4	4.4	2.6	4.2	7.7	17.0
	62年 1987	7.8	5.2	3.0	4.3	7.4	15.8
	63年 1988	8.2	4.9	2.3	3.7	6.6	13.0
	平成元年 1989	10.5	5.5	3.4	4.5	7.0	12.5
	2年 1990	8.6	4.5	2.8	4.0	8.1	13.6
	3年 1991	7.0	5.1	3.7	3.4	8.6	10.2
	4年 1992	6.4	5.5	3.7	2.4	7.8	11.7
	5年 1993	7.9	4.2	4.5	3.2	6.5	12.4
	6年 1994	10.3	4.7	3.1	3.2	7.5	13.5
	7年 1995	7.5	4.4	2.7	2.6	4.8	14.3
	8年 1996	9.9	3.4	3.9	4.3	4.3	11.5
	9年 1997	8.0	3.7	3.3	3.5	4.2	10.8
	10年 1998	8.5	3.9	3.7	3.3	4.2	11.7
	11年 1999	10.0	3.6	3.8	3.8	4.1	7.2
	12年 2000	6.3	4.1	2.7	3.9	3.2	9.6
女	13年 2001	8.0	2.7	3.9	2.8	4.0	9.6
	14年 2002	8.1	2.6	2.5	2.6	3.6	8.2
	15年 2003	8.0	5.1	1.6	2.8	3.2	11.2
	16年 2004	8.4	3.8	2.1	2.0	3.0	9.9
	17年 2005	7.2	5.1	2.4	4.3	2.7	5.0
	18年 2006	9.5	3.7	2.4	3.9	3.7	6.6
	19年 2007	10.6	2.0	2.6	4.3	2.1	6.6
	20年 2008	9.6	2.3	2.5	3.3	4.3	5.3
	昭和55年 1980	13.1	7.9	4.9	6.9	9.5	12.2
	56年 1981	15.0	7.0	3.5	6.2	9.3	12.6
	57年 1982	12.1	8.2	3.5	5.8	7.0	13.3
	58年 1983	16.3	8.0	3.8	4.8	9.3	11.7
	59年 1984	15.6	9.2	4.1	5.9	7.7	12.9
	60年 1985	17.8	7.9	3.8	4.5	6.8	12.6
	61年 1986	19.6	8.6	3.9	5.4	8.5	14.0
	62年 1987	18.6	9.5	4.1	4.6	7.5	12.6
	63年 1988	22.1	9.9	5.8	4.0	5.8	14.1
	平成元年 1989	18.6	11.7	5.6	4.1	5.3	11.0
	2年 1990	18.3	10.1	5.2	3.9	6.8	11.0
	3年 1991	20.0	9.8	5.0	3.7	6.5	10.2
	4年 1992	26.4	10.1	5.6	3.2	6.2	12.4
	5年 1993	17.8	8.7	6.1	5.8	6.4	8.4
	6年 1994	19.2	11.1	4.9	3.6	7.3	13.5
	7年 1995	25.3	11.9	6.1	4.7	4.7	12.8
	8年 1996	22.2	13.9	5.2	4.8	5.6	11.3
	9年 1997	24.1	12.0	6.0	5.2	5.0	9.2
	10年 1998	20.9	13.3	4.7	4.4	3.8	11.0
	11年 1999	23.7	14.2	7.3	2.9	4.4	10.8
	12年 2000	24.5	17.7	5.5	5.4	5.8	9.2
	13年 2001	20.4	16.4	6.3	5.1	6.7	10.0
	14年 2002	26.9	15.5	7.0	6.0	4.1	9.9
	15年 2003	23.4	14.7	7.2	6.6	6.4	8.9
	16年 2004	21.4	15.6	6.6	5.4	6.3	9.7
	17年 2005	22.6	20.0	8.0	4.7	5.4	9.0
	18年 2006	21.7	13.3	8.0	4.4	6.1	8.4
	19年 2007	25.2	14.0	11.4	4.5	6.2	11.6
	20年 2008	22.5	16.8	10.5	8.2	7.0	9.2

注) 妊婦除外