

「令和6年国民健康・栄養調査報告」について、訂正いたしました。

(正)

第22表 薬の服用状況－薬の服用状況、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、
20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	9,132	100.0	450	100.0	687	100.0	1,157	100.0	1,414	100.0	1,780	100.0	3,644	100.0
	使用なし	5,155	58.6	448	99.2	664	97.6	1,036	90.6	1,013	72.2	867	49.4	1,127	31.3
	使用あり(一つ以上)	3,977	41.4	2	0.8	23	2.4	121	9.4	401	27.8	913	50.6	2,517	68.7
	血圧を下げる薬	2,981	31.0	2	0.8	13	1.2	70	5.8	276	19.6	644	34.5	1,976	54.2
	脈の乱れに関する薬	378	4.0	0	0.0	2	0.1	6	0.4	22	1.6	61	3.5	287	8.1
	コレステロールを下げる薬	1,862	19.4	0	0.0	7	0.6	51	4.2	181	12.8	454	24.9	1,169	32.1
	中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬	633	6.5	0	0.0	4	0.3	18	1.4	59	4.2	173	9.2	379	10.2
	インスリン注射または血糖を下げる薬	824	8.8	0	0.0	6	0.8	25	1.7	74	5.5	181	10.6	538	14.8
男性	総数	4,024	100.0	184	100.0	300	100.0	485	100.0	572	100.0	821	100.0	1,662	100.0
	使用なし	2,117	54.3	183	99.4	282	95.7	409	84.0	364	63.5	364	46.1	515	31.0
	使用あり(一つ以上)	1,907	45.7	1	0.6	18	4.3	76	16.0	208	36.5	457	53.9	1,147	69.0
	血圧を下げる薬	1,488	35.8	1	0.6	13	3.0	48	11.1	158	28.3	348	41.0	920	55.3
	脈の乱れに関する薬	211	5.2	0	0.0	1	0.1	3	0.5	14	2.8	45	5.0	148	9.4
	コレステロールを下げる薬	724	17.2	0	0.0	5	1.1	31	6.5	87	15.0	188	20.2	413	25.7
	中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬	338	7.8	0	0.0	4	0.7	14	3.0	37	6.3	100	11.2	183	10.6
	インスリン注射または血糖を下げる薬	488	12.2	0	0.0	4	0.7	16	3.2	47	9.0	111	14.3	310	19.3
女性	総数	5,108	100.0	266	100.0	387	100.0	672	100.0	842	100.0	959	100.0	1,982	100.0
	使用なし	3,038	62.0	265	99.0	382	98.9	627	94.9	649	78.7	503	52.5	612	31.5
	使用あり(一つ以上)	2,070	38.0	1	1.0	5	1.1	45	5.1	193	21.3	456	47.5	1,370	68.5
	血圧を下げる薬	1,493	27.3	1	1.0	0	0.0	22	2.3	118	13.0	296	28.7	1,056	53.3
	脈の乱れに関する薬	167	3.1	0	0.0	1	0.1	3	0.3	8	0.6	16	2.1	139	7.0
	コレステロールを下げる薬	1,138	21.1	0	0.0	2	0.2	20	2.6	94	11.1	266	29.1	756	37.3
	中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬	295	5.5	0	0.0	0	0.0	4	0.4	22	2.6	73	7.4	196	9.9
	インスリン注射または血糖を下げる薬	336	6.0	0	0.0	2	0.9	9	0.8	27	2.8	70	7.3	228	11.1

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる (p.8 参照)。

注2) 血圧を下げる薬、脈の乱れに関する薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬、及びインスリン注射または血糖を下げる薬の服用状況に回答した者を集計対象とした。

注3) 複数回答。

(誤)

第22表 薬の服用状況－薬の服用状況、年齢階級別、人数、割合－全国補正值、総数・男性・女性、
20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	9,132	100.0	450	100.0	687	100.0	1,157	100.0	1,414	100.0	1,780	100.0	3,644	100.0
	使用なし	5,155	58.6	448	99.2	664	97.6	1,036	90.6	1,013	72.2	867	49.4	1,127	31.3
	使用あり(一つ以上)	3,977	41.4	2	0.8	23	2.4	121	9.4	401	27.8	913	50.6	2,517	68.7
	血圧を下げる薬	2,981	31.0	2	0.8	13	1.2	70	5.8	276	19.6	644	34.5	1,976	54.2
	脈の乱れに関する薬	378	4.0	0	0.0	2	0.1	6	0.4	22	1.6	61	3.5	287	8.1
	コレステロールを下げる薬	1,862	19.4	0	0.0	7	0.6	51	4.2	181	12.8	454	24.9	1,169	32.1
	中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬	633	6.5	0	0.0	4	0.3	18	1.4	59	4.2	173	9.2	379	10.2
	インスリン注射または血糖を下げる薬	824	80.5	0	0.0	6	77.2	25	94.2	74	81.8	181	80.8	538	79.9
男性	総数	4,024	100.0	184	100.0	300	100.0	485	100.0	572	100.0	821	100.0	1,662	100.0
	使用なし	2,117	54.3	183	99.4	282	95.7	409	84.0	364	63.5	364	46.1	515	31.0
	使用あり(一つ以上)	1,907	45.7	1	0.6	18	4.3	76	16.0	208	36.5	457	53.9	1,147	69.0
	血圧を下げる薬	1,488	35.8	1	0.6	13	3.0	48	11.1	158	28.3	348	41.0	920	55.3
	脈の乱れに関する薬	211	5.2	0	0.0	1	0.1	3	0.5	14	2.8	45	5.0	148	9.4
	コレステロールを下げる薬	724	17.2	0	0.0	5	1.1	31	6.5	87	15.0	188	20.2	413	25.7
	中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬	338	7.8	0	0.0	4	0.7	14	3.0	37	6.3	100	11.2	183	10.6
	インスリン注射または血糖を下げる薬	488	82.6	0	0.0	4	72.5	16	94.2	47	83.4	111	84.1	310	81.5
女性	総数	5,108	100.0	266	100.0	387	100.0	672	100.0	842	100.0	959	100.0	1,982	100.0
	使用なし	3,038	62.0	265	99.0	382	98.9	627	94.9	649	78.7	503	52.5	612	31.5
	使用あり(一つ以上)	2,070	38.0	1	1.0	5	1.1	45	5.1	193	21.3	456	47.5	1,370	68.5
	血圧を下げる薬	1,493	27.3	1	1.0	0	0.0	22	2.3	118	13.0	296	28.7	1,056	53.3
	脈の乱れに関する薬	167	3.1	0	0.0	1	0.1	3	0.3	8	0.6	16	2.1	139	7.0
	コレステロールを下げる薬	1,138	21.1	0	0.0	2	0.2	20	2.6	94	11.1	266	29.1	756	37.3
	中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬	295	5.5	0	0.0	0	0.0	4	0.4	22	2.6	73	7.4	196	9.9
	インスリン注射または血糖を下げる薬	336	77.5	0	0.0	2	80.3	9	94.1	27	78.2	70	75.5	228	77.7

注1) 割合は全国補正值であり、単なる人数比とは異なる (p.8 参照)。

注2) 血圧を下げる薬、脈の乱れに関する薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬、及びインスリン注射または血糖を下げる薬の服用状況に回答した者を集計対象とした。

注3) 複数回答。