労災疾病臨床研究事業費

有害業務に係る特殊健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究

（230601-01）

令和５年度～令和７年度
総合研究報告書

令和８年３月

研究代表者

森　晃爾
公益社団法人全国労働衛生団体連合会
労働衛生サービス機能評価委員会　委員長

目 次

有害業務に係る特殊健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究
研究代表者 森 晃爾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1. 特殊健康診断の判定に関する文献調査
研究代表者 森 晃爾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

2. 労働衛生機関における特殊健康診断の結果判定に関するアンケート調査
研究分担者:立道昌幸
研究分担者:山本健也 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

3. 労働衛生機関におけるばく露関連情報収集の実態と判定基準が
有所見率に及ぼす影響に関するアンケート調査
研究代表者 森 晃爾
研究分担者:立道昌幸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

4. 労働衛生機関における特殊健康診断の判定に関するインタビュー調査
研究代表者 森 晃爾
研究分担者:立道昌幸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

5. 特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアルの作成
研究代表者 森 晃爾
研究分担者:立道昌幸
研究分担者:山本健也 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

6. 化学物質の健康影響モニタリングにおける標的健康影響およびその検査項目
研究分担者:山本健也 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108

7.「特殊健康診断における適正な情報収集と判定」のアジア諸国における現状
研究代表者 森 晃爾
研究分担者:立道昌幸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182

研究組織

研究代表者

森　晃爾	全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会　委員長

研究分担者

立道昌幸	東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授
山本健也	独立行政法人労働者健康安全機構労働安全総合研究所 化学物質情報管理研究センター化学物質情報管理部 部長

研究協力者

宮本　俊明	日本製鉄株式会社東日本製鉄所統括産業医
山瀧　一	君津健康管理センター　産業保健部部長
福田　崇典	聖隷福祉事業団　理事・専務執行役員
杉浦徹太郎	パナソニック健康保険組合　産業保健センター・産業衛生科学センター所長
深井　航太	東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　准教授
中澤　祥子	東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　助教
古屋　佑子	東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　助教
熊川優希	産業医科大学　産業生態科学研究所　修練医
宇根　理	産業医科大学　産業生態科学研究所　修練医

（いずれも研究参加時の主となる所属・役職で表示）

労災疾病臨床研究事業
（令和５年度～令和７年度）
総括研究報告書

有害業務に係る特殊健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究

研究代表者
森　晃爾
全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会委員長

研究分担者
立道昌幸
東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授

山本健也
独立行政法人労働者健康安全機構労働安全総合研究所
化学物質情報管理研究センター化学物質情報管理部 部長

労災疾病臨床研究事業費補助金研究

総括研究報告書（総合）

有害業務に係る特殊健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究

研究代表者：森　晃爾　全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会　委員長
研究分担者：立道昌幸　東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授
山本健也　独立行政法人労働者健康安全機構労働安全総合研究所
化学物質情報管理研究センター化学物質情報管理部 部長

研究要旨：

【目的】

特殊健康診断（以下「特殊健診」という。）の判定については、昭和 46 年度に示された「ABCRT 区分」が現在も広く用いられているが、各管理区分に至る手順や基準は明確にされておらず、健診機関によって判定結果にばらつきが生じていることが指摘されている。特殊健診の判定は、自他覚所見に加えてばく露情報を組み合わせて行う必要があるが、事業者からの情報提供が不十分であることも課題となっている。また、令和 4 年の省令改正により化学物質の自律的管理が求められるようになり、リスクアセスメントに基づく健康診断の結果を適切に評価・活用できる仕組みの整備が急務となっている。本研究では、労働衛生機関における特殊健診の実態調査を行ったうえで、判定に必要な情報収集の標準化と事業者・労働衛生機関間の役割分担を整理した「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」を作成することを主目的とした。あわせて、法定特殊健診対象物質の標的健康影響・検査項目に関する参考資料を整備するとともに、アジア諸国の特殊健診制度との国際比較を行い、日本の制度改善に資する知見を得ることとした。

【各分担研究項目のまとめ】

1. 特殊健康診断の判定に関する文献調査

特殊健診の判定手順に関する現状と課題を把握するため、医中誌を用いた文献調査を実施し、判定プロセスに関わる文献 19 件を選定・分析した。文献の内容は「現状の整理と課題」「本来あるべき手続き」「作業条件の簡易な調査の活用」「その実施上の課題」の 4 つに分類された。現状の課題としては、ばく露情報の不足、判定基準の不明確さ、実施スタッフのスキル不足の 3 点が抽出された。本来あるべき手続きとしては、十分な情報収集、業務関連性の検討、精通したスタッフの確保が必要とされた。今回の調査から、所見とばく露情報を組み合わせた判定の重要性と、判定手順の整理・言語化の必要性が確認された。また整理にあたっては、企業内産業医と企業外労働衛生機関の医師という判定医の立場別に行う必要があることも示唆された。

2. 労働衛生機関における特殊健康診断の結果判定に関するアンケート調査

特殊健診の判定の実態を把握するため、全衛連加盟の特殊健診実施機関 117 機関を対象にアンケート調査を実施した（回答率 40.2%、57 機関）。有所見率は施設間で大きなばらつ

きが認められ、特化則では平均 1.4%（最大 8.8%）、有機則では平均 2.8%（最大 14.9%）であった。受診対象者の選定は事業者判断が多く、判定は健診機関が行う場合が多いが、作業条件やばく露情報など判定の根拠となる情報を収集しているのは約 60%にとどまっていた。現行の「ABCRT 区分」については判断に迷うケースが多く、基準の改定や判定ロジックの提示を求める声が多く聴取された。本調査から、判定手順の標準化とばく露情報の収集・活用の仕組みの整備が急務であることが示された。

3. 労働衛生機関におけるばく露関連情報収集の実態と判定基準が有所見率に及ぼす影響に関するアンケート調査

全衛連加盟 115 施設を対象とした横断的質問票調査を実施し、有所見率と判定基準の関連を定量的に検証した。事業者からの SDS・作業環境測定結果等のばく露関連情報の入手は大多数の施設で 25%未満にとどまり、情報収集が不十分な状況が確認された。施設間の有所見率は大きくばらついた一方、施設内での健診種別間の相関は高く、施設独自の判定基準が有所見率に影響している可能性が示唆された。有機溶剤健診では、所見とばく露の関連性を重視しない施設の有所見率が有意に高く、生物学的モニタリング値を非職業性要因の除外なしに判定した場合にも有所見率が上昇する傾向が認められた。以上から、判定手順に関する明確なガイダンスの整備と、事業者・労働衛生機関間の情報共有の仕組みの改善が不可欠であることが示された。

4. 労働衛生機関における特殊健康診断の判定に関するインタビュー調査

アンケート調査で示された施設間の有所見率のばらつきの実態をより詳細に把握するため、実施数や有所見率等を考慮して選定した 8 つの労働衛生機関に対し、遠隔会議システム（Zoom）を用いた約 1 時間のインタビュー調査を実施した。調査内容は、判定実施者・判定手順の標準化状況・判定区分の考え方・ばく露情報の反映方法・リスクアセスメント健診への準備状況等であった。各機関はそれぞれ異なる判定プロセスを持ち、機関としての役割を定義のうえ、それと整合した情報収集と結果判定を行っていることが確認された。一方、リスクアセスメント健診の実施実績はなく、準備段階にある機関がほとんどであった。本調査から、判定の適切な実施には、事業場側と労働衛生機関側の役割分担の明確化と、ばく露関連情報の事前共有および健診現場での追加情報聴取が不可欠であることが改めて示された。

5. 特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアルの作成

インタビュー調査・質問票調査の結果を踏まえ、「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」を作成した。マニュアルは、①収集・共有すべきばく露関連情報、②判定レベル（Ⅰ～Ⅲ）と医師の役割、③特殊健診全体のプロセス、④事業者と労働衛生機関の役割分担、の 4 項目で構成された。策定後、企業専属産業医 5 名・労働衛生機関の医師 3 名・渉外担当者 4 名へのインタビューによって妥当性と実現可能性を検証し、厚生労働省担当課との法令・行政施策との整合性確認を経て最終版を確定させた。本マニュアルの活用により、労働衛生機関における判定の質の平準化と、事業者が適切な事後措置を完遂できる体制の構築が期待される。今後は、研修会等を通じた周知・議論とともに事業者側への啓発を進めることが必要である。

6. 化学物質の健康影響モニタリングにおける標的健康影響および検査項目

特別規則で個別規制されている化学物質について、国内法令では各規制物質の標的臓器・標的健康影響が必ずしも明確に示されていないことを踏まえ、GHS 政府分類・海外ガイドライン等を活用して 126 物質のデータシートを作成した。比較可能な 26 物質のうち 20 物質で国内法令と海外情報に差異が認められ、1,3-ブタジエンやカドミウム等では国際的に採用されている有害性が未反映であることが明らかになった。また、平成元年導入の生物学的ばく露モニタリング項目についても見直しの必要性が示された。加えて、国内外の健康サーベイランス対象者選定スキームを比較した結果、国外ではリスクアセスメントに基づく対象者選定が主流であり、日本の特殊健診においても「ばく露の程度」を加味した選定への移行が望ましいことが示唆された。本データシートは、産業医・労働衛生機関における判定の精度向上とリスクアセスメント対象物健康診断の運用支援に資するものである。

7.「特殊健康診断における適正な情報収集と判定」のアジア諸国における現状

産業医学専門医が特殊健診に関与する制度を有するアジア 3 か国（韓国・タイ・シンガポール）を対象に現地訪問インタビュー調査を実施し、日本を含めた 4 か国の制度の国際比較を行った。制度の設計思想には物質列挙型からリスクベース型に至るスペクトラムが認められ、韓国は物質列挙型で職業環境医学専門医への実施者限定と指定機関制度の二重要件を課し、タイは原則特殊健診を実施するが、その検査項目をリスクアセスメント結果に基づき専門医が選択する形式を、シンガポールは 19 要因限定で指定事業場医の専門的判断に委ねる形式を採っていた。3 か国共通して実施者に専門資格要件が法的に課されており、資格要件のない日本との相違が明確であった。タイのリスクベースで検査項目を決定するモデルは日本のリスクアセスメント対象物健康診断の参考となり得る。また、個別事業場レベルでの職業性疾病検出の限界は国際共通の課題であり、国レベルでのモニタリング体制構築の重要性が確認された。

【考察】

複数の調査から、ばく露関連情報の入手が大多数の施設で25%未満にとどまり、判定基準の違いが施設間の有所見率に大きなばらつきをもたらしていることが定量的に示された。これは、現行の特殊健康診断制度が実施体制・情報基盤・判定手順のいずれの面においても根幹的な課題を抱えていることを意味する。アジア諸国との比較では特殊健診の実施・判定医の専門性要件、化学物質調査では健康影響モニタリング項目の更新にも課題が明らかとなった。リスクアセスメント対象物健診が導入されているが、今後も法定特殊健診の制度を存続させる場合には、①事業者によるばく露関連情報提供の義務化、②実施者の専門性確保の仕組みの整備、③国レベルの有所見率モニタリング体制の再構築、を柱とした抜本的な制度改善が不可欠である。また、リスクアセスメント対象物健診においても、共通の課題があると考えられるため、制度運用上の課題の確認が必要と考えられる。

A.目的

労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、事業者は、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、作業環境測定の実施、施設・設備の設置や整備等の措置を講じることが必要となることから、異常の所見の有無に関する判断基準は非常に重要なものである。

健康診断のうち、労働者の健康状況の把握を主たる目的とした「一般健康診断」の結果の判定については、健康診断実施機関は、日本人間ドック学会・予防医療などの関連学会等が示す判定値（基準値）を参考にし、就業区分も「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づき、概ね適正に処理されていると考えられる。

一方、有害物質へのばく露の程度に関する情報の収集、健康障害リスクの未然発見や有害作業因子による健康障害の早期発見と対象などを目的とする「特殊健康診断」の結果の判定については、「昭和 46 年度労働省労働衛生試験研究」により、「管理 A」、「管理 B」、「管理 C」、「管理 R」、「管理 T」という 5 つの管理区分とその場合の事後措置が示されており、現在も多くの健康診断機関がこれを参考にしている。

しかしながら、例えば、「管理 B」の症状区分は「管理 C には該当しないが、当該因子によるかまたは当該因子による疑いのある異常が認められる場合」、「管理 C」の症状区分は「当該因子によって疾病にかかっている場合」等となっているなど、判定の際に参考にすることが難しい表現となっている。特殊健診の健診項目には、有害要因のばく露以外の要因で基準値外となる項目も多いことから、特殊健診の判定は、ばく露の可能性と自他覚所見を組み合わせて実施する必要があるが、各管理区分に至る手順および基準が明確にされていない。

そのため、日本の特殊健診の多くを担う全国労働衛生団体連合会の実施する労働衛生サービス機能評価事業での調査においても、異常の所見判定が健康診断機関により、まちまちであることが指摘されている。事業者は、健康診断結果に基づき、就業制限等の事後措置を行うことが求められることから、判定を適切に行うことが、その後の当該労働者の健康管理や作業環境管理等において重要である。

また、令和 4 年 5 月に行われた労働安全衛生規則等の省令改正により、今後は化学物質を製造し又は取り扱う事業者は自律的管理を求められることとなるが、特に、リスクアセスメントの結果に基づき健康診断を行った場合に、事業者、とりわけ中小零細事業者にとって、その結果をどのように評価し、対応するかが難しい課題となることが予想され、有所見判定を行う産業医や健康診断機関が健康診断結果を適切に評価し、事業者に対して助言・指導を行なうことができるよう、判定の考え方の整理が急務である。

そこで本研究では、労働衛生機関における特殊健診の実態を調査したうえで、

産業医、労働衛生機関等特殊健診の判定に携わる者の考え方や役割分担を整理するため、「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」を作成し、判定に関する考え方の統一を図ることを目的とした。また、法定の特殊健診の対象となっている物質について、適正な判定を行う上で必要な化学物質の健康影響モニタリングにおける標的健康影響および相当する検査項目の整理を行って参考資料を提供することとした。さらに、日本の特殊健康診断の課題解決に資するために、アジア諸国の特殊健診制度について調査を行うこととした。

B. 研究結果

1. 特殊健康診断の判定に関する文献調査

特殊健診の判定において、現在多くの事業場や労働衛生機関が「ABCRT 区分」を用いているが、判定手順については言語化されていない部分が多い。そこで今回は、特殊健診の判定手順に関しての現状や課題を探り、今後の研究に繋げることを目的として、文献調査を行う。

特殊健診をテーマとした文献検索を、医中誌を用いて行った。最終的に判定プロセスに関わる内容を含むものは 19 件であった。

選択された文献の内容は、「1.現状の整理と課題」「2.本来あるべき手続き」「3.『作業条件の簡易な調査』の活用」「4.『作業条件の簡易な調査』の実施上の課題」の 4 つに分類された。また、現状の課題については、ばく露に関する情報不足、判定基準の不明確さ、スタッフのスキル不足の 3 つに分類され、本来あるべき手続きについては、十分な情報収集、業務関連性の検討、精通したスタッフの確保の 3 つに分類された。

今回の文献調査から、所見とばく露に関する情報を組み合わせて判定することの重要性と、判定に至るまでの手順の整理の必要性が考えられた。判定に至るまでの手順の整理については、産業医の場合、企業外労働衛生機関の医師の場合、という判定医の立場別にも整理する必要が考えられた。

2. 労働衛生機関における特殊健康診断の結果判定に関するアンケート調査

「特殊健診」の結果の判定については、「昭和 46 年度労働省労働衛生試験研究」により、「管理 A」、「管理 B」、「管理 C」、「管理 R」、「管理 T」という 5 つの管理区分とその場合の事後措置が示されており、現在も多くの健康診断機関がこれを参考にしている。特殊健診の判定は、ばく露情報と自他覚所見を組み合わせて実施する必要がある。しかしながら各管理区分に至る手順および基準が明確にされていない。そこで本研究では、産業医、健康診断機関等特殊健診の判定に携わる者の考え方を整理するため、「特殊健康診断判定に関するマニュアル（仮称）」を作成し、判定に関する考え方の統一を図ることを目的とする。本年度は、現行の特殊健診の判定に関する実態調査を各健康診断実施施設に対してアンケート調査を行った。

全衛連が労働衛生サービス機能評価事業において把握している評価対象機関の調査票をもとに、特殊健診実施機関（117 機関）にて、特化則、有機則、鉛則、四鉛則、石綿則に関して① 令和4年度の特殊健診実施状況② 健診受託時の情報収集状況 ③ 情報収集担当者の資格 ④ 検査対象者の選定方法 ⑤ 判定 ⑥ 化学

物質ごとの判定結果の分類(管理A～管理T)⑦ 結果の報告、事後支援措置 また、併せて、問診票や特殊健診結果判定に係る標準作業書等の書類の提出も依頼することとした。

回答が得られた施設は、57 機関/117(40.2%)受託事業者数 40094 事業所であった。有所見者の割合は、特化則(47 施設:平均1.4±2.0%、最大8.8%、最小0%)、有機則(50 施設:平均 2.8±3.1%、最大14.9%、最小 0%)、鉛則(36 施設:平均0.54±3.06%、最大18.1%、最小0%)、石綿則(49 施設:平均 0.8±1.0%、最大 3.9%、最小 0%)と施設間差を認めた。健診受診対象者の選定は事業者判断の場合が多いが、判定については健診機関側で行うことが多い。その場合の作業条件やばく露などの判定に用いる根拠の情報について、収集しているのは 60%程度であった。現在の ABCRT 区分については迷うケースが多いことから、判定基準の改定やロジックの提案等を求める要望が聞かれた。

3. 労働衛生機関におけるばく露関連情報収集の実態と判定基準が有所見率に及ぼす影響に関するアンケート調査

日本の特殊健診には、判定に関する統一された指針が不足しており、有所見率の大きなばらつきに繋がっている可能性がある。本研究は、労働衛生機関の特殊健診におけるばく露関連情報の入手状況、特定化学物質健診と有機溶剤健診における施設間の有所見率の差異を定量化、有所見率と施設が採用する判定基準との関連性を検証することを目的とした。

全国労働衛生団体連合会(全衛連)に加盟する115施設を対象とした横断的な質問票調査を実施した。施設から 2022 年から 2024 年度の有所見率および判定手順の標準化に関する情報を入手した。また、医師の判定基準を評価するため、ばく露情報の判定の活用と生物学的モニタリングの活用に関する事例を用いたケースビネットを提示した。所見とばく露の関連性については、2つの質問を組み合わせ、「ばく露との関連性を重視しない」群と「関連性を重視する」群に分類した。また、生物学的も有所見率の施設間差は、Spearman の順位相関係数および Wilcoxon 順位和検定を用いて評価された。

有効回答が得られた施設の健診実施件数は、特定化学物質健診で 666,975 件、有機溶剤健診で 405,401 件に上った。事業者からの安全データシート等のハザード情報、作業環境測定結果等のばく露関連情報の入手は、ほとんどの機関で 25%未満であり、ばく露関連情報が十分に入手できていない状況が観察された。両健診の有所見率は施設間で大きなばらつきを示し、施設内では強く相関していた。有機溶剤健診では、「所見とばく露の関連性を重視しない」施設の方が、有所見率が有意に高い結果となった。特定化学物質健診でも同様の傾向がみられたが、有意差は認められなかった。非職業性要因を除外せずに生物学的モニタリング値のみで異常と判定した場合、両健診で有所見率が上昇する傾向が認められた。

特殊健診の有所見率のばらつきは、施設内では特殊健診間で強く相関しており、施設独自の判定基準がその有病率に影響している可能性を示唆している。このことは、国の公表する有所見率統計の解釈に注意を要することを意味する。多くの施設

で事業者からばく露関連情報の入手が不十分であり、有所見率の判定においてばく露との関連性を重視しない場合、生物学的モニタリング値を非職業性要因に影響を除外せずに異常と判断する場合に、全体の有所見率を押し上げる傾向があったことより、特殊健診の判定手順に関する明確なガイダンスが必要と考えられる。さらに、特殊健診の適切な運用のためには、事業者と労働衛生機関の間で、情報提供と役割分担を明確化し、ばく露関連情報を収集・活用する仕組みを改善することが不可欠である。

4. 労働衛生機関における特殊健康診断の判定に関するインタビュー調査

本調査に先立ち実施したアンケート調査では、有所見率には、施設間で大きな差があることが分かっている。その具体的な内容を詳しく理解するために、労働衛生機関に対するインタビュー調査を行った。

労働衛生機関における特殊健診の判定に関するアンケート調査をもとに、特殊健診の実施数、有所見率の違いなどの情報から、8つの労働衛生機関を選定した。そのうち、2023 年度中に6つの施設に対する調査が完了し、さらに2024年度中に2施設の調査を追加した。 各機関において、特殊健診の結果判定手順に関してもっとも詳しい医師に遠隔会議システム(Zoom)を用いて、1時間程度のインタビューを行った。インタビューの内容として、健診機関における判定実施者、判定手順(標準)の有無とその内容、判定実施者間の調整、判定区分および有所見の考え方、判定に用いる健診項目以外の情報とその確認方法、作業条件の簡易な調査の判定への反映、ばく露情報の結果(有所見)への反映の考え方、判定における現在考えている課題、リスクアセスメント健診に対する準備状況について聴取した。

各機関における判定に関するインタビューでは、それぞれによって異なる判定のプロセスを持っていた。具体的には、①特殊健診の判定における機関としての役割を定義し、それと整合性が取れた結果判定を行い、事業者に提供していた。また、②定義した役割を果たす上で必要な情報を意識して収集が図られていた。リスクアセスメント健診については準備中の場合がほとんどで、実施した実績は報告されなかった。そのため、課題については聴取することができなかった。

適切に特殊健診の判定が実施されるには、「契約・計画→準備→実施→健診判定→管理区分の決定」の一連の流れにおける事業場側と労働衛生機関側の役割分担が明確となっている必要がある。また、労働衛生機関側が事業場側から役割を果たすことができる情報が共有されることや、健診実施場面で追加情報が適切に聴取されることも必要不可欠である。今後は、さらにインタビューを追加して情報を整理して、それらをもとにマニュアルを作成することが必要である。

5.「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」の作成

特殊健診の所見は有害因子に特異的でないことが多いため、適切な判定には健康状態に加えて有害因子への「ばく露の推定」が不可欠であるが、実際には事業者からの情報提供不足や機関ごとの判定基準の相違が課題となっている。そこで今回は、

特殊健診を実施している労働衛生機関の実態に関する調査を行い、その結果を踏まえて、判定に必要な情報収集を標準化し、事業者と労働衛生機関の適切な役割分担と情報共有の在り方を明確にするためのマニュアルを作成することを目的とした。

マニュアルを作成するにあたり、①特殊健診の判定に関するインタビュー調査と②労働衛生機関への質問票調査を実施した。これらの調査から抽出された、情報提供不足や専門性のばらつき等の課題をふまえて、「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル（原案）」を策定した。その後、企業の専属産業医 5 名、労働衛生機関の医師 3 名、同渉外担当者 4 名へのインタビューを通じて妥当性と実現可能性を検証し、厚生労働省担当課による法令や行政施策との整合性確認を経て最終版を確定させた。

作成されたマニュアルは、(1)特殊健診において収集・共有すべきばく露関連情報、(2)労働衛生機関における判定レベル（I～III）と医師の役割、(3)特殊健診全体のプロセス、(4)事業者と労働衛生機関の役割分担のプロセス、の4つの主要項目で構成された。

適切に特殊健診の判定が実施されるには、「契約・計画→準備→実施→健診判定→管理区分の決定」の一連の流れにおける事業場側と労働衛生機関側の役割分担が明確となっている必要がある。また、労働衛生機関側が事業場側から役割を果たすことができる情報が共有されることや、健診実施場面で追加情報が適切に聴取されることも不可欠である。本マニュアルの活用により、労働衛生機関の標準作業書の改訂や判定の質の平準化が図られるとともに、事業者が適切な事後措置を完遂できる体制の構築が期待される。今後は労働衛生機関に対する研修会等を通じた周知や議論に加え、事業者側への啓発を進めていくことが不可欠な課題である。

6. 化学物質の健康影響モニタリングにおける標的健康影響および検査項目

労働安全衛生法令の特別規則での個別規制化学物質における健康影響モニタリング（特殊健診）において、各規制物質の標的臓器・標的健康影響が明確に示されていないことに鑑み、特殊健診の判定およびその事後措置の精度向上を目的に、国内外の情報を基に各規制物質の標的臓器・標的健康影響を整理・統合し、個別規制物質の標的健康影響とその健康影響モニタリングを一元的に整理することで、特別規則の健康診断結果の鑑別精度の向上を目的とした。また、統合した結果について、標的健康影響および健康影響モニタリング項目を比較検討し、現行の国内法令で課題等を整理した。

その結果、現行の特別規則で個別規制されている126物質についてのデータシートを作成した。そのうち、現行法令との比較が可能な 26 物質について比較した結果、20 物質において海外情報や GHS 政府分類区分との差異が認められた。そのうち、特別有機溶剤等令和2年に健診項目が改定された物質については発がん性等について先行した検査項目等が設定されている一方、1,3-ブタジエン、カドミウム等においては海外情報においては採用されている有害性が反映されていないなど、知見の更新が必要な物質があることが明らかにな

った。また、平成元年に法令に導入された生物学的ばく露モニタリング項目については、その区分についての見直しが必要と考えられた。

また、有害業務の健康サーベイランスの対象者選定やその実施方法に係るスキームについて国内外の状況を整理した。本邦の特殊健康診断では作業列挙方式によるハザードベースでの対象者選定であることに対して、2010 年以降に公表されている国外のスキームでは、リスクアセスメントの結果に基づき健康診断の実施の有無がまず検討され、その後のばく露低減対策の実施の有無や、臨床検査等の実施に際しては作業歴やばく露状況および自覚症状等の聴取に基づき、ヒトへの侵襲のある検査の要否の判断がされていた。本邦においては令和 6 年 4 月に導入された「リスクアセスメント対象物健康診断」で同様のスキームが導入されているが、特殊健診においても今後同様に、ハザード情報に「ばく露の程度」を加味した対象者の選定が望ましいと考えられた。なおその際、特殊健診受診対象者の減少と引き換えに事業者が「ばく露の程度」を適切に把握し、その情報を特殊健康診断実施機関等と共有することで、費用の再配分を適切に実施することが望ましいと考えられた。

本研究の成果物であるデータシートの利活用により、産業医、労働衛生機関において化学物質の健康影響モニタリング結果の適切な解釈およびそれに基づくばく露防止対策、および新たな制度におけるリスクアセスメント対象物健康診断での医師の判断による健康診断項目の検討において、そのプロセス支援に資するものと考えられる。 また、既存の特別規則健康診断項目については新たな科学的知見に基づく再評価が必要な項目があり、健康影響モニタリング項目のみではなく、生物学的ばく露モニタリング項目においても、今後の有害性の新着情報の収集及びそれに基づく検査項目等の検討について、定期的な見直しをする機会が必要と考えられた。

7.「特殊健康診断における適正な情報収集と判定」のアジア諸国における現状

特殊健診の実効性は、実施者の専門性、対象物質の規定方法、検査項目の設定方法など、制度を構成する多くの要素に依存している。本研究では、産業医学専門医が特殊健診に関与する制度を持つアジア諸国（韓国、タイ、シンガポール）を対象として、包括的な国際比較を行い、日本の制度改善に資する示唆を得ることを目的とした。

分担研究班（日本産業衛生学会指導医・専門医）で訪問前調査シート（19 項目）を作成し、各国の調査対象機関に事前送付した。韓国の嘉泉大学医学部、タイのバンコク病院産業保健センターおよびサミティベート病院シラチャー産業保健医学センター、シンガポールのシンガポール国立大学公衆衛生大学院産業保健教育研究部門を訪問し、労働衛生を専門とする医師・看護職を対象に対面でインタビュー調査を実施し、Framework Method を用いて分析した。

制度の設計思想には、物質列挙型からリスクベース型に至るスペクトラムが認められた。韓国は日本と同様の物質列挙型であるが、実施者を職業環境医学専門医に限定し、指定機関制度を併設する二重要件を課していた。タイは健康リスクアセスメ

ント（HRA）に基づき専門家が検査項目・頻度を決定するリスクベース型を採用していた。シンガポールは対象有害因子を 19 要因に限定し、指定事業場医（DWD）の専門的判断に広く委ねていた。3 か国に共通して、実施者に産業医学の専門資格または研修修了を法的要件としていた点は、資格要件のない日本との相違点であった。

調査対象 3 か国がいずれも実施者に専門的要件を課していることは、日本における既存の専門医制度等の活用を検討する契機となる。また、タイの HRA モデルは、日本のリスクアセスメント対象物健康診断の運用に向けた参考となりうる。さらに、個別事業場レベルでは職業性疾病の検出に限界があることは国際的に共通する課題であり、国レベルでのモニタリング体制の構築が重要であることが確認された。現地インタビュー調査により、文献調査のみでは得られない制度運用の実態や課題を把握できた。

C. 考察

特殊健診の判定については、昭和 46 年度の研究報告を起源とする管理「ABCRT 区分」の 5 区分が現在も広く参照されているが、各区分の定義は実務的な判定基準としては曖昧であり、特に「管理 B」や「管理 C」の症状区分は、ばく露との因果関係の判断を求めながらも、その根拠となる手順を具体的に示していない。加えて、特殊健診の検査項目の多くは有害要因以外の要因によっても基準値を逸脱し得るため、適切な判定はばく露情報と自他覚所見の統合的な評価を必要とする。しかし本研究の実態調査によって、この本来必要な評価が制度として機能していないことが改めて浮き彫りとなった。

本研究で実施した複数のアンケート調査およびインタビュー調査の結果から、以下の四点にわたる構造的な課題が明らかになった。第一に、事業者からのばく露関連情報（SDS・作業環境測定結果等）の入手は大多数の施設で 25%未満にとどまっており、判定の前提となる情報が恒常的に不足している。第二に、ばく露関連情報の判定への反映方針は施設によって大きく異なり、ばく露との関連性を重視しない施設では有機溶剤健診の有所見率が有意に高く、施設独自の判定基準が国全体の有所見率統計を歪めている可能性がある。第三に、生物学的モニタリング値を非職業性要因の除外なしに有所見と判定する施設では全体の有所見率が上昇する傾向があり、この問題は統計の信頼性のみならず、不必要な事後措置を生じさせる可能性がある。第四に、一次健診でばく露関連の健康障害が疑われた場合の二次健診対応にも施設間で大きな差があり、特殊健診の本来の目的である健康障害の早期発見と事後措置の適正な実施が担保されていない。これらを総合すると、現行の特殊健診制度は実施体制・情報基盤・判定手順のいずれの面においても根幹的な課題を抱えており、労働基準監督署に報告される有所見率の信頼性にも疑義が生じると言わざるを得ない。

化学物質の健康影響モニタリングに関しては、現行の特別規則で個別規制されている 126 物質のデータシートを作成して国内外の情報を比較した結果、比較可能な 26 物質のうち 20 物質において国内法令と海外情報に差異が認められた。1,3-ブタジエンやカドミウム等では国際的に採用

されている有害性が国内法令に未反映であるなど、科学的知見の更新が必要な物質が存在することが明らかとなった。また、平成元年に導入された生物学的ばく露モニタリング項目についても、現行の区分の妥当性について見直しが必要と考えられた。対象者選定のスキームについては、国外では 2010 年以降リスクアセスメント結果に基づく選定が主流となっており、令和 6 年 4 月に導入されたリスクアセスメント対象物健康診断と同様の考え方を法定特殊健診においても段階的に導入することが望ましい。なお、対象者の絞り込みを行う場合には、事業者が「ばく露の程度」を適切に把握・記録し、その情報を特殊健診実施機関と共有する体制を同時に整備することが前提条件となる。

アジア諸国との国際比較では、韓国・タイ・シンガポールの 3 か国いずれにおいても、特殊健診の実施者に産業医学の専門資格または研修修了が法的に要件とされていることが確認された。韓国は物質列挙型を維持しながらも職業環境医学専門医への実施者限定と指定機関制度の二重要件を課し、タイは健康リスクアセスメント（HRA）の結果に基づき専門医が検査項目・頻度を決定するリスクベース型を採用し、シンガポールは対象を 19 要因に限定したうえで指定事業場医（DWD）の専門的判断に委ねる形式をとっていた。いずれの国も実施者の専門性を法的に担保しているのに対し、日本では産業医としての資格を持つ医師であれば特殊健診の判定を行える制度となっており、この差が判定の質のばらつきに影響している可能性がある。日本においても、日本産業衛生学会の指導医・専門医制度や産業医科大学等が提供する研修制度の積極的な活用を通じて、特殊健診実施者の専門性確保に向けた仕組みを整備することが求められる。また、タイのリスクアセスメントの結果に基づき健診項目を医師が決定するモデルは日本のリスクアセスメント対象物健康診断の運用設計において参考となり得る。さらに、個別事業場レベルでの職業性疾病検出には本質的な限界があることは国際共通の課題であり、業種・物質・地域別の集計を含む国レベルでのモニタリング体制の構築が日本においても重要な政策課題である。

厚生労働省の「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」は、既存の特別規則について「5年後の廃止を想定し、自律的管理が十分に定着していない場合はさらに5年後に改めて評価する」と位置付けており、これは法定特殊健診にも当てはまる方向性と考えられる。本研究の結果は、法定特殊健診の制度を今後どのような形で存続・改革するかを検討するうえで、直接的な根拠を提供するものである。制度を存続させる場合には、少なくとも以下の三点の改善が不可欠である。

第一に、情報提供体制の制度的整備である。現状では、判定に必要なばく露関連情報を事業者が労働衛生機関に提供する法的義務が明確でなく、情報収集が各機関の個別努力に委ねられている。行政は、事業者が特殊健診委託時にばく露関連情報を提供することを義務付ける省令・通達の整備を検討すべきである。事業者が企業秘密等を理由に情報を開示しない場合には、労働衛生機関は判定を留保し、検査所見と自他覚症状を事業者に報告するにとどめ、事業者側において産業医または専任医師がばく露関連情報と照合して管

理区分を決定する役割分担を標準化することが現実的な解として考えられる。本研究で作成した「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」は、この役割分担と情報共有の在り方を具体的に示したものであり、各機関における標準作業書の改訂と判定の質の平準化への活用が期待される。

第二に、実施者の専門性確保である。国際比較の結果が示すように、特殊健診の判定の質は実施者の専門性に大きく依存する。現行制度では産業医資格を持つ医師であれば判定が可能であるが、特に化学物質のばく露評価と管理区分の判断には高度な専門知識が求められる。既存の専門医・指導医制度や研修プログラムとの連携を強化し、特殊健診実施機関における担当医師の専門性確保に向けた仕組みを段階的に導入することを提言する。

第三に、国レベルの有所見率モニタリング体制の再構築である。本研究が示したように、現在労働基準監督署に報告されている有所見率は施設の判定基準に大きく左右されており、行政統計として信頼性に限界がある。業種・物質・地域別の標準化された集計と施設間比較の仕組みを構築し、業種・物質・地域別の標準化された集計と施設間比較の仕組みを構築し、専門職による評価や集団としての評価を可能にするなど特殊健診制度の実効性を客観的に評価できる基盤を整備することが必要である。リスクアセスメント対象物健康診断の運用においても、ばく露情報の活用と実施者の専門性確保は共通する課題であり、本研究の知見は両制度の改善に資するものである。

D. 結語

本研究により、特殊健診において施設間で有所見率および判定手順に大きな差があること、その背景にばく露関連情報の恒常的な不足と判定手順の標準化の不十分さがあることが、定量的・定性的に明らかになった。また、現行の特別規則における化学物質の健康影響モニタリング項目については国際的知見との乖離が存在し、科学的更新が必要な物質があることが確認された。さらにアジア諸国との比較を通じて、実施者の専門性の法的担保という点で日本制度の課題が浮き彫りになった。

これらの知見を踏まえ、本研究では「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」を作成・完成させた。今後はこのマニュアルを通じた労働衛生機関および産業医への周知・研修とともに、事業者への啓発を継続的に進めることが必要である。

化学物質の自律的管理への移行が進む中、特別規則に基づく法定特殊健診の今後の在り方については、行政・事業者・労働衛生機関が連携したうえで、①事業者によるばく露関連情報の提供義務の明確化、②特殊健診実施者の専門性確保に向けた仕組みの整備、③行政統計としての有所見率の信頼性向上を含む国レベルのモニタリング体制の再構築、という三点を柱とした制度の抜本的な見直しを早急に検討すべきである。あわせて、リスクアセスメント対象物健康診断についても同様の課題が存在する可能性があり、運用状況の確認が必要と考えられ、その改善には本研究で得られた知見を積極的に活用することが求められる。

E. 学会・学術論文発表

学会発表

- 熊川優希、森晃爾、山本健也、立道昌幸。「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」。第 35 回日本産業衛生学会全国協議会、2025 年 11 月、徳島
- 森　晃爾、宇根　理、熊川優希、山本健也、立道昌幸．有所見率の実態とばらつきに与える要因の検討．第 35 回日本産業衛生学会全国協議会、

学術論文

- Mori K, Une O, Kumakawa Y, Yamamoto K, Tatemichi M. Collection and utilization of exposure-related information in special health examinations: questionnaire survey of occupational health organizations. J Occup Health （accepted）
- 森晃爾, 宇根理, 熊川優希, 山本健也, 立道昌幸. 特殊健康診断におけるばく露関連情報の収集と活用の実態：労働衛生機関への質問票調査. 産業医学ジャーナル（受理）
- 熊川優希、森晃爾、宇根理、山本健也、立道昌幸。「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」の作成。2026。産業衛生学雑誌。（投稿中）

労災疾病臨床研究事業
（令和５年度～令和７年度）
分担研究報告書

特殊健康診断の判定に関する文献調査

研究代表者
森　晃爾
全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会委員長

労災疾病臨床研究事業費補助金研究　分担研究報告書(総合研究報告書)
有害業務に係る特殊健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究

1. 特殊健康診断の判定に関する文献調査

研究代表者:森　晃爾　全国労働衛生団体連合会　労働衛生サービス機能評価委員会委員長

研究要旨

【目的】我が国では、特殊健診の判定において、現在多くの事業場や労働衛生機関が「ABCRT 区分」を用いている。一方で、判定手順については言語化されていない部分が多い。そこで今回は、特殊健診の判定手順に関しての現状や課題を探り、今後の研究に繋げることを目的として、文献調査を行う。

【方法】特殊健診をテーマとした文献検索を、医中誌を用いて行った。最終的に判定プロセスに関わる内容を含むものは 19 件であった。

【結果】選択された文献の内容は、「1. 現状の整理と課題」「2. 本来あるべき手続き」「3.『作業条件の簡易な調査』の活用」「4.『作業条件の簡易な調査』の実施上の課題」の 4 つに分類された。また、現状の課題については、ばく露に関する情報不足、判定基準の不明確さ、スタッフのスキル不足の 3 つに分類され、本来あるべき手続きについては、十分な情報収集、業務関連性の検討、精通したスタッフの確保の 3 つに分類された。

【結論】今回の文献調査から、所見とばく露に関する情報を組み合わせて判定することの重要性と、判定に至るまでの手順の整理の必要性が考えられた。判定に至るまでの手順の整理については、産業医の場合、企業外労働衛生機関の医師の場合、という判定医の立場別にも整理する必要が考えられた。

研究協力者:　日野優希　産業医科大学　産業生態科学研究所　修練医

A. 目的

わが国では、有害業務に従事する労働者に対して特殊健診が実施されており、法令に基づくもの、行政指導によるもの、自主的に行うものがある。

特殊健診の判定に関しては、現在多くの事業場や労働衛生機関が「ABCRT 区分」を用いている。この管理区分は、1971 年の労働省労働衛生試験研究の結果をもとに推奨されている。しかし、特殊健診の判定には、自他覚所見に加えてばく露の程度を勘案する必要があるが、管理区分に至るプロセスは示されていない。

その後、労働安全衛生法関連省令の改正により、現在はばく露の程度を推定することを目的として、生物学的モニタリングや「作業条件の簡易な調査」が健診項目に加わっている。また、化学物質管理が法令型管理から自律型管理へ移行する中で、特殊健診の実施頻度の柔軟化が求められている。

こうした流れの中では、特殊健診の判定手順を明確化し、適切な情報をもとに判定が標準的に行われるようにすることが重要と考えられる。

しかし、特殊健診の判定手順は必ずしも決まったルールがあるわけではなく、言語化されていない部分が多い。そこで、今回は特殊健診の判定手順に関しての現状や課題を探り、今後の標準的な判定手順の策定の基礎資料とすることを目的として、文献調査を行った。

B. 方法

特殊健診をテーマとした文献検索を、医中誌を用いて 2023 年 6 月 27 日の時点で行った。検索ワードは「特殊健康診断」とし、発行年を 1990 年から 2023 年とした。ヒット数は 160 件であり、タイトルと抄録で明らかに判定手順に関するものでないものを除外し、69 件に絞り込んだ。69 件の文献の内容を確認し、最終的に判定プロセスに関わる内容を含むものは 19 件であった。査読つきの文献は含まれなかった。

C. 結果

選択された 19 件の文献の内容は、4 つの内容に分類された。

1. 現状の整理と課題
2. 本来あるべき手続き
3. 「作業条件の簡易な調査」の活用
4. 「作業条件の簡易な調査」の実施上の課題

以下、4 つの内容について順を追って記載する。

1. 現状の整理と課題

現状広く行われている判定区分として、「ABCRT 区分」がある。1963 年に通達で、A（異常なし）、B1（業務上の異常の疑い、要観察）、B2（業務上の異常の疑い、要精査）、C（業務上の異常、要治療）の区分が

示されており、それに加えて 1971 年に労働省研究報告として、T（業務外要因による異常、要医療）、R（業務外要因による異常、要就業制限）の区分が示されている。[1]この区分に準じている健康診断機関が多数ある。[2]

また、特殊健診の判定における課題として、以下の 3 つに分類された。

- **ばく露に関する情報不足**

有所見に対して作業起因性が否かを推定するためには、ばく露に関する様々な情報が必要となる。例えば、健診結果の推移、同一職場における疫学的検討、尿中代謝物濃度、作業環境測定結果、職場巡視結果、日常生活でのばく露機会などである。[3] 事業所の産業医が判定を実施する場合にはそれらの情報を入手することは比較的容易であるが、企業外労働衛生機関が受託して実施する場合に、企業の作業環境状態や使用有害物質・使用量などのデータを手に入れることができるかどうかが課題として挙げられた。[4]

- **判定基準の不明確さ**

前述の通り「ABCRT 区分」は、労働省労働衛生試験研究の結果をもとに推奨されており、現在も汎用されている。しかし、公式なものではない。[5] また、じん肺健診以外の特殊健診において、有所見の明確な判定基準はなく、医師の裁量に任されているという課題がある。[6]

- **スタッフのスキル不足**

健診機関の医師が特殊健診に関する知識のない場合は、特殊健診の本来の目的から逸脱し、健診を実施することが目的となってしまう恐れがある。企業外の健診機関でも、特殊健康診断に精通した医師を持つべきだが、確保できない状況にあるという課題も挙げられた。[4]

2. 本来あるべき手続き

1 の現状の整理や課題をふまえた上で、本来あるべき手続きとして、以下の 3 つに分類された。

- **十分な情報収集**

課題として記載した通り、適切な判定のためにはばく露に関する情報を入手すべきであり、企業外労働衛生機関が受託して実施する場合であっても同様である。そのためには、事業者は必要に応じて作業者の作業環境、作業負荷等の情報を提供することが大切である。[1]その上で情報を提供された側は、情報を判定に活かすために、健診表や個人表に労働衛生情報を集約する必要がある。またそのためには、電子化するなどの対応が求められている。[3]

✓ 作業環境測定結果

作業環境測定結果はばく露の程度を推定する上で特に有用な情報である。健診機関にとって、受託先から作業環境測定結果の情報を受けないと、特殊健診を受診している作業者の作業環境状態が把握できず、特殊健診の判定を明らかにできない状態に陥ることが考えられる。[4]

✓　定期健康診断結果

特殊健診で認められた症状が本当に有害業務によるものなのか、他の原因による同じ症状・所見の鑑別に注意が必要である。そのため、定期健康診断などの結果を含めて総合的に判断しなくてはならないと考えられる。(7)

● **業務関連性の検討**

有所見に対して業務上の異常であるか業務外要因による異常であるかを判断することは、判定をする上で必要不可欠である。前述の「ABCRT 区分」を用いる際にも、その判断が必要であることは各区分の説明を見ると分かる。所見に加えて、ばく露に関する情報を入手し、発症のタイミング、経過、ばく露状況などから業務の関連の有無を慎重に判断する必要がある。(8)

● **精通したスタッフの確保**

業務関連性の十分な検討を行うためには、特殊健診に精通した医師が判定を実施するべきである。一般健診と異なり特殊健診に関わる看護師や医師には一定の労働衛生に関する理解が必要と考えられる。(9)

日本以外の例を考えると、特殊健診の診察や判定は産業医学・職業環境医学の学会専門医レベルの医師にしか行えないよう限定されている国も複数あったとの報告があった。(10)

また、現在の産業保健の課題の 1 つとして、小規模事業所における産業保健について挙げられる。このような規模の事業所に対して、特殊健診に長けた医師が健診医として特殊健診に参加できれば、小規模事業場の作業環境も改善するものと期待される。(4)

3. 「作業条件の簡易な調査」の活用

法令に基づく特殊健診では、原則的に一次健診の項目として「作業条件の簡易な調査」の実施が含まれている。同調査は労働者の当該物質へのばく露状況を適切に把握し、健康診断結果の解釈、二次健康診断の実施の必要の有無の判断及び健康診断結果に基づく措置を行う際の判断に資することを目的としている。(10) 同調査を適切に実施することで、産業医や健診実施機関の医師等が健診時に個人ばく露の概要を知ることができ、健診結果の判定に際してきわめて有用な情報となると考えられる。(11)

岡原らの研究により、同調査で得られた情報が判定結果に影響を及ぼし、判定の統一性を増すことが示唆された。同調査の情報が無い状況では、ばく露状況の把握が困難であるためと考えられた。(12)

4. 「作業条件の簡易な調査」の実施上の課題

情報収集段階の課題として、「作業環境測定の結果」や「事故や修理等の際の大量ばく露」については健康診断機関として顧客企業や労働者に対して聴取しに

くいという課題が示された。商行為における立場関係が要因になっていると考えられた。[13] また、実際に収集出来ている機関は少なかった。[10]

情報の記録・保存の段階の課題としては、健康診断結果個人表の記録スペース・データ容量の制約があり、詳細な情報を記録することが難しい場合があった。[10]

また、作業環境測定結果を含めた同調査の情報が適切に収集され、活用されるためには、特殊健診実施機関あるいは当該事業場の産業医や衛生管理者などが高い専門性と倫理性を持って課題に対処することが大切と思われた。[10]

D. 考察

今回の調査結果から、2 つに分けて考察する。

1. 所見とばく露に関する情報を組み合わせて判定することの重要性

本来、特殊健診においては、所見とばく露の程度の両方を加味して判定を行うべきである。今回課題として挙げられたばく露に関する情報不足、判定基準の不明確さ、スタッフのスキル不足によって、そういった本来あるべき判定が困難になっていると考えられた。

まず、課題の 1 つである情報不足に関して、十分な情報聴取が必要と考えられた。「作業条件の簡易な調査」は有用であると考えられたが、情報の収集・記録・保存に関しては課題が残る。特に、同調査の中には特殊健診の場面で聴取しにくい項目があり、事業者から別途情報提供が必要となるが、実際に収集できていない機関があるということは、大きな課題である。

また、判定基準の不明確さやスタッフのスキル不足により、情報が得られたとしても、ばく露の程度に関しての情報を判定に組み込めていないことが考えうる。

2. 判定に至るまでの手順の整理の必要性

1 の内容を踏まえて、所見とばく露に関する情報をどのように組み合わせて判定を行うか、という手順を示すことが必要であると考えられる。

特殊健診の判定に関しての理想的な手順としては、

① ばく露の程度の推定
② 所見の有無と程度の評価
③ 管理区分の判定

というステップを踏み、「ばく露の推定」と「症状や検査所見」とを組み合わせて判定することが基本となるべきである。[14] このステップの中で、情報入手についても手順として組み込む必要がある。例えば、①ばく露の程度の推定のステップでは、「作業条件の簡易な調査」、②所見の有無と程度の評価のステップでは必要に応じて定期健康診断などが情報として得られている必要がある。

また、特殊健診の判定は、産業医、労働衛生機関の健診判定医などの、様々な立場の医師が実施することが考えられる。判定する医師の立場、周囲の環境によって、あるべき判定の手順は大きく異なることが予想される。

以下、産業医、企業外労働衛生機関で実施した場合について特記すべきであると考えられる点について述べる。

- 産業医が判定をする場合

産業医は、ばく露の状況や現場の実態を把握することが比較的容易である。日頃の巡視などから得た職場への理解をベースに、必要に応じて臨時の職場巡視、作業環境測定結果の確認など行い、業務起因性を加味した判定を行うことが望ましい。

そのためには日頃から職場の理解を深める活動を行う必要がある。また、判定の手順についても整理を行った上で産業保健職や衛生管理者と共有しておくことが重要であると考える。

- 企業外労働衛生機関で判定をする場合

企業外労働衛生機関で企業から委託されて特殊健診を実施している際には、前述のような「ばく露の推定」と「症状や検査所見」とを組み合わせた判定を実施することが比較的困難であると考える。

そのため企業外労働衛生機関では、ばく露に関する情報を入手し、判定に組み込む際の手順を整理することが必要である。その実現には、委託元の事業場との折衝を行うことがより重要となってくる。また、手順を整理した上で、健診に関わるスタッフの教育も行う必要があると考えられる。

E. 結論

今回の文献調査によって、所見とばく露に関する情報を組み合わせて判定することの重要性を再認識し、判定に至るまでの手順の整理することの必要性が示唆された。

今後は、全国労働衛生団体連合会による、企業外労働衛生機関に対する特殊健診の現状に関するアンケート調査を実施する予定である。その結果によって現状の把握に努め、より実現可能な手順について検討していく。

F. 引用・参考文献

1. 岩滝典生. 特殊健康診断　労働衛生機関の健診現場から（解説）. 2000. 働く人の安全と健康 51 巻 7 号
2. 石井義脩. 特殊健康診断（その 2）. 2019. 安全と健康
3. 相澤好治. 特殊健康診断（総説）. 2004. 予防医学
4. 小野田富貴子, 山田誠二, 永見宏行. 特殊健康診断　外部委託の場合はレベルが問題　CSR からは危機感も. 2012. 健康管理
5. 圓藤吟史.労働災害防止・職業病予防

のストラテジー（解説）. 2012. 産業看護
6. 圓藤吟史.特殊健康診断の実施と活用　就業上の措置や安全衛生対策.2012.安全と健康
7. 仲村準. 労働衛生講座　データの読み方・活かし方　特殊健康診断（解説）. 2000. 働く人の安全と健康
8. 沖野哲郎. 職場改善につながる特殊健診のために. 2000. 働く人の安全と健康
9. 岡原伸太郎ら. 特殊健康診断における「作業条件の簡易な調査」の課題と好事例（会議録）. 2015. 産業医科大学雑誌
10. 岡原伸太郎ら. 作業環境測定と特殊健康診断の関係について　特殊健康診断における作業条件の簡易な調査について（会議録）. 2018. 産業衛生学雑誌 60 巻臨増
11. 櫻井治彦. 特殊健康診断の現状と課題. 2008. 産業医学ジャーナル
12. 小橋正樹.「作業条件の簡易な調査」で得られた情報が特殊健康診断判定医の判定結果に及ぼす影響. 2015. 産業衛生学雑誌
13. 岡原伸太郎. 特殊健康診断における「作業条件の簡易な調査」の課題と好事例. 2015. 産業医科大学雑誌
14. 森晃爾編. 改訂 20 版産業保健ハンドブック. 2022. 労働調査会

G. 学会・論文発表

なし

労災疾病臨床研究事業

（令和５年度～令和７年度）

分担研究報告書

労働衛生機関における特殊健康診断の結果判定に関するアンケート調査

研究代表者

森　晃爾

全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会委員長

研究分担者

立道　昌幸

東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授

山本　健也

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全総合研究所

化学物質情報管理研究センター化学物質情報管理部 部長

労災疾病臨床研究事業費補助金研究　分担研究報告書（総合研究報告書）
有害業務に係る特殊健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究

2. 労働衛生機関における特殊健康診断の結果判定に関するアンケート調査

研究代表者:森　晃爾 全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会委員長
研究分担者:立道昌幸　東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授
研究分担者:山本健也　独立行政法人労働者健康安全機構労働安全総合研究所
化学物質情報管理研究センター化学物質情報管理部 部長

研究要旨:「特殊健康診断」の結果の判定については、「昭和 46 年度労働省労働衛生試験研究」により、「管理 A」、「管理 B」、「管理 C」、「管理 R」、「管理 T」という 5 つの管理区分とその場合の事後措置が示されており、現在も多くの健康診断機関がこれを参考にしている。特殊健診の判定は、ばく露情報と自他覚所見を組み合わせて実施する必要がある。しかしながら各管理区分に至る手順および基準が明確にされていない。そこで本研究では、産業医、健康診断機関等特殊健診の判定に携わる者の考え方を整理するため、「特殊健康診断判定に関するマニュアル（仮称）」を作成し、判定に関する考え方の統一を図ることを目的とする。本年度は、現行の特殊健診の判定に関する実態調査を各健康診断実施施設に対してアンケート調査を行った。

全衛連が労働衛生サービス機能評価事業において把握している評価対象機関の調査票をもとに、特殊健診実施機関（117 機関）にて、特化則、有機則、鉛則、四鉛則、石綿則に関して① 令和 4 年度の特殊健診実施状況② 健診受託時の情報収集状況　③ 情報収集担当者の資格　④ 検査対象者の選定方法　⑤ 判定　⑥ 化学物質ごとの判定結果の分類（管理 A～管理 T）⑦ 結果の報告、事後支援措置 また、併せて、問診票や特殊健診結果判定に係る標準作業書等の書類の提出も依頼することとした。

回答が得られた施設は、57 機関/117（40.2%）受託事業者数 40094 事業所であった。有所見者の割合は、特化則（47 施設：平均 1.4±2.0%、最大 8.8%、最小 0%）、有機則（50 施設：平均 2.8±3.1%、最大 14.9%、最小 0%）、鉛則（36 施設：平均 0.54±3.06%、最大 18.1%、最小 0%）、石綿（49 施設：平均 0.8±1.0%、最大 3.9%、最小 0%）と施設間差を認めた。健診受診対象者の選定は事業者判断の場合が多いが、判定については健診機関側で行うことが多い。その場合の作業条件やばく露などの判定に用いる根拠の情報について、収集しているのは 60%程度であった。現在の判定基準「ABCRT 区分」については迷うケースが多いことから、判定基準の改定やロジックの提案等を求める要望が聞かれた。

研究協力者
宮本　俊明　　日本製鉄株式会社東日本製鉄所統括産業医
山瀧　一　　君津健康管理センター　産業保健部部長
福田　崇典　　聖隷福祉事業団　理事・専務執行役員

杉浦徹太郎　パナソニック健康保険組合産業保健センター・産業衛生科学センター所長
深井 航太　東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 准教授
中澤 祥子　東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 助教
古屋 佑子　東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 助教教

A. 研究目的

有害物質へのばく露の程度に関する情報の収集、健康障害リスクの未然発見や有害作業因子による健康障害の早期発見と対象などを目的とする「特殊健診」の結果の判定については、「昭和 46 年度労働省労働衛生試験研究」により、「管理 A」、「管理 B」、「管理 C」、「管理 R」、「管理 T」という 5 つの管理区分とその場合の事後措置が示されており、現在も多くの健康診断機関がこれを参考にしている。しかしながら、例えば、「管理 B」の症状区分は「管理 C には該当しないが、当該因子によるかまたは当該因子による疑いのある異常が認められる場合」、「管理 C」の症状区分は「当該因子によって疾病にかかっている場合」等となっているなど、判定の際に参考にすることが難しい表現となっている。

特殊健診の健診項目には、有害要因のばく露以外の要因で基準値外となる項目も多いことから、特殊健診の判定は、ばく露の可能性と自他覚所見を組み合わせて実施する必要があるが、各管理区分に至る手順および基準が明確にされていない。

そこで本研究では、特殊健診の実態を明らかにする一貫として、現行の特殊健診の判定に関する実態調査（アンケート調査）を各健康診断実施施設に対して実施した。

B. 研究方法

1．調査票の作成

研究者による班会議を開催して、作成方針を明確にし、調査票原案を作成した。その後、メールやオンラインでの打合せを経て、調査票実施案を作成した。さらに、健康診断機関の代表者の意見を求め、必要な改善を行った。

２．アンケート調査の実施

労働衛生サービス機能評価事業において把握している評価対象機関の調査票をもとに、特殊健診実施機関（117 機関）における、

① 令和 4 年度の特殊健診実施状況
② 健診受託時の情報収集状況
③ 情報収集担当者の資格
④ 検査対象者の選定方法
⑤ 判定
⑥ 化学物質ごとの判定結果の分類（管理 A～管理 T）
⑦ 結果の報告、事後支援措置

また、併せて、問診票や特殊健診結果判定に係る標準作業書等の書類の提出も依頼することとした。

C. 結果

１．調査票の作成

研究班会議において、調査票で確認すべき内容は、以下の項目とした。

- ばく露状況の把握方法
- 有所見の判定ロジック
- 作業状況の把握方法

- 事業者への戻し方

その後、より詳細な情報を得るためには、受託、実施、判定、フィードバックの流れに沿うことを意思しながら記載ができるよう、以下の整理が適当であることが合意され、調査票の大項目は以下のとおりとなった。

① 実績（令和４年度）
② 受託時の情報収集
③ 対象者の選定方法および実施
④ 判定
⑤ 結果の報告・事後措置支援

これらの項目に加えて、自由意見の記載および参考資料の提出を依頼することとした。

各大項目の内容ごとに、班会議メンバーの意見をもとに留意した内容について記載する。

① 実績

- データの集計および入力時の負担を小さくするために、事業場に対して提供されている監督署報告様式に沿った形式での収集が適当と考えられた。
- 特別規則による特殊健診の実施方法は、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則および四アルキル中毒予防規則と、特定化学物質障害予防規則および石綿障害予防規則では異なっている。
  - 前者では、医師が必要と認めた場合の追加検査や作業条件の調査をもとめ、それらを総合して結果判定することを前提している。
  - 前者では、所見のあった者（有所見者）の総数の記載を求めているため、有所見者の定義に“ばく露の影響の有無”を勘案しているかどうかについて、機関によって異なる可能性がある。
  - 後者では、第二次健康診断の実施の必要性を評価し、第二次健康診断の結果に基づいて疾病にかかっているとの診断を行うことを前提としている。
- 各数値の判断は受託事業場によって差があることが考えられるため、以下の選択肢を設けて実態を把握する。また、その他については自由記載を設けて、内容を確認する。
  ① 健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断
  ② 事業場（産業医）の個別指示・診断
  ③ 事業場の依頼による全員もしくは一部
  ④ 労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠
  ⑤ 数を把握していない
  ⑥ その他

② 受託時の情報収集

特殊健診の判定にあたっては、当該労働者の自覚症状や他覚所見のほか、有害要因へのばく露に関する情報が不可欠である。そのようなばく露情報は、特殊健診受

託機関が事業場から収集する情報と、「作業条件の簡易な調査」で代表される特殊健診項目の一つとして収集される情報がある。

- 収集する情報の内容は、実績に基づくことによって正確に把握することができるため、実施した件数とした。事前情報は、事業場単位で収集されるため、件数は事業場単位で回答を求めた。
- 実施した件数項目には、入手には事業場の理解が必要な作業環境測定結果や業務上疾病発生状況を加えた。
- 収集する情報の質は、情報収集担当者にも依存すると考えられるため、情報収集担当者の資格を、収集に関わった割合で確認することした。

③ 対象者の選定方法および実施

- 対象者の選定は、機関側が主体になる場合と、事業者側の判断・指示に従う場合を想定した。
- 特に衛生管理者等の有資格者がいない小規模事業場において、適切な対象者選定がされるためには、健診機関側の考え方の明確が必要と思われる。その際、作業の有無を前提とするか、ばく露の有無を前提とするか、２つの在り方を選択肢として示した。
- 健康診断の実施において、血液検査や尿検査以外の収集した情報の質が結果判定には重要と考え、“作業条件の簡易な調査”と自他覚症状の聴取について、確認を行うこととした。
- 特殊健診の実施は、十分な訓練と経験を積んだ産業医が行うべきであり、タイや韓国などでは、日本産業衛生学会の産業衛生専門医に相当する医師に実施者を限定している。そこで、診察医の資格について、産業医の中でも、日本産業衛生学会専門医、労働衛生コンサルタント、その他に分けて確認を行うこととした。

④ 判定

- 特殊健診の判定は、所見が業務上のばく露に起因するものであるか否かを明確にすることが必要であり、その判断のための情報を活用して、専門性を有する医師が判定すべきである。これらの状況について、確認を行うこととした。
- 業務起因性の判断には、ばく露情報が重要であり、法令に基づいて実施されているが想定されている情報の種類として作業条件の調査、作業環境測定結果、リスクアセスメント結果、その他（個人ばく露測定の結果等を想定）を選択肢として提示しました。
- 機関として判定する場合、判定医間の考え方の違いを調整するために、判定ロジックを含む規定が存在することが望ましい。その有無についても確認することとした。
- 現在、特殊健診に用いられている判定区分であるＡＢＣＴＲ区分について、特殊健診種別ごとの判定数の記

載を求め、機関間のばらつきを検証するとともに、判定の考え方や収集情報との関係の検証に用いることとした。

- 産業医がいる事業場の特殊健診では、産業医が判定することを前提、機関としては検査結果の提供のみを行うことがある。そのような事業場数を特殊健康種別ごとに記載を求めることとした。
- 判定ロジックで、議論が分かれる状況として以下を提示して、各機関の判定の特徴について確認することとした。
  - ばく露の可能性が小さい又は情報が不十分な状況で、検査値や自覚症状に所見がある場合の判定
  - 尿中代謝物等のバイオロジカルモニタリングに所見があり、一方で化学物質によるものと思われる症状や検査所見の有無の判定


⑤ 結果の報告・事後措置支援

- 結果報告については、様式を確認することによって、内容を確認することとした。
- 有害要因による健康障害が疑われる場合の当該労働者に関する対応および作業環境や作業方法についてのアドバイスの実態について、自由記載で情報を求めることとした。

2. アンケートの結果

① 基本集計結果


調査期間：2023/10/25-2023/11/27 として、117 機関にアンケートを依頼して、57 機関から返答を得た（回答率 40.2%）特殊健診全体としては、合計で 40094 事業所、施設あたり、703±837（中央値 427、最小 19−最大 5311）であった。このヒストグラムを以下に示す。




2-1 特化則に関する特殊健診

a. 受託事業場	：20,517 事業場（57 施設）
b. 受診者数	：779,594 人（57 施設）
c. 第二次健診を要するとされた者	：7,105 人（47 施設）
d. 第二次健診有所見者	：408 人（20 施設）
e. 疾病と診断された者	：199 人（20 施設）

・要二次健診者割合の分布（47 施設：平均 1.4±2.0%、最大 8.8%、最小 0%）



・二次健診有所見者割合の分布（20 施設：平均 0.2±0.7%、最大 2.8%、最小 0%）



・対象者選定理由：第二次健康診断を要するとされた者（N=48）

	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	38	79.2%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	3	6.3%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	0	0.0%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	5	10.4%
⑥その他	2	4.2%

・対象者選定理由：第二次健康診断有所見者（N=42）

	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	9	21.4%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	5	11.9%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	0	0.0%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	27	64.3%
⑥その他	1	2.4%


・対象者選定理由：疾病にかかっていると診断された者（N=42）

	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	10	23.8%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	4	9.5%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	1	2.4%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	25	59.5%
⑥その他	2	4.8%


2-2　有機則

a. 受託事業場　：16,142 事業場（57 施設）
b. 受診者数　：485,590 人（57 施設）
c. 医師が必要と認めた追加検査　：153 人（36 施設）
d. 医師が必要と認めた作業条件の調査　：121 人（33 施設）
e. 所見のあった者　：9,380 人（50 施設）
f. 有所見者は業務起因性のみとしている　：35.4%（17/48 施設）
g. 医師の指示人数　：2804 人（40 施設）


医師が必要と認めた追加検査（36 施設：平均 0.15±0.51%、最大 2.27%、最小 0%）




医師が必要と認めた作業条件の調査割合（33 施設：平均 0.12±0.47%、最大 2.27%、最小 0%）



有所見者割合の分布（50 施設：平均 2.8±3.1%、最大 14.9%、最小 0%）



・医師の指示人数割合の分布（40 施設：平均 1.3±1.7%、最大 8.0%、最小 0%）



・対象者選定理由：医師が必要と認めた追加検査とされた者（N=42）

	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	18	42.9%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	3	7.1%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	4	9.5%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	14	33.3%
⑥その他	3	7.1%

2-3　鉛則

・対象者選定理由：有所見者（N=51）

	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	48	94.1%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	1	2.0%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	0	0.0%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	1	2.0%
⑥その他	1	2.0%

対象者選定理由：医師の指示人数（N=42）


	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	36	78.3%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	2	4.3%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	0	0.0%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	7	15.2%
⑥その他	1	2.2%

・対象者選定理由：医師が必要と認めた作業条件の調査（N=42）


	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	15	35.7%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	4	9.5%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	3	7.1%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	17	40.5%
⑥その他	3	7.1%

a. 受託事業場　：1,641 事業場（56 施設）
b. 受診者数　：30,462 人（56 施設）
c. 医師が必要と認めた追加検査　：69 人（36 施設）
d. 医師が必要と認めた作業条件の調査　：0 人（32 施設）
e. 所見のあった者　：639 人（48 施設）
f. 有所見者は業務起因性のみとしている　：28.6%（12/42 施設）
g. 医師の指示人数　：138 人（39 施設）


医師が必要と認めた追加検査（36 施設：平均 0.54±3.06%、最大 18.1%、最小 0%）




・医師が必要と認めた作業条件の調査割合（32 施設：平均 0±0%、最大 0%、最小 0%）



有所見者割合の分布（48 施設：平均 2.1±3.3%、最大 13.0%、最小 0%）



・医師の指示人数割合の分布（39 施設：平均 1.4±2.4%、最大 8.7%、最小 0%）



・対象者選定理由：医師が必要と認めた追加検査とされた者（N=38）

	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	16	42.1%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	4	10.5%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	1	2.6%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	13	34.2%
⑥その他	4	10.5%

・対象者選定理由：医師が必要と認めた作業条件の調査（N=38）

	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	14	36.8%

対象者選定理由：医師の指示人数（N=42）

	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	32	76.2%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	1	2.4%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	0	0.0%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	8	19.0%
⑥その他	1	2.4%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	1	2.4%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	0	0.0%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	1	2.4%
⑥その他	2	4.8%

2-4　四アルキル鉛則


a. 受託事業場	：2902 事業場（56 施設）
b. 受診者数	：45738 人（57 施設）
c. 第二次健診を要するとされた者	：277 人（49 施設）
d. 第二次健診有所見者	：53 人（25 施設）
e. 疾病と診断された者	：118 人（24 施設）

※回答数が少ないため、上記集計のみ。


2-5　石綿則

a. 受託事業場	：11 事業場（8 施設）
b. 受診者数	：53 人（8 施設）
c. 医師が必要と認めた追加検査	：0 人（8 施設）
d. 医師が必要と認めた作業条件の調査	：0 人（8 施設）
e. 所見のあった者	：0 人（8 施設）
f. 有所見者は業務起因性のみとしている	：25%（2/8 施設）
g. 医師の指示人数	：0 人（8 施設）

・要二次健診者割合の分布（49 施設：平均 0.8±1.0%、最大 3.9%、最小 0%）



・二次健診有所見者割合の分布（25 施設：平均 0.09±0.21%、最大 0.85%、最小 0%）



・対象者選定理由：第二次健康診断有所見者（N=41）

	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	16	39.0%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	1	2.4%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	0	0.0%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	21	51.2%
⑥その他	3	7.3%

・対象者選定理由：疾病にかかっていると診断された者（N=41）

	N	%
①健診機関（診察医・判定医）の個別指示・診断	14	34.1%
②事業場（産業医）の個別指示・診断	3	7.3%
③事業場の依頼による全員もしくは一部	0	0.0%
④労基署報告用紙裏面の備考欄に準拠	0	0.0%
⑤数を把握していない	22	53.7%
⑥その他	2	4.9%

② 受託時の情報収集状況

3.1 収集情報の内容


全体集計（%）は対具体的業務内容

	具体的業務内容	作業環境測定結果	過去の特殊健診結果	業務上疾病発生状況
有機	29,820	11,438 (38.4%)	14,437 (48.4%)	9,689 (32.5%)
特化	31,319	6,875 (22.0%)	11,128 (35.5%)	11,636 (37.2%)
鉛	2,884	1,404 (18.7%)	1,812 (62.8%)	627 (21.7%)
石綿	3,766	337 (8.9%)	1,301 (34.5%)	799 (21.2%)

施設毎の割合

	具体的業務内容	作業環境測定結果	過去の特殊健診結果	業務上疾病発生状況
有機	100%	29.4%±45.1% (0.0%-129.8%)	67.3%±45.9% (0.0%-100.0%)	21.4%±41.5% (0.0%-100.0%)
特化	100%	29.0%±43.6% (0.0%-100.0%)	69.2%±44.8% (0.0%-100.0%)	21.4%±41.5% (0.0%-100.0%)
鉛	100%	24.8%±41.7% (0.0%-100.0%)	65.6%±47.2% (0.0%-100.0%)	17.9%±38.9% (0.0%-100.0%)
石綿	100%	14.7%±32.9% (0.0%-100.0%)	69.2%±44.6% (0.0%-100.0%)	17.9%±38.9% (0.0%-100.0%)

3.2 情報収集担当者の資格（N=57、各施設の回答からメイン担当者を抽出）



4. 対象者の選定方法

①対象者はどのように選定していますか

	N	%
事業者側の判断に従う	46	80.7
当該業務に従事する労働者全員	8	14.0
当該業務に従事する労働者全員＋事業者側の判断に従う	2	3.5
ばく露が無いと思われる人を除外＋事業者側の判断に従う	1	1.8

③ 対象者の判定方法について

②作業条件の簡易な調査はどのように実施していますか

	N	%
受診者に調査票に記載させる	30	53.6
健診時に聞き取って記載する	13	23.2
その他	2	3.6
受診者に調査票に記載させる＋健診時に聞き取って記載する	9	16.1
健診時に聞き取って記載する＋その他	2	3.6

③問診（自他覚症状の聴取）によって、有害業務による健康影響の可能性を確認していますか

	N	%
はい	52	92.9
いいえ	4	7.1

5. 判定根拠に用いる情報

①「業務による曝露である」（業務起因性）と医師が判断できる根拠となる情報を健康診断の判定に用いている

	有機		特化		鉛		四アル		石綿	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
あり	36	66.7	36	66.7	33	62.3	15	44.1	32	60.4
なし	18	33.3	18	33.3	20	37.7	19	55.9	21	39.6
欠損	4	-	3	-	4	-	23	-	4	-

②判定ロジックに関する規定を定めていますか

	N	%
はい	18	34.6
いいえ	34	65.4

④ 判定根拠に用いる情報について

他の疾病による異常でないことの確認について

（自由記載を要約）

A) 医師による診察と総合的判断
- 診察時（視診、問診等）に確認
- 当日の医師が自覚症状及び他覚症状の問診と診察を行い、総合判定
- 医師による総合的な判断

B) 定期健診と問診票を用いた確認
- 定期健診の問診票を使用し、現病・既往歴を確認
- 定期健診結果の確認、所見・症状等あれば産業医へ注意喚起

C) 職場環境と作業条件による評価
- 業務歴、作業条件、作業環境測定結果から医師が判断
- 診察所見と作業条件の簡易な調び既往歴から総合的に判断
- 産業医に作業環境・保護具着

用・作業内容を確認するように依頼
    - 事業場の産業医が作業環境と合わせて最終判定
D) 特殊健診結果を用いた評価
    - 溶剤ごとの自他覚症状と検体検査の数値でスクリーニング
    - 特殊健診の受診票に記載されている診察医のコメントから情報を得て確認
E) 明確なプロセスがない、または不明瞭
    - 不明
    - 大まかな判定マニュアルのみあるが、曖昧

④ばく露情報の利用を行っていますか

	N	%
作業条件の調査	45	78.9
作業環境測定結果	22	38.6
リスクアセスメントの結果	2	3.5
行っていない	5	8.8%

※重複あり

⑤判定を行う医師の資格

	N	%
日本産業衛生学会専門医	26	45.6
労働衛生コンサルタント	28	49.1
産業医（その他）	1	1.8
上記以外で、十分な経験と知識を有している医師	25	43.9

※重複あり

⑤　判定結果の分類

6.1 特殊健診判定区分（件数）

	A	B	C	R	T	合計
有機	425,112	7,368	121	1,027	10,737	444,365
	(95.7%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.2%)	(2.4%)	(444,365)
特化	540,687	12,093	366	2,170	13,595	568,911
	(95.0%)	(2.1%)	(0.1%)	(0.4%)	(2.4%)	(568,911)
鉛	27,190	558	21	14	342	28,125
	(96.7%)	(2.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(1.2%)	(28,125)
四アル	53	0	0	0	0	53
	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(53)
石綿	36,627	479	34	37	592	37,769
	(97.0%)	(1.3%)	(0.1%)	(0.1%)	(1.6%)	(37,769)

以下のケースの場合、どのように判定することを原則としているか（自由記載を要約）

Q1. ばく露の可能性が小さい又は情報が不十分な状況で、検査値や自覚症状に所見がある場合の判定

（回答数 52 施設）

- 管理 A とする場合：
    - 検査値や自覚症状が異常でない、または軽微な場合に使用されることが多い。
    - 「要観察」や「要注意」のコメントを伴い、定期的な健康管理や経過観察を勧奨するケースに当てはめられる。
    - 治療中疾患や他疾患の影響が考慮される場合もある。
- 管理 B とする場合：
    - 業務に起因する可能性のある異常を認める場合に該当する。
    - 検査値や自覚症状による明確な異常が認められる場合に用いられる。
    - 「要受診」や「産業医にご相談ください」といったアクションが推奨されている。
- 管理 T とする場合：
    - ばく露の可能性が低いと判断された場合や、情報が不十分で明確な判断が難しいケースに適用される。
    - 経過観察や詳細な調査を必要とする状況で使用される。
    - 事業所の産業医が最終判断を下すケースにしばしば当てはめられる。

Q2. 尿中代謝物等のバイオロジカルモニタリングに所見があり、一方で化学物質によるもの思われる症状や検査所見が無

い場合の判定
（回答数 52 施設）

- 管理 A とする場合：
  - 尿中代謝物等のバイオロジカルモニタリングに異常が見られるものの、化学物質による明確な症状や検査所見がない場合、経過観察や一般健診に準じた精密検査を勧奨する場合に使用される。
  - 判定は、自覚症状や検査値を要観察とするコメントを伴うことが多い。
- 管理 B とする場合：
  - 検査値に異常がある場合、特に業務に起因する可能性があると認識される異常が見られた際に使用される。
  - 産業医への相談や再検査など、具体的なアクションが推奨される。
- 管理 T とする場合：
  - 化学物質による症状が認められないが、検査値に異常がある場合に使用され、特にばく露の可能性が低いと考えられる場合や情報が不十分な状況で適用される。
  - 最終判断は事業所産業医に委ねられ、経過観察やさらなる調査が必要とされることがある。

⑤　結果の報告・事後措置支援

Q1. 特殊健診結果の報告書式の有無

	N	%
ある	53	93.0
ない	4	7.0

Q2. 有害要因による健康障害が疑われる場合はどのような対応を行っていますか（自由記載を要約）

- 産業医や医療機関との連携：
  - 多くの回答では、産業医への報告や医療機関での精密検査の受診勧奨が強調されていた。
  - 産業医がいない場合は、事業所担当者が医療機関の受診を勧める役割を担う。
- 事業所とのコミュニケーション：
  - 事業所担当者に連絡して状況を報告し、必要に応じて作業環境や方法の改善を提案する。
- 健診結果の報告と情報提供：
  - 結果報告を通じて事業所や産業医に情報を提供し、関連するアドバイスやコメントを記載する。
- 二次検査の実施と勧奨：
  - 二次健康診断や追加の検査を実施し、特に異常値を示した場合は詳細な評価を勧奨する。
- 作業環境の調査と改善提案：
  - 労働衛生コンサルタントや専門職による作業環境や作業方法の調査を提案し、改善策を勧める場合もあり。

Q3. 有害要因による健康障害が疑われる場合は、作業環境や作業方法についてアドバイスをおこなっていますか（自由記載を要約）

	N	%
行っている	14	26.9%
行っていない	22	42.3%
相談があれば対応	12	23.1%
産業医契約の有無等によって異なる	4	7.7%

⑥ **その他**

Q. 特殊健診の有所見判定の方法やガイドラインの設定について（自由記述を施設ごとに要約）

- 腰痛検診において、整形外科専門医以外の医師の診察に標準化の困難があり、医師からの相談がある。他施設

の実情を知りたい。
- 特殊健診は複数の項目からの総合判断が必要であり、適切な判定が難しい。判定ロジックの開発が必要。
- 特殊健診のシステム化を進めており、一部はシステム化されているが、多くは手動でのデータ処理が必要。明確なガイドラインが望まれる。
- 一次判定における基準として、自覚症状、他覚症状、検査数値などを用いる方法を示し、適切なフォローアップを強調。
- 特殊健診の形式と結果表の変更が予定されており、明確な範囲と役割のガイドラインが必要。
- ほとんどの身体所見や自覚症状が有害物以外で起こりうることから、管理区分の見直しが必要。
- 有所見判定についての明確なガイドラインと事業所産業医への情報提供の重要性を強調。
- 特殊健診の管理区分に関する意味合いの違いを統一する要望。
- 管理区分Ｂ＆Ｃについて、より具体的な判定基準と段階的なアプローチを求める。
- 特殊健診の結果と作業環境等の総合判断は現場の産業医によるものが適切と考える。
- 専門医不足や情報の限界があり、特殊健診の有所見判定の方法として全衛連の標準化を望む。

有所見判定の方法や、事業者への助言や指導のための明確なガイドラインの設定を要望

D. 考察と結論

特殊健診の判定には、基本的な物質の毒性情報、ばく露情報をもとに、診察時の問診による症状の発生経過、標的臓器における症状の有無などの問診と診察が非常に重要であり、その情報から検査結果について、業務関連性を判断しなければならない。また、判定後には、業務関連性が疑われる場合には、事業所への指導が求められる。

今回の全衛連が回答に応じた機関は、特殊健診に精力的に取り組んでいる機関であり、判定についても、日本産業衛生学会専門医や労働衛生コンサルタントが約半数で関与していた。

しかしながら、所見率でみると分散が大きくそれぞれでの所見について独自の判断でされている。

まず、特殊健診で健診全体のスケジュールや内容を決める重要な渉外担当については、事務職、衛生管理者、看護職がそれぞれ 20-30％占めていた。今後リスクアセスメント健診を考える場合には、さらに渉外担当について専門性が必要になることが予測される。

具体的業務内容に対して、作業環境測定結果や、過去の特殊健康診結果等の情報収集が少ないことが確認された。これらは、事業所からの情報提供に難渋するケースが多いことから、事業所についても特殊健診を実施する上での理解が必要であると思われた。

現在の「管理 A」、「管理 B」、「管理 C」、「管理 R」、「管理 T」という判定基準については、判定で迷うことも多く、特に、問診、診察、検査結果から業務関連性を疑うロジックと基準を明確にした判定基準の改定や、その判定に至る共通のロジックを求める意見が多かった。

E. 政策提言および実務活動

本年はなし

F. 研究発表（本研究に関わるもの）

1. 学会発表

なし

2. その他

なし

H. 知的財産権の出願・登録状況

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3. その他

なし

労災疾病臨床研究事業

（令和５年度～令和７年度）

分担研究報告書

労働衛生機関におけるばく露関連情報収集の実態と判定基準が有所見率に及ぼす影響に関するアンケート調査

研究代表者

森　晃爾

全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会委員長

研究分担者

立道昌幸

東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授

3. 労働衛生機関におけるばく露関連情報収集の実態と判定基準が有所見率に及ぼす影響に関するアンケート調査

研究代表者：森晃爾　全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会委員長
研究分担者：立道昌幸　東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授

研究要旨【目的】 日本の特殊健診には、判定に関する統一された指針が不足しており、有所見率の大きなばらつきに繋がっている可能性がある。本研究は、労働衛生機関の特殊健診におけるばく露関連情報の入手状況、特定化学物質健診と有機溶剤健診における施設間の有所見率の差異を定量化、有所見率と施設が採用する判定基準との関連性を検証することを目的とした。

【方法】 全国労働衛生団体連合会（全衛連）に加盟する 115 施設を対象とした横断的な質問票調査を実施した。施設から 2022 年から 2024 年度の有所見率および判定手順の標準化に関する情報を入手した。また、医師の判定基準を評価するため、ばく露情報の判定の活用と生物学的モニタリングの活用に関する事例を用いたケースビネットを提示した。所見とばく露の関連性については、2つの質問を組み合わせ、「ばく露との関連性を重視しない」群と「関連性を重視する」群に分類した。また、生物学的モニタリングにおける有所見率の施設間差は、Spearman の順位相関係数および Wilcoxon 順位和検定を用いて評価された。

【結果】 有効回答が得られた施設の健診実施件数は、特定化学物質健診で 666,975 件、有機溶剤健診で 405,401 件に上った。事業者からの安全データシート等のハザード情報、作業環境測定結果等のばく露関連情報の入手は、ほとんどの機関で 25%未満であり、ばく露関連情報が十分に入手できていない状況が観察された。両健診の有所見率は施設間で大きなばらつきを示し、施設内では強く相関していた。有機溶剤健診では、「所見とばく露の関連性を重視しない」施設の方が、有所見率が有意に高い結果となった。特定化学物質健診でも同様の傾向がみられたが、有意差は認められなかった。非職業性要因を除外せずに生物学的モニタリング値のみで異常と判定した場合、両健診で有所見率が上昇する傾向が認められた。

【考察】 特殊健診の有所見率のばらつきは、施設内では特殊健診間で強く相関しており、施設独自の判定基準がその有病率に影響している可能性を示唆している。このことは、国の公表する有所見率統計の解釈に注意を要することを意味する。多くの施設で事業者からのばく露関連情報の入手が不十分であり、有所見率の判定においてばく露との関連性を重視しない場合、生物学的モニタリング値を非職業性要因に影響を除外せずに異常と判断する場合に、全体の有所見率を押し上げる傾向があったことより、特殊健診の判定手順に関する明確なガイダンスが必要と考えられる。さらに、特殊健診の適切な運用のためには、事業者と労働衛生機関の間で、情報提供と役割分担を明確化し、ばく露関連情報を収集・活用する仕組みを改善することが不可欠である。

研究協力者：　宇根　理　産業医科大学　産業生態科学研究所　修練医

A. 目的

特殊健診は、有害業務に従事する労働者を対象に、職業性疾病の早期発見、リスク管理、適切な就業措置を目的として[1]、日本の労働安全衛生法等に基づき事業者に実施が義務付けられている。法定特殊健診の中でも、特定化学物質健康診断と有機溶剤健康診断は実施件数が多く、2024 年度にはそれぞれ 1,246,418 件と 710,499 件が実施された[2]。

特殊健診の検査項目や自他覚症状の多くは、対象の有害要因に特異的ではない。そのため、有所見の判定においては、検査所見と有害要因へのばく露との関連性を慎重に評価する必要がある。この評価が不十分である場合、有所見率が過剰に高くなり、不必要な事後措置につながる懸念が存在する。

しかしながら、日本においては特殊健診の判定手順や基準に関する明確な国の指針やガイドラインが存在せず、学術団体からの提供も不足しているのが現状である。これにより、判定基準が機関や医師の判断に委ねられ、有所見率に施設間で大きなばらつきが生じる可能性がある。

このような背景から、本調査では、全国労働衛生団体連合会（全衛連）に加盟する労働衛生機関を対象として、以下の 2 点を明らかにすることを目的とした。

1. **特殊健診の判定に必要なばく露関連情報（作業環境測定結果、SDS 等）の入手状況、および判定における活用実態、並びに判定プロセスの標準化の状況を明らかにすること。**

2. **特殊健診の有所見率の施設間差を定量化し、医師の判定基準が有所見率に与える影響を評価すること。**

B. 方法

研究デザイン：本調査は、質問票を用いた横断研究である。

対象および手続き：全衛連に加盟する **115 施設**を対象とし、2025 年 6 月から 7 月にかけて全衛連本部を通じて質問票が配布され、回答が依頼された。質問票は、特殊健診の結果判定を担う**主要判定医師**用と**事務担当者**用の 2 つのセクションで構成された。

分析対象施設は、顧客構成や短期的要因によるバイアスを抑制するため、以下の両条件を満たす機関に限定された。

- 特定化学物質健診と有機溶剤健診の両方について、実施件数と有所見率を**少なくとも 2 年度分**報告していること。
- 各健診の**年間平均実施件数が 1,000 件以上**であること。

分析 1：ばく露関連情報収集、活用、標準化の状況

事務担当者用セクションでは、対象化学物質の安全データシート（SDS）、作業環境測定結果、リスクアセスメン

ト結果の入手状況（6段階で回答）や、事業場との事前打ち合わせに関する標準作業書の整備状況が尋ねられた。

主要判定医師用セクションでは、有所見判定における「作業条件の簡易な調査」の利用状況、医師の診察時等のばく露関連情報の収集状況（基本的に実施・一部のみ実施・実施していない)、二次健診等の年間実施件数、二次健診等における「作業条件の調査」の実施状況と収集する情報、および判定手順や基準を定めた標準作業書の整備状況について質問がなされた。

分析には、回答があった2年または3年間の平均値が算出され、記述統計量（施設数、割合など）を用いて集計が行われた。

分析２：有所見率の施設間差と判定基準の影響

本分析では、ばく露と所見の関連性に関するケースビネットへの回答が矛盾しない45施設に限定された。

アウトカム変数は、対象期間（2022年度から2024年度）の施設ごとの平均有所見率とし、特定化学物質健診と有機溶剤健診について個別に算出された。

主要な説明変数は、有所見を分類するための医師の判断基準とした。これは、ばく露と所見の関連性に関するケースビネット（質問1-1および1-2）と、生物学的モニタリング値のみが基準値を超えたケースビネット（質問 2-1 および2-2）への回答に基づいて定義された。

具体的なケースビネットは以下の通りである。

１．所見とばく露の関係に関するケース

1-1）自他覚症状や検査に所見が有るが、それらの所見とばく露との関係は明確ではない。しかし、当該有害要因を一定の頻度で取り扱いを行っており、ばく露との関係が否定できない場合

1-2）自他覚症状や検査に所見が有る。一次健診で収集された作業状況に関する情報によって、それらの所見が当該有害要因のばく露によることが疑われる場合

ばく露-所見関連性の重視の程度：YES/YES は「ばく露関連性非重視」、NO/YES は「ばく露関連性重視」と分類した。

２．生物学的モニタリングのみ基準値超過のケース

2-1）明確な自他覚症状や健康影響に関する検査所見はないが、尿中代謝物等の生物学的モニタリングが分布２または分布３に相当する。食事等の生活要因や仕事以外でのばく露による影響が完全には除外できていない場合（生物学的モニタリング(ばく露以外の影響非除外)）

2-2）明確な自他覚症状や健康影響に関

する検査所見はないが、尿中代謝物等の生物学的モニタリングが分布２または分布３に相当する。追加の情報収集によって食事等の生活要因や仕事以外でのばく露による影響は除外できると考えられる場合（生物学的モニタリング(ばく露以外の影響除外)）

統計解析として、両健診の有所見率間の関連性は Spearman の順位相関係数を用いて算出され、有所見率と説明変数（判断基準）間の差は Wilcoxon 順位和検定を用いて評価された。有意水準は $P < 0.05$ とし、$0.05 \leq P < 0.10$ は「傾向」とされた 。

C. 結果

結果１:ばく露関連情報収集、活用、標準化の状況(分析1)

有効回答は **46 件**であり、有効回答率は 40.0%であった。分析対象施設の特定化学物質健診の総実施件数は673,195件、有機溶剤健診は 412,536 件であった。

・ **ばく露関連情報の入手状況：** 安全データシート等のハザード情報、作業環境測定結果、リスクアセスメント結果のいずれにおいても、**ほとんどの機関**で事業者からの入手率は 25%未満であり、ばく露関連情報が十分に入手できていない状況が観察された。（図１）

・ **簡易な調査の利用と診察時の情報収集：** 有所見判定における「作業条件の簡易な調査」の利用状況は、“基本的に実施”が 29 施設、“実施していない”が 7 施設であった。医師の診察時等のばく露関連情報の収集については、“基本的に実施”が 21 施設、“実施していない”が 8 施設であった。

・ **判定プロセスの標準化：** 特殊健診の判定手順や基準を定めた標準作業書（マニュアル等）を策定していたのは、31 施設（67.4%）にとどまっていた。

・ **二次健診の実施状況：** 二次健診を「実施していない」と回答した労働衛生機関は 21 施設であった。二次健診を実施している 20 施設のうち、「作業条件の調査」を基本的に実施または一部実施していたのは 18 施設であったが、そのうち化学物質の有害性に関する詳細情報（安全データシート等）を収集していた施設は過半数に達しなかった。（表１）

結果２:有所見率の施設間差と判定基準の影響(分析2)

分析対象となった 45 施設における特定化学物質健診の総実施件数は666,975件、有機溶剤健診は 405,401 件であった。

・ **有所見率の分布と相関：** 施設ごとの有所見率には顕著な施設間差が認められた。特定化学物質健診の有所見率は最小 0.1%～最大 22.4%、有機溶剤健診の有所見率は最小 0.5%～最大 11.7%で

あった。両健診の有所見率は施設内で強い正の相関を示した（Spearman's = 0.74, P < 0.001）。（図２）

· **判定基準の影響（ばく露–所見関連性）：** 有機溶剤健診において、「ばく露関連性非重視」の判定基準を持つ施設は、「ばく露関連性重視」の施設よりも有意に高い有所見率を報告した（P = 0.030）。特定化学物質健診でも同様の傾向が見られた（P = 0.066）。（表２）

· **判定基準の影響（生物学的モニタリング）：** 健康影響に関連する自他覚所見や検査所見がない状態で、非職業的影響が除外されていない生物学的モニタリング値のみで有所見とする場合、両健診とも有所見率が上昇する傾向が見られた（特定化学物質健診: P = 0.081; 有機溶剤健診: P = 0.083）。一方、職業的影響が除外されている場合には、両健診とも有所見率には有意差が認められなかった。（表２）

D. 考察

本研究の結果、日本の主要な労働衛生機関である全衛連加盟施設において、特定化学物質健診および有機溶剤健診の有所見率に大きな施設間差が存在した。また、多くの施設で特殊健診の実施に必要なばく露関連情報の収集と活用に課題があることも示された。有所見率の差異の一部は医師の判断基準の違いによって説明されることが明らかになった。

多くの施設で、安全データシートや作業環境測定結果などのばく露関連情報の入手が不十分であり、法令で求められる「作業条件の簡易な調査」に含まれる情報ですら十分に活用されていない場合があった。また、判定手順について標準作業書を整備している施設が全体の約 3 分の 2 にとどまっていることも、判定プロセスが機関や医師の判断に委ねられ、有所見率のばらつきに繋がっていると考えられた。

両健診の有所見率が施設内で強く相関していたことは、有所見の判定に施設固有の方針が影響していることを示唆している。特殊健診の所見の多くは非特異的であるため、総合的な判定にはばく露レベルの考慮が不可欠である 。所見とばく露の関連性を重視しない施設の方が、有機溶剤健診で高い有所見率を報告しており、これはばく露情報への重きを置かない判定が、非職業的要因による所見を拾い上げている可能性と整合している。この知見は、作業条件の簡易な調査の情報が利用可能である場合、疾病が疑われる評価数が減少するという先行研究の結果とも一致する。

生物学的モニタリング値が上昇した場合の判定についても、非職業的要因が除外されていないケースを異常として分類する施設では、有所見率が上昇

する傾向が見られた。

これらの課題は、特殊健診の目的である「作業環境の改善」や「適切な就業上の措置」の実施を妨げる可能性があり、国が公表する有所見率の統計的意義にも疑義を生じさせる重大な問題である。

特殊健診制度の信頼性を高めるためには、以下の改善が求められる。

1. 標準化されたガイドラインの確立： ばく露情報や生物学的モニタリングにおける非職業的影響の取り扱いを明確にした、標準的な判定基準の策定が不可欠である。

2. 情報共有の仕組みの改善： 労働衛生機関がその役割を果たすために必要なばく露関連情報が、事業場側からタイムリーかつ適切に提供される仕組みを強化すべきである。

３．行政の指導の強化：事業者が委託し，労働衛生機関が受託するという商取引の関係の中で、ばく露関連情報が適切に提供されるためには、労働基準監督署による事業者への指導を強化する必要がある。

４．判定医の資質向上： 検査所見とばく露関連情報を結びつけて判定できるような、判定を行う医師の専門知識と資格の強化が必要である。

E. 結論

日本の特殊健診において、特定化学物質健診と有機溶剤健診の両方で、有所見率に実質的な施設間差が認められ、このばらつきは判定基準の違いやばく露情報の収集・活用不足に起因していることが示唆された。

特殊健診制度の整合性、信頼性、および有効性を向上させるためには、標準化された判定ガイドラインの策定、事業者と労働衛生機関間の情報連携の強化、および判定を行う医師の資質の向上に向けた仕組みの改善が求められる。

F. 引用･参考文献

1. 坂本史彦：特殊健康診断．健康診断ストラテジー バイオコミュニケーションズ. pp52-79, 2014.
2. 厚生労働省： 令和５年度特殊健康診断実施状況（対象作業別）. https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001292235.pdf?utm_source=chatgpt.com

G. 学会･論文発表

論文

- Mori K, Une O, Kumakawa Y, Yamamoto K, Tatemichi M. Collection and utilization of exposure-related information in special health examinations: questionnaire survey of occupational health organizations. J Occup Health （accepted）
- 森晃爾，宇根理，熊川優希，山本健也，立道昌幸. 特殊健康診断におけるばく露関連情報の収集と活用の実態：労働

衛生機関への質問票調査. 産業医学ジャーナル（受理）

学会発表

- 森　晃爾、宇根　理、熊川優希、山本健也、立道昌幸. 有所見率の実態とばらつきに与える要因の検討. 第 35 回日本産業衛生学会全国協議会、2025 年 11 月、徳島




図１　ばく露関連情報の入手状況




図２　両特殊健診の施設内相関

表１　二次健診における「作業条件の調査」でのばく露関連情報の収集状況

作業に関する詳細情報（取扱量や期間、詳細な作業方法など）	100.0%
作業環境に関する詳細情報（作業環境測定結果、換気状態など）	88.9%
既往歴や過去の健康診断に関するより詳しい情報	88.9%
ばく露との時間的関係など、症状と関連した詳細情報	83.3%
個人用保護具に関する詳細情報（着用ルール、カートリッジの管理、フィットテストの実施状況など）	72.2%
安全データシートなどの化学物質の有害性に関する詳細な情報	44.4%

表２．特殊健診における生物学的モニタリング結果の取扱いによる有所見率の比較

生物学的モニタリング結果の判定への反映	特定化学物質健診					有機溶剤健診				
	n	Median	Lower 25%	Upper 25%	P value*	n	Median	Lower 25%	Upper 25%	P value*
曝露以外の影響非除外										
No	9	1.73	0.20	3.20	0.081	9	2.13	1.30	2.57	0.083
Yes	36	3.28	1.07	5.75		36	3.18	1.45	6.00	
曝露以外の影響除外										
No	16	2.38	1.15	4.07	0.387	16	3.12	1.75	5.57	0.553
Yes	29	3.40	0.33	5.87		29	2.57	1.43	4.40	

*: Wilcoxon rank-sum test

○ 投稿論文○ 【論 文】

特殊健康診断における曝露関連情報の収集と活用の実態：労働衛生機関への質問票調査

森　晃爾[1, 2]　宇根　理[1]　熊川　優希[1]
山本　健也[3]　立道　昌幸[2, 4]
Mori Koji, Une Osamu, Kumakawa Yuki,
Yamamoto Kenya, Tatemichi Masayuki

要　約

労働衛生機関における特殊健康診断の結果判定に必要な曝露関連情報の入手状況および判定における活用状況に関して調査を行った。併せて、特定化学物質健診と有機溶剤健診の有所見率を施設間で比較した。その結果、多くの施設で事業者からの情報収集が不十分であり、判定や標準化、有所見率に大きな差が認められた。特殊健康診断の適正運用には、事業者・労働衛生機関の連携および行政の関わりによる仕組みの改善が必要であることが示唆された。

緒言

特殊健康診断は、有害な業務に従事する労働者を対象に、職業性疾病の早期発見、作業環境の改善を通じたリスク管理、そして個々の労働者に対する適切な就業上の措置を目的として実施される[1]。日本においては、労働安全衛生法およびじん肺法に基づき事業者にその実施が義務付けられており、対象となる有害要因や検査項目は省令で定められ、事業者は健診結果の判定に基づき、必要に応じて作業転換、労働時間短縮、作業環境改善といった措置を講じなければならない。法定特殊健康診断の中では特定化学物質健診と有機溶剤健診の実施件数が多く、2023年度にはそれぞれ約122万件、約71万件が実施されており、有所見率はそれぞれ1.5%、3.2%であった[2]。

特殊健康診断における検査項目や自他覚症状の多くは、必ずしも対象の有害要因に特異的なものではない。そのため、有所見の判定においては、検査所見と有害要因への曝露との関連性を慎重に評価する必要がある。この評価が不十分な場合、有所見率が過剰に高くなり、本来必要のない事後措置につながる懸念がある。このような課題に対応するため、2020年 7 月からは「作業条件の簡易な調査」が健診項目として導入された。これには作業環境測定結果、有害物質の取扱状況、曝露防止対策の状況、事故による大量曝露の有無などが含まれるが、その一部は事業者から提供される必要がある情報である。しかし、特殊健康診断の実務にはいくつかの課題が存在する。多くの特殊健康診断は外部の労働衛生機関（健診機関）に委託されているが、

1　産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学
2　公益社団法人全国労働衛生団体連合会 労働衛生サービス機能評価委員会
3　独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全総合研究所 化学物質情報管理研究センター
4　東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学
産業医学ジャーナル 49 (1) : 62–67, 2026. doi: 10.34354/ohpfjrnl.49.1_62

特殊健康診断の判定における曝露関連情報の活用の方法について明確な指針やガイドラインは学術団体などからも示されておらず、判定手順や基準は各機関や医師の判断に委ねられているのが現状である。その際、事業者から機関へ「作業条件の簡易な調査」を含む曝露関連情報が十分に提供されていない場合や、判定に活用していない場合がある[3]。また、全国労働衛生団体連合会（全衛連）の会員機関では、労働衛生サービス機能評価の認定制度[4]や精度管理プログラム[5]などを通じた品質保証の取り組みが進められているものの、曝露情報の活用と判定の標準化は依然として大きな課題である。

これまで、特殊健康診断における曝露関連情報の入手・活用状況や、判定プロセスの実態を明らかにした全国的な調査は我々が知る限りでは見当たらなかった。そこで本研究では、全衛連に加盟する労働衛生機関を対象に、実施件数の多い特定化学物質健診と有機溶剤健診の機関ごとの有所見率とともに、曝露関連情報の入手状況と判定への活用実態、および判定プロセスの標準化の状況について調査を行った。

方法

全衛連に加盟する115施設を対象として、2025年６月から７月にかけて全衛連本部を通じて質問票を配布し、回答を依頼した。

質問票は、事務担当者用と特殊健康診断の判定を担う主要医師（主要判定医師）用の２つのセクションで構成した。事務担当者用セクションでは、対象化学物質の安全データシート、作業環境測定結果、リスクアセスメント結果の入手状況（まったく入手していない、ほとんど（５％未満）入手していない、５～24%程度入手している、25～49% 程度入手している、50～74%程度入手している、75%以上入手している）および事業場との事前打ち合わせに関する標準作業書の整備状況を尋ねた。また、2022年度から2024年度までの特定化学物質健診および有機溶剤健診の実施件数と有所見率の記載を求めた。一方、主要判定医師用セクションでは、有所　見判定における「作業条件の簡易な調査」の利用状況や、医師の診察時等の作業内容や曝露関連情報の収集状況（基本的に実施、一部のみ実施、実施していない）、二次健診等の年間実施件数（実施していない、１件以上10件未満、10件以上50件未満、50件以上100件未満、100件以上）、二次健診等における「作業条件の調査」の実施状況（基本的に実施、一部のみ実施、実施していない）、およびその調査で収集する情報を尋ねた。その際、二次健診等には、有機溶剤健診の「医師が必要」と認めた場合に実施する項目も含めた。また、判定手順や基準を定めた標準作業書の整備状況についても質問した。

分析対象は、顧客構成や短期的要因によるバイアスを抑制するため、以下の両条件を満たす機関とした。⑴ 特定化学物質健診と有機溶剤健診の両方について、実施件数と有所見率を少なくとも２年度分報告していること。⑵ 各健診の年間平均実施件数が1,000件以上であること。さらに、二次健診を実施していないにもかかわらず「作業条件の調査」に関する回答があるなど、明らかに矛盾した回答については当該項目のみ無効とした。

各健診実施数および有所見率は、回答があった２年または３年間の平均値とした。分析にはMicrosoft Excel（Microsoft Corp., Redmond, WA, USA）を用いた。

結果

回答総数は55件であった。このうち、特定化学物質健診と有機溶剤健診の両方または一方について２年度分のデータを報告しなかった５施設、および各健診の年間平均実施件数が1,000件未満の４施設を分析対象から除いた。その結果、有効回答は46件、有効回答率は40.0%となった。事業者からの曝露関連情報のうち、一次健診での情報入手状況の結果を**図１**に示す。安全データシート等のハザード情報、作業環境測定結果、リスクアセスメント結果ともほとんどの機関で入手率は25%未満であり、「全く入手していない」と回答した機関も一定数あり、曝露関連情報が十分に入手できていない状況が観察された。一方で、安全データシート等のハザード情報と作業環境測定結果については、75%以上入手できている機関もあった。




図 1　曝露関連情報の入手状況

表 1　二次健診における「作業条件の簡易な調査」での曝露関連情報の収集状況

項目	施設数
・作業に関する詳細情報（取扱量や期間、詳細な作業方法など）	18
・作業環境に関する詳細情報（作業環境測定結果、換気状態など）	16
・既往歴や過去の健康診断に関するより詳しい情報	16
・曝露との時間的関係など、症状と関連した詳細情報	15
・個人用保護具に関する詳細情報（着用ルール、カートリッジの管理、フィットテストの実施状況など）	13
・安全データシートなどの化学物質の有害性に関する詳細情報	8

有所見判定における「作業条件の簡易な調査」の利用状況は、「基本的に実施」が29施設、「一部のみ実施」が10施設、「実施していない」が 7施設であった。また、医師の診察時等の作業内容や曝露関連情報の収集状況は、「基本的に実施」が21施設、「一部のみ実施」が17施設、「実施していない」が 8 施設であった。

二次健診を実施していないにもかかわらず「作業条件の調査」に関する回答があるなどの明らかに矛盾した回答 2 件を無効とした結果、特定化学物質健診および有機溶剤健診の一次健診において曝露によることが疑われる所見がある場合に実施する二次健診の実施数は、「 1 件以上10件未満」が11施設、「10件以上50件未満」が 5 施設、「50件以上100件未満」が 2 施設 「100件以上」が 2 施設であり、「実施していない」と回答した労働衛生機関が21施設、無回答が 5 施設であった。 1 件以上実施している20施設のうち、二次健診における「作業条件の調査」の実施状況は、「基本的に実施している」が 9 施設、「一部のみ実施している」が 9 施設、「実施していない」が 2 施設であった。さらに、「作業条件の簡易な調査」を「基本的に実施している」および「一部のみ実施している」に該当する18施設における取得状況を**表 1** に示す。作業に関する詳細情報は全施設で収集されていたが、作業環境に関する詳細情報、既往歴や過去の健康診断に関するより詳しい情報、曝露との




図 2　有所見率別の施設数

時間的関係など症状と関連した詳細情報、個人用保護具に関する詳細情報は一部の機関で実施されておらず、安全データシートなどの化学物質の有害性に関する詳細な情報については過半数の施設で実施されていなかった。

施設としての標準作業書の作成によるプロセスの標準化について、事業場との特殊健康診断の打ち合わせに関するマニュアル等については25施設（54.3%）、特殊健康診断の判定手順や基準を定めたマニュアル等については31 施設（67.4%）で策定されていた。

分析対象となった施設の特殊健康診断の総実施件数は、特定化学物質健診では673,195件、有機溶剤健診では412,536件であった。各施設の有所見率の分布を**図 2** に示す。特定化学物質健診の有所見率は最小0.1%、最大22.4%であり、有機溶剤健診は最小0.5%、最大11.7%であり、両健診とも約半数が 3 %未満であったが、幅広い分布を示した。

考察

本研究では、特定化学物質健診および有機溶剤健診のいずれにおいても、施設間で有所見率に顕著なばらつきが認められた。有効回答率は40.0%にとどまったものの、分析対象となった施設における両健診の総実施件数は、日本全体の実施件数の過半数を上回っており、日本における特殊健康診断の実態をおおむね反映している可能性が高いと考えられる。

有効回答施設の多くでは、事業者からの曝露関連情報の入手が十分ではなく、法令で求められる「作業条件の簡易な調査」に含まれる情報すら入手できていない場合があった。さらに、収集した情報を判定に結び付ける過程においても、標準作業書を整備し標準化している施設は全体の約 3 分の 2 にとどまっていた。特殊健康診断に用いられる検査項目や自他覚症状の多くは、対象とする有害要因に特異的とは限らない。たとえば、肝毒性を有する化学物質の健診で実施される ALT、AST、γ-GT の検査値は、脂肪肝やウイルス性肝炎など多様な疾患でも上昇を示す。そのため、有所見の判定にあたっては、検査所見と有害要因への曝露との関連性を慎重に評価する必要がある。加えて、曝露に関連する健康障害の可能性があると判定された場合には、二次健診により曝露関連情報や健康影響を詳細に確認し、最終的な判定に基づいて就業制限や職場環境改善へ結び付けることが求められる。しかし、多くの労働衛生機関で、事業者からの曝露関連情報の入手率が低かった。その原因には、労働衛生機関が事業者に提出を積極的に求めていないこと、事業者側が情報提供に消極的であることなどが考えられる。一部の施設では対象化学物質の安全データシートや作業環境測定結果を75%以上の事業者から入手してい

たことより、曝露関連情報の入手率向上に向けた方策を検討するうえで、そのような労働衛生機関の対応方法を明らかにすることが必要と考えられる。

各種所見の曝露関連性を評価する際には、事業者から提供される情報に加えて、診察場面で得られる症状の出現時期や経過を把握することが重要である。また、「作業条件の簡易な調査」で得られた情報を、一次健診における有所見の判定や二次健診の要否判断にどのように活用するかは、特殊健康診断の判定を適切に実施するうえで欠かせない要素である。今回の調査では、これらを「基本的に実施」と回答した施設が最も多かった一方で、8施設では診察時に曝露関連情報の収集を行っておらず、7施設では「作業条件の簡易な調査」の結果を判定に活用していなかった。このような対応の施設間の差異が、本調査で観察された特定化学物質健診および有機溶剤健診の有所見率の大きな差異に影響している可能性がある。

一次健診で曝露関連の健康障害が疑われた場合には、二次健診の結果を踏まえて就業上の措置を判断する必要がある。有効回答を行った労働衛生機関のうち、二次健診を実施していたのは20施設であったが、その実施数には大きな差があり、総健診件数との関連はみられなかった。また、「作業条件の簡易な調査」を行っていたのは18施設にすぎず、その中でも化学物質の有害性に関する詳細な情報（安全データシート等）を収集していた施設は過半数に達しなかった。今回の質問では、二次健診の実施件数に対して「実施していない」と回答した施設について、体制は整備されているが対象者がいなかったのか、あるいは体制自体が存在しなかったのかを区別できていない。それでも、本調査結果からは労働衛生機関の二次健診実施体制に課題が残されていることが示唆される。

なお、今回調査対象とした全衛連加盟の労働衛生機関は、健康診断を担う医療機関の中でも労働衛生に対する専門性が高いと位置付けられる。実際、特殊健康診断を主要に受託する労働衛生機関の多くは全衛連に加盟し、同会が運営する「労働衛生サービス機能評価（認定事業）」[4]や「生物学的モニタリング精度管理事業」[5]に参加して、健康診断の質の管理に取り組んでいる。したがって、これらの事業に参加していない医療機関において特殊健康診断を実施する場合には、曝露関連情報の収集や判定への活用において、さらに大きな課題を抱えている可能性がある。

今回の調査結果から、特殊健康診断制度の運営には根幹的な課題が存在することが示唆された。具体的には、特殊健康診断の受託時に労働衛生機関が曝露関連情報を十分に入手できていないこと、「作業条件の簡易な調査」の結果が判定に十分活用されていない場合があることである。これらは健康診断の事後措置の適切な実施に影響するとともに、国が公表する有所見率統計の意義にも疑義を生じさせる重大な問題である。厚生労働省は、化学物質の自律的な管理制度を検討する過程で「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」を公表している[6]。同報告書では、特定化学物質障害予防規則等の既存の特別規則について「5年後の廃止を想定し、自律的管理が十分に定着していない場合は廃止を見送り、さらに5年後に改めて評価することが適当」としている。これは法定特殊健康診断にも当てはまると考えられる。法定特殊健康診断の制度を存続させる場合には、今回明らかとなった課題に対して多角的な改善が求められる。また、リスクアセスメント対象物健診について、実施の要否の判断に関しては行政のガイドライン等が参考になるが、結果判定の考え方については示されていない[7,8]。法定特殊健康診断同様、リスクアセスメント対象物健診の適切な判定のためには、検査所見や自他覚症状と曝露関連情報を結び付ける必要があり、その運用においても参考になる改善事項である。

特殊健康診断の判定が適切に実施されるために、判定の際に検査所見や自他覚症状に加えて曝露関連情報が存在していることが不可欠である。そのためには、労働衛生機関の渉外担当者が事業者との事前打ち合わせの際に曝露関連情報提供の必要性を説明して依頼することを標準化することや、事業場に産業医が選任されている場合には、労働衛生機関から検査所見や自他覚症状を事業者に報告し、産業医が事業場内で入手できる曝露関連情報と照合して判定すると

いった役割分担を行うことなどが考えられる[9]。また、労働衛生機関が入手した「作業条件の簡易な調査」などの情報が必ずしも判定に活用されていないことに対して、労働衛生機関における判定手順の標準化や曝露情報と検査所見を結び付けて判定できるような判定医師の資質向上などの取り組みが必要となる。さらに適切な判定実施の基盤として、国や学会等による曝露関連情報の活用等の判定手順に関するガイドラインの作成が検討されるべきである。

本研究にはいくつかの限界がある。第一に、回答率が約40%であった点である。曝露情報の活用に積極的な施設が回答した可能性があり、実際のばらつきは本研究で示された以上に大きい可能性がある。ただし、これらの施設で特定化学物質健診および有機溶剤健診のそれぞれについて、日本全体の実施件数の過半数を含んでいることから、一定の代表性は担保されていると考えられる。第二に、判定に関する情報は特定の医師に回答を依頼したため、施設全体の方針とは異なる可能性がある。しかし、依頼時には特殊健康診断の主担当医師を指定し、事前の8施設へのインタビュー調査においても判定は担当医師が一貫して行っていたことから[3]、施設方針をおおむね反映していると考えられる。第三に、有所見率や判定方針は自己記入式質問票により収集しており、記載方法や集計基準の相違、記憶の不正確さ、意図的あるいは無意図的な回答の偏りが影響した可能性を否定できない。

結語

本研究により、特殊健康診断において施設間で有所見率や判定手順に大きな差があり、曝露情報の不足や標準化の不十分さが明らかとなった。特殊健康診断の適正運用には、事業者・労働衛生機関の連携および行政の関わりによる仕組みの改善を図ることが求められる。

謝辞

本研究は、厚生労働省労災疾病臨床研究事業「有害業務に係る特殊健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究（230601-01）」の一環で行われました。調査の実施にあたり、全国労働衛生団体連合会の亀澤典子氏ならびに伊知地宏志氏に、多大な支援を賜りました。ここに深く感謝申し上げます。

参 考 文 献

1）坂本史彦．特殊健康診断 . 健康診断ストラテジー．バイオコミュニケーションズ．pp52–79，2014.

2）厚生労働省．令和 5 年特殊健康診断実施状況（対象作業別）．業務上疾病発生状況等調査（令和 5 年）．［PDF］https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001292235.pdf（最終アクセス：2025年10月19日）

3）森晃爾，立道昌幸．労働衛生機関における特殊健康診断の結果判定に関するインタビュー調査．有害業務に係る特殊健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究．令和 5 年度労災疾病研究事業報告書．pp56–62，2024.［PDF］https://www.mhlw.go.jp/content/001275875.pdf（最終アクセス：2025年 9 月11日）

4）公益社団法人全国労働衛生団体連合会．労働衛生サービス機能評価事業．2025.［Web］https://www.zeneiren.or.jp/service/（最終アクセス：2025年10月19日）

5）公益社団法人全国労働衛生団体連合会．総合精度管理事業．2025.［Web］https://www.zeneiren.or.jp/management/index.html（最終アクセス：2025年10月19日）

6）厚生労働省．職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書．2021.［PDF］https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000807679.pdf（最終アクセス：2025年 9 月11日）

7）厚生労働省．リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン．2023.［PDF］https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001156454.pdf（最終アクセス：2025年 9 月11日）

8）日本産業衛生学会産業医部会化学物質管理 WG．化学物質リスクアセスメントに基づく健康診断の考え方に関する手引き．2024.［PDF］https://www.sanei.or.jp/files/topics/recommendation/tebiki_ra-kenshin-chemicals_202405.pdf（最終アクセス：2025年 9 月11日）

9）森晃爾，立道昌幸．「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」（原案）の作成．有害業務に係る特殊健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究．令和 6 年度労災疾病研究事業報告書．pp25–48，2025.［PDF］https://www.mhlw.go.jp/content/001554545.pdf（最終アクセス：2025年10月19日）

OXFORD

Journal of Occupational Health, 2026, **68**(1), uiag010
https://doi.org/10.1093/joccuh/uiag010
Advance access publication date 21 February 2026
Brief Report

Disparities in abnormal-finding rates among special health examination facilities and the influence of judgment criteria

Koji Mori [1,2,*], Osamu Une[1], Yuki Kumakawa[1], Kenya Yamamoto[3], Masayuki Tatemichi[2,4]

[1]Department of Occupational Health Practice and Management, Institute of Industrial Ecological Sciences, University of Occupational and Environmental Health, Kitakyushu, 1-1 Iseigaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu 807-8555, Japan
[2]Committee for Accreditation of Industrial Health Services, National Federation of Industrial Health Organizations, Tokyo, Japan
[3]Division of Chemical Information, National Institute of Occupational Safety and Health, Kawasaki, Japan
[4]Department of Preventive Medicine, Tokai University School of Medicine, Isehara, Japan
*Corresponding author: Koji Mori, (kmori@med.uoeh-u.ac.jp).

Abstract

Objectives: Special health examinations in Japan lack standardized judgment guidelines, potentially leading to wide variation in outcomes. This study quantified inter-institutional differences in abnormal-finding rates for examinations targeting specified chemical substances and organic solvents, and examined whether institutional judgment criteria are associated with these rates.
Methods: We conducted a cross-sectional questionnaire survey of 115 facilities affiliated with the National Federation of Industrial Health Organizations (Zen-Eiren). Facilities reported abnormal-finding rates for fiscal years 2022-2024. Physicians' judgment criteria were assessed using case vignettes addressing the use of exposure information and biological monitoring. Associations between rates and judgment criteria were evaluated using nonparametric tests (Spearman rank correlation; Wilcoxon rank-sum).
Results: Valid responses were obtained from 45 facilities (39.1%). Abnormal-finding rates for specified chemical substances and organic solvent examinations were strongly correlated within facilities. For organic solvent examinations, facilities that did not emphasize the exposure–finding association reported higher abnormal-finding rates than those that did. A similar, but nonsignificant trend was observed for specified chemical substance examinations ($P = .066$). Abnormal finding rates tended to rise when biological monitoring alone triggered abnormalities and nonoccupational factors were not excluded in both examinations.
Conclusions: Major special health examinations in Japan show substantial inter-institutional variation in abnormal-finding rates, partly explained by differences in judgment criteria—particularly the weight placed on linking clinical findings to workplace exposure. Establishing standardized national guidelines is essential to improve consistency, reliability, and system effectiveness.

Key points

What is already known on this topic: Japan mandates special health examinations for workers with potential exposure and publishes abnormal-finding rates. National guidance on assessment criteria is lacking, and major academic bodies have not filled the gap. Findings can be nonspecific without adequate exposure information. Biological monitoring is used, but values may reflect nonoccupational factors.

What this study adds: In a survey of large occupational health service institutions, we found wide inter-facility variation and a strong within-facility correlation between specified chemical substance and organic solvent examinations. Facilities that de-emphasized linking findings to exposure reported higher abnormal-finding rates for solvents, with a similar trend for specified chemicals. Rates rose when biological monitoring alone triggered abnormalities and nonoccupational factors were not excluded.

How this study might affect research, practice, or policy: These results support creating standardized national criteria, clarifying how exposure information should be used, and strengthening physician qualifications. They caution against naive interpretation of national statistics. Research should test causal pathways and incorporate multivariable adjustment; practice and policy should harmonize classification and improve the national flow of employer-to-provider exposure data.

Keywords: special health examinations; occupational exposure; hazardous substances; biological monitoring; occupational health service; inter-facility variation.

Received: November 16, 2025; **Revised:** January 17, 2026; **Accepted:** February 12, 2026
© The Author(s) 2026. Published by Oxford University Press on behalf of the Japan Society for Occupational Health.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. For commercial re-use, please contact reprints@oup.com for reprints and translation rights for reprints. All other permissions can be obtained through our RightsLink service via the Permissions link on the article page on our site—for further information please contact journals.permissions@oup.com.

Downloaded from academic.oup.com/joh/article/68/1/uiag010/8494269 by guest on 08 September 2026

Introduction

Special health examinations are an important component of occupational health in Japan, designed for workers potentially exposed to hazardous factors. Their purposes are 3-fold: (1) detecting occupational diseases early and enabling timely care; (2) managing risk by assessing exposure and health effects and using the findings to improve workplaces and processes; and (3) guiding individual employment measures—such as job modification, reassignment, or reduced hours—based on health status and fitness for duty.[1]

These examinations are mandated under the Industrial Safety and Health Act and the Pneumoconiosis Act. Ministerial ordinances specify the hazardous agents, designated work activities, and mandatory examination items. Following physician review of the results, employers must implement necessary measures, including job or workplace reassignment, adjustment of duties or hours, workplace environmental monitoring, and engineering or facility improvements. The individuals subject to special health examinations are workers engaged in designated work, not based on risk that reflects the degree of exposure. Among the legally mandated categories, the most common are examinations for specified chemical substances and organic solvents. The government publishes annual statistics; in 2024, 1 246 418 examinations were conducted for specified chemical substances and 710 499 for organic solvents, with abnormal-finding rates of 1.5% and 3.1%, respectively.[2]

In practice, although employers with 50 or more employees are legally required to appoint an occupational physician, most special examinations are conducted by external occupational health service institutions due to equipment and technical requirements. Many major institutions—often members of the National Federation of Industrial Health Organizations (Zen-Eiren)—participate in quality-assurance programs such as the Accreditation System for the Quality Management of Occupational Health Services[3] and the Biological Monitoring Quality Control Program[4] to maintain examination quality.

Despite the detailed regulatory requirements, the Japanese government has not issued clear national guidance on the procedures or judgment criteria for special health examinations, and academic bodies such as the Japanese Society for Occupational Health have also not provided such guidance. Consequently, the judgment criteria used by institutions and physicians vary widely,[5] likely contributing to large inter-facility differences in abnormal-finding rates. Many abnormal findings are also nonspecific and may reflect conditions unrelated to occupational exposure, underscoring the importance of adequate exposure information for proper attribution. Prior studies have noted variation between facilities in how exposure information is utilized, often because employers provide insufficient data. Differences are also evident in how institutions use biological monitoring results—which are mandated for certain substances—in determining whether findings are classified as abnormal.[5]

Therefore, this study aimed to examine inter-institutional disparities in abnormal-finding rates and to assess the impact of exposure-related information on these rates for the 2 major statutory special health examinations in Japan—for specified chemical substances and for organic solvents—focusing on facilities affiliated with Zen-Eiren.

Methods

Research design

This study was a cross-sectional study using a questionnaire.

Subjects

The study involved 115 facilities affiliated with Zen-Eiren. From June to July 2025, the Zen-Eiren headquarters distributed questionnaires to all facilities and solicited responses. To limit bias from client mix or short-term events, we included only facilities that met the following criteria: (1) they reported, for at least 2 fiscal years, the numbers of examinations conducted and abnormal-finding rates for both specified chemical substance and organic solvent examinations; and (2) they had an average annual volume of ≥1000 examinations in each category. We further excluded facilities whose responses on the linkage between findings and exposure were inconsistent with the case vignettes described below; the remaining responses were considered valid.

Questionnaire structure

The questionnaire comprised 2 sections—1 for administrative staff and 1 for physicians who assess special health examinations. In the administrative section, respondents reported, for fiscal years 2022-2024, the number of examinations conducted and the abnormal-finding rates for examinations targeting specified chemical substances and organic solvents. In the physician section, to clarify criteria for classifying abnormal findings, 4 brief case vignettes were presented: 2 in which the linkage between findings and exposure was ambiguous, and 2 in which only biological monitoring exceeded reference values. For each vignette, respondents indicated whether they would classify the case as an abnormal finding (Yes/No). An overview of the vignettes is provided below.

Cases related to the relationship between findings and exposure

1-1. There are subjective or objective symptoms or significant test findings, but the relationship between these findings and exposure is unclear. However, the hazardous factor is handled at a certain frequency, and the relationship with exposure cannot be ruled out.

1-2. There are subjective or objective symptoms or significant test findings. Cases where the findings are suspected to be caused by exposure to the hazardous factor based on information about work conditions collected during the health examination.

Cases in which only biological monitoring exceeds the reference values

The boundary values of Distributions 2 and 3 (as defined under the Ministerial Ordinances of the Ministry of Health, Labour and Welfare) correspond to the urine concentration at the end of work after 8 hours of exposure at the permissible concentration level.[6] Distribution 2 or 3 is defined by the government as indicative of suspected exposure whereas Distribution 1 represents a situation where exposure is sufficiently low.

2-1. There are no clear self-reported or observed symptoms or significant test findings related to health effects, but biological monitoring, such as urinary metabolites, corresponds to Distribution 2 or 3. Cases where the influence of lifestyle factors such as diet or exposure outside of work cannot be ruled out (biological monitoring not excluding other influences).

2-2. There are no clear self-reported or observed symptoms or test findings related to health effects, but biological monitoring corresponds to Distribution 2 or 3. Cases where additional information collection is expected to exclude the influence of lifestyle factors such as diet or exposure outside of work (biological monitoring excluding other effects).

Definition of variables

The outcome was the average abnormal-finding rate per facility during targeted years, calculated separately for examinations

Downloaded from academic.oup.com/joh/article/68/1/uiag010/8494269 by guest on 08 September 2026




Figure 1. Inter-institution correlation of positive findings rates for both special health examinations.

targeting specified chemical substances and those targeting organic solvents. The Shapiro-Wilk test indicated that abnormal-finding rates for both examination types departed from normality.

The main explanatory variable captured physicians' criteria for classifying abnormal findings. For the exposure–finding association items (questions 1-1 and 1-2), responses of YES/YES were coded as "nonemphasis on association with exposure," and NO/YES as "emphasis on association with exposure." One response (YES/NO) was excluded as internally inconsistent. In addition, the vignettes in which only biological monitoring exceeded reference values (questions 2-1 and 2-2) were entered as separate binary variables.

Statistical analysis

The significance level was set at $P < .05$, with $.05 \leq P < .10$ indicating "trend." The association between the abnormal-finding rates between the 2 health examinations was calculated using the Spearman rank correlation coefficient. Additionally, the differences in the rates between explanatory variables were examined using the Wilcoxon rank sum test for each type of health examination. All analyses were conducted using Stata Statistical Software (version 16; StataCorp LLC, TX, USA).

Results

Responses were obtained from 55 facilities, of which 45 provided valid data for both types of examinations (valid response rate: 39.1%). Across these 45 facilities, a total of 666 975 examinations for specified chemical substances and 405 401 examinations for organic solvents were conducted. The average number of examinations per year had a median of 8513.7 (25th percentile: 4569.0; 75th percentile: 19 426.0) for specified chemical substances, and a median of 4524.7 (25th percentile: 3256.0; 75th percentile: 9839.0) for organic solvents.

The distribution of facility-level abnormal-finding rates for both examination types is shown in Figure 1. The rates were strongly correlated (Spearman $\rho = 0.74$, $P < .001$).

For examinations for organic solvents, as shown in Table 1, facilities categorized as placing "nonemphasis on association with exposure" had higher abnormal-finding rates than those emphasizing the exposure–finding association ($P = .030$). A similar but nonsignificant trend was observed for examinations for specified chemical substances ($P = .066$).

For vignettes in which only biological monitoring values exceeded reference levels—without excluding other potential causes—no significant differences were observed for either examination type, although rates tended to be higher when such cases were classified as abnormal (specified chemical substances: $P = .081$; organic solvents: $P = .083$) as shown in Table 1. In contrast, for vignettes specifying biological monitoring results after excluding other potential causes, neither tendencies nor significant differences were observed (specified chemical substances: $P = .387$; organic solvents: $P = .553$).

Discussion

This study found wide inter-facility variation in abnormal-finding rates for both specified chemical substance examinations and organic solvent examinations. The survey targeted major occupational health service institutions in Japan (Zen-Eiren members). Although the response rate was only 39.1%, the number of examinations at responding facilities accounted for more than half of the national total, suggesting that the findings likely approximated national patterns.

Abnormal-finding rates were strongly correlated between the 2 examination types at the facility level, implying that facility-specific judgment criteria may influence prevalence. A key element of these criteria is the use of exposure information. In Japan, special examinations rely on self-reported and observed symptoms, clinical tests, and basic workplace surveys, with biological monitoring mandated for selected substances in both health examinations for specified chemical substances[7] and organic solvents.[8] Because symptoms and clinical test abnormalities may arise from nonoccupational causes, comprehensive judgments should consider exposure levels. Accordingly, facilities that place less emphasis on exposure information are expected to record higher abnormal-finding rates. A previous simulation study on the assessment of special health examination results reported that when the findings of a simple survey of working conditions—a statutory item in special health examinations—were available, as opposed to unavailable, the number of assessments indicating suspected disease due to the relevant exposure factor decreased.[9] This finding is consistent with the results of this study. Such criteria may be justified if they result in a larger number of subjects being selected for secondary examinations, and a more detailed investigation of working conditions is conducted. However, it has been reported that secondary health examinations based on sufficient information have not been implemented for the same subjects as in this study.[10]

Biological monitoring provides objective indicators; however, values—particularly urinary metabolites commonly used in statutory monitoring—may be affected by nonoccupational factors such as diet or hobbies.[11] For example, in Japan, biological monitoring for toluene exposure is based on urinary hippuric acid rather than unmetabolized urinary toluene, and hippuric acid levels are known to be influenced by dietary intake. In this study, when such factors were not excluded, classifying these cases as abnormal tended to increase the overall rate of abnormal findings. At the same time, some facilities do not classify cases as abnormal even when biological monitoring values are elevated, if no other test results indicate abnormalities. Conceptually, if abnormalities were defined solely by biological monitoring after excluding nonoccupational influences, one would expect facility-level abnormal-finding rates to rise. Yet, our analysis did not show a significant difference. This suggests that, in practice, cases in which elevated biological monitoring values truly reflect occupational exposure may be relatively uncommon.

Downloaded from academic.oup.com/joh/article/68/1/uiag010/8494269 by guest on 08 September 2026

Table 1. Comparison of abnormal-finding rates according to criteria for classifying abnormal findings.

	Specified chemical substances					Organic solvents				
	n	Median	Lower 25%	Upper 25%	*P* value[a]	*n*	Median	Lower 25%	Upper 25%	*P* value[a]
All participating facilities										
	45	3.11	0.87	5.33	—	45	2.77	1.43	5.57	—
Focus association with exposure										
No	39	3.17	1.08	5.77	.066	39	3.03	1.84	5.57	.030
Yes	6	0.55	0.20	3.27	—	6	0.92	0.27	1.93	—
Reflecting biological monitoring results										
Other effects not excluded										
No	9	1.73	0.20	3.20	.081	9	2.13	1.30	2.57	.083
Yes	36	3.28	1.07	5.75	—	36	3.18	1.45	6.00	—
Other effects excluded										
No	16	2.38	1.15	4.07	.387	16	3.12	1.75	5.57	.553
Yes	29	3.40	0.33	5.87	—	29	2.57	1.43	4.40	—

[a]Wilcoxon rank-sum test.

These findings indicate that national statistics on abnormal-finding rates should be interpreted with caution. Variation in judgment criteria may also affect 2 core aims of special examinations: improving work environments and processes, and guiding individual work accommodations. Three improvements merit consideration. First, standardized guidelines for classification should be developed, with explicit instructions on incorporating exposure information and handling nonoccupational influences on biological monitoring. Second, roles and implementation methods should be clarified and strengthened—particularly the timely provision of exposure-related data (eg, workplace measurements) from employers to occupational health institutions. Third, physician expertise should be enhanced. Some countries, such as Thailand[12] and South Korea,[13] require specific qualifications for physicians conducting such examinations; Japan should similarly ensure that determinations are made with sufficient understanding of hazardous exposures.

This study has limitations. First, the response rate was approximately 40%; facilities that more actively use exposure information may have been more likely to respond, potentially understating true variability. Nevertheless, coverage of over half of all examinations supports reasonable representativeness. Second, facility policy was assessed via 1 designated physician and may not fully capture institutional practice; however, we targeted the lead physician for special examinations, and preliminary interviews at 8 facilities indicated consistent decision-makers. Third, organic solvents are often used as mixed solvents, whereas those with carcinogenic properties are classified as specified chemical substances. As a result, both specified chemical substance health examinations and organic solvent health examinations may be conducted for the same work. It cannot be ruled out that this practice contributes to the heightened correlation observed between the 2 examination types. Fourth, unmeasured factors—such as physician expertise, regional characteristics, and client industry/-size—may influence rates and warrant further study. Fifth, data from 2022-2024 were not adjusted for time-specific influences (eg, COVID-19). Sixth, the sample size limited analyses to univariate comparisons; multivariable modeling was not performed, so independent effects could not be estimated.

Conclusions

Abnormal-finding rates varied widely across institutions for both specified chemical substance and organic solvent examinations in Japan's mandated special health checks. This variation likely reflects differences in judgment criteria, alongside other factors. To strengthen the system, standardized judgment guidelines, better provision of exposure information, and enhanced qualifications for determining physicians are needed.

Acknowledgments

We would like to express our sincere gratitude to Ms Noriko Kamezawa and Mr Hiroshi Ichiji from the National Federation of Industrial Health Organizations for their excellent administrative support.

Author contributions

Koji Mori and Masayuki Tatemichi conceived the ideas; Koji Mori and Osamu Une led the development of questionnaires, and the other authors reviewed and approved them. Koji Mori and Osamu Une designed the analysis and analyzed the data. Koji Mori wrote the draft of the manuscript. All authors advised on the data interpretation and have reviewed, edited, and approved the final manuscript.

Funding

This work was supported by a Grant-in-Aid for Special Research on Industrial Accidents and Diseases from the Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan.

Conflicts of interest

The authors declare no conflicts of interest.

Data availability

The data are not publicly available because they contain proprietary and confidential information from participating organizations. Data provided by each institution was strictly managed among researchers.

References

1. Sakamoto F. Specific health examinations. In: Moriguchi J, Yamataki H eds. *The Health Examination Strategy*. 2nd ed. Biocommunications; 2014:52–79 Article in Japanese.
2. Ministry of Health, Labour and Welfare. *Status of special health examinations in FY 2024, by type of work*. Accessed April 27, 2026. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61103.html

Downloaded from academic.oup.com/joh/article/68/1/uiag010/8494269 by guest on 08 September 2026

3. National Federation of Industrial Health Organization. *Accreditation system for quality management of occupational health services*. Accessed November 13, 2025. https://www.zeneiren.or.jp/service/
4. National Federation of Industrial Health Organization. *Comprehensive quality control program*: Accessed November 13, 2025. https://www.zeneiren.or.jp/management/index.html
5. Mori K, Tatemichi M. *Interview survey on the judgement of special health examinations in occupational health service institutions, fiscal year 2023. Clinical research project on occupational accident and disease collaborative research report*. 2024. Accessed November 13, 2025. https://www.mhlw.go.jp/content/001275875.pdf
6. Kawamoto T, Tsuji M, Tanaka M. Biological monitoring and occupational physician. *J UOEH*. 2013;**35**(Special Issue):97–106.
7. Ministry of Labour of Japan. *Ordinance on Prevention of Hazards Due to Specified Chemical Substances*. Ordinance No. 57; 1972: Accessed November 13, 2025. https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/29297/JPN29297.pdf
8. Ministry of Labour of Japan. *Ordinance on Prevention of Organic Solvent Poisoning*. Ordinance No. 36; 1972: Accessed November 13, 2025. https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/29294/JPN29294.pdf
9. Kobashi M, Kajiki S, Okahara S, Mori K. Influence of information obtained from a "simple survey of working conditions" on physicians' judgment in special health examinations: conference proceeding. *Jpn J Occup Health*. 2015;**57**(Suppl):324.
10. Mori K, Une O, Kumakawa Y, Yamamoto K, Tatemichi M. Collection and utilization of exposure-related information in special health examinations: questionnaire survey of occupational health organizations. *Occup Health J*. 2026;**26**(1):62–67.
11. Foà V, Alessio L. *General Principles, Biological Monitoring, ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety 4th edition*. 1998; Part 27: Biological monitoring. Accessed November 13, 2025. https://www.iloencyclopaedia.org/part-iv-66769/biological-monitoring-65407
12. Ministry of Labour of Thailand. *Ministerial regulation on the prescribing of criteria on method of conducting health check-up of employees and forwarding the results of health check-up to labour inspector. B.E. 2547, 2004*. Accessed November 13, 2025. https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=96400
13. Lee Y, Kim J, Lee YC. Residency programs and the outlook for occupational and environmental medicine in Korea. *Ann Occup Environ Med*. 2015;**27**:23. https://doi.org/10.1186/s40557-015-0072-1

Downloaded from academic.oup.com/joh/article/68/1/uiag010/8494269 by guest on 08 September 2026

© The Author(s) 2026. Published by Oxford University Press on behalf of the Japan Society for Occupational Health. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. For commercial re-use, please contact reprints@oup.com for reprints and translation rights for reprints. All other permissions can be obtained through our RightsLink service via the Permissions link on the article page on our site—for further information please contact journals.permissions@oup.com.
Journal of Occupational Health, 2026, **68**(1), uiag010
https://doi.org/10.1093/joccuh/uiag010
Brief Report

労災疾病臨床研究事業
（令和５年度～令和７年度）
分担研究報告書

労働衛生機関における特殊健康診断の判定に関するインタビュー調査

研究代表者
森　晃爾
全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会委員長

研究分担者
立道昌幸
東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授

4. 労働衛生機関における特殊健康診断の判定に関するインタビュー調査

研究代表者:森晃爾　全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会委員長
研究分担者:立道昌幸　東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授

研究要旨

【目的】我が国では、特殊健診の判定において、現在多くの事業場や労働衛生機関がABCRT 区分を用いている。一方で、判定手順については言語化されていない部分が多い。そこで、今回は特殊健診を実施している労働衛生機関の実態に関する調査を行うことにした。そのうち、別の分担研究として実施したアンケート調査では、有所見率には、施設間で大きな差があることが分かっている。その具体的な内容を詳しく理解するために、労働衛生機関に対するインタビュー調査を行った。

【方法】労働衛生機関における特殊健診の判定に関するアンケート調査をもとに、特殊健診の実施数、有所見率の違いなどの情報から、8つの労働衛生機関を選定した。そのうち、2023年度中に6つの施設に対する調査が完了し、さらに 2024 年度中に2施設の調査を追加した。各機関において、特殊健診の結果判定手順に関してもっとも詳しい医師に遠隔会議システム(Zoom)を用いて、1時間程度のインタビューを行った。インタビューの内容として、健診機関における判定実施者、判定手順(標準)の有無とその内容、判定実施者間の調整、判定区分および有所見の考え方、判定に用いる健診項目以外の情報とその確認方法、作業条件の簡易な調査の判定への反映、ばく露情報の結果(有所見)への反映の考え方、判定における現在考えている課題、リスクアセスメント健診に対する準備状況について聴取した。

【結果】各機関における判定に関するインタビューでは、それぞれによって異なる判定のプロセスを持っていた。具体的には、①特殊健康診断の判定における機関としての役割を定義し、それと整合性が取れた結果判定を行い、事業者に提供していた。また、②定義した役割を果たす上で必要な情報を意識して収集が図られていた。リスクアセスメント健診については準備中の場合がほとんどで、実施した実績は報告されなかった。そのため、課題については聴取することができなかった。

【結論】適切に特殊健診の判定が実施されるには、「契約・計画→準備→実施→健診判定→管理区分の決定」の一連の流れにおける事業場側と労働衛生機関側の役割分担が明確となっている必要がある。また、労働衛生機関側が事業場側から役割を果たすことができる情報が共有されることや、健診実施場面で追加情報が適切に聴取されることも必要不可欠である。今後は、さらにインタビューを追加して情報を整理して、それらをもとにマニュアルを作成することが必要である。

研究協力者:　日野優希　産業医科大学　産業生態科学研究所　修練医

A. 目的

わが国では、有害業務に従事する労働者に対して特殊健診が実施されている。特殊健診の判定に関しては、現在多くの事業場や労働衛生機関が「ABCRT区分」を用いている。この管理区分は、1971 年の労働省労働衛生試験研究の結果をもとに推奨されている。しかし、特殊健診の判定には、自他覚所見に加えてばく露の程度を勘案する必要があるが、管理区分に至るプロセスは示されていない。

その後、労働安全衛生法関連省令の改正により、現在はばく露の程度を推定することを目的として、生物学的モニタリングや「作業条件の簡易な調査」が健診項目に加わっている。また、化学物質管理が法令型管理から自律型管理へ移行する中で、特殊健診の実施頻度の柔軟化が求められている。

こうした流れの中では、特殊健診の判定手順を明確化し、適切な情報をもとに判定が標準的に行われるようにすることが重要と考えられる。

しかし、特殊健診の判定手順は必ずしも決まったルールがあるわけではなく、言語化されていない部分が多い。そこで、今回は特殊健診を実施している労働衛生機関の実態に関する調査を行うことにした。そのうち、別の分担研究として実施したアンケート調査では、有所見者の割合の有所見率には、施設間で大きな差があることが分かっている。その具体的な内容を詳しく理解するために、労働衛生機関に対するインタビュー調査を行った。

B. 方法

労働衛生機関における特殊健診の判定に関するアンケート調査をもとに、特殊健診の実施数、有所見率の違いなどの情報から、８つの労働衛生機関を選定した。

各機関の責任医師に連絡して、特殊健診の結果判定手順に関してもっとも詳しい医師の推薦を依頼し、推薦のあった医師に遠隔会議システム(Zoom)を用いて、1時間程度のインタビューを行った。施設によっては、複数の医師や事務職が同席した場合もあった。

インタビュー内容は、これまでの分担研究である、「特殊健診の判定に関する文献調査」や「有害業務に係る特殊健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究」を元に検討を行い、以下の質問項目とした。

- 健診機関における判定実施者
- 判定手順（標準）の有無とその内容
- 判定実施者間の調整
- 判定区分および有所見の考え方
- 判定に用いる健診項目以外の情報とその確認方法、作業条件の簡易な調査の判定への反映

・ ばく露情報の結果（有所見）への反映の考え方
・ 判定における現在考えている課題
・ リスクアセスメント健診に対する準備

C．結果

各労働衛生機関のインタビュー結果では、特に①事業者責任である特殊健診の実施と判定における労働衛生機関としての役割の範囲、②判定に用いる情報収集の方法と範囲の考え方や実態に大きな差があることが認められた。そのため、労働衛生機関別に、上記の 2 点に関して重点的に内容を記載する。

● 労働衛生機関 A

① 判定における機関としての役割

特殊健診で認められた所見の業務起因性の有無については、各事業場の職場環境の詳細を知る事ができないため判定できていない。そのため、血液検査や尿検査の所見を基準値に従って有所見の有無の判定を行っている。また、他覚所見は軽度異常として判定に反映させることがある。しかし、自覚症状及び既往歴、現病歴は対象物質との因果関係が不明であるため判定に反映させない。事業所から問い合わせがあった際は、業務起因性の説明や二次健診の実施などは、個別に対応している。

② 判定に用いる情報収集

「作業条件の簡易な調査」の項目は聴取しているが、作業環境を直接確認できるわけではないため十分な情報といえず、判定には反映させていない。作業環境測定結果は、ほとんどの会社から提供されない現状がある。

● 労働衛生機関 B

① 判定における機関としての役割

あくまでも特殊健診の判定は事業場の産業医が判定するものと位置づけ、そのために必要な健康診断の情報を提供するという立場で判定を実施している。そのため、産業医にメッセージを出すために、何らかの所見を認めた場合には、「経過観察」と判定をして、産業医に判断を促す。

② 判定に用いる情報収集

「作業条件の簡易な調査」は、診察の際に活用している。ばく露に関する情報は、自覚症状等を認める場合には、診察の場で問診医が情報収集して、症状や所見の業務起因の可能性を推定するために用いている。作業環境測定結果は入手できていない現状がある。

● 労働衛生機関 C

① 判定における機関としての役割

特殊健診で認めた所見にばく露の可能性が疑われる際には、事後措置を意識した上で「産業医に相談」というコメントを出している。また、同一事業場の労働者複数名に同様の有所見を認めた際などは、「経過

観察」と判定をつけて、事業場側の対応を促すことがある。

② 判定に用いる情報収集

「作業条件の簡易な調査」は、診察時に参考にすることを期待しているが、非常勤の医師が多いなかで十分な標準化はできていない。業務起因性に関する情報は、診察の場で収集したり、対象事業場の嘱託産業医が機関内にいる場合には産業医から収集したり、当該労働者の過去の健診結果を参考に、可能な限り精度の高い判定を行うようにしている。

● 労働衛生機関 D

① 判定における機関としての役割

基本的には、自動判定で判定を実施しているが、診察担当医による問診・診察において、自覚症状・既往歴・他覚症状で業務起因性が疑われた場合、医師による判定を実施している。医師による判定の際には、業務歴・作業条件の簡易な調査・自覚症状・他覚症状・既往歴・各検査結果・代謝物結果などを考慮して判定をしている。判定分類は独自の分類を用いており、一次健診の段階では管理区分は決められないという考え方から、必要に応じて、「二次健診推奨」「要産業医確認」の判定をしている。

② 判定に用いる情報収集

「作業条件の簡易な調査」の内容は、判定医による判定の際に活用している。ただ、調査自体が本人からの聞き取りであるため、曖昧な場合が多いという現状がある。診察医は比較的固定の医師で実施しているため、特殊健診の理解が深い医師による問診を実施、必要情報を聞き取りできていると考える。作業環境測定、一般健診結果は判定ロジックには含めていないが、判定医による判定の際には参考にすることはある。

● 労働衛生機関 E

① 判定における機関としての役割

独自の判定区分を使用しており、管理区分は事業場の産業医が判定すべきであるという考え方から、必要に応じて、「再検査」「要産業医相談」「要受診」の判定をしている。検査値の異常がない場合で自覚症状を認める際は、判定には反映させなくてもコメントで産業医への相談を促す場合もある。尿中代謝物のみ有所見の場合も同様のコメントでの対応をとることがある。事業場には契約時点で、独自の判定区分を用いることを説明している。

② 判定に用いる情報収集

「作業条件の簡易な調査」の内容は、システムの関係上、一部は判定時に確認することができる。作業環境測定は、判定時手元にない。診察医によるばく露情報の聴取に関しては、有所見の場合の業務起因性の判定の参考にすることが多い。

● 労働衛生機関 F

① 判定における機関としての役割

一次健診で気になる所見がある際には、

二次健診の外来(精密検査の外来)で業務起因性を加味した最終的な判定を実施している。二次健診では、「診断」「業務起因性」「理由」「判定」「就業場の措置」について問診を実施して判断する。化学物質に関する特殊健診における有所見者は、基本的には二次健診を実施して判定を実施している。その後の対応が事業者任せになることを防ぐため、二次健診では就業上の措置まで判断をするようにしている。

② 判定に用いる情報収集

「作業条件の簡易な調査」は、判定の場面で、量反応関係の判断の参考にしている。作業環境測定結果は、入手できない場合も多いが、入手できた際には判定の参考にしている。二次健診では、問診の場面で情報収集を実施している。事業者の方が同席する場合もある。

労働衛生機関G

①判定における機関としての役割

判定については、産業医がいない事業所がほとんどであるので、自身の機関で ABCRT 判定を用いて判定をつけている。しかし、判定を事業所に返却してもその後の事後措置につながっているのかが不明である点が問題である。判定は、異常なしか所見ありを自動的に判定。所見ありの場合は、二次健診にて詳細にばく露状況や作業環境測定結果を確認する。しかし、検査についてはそれを受けてくれる機関が少なくなってきているので困っている。

②判定に用いる情報収集

ばく露情報は基本的に、事前の問診票で入手。事前に作業環境測定結果等の情報が得られるのは1%前後、

○ばく露に不明な点がある場合は、診察前の問診で聞くことにしている。

○診察医師については、最初から OCR から予測される所見が、選べるように、チェックできるようになっているので、医師のところで１つ１つ確認してチェックできるようになっている。法定項目についての症状は網羅されている。従って診察医は経験が少なくても症状をチェックできるようになっている。

○リスクアセスメント健診への対応はまだである

労働衛生機関H

①判定における機関としての役割

基本姿勢として渉外担当が作業環境測定結果の入手と判定の割り当てを交渉できている。「ABCRT 区分」を用いているが、産業医がいるところは基本的に産業医が判定。

検査異常値、生物学的モニタリングでの異常値、自他覚的がある場合は、作業条件や採取条件を再度確認して再検査にて所見を確認。作業関連性が疑われる場合には、労災病院にて二次検査を実施するように産業医と連携する。

（これまで二次検査の経験はなし）

○担当医が公衆衛生学の教授であったこともあり、化学物質の知見もあり、所見がある場合には、二人の専門家による総合的に判定を行い、事業場へ返却している。

②判定に用いる情報収集

医師の診察の前に、作業状況を聞く看護師に対して、システマティックな問診票を作成して OJT にて教育をしながら、ばく露情報入手の精度を高めている。

健診実施前日、あるいは当日にどのような作業場であるかの情報をミーティングで伝えていて作業場のイメージを沸かせている。

診察医はアルバイトや、専門知識のない常勤医師で行っているが、事前に SDS や作業情報についてはマニュアル化しており自他覚症状の診察を行う。

○リスクアセスメント健診に関するコンサルの準備はしているが、現時点で要請はない。

D．考察

特殊健診の判定が適切に実施されるためには、有所見の判定、所見のばく露起因性の判定が必要であり、その結果をもとに管理区分を決定しなければならない。法令に基づく特殊健診の実施は事業者責務ではあるが、その多くが労働衛生機関に委託されている。

適切な特殊健診の判定は、「契約・計画→準備→実施→健診判定（有所見および業務起因性）→管理区分の決定」が行われ、管理区分による事業者による事後措置が実施されることになる。

今回のインタビューの結果から、「契約・計画→準備→実施→健診判定→管理区分の決定」の一連の流れにおける事業者側と労働衛生機関側の役割分担は、労働衛生機関ごとに大きく異なっていた。しかし、そのような役割分担は契約・計画時に調整され、双方が明確に理解していることが必要であるが、そのような対応ができていないという課題も挙げられた。その結果、仮に事業場側の産業医の判断を委ねる判定がされ、労働衛生機関側から情報提供がされても、最終的な判定および事後措置が実施されていない可能性が高い。

適切な役割分担がされた際には、それぞれが役割を果たすために情報の収集と共有が不可欠になる。しかし、健診実施場面で追加情報が十分に聴取されていなかったり、労働衛生機関が役割を果たすうえで必要な情報が事業場側から提供されていないことが少なくない。

特殊健康診断の適切な結果判定には、以下の情報が収集され、役割分担の中で判定に用いられるべきである。

- 取り扱い物質の内容と有害性
- 作業時間、使用量等の情報
- 換気設備、作業環境測定の結果等の作業環境等の情報
- 保護具の使用状況、管理状況

・　自覚症状の確認
・　自覚症状とばく露との時間関係等
・　他覚症状の確認（診察、検査結果）

これらの情報の一部は、「作業条件の簡易な調査」等の健康診断項目の一部として収集される。

今回のインタビュー結果から、事業者側から労働衛生機関側への情報の提供や追加情報収集に関しても、各労働衛生機関によって異なる工夫を認めた。また、「作業条件の簡易な調査」は、情報収集の面でうまく機能していない部分も課題として挙げられた。前述の事業場側と労働衛生機関側の役割分担を明確にする過程の中で、提供すべき情報についても双方で整理しておく必要が考えられる。また、多くの機関において健診実施場面で追加情報を聴取する工夫として、健診の問診や診察の場が活用されていた。適切な情報収集のためには、問診や診察レベルの向上も必要である。

E. 結論

適切に特殊健診の判定が実施されるには、「契約・計画→準備→実施→健診判定→管理区分の決定」の一連の流れにおける事業場側と労働衛生機関側の役割分担が明確となっている必要がある。また、労働衛生機関側が事業場側から役割を果たすことができる情報が共有されることや、健診実施場面で追加情報が適切に聴取されることも必要不可欠である。今後は、さらにインタビューを追加して情報を整理して、それらをもとにマニュアルを作成することが必要である。

F. 引用・参考文献

なし

G. 学会・論文発表

なし

労災疾病臨床研究事業
（令和５年度～令和７年度）
分担研究報告書

特殊健康診断における適正な情報収集と
判定に関するマニュアルの作成

研究代表者
森　晃爾
全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会委員長

研究分担者
立道昌幸
東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授

5. 特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアルの作成

研究代表者：森 晃爾　全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会委員長
研究分担者：立道昌幸　東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授

研究要旨

【目的】我が国では、特殊健診の判定において現在多くの事業場や労働衛生機関が「ABCRT 区分」を用いているが、判定手順については言語化されていない部分が多い。特殊健診の所見は有害因子に特異的でないことが多いため、適切な判定には健康状態に加えて有害因子への「ばく露の推定」が不可欠であるが、実際には事業者からの情報提供不足や機関ごとの判定基準の相違が課題となっている。そこで今回は、特殊健診を実施している労働衛生機関の実態に関する調査を行い、その結果を踏まえて、判定に必要な情報収集を標準化し、事業者と労働衛生機関の適切な役割分担と情報共有の在り方を明確にするためのマニュアルを作成することを目的とした。

【方法】マニュアルを作成するにあたり、①特殊健診の判定に関するインタビュー調査と②労働衛生機関への質問票調査を実施した。これらの調査から抽出された、情報提供不足や専門性のばらつき等の課題をふまえて、「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル（原案）」を策定した。その後、企業の専属産業医 5 名、労働衛生機関の医師 3 名、同渉外担当者 4 名へのインタビューを通じて妥当性と実現可能性を検証し、厚生労働省担当課による法令や行政施策との整合性確認を経て最終版を確定させた。

【結果】作成されたマニュアルは、(1)特殊健診において収集・共有すべきばく露関連情報、(2)労働衛生機関における判定レベル（Ⅰ～Ⅲ）と医師の役割、(3)特殊健診全体のプロセス、(4)事業者と労働衛生機関の役割分担のプロセス、の 4 つの主要項目で構成された。

【結論】適切に特殊健診の判定が実施されるには、「契約・計画→準備→実施→健診判定→管理区分の決定」の一連の流れにおける事業場側と労働衛生機関側の役割分担が明確となっている必要がある。また、労働衛生機関側が事業場側から役割を果たすことができる情報が共有されることや、健診実施場面で追加情報が適切に聴取されることも不可欠である。本マニュアルの活用により、労働衛生機関の標準作業書の改訂や判定の質の平準化が図られるとともに、事業者が適切な事後措置を完遂できる体制の構築が期待される。今後は労働衛生機関に対する研修会等を通じた周知や議論に加え、事業者側への啓発を進めていくことが不可欠な課題である。

研究協力者：熊川優希　産業医科大学　産業生態科学研究所　非常勤助教

A. 目的

有害業務に従事する労働者への特殊健康診断（以下、特殊健診）は、法令等に基づき事業者に実施が義務付けられており、医師の意見聴取を通じた適切な事後措置が求められる。医師は就業区分や作業管理に関する意見を述べる際、一般に「ABCRT 区分」を用いるが、特殊健診の所見は有害因子に特異的でないことが多いため、正確な判定には健康状態に加え、有害因子への「ばく露の推定」が不可欠である。法令改正により生物学的モニタリング等の情報収集手法も整備されてきたが、依然として管理区分に至る標準的な手順は言語化・明文化されていない。

また、多くの特殊健診が労働衛生機関に委託されている現状において、事業者からの情報提供不足や、機関ごとの判定基準・手順の相違が大きな課題となっている。実際、本事業の他の分担研究による調査では、検査所見とばく露情報の関連性をどの程度重視するかといった判定の考え方の違いにより、施設間で有所見率に大きな差が生じている実態が判明した。こうした判断内容の差異は、特殊健診の質と一貫性を確保する上での重大な懸念事項となっている。

そこで本研究では、特殊健診の判定実態を把握し課題を抽出するため、労働衛生機関へのインタビューおよび質問票調査を実施した。その結果を踏まえ、判定に必要な情報収集を標準化し、事業者と労働衛生機関の適切な役割分担と情報共有の在り方を明確にすることを目的として、「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」を作成した。

B. 方法

マニュアルを作成するにあたり、特殊健診の実態把握と課題抽出のため、以下の2つの調査研究を実施した。

(1) 特殊健診の判定に関するインタビュー調査

8つの労働衛生機関を対象に、判定手順に最も詳しい常勤医師へのインタビュー調査（遠隔会議システム zoom を利用）を行い、健診の各プロセスにおける役割認識の実態を調査した。その結果、各機関が独自の役割定義に基づき判定を行う一方で、契約・計画時の事業者との役割調整が不十分であり、事後措置が適切に実施されない懸念があるという課題を抽出した。

(2) 労働衛生機関への質問票調査

全国労働衛生団体連合会加盟の 115 施設を対象とした質問票調査を行い、特定化学物質および有機溶剤健診の有所見率や判定基準を分析した。これにより、施設間での有所見率のばらつきが、ばく露関連情報の入手状況や、業務起因性をどの程度重視するかという判定の考え方の違いに起因する実態を明らかにした。

これらの調査結果から得られた課題（情

報提供不足、専門性のばらつき、ガイドラインの欠如等)を解決するため、以下の手順でマニュアルの作成を行った。

① 研究班会議において、判定に必要な情報収集の標準化と役割分担の明確化を目的とした「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル(原案)」を策定した。

② 原案の妥当性と実現可能性を検証するため、企業の専属産業医5名、労働衛生機関の医師3名、同渉外担当者4名へのインタビューを実施し、実務上の運用課題を聴取した。

③ 厚生労働省担当課に対し、法令や行政施策との整合性について確認を行った。

④ 以上のプロセスを経て必要な修正を加え、最終版のマニュアルを確定させた。

C. 結果

作成された「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」は、以下の4つの主要項目で構成されている。

(1) 特殊健診において収集・共有すべきばく露関連情報

判定の精度を高めるために必要な情報を、収集のタイミングに応じて、「リスト A:一次健診の実施において一般的に収集される情報」「リスト B:二次健診等や別途調査など追加で収集される情報」の2つにに分類し、チェックリストを掲載した。

(2) 労働衛生機関における判定レベル(Ⅰ～Ⅲ)と医師の役割

特殊健診の全体プロセスは、事前に事業者と労働衛生機関との間で合意された役割分担を前提に実施されるが、役割分担によって労働衛生機関が行う有所見判定に用いるばく露との関連性に関する情報の範囲に違いが出てくる。その結果、労働衛生機関から出される有所見判定の意味が異なってくる。本マニュアルでは、労働衛生機関における判定レベルを3つに分け、ばく露との関連性の判断に用いる情報および有所見判定の意味を示した。

- 判定レベルⅠ:労働衛生機関の判定レベルは「一次健診で収集される情報の一部」、有所見判定の意味は「有害因子へのばく露との関連の可能性がある(否定できない)」
- 判定レベルⅡ:労働衛生機関の判定レベルは「一次健診で収集されるすべての情報」、有所見判定の意味は「有害因子へのばく露と関連性が疑われる」
- 判定レベルⅢ:労働衛生機関の判定レベルは「二次健診等や別途調査によって収集される情報を追加」、有所見判定の意味は「有害因子へのばく露との関連性が強く

疑われる（管理区分等の医師等の意見提示）」

また、医師の役割を「健康診断を実施する医師」と「意見を述べる医師」に分離して定義した。判定レベルがⅠまたはⅡの場合、労働衛生機関は前者の役割に留まるため、事業者は別途「意見を述べる医師（産業医等）」を確保し、事後措置を完結させる必要がある。

(3) 特殊健診全体のプロセス

本マニュアルでは、事業者と労働衛生機関の「事前の打ち合わせ」をプロセスの出発点として位置づけている。この段階で、双方が担う役割、提供すべき情報の範囲、および期待される判定レベルについて合意を形成する。 その後のフローとして、対象選定、一次・二次健診の実施を経て、得られた知見を総合的に評価し、最終的な管理区分を決定する。この一連のステップを通じて、特殊健診の結果を確実な事後措置へと繋げる仕組みとしている。

(4) 事業者と労働衛生機関の役割分担のプロセス

判定レベル（Ⅰ～Ⅲ）ごとに、特殊健診の全プロセスにおいて各主体が具体的に何をすべきかを明示した。

D. 考察

本研究における一連の調査により、特殊健診の判定において施設間で有所見率に大きな差が生じている実態や、事業者からの情報提供不足、判定基準の未整備、および役割分担の不明確さといった事後措置を阻害する構造的な課題が浮き彫りとなった。

これらの課題に対し、本マニュアルは、事業者と労働衛生機関が「契約・計画」の段階で合意を形成し、共通の尺度で判定を行うための実務的な枠組みを提供するものである。収集すべき情報をリスト A（一次健診時）およびリスト B（追加収集）として標準化したことは、情報の質と量の向上に直結する。さらに、労働衛生機関における判定レベルを、情報の充足度に応じて3段階（判定レベルⅠ～Ⅲ）に定義し、医師の役割を「実施する医師」と「意見を述べる医師」に分離して整理したことは、労働衛生機関とのスムーズな役割分担の一助となることが考えられる。

本マニュアルの活用において、労働衛生機関側は、まず自社の「標準作業書」を点検・改訂し、組織としての判定の質を平準化させることが求められる。具体的には「事業者との特殊健診の事前打合せに関する標準作業書」や「医師による特殊健診判定に関する標準作業書」などを新規作成または改訂することが想定される。特に、渉外担当者が事業者と専門的な打合せを対等に行えるよう、本マニュアルを基にし

た研修の実施や事業者向け説明資料の作成を推進すべきである。

一方、事業者側においても、特殊健診が自らの法的義務である事後措置に直結するプロセスであることを再認識し、本マニュアルを労働衛生機関との打合せに活用することが期待される。事業者が、自社がどの程度の情報を提供でき、どのレベルの判定を求めるのかを主体的に選択し、合意することは、健診結果が返却された後の迅速かつ適切な事後措置の完遂に繋がる。

今後の周知については、全国労働衛生団体連合会のホームページへの掲載や、各機関の医師・渉外担当者への研修を通じてマニュアルの普及を図る。さらに、同団体が実施する「労働衛生サービス機能評価」の指標に本マニュアルの内容を加えることを検討することで、全国的な判定レベルの向上を強力に後押しできると考えられる。

ただし、特殊健診においてばく露関連情報が十分に提供されていない背景には、委託元である事業者側の理解不足も大きく関与している。そのため、労働衛生機関に対する普及活動に留まらず、行政や各団体を通じて事業者側に対しても、正確な判定と有効な事後措置のために「ばく露情報の共有」が不可欠であることを広く周知・啓発していくことが、わが国の特殊健診制度をより実効性のあるものにするための不可欠な課題である。

E. 引用・参考文献

なし

F. 学会・論文発表

- 熊川優希、森晃爾、山本健也、立道昌幸。「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」。第 35 回日本産業衛生学会全国協議会、2025 年 11 月、徳島。
- 熊川優希、森晃爾、宇根理、山本健也、立道昌幸。「特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル」の作成。2026。産業衛生学雑誌。(投稿中)

事業者と労働衛生機関の連携で進める

特殊健康診断における適正な情報収集と判定に関するマニュアル

目 次

0.　はじめに

0-1　本マニュアルの趣旨

0-2　本マニュアルの活用場面・方法等

1.　特殊健康診断において収集または共有されるばく露に関連する情報

2.　労働衛生機関における判定レベルⅠ～Ⅲと医師の役割

3.　特殊健康診断全体のプロセス

4.　事業者と労働衛生機関の役割分担のプロセス

・　判定レベルⅠの場合

・　判定レベルⅡの場合

・　判定レベルⅢの場合

【補足資料】

① 用語集

② 特殊健康診断における事業者と労働衛生機関の役割分担　説明例

0. はじめに

0-1　本マニュアルの趣旨

法定の特殊健康診断（以下、特殊健診）の実施は事業者の義務ですが、あわせて、医師の意見を聴き、必要な措置（事後措置）を講じなければならないことが定められています。さらに、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針（事後措置指針）」では、医師の意見の具体的な内容として、(イ) 就業区分（通常勤務、就業制限、要休業）およびその内容に関する意見、(ロ) 作業環境管理(巻末用語集※1)および作業管理※2 に関する意見を示すことが求められています。

これらの意見を述べる際には、管理区分を付与することが一般的です。管理区分については、「昭和46 年度労働省労働衛生試験研究」の報告書に基づいて提案された「管理 A」「管理 B」「管理 C」「管理 R」「管理 T」という 5 つの区分が広く用いられており、現在も多くの事業者および労働衛生機関が参考としています。各管理区分には、標準的な事後措置の内容も提示されています。

管理区分	症状区分	事後措置
管理 A	異常なし	措置不要
管理 B	管理 C には該当しないが、当該因子によるか若しくはその疑いのある異常が認められる場合	医師が必要と認める検診または検査を医師が指定した期間ごとに行い、必要に応じて就業制限
管理 C	当該因子による疾病に罹患している場合	当該業務への就業禁止および療養を必要とする
管理 R	当該因子による疾病または異常を認めないが、当該業務の就業により増悪する可能性のある疾病に罹患している場合	当該業務への就業制限、療養その他の措置
管理 T	当該因子以外の原因による疾病に罹患している場合	当該疾病に対する療養その他の措置

特殊健診の健診項目には有害因子に対する特異性がなく、ばく露との関係がなくても基準値外となる項目も多いため、医師が管理区分を含めた適切な意見を述べるには、労働者の健康状態だけでなく、有害因子へのばく露状況に関する情報を把握し、「ばく露の推定」を行う必要があります。これを踏まえ、法令改正により、バイオロジカルモニタリング※3 や作業条件の簡易調査といった、ばく露に関する情報収集の手法が段階的に整備されてきました。

しかしながら、管理区分に至る手順や基準が明確に定められていないこと、特殊健診の多くが労働衛生機関に委託されているにもかかわらず、事業者からの十分な情報提供がなされていないこと、また労働衛生機関ごとに判定の考え方や手順が異なることなどから、機関ごとの特殊健診の有所見率には大きな差異が生じています。

特殊健診の実施が事業者から労働衛生機関へ委託されることを前提とするならば、その準備、実施、結果判定、事後措置といった一連のプロセスにおける両者の役割分担を明確にする必要があります。そして、労働衛生機関が期待される役割を果たすには、それに応じた情報が事業者から適切に提供されなければなりません。

本マニュアルでは、労働衛生機関への委託を前提とした特殊健診全体のプロセスを整理した上で、事業者による適切な事後措置につなげるための、事業者側と労働衛生機関側の役割分担とその実施方法について、詳細に提示しています。

0-2　本マニュアルの活用場面・方法等

本マニュアルは、特殊健診が事業者による適切な事後措置へ確実につながるよう、事業者側と労働衛生機関側の役割分担およびその実施方法を提示したものです。それぞれの活用場面・方法等についてご確認ください。

（１）労働衛生機関側

本マニュアルの第１の利用者として、特殊健診を受託する労働衛生機関を想定しています。法定の特殊健診については、実施項目は明確に定められているものの、判定基準や判定プロセスについては統一的な基準が存在しません。そのため、労働衛生機関ごとに実情に応じたさまざまな考え方や方法で判定や結果報告が行われているのが現状です。

本マニュアルは、各機関の方針変更を必ずしも求めるものではありません。しかし、事業者が有所見者について医師の意見を聴取し、適切な事後措置につなげるためには、特殊健診に関する基本的事項を理解したうえで、事前打合せの段階で労働衛生機関と事業者の役割分担を合意し、双方がその役割を確実に実行することが不可欠です。

このため、本マニュアルを活用し、労働衛生機関には以下のような対応を行うことを期待します。

① 特殊健診に関する標準作業書※の内容を点検し、必要に応じて改訂または新規作成する。
　※標準作業書の例：「事業者との特殊健診の事前打合せに関する標準作業書」、「医師による特殊健診判定に関する標準作業書」など
② すべての渉外担当者が標準作業書に基づいて事業者と打合せを行えるよう、研修の実施や事業者向け説明資料の作成を行う。
③ その他、特殊健診の実施および事後措置のプロセスを見直す。

もっとも、労働衛生機関が上記の対応を講じたとしても、事業者によっては十分な資源や認識を欠く場合もあり、すべての事業者に理解が得られるとは限りません。そのような制約を踏まえつつも、有効な特殊健診の実施のために、労働衛生サービスを専門的に担う機関として可能な限りの努力を行うことを期待します。

（２）事業者側

本マニュアルの第２の利用者は、事業者側の衛生管理者や産業医などの健康管理担当者です。特殊健診の実施および事後措置の義務は事業者にあります。その過程の一部を労働衛生機関に委託することを前提に、以下のような対応を行うことを期待します。

① 特殊健診の適切な実施における自らの役割を認識し、労働衛生機関の渉外担当者との打合せに活用する。
② 特殊健診の判定および事後措置の方法を見直す。
③ その他、特殊健診の実施および事後措置のプロセスを見直す。

特殊健診に関する事業者の義務範囲は共通であっても、事業場規模等の要因により、産業医の有無など保有する資源には大きな差があります。そのような実情に合わせて、労働衛生機関との連携を図るとともに地域産業保健センター等の外部資源を活用して、有効な実施を期待します。

１．特殊健診において収集または共有されるばく露に関連する情報

特殊健診の実施は、対象者に対して一律の内容を実施するいわゆる一次健診と、一次健診において有害因子へのばく露との可能性がある労働者に対して行う二次健診等があります。ここでは、「一次健診の実施において一般的に収集される情報（リストA）」と、「二次健診等や別途調査など追加で収集される情報（リスト B）」の二つに分類して、収集または共有されるべき情報のチェックリストを示します（二次健診等には、有機溶剤に対する医師が必要と認めた場合に行う項目も含む）。また、リストAには、一次健診実施前に収集される情報（A-1）と、一次健診実施中に主に労働者から直接収集する情報（A-2）に分類しています。

リスト A-1、リスト B の情報を収集する際には、労働者や事業場の担当者では把握が不十分と考えられる項目もあるため、必要に応じて化学物質管理者※4 等と連携をしながら収集する必要があります。

リストA　一次健診の実施において一般的に収集される情報

- ● リスト A-1　一次健診実施「前」に収集される情報
- □ 有害因子に関するより詳細な情報（安全データシート（SDS）など）
- □ 作業条件の簡易な調査
- □ 当該労働者が主に従事する単位作業場所※５ における作業環境測定結果（「作業環境測定結果報告書（最新＋過去４回分の結果記載欄あり）」の提出を求める等）
- □ 作業における当該有害物質の平均的な使用頻度および前回の健康診断以降の作業工程や取扱量などの変更
- □ 局所排気装置などの有無および稼動状況（定期点検の状況含む）
- □ 保護具の使用状況（保護具の種類等の詳細含む）
- □ 事故や修理などの際における大量ばく露
- □ 過去の健康診断の情報
- ● リスト A-2　一次健診実施「中」に収集される情報：問診・診察時の自他覚所見
- □ 自他覚所見が発生した状況や作業時間・時期との関係
  （作業中または作業に関連して起こっているか？一過性であるか持続性であるか？一定であるか、進行性であるか？など）

リストB　二次健診等や別途調査など追加で収集される情報

- □ 作業に関する詳細情報
  - ・ 取扱量や期間に関する情報
  - ・ 詳細な作業方法に関する情報
- □ 個人用保護具に関する詳細情報
  （職場の保護具着用ルール、カートリッジの管理状況、フィットテスト※6や日常のチェックの実施状況等）
- □ 作業環境に関する詳細情報
  - ・ 換気状態に関する情報（局所排気装置の稼働状況など）
- □ 自他覚所見のついての追加情報収集
- □ バイオロジカルモニタリング等の追加検査
- □ その他

2. 労働衛生機関における有所見判定のレベルⅠ～Ⅲと医師の役割

特殊健診の全体プロセスは、事前に事業者と労働衛生機関との間で合意された役割分担を前提に実施されますが、役割分担によって労働衛生機関が行う有所見判定に用いるばく露との関連性に関する情報の範囲に違いが出てきます。その結果、労働衛生機関から出される有所見判定の意味が異なってきます。ここでは、労働衛生機関における判定レベルを３つに分け、ばく露との関連性の判断に用いる情報および有所見判定の意味を示しました。（なお、ここで示す判定レベルは、事業者と事前に合意された役割分担および提供される情報の範囲に応じて決定されるものです。労働衛生機関ごとの能力や質、方針を示すものではありません。）

判定レベル	ばく露との関連性の判断に用いる情報	有所見判定の意味
Ⅰ	一次健診で収集される情報の一部 ※作業環境測定結果が反映されないなど	有害因子へのばく露との関連の可能性がある （否定できない）
Ⅱ	一次健診で収集されるすべての情報 （リスト A-1 および A-2）	有害因子へのばく露と関連性が疑われる
Ⅲ	二次健診等や別途調査によって収集される情報を追加（リストＢ）	有害因子へのばく露との関連性が強く疑われる （管理区分等の医師等の意見提示）


事業者は特殊健診を実施した際、有所見者に対して最終的に管理区分を決定して、医師等の意見を聴取し、事後措置を実施する必要があります。特殊健診に関わる医師には、「健康診断を実施する医師」と「意見を述べる医師」の役割があります。労働衛生機関における判定レベルがⅢの場合には両者の役割を労働衛生機関の医師が果たすことができます（二次健診等の結果をもとに、産業医が意見を述べることも可能）。しかし、労働衛生機関における判定レベルがⅠまたはⅡの場合には、事業者側で、別途、「意見を述べる医師」を確保して、意見聴取を行い、事後措置に結びつける必要があります（図１参照）。産業医が選任されている事業場においては、労働衛生機関の医師が「健康診断を実施する医師」となり、事業場の産業医が「意見を述べる医師」となることが基本です。

コラム：本分類のもとになった労働衛生機関医のインタビュー調査

本マニュアルを開発するに当たって実施した労働衛生機関に対するインタビュー調査の結果では、それぞれの機関において収集するばく露に関連する情報およびそのうち判定に用いる情報の範囲が異なっていることが明らかになりました。その範囲は有所見に対するばく露との関連性に基づく判定レベルに大きく影響していました。この結果に基づき労働衛生機関における判定レベルを３つに分類しました。

これらの違いは、各労働衛生機関の方針が大きく影響していますが、労働衛生機関における判定レベルによって事業者が管理区分の決定に至る残りのプロセスを実施することが不可欠であることから、本来は事業者と労働衛生機関の役割分担を事前の打合せで確認して、決定する必要があります。

図1. 労働衛生機関における有所見者の判定レベルI～Ⅲ




3. 特殊健診全体のプロセス

本マニュアルは、事業者の責務として実施する「健診の実施」から「医師等からの意見聴取」をもとにした「事後措置」まで特殊健診全体のプロセスの一部を、事業者が労働衛生機関に委託することを前提に作成されています。前章（労働衛生機関における判定レベルⅠ～Ⅲと医師の役割）で述べたとおり、労働衛生機関が提供する有所見判定のレベルは、労働衛生機関が収集する“ばく露との関連性の判断に用いる情報”の範囲を基本にしています。この情報の範囲は、事前に行われる事業者と労働衛生機関との役割分担に関する打合せによって決まります。

そのため、本マニュアルでは、両者の打ち合わせを特殊健診全体のプロセスの出発点として位置づけています。この打合せでは、労働衛生機関が担う役割、それに応じて事業者が提供すべき“ばく露との関連性の判断に用いる情報”の範囲、労働衛生機関から事業者に提供される有所見判定のレベルについて確認します。

そのうえで、事前に両者が合意した役割分担に基づき、対象者の決定と受診の手配を行い、一次健診の実施、有所見者に対する二次健診の要否の判定、必要に応じて二次健診の実施を行います。そして、これらの過程で得られた自他覚所見、検査結果、およびばく露に関連する情報を総合的に評価し、最終的に管理区分を決定します。この管理区分に基づき、事業者は医師の意見を聞き、適切な事後措置を講じることが求められます（図２参照）。

図2. 特殊健診全体のステップ



4．事業者と労働衛生機関の役割分担のプロセス

特殊健診の実施に当たって、最初に、事業者と労働衛生機関の間で、実施から管理区分の決定に至る過程での役割分担等に関する打合せを行います。その結果、労働衛生機関における判定レベルも決まります。

判定レベル	ばく露との関連性の判断に用いる情報	有所見判定の意味
Ⅰ	一次健診で収集される情報の一部 ※作業環境測定結果が反映されないなど	有害因子へのばく露との関連の可能性がある （否定できない）
Ⅱ	一次健診で収集されるすべての情報 （リスト A-1 および A-2）	有害因子へのばく露と関連性が疑われる
Ⅲ	二次健診等や別途調査によって収集される情報を追加（リストＢ）	有害因子へのばく露との関連性が強く疑われる （管理区分等の医師等の意見提示）


本章では、判定レベル別に、特殊健診の全体プロセスの中で特殊健診の適切な判定と事業措置のために行うべきことを、事業者と労働衛生機関の役割分担を明示しながら解説します。判定レベルに応じて、以下のページに記載をご覧ください。

- 判定レベルⅠの場合 ⇒ 10 ページへ
- 判定レベルⅡの場合 ⇒ 14 ページへ
- 判定レベルⅢの場合 ⇒ 18 ページへ

【判定レベルⅠの場合】

労働衛生機関における判定レベルⅠの場合の、特殊健診実施におけるステップごとの事業者と労働衛生機関の役割分担を図 3-Ⅰに示します。各ステップの詳細について、次ページから解説を行います。

図3-Ⅰ. 特殊健診実施におけるステップごとの事業者と労働衛生機関の役割分担（判定レベルⅠの場合）



※ピンク：特殊健診全体のステップ、緑：事業者･労働衛生機関側で連携して実施、黄色：事業者が実施、水色：労働衛生機関が実施
※有害因子へのばく露と関連性が疑われる対象者がいない場合には、二次健診を実施せず、事業者側で管理区分を判定

ステップ１

事業者と労働衛生機関の間で、両者の役割分担について合意する

事業者･労働衛生機関の役割：事業者と労働衛生機関の間で、特殊健診の内容、実施から管理区分決定に至る過程での役割分担について打合せを行い、合意する

契約段階において、事業者と労働衛生機関の双方は、特殊健診の判定におけるそれぞれの役割について合意されていなければなりません。ステップ１の打ち合わせの際には、事業者は、労働衛生機関に「ばく露の推定」のための情報（リスト A･B）をどの程度提供できるかを、労働衛生機関側に提示し、それに対して労働衛生機関は、事業者から提供される情報の範囲に応じた実施可能な判定レベルについて明示する必要があります。

判定レベルⅠの場合、労働衛生機関が行う有所見者に対するばく露との関連性の判定レベルが低くなるため、事業者が追加の情報収集を行い、医師による管理区分の最終的な決定および意見聴取を手配する必要があることを、事業者は強く認識しなければなりません。

P23 に『補足資料②特殊健診における事業者と労働衛生機関の役割分担　説明例』を掲載しています。労働衛生機関の渉外担当の方が、役割分担について、事業者に説明する際には、必要に応じてこちらをご参考ください。

ステップ２

健康診断の対象者の決定および計画立案を行う

事業者の役割：健康診断の受診対象者を決定する

特殊健診を必要とする有害因子を常時取り扱うまたはばく露する可能性のある労働者を明確にして、特殊健診の対象者を決定する必要があります。

労働衛生機関の役割：合意内容に基づき、健康診断の実施計画を立案する

ステップ１での合意内容（判定レベル）に応じた実施計画を立案する必要があります。

判定レベルⅠの場合の健診全体のプロセスを意識した実施計画を検討してください。

ステップ３

一次健診に必要な情報収集を行う

事業者の役割：一次健診に必要な情報を収集し、労働衛生機関に提供する

ステップ １ で合意された内容に基づき必要な情報を収集します。一次健診の実施前に収集すべき情報については、ページ４「特殊健診において収集または共有されるばく露に関連する情報」のリストＡ-1を参考にしてください。

特に判定レベルⅠの場合、A-1 のうち一部を収集することが考えられますので、合意内容を基に情報

収集を実施する必要があります。

情報収集の際には、必要に応じて化学物質管理者・保護具着用管理責任者・産業医等の意見を取り入れ、情報を補足してください。

労働衛生機関の役割：事業者から提供された情報に不足がないか、確認する

事業者から提供された情報がステップ 1 で合意された内容と比較して不足がないか、つまり判定レベルⅠの有所見者を判定する上で必要な情報として不足がないかを確認する必要があります。

ステップ 4

一次健診の実施と判定を行う

労働衛生機関の役割：一次健診を実施し、所見の有無（判定レベルⅠ）を判定する

一次健診実施の際には、労働衛生機関は、「ばく露の推定」のための情報の中で一次健診中に収集可能なもの（リスト A-2）について収集する必要があります。これらの情報を適切に収集するため、診察医や問診を行う看護師等は、「ばく露の推定」に必要な情報について十分な知識を持っている必要があります。

判定レベルⅠの場合、労働衛生機関が実施できる判定は「有害因子へのばく露との関連の可能性がある有所見者の判定」に留まります。この段階では、管理区分に関する医師等からの意見聴取をするには、情報が不足していますので、残りのプロセスについては事業者に委ねる必要があります。

事業者の役割：必要に応じて追加情報を収集して、二次健診の要否を含む一次健診の判定を行う

判定レベルⅠの場合、労働衛生機関が実施できる判定は「有害因子へのばく露との関連の可能性がある有所見者の判定」に留まります。事業者は、受領した一次健診の結果をもとに、必要に応じて追加情報を収集して、二次健診の要否を判定する必要があります。

追加情報の収集や二次健診の要否を判定する際には、事業場で選任した化学物質管理者・保護具着用管理責任者・産業医等と協議をしながら進めることが望ましいです。

ステップ 5

二次健診や別途調査を実施する

事業者の役割：二次健診や別途調査を実施する

事業者は、追加の情報収集（リスト B）を行い、二次健診や別途調査を実施します。二次健診や別途調査は、化学物質管理者・保護具着用管理責任者・産業医等と協議をしながら進めることが望ましいです。バイオロジカルモニタリング等、追加検査の実施が必要な際には、必要に応じて外部委託を検討する必要があります。

ステップ６

管理区分の決定と医師の意見聴取を行う

事業者の役割：産業医（もしくは事業者が確保した医師）から、管理区分を含む、意見の聴取を行う

労働衛生機関における判定レベルがⅠの場合には、事業者側で、「意見を述べる医師」を確保して、意見聴取を行い、事後措置に結びつける必要があります。産業医が選任されている事業場においては、事業場の産業医が「意見を述べる医師」となることが基本です。産業医が選任されていない場合には、「意見を述べる医師」を確保する必要があります。その際には、地域産業保健センター等の外部資源を活用することが考えられます。

管理区分については、「昭和 46 年度労働省労働衛生試験研究」の報告書に基づいて提案された「管理 A」「管理 B」「管理 C」「管理 R」「管理 T」という５つの区分が広く用いられています。意見を聴取する際の参考にしてください。

管理区分	症状区分	事後措置
管理 A	異常なし	措置不要
管理 B	管理 C には該当しないが、当該因子によるか若しくはその疑いのある異常が認められる場合	医師が必要と認める検診または検査を医師が指定した期間ごとに行い、必要に応じて就業制限
管理 C	当該因子による疾病に罹患している場合	当該業務への就業禁止および療養を必要とする
管理 R	当該因子による疾病または異常を認めないが、当該業務の就業により増悪する可能性のある疾病に罹患している場合	当該業務への就業制限、療養その他の措置
管理 T	当該因子以外の原因による疾病に罹患している場合	当該疾病に対する療養その他の措置

ステップ７

事後措置を実施する


事業者の役割：医師の意見を勘案して、事後措置を実施する

ステップ６の医師の意見をふまえて、事後措置を実施します。「昭和 46 年度労働省労働衛生試験研究」の報告書に基づいて提案された「管理 A」「管理 B」「管理 C」「管理 R」「管理 T」という５つの区分の中には、標準的な事後措置の内容も提示されていますのでその内容に基づいて検討する必要があります。

【判定レベルⅡの場合】

労働衛生機関における判定レベルⅡの場合の、特殊健診実施におけるステップごとの事業者と労働衛生機関の役割分担を図 3-Ⅱに示します。各ステップの詳細について、次ページから解説を行います。

図3-II. 特殊健診実施におけるステップごとの事業者と労働衛生機関の役割分担（判定レベルIIの場合）



※ピンク：特殊健診全体のステップ、緑：事業者・労働衛生機関側で連携して実施、黄色：事業者が実施、水色：労働衛生機関が実施
※有害因子へのばく露と関連性が疑われる対象者がいない場合には、二次健診を実施せず、事業者側で管理区分を判定

ステップ１

事業者と労働衛生機関の間で、両者の役割分担について合意する

事業者・労働衛生機関の役割：事業者と労働衛生機関の間で、特殊健診の内容、実施から管理区分決定に至る過程での役割分担について打合せを行い、合意する

契約段階において、事業者と労働衛生機関の双方は、特殊健診の判定におけるそれぞれの役割について合意されていなければなりません。ステップ１の打ち合わせの際には、事業者は、労働衛生機関に「ばく露の推定」のための情報（リスト A・B）をどの程度提供できるかを、労働衛生機関側に提示し、それに対して労働衛生機関は、事業者から提供される情報の範囲に応じた実施可能な判定レベルについて明示する必要があります。

判定レベルⅡの場合、労働衛生機関が行う有所見者に対するばく露との関連性の判定レベルが低くなるため、事業者が追加の二次健診・追加検査を行い、医師による管理区分の最終的な決定および意見聴取を手配する必要があることを、事業者は強く認識しなければなりません。

P23 に『補足資料②特殊健診における事業者と労働衛生機関の役割分担　説明例』を掲載しています。労働衛生機関の渉外担当の方が、役割分担について、事業者に説明する際には、必要に応じてこちらをご参考ください。

ステップ２

健康診断の対象者の決定および計画立案を行う

事業者の役割：健康診断の受診対象者を決定する

特殊健診を必要とする有害因子を常時取り扱うまたはばく露する可能性のある労働者を明確にして、特殊健診の対象者を決定する必要があります。

労働衛生機関の役割：合意内容に基づき、健康診断の実施計画を立案する

ステップ１での合意内容（判定レベル）に応じた実施計画を立案する必要があります。

判定レベルⅡの場合の健診全体のプロセスを意識した実施計画を検討してください。

ステップ３

一次健診に必要な情報収集を行う

事業者の役割：一次健診に必要な情報を収集し、労働衛生機関に提供する

ステップ １ で合意された内容に基づき必要な情報を収集します。一次健診の実施前に収集すべき情報については、ページ４「特殊健診において収集または共有されるばく露に関連する情報」のリストＡ-1を参考にしてください。

判定レベルⅡの場合、リスト A-1 の全ての情報を収集する前提ですので、網羅的に情報を収集する

必要があります。

情報収集の際には、必要に応じて化学物質管理者・保護具着用管理責任者・産業医等の意見を取り入れ、情報を補足してください。

労働衛生機関の役割：事業者から提供された情報に不足がないか、確認する

事業者から提供された情報がステップ 1 で合意された内容と比較して不足がないか、つまり判定レベルⅡの有所見者を判定する上で不足した情報がないかを確認する必要があります。

ステップ 4

一次健診の実施と判定を行う

労働衛生機関の役割：一次健診を実施し、所見の有無及び二次健診の要否（判定レベルⅡ）を判定する

一次健診実施の際には、労働衛生機関は、「ばく露の推定」のための情報の中で一次健診中に収集可能なもの（リスト A-2）について収集する必要があります。これらの情報を適切に収集するため、診察医や問診を行う看護師等は、「ばく露の推定」に必要な情報について十分な知識を持っている必要があります。

判定レベルⅡの場合、一次健診の結果をふまえた二次健診の要否を含めて、事業者に結果を提供する必要があります。

また、判定レベルⅡの場合、労働衛生機関が実施できる判定は「有害因子へのばく露との関連が疑われる有所見者の判定」に留まります。この段階では、管理区分に関する医師等からの意見聴取をするには、情報が不足していますので、残りのプロセスについては事業者に委ねる必要があります。

事業者の役割：一次健診の結果を受領する

判定レベルⅡの場合、労働衛生機関が実施できる判定は「有害因子へのばく露との関連が疑われる有所見者の判定」であり、二次健診の要否を含めた判定を受領します。

ステップ 5

二次健診や別途調査を実施する

事業者の役割：二次健診や別途調査を実施する

事業者は、追加の情報収集（リスト B）を行い、二次健診や別途調査を実施します。二次健診や別途調査は、化学物質管理者・保護具着用管理責任者・産業医等と協議をしながら進めることが望ましいです。バイオロジカルモニタリング等、追加検査の実施が必要な際には、必要に応じて外部委託を検討する必要があります。

ステップ６

管理区分の決定と医師の意見聴取を行う

事業者の役割：産業医（もしくは事業者が確保した医師）から、管理区分を含む、意見の聴取を行う

労働衛生機関における判定レベルがⅡの場合には、事業者側で、「意見を述べる医師」を確保して、意見聴取を行い、事後措置に結びつける必要があります。産業医が選任されている事業場においては、事業場の産業医が「意見を述べる医師」となることが基本です。産業医が選任されていない場合には、「意見を述べる医師」を確保する必要があります。その際には、地域産業保健センター等の外部資源を活用することが考えられます。

管理区分については、「昭和 46 年度労働省労働衛生試験研究」の報告書に基づいて提案された「管理 A」「管理 B」「管理 C」「管理 R」「管理 T」という 5 つの区分が広く用いられています。意見を聴取する際の参考にしてください。

管理区分	症状区分	事後措置
管理 A	異常なし	措置不要
管理 B	管理 C には該当しないが、当該因子によるか若しくはその疑いのある異常が認められる場合	医師が必要と認める検診または検査を医師が指定した期間ごとに行い、必要に応じて就業制限
管理 C	当該因子による疾病に罹患している場合	当該業務への就業禁止および療養を必要とする
管理 R	当該因子による疾病または異常を認めないが、当該業務の就業により増悪する可能性のある疾病に罹患している場合	当該業務への就業制限、療養その他の措置
管理 T	当該因子以外の原因による疾病に罹患している場合	当該疾病に対する療養その他の措置

ステップ７

事後措置を実施する


事業者の役割：医師の意見を勘案して、事後措置を実施する

ステップ６の医師の意見をふまえて、事後措置を実施します。「昭和 46 年度労働省労働衛生試験研究」の報告書に基づいて提案された「管理 A」「管理 B」「管理 C」「管理 R」「管理 T」という 5 つの区分の中には、標準的な事後措置の内容も提示されていますのでその内容に基づいて検討する必要があります。

【判定レベルⅢの場合】

労働衛生機関における判定レベルⅢの場合の、特殊健診実施におけるステップごとの事業者と労働衛生機関の役割分担を図 3-Ⅲに示します。各ステップの詳細について、次ページから解説を行います。

図3-III. 特殊健診実施におけるステップごとの事業者と労働衛生機関の役割分担（判定レベルIIIの場合）



※ピンク：特殊健診全体のステップ、緑：事業者・労働衛生機関側で連携して実施、黄色：事業者が実施、水色：労働衛生機関が実施
※有害因子へのばく露と関連性が疑われる対象者がいない場合には、二次健診を実施せず、事業者側で管理区分を判定

ステップ１

事業者と労働衛生機関の間で、両者の役割分担について合意する

事業者・労働衛生機関の役割：事業者と労働衛生機関の間で、特殊健診の内容、実施から管理区分決定に至る過程での役割分担について打合せを行い、合意する

契約段階において、事業者と労働衛生機関の双方は、特殊健診の判定におけるそれぞれの役割について合意されていなければなりません。ステップ１の打ち合わせの際には、事業者は、労働衛生機関に「ばく露の推定」のための情報（リスト A・B）をどの程度提供できるかを、労働衛生機関側に提示し、それに対して労働衛生機関は、事業者から提供される情報の範囲に応じた実施可能な判定レベルについて明示する必要があります。

判定レベルⅢの場合、「健康診断を実施する医師」と「意見を述べる医師」の役割を労働衛生機関の医師が果たすことができます。しかし前提として、労働衛生機関が、判定に必要な情報を不足なく収集できることが挙げられますので、このことを両者が認識をしておく必要があります。

P23 に『補足資料②特殊健診における事業者と労働衛生機関の役割分担　説明例』を掲載しています。労働衛生機関の渉外担当の方が、役割分担について、事業者に説明する際には、必要に応じてこちらをご参考ください。

ステップ２

健康診断の対象者の決定および計画立案を行う

事業者の役割：健康診断の受診対象者を決定する

特殊健診を必要とする有害因子を常時取り扱うまたはばく露する可能性のある労働者を明確にして、特殊健診の対象者を決定する必要があります。

労働衛生機関の役割：合意内容に基づき、健康診断の実施計画を立案する

ステップ１での合意内容（判定レベル）に応じた実施計画を立案する必要があります。

判定レベルⅢの場合の健診全体のプロセスを意識した実施計画を検討してください。

ステップ３

一次健診に必要な情報収集を行う

事業者の役割：一次健診に必要な情報を収集し、労働衛生機関に提供する

ステップ １ で合意された内容に基づき必要な情報を収集します。一次健診の実施前に収集すべき情報については、ページ４「特殊健診において収集または共有されるばく露に関連する情報」のリストＡ-1を参考にしてください。

判定レベルⅢの場合、A-1 の全ての情報を収集する前提ですので、網羅的に情報を収集する必要が

あります。

情報収集の際には、必要に応じて化学物質管理者・保護具着用管理責任者・産業医等の意見を取り入れ、情報を補足してください。

労働衛生機関の役割：事業者から提供された情報に不足がないか、確認する

事業者から提供された情報がステップ 1 で合意された内容と比較して不足がないか、つまり判定レベルⅢの有所見者を判定する上で不足した情報がないかを確認する必要があります。

ステップ 4

一次健診の実施と判定を行う

労働衛生機関の役割：一次健診を実施し、所見の有無及び二次健診の要否（判定レベルⅡ）を判定する

一次健診実施の際には、労働衛生機関は、「ばく露の推定」のための情報の中で一次健診中に収集可能なもの（リスト A-2）について収集する必要があります。これらの情報を適切に収集するため、診察医や問診を行う看護師等は、「ばく露の推定」に必要な情報について十分な知識を持っている必要があります。

判定レベルⅢの場合、一次健診の結果をふまえた二次健診の要否を含めて、事業者に結果を提供する必要があります。

事業者の役割：一次健診の結果を受領する

判定レベルⅢの場合、労働衛生機関が実施できる判定は「有害因子へのばく露との関連が疑われる有所見者の判定」であり、二次健診の要否を含めた判定を受領します。

ステップ 5

二次健診や別途調査を実施する

事業者の役割：二次健診に必要な情報を収集し、提供する

労働衛生機関に二次健診を委託するにあたって、事業者は、追加の情報収集（リスト B）を行います。情報収集にあたっては、化学物質管理者・保護具着用管理責任者・産業医等と協議をしながら進めることが望ましいです。

労働衛生機関の役割：二次健診や別途調査を実施する

事業者からの提供された情報をふまえて、二次健診や別途調査を実施します。健診実施の中で、追加の情報収集が必要な際には、該当労働者への問診・診察に加えて、化学物質管理者・保護具着用管理責任者・産業医等にも直接情報収集の依頼をすることも考えられます。

ステップ６

管理区分の決定と医師の意見聴取を行う

労働衛生機関の役割：管理区分を決定し、事業者に医師の意見（判定レベルⅢ）を提示する

管理区分については、「昭和 46 年度労働省労働衛生試験研究」の報告書に基づいて提案された「管理 A」「管理 B」「管理 C」「管理 R」「管理 T」という５つの区分が広く用いられています。意見を聴取する際の参考にしてください。

管理区分	症状区分	事後措置
管理 A	異常なし	措置不要
管理 B	管理 C には該当しないが、当該因子によるか若しくはその疑いのある異常が認められる場合	医師が必要と認める検診または検査を医師が指定した期間ごとに行い、必要に応じて就業制限
管理 C	当該因子による疾病に罹患している場合	当該業務への就業禁止および療養を必要とする
管理 R	当該因子による疾病または異常を認めないが、当該業務の就業により増悪する可能性のある疾病に罹患している場合	当該業務への就業制限、療養その他の措置
管理 T	当該因子以外の原因による疾病に罹患している場合	当該疾病に対する療養その他の措置

事業者の役割：労働衛生機関の医師から、管理区分を含む、意見の聴取を行う

「意見を述べる医師」を労働衛生機関の医師に委託する場合においても、医師への意見聴取は、特殊健診における事業者の義務のうちの１つであることには変わりありません。ステップ７の事後措置を見越して、必要な意見を聴取しましょう。

ステップ７

事後措置を実施する

事業者の役割：医師の意見を勘案して、事後措置を実施する

ステップ６の医師の意見をふまえて、事後措置を実施します。「昭和 46 年度労働省労働衛生試験研究」の報告書に基づいて提案された「管理 A」「管理 B」「管理 C」「管理 R」「管理 T」という５つの区分の中には、標準的な事後措置の内容も提示されていますのでその内容に基づいて検討する必要があります。

【補足資料①】 用語集

※１　作業環境管理：作業環境中の有害因子を適切な状態に保つための管理。物理的・化学的要因の濃度測定、換気装置の設置・点検などが含まれる。

※２　作業管理：労働者の作業方法や作業行動を改善し、有害因子へのばく露を低減するための管理。保護具の着用、作業時間の短縮、作業手順の見直しなどが含まれる。

※３　バイオロジカルモニタリング：労働者の体内の有害物質の濃度やその代謝物の濃度を測定することで、ばく露量を評価する方法。

※４　化学物質管理者：2024 年 4 月より、リスクアセスメント対象物を製造・取り扱い・譲渡・提供する全ての事業場において選任が義務化されている、化学物質の管理に関する技術的事項を管理する責任者。

※５　単位作業場所：当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域のこと。作業環境測定基準第 2 条に記載されている。

※６　フィットテスト：フィットテストとは、防じんマスクや防毒マスクなどの呼吸用保護具が着用者の顔に適切に密着し、十分な保護性能を発揮できているかを確認する検査。

【補足資料②】 特殊健診における事業者と労働衛生機関の役割分担　説明例

労働衛生機関の渉外担当の方が、役割分担について、事業者に説明する際の説明例です。
（１）事業場に産業医がいる場合（２）事業場に産業医がいない場合　で使い分けてください。

（１）事業場に産業医がいる場合

特殊健診は事業者の責任で実施いただくものですが、当機関に委託いただいて実施させていただきます。
健康診断で何らかの所見があった場合、「二次健診の要否を含む一次健診の判定」および「二次健診の実施」、そして最終的には法令で求められる「医師からの、管理区分を含む意見聴取」が必要になります。
そのような特殊健診の判定は、健康診断の所見のみでなく、当該有害要因に対する曝露状況を推定するための情報が必要となりますので、作業環境測定結果などのご提供をお願いします。
もし、曝露関連情報の提供が難しい場合には、当機関でできるのは、健康診断で認められた所見の内容の提供のみとなります。その場合は、事業場の産業医の先生に、**管理区分を含む、意見の聴取**を行っていただく必要があります。そのご対応は可能でしょうか。
もし対応が難しく、意見聴取まで当機関にお任せいただく場合には、このような情報を事前にご提供いただくことが必要になります。 ⇒P5 のリスト A・B、P7 の図１を見せる

（２）事業場に産業医がいない場合

特殊健診は事業者の責任で実施いただくものですが、当機関に委託いただいて実施させていただきます。
健康診断で何らかの所見があった場合、「二次健診の要否を含む一次健診の判定」および「二次健診の実施」、そして最終的には法令で求められる「医師からの、管理区分を含む意見聴取」のためには必要になります。
そのような特殊健診の判定は、健康診断の所見のみでなく、当該有害要因に対する曝露状況を推定するための情報が必要となりますので、作業環境測定結果などのご提供をお願いします。
もし、曝露関連情報の提供が難しい場合には、当機関でできるのは、健康診断で認められた所見の内容の提供のみとなります。その場合は、事業場で地域産業保健センター等を通じて、別途医師を確保して、**管理区分を含む、意見の聴取**を行っていただく必要があります。そのご対応は可能でしょうか。
もし対応が難しく、意見聴取まで当機関にお任せいただく場合には、このような情報を事前にご提供いただくことが必要になります。 ⇒P5 のリスト A・B、P7 の図１を見せる

労災疾病臨床研究事業

（令和５年度～令和７年度）

分担研究報告書

化学物質の健康影響モニタリングにおける標的健康影響およびその検査項目

研究分担者

山本健也

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全総合研究所

化学物質情報管理研究センター化学物質情報管理部 部長

労災疾病臨床研究事業費補助金研究　分担研究報告書（総合研究報告書）
有害業務に係る特殊健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究

６．化学物質の健康影響モニタリングにおける標的健康影響およびその検査項目

研究分担者：山本健也　独立行政法人労働者健康安全機構労働安全総合研究所
化学物質情報管理研究センター化学物質情報管理部 部長

研究要旨

労働安全衛生法令の特別規則での個別規制化学物質における健康影響モニタリング（特殊健診）において、各規制物質の標的臓器・標的健康影響が明確に示されていないことに鑑み、特殊健診の判定およびその事後措置の精度向上を目的に、国内外の情報を基に各規制物質の標的臓器・標的健康影響を整理・統合し、個別規制物質の標的健康影響とその健康影響モニタリングを一元的に整理することで、特別規則の健康診断結果の鑑別精度の向上を目的とした。また、統合した結果について、標的健康影響および健康影響モニタリング項目を比較検討した比較検討し、現行の国内法令で課題等を整理した。

その結果、現行の特別規則で個別規制されている 126 物質についてのデータシートを作成した。そのうち、現行法令との比較が可能な 26 物質について比較した結果、20 物質において海外情報や GHS 政府分類区分との差異が認められた。そのうち、特別有機溶剤等令和 2 年に健診項目が改定された物質については発がん性等について先行した検査項目等が設定されている一方、1,3-ブタジエン、カドミウム等においては海外情報においては採用されている有害性が反映されていないなど、知見の更新が必要な物質があることが明らかになった。また、平成元年に法令に導入された生物学的ばく露モニタリング項目については、その区分についての見直しが必要と考えられた。

また、有害業務の健康サーベイランスの対象者選定やその実施方法に係るスキームについて国内外の状況を整理した。本邦の特殊健診では作業列挙方式によるハザードベースでの対象者選定であることに対して、2010 年以降に公表されている国外のスキームでは、リスクアセスメントの結果に基づき健康診断の実施の有無がまず検討され、その後のばく露低減対策の実施の有無や、臨床検査等の実施に際しては作業歴やばく露状況および自覚症状等の聴取に基づき、ヒトへの侵襲のある検査の要否の判断がされていた。本邦においては令和 6 年 4 月に導入された「リスクアセスメント対象物健康診断」で同様のスキームが導入されているが、特殊健診においても今後同様に、ハザード情報に「ばく露の程度」を加味した対象者の選定が望ましいと考えられた。なおその際、特殊健診受診対象者の減少と引き換えに事業者が「ばく露の程度」を適切に把握し、その情報を特殊健診実施機関等と共有することで、費用の再配分を適切に実施することが望ましいと考えられた。

本研究の成果物であるデータシートの利活用により、産業医、労働衛生機関において化学物質の健康影響モニタリング結果の適切な解釈およびそれに基づくばく露防止対策、および新たな制度におけるリスクアセスメント対象物健康診断での医師の判断による健康診断項目の検討において、そのプロセス支援に資するものと考えられる。 また、既存の特別規則健康診断項目については新たな科学的知見に基づく再評価が必要な項目があり、健康影響モニタリング項目のみではなく、生物学的ばく露モニタリング項目においても、今後の有害性の新着情報の収集及びそれに基づく検査項目等の検討について、定期的な見直しをする機会が必要と考えられた。

A. 目的

労働安全衛生法第 66 条第 2 項に基づく有機溶剤中毒予防規則（以下「有機則」という。）第29条、特定化学物質障害予防規則（以下「特化則」という。）第 39 条、鉛中毒予防規則（以下「鉛則」という）第 53 条、四アルキル鉛中毒予防規則（以下「四アルキル則という」。）第 22 条および石綿障害予防規則（以下「石綿則」という。）第 40 条で規定されている健康診断（以下「特殊健診」という。）では、有機則においては有機溶剤に共通の有害性に基づく健康診断項目が、特化則、鉛則、四アルキル鉛則、石綿則および有機則の一部の物質については個別規制物質ごとの有害性に基づく健康診断項目が、その物質と対比した別表として提示され、スクリーニング項目として運用されている。

しかしながら、これらの対比表には「物質名」と「健康診断項目」のみ記載されており、両者の間にある「有害性（または標的健康影響）」についての記載がない。当該特別規則の改正時等における施行通達や、労働基準法施行規則別表第一の二（以下「職業病リスト 4 号1」という。）第 7 項および同第 4 項の大臣告示（労働基準法施行規則別表第一の二第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物（合金を含む）並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示）等で一部記載が見られるものの、当該物質による標的健康影響を把握することは容易とはいえない。

サーベイランスという観点では、現状の情報構造であっても「一次健康診断」の基準範囲外の結果に対して次のアクション（二次健康診断または確定診断のための精査、事後措置等）に繋げることで健康診断としての意義はあると考えられる一方、二次健康診断・精査等に必要な検査項目やばく露の程度等による因果関係の推定においては、当該物質の「標的健康影響」が何であるかは重要な情報であり、換言すれば、標的健康影響が明確に解釈されていない状態では有所見に対する鑑別が適切に実施できない可能性が考えられる。

また、特殊健診の検査項目は、昭和 40 年代の法令施行以後、平成 14-16 年にかけてその見直しに係る文献調査および提言がされ、この提言および平成 20 年代後半の職業性がんの集積発生事案を受け、一部の化学物質（特別有機溶剤、カドミウム等）についてはそれまでの検討結果等を基に令和 2 年度に健康診断項目の改正作業が行われたが、多くの物質は平成 16 年度の検討以降、その情報のアップデートがされていない。

本分担研究では、特殊健診の対象物質の個別規制物質ごとの標的健康影響の記述を整理し、また国際機関等で発行されている文書における特別規則対象物質の標的健康影響を整理し、それらを統合することで、健康診断実施後の各プロセスにおける医師等の判断の適正化を図ることを目的

とする。併せて、前述の整理・統合された国内外情報を比較し、現行の標的健康影響および健康影響モニタリング項目の現在の課題と今後の在り方についての提案を行う事をその目的とする。

また、特殊健診の実施手順について諸外国との比較を行い、現在作業列挙方式により選定されている特殊健診対象者について、現在の課題と今後の在り方についての提案を行う事をその目的とする。

B. 方法

1）化学物質の標的健康影響及び健康影響モニタリング項目にかかる情報の一元化

令和 6 年度までに、各特別規則別表内に健康診断項目として記載されている標的臓器、標的健康影響およびその自他覚症状と、「職業病リスト 4 号1」に記載されている疾患名等を収集・集約した。併せて、当該物質の GHS 政府分類結果およびその分類根拠情報を収集し、標的臓器の類型化を整理した。また、過去 10 年の間に発出された国外の健康サーベイランス／スクリーニングにかかるガイドライン等を検索した結果、ILO が 2020 年に公表した” Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases, Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases（revised 2010 注；公表は 2020）”、Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)が 2024 年に公表した職業健康診断に関するガイドライン（ Empfehlungen für arbeitsmedizin-ische Beratungen und Untersuch-ungen）および US-OSHA が 2014 年以公表した Medical Screening and Surveillance Requirements in OSHA Standards: A Guide(2014)がヒットしたため、その記載内容のうち本邦の特別規則規制対象物質について、その標的健康影響および検査項目等について収集した。これらの収集結果について、令和 7 年度までに収集した諸外国の化学物質と標的健康影響と健康影響モニタリング項目にかかる主要なリストを統合し、個別化学物質の標的健康影響およびその健康影響モニタリング項目の一元的表記を作成した。

2）特別規則対象物質の諸外国におけるヘルスサーベイランスにかかる標的健康影響及びその健康影響モニタリング項目の比較

上記1）で作成したデータベースを基に、諸外国における当該化学物質の標的健康影響及びその健康影響モニタリング項目を比較し、その類型を検討した。

3）生物学的ばく露モニタリング項目にかかる検討

情報収集の過程において、平成元年に有機則および鉛則で規定される健康診断（以下「有機溶剤健診」および「鉛健診」という。）に、生物学的ばく露

モニタリング指標として有機溶剤の尿中代謝物および血中鉛濃度の量の検査が追加された際に、その判断の目安として「区分1～3」までのカットオフ値の変更がされていないことから、制定後の当該物質の新たな有害性情報等を基に、区分の変更等の必要性について検討を行った。

4）有害業務の健康サーベイランス方法に係る整理

有害業務におけるヘルスサーベイランス方法おけるスキームを有している国外機関の情報を収集し、検査対象者の選定方法にかかる本邦との比較を行った。

C. 結果

1）化学物質の標的健康影響及び健康影響モニタリング項目にかかる情報の一元化

特別規則等の対象である計 126 物質について、個々の物質における疾病名称を集約した。なお、標的健康影響に係る記述が得られない物質については、問診項目として採用されている自他覚症状または GHS 政府分類結果の情報と基に標的臓器を設定し、計 23 類型（神経系3、呼吸器系3、肝障害系3、腎障害系2、消化器系1、血液系1、泌尿器系3、眼刺激性1、皮膚障害系2、発がん性1、生殖毒性1、感作性2）の標的臓器が設定され、これらの情報によるデータベースを構築した。

また、ILO、DGUV、 OSHA にリストされた物質のうち特別規則での個別規制がされている物質（ILO の List of Occupational Diseases から 11 物質、DGUV のガイドラインからは 23 物質、OSHA ガイドからは9物質）について、その標的健康影響または健康診断項目（自他覚症状を除く）について整理を行った（表 1-3）。なお ILO リストには当該疾患の ICD-10 コードにかかる記載があることから、そのコードごとに当該疾患の発症経過（急性／慢性）の類型化を行った。

■ILO リスト 11 物質

（Manganage, mercury, lead, carbon disulfide, halogen derivatives of alph-atic or aromatic hydrocarbons, acryl-onitrile, antimony or its compounds, hexane, chlorine, organic solvents, vanadium or its compounds）

■DGUV ガイドライン：23 物質

（ヒ素およびヒ素化合物、アスベスト、ベンゼン、四エチル鉛及び四メチル鉛、鉛及びその無機化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ジメチルホルムアミド、グリセロール・トリニトラート（ニトログリセリン）およびグリコール・ジニトラート（ニトログリコール）、二硫化炭素、メタノール、ニッケルおよびニッケル化合物、多環芳香族炭化水素（有機物の熱分解生成物）、水銀および無機水銀化合物、金属の溶接および切断、珪肺性粉塵、スチレン、トルエンおよびキ

シレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、塩化ビニル

■OSHA ガイド：9物質

アクリロニトリル、無機ヒ素、石綿（一般産業／建設・造船業）、ベンゼン、1,3-ブタジエン、カドミウム、クロム（6 価）、鉛、ジクロロメタン

なお、統合データの解釈に際しては以下について留意をする必要がある。

※vanadium and inorganic compounds は安衛法令の「五酸化バナジウム」と統合した。

※chromium(VI)は安衛法令の「重クロム酸及びその化合物」として統合した。

※hexane は複数の異性体を含むと考えられるが、今回の比較では安衛法令の「ノルマルヘキサン」と統合した。

※xylene and all isomer は複数の異性体を含むと考えられるが、今回の比較では安衛法令の「キシレン」と統合した。

※arsenic compound について、安衛法令には含まれない「アルシン、砒化ガリウム」が国外情報では含まれている。

※Dimethylformamide は今回の比較では安衛法令の N,N-ジメチルホルムアミドと統合した。

また、CDC-NIOSH が 2000 年に公表した SPECIFIC MEDICAL TESTS OR EXAMINATIONS PUBLISHED IN THE LITERATURE FOR OSHA-REGULATED SUBSTANCES について、リストには標的健康影響の記述はないが、健康影響モニタリングのリストが多数の物質について公表されていることから、併せて参考情報として追加した。これらの結果より、国内および国外の標的健康影響（急性及び慢性）及び健康診断項目（初期の検査、追加検査）を一元的に表記した。全 126 物質のうち、以下の2）で比較をした 20 物質（表 4）について、そのデータシートを表 5 に例示する。

2）特別規則対象物質の諸外国におけるヘルスサーベイランスにかかる標的健康影響及びその検査項目の比較

標的健康影響にかかる記述がある前述の 3 つの情報源において、特別規則対象物質全 126 物質と対比可能な物質は計 26 物質（有機溶剤の共通毒性は除く）であり、そのうち特別規則の標的健康影響とは異なる疾患等の記述があるのは 20 物質であった、その結果を表1に示す。標的健康影響の比較のうちジクロロメタン、スチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなど本邦の特化則において発がん性等の可能性を踏まえた標的健康影響が国外の情報源ではその欠落がみられた。その一方で、カドミウムにおける循環器系への影響、二硫化炭素による二次的な循環器および主要臓器への影響は法令において現時点では記述がなく、また 1,3-ブタジエンやジメチルホルムアミドでは本邦の法令において発がん性による標的健康影響およびその健康影響モニタリングは考慮されていなかった。

3）生物学的モニタリング項目にかかる検

討

平成元年の法令改正に伴い特殊健診項目として生物学的ばく露モニタリングが設定された有機溶剤8物質および鉛について、平成元年以降の ACGIH-TLV または日本産業衛生学会許容濃度（以下、「職業性ばく露限界値」という。）および ACGIH-BEIs または日本産業衛生学会生物学的許容値（以下、「生物学的許容値」という。）の変化の推移を表3に示す。n-ヘキサンを除きすべての物質でその後に職業性ばく露限界値の更新があり、それらすべてにおいて値は引き下げられていた。また、生物学的許容値もすべての物質でその値の引き下げが認められた。また、平成元年に設定された生物学的モニタリング項目のうち、スチレンについては令和2年の法令改正において「尿中のマンデル酸」から「尿中のマンデル酸およびフェニルグリオキシ酸の総和」へと項目変更がされたが具体的な分布の提示はなく、またトルエンの尿中馬尿酸はそれが設定されていた ACGIH-BEI において 2010 年に取り下げられていた。また、共通の生物学的ばく露モニタリングが設定されているトリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンおよびテトラクロロエチレンのうち、生物学的許容値として唯一「尿中の総三塩化物」が提案されていた日本産業衛生学会のトリクロロエチレンについて、2022 年に生物学的許容値から尿中の総三塩化物が取り下げられていた。

なお、有機溶剤8物質のうち 3 物質では、現行の生物学的許容値では使われてない項目での検査がされていた。

4）有害業務の健康サーベイランス方法に係る整理

Empfehlungen für arbeitsmedizini-sche Beratungen und Untersuchun-gen, 2024 に記載されている「労働衛生予防措置のフローチャート”Abl-auf der arbeitsmedizinischen Vor-sorge”」（DGUV）、および UK-Health and Safety Exective（UK-HSE）が公表をしている” Health Surveillance process”が収集された。両フローチャートにおいて、スクリーニング検査を実施する前にリスクアセスメントが適切に実施されているか否かを問うプロセスがあり、また受診者に侵襲を与える可能性がある検査項目を実施する場合には、リスクアセスメント結果の評価と併せてその必要性を評価するステップが含まれていた（図 1-3）。

また、DGUV では、臨床検査の前に以下のような内容での「初期相談」が設定されていた。

＜DGUV における初期相談内容（トルエン／キシレンの場合）＞

■一般既往歴

■胎内での子どもの障害に関する情報（母体保護法に準拠）

■職業既往歴

・ばく露量

・皮膚ばく露

・空気中濃度限界値の超過

■症状

■追加

作業歴の聴取（作業特異的な症状に関する質問を含む）:

・頭痛、めまい

・食欲不振、吐き気

・体重減少

・軽度の疲労感

D. 考察

1）化学物質の標的健康影響及び健康影響モニタリング項目にかかる情報の一元化

上記3つの情報源およびOSHAが2000年に公表している健康影響モニタリング項目を令和 6 年度に構築した国内法令に基づくデータセットに追加した結果、国内および国外の標的健康影響（急性及び慢性）及び健康診断項目（初期の検査、追加検査）を一元的に視認・把握することが可能となった。この結果、特別規則健康診断において健康診断結果を評価する際の医師による診断および鑑別がより容易になるほか、リスクアセスメント対象物健康診断における「医師が必要と判断する検査」を検討する際のヒントとして利活用することが期待される。

その一方で、得られた国内外情報ではばく露濃度やその程度にかかる情報は得られていないことから、遅発性疾病の予防に資する早期健康影響を評価することが容易ではない。特に、本邦のリスクアセスメント対象物健康診断にかかるガイドラインや DGUV などでは、生理学的検査や生体試料測定に先立ち自他覚症状の問診をすることが推奨されているが、例えば、令和 2 年度の化学物質の健診項目に関する専門委員会において審議されたオルト-フェニレンジアミンに関する記述のように、最終的に予防すべき疾病の最小毒性量が自他覚症状の閾値より低い濃度で臓器影響等をもたらす化学物質もあり、自他覚症状の問診のみに早期健康影響を委ねることの可否は物質ごとの検討が必要である。むしろ、皮膚・眼刺激性や急性毒性の有害性が低い物質ほど、そのばく露に気づかずに慢性影響の最小毒性量を超えたばく露がされる可能性もあることから、今回整理された知見について、今後は一次文献等の検索を基に、そのばく露の程度を考慮した早期健康影響指標の設定に係る情報の整理が必要であろうと考えられる。

2）特別規則対象物質の諸外国におけるヘルスサーベイランスにかかる標的健康影響及びその健康影響モニタリング項目の比較

標的健康影響の比較のうちジクロロメタン、スチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどについて、本邦の特化則において発がん性等の可能性を踏まえた標的健康影響に基づく検査項目を導入されていたが、国外資料では必ずしもそ

の記述がみられなかった。これらの物質は、特別有機溶剤として有機則から特化則に移管をされたのちの令和2年の特化則改正によるものであり、本邦での検討が先行していることがその要因であると思われた。

その一方で、カドミウムにおける循環器系への影響、二硫化炭素による二次的な循環器および主要臓器への影響について、本邦の法令ではその記述がなかった。カドミウムについては平成16年度に実施された特殊健診項目の見直し以降の知見と考えられ、また二硫化炭素については、同物質による血管内壁の動脈硬化性変化を標的健康影響とした健康診断は実施されているが、その二次的変化としての遅発性の疾病に対する認識が海外では採用されていることは興味深い結果である。

また、1,3-ブタジエンやジメチルホルムアミドではGHS政府分類で発がん性区分1B以上とされているが、本邦の法令において発がん性による標的健康影響およびその健康影響モニタリングは考慮されていなかった。これは、両物質のGHSの発がん性区分はそれぞれ2017年および2024年の分類結果であり、新たな情報のアップデートが反映されないためと考えられた。今後、個別規制物質の有害性にかかる新着情報の収集及びそれに基づく標的健康影響および健康影響モニタリング項目のアップデート作業を定期的に実施する必要があると考えられる。

なお、鉛、1,3-ブタジエン、メタノール、トルエンなど、GHS政府分類において生殖毒性区分が1B以上物質について、現時点では特別規則およびリスクアセスメント対象物健康診断ガイドラインでは生殖毒性にかかる検査項目は設定されていない。その背景としては、後者のガイドラインにも記載がある通り、当該有害性の検査方法が汎用的ではないことなどが挙げられているが、その一方でOSHA2014では鉛において"if requested by employee, pregnancy testing of fertility testing "と記載されている。こうしたことから、今後生殖毒性の予防において、特に生殖毒性による最小毒性量が他の有害性よりも低い等の場合においては、当該健康影響モニタリングの実施等についても検討をする必要があると考えられた。

なお、労基則35条に基づく疾病名は、その多くが「気道・肺障害」などの臓器名で記載されている。GHSの有害性区分についても同様であるが、例えば「気道・肺障害」には急性の気道粘膜刺激性のほか、末梢肺組織の線維化、気管支喘息等があり、それらの検査項目は異なることから、疾患の鑑別及び健康影響モニタリングの判定精度の確保に際しては、標的健康影響の疾病名が明らかな場合はそれを明記して区別をすることが必要と考えられた。

なお、標的健康影響が明記されている上

記 3 物質の情報源のうち、特別規則対象物質 126 物質と対比が可能な物質は 26 物質と少ない結果であったことについて、かつては CDC-NIOSH2000 のように物質と健康診断項目とを多数列挙した対比表が海外においても存在したが、2003 年の化学物質の国際的潮流に基づく国連による GHS の導入を前後して、化学物質の危険性・有害性にかかる情報インフラの整備が進み、UK-HSE 設立の背景でもあるローベンス報告に基づく「個別規制から包括規制」への動きが加速され、健康サーベイランス／健康影響モニタリングにおいても、リスクアセスメントやリスクリダクションの結果に基づきその実施の要否を判断するスキームが導入されていることも背景要因と考えられた。

本邦においても、令和 4 年の安衛法令改正公示およびそれに伴う令和 6 年度の化学物質の自律的な管理の制度化に際して、平成 20 年度前後以降より順次特化則等に個別物質を追加してきた仕組みが令和 2 年を境に中止され、化学物質の健康影響モニタリングとしてのリスクアセスメント対象物健康診断が導入されたことから、今後既存の個別規制物質について、その実施頻度や方法等についても、一律ではなくリスクに応じた自律的な実施等への移管にかかる検討が望ましいと考えられた。

3）生物学的モニタリング項目にかかる検討

平成元年の制度施行以降に、当該項目が生物学的許容値から取り下げられた物質が2物質（トルエン、トリクロロエチレン）認められた、このうちトルエンの尿中馬尿酸については、ACGIH-TLV が新たな有害性（生殖毒性等）に基づき 2007 年に 50ppm から 20ppm に低減され、その結果バックグランド値との区別がつかなくなったことがその理由として挙げられていた。現行法規の区分 3 のカットオフ値である尿中馬尿酸 2.5g/gCr は、時間加重平均値 100ppm に相当し、その関係式について y ＝0.0274x ＋ 0.3362 (y:尿中馬尿酸濃度 g/gCr、x:トルエンの個人ばく露濃度 ppm）との報告もある [9]。このことより、現行の職業性ばく露限界値（時間加重平均値）のうち日本産業衛生学会の許容濃度 50ppm に相当する尿中馬尿酸濃度が 1.3/gCr であり、ACGIH の TLV-TWA20ppm であれば 0.51/gCr を、現行法規での区分 3 とすることが必要になると考えられる。なお、トルエンの「比較的多いばく露」の検出、およびその経年変動や集積発生を把握する目的であれば尿中馬尿酸の意義は残る一方、妨害物質である安息香酸ばく露等によるバックグラウンド値にマスクされることを踏まえると、「早期ばく露指標」としてのトルエンの生物学的モニタリング項目の見直しが今後必要と考えられた。

トリクロロエチレンの日本産業衛生学会の生物学的許容値の提案理由書 [10]では、

総三塩化物のうちトリクロロエタノール は比較的半減期が短く(表:参考)、また β-グルクロニダー ゼ, 塩酸や硫酸による加水分解の有無で値が変わることから、体内負荷量として蓄積を反映する尿中トリクロロ酢酸 を対象としたとの記述があるが、併せて、トリクロロエチレンばく露の疫学研究において、平均個人ばく露濃度 22.4 – 2,330 mg/m3 (4.1–432 ppm)の作業者の作業終了直後のスポット尿中の トリクロロ酢酸およびトリクロロエタノールの尿中濃度がそれぞれは 9.9–1,617 mg/l および 0.9–1,804 mg/l であり [10]、生物学的許容値の引き下げに伴い総三塩化物のうちその 10%を占めるに過ぎないトリクロロエタノール値の意義が低下したことも、その背景にあると考えられた。

上記の例より、現行項目での生物学的モニタリングは、有害性情報にかかる知見の更新に基づく職業性ばく露限界値の引き下げに応じて、その意義を見直すことが求められおり、すなわち分布区分の引き下げにかかる検討のほか、一部の物質については低濃度ばく露の検出が可能な検査項目に変更する等により、健康影響の予防に資するばく露指標の更新が必要と考えられた。

4)有害業務の健康サーベイランス方法に係る整理

今回収集した海外情報のうち、健康診断の対象者の選定に資するスキームの記載があるのは DGUV および UK-HSE の情報であった。そのうち、健康診断における「臨床検査の実施」に際して、日本では作業列挙方式(ハザード情報)により選定された作業従事者に一律に自他覚症状および臨床検査を同時に実施しているが、HSE および DGUV のスキームでは「ばく露の程度(又はそれに基づくリスクアセスメントの結果)」に基づきその実施の要否を判断していた。また、UK-HSE では、特に法令対象(鉛、石綿等)以外の有害性については、リスク低減ができない場合に健康影響モニタリングの実施の要否判断をすることとされており、一方 DGUV では、リスクアセスメントによる要否の判断の後に「職業歴と自覚症状の調査」が先に行われ、その結果に基づき臨床検査実施の有無やばく露モニタリングの実施を検討することとされていた。本邦でも職場における化学物質管理の法令改正を機に新たに「リスクアセスメント対象物健康診断」が法整備され、その中では「健康障害リスク」の許容の是非に基づく健康診断の要否の判断や、自他覚症状等の検査により臨床検査の実施を進める方策が導入されている。健康診断受診対象者選定の適正化という観点において、今後特殊健診においても、リスクベースでの健診実施の要否判断等を検討することは合理的と考えられる。ただしその際、現在のハザードベースでの対象者選定に対して「ばく露の程度」に係る情報の提供が必要であり、これらの情報を健康診

断実施機関に対して事業者側が適切に提供できる仕組みが必要と考えられる。

なお、ILO 文書では、ハザード情報、標的健康影響およびそのモニタリング方法と併せて、ばく露シナリオおよびその評価に係る解説の記載が見られ、また ILO/DGUV の両文書では、当該健康影響の病態生理学的作業機序や、急性期影響と慢性期影響を区別した具体的な記載がみられるが、本邦においてばく露シナリオやその健康影響に係る記述がされたガイドライン等公開文書が普及している状況とは言えない。従って、ばく露と健康影響の因果関係等が明記されたガイドライン等を作成および公表し、事業者が適切に「ばく露に係る情報」を収集・把握し、それを労働衛生機関等と共有して適切な対象者選定および結果の評価に繋げてその精度向上を図ることは、事業者が負担する当該労働衛生対策の費用の適切な再配分にも資すると考えられる。

また、DGUV 文書および OSHA ガイドでは、物質ごとの記載のほか、類型化された標的健康影響（例：閉塞性呼吸器疾患を引き起こす可能性のある物質を扱う作業、皮膚腐食性・刺激性、発がん性および生殖細胞変異原性有害物質全般、等）でカテゴリ化された健康モニタリング項目の解説がされており、「事業者が許容できないと判断した標的健康影響」に基づいたスクリーニング項目の検討にも有用と考えられた。

なお本邦では、特に中小規模事業場における特殊健診の判断を担うのは労働衛生機関の医師および各事業場の嘱託産業医であると考えられ、その多くは日本医師会生涯教育制度における認定産業医であることから、これらの医師が利用可能な「化学物質による標的健康影響」に係る情報、およびそれらを用いてばく露評価のシナリオを用いたシミュレーションやトレーニングツールを開発、啓発することで、特殊健診における判定等精度の向上する図ることが必要と考えられる。

E. 結論

本年度の分担研究では、国内外の情報を統合し、個別規制物質の標的健康影響とその健康影響モニタリングを一元的に整理することで、特別規則の健康診断結果の鑑別精度の向上を目的とした。本研究のデータシートの利活用により、産業医、労働衛生機関において化学物質の健康影響モニタリング結果の適切な解釈およびそれに基づくばく露防止対策、および新たな制度におけるリスクアセスメント対象物健康診断での医師の判断による健康診断項目の検討において、そのプロセス支援に資するものと考えられる。

また、既存の特別規則健康診断項目については新たな科学的知見に基づく再評価が必要な項目があり、健康影響モニタリング項目のみではなく、生物学的ばく露モニタリング項目においても、今後の

有害性の新着情報の収集及びそれに基づく検査項目等の検討について、定期的な見直しをする機会が必要と考えられた。

また、有害業務の健康サーベイランスの実施方法について、公表されている国外のスキームでは、リスクアセスメントの結果に基づき健康診断の実施の有無がまず検討され、その後のばく露低減対策の実施の有無や、臨床検査等の実施に際しては作業歴やばく露状況および自覚症状等の聴取に基づき、ヒトへの侵襲のある検査の要否の判断がされていたことから、特殊健診においても今後ハザード情報に「ばく露の程度」を加味した対象者の選定などの検討が望ましいと考えられた。


F. 引用・参考文献

1. 中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター.「特殊健康診断に係る調査研究事業　個別物質の検討報告書」2005. 中央労働災害防止協会.
2.労働基準法施行規則別表第一の二第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物（合金を含む）並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示
3.Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases, Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases、(revised 2010), 2020.
4. Germany DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchungen. Sep, 2024.
5. Screening and Surveillance: A Guide to OSHA Standards. OSHA Publication 3162, (2014).
6.Medical Screening and Surveillance. SPECIFIC MEDICAL TESTS OR EXAMINATIONS PUBLISHED IN THE LITERATURE FOR OSHA-REGULATED SUBSTANCES. CDC-NIOSH,2000.
7. Documentation of Threshold limit values, ACGIH, Access in 2025.
8.令和 2 年度 化学物質の健診項目に関する専門委員会報告書
9.呉羽ら. 尿中馬尿酸定期検査からトル エン高濃度ばく露が示唆された一事業場の事例. 産衛誌 41 巻（臨時増刷）p624.1999.
10. 日本産業衛生学会許容濃度の勧告, 生物学的許容値,トリクロロエチレン、産衛誌 64 巻, pp319-324, 2022.
11. Health Surveillance process overview. UK-Health and Safety Exective (HSE). https://www.hse.gov.uk/coshh/assets/docs/healthsurveilance.pdf
12. The health surveillance cycle, UK-Health and Safety Exective (HSE). https://hhseg.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/health-surveillance-cycle.pdf
13. 許容濃度の提案. 日本産業衛生学会許容濃度委員会, 2025.

G. 学会・論文発表

令和 7 年度労働安全衛生総合研究所　安全衛生技術講演会講演「有害業務健康診断の新たな戦略」

図１　英国HSEが公表している健康サーベイランスの手順



リスクアセスメント
とコントロール

健康サーベイランスが必要？

どのようなモニタリングが必要？

必要に応じてモニタリング体制を構築し設計する。
必要であれば、その実施に際して支援を求める。

対象者を特定する

必要な対象者に
健康サーベイランスを実施する

結果を解釈し、
結果に基づいて行動する

雇用主

https://hhseg.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/health-surveillance-cycle.pdf

図２　HSEの健康サーベイランス
スキーム





図３：DGUVによる健康スクリーニングのスキーム



産業医による企業向けコンサルティング

企業によるリスクアセスメント → 必要に応じて、産業保健検診の理由

会社は、その理由を産業医に通知する。会社は、産業医に労働衛生検査の実施を委託する。

ドイツ労働衛生検査規則（ArbMedVV）に基づく職業上の健康診断 → 義務健康診断／任意健康診断／要請健康診断

初期相談（病歴聴取／職業病歴聴取を含む）（DGUV勧告、第7.1項を参照）

検査が必要ですか？

ja

被保険者は検査を拒否した。

ja

nein

必要に応じて、他の専門医の診察

検査（DGUV勧告、第7.2項を参照）

評価（DGUV勧告、第7.4項を参照）

最終相談、必要に応じて、企業の相談（DGUV勧告、第8項を参照）

被保険者および会社宛の年金証明書（理由、次の年金支給日）

産業医による所見の評価、さらなる労働安全対策の提案が必要かどうかを検討 → 必要に応じて企業にフィードバック

表 1 -1 ILO 職業性疾病リストに記載のある標的健康影響（日本の特別規則対象物質を抽出、がんを除く）

Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases, Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases、（revised 2010）

Substance Name	Disease name	Disease category	onset phase	ICD10	Initial of ICD10
carbon dislfide	Respiratory tract irritation	Respiratory tract irritation	acute	J68	J
carbon dislfide	Acute chemical pneumonitis	pulmonary	acute	J68.0	J
carbon dislfide	Pulmonary oedema	pulmonary	acute	J68.1	J
carbon dislfide	Upper respiratory inflammation	skin/mucosa respiratory	acute	J68.2	J
carbon dislfide	Burns and corrosion of external body surface	skin/mucosa	acute	T20-T25	T
carbon dislfide	Burns and corrosion of mouth, pharynx and oesophagus	skin/mucosa respiratory	acute	T28.0-T28.1, T28.5-T28.6	T
carbon dislfide	Burns and corrosion of eye and adnexa	skin/mucosa	acute	T26.0-T26.1, T26.5-T26.6	T
carbon dislfide	Conjunctivitis	skin/mucosa	acute	H10.2	H
carbon dislfide	Irritant contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L24	L
carbon dislfide	Toxic encephalopathy	CNS	acute	G92	G
carbon dislfide	Acute/chronic diseases caused by carbon disulfide	-	acute/chronic	T65.4	T
carbon dislfide	Corneal ulcer	skin/mucosa	acute/chronic	H16.0	H
carbon dislfide	Toxic optic neuropathy	neuro	chronic	H46	H
carbon dislfide	Ototoxic hearing loss	neuro	chronic	H91.0	H
carbon dislfide	Peripheral polyneuropathy	neuro	chronic	G62.2	G
carbon dislfide	Chronic ischaemic heart disease	cardiac	chronic	I25.8	I
carbon dislfide	Secondary hypertension	cardiac	chronic	I15.9	I
carbon dislfide	Atherosclerosis	cardiac	chronic	I70.9	I
carbon dislfide	Chronic kidney disease	renal	chronic	N18.9	N
carbon dislfide	Intermittent claudication	vaso	chronic	I73.9	I
Diseases caused by acrylonitrile	Acute diseases caused by acrylonitrile	-	acute	T65.8	T
Diseases caused by acrylonitrile	Respiratory tract irritation	Respiratory tract irritation	acute	J68	J
Diseases caused by acrylonitrile	Burns and corrosions of respiratory tract	skin/mucosa respiratory	acute	T27	T
Diseases caused by acrylonitrile	Burns and corrosions of external body surface	skin/mucosa	acute	T20-T25	T
Diseases caused by acrylonitrile	Burn and corrosion of mouth, pharynx and oesophagus	skin/mucosa respiratory	acute	T28.0-T28.1, T28.5-T28.6	T
Diseases caused by acrylonitrile	Burns and corrosions of eye and adnexa	skin/mucosa	acute	T26.0-T26.1, T26.5 -T26.6	T
Diseases caused by acrylonitrile	Conjunctivitis	skin/mucosa	acute	H10.2	H
Diseases caused by acrylonitrile	Irritant contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L24	L
Diseases caused by acrylonitrile	Acute systemic poisoning	-	acute	T65.8	T
Diseases caused by acrylonitrile	Allergic contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L23	L
Diseases caused by acrylonitrile	Corneal ulcer	skin/mucosa	acute/chronic	H16.0	H
Diseases caused by antimony or its compounds	Respiratory irritation	Respiratory tract irritation	acute	J68	J
Diseases caused by antimony or its compounds	Upper respiratory tract inflammation	skin/mucosa respiratory	acute	J68.2	J
Diseases caused by antimony or its compounds	Chemical pulmonary oedema	pulmonary	acute	J68.1	J
Diseases caused by antimony or its compounds	Burn and corrosion of respiratory tract	skin/mucosa respiratory	acute	T27	T
Diseases caused by antimony or its compounds	Chemical burns and corrosions of external body surface	skin/mucosa	acute	T20-T25	T
Diseases caused by antimony or its compounds	Burn and corrosion of internal organs	general	acute	T28.0-T28.2, T28.5-T28.7	T
Diseases caused by antimony or its compounds	Chemical burn and corrosion of eye and adnexa	skin/mucosa	acute	T26.0-T26.1, T26.5-T26.6	T
Diseases caused by antimony or its compounds	Conjunctivitis	skin/mucosa	acute	H10.2	H
Diseases caused by antimony or its compounds	Keratitis	skin/mucosa	acute	H16	H
Diseases caused by antimony or its compounds	Irritant contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L24	L
Diseases caused by antimony or its compounds	Acute toxic haemolytic anaemia	hematological	acute	D59.4	D
Diseases caused by antimony or its compounds	Acute toxic renal failure with tubular necrosis	renal	acute	N17.0	N
Diseases caused by antimony or its compounds	Chemical bronchitis and pneumonitis	pulmonary	acute/chronic	J68.0	J

表１-1 ILO 職業性疾病リストに記載のある標的健康影響（日本の特別規則対象物質を抽出、がんを除く）

Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases, Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases、（revised 2010）

Substance Name	Disease name	Disease category	onset phase	ICD10	Initial of ICD10
Diseases caused by antimony or its compounds	Corneal ulcer	skin/mucosa	acute/chronic	H16.0	H
Diseases caused by antimony or its compounds	Pustular dermatitis (antimony spots)	skin/mucosa	chronic	L30.8	L
Diseases caused by antimony or its compounds	Nose septal ulceration	skin/mucosa	chronic	J34.8	J
Diseases caused by antimony or its compounds	Deposits on teeth	teeth	chronic	K03.6	K
Diseases caused by antimony or its compounds	Diseases caused by antimony or its compounds	-		T56.8	T
Diseases caused by antimony or its compounds	Antimoniosis	-		J63.8	J
Diseases caused by chlorine	Irritant contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L24.0	L
Diseases caused by chlorine	Chemical burns and corrosions of external body surface	skin/mucosa	acute	T20-T25	T
Diseases caused by chlorine	Burns and corrosions of eyes and adnexa	skin/mucosa	acute	T26.0-T26.1,T26.5-T26.6	T
Diseases caused by chlorine	Burns and corrosions of internal organs	general	acute	T28.0-T28.2, T28.5-T28.7	T
Diseases caused by chlorine	Respiratory tract irritation	Respiratory tract irritation	acute	J68	J
Diseases caused by chlorine	Acute chemical pneumonitis and bronchitis	pulmonary	acute	J68.0	J
Diseases caused by chlorine	Pulmonary oedema	pulmonary	acute	J68.1	J
Diseases caused by chlorine	Upper respiratory inflammation	skin/mucosa respiratory	acute	J68.2	J
Diseases caused by chlorine	Reactive airways dysfunction syndrome (RADS)	pulmonary	acute	J68.3	J
Diseases caused by chlorine	Irritant-induced occupational asthma	sensitization	acute	J68.3	J
Diseases caused by chlorine	Acute/chronic diseases caused by chlorine	-	acute/chronic	T59.4	T
Diseases caused by chlorine	Erosion of the teeth	teeth	acute/chronic	K03.2	K
Diseases caused by chlorine	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), Emphysema, Chronic bronchiolitis, Pulmonary fibrosis	pulmonary	chronic	J68.4	J
Diseases caused by chlorine	Chronic rhinitis	skin/mucosa	chronic	J31.0	J
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Respiratory tract irritation	Respiratory tract irritation	acute	J68.3	J
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Acute chemical pneumonitis and bronchitis	pulmonary	acute	J68.0	J
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Pulmonary oedema	pulmonary	acute	J68.1	J
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Upper respiratory inflammation	skin/mucosa respiratory	acute	J68.2	J
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Burns and corrosions of eye and adnexa	skin/mucosa	acute	T26.0-T26.1, T26.5-T26.6	T
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Conjunctivitis	skin/mucosa	acute	H10.2	H
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Keratoconjunctivitis	skin/mucosa	acute	H16.2	H
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Burns and corrosions of external body surface	skin/mucosa	acute	T20-T25	T
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Irritant contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L24	L
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Narcotic syndrome consequent to acute systemic poisoning by halogenated derivatives of aliphatic or alicyclic hydrocarbons: methylene chloride, trichloroethylene, tetrachloroethylene, vinyl chloride monomer, chloroacetone, bromoacetone, hexafluoroacetone, halogenated derivatives of benzene	-	acute	T53.2, T53.3, T53.4, T53.6, T53.7, T59.3, T59.8	T
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Acute neurological syndrome	neuro	acute	T59.8, T60.8, X47, X48, Y17	T
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Renal failure with tubular necrosis	renal	acute	N17.0	N
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Acute/chronic diseases caused by halogen derivatives of aliphatic and aromatic hydrocarbons	-	acute/chronic	T53	T
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Corneal ulcer	skin/mucosa	acute/chronic	H16.0	H

表１-1 ILO 職業性疾病リストに記載のある標的健康影響（日本の特別規則対象物質を抽出、がんを除く）

Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases, Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases、（revised 2010）

Substance Name	Disease name	Disease category	onset phase	ICD10	Initial of ICD10
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Acute/chronic toxic encephalopathy	CNS	acute/chronic	G92	G
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Toxic liver disease	liver	acute/chronic	K71	K
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Injury of trigeminal nerve	neuro	acute/chronic	S04.3	S
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Toxic optic neuropathy	neuro	chronic	H46	H
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Chloracne	skin/mucosa	chronic	L70.8	L
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Toxic optic neuropathy	neuro	chronic	H46	H
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Ototoxic hearing loss	neuro	chronic	H91.0	H
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Effects on the peripheral nervous system	neuro	chronic	G62.2	G
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Raynaud’s phenomenon in the hands and feet	vaso	chronic	I73.0	I
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Acro-osteolysis in the terminal phalanges of the hands and feet	bone	chronic	M89.5	M
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Distal skin disorders (scleroderma-like syndrome)	skin/mucosa	chronic	L94.8	L
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Liver fibrosis with portal hypertension	liver	chronic	K74.0, +K76.6	K
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Chronic renal failure	renal	chronic	N18.9	N
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Chemical porphyria	hematological	chronic	E80.1	E
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Liver angiosarcoma	liver	chronic	C22.3	C
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Hepatocellular carcinoma	liver	chronic	C22.0	C
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Kidney cancer	renal	chronic	C64	C
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Melanoma	skin/mucosa	chronic	C43	C
Diseases caused by halogen derivatives of aliphatic or aromatic hydrocarbons	Effects on endocrine, immune, nervous, and reproductive systems following exposure to derivatives of biphenyls	-		T53.7, T65.8, X46, X49, Y16, Y19	T
Diseases caused by hexane	Respiratory tract irritation	Respiratory tract irritation	acute	J68	J
Diseases caused by hexane	Upper respiratory inflammation	skin/mucosa respiratory	acute	J68.2	J
Diseases caused by hexane	Conjunctivitis	skin/mucosa	acute	H10.2	H
Diseases caused by hexane	Irritant contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L24	L
Diseases caused by hexane	Narcotic syndrome	CNS	acute	T52.8	T
Diseases caused by hexane	Acute/chronic diseases caused by n-hexane	-	acute/chronic	T52.8	T
Diseases caused by hexane	Corneal scar and opacity	skin/mucosa	acute/chronic	H17.8	H
Diseases caused by hexane	Peripheral polyneuropathy	neuro	chronic	G62.2	G
Diseases caused by hexane	Chronic toxic encephalopathy	CNS	chronic	G92	G
Diseases caused by organic solvents	Respiratory tract irritation	Respiratory tract irritation	acute	J68	J
Diseases caused by organic solvents	Acute chemical pneumonitis and bronchitis	pulmonary	acute	J68.0	J
Diseases caused by organic solvents	Upper respiratory inflammation	skin/mucosa respiratory	acute	J68.2	J
Diseases caused by organic solvents	Burns and corrosions of eye and adnexa	skin/mucosa	acute	T26.0-T26.1, T26.5-T26.6	T
Diseases caused by organic solvents	Conjunctivitis	skin/mucosa	acute	H10.2	H

表 1 -1 ILO 職業性疾病リストに記載のある標的健康影響（日本の特別規則対象物質を抽出、がんを除く）

Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases, Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases、（revised 2010）

Substance Name	Disease name	Disease category	onset phase	ICD10	Initial of ICD10
Diseases caused by organic solvents	Irritant contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L24	L
Diseases caused by organic solvents	Narcotic syndrome consequent to poisoning by organic solvents	neuro	acute	T52	T
Diseases caused by organic solvents	Allergic contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L23	L
Diseases caused by organic solvents	Toxic encephalopathy	CNS	acute	G92	G
Diseases caused by organic solvents	Acute toxic renal failure with tubular necrosis	renal	acute	N17.0	N
Diseases caused by organic solvents	Acute myeloblastic leukemia	hematological	acute	C92.0	C
Diseases caused by organic solvents	Acute/chronic diseases caused by organic solvents	-	acute/chronic	T52	T
Diseases caused by organic solvents	Corneal ulcer	skin/mucosa	acute/chronic	H16.0	H
Diseases caused by organic solvents	Toxic liver disease	liver	acute/chronic	K71	K
Diseases caused by organic solvents	Liver toxicity (impairment, functional)	liver	acute/chronic	K72.9	K
Diseases caused by organic solvents	Chronic toxic renal failure	renal	chronic	N18.9	N
Diseases caused by organic solvents	Bone marrow depression (aplastic anaemia)	hematological	chronic	D61.9	D
Diseases caused by organic solvents	Infertility	repro	chronic	N46, N97.0	N
Diseases caused by organic solvents	Congenital malformation syndromes	repro/develop	chronic	Q86.8	Q
Diseases caused by organic solvents	Ototoxic hearing loss	neuro	chronic	H91.0	H
Diseases caused by organic solvents	Peripheral polyneuropathy	neuro	chronic	G62.2	G
Diseases caused by vanadium or its compounds	Respiratory tract irritation	Respiratory tract irritation	acute	J68	J
Diseases caused by vanadium or its compounds	Acute chemical pneumonitis and bronchitis	pulmonary	acute	J68.0	J
Diseases caused by vanadium or its compounds	Pulmonary oedema	pulmonary	acute	J68.1	J
Diseases caused by vanadium or its compounds	Upper respiratory inflammation	skin/mucosa respiratory	acute	J68.2	J
Diseases caused by vanadium or its compounds	Reactive airways dysfunction syndrome (RADS)	pulmonary	acute	J68.3	J
Diseases caused by vanadium or its compounds	Irritant-induced occupational asthma	sensitization	acute	J68.3	J
Diseases caused by vanadium or its compounds	Burn and corrosion confined to eye and adnexa	skin/mucosa	acute	T26.0-T26.1, T26.5-T26.6	T
Diseases caused by vanadium or its compounds	Irritant contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L24	L
Diseases caused by vanadium or its compounds	Sensitizer-induced occupational asthma	sensitization	acute	J45.0	J
Diseases caused by vanadium or its compounds	Allergic contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L23.0	L
Diseases caused by vanadium or its compounds	Vanadium toxicity (acute/chronic)	-	acute/chronic	T56.8	T
Diseases caused by vanadium or its compounds	Conjunctivitis (acute/chronic)	skin/mucosa	acute/chronic	H10.2	H
Diseases caused by vanadium or its compounds	Chronic bronchitis and emphysema	pulmonary	chronic	J68.4	J
Diseases caused by vanadium or its compounds	Chronic rhinitis	skin/mucosa	chronic	J31.0	J
Diseases caused by vanadium or its compounds	Chronic pharyngitis	skin/mucosa	chronic	J31.2	J
lead	Mucous membrane irritation	skin/mucosa	acute	J68	J
lead	Chemical bronchitis and pneumonitis	pulmonary	acute	J68.0	J
lead	Chemical pulmonary oedema	pulmonary	acute	J68.1	J
lead	Burn of mouth, pharynx and oesophagus	skin/mucosa respiratory	acute	T28.0-T28.1, T28.5-T28.6	T
lead	Burn of eye and adnexa	skin/mucosa	acute	T26.0-T26.1, T26.5-T26.6	T
lead	Upper respiratory tract inflammation	skin/mucosa respiratory	acute	J68.2	J
lead	Burns and corrosion of respiratory tract	skin/mucosa respiratory	acute	T27	T
lead	Reactive airways dysfunction syndrome (RADS)	pulmonary	acute	J68.3	J
lead	Irritant-induced occupational asthma	sensitization	acute	J68.3	J
lead	Acute lead nephropathy	renal	acute	N14.3	N
lead	Acute toxic encephalopathy (organic and inorganic)	CNS	acute	G92	G

表 1 -1 ILO 職業性疾病リストに記載のある標的健康影響（日本の特別規則対象物質を抽出、がんを除く）

Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases, Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases、（revised 2010）

Substance Name	Disease name	Disease category	onset phase	ICD10	Initial of ICD10
lead	Cerebral oedema	CNS	acute	G93.6	G
lead	Irritant contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L24	L
lead	Acute and chronic diseases caused by lead or its compounds	-	acute/chronic	T56.0	T
lead	Gastrointestinal toxicity (organic and inorganic, acute and chronic)	GI	acute/chronic	K52.1	K
lead	Hypertension (secondary)	cardiac	chronic	I15.8	I
lead	Fanconi-like syndrome	hematological	chronic	E72.0	E
lead	Polyneuropathy (organic and inorganic)	neuro	chronic	G62.2	G
lead	Chronic toxic encephalophaty (organic and inorganic)	CNS	chronic	G92	G
lead	Burton line on the gums	teeth	chronic	K05	K
lead	Chronic progressive renal failure	renal	chronic	N14.3	N
lead	Infertility male	repro	chronic	N46	N
lead	Infertility female	repro	chronic	N97.8	N
manganage	Manganism	-	-	T57.2	T
manganage	Mucous membrane irritation	skin/mucosa	acute	J68	J
manganage	Bronchitis and pneumonitis	pulmonary	acute	J68.0	J
manganage	Burns and corrosion of respiratory tract	skin/mucosa respiratory	acute	T27	T
manganage	Burns and corrosion of external body surface	skin/mucosa	acute	T20-T25	T
manganage	Burns and corrosion of mouth, pharynx and esophagus	skin/mucosa respiratory	acute	T28.0-T28.1,T28.5-T28.6	T
manganage	Burns and corrosion of eye and adnexa	skin/mucosa	acute	T26.0-T26.1,T26.5-T26.6	T
manganage	Metal fume fever	pulmonary	acute	T57.2	T
manganage	Irritant contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L24	L
manganage	Allergic contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L23	L
manganage	Irritant-induced occupational asthma	sensitization	acute	J68.3	J
manganage	Acute and chronic diseases caused by manganese or its compounds	-	acute/chronic	T57.2	T
manganage	Toxic encephalopathy (acute/chronic)	CNS	acute/chronic	G92	G
mercury	Toxic encephalopathy	CNS	acute	G92	G
mercury	Upper respiratory inflammation	skin/mucosa respiratory	acute	J68.2	J
mercury	Acute chemical bronchitis and pneumonitis	pulmonary	acute	J68.0	J
mercury	Acute chemical bronchiolitis	pulmonary	acute	J68.4	J
mercury	Chemical pulmonary oedema	pulmonary	acute	J68.1	J
mercury	Irritant contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L24	L
mercury	Acute conjunctivitis	skin/mucosa	acute	H10.2	H
mercury	Allergic contact dermatitis	skin/mucosa	acute	L23	L
mercury	Acute/chronic diseases caused by mercury or its compounds	-	acute/chronic	T56.1	T
mercury	Gastrointestinal toxicity	GI	acute/chronic	K52.1	K
mercury	Disturbances of taste and smell	neuro	acute/chronic	R43.8	R
mercury	Toxic nephropathy	Neural	chronic	N14.3	N
mercury	Mercury pigmentation	skin/mucosa	chronic	L81.8	L
mercury	Chronic gingivitis	teeth	chronic	K05.1	K
mercury	Toxic polyneuropathy	neuro	chronic	G62.2	G
mercury	Chronic progressive renal failure	renal	chronic	N14.3	N
mercury	Chronic kidney dysfunction	renal	chronic	N18.9	N
mercury	Acrodynia	-		T56.1	T

表１-2 ILO 職業性疾病リストに記載のある標的健康影響（日本の特別規則対象物質を抽出、がんに限る）

Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases, Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases、（revised 2010）

Substance Name	Disease name	ICD10
asbestos	Malignant mesothelioma	C45
asbestos	Lung cancer	C34
asbestos	Laryngeal cancer	C32
asbestos	Ovarian cancer	C56
asbestos	Occupational exposure to dust	Z57.2
asbestos	Other specified inorganic substances	T57.8
benzidine and its salts	Bladder cancer	C67
benzidine and its salts	Exposure to occupational risk factors	Z57
bis-chloromethyl ether (BCME)	Lung cancer	C34
bis-chloromethyl ether (BCME)	Exposure to occupational risk factors	Z57
chromium VI compounds	Lung cancer	C34
chromium VI compounds	Exposure to occupational risk factors	Z57
coal tars, coal tar pitches or soots	Toxic effect of coal tars, coal tar pitches or	T65.8
coal tars, coal tar pitches or soots	Lung cancer	C34
coal tars, coal tar pitches or soots	Skin cancer	C44
coal tars, coal tar pitches or soots	Exposure to occupational risk factors	Z57
beta-naphthylamine	Toxic effect of beta-naphthylamine	T65.8
beta-naphthylamine	Bladder cancer	C67
beta-naphthylamine	Exposure to occupational risk factors	Z57
vinyl chloride	Toxic effect of vinyl chloride	T53.6
vinyl chloride	Liver angiosarcoma	C22.3
vinyl chloride	Hepatocellular carcinoma	C22.0
vinyl chloride	Exposure to occupational risk factors	Z57
benzene	Toxic effect of benzene	T52.1
benzene	Acute myeloid leukaemia (AML)	C92.0
benzene	Exposure to occupational risk factors	Z57
toxic nitro- and amino-derivatives of benzene or its homologues	Toxic effects of nitroderivatives and aminoderivatives of benzene and its homologues	T65.3
toxic nitro- and amino-derivatives of benzene or its homologues	Bladder cancer	C67
toxic nitro- and amino-derivatives of benzene or its homologues	Exposure to occupational risk factors	Z57
nickel compounds	Toxic effect of nickel compounds	T56.8
nickel compounds	Cancer of the nasal cavity	C30.0
nickel compounds	Cancer of the paranasal sinuses	C31
nickel compounds	Lung cancer	C34
nickel compounds	Exposure to occupational risk factors	Z57
arsenic and its compounds	Toxic effect of arsenic and its compounds	T57.0
arsenic and its compounds	Lung cancer	C34
arsenic and its compounds	Skin cancer	C44
arsenic and its compounds	Bladder cancer	C67
arsenic and its compounds	Exposure to occupational risk factors	Z57
beryllium or its compounds	Toxic effect of beryllium and its compound	T56.7
beryllium or its compounds	Lung cancer	C34

表１-2 ILO 職業性疾病リストに記載のある標的健康影響（日本の特別規則対象物質を抽出、がんに限る）

Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases, Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases、（revised 2010）

Substance Name	Disease name	ICD10
beryllium or its compounds	Exposure to occupational risk factors	Z57
cadmium and its compounds		
cadmium and its compounds	Toxic effect of cadmium and its compound	T56.3
cadmium and its compounds	Lung cancer	C34
cadmium and its compounds	Exposure to occupational risk factors	Z57
ethylene oxide	Non-Hodgkin lymphoma (NHL)	C82-C85
ethylene oxide	Chronic lymphocytic leukaemia (CLL)	C91.1
ethylene oxide	Multiple myeloma (MM)	C90
ethylene oxide	Bladder cancer	C67
ethylene oxide	Occupational exposure to toxic agents in other industries-solids, liquids, gases or vapour	Z57.5

表２　DGUVの職業健康診断に関するガイドラインに記載のある標的健康影響（日本の特別規則対象物質を抽出）

DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchungen Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

		ヒ素および ヒ素化合物	アスベスト	ベンゼン	四エチル鉛及び四メチル鉛	鉛及びその無機化合物	カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	ジメチルホルムアミド
6.3.2 急性/亜急性影響 Akute/subakute Wirkungen		純粋な金属性ヒ素を扱う際に中毒が発生しないと考えら、頻繁に観察される毒性は、ヒ素三酸化物による不純物に起因するとされている。非金属性ヒ素は極めて毒性が強い。 ■目、上気道、皮膚の局所的な刺激 ■吸入摂取後の消化管障害や末梢神経系および中枢神経系への全身性作用 ■ヒ素三酸化物による経口中毒では、2つの経過形態が区別される： 麻痺型 心血管系および中枢神経系の重度障害、循環不全/ショック、呼吸麻痺、死亡。 胃腸型 金属臭やにんにくのような味、口や咽の灼熱感、嚥下困難、反射性嘔吐、下痢など。 血圧低下、心拍数異常、筋肉けいれん、腎機能障害など。 非常に高用量（体重1 kgあたり2mg 以上のヒ素）を摂取した場合、末梢神経障害（末梢神経障害）や中枢神経系障害（混乱、幻覚など）が頻繁に観察され、血液障害（貧血、白血球減少）や肝機能障害も報告されている。	該当なし	•粘膜および皮膚への刺激作用 •中枢神経系の障害（例：頭痛、吐き気、めまい）	鉛アルキルは強い全身性毒性を有する。 ■中枢神経系刺激・変性症状 •食欲不振、悪心、嘔吐 •不眠症、頭痛、めまい •不安感、混乱、 irritability、興奮性、震え、幻覚 ■循環器障害（低血圧、徐脈）	急性中毒は、労働安全衛生基準の遵守が改善されたため稀。 ■疲労感、倦怠感、食欲不振などの非特異的な症状	カドミウム蒸気またはカドミウム煙の吸入による鼻、のど、気管、気管支の粘膜の刺激	■クロムトリオキシド、クロム酸塩、または二クロム酸塩の粉塵や蒸気への急性局所曝露によるは、涙液分泌を伴う結膜炎および目の角膜損傷 皮膚 ■クロムトリオキシド、クロム化合物、またはニクロム化物による皮膚の損傷（特に擦過傷や裂傷に侵入すると、特徴的な治癒の悪い「クロム潰瘍」を引き起こす）。 ■クロム（VI）化合物による皮膚感作に伴うアレルギー性接触性皮膚炎 消化管 ■大量経口摂取による消化管粘膜および口腔の黄変色、嚥下困難、声門の腫食、鼻の灼熱痛、咽吐（場合によっては誤嚥性肺炎）、血便、循環不全、痙攣、意識喪失、腎不全、昏睡状態での死亡 ■クロムトリオキシド、クロム酸塩、または二クロム酸塩の粉塵または蒸気の高濃度での吸入による鼻粘膜の損傷（充血、カタル、上皮壊死）、上気道と肺の刺激症状 ■凝固障害、溶血、貧血等の血液系障害	■DMF蒸気の吸入による上気道粘膜刺激、 ■目に接触すると、充血、灼熱感、涙目、または瘤擦性のまぶたの閉塞
6.3.3　慢性影響 Chronische Wirkungen		純粋な金属性ヒ素の長期的な影響については、ほとんど知られていない。 中毒ではヒ素三酸化物との混合曝露を伴う事が多い。 ■眼の結膜、上気道、皮膚に刺激や粗繊変化 ■全身性皮膚障害（色素沈着、角化症） ■末梢血管障害（特に指の動脈に関するもの） ■心血管疾患、糖尿病、末梢神経障害、脳血管疾患、皮膚・呼吸器・膀胱および腎臓の癌	■アスベスト症 肺高血圧症、慢性肺性心、気管支拡張症、気管支肺炎性過程は、アスベスト症の合併症または合併症として起こり得ます。 ■胸膜の疾患 •胸膜の肥厚（石灰化を伴うか伴わないか） •円形のアテトーシス •結合組織の瘢痕化を伴うまたは伴わない胸膜腔液貯留（複雑化ヒアリシス） ■肺がんおよび中皮腫 ■喉頭がん ■卵巣がん	■造血系の障害または損傷	慢性中毒の場合も、まず第一に中枢神経系が影響を受けます。 ■中枢神経系刺激・変性症状 •興奮性、抑ろつ、幻覚 •頭痛 •低血圧 •振戦、運動失調、神経衰弱	■血液系障害 •ヘム合成における貧血、灰白色の皮膚色調 •好塩基球の点状沈着 ■消化器系障害 •慢性的な便秘から疝痛のような腹痛 ■神経障害（中枢神経系と末梢神経系） •神経伝導速度の変化、認知機能障害、その他 •橈骨神経麻痺（「鉛手」は、現在ではほとんど観察されない） ■腎機能障害 •尿細管障害による尿細管再吸収の低下と慢性間質性線維化 ■その他 •鉛白斑（動脈細動脈と前毛細血管の筋収縮） •「鉛縁」（鉛硫化物の沈着） •MAK委員会は、鉛および無機鉛化合物を動物実験で発がん性物質として分類（吸入可能分画のカテゴリ−4）。	＜非悪性疾患＞ ■呼吸器系と肺：慢性閉塞性呼吸器疾患および上気道における炎症性刺激状態、肺気腫 ■腎臓：毒性性尿細管障害 ■骨：骨軟化症 ＜悪性疾患＞ ■肺がん ■腎細胞がん	■い皮膚潰瘍（無痛、赤い縁状の線、壊死性底部、場合によっては瘤皮形成）の発生；これらの深い潰瘍は、裂傷、亀裂、または小さな外傷性皮膚損傷のある部位にのみ発生 ■鼻中隔の変化 A：　赤み、腫れ、分泌物の増加 B：　潰瘍、出血、瘤皮および瘤皮の形成 C：　鼻中隔の穿孔 C Ⅰ：　針の頭ほどの大きさ C Ⅱ：　レンズほどの大きさ C Ⅲ：　より大きなから部分的な鼻中隔欠損 ■咽頭および喉頭のカタル症状 ■慢性気管支炎、まれに気管支喘息を伴う ■その他 唾液と共に摂取された微量のクロムによる胃腸疾患可能性、吐き気、胃痛、下痢（場合によっては血便を伴う）および肝障害の可能性	■高用量領域での肝毒性 ■胃腸症状（腹痛、食欲不振、悪心、嘔吐、便秘または下痢）、 ■膵炎 ■中枢神経系障害 ■循環器障害が ■胎児に害を及ぼす可能性
7.2.2 臨床検査 Klinische Untersuchungen	初回検査 Erstuntersuchung	•尿検査（多項目試薬（試験紙法を含む）検査、沈渣） •血液検査（血球検査） •皮膚検査（特に注意すべき点：過角化、色素沈着異常、湿疹） •BSG（赤血球沈降速度）またはCRP •肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT） •血清クレアチニン •初回バイオモニタリング（空腹時値）を基準として	■呼吸器系および循環器系の検査 ■スパイロメトリー•必要に応じて、胸部X線正面撮影。胸部X線撮影の実施の適応は、個々のケースで検討する必要があります（詳細は第7.2項の注意事項を参照）。一般的な適応2はありません。初回検査そのものは、胸部X線撮影の適応ではありません。 •胸部X線撮影は、病歴の結果に応じて、1年以内に撮影されたものを使用することができます。 喉頭がん（喉頭がん）のリスクがあるため、特に持続的な声のかすれ（3週間以上）、発声障害、異常感覚、およびアルコール摂取は記録する必要があります。	■血液検査	■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、沈渣） ■血液検査（血球検査） ■血清クレアチニン ■肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT） ■既往歴で鉛アルキル化合物への曝露が確認された場合：バイオモニタリング	•尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）） •血液検査（分画検査を含む） •血清クレアチニン •肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT） •尿中β2-ミクログロブリン •既往歴で鉛曝露が確認されている場合：血液中の鉛のバイオモニタリング	■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）） ■鼻呼吸の簡易検査 ■スパイロメトリー（別紙1、ガイドライン「肺機能検査」） ■血清クレアチニン ■尿中β2-ミクログロブリン ■BSGまたはCRP ■肝機能酵素（SGOT、SGPT、γ-GT） ■バイオモニタリング：尿中カドミウム測定（既存の曝露評価のため）	■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、沈渣） ■肺機能検査（肺機能検査ガイドライン参照） ■血液検査（血球検査） ■皮膚検査（湿疹、亀裂、アレルギー症状、治癒不良の傷に注意） ■鼻腔鏡検査（適応がある場合、例：エアロゾル曝露） ■既往歴で曝露が確認されている場合：バイオモニタリング、尿中および赤血球中のクロム濃度測定（基準値）	■γ-GT、SGPT（ALAT）、SGOT（ASAT） ■バイオモニタリング ■必要に応じて、追加の肝機能検査を実施。 例：上腹部超音波検査
	追跡調査 Nachuntersuchung	•初回検査と同様 •バイオモニタリング（6.4節参照）	■呼吸器系および循環器系の検査 ■スパイロメトリー •X線撮影の実施に関する正当な適応は、§ 83 StrlSchG（放射線防護法）および§ 119 StrSchV（放射線防護規則）に従い、個々のケースにおける追跡検査において検討する必要があります。経験上、鉱物粉塵による肺の職業病の診断のためX線撮影を実施するのは、曝露開始後15年以上経過するか、または45歳に達した後に限られる。さらに、曝露の程度も考慮しなければならない。 •ただし、肺疾患の臨床的疑いがある場合は、年齢や曝露開始時期に関わらず、胸部 X 線検査の適応があります。 •X 線写真は、病歴の結果に応じて、1 年以内のものを使用できます。 •被保険者の特別な曝露条件（高リスク群）における追跡検査/追加検査では、胸部概観撮影の代わりに低線量多列ボリュームCT（HRCT）を用いた検査プログラムを提供する必要があります。 補足： 初回検査と追跡検査に加え、病歴と所見に応じて、気管支拡張試験や全身肺量測定法などの詳細な肺機能検査を検討する必要があります。 胸部単純X線写真で所見が不明確な場合、胸部低線量高解像度CT検査の実施が適応となる場合があります。この場合、医師は第二意見者（GVSまたは各州の医療団体が定めるリストに記載）の意見を聴取し、CT検査の実施の適応を判断する必要があります。 アスベストに曝露した被保険者の年次胸部X線検査結果に基づき、肺または胸膜の腫瘍の疑いが指摘された場合、第二意見の依頼なしに、資格を有するCT検査を実施する必要があります。	■血液検査 ■バイオモニタリング（6.4 参照）。バイオモニタリングは、追跡検査の一環として行われる検査では通常不要です。 ■疑わしい場合：血液学的な診断	（注：原文でも上記と同じ） ■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、沈渣） ■血液検査（血球検査） ■血清クレアチニン ■肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT） ■既往歴で鉛アルキル化合物への曝露が確認された場合：バイオモニタリング	■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）） ■血液検査（分画検査を含む） ■血清クレアチニン ■肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT） ■尿中β2-ミクログロブリン ■血液中のバイオモニタリング（追跡検査の場合：血液中の鉛濃度が上昇している限り継続） 臨床所見に異常がある場合： ■尿中タンパク質（例：総タンパク質、アルブミン、δ1-ミクログロブリン） ■神経学的検査（神経生理学/筋電図検査を含む） 生物学的基準値を明らかに超える場合： ■効果の検出のため：尿中δ-アミノレブリン酸（ALA-U）、血中δ-アミノレブリン酸脱水素酵素（ALA-D）、尿中コプロポルフィリン、血中遊離赤血球ポルフィリンIX（EP）、コプロポルフィリンゲンIII、斑点細胞の検出のための血液塗抹標本。	•尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）） •鼻呼吸の簡易検査 •スパイロメトリー •血清クレアチニン •尿中β2-ミクログロブリン •BSGまたはCRP •肝機能酵素（SGOT、SGPT、γ-GT） •血液中のカドミウムのバイオモニタリング（追跡検査の場合は省略）および尿中のカドミウム •腎超音波検査（長期曝露後） 高カドミウム曝露の場合の追加検査： •嗅覚検査（例：スニッフィンスティック） •鼻内視鏡検査および機能検査による鼻呼吸検査（例：前鼻腔内圧測定） 長期高濃度曝露後の追跡検査において、必要に応じて胸部画像診断を実施。ただし、既往歴および/または検査結果に異常が認められる場合（適応基準を満たす場合）に限る。	■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、沈渣） ■肺機能検査（肺機能検査ガイドライン参照） ■血液検査（血球検査） ■皮膚検査（湿疹、亀裂、アレルギー症状、治癒不良の傷や潰瘍に注意） •■鼻腔鏡検査（適応がある場合、例：エアロゾル曝露） ■バイオモニタリング：尿中および赤血球中のクロム測定 不明な場合における追加検査： ■耳鼻咽喉科検査 ■呼吸器科検査 胸部画像検査（既往歴および/または検査で異常が認められる場合のみ - 適応基準を満たす場合） 不明な場合における追加検査：耳鼻咽喉科検査	

		グリセロール・トリニトラート（ニトログリセリン）およびグリコール・ジニトラート（ニトログリコール）	二硫化炭素	メタノール	ニッケルおよびニッケル化合物	水銀および無機水銀化合物	金属の溶接および切断	珪肺性粉塵	スチレン	トルエンおよびキシレン	トリクロロエチレン
6.3.2 急性/亜急性影響 Akute/subakute Wirkungen		■中枢神経障害 •頭痛 •めまい •吐き気 •顔の紅潮 •末梢の異常感覚 •不安感 ■循環器障害 •胸部の痛み •血圧の低下 •徐脈または頻脈 •意識喪失 •循環器系の崩壊	高用量では強い中枢神経障害 ・麻酔作用 ・興奮状態 ・不眠 ・多弁 ・精神障害 ・急速で深い意識喪失から致死に至る場合がある。	■中枢神経障害 •「二日酔い」症状：めまい、倦怠感、頭痛、吐き気、嘔吐、腹痛（疝痛様） •視覚障害（「視界がぼやける」） ■呼吸器障害 •呼吸困難から呼吸中枢の麻痺、けいれん、昏睡、循環不全	■呼吸器系と肺（間質性肺炎）の損傷 ■感作された個人でのアレルギー性蕁麻疹	■腎機能障害（多尿、アルブミン尿、赤血球尿）から無尿まで ■吸入による気道刺激（気管支炎、気管支肺炎） ■口腔粘膜の炎症（口内炎、歯肉炎、粘液性潰瘍、特に虫歯のある部位に多く、歯の動揺）	■感作と金属煙熱（または金属蒸気熱） ■肺機能への影響	急性珪肺症（以下参照）の症状は、ドイツ連邦共和国では発生しないものとされています。これは、そのような高濃度の曝露が現在では発生しないためです。	■目と上気道の粘膜刺激 ■中枢神経系異常（基準値を大幅に超過した濃度（約50 ppm）） •注意力、集中力、記憶力の障害（短期記憶） •異常な疲労感 •頻発する頭痛 •めまい •吐き気 •酔ったような感覚 •意識喪失に至るまでのめまい	■中枢神経系異常 •麻酔前症状 ■皮膚障害 •皮膚および粘膜の刺激 •皮膚の脱脂作用 •アルコール（エタノール）の作用増強効果	■中枢神経系異常 •麻酔作用（すべての段階の酩酊状態から致死的な深い麻酔状態まで） •食欲不振、腹部不快感 •吐き気、嘔吐、腹痛/痙攣 •頭痛、めまい •倦怠感 ■末梢神経系異常 •四肢の運動障害、感覚障害、栄養障害 ■皮膚粘膜異常 •皮膚および粘膜の急性刺激はまれ（咳、呼吸困難） ■その他 •まれに、身体的努力やアルコール摂取後に心室細動による突然の遅発性死亡
6.3.3 慢性影響 Chronische Wirkungen		■中枢神経障害 •頭痛 •ほてり •めまい •食欲不振 •アルコール不耐症 ■循環器障害 •胸痛（狭心症様） •動脈硬化性変化 長期間にわたる高濃度の曝露（例えば混合作業やカートリッジ充填作業など）の後、急性心不全による突然の死亡が発生する可能性があります。	■神経障害（中枢神経系、末梢神経系、および/または自律神経系の障害） •精神病、機能障害、集中力の低下、疲労感の増強、感情の不安定、脳症 •遺伝部に感覚障害が顕著な多発性神経障害 •遺伝部の筋反射の減弱 ■血管障害 •脳、心臓、腎臓、四肢の血流に影響を及ぼす血管硬化症 ■消化器障害 •胃腸障害の傾向、体重減少、食欲不振 ■その他おそらく生殖能力に影響を及ぼす可能性があり、または胎児に障害を引き起こす可能性があります	■中枢神経系の障害 ■末梢性多発神経炎、聴神経炎、視神経炎の症状 ■パーキンソン病に類似した症状 ■肝実質障害	■発がん •無機ニッケル化合物（トリニッケルジスルフィド（ニッケルサブスルフィド Ni_3S_2）やニッケル酸化物（NiO）など）を吸入した場合、まれに鼻腔、副鼻腔、肺の癌を引き起こす可能性 ■上気道障害 •ニッケルまたはニッケル化合物への高濃度かつ長期的な曝露による鼻粘膜の慢性的な損傷（慢性鼻炎、副鼻腔炎、鼻中隔の浸食、嗅覚上皮の損傷による嗅覚障害） ■下気道障害 •線維化性肺変化 •感作による喘息性疾患 ■皮膚 •アレルギー性湿疹	■中枢神経系の障害： –過興奮 –不安感、緊張感、気分不安定 （水銀中毒症） –指の震え、腕、脚、頭の震え（水銀震え）および吃音や不明瞭な発声（水銀吃音症） ■自律神経症状の増強 –極端な濃度でのみ前眼部レンズ嚢の不可逆的な褐色変色（水銀レンズ症） ■末梢神経障害 ■アレルギー性接触性皮膚炎	■塵肺症 ■変異原性および発がん性 ■神経毒性作用/マンガン中毒	珪肺症	■中枢神経系への影響 •心理運動機能障害 •認知機能障害（反応時間の遅延、記憶力の低下） •後天性の色覚障害（青黄色識別困難） ■末梢神経系への影響 •神経伝導速度の遅延 •前庭機能障害 ■皮膚粘膜障害 皮膚や粘膜に強い刺激	■中枢神経系異常 •毒性脳症 ■皮膚障害 •湿疹	■神経衰弱症状 ■中枢神経系障害 ■心筋障害 ■肝障害 ■腎障害 ■高曝露群において腎細胞腫瘍 ■上気道の粘膜刺激 ■湿疹
7.2.2 臨床検査 Klinische Untersuchungen	初回検査 Erstuntersuchung	■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、沈渣） ■血液検査（血球検査） ■その他推奨： •循環機能検査（例：シェロン検査） •異常な血圧値の場合、長期血圧測定	■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、異常がある場合は沈渣検査を追加） ■エルゴメトリー（別紙2「エルゴメトリーガイドライン」参照） ■128Hzのチューニングフォークを用いた振動感覚検査 ■追加検査： –コレステロールとトリグリセリド –γ-GT、SGPT（ALAT）、SGOT（ASAT） –小血液検査		■皮膚の状態（湿疹や皮膚アレルギーに注意） ■鼻腔鏡検査（鼻腔の鏡検査） ■肺機能検査（別紙1、ガイドライン「肺機能検査」） ■既往歴で既往曝露が確認された場合：尿中ニッケルのバイオモニタリング（基準値）	•血液検査（血球検査） •血清クレアチニン •肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT） •尿検査（多項目検査ストリップ、沈渣） •尿中水銀のバイオモニタリング •後日の経過観察のための筆跡サンプル	■スパイロメトリー ■胸部X線撮影（p. a. 線路）※特別な適応がある場合 –X線写真は、病歴に応じて1年以内のものも考慮可能です （参照：「放射線診断に関する付録」DGUVガイドライン「シリカゲン性粉塵」） –X線撮影の実施を正当化する適応は、個々の症例において病歴に応じて決定すべきである。	■呼吸器系および循環器系の検査 •スパイロメトリー •必要に応じて、胸部の正面撮影（p. a. 線路）。X線撮影の実施の適応は、個々のケースで検討する必要があります（詳細は7.2項の注記も参照）。一般的な適応はありません。初回検査そのものは、胸部X線撮影の適応ではありません。 •胸部X線撮影は、既往歴の結果に応じて、1年以内のものを使用できます。 撮影画像がある場合は、比較のために参照されます。	■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む） ■神経学的検査（運動機能、反射状態、感覚、両側内果部の振動感覚検査（パレステノメトリー）、協調性） ■スチレンの刺激性または神経毒性作用に関する検査 ■バイオモニタリング– 初回検査時は正当な理由がある場合のみ 追加検査： •γ-GT、SGPT（ALAT）、SGOT（ASAT） •血液検査（血球検査） •血糖値 / HbA1c •スパイロメトリー •不明な場合、必要に応じて専門医の追加検査	■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、異常がある場合は沈渣検査を追加） ■皮膚の検査 ■血液検査（2年ごとの再検査時） ■ 追加検査： –γ-GT、SGPT（ALAT）、SGOT（ASAT） –神経学的検査（概略）	■尿検査（多項目検査（試験紙法 ■γ-GT、SGPT（ALAT）、SGOT ■尿中o1-ミクログロブリン 追加検査： ■腎疾患が疑われる場合：血清クレ ■血液検査 ■心不整脈が疑われる場合：安静時 ※注：健診項目については3物質が
	追跡調査 Nachuntersuchung		■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、異常がある場合は沈渣検査を追加） ■バイオモニタリング ■眼底検査 ■7.2.2で記載された一般的な医学的検査で明確に診断できない場合、追加として：精神科的および/または専門神経科的検査（必要に応じて脳波検査（EEG）および/または電気神経検査および筋電図検査を含む）	■初回検査と同様 ■追加調査 •バイオモニタリング（6.4 参照） •不明な場合における追加検査： –眼科専門医による検査 –神経科専門医による検査 –必要に応じて肝機能検査	■皮膚の状態（湿疹や皮膚アレルギーに注意） ■鼻腔鏡検査（鼻腔の鏡検査） ■肺機能検査（別紙1「肺機能検査ガイドライン」参照） ■尿中ニッケルバイオモニタリング（6.4項参照；追跡検診では省略） 追加検査： ■不明な場合：副鼻腔のイメージング診断 ■不明なアレルギー性皮膚疾患の場合：皮膚科の追加検査 ■肺がんまたは肺線維症の臨床的疑いがある場合：呼吸器科の検査	•血液検査（詳細） •血清クレアチニン •肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT） •尿検査（多項目検査ストリップ、沈渣） •尿中水銀のバイオモニタリング •特に高濃度または長期の曝露の場合、または水銀中毒が疑われる場合：書字検査（震えの傾向） •心理神経機能検査 •腎疾患の疑いがある場合：尿中のα1-ミクログロブリンまたはN-アセチル-β-D-グルコサミダーゼ	■初回検査と同様 追加検査： クロム、ニッケル、アルミニウム、鉛、カドミウムのバイオモニタリング。	■呼吸器系および循環器系の検査 •スパイロメトリー •X線撮影の実施に関する正当な適応は、StrlSchG第83条およびStrSchV第119条の規定に従い、個々のケースにおける追跡検査において検討する必要があります。経験上、鉱物粉塵による肺の職業病の診断のためには、長期間の曝露（約10～15年）後にX線撮影を実施することが適切である。さらに、曝露の程度も考慮する必要がある。 •ただし、肺疾患の臨床的疑いがある場合、年齢や曝露開始時期に関わらず、胸部X線検査の適応が認められる。 •X線写真は、病歴の結果に応じて、1年以内のものを使用することができる。		■初回検査と同様 ■追加でバイオモニタリング ■不明な場合：必要に応じて専門医による追加検査	■神経学的検査（初期評価） ■尿検査（多項目検査（試験紙法 ■有効なバイオマーカーが存在する場 置の一環として行われる検査では、通 ■上記の検査で明確にならない場合、 –腎臓および肝機能の追加検査（例 は微量血尿または1-ミクログロブリン –神経学的・精神科的検査（必要に ※注：健診項目については3物質が

		テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	塩化ビニル
6.3.2 急性/亜急性影響 Akute/subakute Wirkungen		■中枢神経系異常 •麻酔作用を伴い、意識障害のすべての段階を経て、致死的な深い麻酔状態に至る •頭痛、めまい •倦怠感 ■末梢神経系異常 •四肢の運動障害、感覚障害、栄養障害 ■呼吸器異常 •まれに、テトラクロロエチレン蒸気に直接曝露することで肺水腫を引き起こす ■消化器異常 •胃腸障害から出血性腸炎に至る •食欲不振、腹部不快感 •吐き気、嘔吐、腹痛/痙攣 ■皮膚粘膜異常 •皮膚および粘膜の急性刺激はまれ（咳、呼吸困難） •アレルギー性皮膚疾患 ■その他 •まれに、身体的努力やアルコール摂取後に心室細動による突然の遅発性死亡が発生する。	■中枢神経系異常 •麻酔作用（すべての段階の酩酊状態から致死的な深い麻酔状態まで） •食欲不振、吐き気、嘔吐感 •頭痛、めまい ■皮膚粘膜異常 •目、呼吸器、皮膚の刺激症状 ■循環器異常 •心拍数異常の発生 •胸痛	高濃度の塩化ビニルへの急性曝露は、中枢神経障害 •疲労、めまい •前麻酔症候群、麻酔作用
6.3.3　慢性影響 Chronische Wirkungen		•さまざまな形態の皮膚炎 •上気道の粘膜刺激 •脳症 •心理・自律神経系の過敏症の増強 •胃腸障害 •発がん作用の疑い 肝実質組織への影響は可能性がありますが、肝障害は通常軽度です。重症例は稀で、肝細胞壊死を伴う場合があり、場合によっては腎臓が関与する肝腎症候群の形態を呈することがあります。	■高濃度曝露時の中枢神経系への影響 ■発がん性の疑い ※臨界毒性効果は、一酸化炭素またはCOヘモグロビンの生成	■肝障害（悪性腫瘍を含む：血管内皮肉腫、肝細胞がん）、 ■血流障害（特にレイノー症候群）、 ■骨格系異常 •末梢骨壊死 •指骨の形態変化（ドラムスティック指） •皮膚硬化症様変化（VC病：非常に高い曝露量の場合にのみ）
7.2.2 臨床検査 Klinische Untersuchungen	初回検査 Erstuntersuchung	を含む）、異常がある場合は沈渣検査を追加） （ASAT） アチニン 心電図 合して記載されている		■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、沈渣） •血液検査（血小板を含む） •肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT） •アルカリフォスファターゼ •初回バイオモニタリング（空腹時値）
	追跡調査 Nachuntersuchung	を含む）、異常が認められる場合は沈渣検査を追加） 含は、バイオモニタリングを追加（トリクロロエチレンに関する事後予防措常、バイオモニタリングは省略可能）。 以下の検査を補足的に実施： ：トリクロロエチレンへの曝露の潜伏期間が10年以上である場合、また排泄量増加が認められる場合、腎臓の超音波検査） 応じて心理検査を含む）。 合して記載されている		■初回検査と同様 追加で： バイオモニタリング（追跡検査のみ；尿中のチオジグリコール酸）

表3　OSHAの医療検査およびモニタリングの要件ガイドに記載のある標的健康影響（日本の特別規則対象物質を抽出）

Medical Screening and Surveillance Requirements in OSHA Standards: A Guide(2014)

	Acrylonitrile	Arsenic (Inorganic)	Asbestos (General Industry)	Asbestos (Construction and Shipyards)	Benzene	1,3−Butadiene
Examination includes special emphasis on these body systems	Respiratory,gastrointesti nal1,thyroid, skin, neuro logical (peripheral and central)	Skin, nasal	Respiratory, cardiovascular, gastrointestinal	Pulmonary and gastrointestinal	Hemopoietic; add cardiopul monary if respiratory protec tion used at least 30 days/year, (initially, then every 3 years)	Liver, spleen, lymph nodes, and skin
Work and medical history	Required for all exams	Required for all exams with focus on respiratory symptoms; includes smoking history	Required for all exams standardized form required; see standard, Appendix D parts 1 and 2.	Required for all exams standardized form required; see standard, Appendix D parts 1 and 2.	Required for initial and periodic exams (pre− place ment exam requires special history)	Required annually and for all examinations2; standard ized form or equivalent; includes comprehensive occupational and health history; see standard, Appendices F and C
Chest x−ray	Yes	Yes	Yes − see standard Table 1 for frequency; B reader, board eligible/certified radiologist or physician with expertise in pneumoconioses required; see standard, Appendix E for x−ray interpretation and classification	Yes − B reader, board eligible/certified radiologist or physician with expertise in pneumoconioses re quired; see standard, Appendix E for x−ray interpretation and classification requirements	No	No
Pulmonary function test (PF	No	No	FVC, FEV1	FVC, FEV1	Initially and every 3 years if respiratory protection used 30 days/year; specific tester requirements.	No
Other required tests	Fecal occult blood	No	No	No	CBC, differential, other spe cific blood tests; repeated as required; see standard.	Annually, CBC with differ ential and platelet count; also within 48 hrs. after ex posure in an emergency situation and repeated monthly for 3 more months.

	Cadmium	Chromium(VI)	Lead	Methylene Chloride
Examination includes special emphasis on these body systems	Respiratory, cardiovascular (BP), urinary, and for males over 40 – prostate palpation.	Skin and respiratory tract	Teeth, gums, hematologic, gastrointestinal, renal, car diovascular (BP), neurologi cal; pulmonary status if respiratory protection used.	Lungs, cardiovascular (including BP and pulse), liver, nervous, skin; extent of exam determined by examiner based on employee's health status, work, and medical history
Work and medical history	Required for preplacement and periodic exams2; standardized form required; see Appendix D	Required for all exams; includes past, present and anticipated future exposure; any history of respiratory system dysfunction, asthma, dermatitis, skin ulceration or nasal septum perforation; smoking status and history.	Required for all exams; includes reproductive his tory, past lead exposure, both work/non–work, and history of specific body systems; see standard.	Required for all exams; example of work and med ical history form provided in standard, Appendix B
Chest x–ray	Yes	No	No	No
Pulmonary function test (PF	FVC, FEV1	No	No – unless deemed neces sary by physician	No – unless deemed necessary by physician or other licensed healthcare professional
Other required tests	Cadmium in urine, beta–2 microglobulin in urine, cadmium in blood, CBC, BUN, serum creatinine, urinalysis; see standard.	No	Hemoglobin, hematocrit, ZPP, BUN, serum creatinine, urinalysis with micro, blood lead levels, peripheral smear morphology, red cell indices1, 5; if requested by employee, pregnancy test ing and fertility testing (female/male)	Laboratory surveillance may include tests as determined by examiner including "before and after shift tests"; see standard, Appendix B

表１：特別規則対象物質の国外情報源の標的健康影響・健康診断項目の主な差異

物質名	情報源	特化則との比較	
		標的健康影響	健康診断項目
アクリロニトリル	ILO/OSHA	甲状腺の記載（OSHA）	
塩化ビニル	DGUV	おおむね同じ	二次健診として尿中代謝物の記載（OSHA）
塩素	ILO	COPD・肺気腫の記載（ILO）	
カドミウム	DGUV/OSHA	肺がん・腎細胞がんの記載（DGUV） 循環器、前立腺の記載（OSHA）	・初期の検査で呼吸機能検査（DGUV） ・肝機能検査の記載（DGUV)は理由不明
アンチモン	ILO	呼吸器及び腎障害、溶血性貧血、歯牙異常の記載（ILO）	
ジクロロメタン	DGUV/OSHA	循環器症状の記載（DGUV/OSHA）	
六価クロム	DGUV/OSHA	溶血等血液系障害の記載（DGUV）	
水銀	ILO/DGUV	おおむね同じ	初期検査として尿中水銀濃度測定の記載、二次検査として尿中微量タンパク測定の記載（DGUV）
スチレン	DGUV	35条には反映されていないが血液系腫瘍（安衛法令：R02改正）	糖代謝異常検査（DGUV)は理由不明
テトラクロロエタン	DGUV	35条には反映されていないが肝臓腫瘍（安衛法令：R02改正）	
トリクロロエチレン	DGUV	35条には反映されていないが腎臓腫瘍（安衛法令：R02改正）	
1,3-ブタジエン	OSHA	肝臓・膵臓・リンパ節及び皮膚障害の記載（OSHA） GHS発がん性区分１A（GHS政府分類:2017分類） GHS生殖毒性区分１B（GHS政府分類:2017分類）	発がん性にかかる記述がない
二硫化炭素	ILO/DGUV	動脈硬化性疾患に伴う二次性循環器糖疾患の記載（ILO、DGUV）	初期検査でのエルゴメーター検査（DGUV）
ジメチルホルムアミド	DGUV	骨髄抑制、急性骨髄性白血病害の記載（ILO） GHS発がん性区分１B（GHS政府分類:2024分類） 生殖毒性の記載（ILO)およびGHS生殖毒性区分１B（GHS政府分類:2024分類）	
トルエン	DGUV	骨髄抑制、急性骨髄性白血病、末梢神経障害の記載（ILO） 生殖毒性の記載（ILO)およびGHS生殖毒性区分１A（GHS政府分類:2012分類）	
ヘキサン	ILO	皮膚粘膜刺激性の記載（ILO）	
メタノール	DGUV	骨髄抑制、腎障害の記載（ILO） 生殖毒性の記載（ILO)およびGHS生殖毒性区分１B（GHS政府分類:2009分類）	
鉛	ILO/DGUV/OSHA	急性中枢神経症状、腎障害の記載(ILO) 循環器異常の記載(OSHA) GHS生殖毒性区分1A（GHS政府分類:2025分類）	初期検査として尿中微量タンパク測定の記載（DGUV） 生殖毒性にかかる検査（必要に応じOSHA）
4メチル鉛	DGUV	循環器異常の記載(OSHA)	
石綿	DGUV/OSHA	喉頭がん・卵巣がんの記述（DGUV）	

表５：個別規制物質の標的健康影響および健康影響モニタリング項目のデータシート

ID	10	物質名２	アクリロニトリル	CASRN修正	107-13-1
規則	特化則・第２類物質				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分2	皮膚感作性	区分1
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分1B
皮膚腐食性／刺激性	区分2	発がん性	区分1B
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分1	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1 （神経系、呼吸器、血液系、肝臓、腎臓、精巣）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1 （神経系、肝臓、腎臓、血液系）、区分3 （気道刺激性、麻酔作用）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１	呼吸器系の障害	別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２	消化器系の障害	別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３	中枢神経系の障害	別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４	皮膚および粘膜の障害	別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	皮膚障害	疾病名称５	
疾病名称２	前眼部障害	疾病名称６	
疾病名称３	気道障害	疾病名称７	
疾病名称４		疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響	・Acute diseases caused by acrylonitrile・Respiratory tract irritation・Burns and corrosions of respiratory tract・Burns and corrosions of external body surface・Burn and corrosion of mouth, pharynx and oesophagus・Burns and corrosions of eye and adnexa・Conjunctivitis・Irritant contact dermatitis・Acute systemic poisoning・Allergic contact dermatitis		Respiratory,gastro intesti nal1,thyroi d, skin, neuro logical (peripheral and central)
慢性影響	・Corneal ulcer		
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般	○	血液系	○	皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等		泌尿器全般		歯牙		（精巣）
末梢		肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○	
呼吸器全般	○	腎障害全般	○	泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状	○	腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性	○	
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性		

ID	10	物質名２	アクリロニトリル	CASRN修正	107-13-1
規則	特化則・第２類物質				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１	頭痛	自他覚症状４	
自他覚症状２	めまい	自他覚症状５	
自他覚症状３	嘔吐	自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査・二　作業条件の簡易な調査・三　アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦(けん)怠感、易疲労感、悪心、嘔(おう)吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査・四　頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦(けん)怠感、易疲労感、悪心、嘔(おう)吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

特別規則二次

・一　作業条件の調査・二　血漿(しょう)コリンエステラーゼ活性値の測定・三 肝機能検査

DGUV

初期検査

追加検査

OSHA

問診

Required for all exams

胸部X線の要否　Yes

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

Fecal occult blood

NIOSH2000の提案項目（※１

CXr FOB BL(Lac pH)BLC BLP BLP(Bicarb) BLS ExA PFT RBC U

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	16	物質名２	塩化ビニル	CASRN修正	75-01-4
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分に該当しない（分類対象外	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	区分に該当しない（分類対象外	生殖毒性	区分2
皮膚腐食性／刺激性	区分2	発がん性	区分1A
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（肝臓、神経系、血管、血液、呼吸器、精巣、骨）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（中枢神経系）、区分3（麻酔作用）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１	呼吸器系の障害	別表3標的健康影響１	肝血管肉腫
別表3標的臓器２	中枢神経系の障害	別表3標的健康影響２	門脈圧亢進症
別表3標的臓器３	肝臓の障害	別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４	指端骨溶解症	別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	中枢神経系抑制	疾病名称５	門脈圧亢進
疾病名称２	皮膚障害	疾病名称６	
疾病名称３	レイノー現象	疾病名称７	
疾病名称４	指端骨溶解	疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項　肝血管肉腫又は肝細胞がん

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響		高濃度の塩化ビニルへの急性曝露は、中枢神経障害•疲労、めまい、•前麻酔症候群、麻酔作用	
慢性影響		■肝障害（悪性腫瘍を含む：血管内皮肉腫、肝細胞がん）、■血流障害（特にレイノー症候群）、■骨格系異常•末梢骨壊死•指骨の形態変化（ドラムスティック指） •皮膚硬化症様変化（VC病：非常に高い曝露量の場合にのみ）	
悪性腫瘍	・Liver angiosarcoma・Hepatocellular carcinoma		

類型

神経全般	○	肝障害全般	○	血液系	○	皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等	○	泌尿器全般		歯牙		指端骨溶解症、門脈圧亢進症
末梢		肝臓腫瘍等	○	泌尿器炎症等		発がん性	○	
呼吸器全般	○	腎障害全般		泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状		腎臓腫瘍等		眼の刺激性		皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性		

ID	16	物質名２	塩化ビニル	CASRN修正	75-01-4
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	肝又は脾の腫大
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査（当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）・二　作業条件の簡易な調査（当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）・三　塩化ビニルによる全身倦(けん)怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸(だん)、黒色便、手指の蒼(そう)白、疼(とう)痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査・四　頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦(けん)怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸(だん)、黒色便、手指の疼(とう)痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査・五　肝又は脾(ひ)の腫大の有無の検査・六　血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査・七　当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査

特別規則二次

・一　作業条件の調査（当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）・二　肝又は脾(ひ)の腫大を認める場合は、血小板数、ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ（γ－ＧＴＰ）及びクンケル反応（ＺＴＴ）の検査・三　医師が必要と認める場合は、ジアノグリーン法（ＩＣＧ）の検査、血清乳酸脱水素酵素（ＬＤＨ）の検査、血清脂質等の検査、特殊なエツクス線撮影による検査、肝若しくは脾(ひ)のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経学的検査

DGUV

初期検査

■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、沈渣）•血液検査（血小板を含む）•肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT）•アルカリフォスファターゼ•初回バイオモニタリング（空腹時値）

追加検査

■初回検査と同様追加で：バイオモニタリング（追跡検査のみ；尿中のチオジグリコール酸）

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

BLS(APh Br GGT SGOT SGPT) APh BLS(LDH) CXr ExA LFT(APh Br GGT SGOT SGPT) LFT PFT(FVC FEV1) RBC U Ua(Alb BL) Usg

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	17	物質名２	塩素	CASRN修正	7782-50-5
規則	特化則・第２類物質				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分2	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分に該当しない（分類対象外	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	区分に該当しない（分類対象外	生殖毒性	区分に該当しない
皮膚腐食性／刺激性	区分1	発がん性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分1	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（呼吸器、肝臓、腎臓）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（呼吸器）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１	呼吸器系の障害	別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２	歯牙の障害	別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３	皮膚および粘膜の障害（特に眼、上気道）	別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	皮膚障害	疾病名称５	
疾病名称２	前眼部障害	疾病名称６	
疾病名称３	気道・肺障害	疾病名称７	
疾病名称４	歯牙酸蝕	疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響	・Irritant contact dermatitis・Chemical burns and corrosions of external body surface・Burns and corrosions of eyes and adnexa・Burns and corrosions of internal organs・Respiratory tract irritation・Acute chemical pneumonitis and bronchitis・Pulmonary oedema・Upper respiratory inflammation・Reactive airways dysfunction syndrome (RADS)・Irritant-induced occupational asthma		
慢性影響	・Erosion of the teeth・Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), Emphysema, Chronic bronchiolitis, Pulmonary fibrosis・Chronic rhinitis		
悪性腫瘍			

類型

神経全般		肝障害全般	○	血液系		皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢		肝炎等		泌尿器全般		歯牙	○	
末梢		肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性		
呼吸器全般	○	腎障害全般	○	泌尿器腫瘍等		生殖毒性		
呼吸器刺激症状	○	腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性		

ID	17	物質名２	塩素	CASRN修正	7782-50-5
規則	特化則・第２類物質				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	呼吸器症状、眼の症状等
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	眼症状等の「等」には皮膚症状および歯の変化がある事
別表3自他覚症状（現症）	せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	歯の変化等の「等」には皮膚炎および皮膚潰瘍がある事
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査・二　作業条件の簡易な調査・三　塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査・四　せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

特別規則二次

・一　作業条件の調査・二　胸部理学的検査又は胸部のエックス線直接撮影による検査・三　呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査

DGUV

初期検査

追加検査

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

BGa CXr Ecg　PFT(FVC FEV1) SpC WBC

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	21	物質名２	カドミウム及びその化合物	CASRN修正	7440-43-9
規則	特化則・第２類物質				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	区分1	生殖毒性	区分2
皮膚腐食性／刺激性	分類できない	発がん性	区分1A
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（腎臓、肺、血液、骨、呼吸器）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（肺、呼吸器）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１	呼吸器系の障害	別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２	消化器系の障害	別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３	腎臓の障害	別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	気道・肺障害	疾病名称５	
疾病名称２	腎障害	疾病名称６	
疾病名称３	骨軟化	疾病名称７	
疾病名称４		疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響		カドミウム蒸気またはカドミウム煙の吸入による鼻、のど、気管、気管支の粘膜の刺激	Respiratory, cardiovascular (BP), urinary, and for males over 40 – prostate palpation.
慢性影響		＜非悪性疾患＞■呼吸器系と肺：慢性閉塞性呼吸器疾患および上気道における炎症性刺激状態、肺気腫■腎臓：毒性性尿細管障害■骨：骨軟化症＜悪性疾患＞■肺がん■腎細胞がん	
悪性腫瘍	・Lung cancer		

類型

神経全般		肝障害全般		血液系	○	皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢		肝炎等		泌尿器全般		歯牙		骨軟化
末梢		肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○	
呼吸器全般	○	腎障害全般	○	泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状	○	腎臓腫瘍等		眼の刺激性		皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系	○	皮膚の刺激性		呼吸器感作性		

ID	21	物質名２	カドミウム及びその化合物	CASRN修正	7440-43-9
規則	特化則・第２類物質				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	せき、たん、喉のいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	せき、たん、喉のいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	体重減少等の「等」には胸痛および疲労感がある事
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査・二　作業条件の簡易な調査・三　カドミウム又はその化合物によるせき、たん、喉のいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査・四　せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査・五　血液中のカドミウムの量の測定・六　尿中のベータ２－ミクログロブリンの量の測定

特別規則二次

・一　作業条件の調査・二　医師が必要と認める場合は、尿中のカドミウムの量の測定、尿中のアルファ１－ミクログロブリンの量若しくはＮ－アセチルグルコサミニターゼの量の測定、腎機能検査、胸部エックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査又は喀痰(かくたん)の細胞診・三　呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査

DGUV

初期検査

■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む））■鼻呼吸の簡易検査■スパイロメトリー（別紙1、ガイドライン「肺機能検査」）■血清クレアチニン■尿中β2-ミクログロブリン■BSGまたはCRP■肝機能酵素（SGOT、SGPT、γ-GT）■バイオモニタリング：尿中カドミウム測定（既存の曝露評価のため）

追加検査

•尿検査（多項目検査（試験紙法を含む））•鼻呼吸の簡易検査

•スパイロメトリー•血清クレアチニン•尿中β2-ミクログロブリン•BSGまたはCRP•肝機能酵素（SGOT、SGPT、γ-GT）•血液中のカドミウムのバイオモニタリング（追跡検査の場合は省略）および尿中のカドミウム•腎超音波検査（長期曝露後）高カドミウム曝露の場合の追加検査：•嗅覚検査（例：スニッフィンスティック）•鼻内視鏡検査および機能検査による鼻呼吸検査（例：前鼻腔内圧測定）長期高濃度曝露後の追跡検査において、必要に応じて胸部画像診断を実施。ただし、既往歴および/または検査結果に異常が認められる場合（適応基準を満たす場合）に限る。

OSHA

問診

Required for preplacement and periodic exams2; standardized form required; see Appendix D

胸部X線の要否	Yes
呼吸機能検査の要否	

その他の検査項目

Cadmium in urine, beta−2 microglobulin in urine, cadmium in blood, CBC, BUN, serum creatinine, urinalysis; see standard.

NIOSH2000の提案項目（※１

BL Ua(βM) BGa BT CBC CXr Ecg LFT PFT(FVC FEV1) SpC U Ua Ua(Cyt)

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	29	物質名２	三酸化二アンチモン	CASRN修正	1309-64-4
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	分類できない	発がん性	区分1B
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分に該当しない	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（呼吸器）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分2（呼吸器）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	皮膚障害	疾病名称５	
疾病名称２	前眼部障害	疾病名称６	
疾病名称３	心筋障害	疾病名称７	
疾病名称４	胃腸障害	疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響	・Respiratory irritation・Upper respiratory tract inflammation・Chemical pulmonary oedema・Burn and corrosion of respiratory tract・Chemical burns and corrosions of external body surface・Burn and corrosion of internal organs・Chemical burn and corrosion of eye and adnexa・Conjunctivitis・Keratitis・Irritant contact dermatitis・Acute toxic haemolytic anaemia・Acute toxic renal failure with tubular necrosis		
慢性影響	・Chemical bronchitis and pneumonitis・Corneal ulcer・Pustular dermatitis (antimony spots)・Nose septal ulceration・Deposits on teeth		
悪性腫瘍			

類型

神経全般		肝障害全般		血液系		皮膚炎	○	物質特異的愁訴等	
中枢		肝炎等		泌尿器全般		歯牙		アンチモン皮疹	
末梢		肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○		
呼吸器全般	○	腎障害全般		泌尿器腫瘍等		生殖毒性			
呼吸器刺激症状	○	腎臓腫瘍等		眼の刺激性		皮膚感作性			
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性		呼吸器感作性			

ID	29	物質名２	三酸化二アンチモン	CASRN修正	1309-64-4
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	せき、たん、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	せき、たん、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業業務の経歴の調査（当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）・二　作業条件の簡易な調査（当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）・三　三酸化二アンチモンによるせき、たん、頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査（頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）・四　せき、たん、頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査（頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）・五　医師が必要と認める場合は、尿中のアンチモンの量の測定又は心電図検査（尿中のアンチモンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）

特別規則二次

・一　作業条件の調査・二　医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査

DGUV

初期検査

追加検査

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

BL BT Cxr Ecg PFT(FVC FEV) U

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	38	物質名２	ジクロロメタン（別名二塩化メチレン）	CASRN修正	75-09-2
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分4	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分2
皮膚腐食性／刺激性	区分2	発がん性	区分1A
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2A	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（中枢神経系、肝臓、生殖器（男性））
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（中枢神経系、呼吸器）、区分3（麻酔作用）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１	発がん性のおそれ	別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２	肝機能障害	別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３	中枢神経症状	別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	中枢神経系抑制	疾病名称５	
疾病名称２	前眼部障害	疾病名称６	
疾病名称３	気道・肺障害	疾病名称７	
疾病名称４		疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響		■中枢神経系異常•麻酔作用（すべての段階の酩酊状態から致死的な深い麻酔状態まで）•食欲不振、吐き気、嘔吐感•頭痛、めまい■皮膚粘膜異常•目、呼吸器、皮膚の刺激症状■循環器異常•心拍数異常の発生•胸痛	Lungs, cardiovascular (including BP and pulse), liver, nervous, skin; extent of exam determined by examiner based on employee's health status, work, and medical history
慢性影響		■高濃度暴露時の中枢神経系への影響■発がん性の疑い※臨界毒性効果は、一酸化炭素またはCOヘモグロビンの生成	
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般	○	血液系		皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等	○	泌尿器全般		歯牙		（発がんの記載修正）（生殖器）
末梢		肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○	
呼吸器全般	○	腎障害全般		泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状		腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性		

ID	38	物質名２	ジクロロメタン（別名二塩化メチレン）	CASRN修正	75-09-2
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)・二　作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)・三　ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、悪心、嘔(おう)吐、黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)・四　集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、悪心、嘔(おう)吐、黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)・五　血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ－GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査

特別規則二次

・一　作業条件の調査（当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）・二　医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、ＣＡ19－9等の血液中の腫瘍(しゅよう)マーカーの検査、血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定（血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定及び呼気中の一酸化炭素の量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）

DGUV

初期検査

追加検査

OSHA

問診

Required for all exams; example of work and med ical history form provided in standard, Appendix B

胸部X線の要否　No

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

Laboratory surveillance may include tests as determinedby examiner including “before and after shift tests”; see standard, Appendix B

NIOSH2000の提案項目（※１

Lab(COHb Ecgr Hct LFT Chol) BL BL(COHb) BL(COHb EOS) BL(COHb PNS) BL(EOS) CBC ExA ExA(EOS) LFT U

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	42	物質名２	重クロム酸及びその塩*2	CASRN修正	13530-68-2
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）		呼吸器感作性	区分1
急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない	皮膚感作性	区分1
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	区分1	発がん性	区分1A
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分1	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（呼吸器系、腎臓、肝臓）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（呼吸器系、腎臓、肝臓）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１		疾病名称５	
疾病名称２		疾病名称６	
疾病名称３		疾病名称７	
疾病名称４		疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項　肺がん又は上気道のがん

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響		■クロムトリオキシド、クロム酸塩、または二クロム酸塩の粉塵や蒸気への急性局所曝露によるは、涙液分泌を伴う結膜炎および目の角膜損傷皮膚■クロムトリオキシド、クロム化合物、または二クロム化物による皮膚の損傷（特に擦過傷や裂傷に侵入すると、特徴的な治癒の悪い「クロム潰瘍」を引き起こす）。■クロム（VI）化合物による皮膚感作に伴うアレルギー性接触性皮膚炎消化管■大量経口摂取による消化管粘膜および口腔の黄変色、嚥下困難、声門の腐食、胃の灼熱痛、嘔吐（場合によっては誤嚥性肺炎）、血便、循環不全、痙攣、意識喪失、腎不全、昏睡状態での死亡■クロムトリオキシド、クロム酸塩、または二クロム酸塩の粉塵または蒸気の高濃度での吸入による鼻粘膜の損傷（充血、カタル、上皮壊死）、上気道と肺の刺激症状■凝固障害、溶血、貧血等の血液系障害	
慢性影響		■い皮膚潰瘍（無痛、赤い壁状の縁、壊死性底部、場合によっては痂皮形成）の発生；これらの深い潰瘍は、裂傷、亀裂、または小さな外傷性皮膚損傷のある部位にのみ発生■鼻中隔の変化A： 赤み、腫れ、分泌物の増加B： 潰瘍、出血、痂皮および痂皮の形成C： 鼻中隔の穿孔C I： 針の頭ほどの大きさC II： レンズほどの大きさC III： より大きなから部分的な鼻中隔欠損■咽頭および喉頭のカタル症状■慢性気管支炎、まれに気管支喘息を伴う■その他　唾液と共に摂取された微量のクロムによる胃腸疾患可能性、吐き気、胃痛、下痢（場合によっては血便を伴う）および肝障害の可能性	
悪性腫瘍			

類型

神経全般		肝障害全般	○	血液系		皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢		肝炎等		泌尿器全般		歯牙		皮膚粘膜の小潰瘍（クロム酸とカテゴリの統一）、鼻中隔穿孔
末梢		肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○	
呼吸器全般	○	腎障害全般	○	泌尿器腫瘍等		生殖毒性		
呼吸器刺激症状		腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性	○	
呼吸器腫瘍等	○	消化器系		皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性	○	

ID	42	物質名２	重クロム酸及びその塩*2	CASRN修正	13530-68-2
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	せき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	せき、たん、胸痛等
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔所見、皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	潰瘍等の「等」には湿疹がある事

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査（当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）・二　作業条件の簡易な調査（当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）・三　クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔(くう)の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査・四　せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査・五　鼻粘膜の異常、鼻中隔穿(せん)孔等の鼻腔(くう)の所見の有無の検査・六　皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査・七　令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査

特別規則二次

・一　作業条件の調査（当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。）・二　医師が必要と認める場合は、エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査

DGUV

初期検査

■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、沈渣）■肺機能検査（肺機能検査ガイドライン参照）■血液検査（血球検査）■皮膚検査（湿疹、亀裂、アレルギー症状、治癒不良の傷に注意）■鼻腔鏡検査（適応がある場合、例：エアロゾル曝露）■既往歴で曝露が確認されている場合：バイオモニタリング、尿中および赤血球中のクロム濃度測定（基準値）

追加検査

■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、沈渣）■肺機能検査（肺機能検査ガイドライン参照）■血液検査（血球検査）■皮膚検査（湿疹、亀裂、アレルギー症状、治癒不良の傷や潰瘍に注意）•■鼻腔鏡検査（適応がある場合、例：エアロゾル曝露）■バイオモニタリング：尿中および赤血球中のクロム測定不明な場合における追加検査：■耳鼻咽喉科検査■呼吸器科検査胸部画像検査（既往歴および/または検査で異常が認められる場合のみ - 適応基準を満たす場合）不明な場合における追加検査：耳鼻咽喉科検査

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	43	物質名２	水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）*2	CASRN修正	7439-97-6
規則	特化則・第２類物質				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分1	皮膚感作性	区分1
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分1A
皮膚腐食性／刺激性	分類できない	発がん性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（神経系、心血管系、血液、肝臓、歯肉）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（呼吸器系、心血管系、腎臓、肝臓、中枢神経系）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１	中枢神経系の障害	別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２	腎臓の障害	別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	振せん、歩行障害等の神経障害	疾病名称５	
疾病名称２	焦燥感・記憶減退・不眠等の精神障害	疾病名称６	
疾病名称３	口腔粘膜障害	疾病名称７	
疾病名称４	腎障害	疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響	・Toxic encephalopathy・Upper respiratory inflammation・Acute chemical bronchitis and pneumonitis・Acute chemical bronchiolitis・Chemical pulmonary oedema・Irritant contact dermatitis・Acute conjunctivitis・Allergic contact dermatitis	■腎機能障害（多尿、アルブミン尿、赤血球尿）から無尿まで■吸入による気道刺激（気管支炎、気管支肺炎）■口腔粘膜の炎症（口内炎、歯肉炎、粘液性潰瘍、特に虫歯のある部位に多く、歯の動揺）	
慢性影響	・Gastrointestinal toxicity・Disturbances of taste and smell・Toxic nephropathy・Mercury pigmentation・Chronic gingivitis・Toxic polyneuropathy・Chronic progressive renal failure・Chronic kidney dysfunction	■中枢神経系の障害：−過興奮−不安感、緊張感、気分不安定（水銀中毒症）−指の震え、腕、脚、頭の震え（水銀震え）および吃音や不明瞭な発声（水銀吃音症） ■自律神経症状の増強−極端な濃度でのみ前眼部レンズ嚢の不可逆的な褐色変色（水銀レンズ症）■末梢神経障害■アレルギー性接触性皮膚炎	
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般	○	血液系	○	皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等		泌尿器全般		歯牙		中枢神経症状特異的
末梢	○	肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性		
呼吸器全般	○	腎障害全般	○	泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状		腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性	○	
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性		呼吸器感作性		

ID	43	物質名２	水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）*2	CASRN修正	7439-97-6
規則	特化則・第２類物質				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査・二　作業条件の簡易な調査・三　水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査・四　頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査・五　尿中の潜血及び蛋(たん)白の有無の検査

特別規則二次

・一　作業条件の調査・二　神経学的検査・三　尿中の水銀の量の測定及び尿沈渣(さ)検鏡の検査

DGUV

初期検査

•血液検査（血球検査）•血清クレアチニン•肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT）•尿検査（多項目検査ストリップ、沈渣）•尿中水銀のバイオモニタリング•後日の経過観察のための筆跡サンプル

追加検査

•血液検査（詳細）•血清クレアチニン•肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT）•尿検査（多項目検査ストリップ、沈渣）•尿中水銀のバイオモニタリング•特に高濃度または長期の曝露の場合、または水銀中毒が疑われる場合：書字検査（震えの傾向）•心理神経機能検査•腎疾患の疑いがある場合：尿中のα1-ミクログロブリンまたはN-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

BL BL(EOS) BL(ESW) BL(EWW) BT BUN NCS Neur TFT U U(PNS) U(PTS) U(Sed) Ua

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	44	物質名２	スチレン	CASRN修正	100-42-5
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分4	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分1B
皮膚腐食性／刺激性	区分2	発がん性	区分1B
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2A	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（中枢神経系、末梢神経系、聴覚器、視覚器、呼吸器、肝臓）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（中枢神経系）、区分3（気道刺激性、麻酔作用）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	皮膚障害	疾病名称５	末梢神経障害
疾病名称２	前眼部障害	疾病名称６	
疾病名称３	視覚障害	疾病名称７	
疾病名称４	気道障害	疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響		■目と上気道の粘膜刺激■中枢神経系異常（基準値を大幅に超過した濃度（約50 ppm））•注意力、集中力、記憶力の障害（短期記憶）•異常な疲労感•頻発する頭痛•めまい•吐き気•酔ったような感覚•意識喪失に至るまでのめまい	
慢性影響		■中枢神経系への影響•心理運動機能障害•認知機能障害（反応時間の遅延、記憶力の低下）•後天性の色覚障害（青黄色識別困難）■末梢神経系への影響•神経伝導速度の遅延•前庭機能障害■皮膚粘膜障害皮膚や粘膜に強い刺激	
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般	○	血液系		皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等		泌尿器全般		歯牙		視覚障害、聴覚障害
末梢	○	肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○	
呼吸器全般	○	腎障害全般		泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状	○	腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性		

ID	44	物質名２	スチレン	CASRN修正	100-42-5
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１	頭痛	自他覚症状４	
自他覚症状２	めまい	自他覚症状５	
自他覚症状３	嘔吐	自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査・二　作業条件の簡易な調査・三　スチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸(けい)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査・四　頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸(けい)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査・五　尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定・六　白血球数及び白血球分画の検査・七　血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及び血清ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ（γ－ＧＴＰ）の検査

特別規則二次

・一　作業条件の調査・二　医師が必要と認める場合は、血液像その他の血液に関する精密検査、聴力低下の検査等の耳鼻科学的検査、色覚検査等の眼科学的検査、神経学的検査、肝機能検査（血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及び血清ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ（γ－ＧＴＰ）の検査を除く。）、特殊なエツクス線撮影による検査又は核磁気共鳴画像診断装置による画像検査

DGUV

初期検査

■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）■神経学的検査（運動機能、反射状態、感覚、両側内果部の振動感覚検査（パレスチノメトリー）、協調性）■スチレンの刺激性または神経毒性作用に関する検査■バイオモニタリング−初回検査時は正当な理由がある場合のみ追加検査：•γ-GT、SGPT（ALAT）、SGOT（ASAT）•血液検査（血球検査）•血糖値 / HbA1c•スパイロメトリー•不明な場合、必要に応じて専門医の追加検査

追加検査

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

BL BL(EOS) BL(EWW) BL(PNS) BL(PTS) ExA ExA(DE) ExA(PNS) Neur U U(EOS) U(EWW) U(PTS) U(16H)

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	46	物質名２	テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン）	CASRN修正	127-18-4
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分4	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分2、授乳に対するまたは授乳
皮膚腐食性／刺激性	区分2	発がん性	区分1B
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2B	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（神経系、肝臓、呼吸器）、区分2（腎臓）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（中枢神経系、呼吸器、肝臓）、区分3（麻酔作用）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	中枢神経系抑制	疾病名称５	
疾病名称２	気道・肺障害	疾病名称６	
疾病名称３	気道・肺障害	疾病名称７	
疾病名称４	肝障害	疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響		■中枢神経系異常●麻酔作用を伴い、意識障害のすべての段階を経て、致死的な深い麻酔状態に至る●頭痛、めまい●倦怠感■末梢神経系異常●四肢の運動障害、感覚障害、栄養障害■呼吸器異常●まれに、テトラクロロエチレン蒸気に直接曝露することで肺水腫を引き起こす■消化器異常●胃腸障害から出血性腸炎に至る●食欲不振、腹部不快感●吐き気、嘔吐、腹痛/痙攣■皮膚粘膜異常●皮膚および粘膜の急性刺激はまれ（咳、呼吸困難）●アレルギー性皮膚疾患■その他●まれに、身体的努力やアルコール摂取後に心室細動による突然の遅発性死亡が発生する。	
慢性影響		●さまざまな形態の皮膚炎●上気道の粘膜刺激●脳症●心理・自律神経系の過敏症の増強●胃腸障害●発がん作用の疑い肝実質組織への影響は可能性がありますが、肝障害は通常軽度です。重症例は稀で、肝細胞壊死を伴う場合があり、場合によっては腎臓が関与する肝腎症候群の形態を呈することがあります。	
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般	○	血液系		皮膚炎	○	物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等		泌尿器全般		歯牙		
末梢		肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○	
呼吸器全般	○	腎障害全般	○	泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状		腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性		

ID	46	物質名２	テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン）	CASRN修正	127-18-4
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	皮膚炎等の皮膚所見の有無
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査・二　作業条件の簡易な調査・三　テトラクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん)、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査・四　頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん)、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査・五　皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査・六　尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定・七　血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及び血清ガンマ－グルタミルトランスペプチダーゼ（γ－ＧＴＰ）の検査・八　尿中の潜血検査

特別規則二次

・一　作業条件の調査・二　医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査、尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査、膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、神経学的検査、肝機能検査（血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及び血清ガンマ－グルタミルトランスペプチダーゼ（γ－ＧＴＰ）の検査を除く。）又は腎機能検査

DGUV

初期検査

追加検査

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	47	物質名２	トリクロロエチレン	CASRN修正	79-01-6
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	区分に該当しない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分4	皮膚感作性	区分1
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分2
皮膚腐食性／刺激性	区分2	発がん性	区分1A
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2A	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（中枢神経系、肝臓）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（中枢神経系）、区分3（気道刺激性、麻酔作用）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	中枢神経系抑制	疾病名称５	三叉神経障害
疾病名称２	前眼部障害	疾病名称６	末梢神経障害
疾病名称３	気道・肺障害	疾病名称７	肝障害
疾病名称４	視神経障害	疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響		■中枢神経系異常•麻酔作用（すべての段階の酩酊状態から致死的な深い麻酔状態まで）•食欲不振、腹部不快感•吐き気、嘔吐、腹痛/痙攣•頭痛、めまい•倦怠感 ■末梢神経系異常•四肢の運動障害、感覚障害、栄養障害 ■皮膚粘膜異常•皮膚および粘膜の急性刺激はまれ（咳、呼吸困難） ■その他•まれに、身体的努力やアルコール摂取後に心室細動による突然の遅発性死亡	
慢性影響		■神経衰弱症状 ■中枢神経系障害 ■心筋障害 ■肝障害 ■腎障害 ■高曝露群において腎細胞腫瘍 ■上気道の粘膜刺激 ■湿疹	
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般	○	血液系		皮膚炎	○	物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等	○	泌尿器全般		歯牙		
末梢	○	肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○	
呼吸器全般	○	腎障害全般	○	泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状	○	腎臓腫瘍等	○	眼の刺激性	○	皮膚感作性	○	
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性		

ID	47	物質名２	トリクロロエチレン	CASRN修正	79-01-6
規則	特化則・第２類物質・特別管理物質				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、傾眠、振顫、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有無等
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	皮膚炎等の皮膚所見の有無
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１	頭痛	自他覚症状４	
自他覚症状２	めまい	自他覚症状５	
自他覚症状３	嘔吐	自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査・二　作業条件の簡易な調査・三　トリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん)、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸(けい)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

・四　頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん)、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸(せん)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査・五　皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査・六　尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定・七　血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及び血清ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ（γ－ＧＴＰ）の検査・八　医師が必要と認める場合は、尿中の潜血検査又は腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査

特別規則二次

・一　作業条件の調査・二　医師が必要と認める場合は、白血球数及び白血球分画の検査、血液像その他の血液に関する精密検査、ＣＡ19－9等の血液中の腫瘍(しゅよう)マーカーの検査、神経学的検査、肝機能検査（血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及び血清ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ（γ－ＧＴＰ）の検査を除く。）、腎機能検査、特殊なエックス線撮影による検査又は核磁気共鳴画像診断装置による画像検査

DGUV

初期検査

■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、異常がある場合は沈渣検査を追加）■γ-GT、SGPT（ALAT）、SGOT（ASAT）■尿中α1-ミクログロブリン追加検査：■腎疾患が疑われる場合：血清クレアチニン■血液検査■心不整脈が疑われる場合：安静時心電図※注：健診項目については3物質が統合して記載されている

追加検査

■神経学的検査（初期評価）■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、異常が認められる場合は沈渣検査を追加）■有効なバイオマーカーが存在する場合は、バイオモニタリングを追加（トリクロロエチレンに関する事後予防措置の一環として行われる検査では、通常、バイオモニタリングは省略可能）。■上記の検査で明確にならない場合、以下の検査を補足的に実施：−腎臓および肝機能の追加検査（例：トリクロロエチレンへの曝露の潜伏期間が10年以上である場合、または微量血尿またはα1-ミクログロブリンの排泄量増加が認められる場合、腎臓の超音波検査）−神経学的・精神科的検査（必要に応じて心理検査を含む）。※注：健診項目については3物質が統合して記載されている

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

BL BL(EOS) BL(ESW) BL(EWW) ExA ExA(EWW) ExA(PNS) ExA(16H) LFT PFT U U(EOS) U(ESW) U(EWW) U (PNS)

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	77	物質名２	1,3-ブタジエン	CASRN修正	106-99-0
規則	特化則				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分に該当しない（分類対象外	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	区分に該当しない（分類対象外	生殖毒性	区分1B
皮膚腐食性／刺激性	分類できない	発がん性	区分1A
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（生殖器（女性））、区分2（心臓、血液系、肝臓）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分3（気道刺激性、麻酔作用）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１		疾病名称５	
疾病名称２		疾病名称６	
疾病名称３		疾病名称７	
疾病名称４		疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響			Liver, spleen, lymph nodes,and skin
慢性影響			
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般	○	血液系	○	皮膚炎		物質特異的愁訴等	
中枢	○	肝炎等		泌尿器全般		歯牙		（生殖器、心血管系？）	
末梢		肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○		
呼吸器全般	○	腎障害全般		泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○		
呼吸器刺激症状		腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性			
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性		呼吸器感作性			

ID	77	物質名２	1,3-ブタジエン	CASRN修正	106-99-0
規則	特化則				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

特別規則二次

DGUV

初期検査

追加検査

OSHA

問診

Required annually and for all examinations2; standard ized form or equivalent; includes comprehensiveoccupational and health history; see standard, Appendices F and C

胸部X線の要否 No

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

Annually, CBC with differ ential and platelet count; also within 48 hrs. after ex posure in an emergency situation and repeated monthly for 3 more months.

NIOSH2000の提案項目（※１

CBC ExA RBC U

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質／代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	83	物質名２	二硫化炭素	CASRN修正	75-15-0
規則	有機則・第１種有機溶剤				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分4	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分1A、授乳に対するまたは授
皮膚腐食性／刺激性	区分2	発がん性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（中枢神経系、心血管系、腎臓）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（中枢神経系、心臓）、区分3（気道刺激性、麻酔作用）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	せん妄、躁鬱等の精神障害	疾病名称５	腎障害
疾病名称２	意識障害	疾病名称６	
疾病名称３	末梢神経障害	疾病名称７	
疾病名称４	網膜変化を伴う脳血管障害	疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響	・Respiratory tract irritation・Acute chemical pneumonitis・Pulmonary oedema・Upper respiratory inflammation・Burns and corrosion of external body surface・Burns and corrosion of mouth, pharynx and oesophagus・Burns and corrosion of eye and adnexa・Conjunctivitis・Irritant contact dermatitis・Toxic encephalopathy	高用量では強い中枢神経障害・麻酔作用・興奮状態・不眠・多弁・精神障害・急速で深い意識喪失から致死に至る場合がある。	
慢性影響	・Corneal ulcer・Toxic optic neuropathy・Ototoxic hearing loss・Peripheral polyneuropathy・Chronic ischaemic heart disease・Secondary hypertension・Atherosclerosis・Chronic kidney disease・Intermittent claudication	■神経障害（中枢神経系、末梢神経系、および/または自律神経系の障害）●精神病、機能障害、集中力の低下、疲労感の増強、感情の不安定、脳症●遠位部に感覚障害が顕著な多発性神経障害●遠位部の筋反射の減弱■血管障害●脳、心臓、腎臓、四肢の血流に影響を及ぼす血管硬化症■消化器障害●胃腸障害の傾向、体重減少、食欲不振■その他おそらく生殖能力に影響を及ぼす可能性があり、または胎児に障害を引き起こす可能性があります	
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般		血液系		皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等		泌尿器全般		歯牙		網膜変化を伴う脳血管障害
末梢	○	肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性		
呼吸器全般	○	腎障害全般	○	泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状		腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性		

ID	83	物質名２	二硫化炭素	CASRN修正	75-15-0
規則	有機則・第１種有機溶剤				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・業務の経歴の調査・作業条件の簡易な調査・有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査・有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査・眼底検査

特別規則二次

DGUV

初期検査

■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、異常がある場合は沈渣検査を追加）■エルゴメトリー（別紙2「エルゴメトリーガイドライン」参照）■128Hzのチューニングフォークを用いた振動感覚検査■追加検査：−コレステロールとトリグリセリド−γ-GT、SGPT（ALAT）、SGOT（ASAT）−小血液検査

追加検査

■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、異常がある場合は沈渣検査を追加）■バイオモニタリング■眼底検査■7.2.2で記載された一般的な医学的検査で明確に診断できない場合、追加として：精神科的および/または専門神経科的検査（必要に応じて脳波検査（EEG）および電気神経検査および筋電図検査を含む）

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

BUN Ecg ExA LFT Oph U U(Sed) U(EOS) U(ESW) U(EWW) U(PPS) Ua

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	103	物質名２	N,N-ジメチルホルムアミド	CASRN修正	68-12-2
規則	有機則・第２種有機溶剤				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分3	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分1B
皮膚腐食性／刺激性	区分2	発がん性	区分1B
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2B	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（肝臓）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（肝臓）、区分2（呼吸器）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	皮膚障害	疾病名称５	胃腸障害
疾病名称２	前眼部障害	疾病名称６	
疾病名称３	気道障害	疾病名称７	
疾病名称４	肝障害	疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響	・Respiratory tract irritation・Acute chemical pneumonitis and bronchitis・Upper respiratory inflammation・Burns and corrosions of eye and adnexa・Conjunctivitis・Irritant contact dermatitis・Narcotic syndrome consequent to poisoning by organic solvents・Allergic contact dermatitis・Toxic encephalopathy・Acute toxic renal failure with tubular necrosis・Acute myeloblastic leukemia	■DMF蒸気の吸入による上気道粘膜刺激、■目に接触すると、充血、灼熱感、涙目、または痙攣性のまぶたの閉塞	
慢性影響	・Corneal ulcer・Toxic liver disease・Liver toxicity (impairment, functional) ・Chronic toxic renal failure・Bone marrow depression (aplastic anaemia) ・Infertility・Congenital malformation syndromes・Ototoxic hearing loss・Peripheral polyneuropathy	■高用量領域での肝毒性■胃腸症状（腹痛、食欲不振、悪心、嘔吐、便秘または下痢）、■膵炎■中枢神経系障害■循環器障害が■胎児に害を及ぼす可能性	
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般	○	血液系		皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等	○	泌尿器全般		歯牙		
末梢		肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○	
呼吸器全般	○	腎障害全般		泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状	○	腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系	○	皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性		

ID	103	物質名２	N,N-ジメチルホルムアミド	CASRN修正	68-12-2
規則	有機則・第２種有機溶剤				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１	頭痛	自他覚症状４	
自他覚症状２	めまい	自他覚症状５	
自他覚症状３	嘔吐	自他覚症状６	

特別規則一次

・業務の経歴の調査・作業条件の簡易な調査・有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査・有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査・肝機能検査・尿中のＮ－メチルホルムアミドの量の検査

特別規則二次

DGUV

初期検査

■γ-GT、SGPT（ALAT）、SGOT（ASAT）■バイオモニタリング■必要に応じて、追加の肝機能検査を実施。
例：上腹部超音波検査

追加検査

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	106	物質名２	トルエン	CASRN修正	108-88-3
規則	有機則・第２種有機溶剤				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分4	皮膚感作性	区分に該当しない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分1A、授乳に対するまたは授
皮膚腐食性／刺激性	区分2	発がん性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2B	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（中枢神経系、腎臓）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（中枢神経系）、区分3（気道刺激性、麻酔作用）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	中枢神経系抑制	疾病名称５	
疾病名称２		疾病名称６	
疾病名称３		疾病名称７	
疾病名称４		疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響	・Respiratory tract irritation・Acute chemical pneumonitis and bronchitis・Upper respiratory inflammation・Burns and corrosions of eye and adnexa・Conjunctivitis・Irritant contact dermatitis・Narcotic syndrome consequent to poisoning by organic solvents・Allergic contact dermatitis・Toxic encephalopathy・Acute toxic renal failure with tubular necrosis・Acute myeloblastic leukemia	■中枢神経系異常●麻酔前症状■皮膚障害●皮膚および粘膜の刺激●皮膚の脱脂作用●アルコール（エタノール）の作用増強効果	
慢性影響	・Corneal ulcer・Toxic liver disease・Liver toxicity (impairment, functional) ・Chronic toxic renal failure・Bone marrow depression (aplastic anaemia) ・Infertility・Congenital malformation syndromes・Ototoxic hearing loss・Peripheral polyneuropathy	■中枢神経系異常●毒性脳症■皮膚障害●湿疹	
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般		血液系		皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等		泌尿器全般		歯牙		
末梢		肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性		
呼吸器全般	○	腎障害全般	○	泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状		腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性		

ID	106	物質名２	トルエン	CASRN修正	108-88-3
規則	有機則・第２種有機溶剤				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１	頭痛	自他覚症状４	
自他覚症状２	めまい	自他覚症状５	
自他覚症状３	嘔吐	自他覚症状６	

特別規則一次

・業務の経歴の調査・作業条件の簡易な調査・有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査・有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査・尿中の馬尿酸の量の検査

特別規則二次

DGUV

初期検査

■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、異常がある場合は沈渣検査を追加）■皮膚の検査■血液検査（2年ごとの再検査時）■追加検査：−γ-GT、SGPT（ALAT）、SGOT（ASAT）−神経学的検査（概略）

追加検査

■初回検査と同様■追加でバイオモニタリング■不明な場合：必要に応じて専門医による追加検査

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	107	物質名２	ノルマルヘキサン	CASRN修正	110-54-3
規則	有機則・第２種有機溶剤				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分に該当しない	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分2
皮膚腐食性／刺激性	区分2	発がん性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（神経系）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分3（麻酔作用、気道刺激性）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	末梢神経障害	疾病名称５	
疾病名称２		疾病名称６	
疾病名称３		疾病名称７	
疾病名称４		疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響	・Respiratory tract irritation・Upper respiratory inflammation・Conjunctivitis・Irritant contact dermatitis・Narcotic syndrome		
慢性影響	・Corneal scar and opacity・Peripheral polyneuropathy・Chronic toxic encephalopathy		
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般		血液系		皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等		泌尿器全般		歯牙		
末梢	○	肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性		
呼吸器全般	○	腎障害全般		泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状		腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性	○	呼吸器感作性		

ID	107	物質名２	ノルマルヘキサン	CASRN修正	110-54-3
規則	有機則・第２種有機溶剤				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・業務の経歴の調査・作業条件の簡易な調査・有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査・有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査・尿中の二・五－ヘキサンジオンの量の検査

特別規則二次

DGUV

初期検査

追加検査

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

BL BL(DE) ExA ExA(DE) Neur U U(EOS) U(ESW) U(EWW)

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	110	物質名２	メタノール	CASRN修正	67-56-1
規則	有機則・第２種有機溶剤				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分に該当しない	皮膚感作性	区分に該当しない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分1B
皮膚腐食性／刺激性	分類できない	発がん性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（中枢神経系、視覚器）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（中枢神経系、視覚器、全身毒性）区分3（麻酔作用）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	中枢神経抑制	疾病名称５	
疾病名称２	視神経障害	疾病名称６	
疾病名称３	前眼部障害	疾病名称７	
疾病名称４	気道・肺障害	疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響	・Respiratory tract irritation・Acute chemical pneumonitis and bronchitis・Upper respiratory inflammation・Burns and corrosions of eye and adnexa・Conjunctivitis・Irritant contact dermatitis・Narcotic syndrome consequent to poisoning by organic solvents・Allergic contact dermatitis・Toxic encephalopathy・Acute toxic renal failure with tubular necrosis・Acute myeloblastic leukemia	■中枢神経障害●「二日酔い」症状：めまい、倦怠感、頭痛、吐き気、嘔吐、腹痛（疝痛様）●視覚障害（「視界がぼやける」）■呼吸器障害●呼吸困難から呼吸中枢の麻痺、けいれん、昏睡、循環不全	
慢性影響	・Corneal ulcer・Toxic liver disease・Liver toxicity (impairment, functional) ・Chronic toxic renal failure・Bone marrow depression (aplastic anaemia) ・Infertility・Congenital malformation syndromes・Ototoxic hearing loss・Peripheral polyneuropathy	■中枢神経系の障害■末梢性多発神経炎、聴神経炎、視神経炎の症状■パーキンソン病に類似した症状■肝実質障害	
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般		血液系		皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等		泌尿器全般		歯牙		
末梢	○	肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性		
呼吸器全般		腎障害全般		泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状	○	腎臓腫瘍等		眼の刺激性	○	皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系		皮膚の刺激性		呼吸器感作性		

ID	110	物質名２	メタノール	CASRN修正	67-56-1
規則	有機則・第２種有機溶剤				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１	頭痛	自他覚症状４	
自他覚症状２	めまい	自他覚症状５	
自他覚症状３	嘔吐	自他覚症状６	

特別規則一次

・業務の経歴の調査・作業条件の簡易な調査・有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査・有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査

特別規則二次

DGUV

初期検査

追加検査

■初回検査と同様■追加調査•バイオモニタリング（6.4 参照）•
不明な場合における追加検査：–眼科専門医による検査–神経科専門医による検査–必要に応じて肝機能検査

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質／代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	122	物質名２	鉛	CASRN修正	7439-92-1
規則	鉛則				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）	区分に該当しない（分類対象外	呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	区分1A
皮膚腐食性／刺激性	分類できない	発がん性	区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（造血系、腎臓、中枢神経系、末梢神経系、心血管系、免疫系）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	分類できない		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	造血器障害	疾病名称５	
疾病名称２	末梢神経障害	疾病名称６	
疾病名称３	便秘等の胃腸障害	疾病名称７	
疾病名称４		疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響	･Mucous membrane irritation･Chemical bronchitis and pneumonitis･Chemical pulmonary oedema･Burn of mouth, pharynx and oesophagus･Burn of eye and adnexa･Upper respiratory tract inflammation･Burns and corrosion of respiratory tract･Reactive airways dysfunction syndrome (RADS)･Irritant-induced occupational asthma･Acute lead nephropathy･Acute toxic encephalopathy (organic and inorganic)･Cerebral oedema･Irritant contact dermatitis	急性中毒は、労働安全衛生基準の遵守が改善されたため稀。■疲労感、倦怠感、食欲不振などの非特異的な症状	Teeth, gums, hematologic, gastrointestinal, renal, car diovascular (BP), neurologi cal; pulmonary status ifrespiratory protection used.
慢性影響	･Gastrointestinal toxicity (organic and inorganic, acute and chronic)･Hypertension (secondary)･Fanconi-like syndrome･Polyneuropathy (organic and inorganic)･Chronic toxic encephalophaty (organic and inorganic)･Burton line on the gums･Chronic progressive renal failure･Infertility male･Infertility female	■血液系障害•ヘム合成における貧血、灰白色の皮膚色調•好塩基球の点状沈着■消化器系障害•慢性的な便秘から疝痛のような腹痛■神経障害（中枢神経系と末梢神経系）•神経伝導速度の変化、認知機能障害、その他•橈骨神経麻痺（「鉛手」は、現在ではほとんど観察されない）■腎機能障害•尿細管障害による尿細管再吸収の低下と慢性間質性線維化■その他•鉛白斑（動脈細動脈と前毛細血管の筋収縮）•「鉛縁」（鉛硫化物の沈着）•MAK委員会は、鉛および無機鉛化合物を動物実験で発がん性物質として分類（吸入可能分画のカテゴリー4）。	
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般		血液系	○	皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等		泌尿器全般		歯牙		心血管系？
末梢	○	肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○	
呼吸器全般		腎障害全般	○	泌尿器腫瘍等		生殖毒性	○	
呼吸器刺激症状		腎臓腫瘍等		眼の刺激性		皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系	○	皮膚の刺激性		呼吸器感作性		

ID	122	物質名２	鉛	CASRN修正	7439-92-1
規則	鉛則				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１	頭痛	自他覚症状４	疝痛
自他覚症状２	めまい	自他覚症状５	
自他覚症状３	嘔吐	自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査・二　作業条件の簡易な調査・三　鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査・四　鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査・五　血液中の鉛の量の検査・六　尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査

特別規則二次

DGUV

初期検査

•尿検査（多項目検査（試験紙法を含む））•血液検査（分画検査を含む）•血清クレアチニン•肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT）•尿中β2-ミクログロブリン•既往歴で鉛曝露が確認されている場合：血液中の鉛のバイオモニタリング

追加検査

■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む））■血液検査（分画検査を含む）■血清クレアチニン■肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT）■尿中β2-ミクログロブリン■血液中の鉛のバイオモニタリング（追跡検査の場合：血液中の鉛濃度が上昇している限り継続）臨床所見に異常がある場合：■尿中タンパク質（例：総タンパク質、アルブミン、δ1-ミクログロブリン）■神経学的検査（神経生理学/筋電図検査を含む）生物学的基準値を明らかに超える場合:■効果の検出のため：尿中δ-アミノレブリン酸（ALA-U）、血中δ-アミノレブリン酸脱水素酵素（ALA-D）、尿中コプロポルフィリン、血中遊離赤血球ポルフィリンIX（EP）、コプロポルフィリンゲンIII、斑点細胞の検出のための血液塗抹標本。

OSHA

問診

Required for all exams; includes reproductive his tory, past lead exposure, both work/non−work, and history of specific body systems; see standard.

胸部X線の要否　No

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

Hemoglobin, hematocrit, ZPP, BUN, serum creatinine, urinalysis with micro, blood lead levels, peripheral smearmorphology, red cell indices1, 5; if requested by employee, pregnancy test ing and fertility testing (female/male)

NIOSH2000の提案項目（※１

BL(BLL Hgb Hct ZPP BUN Scr) BLPr Ua(Micr) BL BLL BT CBC NCS Neur RBC RBC(ZPP) U U(EOS) Ua(24H) ZPP ZPP(M)

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	125	物質名２	四アルキル鉛	CASRN修正	9999999993
規則	四アルキル則				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）		呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	分類できない	生殖毒性	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	分類できない	発がん性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（神経系）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（神経系）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１	せん妄、幻覚等の精神障害	疾病名称５	
疾病名称２		疾病名称６	
疾病名称３		疾病名称７	
疾病名称４		疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響		鉛アルキルは強い全身性毒性を有する。■中枢神経系刺激・変性症状•食欲不振、悪心、嘔吐•不眠症、頭痛、めまい•不安感、混乱、 irritability、興奮性、震え、幻覚 ■循環器障害（低血圧、徐脈）	
慢性影響		慢性中毒の場合も、まず第一に中枢神経系が影響を受けます。■中枢神経系刺激・変性症状•興奮性、抑うつ、幻覚•頭痛•低血圧•振戦、運動失調、神経衰弱	
悪性腫瘍			

類型

神経全般	○	肝障害全般		血液系	○	皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢	○	肝炎等		泌尿器全般		歯牙		
末梢	○	肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性		
呼吸器全般		腎障害全般		泌尿器腫瘍等		生殖毒性		
呼吸器刺激症状		腎臓腫瘍等		眼の刺激性		皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等		消化器系	○	皮膚の刺激性		呼吸器感作性		

ID	125	物質名２	四アルキル鉛	CASRN修正	9999999993
規則	四アルキル則				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査・二　作業条件の簡易な調査・三　鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査・四　鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査・五　血液中の鉛の量の検査・六　尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査

特別規則二次

DGUV

初期検査

■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、沈渣）■血液検査（血球検査）■血清クレアチニン■肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT）■既往歴で鉛アルキル化合物への曝露が確認された場合：バイオモニタリング

追加検査

（注：原文でも上記と同じ）■尿検査（多項目検査（試験紙法を含む）、沈渣）■血液検査（血球検査）■血清クレアチニン■肝機能検査（SGOT、SGPT、γ-GT）■既往歴で鉛アルキル化合物への曝露が確認された場合：バイオモニタリング

OSHA

問診

胸部X線の要否

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

NIOSH2000の提案項目（※１

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

ID	126	物質名２	石綿*3	CASRN修正	9999999992
規則	石綿則				

標的健康影響の例

GHS政府分類（健康有害性のうち「生殖細胞変異原性」「誤嚥有害性」をのぞく）

急性毒性（吸入：ガス）		呼吸器感作性	分類できない
急性毒性（吸入：蒸気）	区分に該当しない（分類対象外	皮膚感作性	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	区分に該当しない（分類対象外	生殖毒性	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	分類できない	発がん性	区分1A
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない	GHS特定標的臓器毒性（反復暴露）	区分1（呼吸器）
GHS特定標的臓器毒性（単回暴露）	区分1（呼吸器）		

安衛法特別規則規定内容

別表3標的臓器１		別表3標的健康影響１	
別表3標的臓器２		別表3標的健康影響２	
別表3標的臓器３		別表3標的健康影響３	
別表3標的臓器４		別表3標的健康影響４	
別表3標的臓器５		別表3標的健康影響５	
別表3標的臓器６		別表3標的健康影響６	
別表3標的臓器７		別表3標的健康影響７	
		別表3標的健康影響８	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

疾病名称１		疾病名称５	
疾病名称２		疾病名称６	
疾病名称３		疾病名称７	
疾病名称４		疾病名称８	

労規則別表第一の二第七項　中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、石綿肺、良性石綿胸水

	ILO	DGUV	OSHA
急性影響		該当なし	Pulmonary and gastrointestinal
慢性影響		■アスベスト症肺高血圧症、慢性肺性心、気管支拡張症、気管支肺炎性過程は、アスベスト症の合併症または合併症として起こり得ます。■胸膜の疾患•胸膜の肥厚（石灰化を伴うか伴わないか）•円形のアテクトーシス•結合組織の瘢痕化を伴うまたは伴わない胸膜腔液貯留（複雑化ヒアリノシス）■肺がんおよび中皮腫■喉頭がん■卵巣がん	
悪性腫瘍	・Malignant mesothelioma・Lung cancer・Laryngeal cancer・Ovarian cancer		

類型

神経全般		肝障害全般		血液系		皮膚炎		物質特異的愁訴等
中枢		肝炎等		泌尿器全般		歯牙		
末梢		肝臓腫瘍等		泌尿器炎症等		発がん性	○	
呼吸器全般	○	腎障害全般		泌尿器腫瘍等		生殖毒性		
呼吸器刺激症状	○	腎臓腫瘍等		眼の刺激性		皮膚感作性		
呼吸器腫瘍等	○	消化器系		皮膚の刺激性		呼吸器感作性		

ID	126	物質名２	石綿*3	CASRN修正	9999999992
規則	石綿則				

健康影響モニタリングの例

別表3自他覚症状の既往歴	
別表3自他覚症状既往歴の「等」の解釈	
別表3自他覚症状（現症）	
別表3自他覚症状（現症）の「等」の解釈	
別表3他覚所見（現症）	
別表3皮膚所見（現症）の「等」の解釈	

労規則三十五条関係規定内容

別表第一の二第四項大臣告示

自他覚症状１		自他覚症状４	
自他覚症状２		自他覚症状５	
自他覚症状３		自他覚症状６	

特別規則一次

・一　業務の経歴の調査・二　石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査・三　せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査・四　胸部のエックス線直接撮影による検査

特別規則二次

DGUV

初期検査

■呼吸器系および循環器系の検査■スパイロメトリー•必要に応じて、胸部X線正面撮影。胸部X線撮影の実施の適応は、個々のケースで検討する必要があります（詳細は第7.2項の注意事項を参照）。一般的な適応2はありません。初回検査そのものは、胸部X線撮影の適応ではありません。•胸部X線撮影は、病歴の結果に応じて、1年以内に撮影されたものを使用することができます。喉頭がん（喉頭がん）のリスクがあるため、特に持続的な声のかすれ（3週間以上）、発声障害、異常感覚、およびアルコール摂取は記録する必要があります。

追加検査

■呼吸器系および循環器系の検査■スパイロメトリー•X線撮影の実施に関する正当な適応は、§ 83 StrlSchG（放射線防護法）および§ 119 StrSchV（放射線防護規則）に従い、個々のケースにおける追跡検査において検討する必要があります。経験上、鉱物粉塵による肺の職業病の診断のためX線撮影を実施するのは、曝露開始後15年以上経過するか、または45歳に達した後に限られる。さらに、曝露の程度も考慮しなければならない。•ただし、肺疾患の臨床的疑いがある場合は、年齢や曝露開始時期に関わらず、胸部 X 線検査の適応があります。•X 線写真は、病歴の結果に応じて、1 年以内のものを使用できます。•被保険者の特別な曝露条件（高リスク群）における追跡検査/追加検査では、胸部概観撮影の代わりに低線量多列ボリュームCT（HRCT）を用いた検査プログラムを提供する必要があります。補足：　初回検査と追跡検査に加え、病歴と所見に応じて、気管支拡張試験や全身肺量測定法などの詳細な肺機能検査を検討する必要があります。胸部単純X線写真で所見が不明確な場合、胸部低線量高解像度CT検査の実施が適応となる場合があります。この場合、医師は第二意見者（GVSまたは各州の医療団体が定めるリストに記載）の意見を聴取し、CT検査の実施の適応を判断する必要があります。アスベストに曝露した被保険者の年次胸部X線検査結果に基づき、肺

OSHA

問診

Required for all exams standardized form required; see standard, Appendix D parts 1 and 2.

胸部X線の要否　Yes –

呼吸機能検査の要否

その他の検査項目

No

NIOSH2000の提案項目（※１

CXr PFT(FVC FEV1) Rdg SpC TBS

※１：略語一覧

1M=1ヶ月曝露後
2D/2H = 2時間または2日間曝露後
6M = 6ヶ月ごと
16H=曝露終了16時間後
24H= 24時間採取
AdT=脂肪組織
Alb = アルブミン
Anm =貧血
ApA =再生不良性貧血
APh =アルカリホスファターゼ
B2M = 尿中β2ミクログロブリン
BF = 体液（化学物質/代謝物）
BGa＝血液ガス分析
BH/N = 体毛/爪
Bicarb =重炭酸塩
BL =全血（化学物質/代謝物）
BLC =血中シアン化物
BLL = 血中鉛濃度
BLP = 血漿
BLPr L =血圧
BLS =血清
BLW =血液分析（毎週）
BM =尿の生物学的モニタリング（3ヶ月ごと）
Br =ビリルビン
BT = 生体組織/生検
Bth = 呼気
BUN = 血中尿素窒素
Ca = カルシウム
CBC = 全血球計算
CH = コリンエステラーゼ
Chol = コレステロール値Cig = 喫煙
Cnv =痙攣
CO_2 = 二酸化炭素
COHb = カルボキシヘモグロビン
CXr = 胸部X線
Cys = 膀胱鏡検査
Cyt = 細胞診
DEO = 曝露中
DXr = 歯科X線検査
Ecg = 心電図
Ecgr = 心電図（安静時）
Ecg40 = 40歳以上の労働者の心電図
EMD = 毎月
EOS = シフト終了時
Ery = 赤血球数
ESW = シフト終了時/週の終わり
EWWO = 週の終わり
ExA = 呼気
FEV1 = 強制呼気量（1秒）
FEF = 強制呼気流量
FOB =便潜血検査（40歳以上）
FSH =卵胞刺激ホルモン
FVC =努力肺活量
GGT =γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
Frg = 脆弱性
GLO = 顆粒球性白血病
Glau 緑内障
Glu = 糖/グルコース
GraS =皮膚肉芽腫
GUT= 泌尿生殖器
Hct = ヘマトクリット
HeD =造血抑制Hem =赤血球溶血
Hyt =低プロトロンビン血症
InR =リスク増加
KFT =腎機能検査
Hgb =ヘモグロビン
Hmt =血尿L2H=8時間曝露の最後の2時間
L4H=8時間曝露の最後の4時間
Lab = 臨床検査室監視
Lac =乳酸
LDH =乳酸脱水素酵素
Leuk =白血球数
LFT =肝機能検査
LH =黄体形成ホルモン
LT =リンパ球幼若化試験
MHgb =メトヘモグロビン
Micr=顕微鏡検査
Nas=鼻腔検査
NCS=神経伝導検査
Neur=神経学的検査／筋電図検査
Oph =眼科検査
PH=水素イオン濃度
PFT= 肺機能検査
Pgm =色素沈着の証拠
PMN =多形核白血球
PNS=次のシフト前
PPS =シフト前とシフト後
PpT =光パッチテスト
Preg =妊娠
PTS=勤務開始前 PTT：プロトロンビン時間
PWW=週の最終勤務開始前Pxr=骨盤X線検査
RBC=赤血球数
Rdg=レントゲン撮影ReC=網状赤血球数
SCr=血清クレアチニン
SCT=精子数
Sed=沈渣
SGOT=血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（SGPT）
RICO=免疫機能低下SMA12=血清多相分析
Ster=ステロイド治療
TBS=ツベルクリン反応検査
Skn=皮膚検査
SpC=喀痰細胞診
TEO=総エストロゲン（女性）
Test=睾丸サイズ
Testo=テストステロン
TFT=甲状腺機能検査／甲状腺プロファイル
Thrm=血小板数
U=尿（化学物質/代謝物）
Ua = 尿検査（ルーチン）
Usg = 肝臓超音波検査
WBC=白血球数/白血球分画
ZPP=亜鉛プロトポルフィリン

労災疾病臨床研究事業
（令和５年度～令和７年度）
分担研究報告書

「特殊健診における適正な情報収集と判定」の
アジア諸国における現状

研究代表者
森　晃爾
全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会委員長

研究分担者
立道昌幸
東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　教授

7.「特殊健診における適正な情報収集と判定」のアジア諸国における現状

研究代表者：森 晃爾　全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価委員会 委員長
研究分担者：立道昌幸　東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学 教授

【目的】特殊健診の実効性は、実施者の専門性、対象物質の規定方法、検査項目の設定方法など、制度を構成する多くの要素に依存している。本研究では、産業医学専門医が特殊健診に関与する制度を持つアジア諸国（韓国、タイ、シンガポール）を対象として、包括的な国際比較を行い、日本の制度改善に資する示唆を得ることを目的とした。
【方法】分担研究班（日本産業衛生学会指導医・専門医）で訪問前調査シート（19 項目）を作成し、各国の調査対象機関に事前送付した。韓国の嘉泉大学医学部、タイのバンコク病院産業保健センターおよびサミティベート病院シラチャー産業保健医学センター、シンガポールのシンガポール国立大学公衆衛生大学院産業保健教育研究部門を訪問し、労働衛生を専門とする医師・看護職を対象に対面でインタビュー調査を実施し、Framework Method を用いて分析した。
【結果】制度の設計思想には、物質列挙型からリスクベース型に至るスペクトラムが認められた。韓国は日本と同様の物質列挙型であるが、実施者を職業環境医学専門医に限定し、指定機関制度を併設する二重要件を課していた。タイは健康リスクアセスメント（HRA）に基づき専門家が検査項目・頻度を決定するリスクベース型を採用していた。シンガポールは対象有害因子を 19 要因に限定し、指定事業場医（DWD）の専門的判断に広く委ねていた。3 か国に共通して、実施者に産業医学の専門資格または研修修了を法的要件としていた点は、資格要件のない日本との相違点であった。
【考察】調査対象 3 か国がいずれも実施者に専門的要件を課していることは、日本における既存の専門医制度等の活用を検討する契機となる。また、タイの HRA モデルは、日本のリスクアセスメント対象物健康診断の運用に向けた参考となりうる。さらに、個別事業場レベルでは職業性疾病の検出に限界があることは国際的に共通する課題であり、国レベルでのモニタリング体制の構築が重要であることが確認された。現地インタビュー調査により、文献調査のみでは得られない制度運用の実態や課題を把握できた。

研究協力者：深井航太　東海大学医学部基盤診療学系衛生学公衆衛生学　准教授
日野優希　産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学　修練医
宇根理　産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学　修練医

A. 目的

事業者は労働安全衛生法に基づき、有害業務に従事する労働者に対して特殊健診を実施し、その結果を踏まえて適切な事後措置を講じる義務を負う。特殊健診は、業務に起因する健康障害の予防と早期発見を目的とした制度であり、その実効性は、実施者の専門性、対象物質の規定方法、検査項目の設定方法、ばく露情報の収集・活用、結果の判定と事後措置など、制度を構成する多くの要素に依存している。

本研究では、これまでの知見を踏まえ、産業医学の専門医が法定特殊健診に関与する制度を持つアジア諸国（韓国、タイ、シンガポール）を対象として、特殊健診制度の包括的な国際比較を行った。法的根拠、対象物質、検査項目、実施者の資格要件、費用負担、事後措置、職業病認定等の 19 項目にわたる調査枠組みを設定し、訪問前調査シートと現地インタビュー調査を組み合わせた質的比較研究を実施した。本研究の目的は、各国の制度の構造と運用実態を明らかにし、日本の特殊健診制度の改善に資する示唆を得ることである。

B. 方法

1）研究デザイン

本研究は、アジア諸外国における特殊健診制度の実態を把握し、日本の制度と比較検討することを目的とした質的比較研究である。調査は、訪問前調査シートへの記入と現地訪問によるインタビュー調査の2段階で実施した。調査期間は 2025 年 3 月から 2026 年 2 月までとした。

2）対象国の選定

対象国の選定基準は、「産業医学専門医が法定特殊健診に関与する制度を持つアジア諸国」とした。この基準に基づき、韓国、タイ、シンガポールの 3 か国を選定した。いずれの国も、産業医学の専門家が特殊健診の実施に関与する法制度を有しており、日本の制度と比較するうえで有意義な知見が得られると判断した。

3）調査対象機関および対象者

調査対象機関は、各国の産業保健・労働衛生領域において教育・研究または臨床サービスを提供する機関の中から、分担研究班の既存の学術ネットワークを通じて選定した。具体的には、韓国は Gachon University College of Medicine（嘉泉大学医学部）および Catholic University of Korea（カトリック大学）、タイは Bangkok Hospital Occupational Health Center（バンコク病院産業保健センター）および Samitivej Sriracha Hospital Occupational Health Medicine Center（サミティベート病院シラチャー産業保健医学センター）、シンガポールは National University of Singapore, Saw Swee Hock School of Public Health, Occupational Health Education & Research Unit（シンガポール国立大学公衆衛生大学院産業保健教育研究部門）の計 5 機関とした。

インタビュー調査の対象者は、各機関において労働衛生サービスを専門に提供または研究する医師および看護職とした。

4）訪問前調査シートの作成と配布

訪問前調査シートの項目は、分担研究班（日本産業衛生学会指導医および専門医4名にて構成）での議論を経て、特殊健診制度を多面的に把握するために必要な以下の19項目を設定した。すなわち、①法的根拠と担当行政、②健診対象物質（規制のレベル）、③健診対象者（有害業務作業者の選定基準）、④対象事業場の規模要件、⑤健診項目（法令規定、リスクに応じた決定、産業医の裁量等）、⑥実施頻度（もしくは実施時期）とその決定方法、⑦健診実施医の資格要件、⑧収集されるばく露情報（作業条件の調査、事業者からの情報提供様式等）、⑨二次健診の方法および詳細調査の法定規定、⑩判定方法や判定基準、⑪プライバシー保護および結果のフィードバック方法、⑫費用負担（事業者負担、保険制度との関係、労働者負担の有無）、⑬一般健康診断との関係、⑭事後措置に関する規定、⑮情報開示・従業員へのフィードバックに関する規定、⑯労働基準監督署（相当機関）への報告内容、⑰記録保存義務と保存年限、⑱実施状況および実施率のモニタリング状況、⑲職業病の認定方法および療養費負担である。これらの項目は、法的根拠から実施体制、費用負担、事後措置、職業病認定に至るまで、特殊健診制度の全体像を体系的に捉えることを意図して設計した。

訪問前調査シートは、調査対象機関の医師・研究者に対し、現地訪問に先立って電子メールにて送付した。回答者は各機関において労働衛生を専門とする医師・研究者本人とした。回答を得た後に、その内容を踏まえてインタビュー調査を実施した。

5）現地インタビュー調査

現地インタビュー調査は、各調査対象機関を訪問し、対面で実施した。インタビューの所要時間は各機関あたり概ね 2〜4 時間であった。使用言語は英語とし、原則的に通訳は介さなかった。

インタビューでは、訪問前調査シートへの回答内容を基盤として、各国の特殊健診制度の運用実態について聴取・整理することに注力した。具体的には、法令上の規定と実際の運用との乖離、制度の背景にある歴史的・社会的文脈、および現場で認識されている課題等について掘り下げて聴取した。記録は、インタビュー時のメモに基づき、調査終了後に研究班で整理・確認した。

6）日本の制度情報の収集

比較対照としての日本の特殊健診制度に関する情報は、分担研究班の構成員である日本産業衛生学会指導医・専門医が、訪問前調査シートと同一の19項目の枠組みを用いて記述した。これにより、各国の情報と同一の構造で日本の制度情報を整理し、国際比較の一貫性を担保した。

7）分析方法

収集したデータの分析には、Framework Method を用いた[1]。Framework Method は、質的データを体系的にマトリックスに整理し、事例間・テーマ間の比較を可能にする分析手法であり、複数国の制度比較に適している。

分析は以下の手順で実施した。第一に、訪問前調査シートの回答およびインタビュー記録を精読し、データの全体像を把握した（familiarisation)。第二に、データの内容に基づきコードを付与した（coding)。第三に、訪問前調査シートの 19 項目をベースとした分析枠組みを構築した（developing a working analytical framework)。第四に、構築した分析枠組みを全データに適用した(applying the framework)。第五に、国（韓国、タイ、シンガポール、日本）と調査項目を軸としたマトリックスにデータを整理した（charting)。第六に、マトリックスに基づき、各国の制度の共通点、相違点、特徴的な要素を抽出し、解釈を行った（interpreting)。

8）倫理面への配慮

本研究は、各国の特殊健診制度に関する公的情報および専門家の知見を収集・整理する制度比較研究であり、個人を対象とした介入や個人情報の収集は行っていない。インタビュー調査の対象者は、各国の制度に関する専門的知見を有する医師・研究者であり、個人の健康情報や機微な個人情報を聴取するものではない。したがって、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（令和 3 年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号）に定める「人を対象とする生命科学・医学系研究」には該当しないと判断し、倫理審査委員会への申請は不要とした。

なお、インタビュー調査の実施にあたっては、調査の目的および方法を対象者に事前に説明し、協力への同意を得た上で実施した。

C. 結果

本調査により、韓国、タイ、シンガポールの 3 か国における特殊健診制度の実態を把握した。結果の詳細は、表 1) 特殊健診制度の比較（日本、タイ、韓国、シンガポール）の国際比較表に示すとおりであり、以下では国ごとに得られた主要な知見を記述する。

1）韓国

法的枠組み：

韓国における特殊健診は、産業安全保健法（Occupational Safety and Health Act）により義務付けられている。同法第 130 条は、指定有害物質にばく露される労働者に対する健康診断の実施を使用者に求めている。雇用労働部（Ministry of Employment and Labor）が本制度を所管し、詳細な実施方法は同法施行規則で規定されている。韓国産業安全保健公団（Korea Occupational Safety and Health Agency: KOSHA）が制度運用の実務的支援を担っている。

対象物質：

対象物質は施行規則別表 22 に規定

されており、化学物質 164 種、粉じん 7 種、物理的因子 8 種に加え、夜間作業を含む計 180 項目が指定されている。日本の法定特殊健診の対象物質数（有機溶剤 54 物質、特定化学物質 75 物質等）と比較して広範であり、夜間作業が対象に含まれる点も特徴的である。

実施者：

韓国では、特殊健診は職業環境医学専門医（Occupational and Environmental Medicine Specialist）のみが実施できる。同専門医は現在 600 名以上が活動しており、日本の産業衛生専門医に相当する。さらに、個人の医師資格に加え、人員・施設・設備の要件を満たした機関が指定を受ける必要があり、現在 258 の指定機関が存在する。すなわち、韓国では「専門医資格」と「機関指定」の二重要件が課されている。日本では、免許を有する医師であれば特殊健診を実施でき、産業衛生の専門資格は法的に要求されていない。

検査項目：

検査項目は施行規則別表 24 において有害物質ごとに詳細に規定されている。項目には、業務歴・ばく露歴調査、既往歴、自覚症状調査、標的臓器の臨床検査が含まれ、全員に実施する一次臨床検査と、詳細評価を要する者に実施する二次臨床検査に区分されている。該当する場合には、生物学的ばく露指標検査も実施される。二次検査は、一次検査結果の解釈が困難な場合または鑑別を要する場合に義務付けられ、使用者は通知後 30 日以内に二次検査を実施しなければならない。

健康管理区分：

韓国は独自の健康管理区分を設けている。具体的には、A（健常）、C1（職業病の疑いによる経過観察）、C2（一般疾病による経過観察）、D1（職業病による有所見）、D2（一般疾病による有所見）、R（二次健診対象）の区分が設定されている。夜間作業については CN・DN の独自区分が追加されている。日本の分類である「ABCRT 区分」と比較すると、職業性と一般疾病を明確に区分している点が特徴的である。

実施頻度：

初回検査は配置後の規定期間内（物質により 1～12 か月）に実施しなければならない。定期検査の間隔は物質ごとに規定されており、高リスク物質は 6 か月ごと、石綿・綿じんは 12 か月ごと、鉱物性粉じん・騒音は 24 か月ごと、その他のほとんどの物質は 12 か月ごとである。

情報フローと報告：

韓国の制度では、特殊健診機関が検査結果を 30 日以内に地方雇用労働庁に直接提出する。この点は、日本において使用者が労働基準監督署に報告する仕組みとは異なり、事業主を介さない情報フローとなっている。個人の健康診断結果は 30 日以内に労働者本人と使用者の双方に送付される。使用者に対しては、個人の医療詳細（具体的な血液検査値など）へのアクセスは制限されているものの、事後措置を実施するために必要な個々の労働者の健康管理区分や就業適性に関する結

果が個別に通知される。

質の管理：

KOSHA は指定特殊健診機関に対して定期的な品質評価を実施しており、基準を満たさない場合は指定取消しの対象となる。また、診療記録は 10 年間、検査記録は 5 年間の保存が義務付けられている。使用者側でも健康診断結果を 5 年間（特別有害物質については 30 年間)保存しなければならない。

費用負担と事後措置：

検査費用は企業規模にかかわらず使用者が全額負担し、労働者との費用分担・自己負担はない。二次検査や事後措置の追加費用も使用者の責任であり、中小企業向けには政府支援が設けられている。事後措置としては、健康管理区分に基づき、作業場変更、配置転換、労働時間短縮、夜間勤務制限、保護具提供、追跡検査、勤務時間中の治療、職業病確認のための紹介等が義務付けられている。

職業病の認定：

職業病の認定は労災保険法に基づき、有害因子へのばく露歴、疾病発症の可能性、医学的因果関係の 3 要件が認められる場合に行われる。特殊健診による早期発見を重視するアプローチにより、労働者側の立証負担の軽減が図られている。

2）タイ

法的枠組み：

タイにおける特殊健診は、複数の法令に基づいて実施されている。主要な根拠法は、労働省所管の労働安全衛生環境法（仏暦 2554 年/西暦 2011 年）であり、有害因子にばく露される労働者に対し、リスクに基づく健康診断を少なくとも年 1 回実施することを使用者に義務付けている。加えて、労働者保護法（仏暦 2541 年/西暦 1998 年）が労働者の権利保護を規定している。下位法令として、リスク要因健康診断基準省令(仏暦 2563 年/西暦 2020 年、旧仏暦 2547 年版を全面改正）が健診の具体的基準を定めている。また、公衆衛生省所管の職業病及び環境疾病管理法（仏暦 2562 年/西暦 2019 年）が、病院で実施される健康診断の品質保証を含め、職業病の予防・管理の枠組みを規定している。このように、労働省と公衆衛生省の二省にまたがる法体系となっている点が特徴的である。なお、労働省所管の法律は正規労働者にのみ適用され、非正規労働者は直接の対象外であるが、公衆衛生省の法律は非正規労働者や公害にばく露される住民も対象としている。

対象物質：

健康診断を要する有害因子は、省令（仏暦 2563 年）に定められた 5 カテゴリで構成されている。具体的には、有害化学物質（6 群 85 物質)、生物学的因子、放射線、物理的要因（騒音、熱、寒冷、振動等)、その他有害環境条件である。検査項目と頻度は有害因子の種類ごとに付属書で規定されている。


実施者：

タイでは、特殊健診を実施する医師に産業医学の資格が求められる。具体的には、予防医学（産業医学）認定医

師、または公衆衛生省が承認する 8 週間の産業医学研修プログラムを修了した医師が実施できる。後者は日本の産業医学ディプロマに相当する位置づけである。日本では免許を有する医師であれば専門資格なく実施可能であるのに対し、タイでは一定の専門研修の修了が要件とされている。

検査項目：

タイの特殊健診の最大の特徴は、検査項目が健康リスクアセスメント（Health Risk Assessment: HRA）の結果に基づいて決定される点にある。産業保健専門家が HRA を実施し、類似ばく露群（Similar Exposure Group: SEG）の概念を用いてリスクレベルを評価したうえで、検査の内容と頻度を設計する。検査内容には、詳細問診、標的臓器の身体診察、生体指標モニタリング、追加特殊検査（肺機能検査、聴力検査、胸部 X 線検査等）が含まれる。法令で物質ごとに一律の検査項目を規定する日本や韓国の方式とは対照的に、タイではリスクベースの柔軟な制度設計が採用されている。



実施頻度：

健康診断は、雇入れ時（30 日以内）、配置転換時（30 日以内）、及び定期的（少なくとも年 1 回）に実施される。定期検査の頻度は HRA のリスクレベルに応じて調整され、高リスクの場合は 6 か月ごと、非常に高いリスクの場合は 3 か月ごとに実施される。

Risk Level	History	Physical examination	Additional tests	Frequency
Very low	✓	-	-	1/year
Low	✓	✓	-	1/year
Moderate	✓	✓	✓	1/year
High	✓	✓	✓	every 6 months
Very high	✓	✓	✓	every 3 months

ばく露情報の収集：

検査に先立ち、化学物質の使用状況、作業環境、保護具の使用、職歴を評価する HRA が実施される。検査時には詳細な問診が行われ、必要に応じて職場訪問も実施される。この HRA を起点とした一連のプロセスは、タイの制度全体を貫く基本的な設計思想である。

結果の判定と事後措置：

異常が認められた場合、医師は業務起因性と就業適性を判定し、結果は個人健康手帳に記録される。使用者、労働者、労働省に報告がなされる。HRA に基づくリスク分類（非常に低い～非常に高い）が検査頻度と項目の指針となる。異常が認められた場合、使用者は医療手配と原因調査を行う義務がある。

報告と記録保存：

異常または職業病の疑いが認められた場合、使用者は 30 日以内に労働監督官に報告しなければならない。記録は個人の健康手帳・健康管理表またはデジタルファイルで事業場に保存され、保存期間は雇用期間全体に加え 2 年間、発がん性物質へのばく露者に

ついては雇用期間全体に加え 10 年間とされている。

一般健康診断との関係：

タイでは一般健康診断とリスクに基づく特殊健診は明確に区別されている。一般健康診断は法律上の義務ではないが、福利厚生として実施されることが多い。

費用負担と職業病認定：

検査費用は使用者が負担する。疾病が業務関連と判定された場合は労災補償基金、そうでない場合は社会保険基金により医療が提供される。職業病は ILO 職業病リスト（2010 年改訂）に準拠して法的に定義されており、公衆衛生省が認定、調査、予防を担当している。

3）シンガポール

法的枠組み：

シンガポールにおける特殊健診は、職場安全衛生法（Workplace Safety and Health Act, 2006 年）及び下位法令である職場安全衛生（健康診断）規則（Workplace Safety and Health (Medical Examinations) Regulations, 2011 年）に基づいて実施されている。人材開発省（Ministry of Manpower: MOM）の労働安全衛生部門が制度を監督しており、指定事業場医及び使用者向けに法定健康診断の実施に関するガイドラインが公開されている。

対象物質：

法定健康診断の対象有害因子は、同規則の第一附則（First Schedule）に規定されている。現在、ヒ素、石綿、ベンゼン、ビチューメン、カドミウム、クレオソート、鉛、マンガン、水銀、有機リン、ペルクロロエチレン（テトラクロロエチレン）、ピッチ、原綿、シリカ、タール、トリクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、圧気環境、過度の騒音の 19 要因が指定されている。日本（120 物質以上）や韓国（180 項目）と比較して極めて限定的であり、制度の規定を最小限にし、専門家の判断に委ねるという設計思想が反映されている。

実施者：

シンガポールでは、法定健康診断は指定事業場医（Designated Workplace Doctor: DWD）のみが実施できる。DWD の要件は、シンガポール医師会（Singapore Medical Council: SMC）に正規登録された医師であること、臨床経験 2 年以上を有すること、及びシンガポール国立大学が提供する産業医学大学院ディプロマ（Graduate Diploma in Occupational Medicine: GDOM）を取得していることである。GDOM は 6 か月間・120 時間の課程であり、職場訪問と臨床症例レポートの提出が含まれる。DWD の登録は終身有効である。なお、産業医学専門医（Specialist in Occupational Medicine）は別途存在し、シンガポール国内には 30 名程度が活動しているが、DWD とは異なる資格である。

検査項目：

法定健康診断で必要な具体的検査項目は、同規則の第一附則で有害因子ごとに規定されている。全ての有害因子について臨床検査が必要であり、有

害因子ごとに検体検査・画像検査等が定められている。日本や韓国のように検査を「一次」「二次」に区分する法令上の規定はなく、DWD は臨床管理または業務適性評価の一環として、再検査、追加検査、専門医紹介を自らの判断で行うことができる。このように、検査項目は法定されつつも、DWD の専門的裁量が大きい点が特徴的である。

実施頻度：

配置前法定健康診断は有害業務開始後3か月以内に実施しなければならない。ただし、圧気環境での作業については、作業開始前 30 日以内に実施が必要である。定期検査は全ての有害因子について 12 か月ごとが基本であるが、鉛・有機リンは6か月ごと、石綿・シリカは3年ごとと、物質により異なる。

評価と就業適性判定：

日本や韓国のような法定の健康管理区分制度は存在しない。DWD は労働者が有害業務に就労適合(fit)かどうかを個別に評価し、評価に基づき一時的または永続的に就業停止（suspend）とすることができる。就業停止または就労適合の認定時には、DWD が人材開発省に停止証明書・適合証明書を提出する。

報告と記録保存：

使用者は人材開発省に「健康診断概要報告書」及び「従業員登録簿」を提出する義務がある。記録の保存期間は少なくとも5年間とされている。

プライバシーとフィードバック：

DWD は健康診断結果を使用者に報告する責任を負い、人材開発省は、DWD が使用者に概要報告書、従業員登録簿、検査結果の写しを提供するとしている。結果のフィードバックは、シンガポール医師会の倫理規定・倫理指針に従い適時に行うことが求められている。日本のように、使用者へのアクセスを制限し労働者の同意を要する仕組みとは異なる構造となっている。

一般健康診断との関係：

シンガポールでは、有害業務に従事しない労働者に対する定期一般健康診断の法的義務は存在しない。配置前健康診断は使用者の裁量で実施される場合がある。この点は、労働安全衛生法に基づき全労働者に一般定期健康診断を義務付けている日本とは大きく異なる。

費用負担と職業病認定：

法定健康診断の費用は使用者が負担する。職業病は職場安全衛生法において、同法の第二附則に規定する疾病、または業務中の化学的・生物学的因子へのばく露に起因するその他の疾病と規定されている。法定健康診断中に労働者が職業病と診断された場合、労災補償法に基づく補償の対象となる。

4）結果のまとめ

表2に、特殊健診の実施者、対象物質、検査項目の決定方法の各国比較のまとめを示す。3か国の調査結果を総括すると、特殊健診制度の設計思想には、物質列挙型からリスクベース型に至る連続的なスペクトラムが認められた。

韓国は日本と同様に物質列挙型の

制度設計を採用しており、対象物質ごとに一次・二次の検査項目を施行規則で詳細に規定している。一方で、実施者を職業環境医学専門医に限定し、機関単位の指定制度を併設している点、職業性疾患と一般疾患を明確に区分する健康管理区分を有する点、検査機関から行政への直接報告制度を設けている点において、日本とは異なる特徴が認められた。

タイはリスクベース型の制度設計を採用しており、検査項目・頻度ともに健康リスクアセスメント(HRA)の結果に基づき医師が決定する。法令は検査項目を一律に固定せず、有害因子のカテゴリと基本的な枠組みを規定するにとどめている。また、労働省と公衆衛生省の二省にまたがる法体系を有し、正規労働者と非正規労働者で適用される法律が異なる点も特徴的であった。

シンガポールは成果志向型の制度設計を採用しており、対象有害因子を19要因に限定し、制度の規定を最小限にしたうえで、指定事業場医(DWD)の専門的判断に広く委ねる設計となっている。法定の健康管理区分は存在せず、DWDが就業適性を個別に判断する。DWDの資格要件として産業医学大学院ディプロマの取得を必須としている点は、韓国の専門医要件とは異なる形で実施者の質を担保する仕組みである。また、有害業務に従事しない労働者に対する一般定期健康診断の法的義務がない点は、日本を含む他の3か国とは異なる特徴であった。

3か国に共通する点として、特殊健診の費用は使用者負担であること、有害業務に従事する労働者に対する健康診断は事業場規模にかかわらず義務付けられていること、及び実施者に一定の専門性を求めている点が挙げられた。一方、日本では免許を有する医師であれば特殊健診を実施できるのに対し、調査対象3か国ではいずれも産業医学に関する専門資格または研修修了を法的要件としている点が、日本との相違点として確認された。

D. 考察

本研究では、韓国、タイ、シンガポールの3か国を対象に、訪問前調査シートと現地インタビュー調査を組み合わせた質的比較研究により、アジア諸外国における特殊健診制度の実態を把握した。その結果、制度の設計思想には物質列挙型からリスクベース型に至るスペクトラムが存在すること、また3か国いずれにおいても実施者に産業医学の専門性を求めている点が共通していることが明らかとなった。以下、Donabedianの構造(Structure)・過程(Process)・結果(Outcome)の枠組みも参考にしつつ、日本の制度との比較から得られた示唆について考察する。

1) 特殊健診実施者の専門性

本調査で最も顕著な知見の一つは、調査対象3か国のいずれにおいても、特殊健診の実施者に産業医学に関する専門資格または研修修了を法的要件として課していたことである。韓国

では職業環境医学専門医の独占業務として位置づけられ、さらに人員・施設・設備の要件を満たした指定機関のみが実施できる二重要件が課されている。タイでは産業医学認定医師または8週間の産業医学研修修了医師が要件とされ、シンガポールでは指定事業場医(DWD)として産業医学大学院ディプロマ(GDOM、6か月・120時間)の取得が必須とされている。専門性の水準には幅があるものの、3か国とも一定の専門研修を経た医師のみが特殊健診を実施する制度設計となっている。

一方、日本では免許を有する医師であれば特殊健診を実施でき、産業衛生の専門資格は法的に要求されていない。特殊健診においては、職歴の聴取、ばく露評価、標的臓器の臨床所見の解釈、健康管理区分の判定など、産業医学に関する専門的知識を要する判断が求められる。調査対象国では、これらの判断を専門性のある医師に委ねることで、健診の質を構造的に担保する仕組みが構築されている。日本においても様々な既存の専門医制度の枠組みを活用した段階的な要件設定を検討する余地があると考えられる。

また、韓国では指定特殊健診機関に対して韓国産業安全保健公団(KOSHA)による定期的な品質評価が実施されており、判定基準の標準化と機関間の質の均一化が図られている。日本においても全国労働衛生団体連合会(全衛連)による精度管理事業が実施されているが、今回の調査では各国の精度管理制度の詳細な比較には至らなかった。今後、実施機関の質評価制度や判定基準の標準化のあり方について、さらに検討を深めることが望まれる。

2) 対象物質の決定方法

対象物質の決定方法について、各国の制度設計に特徴的な差異が認められた。日本と韓国は、省令で個別物質を指定し、物質ごとに検査項目を詳細に規定する物質列挙型を採用している。一方、シンガポールは対象有害因子を19要因に限定し、制度の規定を最小限にしたうえでDWDの専門的判断に委ねる成果志向型の設計を採用している。

日本では、2024年4月以降、リスクアセスメント対象物に対する健康診断制度が導入され、対象物質は段階的に拡大している。この制度は、従来の法定特殊健診を補完し、リスクアセスメントの結果に基づいて医師が検査の要否を判断する仕組みであり、物質列挙型からリスクベース型への移行を含む重要な制度改革と位置づけられる。

タイでは、すべての化学物質に対して健康リスクアセスメント(HRA)を起点とし、専門家が検査の内容・頻度を設計する一連のプロセスが制度として存在している。このプロセスは、リスクアセスメント→専門家による健診設計→結果評価→措置→記録という循環型の構造を有しており、労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の枠組みと整合的である。日本においても、リスクアセスメント対象物健康診断の運用が本格化するなかで、タイ

の制度設計から学びうる点は多いと考えられた。特に、リスクアセスメントの結果と健康診断の設計を専門家が一貫して担う体制の構築や、健診結果を次のリスク評価にフィードバックするプロセスの明確化は、制度の実効性を高めるうえで有効であろう。

この考え方は、すべての化学物質に対して網羅的な法定基準を設けることが現実的でない場合に、専門家の裁量を活かす一つのモデルとして参考になる。ただし、このアプローチが有効に機能するためには、やはり実施者の専門性を制度的に保証する仕組みが前提となる。

3）検査項目の設定方法

検査項目の設定方法は、制度設計の根幹に関わる点であり、各国の特徴が表れた領域であった。日本と韓国は、物質ごとに検査項目を法令で詳細に規定する方式を採用しており、均一性と予測可能性に優れる反面、個別の作業環境やばく露条件に応じた柔軟な対応が困難になりうるという側面がある。

タイの制度は、対象物質の決定と併せて特徴的であった。タイでは、HRA の結果に基づき、産業保健専門家が検査項目のみならず実施頻度まで決定する。リスクレベルに応じて高リスクの場合は 6 か月ごと、非常に高いリスクの場合は3か月ごとに健診が実施される。法令は有害因子のカテゴリと基本的な枠組みを規定するにとどめ、具体的な検査内容は専門家の判断に委ねている。このリスクベース型の設計は、ばく露条件の多様性に対応するうえで合理的なアプローチであり、日本のリスクアセスメント対象物健康診断の運用にあたって参考にしうる。

日本の法定特殊健診では、物質ごとに一次健診と二次健診の項目が詳細に規定されているが、検査項目が形式的に実施され、職歴聴取やばく露評価の情報が十分に活用されていないとの指摘もある。今回の調査対象国の制度を踏まえると、法令による最低限の項目規定を維持しつつも、リスクアセスメントの結果や個別のばく露条件に応じて専門家が検査内容を調整できる仕組みを併せ持つことが、制度の実効性を高める方向性として示唆される。

4）アウトカムへの接続強化

特殊健診制度の最終的な目的は、職業性疾病の予防と早期発見にある。しかし、個別の事業場レベルでの健診が職業性疾病の検出にどの程度有効であるかについては、制度上のモニタリング体制が十分に整備されているとは言い難い状況が、調査対象国を含め共通して認められた。

Watanabe, Fukai ら（2024）は、300 人規模の事業場において同一種のがんが 2 例発生する確率を標準化罹患比（SIR）を用いてシミュレーションし、ほとんどのがん種で SIR が有意に高い値を示すには 5 年以上の観察期間を要することを踏まえると、個別事業場レベルで職業がんの集積を検出することは理論上極めて困難であることを報告した[2]。この知見は、日本のみな

らず今回の調査対象国にも共通して当てはまる課題であり、実際に3か国いずれのインタビュー対象者からも、個別事業場の健診データのみでは職業性疾病の早期発見には限界があり、国家レベルでのモニタリングシステムの構築が必要であるとの見解が示された。

韓国では、検査機関から地方雇用労働庁への直接報告制度が設けられており、事業主を介さない情報フローによってデータの集約が構造的に促進されているが、健診データと労災認定データやがん登録データとのリンケージは、いずれの国においても十分には実現されていない。タイでは登録サービス機関から疾病管理局へのデータ転送の仕組みはあるものの、データ提供が依然として課題であるとの意見が聴取された。

日本においても、特殊健診の実施状況は労働基準監督署への報告により把握されているが、有所見者のその後の転帰や、健診が職業性疾病の検出にどの程度寄与しているかについての系統的な評価は行われていない。特殊健診データ、がん登録、労災認定データ等のリンケージによるモニタリング体制の構築が、制度の有効性を可視化し、エビデンスに基づく制度改善サイクルを確立するうえで重要な課題であることが示唆された。

5）本研究の限界

本研究にはいくつかの限界がある。第一に、調査対象国が韓国、タイ、シンガポールの 3 か国に限られており、世界全体の制度を網羅するものではない。第二に、各国 1〜2 機関の専門家へのインタビューに基づく質的研究であり、各国の制度運用の全体像を代表するものではない。制度の法令上の規定と実際の現場における運用には乖離がありうる点にも留意が必要である。第三に、今回の調査では実施機関の精度管理制度の詳細な比較や、制度のアウトカム評価に関する十分なデータを得るには至らなかった。

一方で、本研究には以下の強みがある。現地訪問によるインタビュー調査を実施したことにより、文献調査のみでは得られない各国の制度運用の実態や、法令の背景にある歴史的・社会的文脈、現場で認識されている課題を直接聴取することができた。特に、物質列挙型からリスクベース型に至る制度設計のスペクトラムの把握や、実施者の専門性に関する各国の設計思想の差異は、文献調査では捉えがたい知見であった。また、アジア諸外国の特殊健診制度から日本の制度改善に資する示唆が予想以上に多く得られたことは、本研究の意義として強調したい。これらの知見を基盤として、今後さらに対象国を拡大し、精度管理やアウトカム評価を含む包括的な比較研究を展開していくことが期待される。

E. 結論

アジア3か国の特殊健診制度の比較から、我が国の制度を発展させるための示唆が得られた。特殊健診実施者の

専門性について、調査対象3か国がいずれも産業医学の専門的研修を法的要件としていることは、日本においても実施者の専門的要件のあり方を検討する契機となりうる。また、リスクアセスメントを起点とした検査設計を専門家が一貫して担う制度は、日本のリスクアセスメント対象物健康診断の運用充実に向けた参考モデルとなりうる。さらに、個別事業場レベルの健診のみでは職業性疾病の検出に限界があることは国際的に共通する課題であり、国家レベルでのモニタリング体制の構築が重要であることが確認された。

今後、本研究の知見を踏まえ、精度管理制度やアウトカム評価を含む更なる国際比較研究を進め、日本の特殊健診制度の継続的な改善に貢献していくことが求められる。

F. 引用及び参考文献

[1] Gale NK, Heath G, Cameron E, Rashid S, Redwood S. Using the framework method for the analysis of qualitative data in multi-disciplinary health research. BMC Med Res Methodol. 2013;13:117.

[2] Watanabe S, Fukai K, Tatemichi M. Estimating the probability of multiple incidences of the same cancer type in a single workplace. J Occup Health. 2024;66(1):uiae072.

G. 学会発表

なし

H. 論文発表

表 1）特殊健診制度の比較（日本、タイ、韓国、シンガポール）

項目	日本：法定特殊健診	日本：リスクアセスメント対象物健康診断	タイ	韓国	シンガポール
①法的根拠と所管行政機関	特殊健診は労働安全衛生法により義務付けられている。同法は、化学物質や物理的有害因子へのばく露を伴う業務に従事する労働者に対し、使用者が定期的に健康診断を実施することを求めている。厚生労働省が本制度を所管し、詳細な実施方法は政令・省令で規定されている。	本健康診断は、労働安全衛生規則第 577 条の 2 第 3 項及び第 4 項に基づき義務付けられている。リスクアセスメントにより健康への有害性が特定された化学物質を取り扱う労働者が対象となる。使用者が実施責任を負い、厚生労働省が所管する。	職業健康診断は、労働省所管の労働安全衛生環境法（仏暦 2554 年/西暦 2011 年）及び関連省令により義務付けられている。同法は、ばく露を受ける労働者に対し、リスクに基づく健康診断を少なくとも年 1 回実施することを使用者に義務付けている。これらの法律は正規労働者にのみ適用される。公衆衛生省所管の職業病及び環境疾病管理法（仏暦 2562 年/西暦 2019 年）も、病院で実施される健康診断の品質保証を含め、職業病の予防・管理の枠組みを規定している。	特殊健診は労働安全衛生法により義務付けられている。第 130 条は、指定有害物質にばく露される労働者に対する健康診断の実施を使用者に求めている。雇用労働部が本制度を所管し、詳細な実施方法は労働安全衛生法施行規則で規定されている。	法定健康診断は、職場安全衛生法（2006 年）及び下位法令である職場安全衛生（健康診断）規則（2011 年）に基づき規定されている。これらの健康診断は、人材開発省労働安全衛生部門が監督している。指定事業場医及び使用者向けに、法定健康診断の実施に関する職場安全衛生ガイドラインが公開されている。

②対象物質	特殊健診の対象物質は、同法に基づく省令で規定されている。有機溶剤（54 物質）、鉛（無機・有機）、石綿（6 種類）、粉じん（金属、研磨材、溶接ヒューム等）、及び慢性毒性または遅発性毒性を有する 75 の特定化学物質（発がん性物質等）が含まれる。	対象物質は、厚生労働省が有害性ありと指定した化学物質である。リスクアセスメント対象物質の範囲は拡大しており、2024 年 4 月時点で 896 物質、2025 年度には約 1,600 物質、2026 年度には約 2,900 物質に達する見込みである。	健康診断を要する有害因子には、労働省所管の法令で定義される有害化学物質、粉じん、騒音、放射線、熱、寒冷、光、振動が含まれる。検査項目と頻度は、有害因子の種類ごとに付属書で規定されている。	対象物質は施行規則別表 22 に規定されており、有機溶剤（N,N-ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ベンゼン等）、金属及びその化合物（鉛、水銀、クロム等）、粉じん（石綿、綿じん、鉱物性粉じん、木粉）、物理的因子（騒音、振動）、夜間勤務を含む 180 物質が含まれる。発がん性物質、生殖毒性物質、その他の慢性健康障害も対象となる。	法定健康診断の対象物質は、職場安全衛生（健康診断）規則（2011 年）の第一附則で規定されている。現在、ヒ素、石綿、ベンゼン、カドミウム、圧気、過度の騒音、鉛、マンガン、水銀、有機リン、テトラクロロエチレン、シリカ、タール/ピッチ/ビチューメン、塩化ビニルモノマーを含む 19 の特定有害因子が指定されている。
③対象労働者	指定された有害物質または物理的有害因子へのばく露を伴う業務に「常時」従事する労働者が対象となる。「常時」は法律で明確に定義されていないが、一般的にばく露の頻度、期間、量に基づいて解釈され、広く適用されることが多い。	本健康診断の対象者は、リスクアセスメントにより健康への有害性が特定された物質を取り扱う労働者である。使用者が省令の基準に基づき選定責任を負う。基準には①高い健康リスクがあり定期的な検査を要する労働者、②閾値を超えるばく露の可能性があり緊急検査を要する労働者が含まれる。	健康診断は、職業上の有害因子に著しくばく露される労働者を対象に実施される。選定は、類似ばく露群（SEG）による健康リスクアセスメント（HRA）とばく露評価に基づく。目的は、健康サーベイランスによる早期発見と労働者の業務適性確保である。	指定有害物質へのばく露を伴う特殊健診対象業務に従事する労働者が対象となる。選定は、個人のばく露評価ではなく、有害業務区域への配置に基づく。指定された職種の全労働者は、実際のばく露レベルにかかわらず健康診断を受けなければならない。	有害業務に従事する全ての労働者は、法定健康診断の受診が義務付けられている。有害業務とは、職場安全衛生（健康診断）規則（2011 年）に掲げる有害因子を使用、取扱い、またはばく露される職業を指す。

④事業場規模要件	事業場の規模にかかわらず、有害業務が行われる全ての事業場に特殊健診の実施義務がある。従業員数は本要件に影響しない。	法定健康診断と同様、有害業務を行う全ての事業場に規模にかかわらず実施義務がある。	労働者を 1 人以上雇用する全ての企業が労働省所管の法律の適用を受けるが、非正規労働者は直接の対象外である。公衆衛生省の法律は、非正規労働者や公害にばく露される住民も対象とする。企業規模よりもリスクの有無が優先される。	有害業務に従事する労働者がいる全ての事業場に、規模にかかわらず特殊健診の実施義務がある。同法は、労働者 1 人の事業場から大企業まで全ての使用者に適用され、企業規模による免除はない。	事業場の規模にかかわらず、職場安全衛生（健康診断）規則（2011 年）の第一附則に掲げる有害因子を使用、取扱い、またはばく露される有害業務に従事する労働者は、法定健康診断の受診が義務付けられている。
⑤検査項目	対象物質ごとに省令で具体的な項目が規定されている。業務歴、作業条件の簡易調査、自覚症状・他覚症状、物質に応じた医学的検査または生物学的モニタリングが含まれる。医師は必要に応じて項目を追加できる。	具体的な項目は法定されていない。医師または産業保健専門家が、科学文献、安全データシート（SDS）、専門的判断に基づき項目を決定する。	項目は HRA の結果に基づいて決定され、業務歴、身体検査、物質ごとの生物学的モニタリングが含まれる場合がある。詳細は付属書で規定されている。産業保健専門家が内容と頻度を設計する。	検査項目は別表 24 で有害物質ごとに規定されており、業務歴・ばく露歴調査、既往歴、自覚症状調査、標的臓器の臨床検査、一次臨床検査（全員必須）、二次臨床検査（詳細評価を要する者）、該当する場合は生物学的ばく露指標検査を含む。	法定健康診断で必要な具体的項目は、職場安全衛生（健康診断）規則（2011 年）の第一附則で規定されている。全ての有害因子について臨床検査が必要であり、臨床検査（検体検査、画像検査等）は有害因子ごとに規定されている。

⑥ 実施時期と頻度	健康診断は、雇入れ時、配置転換時、及び 6 か月を超えない間隔で定期的に実施しなければならない。	法定の間隔は定められていない。頻度は医師の勧告とリスクレベルに基づき使用者が決定する。閾値を超えるばく露が疑われた場合は、速やかに実施すべきである。	健康診断は、雇入れ時（30 日以内）、配置転換時（30 日以内）、及び定期的（少なくとも年 1 回）に実施される。頻度は HRA のリスクレベルに応じて調整される（高リスク：6 か月ごと、非常に高いリスク：3 か月ごと等）。	初回検査は配置後の規定期間内（物質により 1～12 か月）に実施しなければならない。定期検査は物質ごとの間隔に従う：高リスク物質は 6 か月ごと、石綿・綿じんは 12 か月ごと、鉱物性粉じん・騒音は 24 か月ごと、その他ほとんどの物質は 12 か月ごと。	配置前法定健康診断は有害業務開始後 3 か月以内に実施する。ただし、圧気環境での作業は、作業開始前 30 日以内に実施が必要である。定期検査は全ての有害因子について 12 か月ごと、鉛・有機リンは 6 か月ごと、石綿・シリカは 3 年ごと。
⑦ 医師の資格要件	免許を有する医師であれば特殊健診を実施できる。産業衛生の専門資格は要求されない。	法定健康診断と同様、免許を有する医師であれば実施できる。	医師は産業医学の資格を有するか、公衆衛生省が認定する 8 週間の産業保健研修プログラムを修了していなければならない。	健康診断は、指定特殊健診機関の産業医学専門医が実施しなければならない。機関は人員、施設、設備の要件を満たし、指定を受けるための品質評価に合格しなければならない。	法定健康診断は指定事業場医（DWD）のみが実施できる。DWD は医師登録法に基づく免許を有する医師で、人材開発省が認める課程（産業医学大学院ディプロマ及び産業医学専門医等）を修了していなければならない。
⑧ 収集されるばく露情報	作業条件の簡易調査が必須項目である。環境測定データ、有害物質の平均使用頻度、前回検査以降の作業工程やばく露の変化、局所排気装置・保護具の有無と使用状況、高ばく露の発生が含まれる。	リスクアセスメントに基づき、使用者は物質の有害性、作業場測定、作業手順、保護具使用、作業変更歴などのデータを医師に提供しなければならない。データ提供の範囲と方法は使用者と医師の裁量に委ねられている。	検査前に、化学物質使用、作業環境、保護具使用、職歴を評価する HRA を実施する。検査時に詳細な問診を行う。必要に応じて職場訪問を実施する。	必須収集項目には、作業場環境測定結果、業務歴・ばく露パターン、過去の健康診断結果、詳細な作業工程・職務変更、保護具使用状況、高ばく露の発生が含まれる。	使用者は、「労働者の適切な健康診断を実施するために関連し、両者が共同で知り得る全ての情報」を指定事業場医に提供しなければならない（職場安全衛生（健康診断）規則 2011 年）。

⑨ 二次検査	初回検査で異常が認められた場合、医師の判断により二次（精密）検査を実施できる。二次検査の項目は労働者の健康状態に応じて柔軟に決定され、法律で標準化されていない。	異常が検出された場合、医師の判断により追加検査を実施できる。二次検査に関する法定基準はない。	異常が検出された場合、医師は業務関連性と業務適性を評価する。疾病が疑われる場合、公的機関が関連法に基づき調査を行う。	一次検査結果の解釈が困難な場合または鑑別を要する場合、二次検査が義務付けられる。二次検査項目は別表 24 で標的臓器ごとに規定されている。使用者は通知後 30 日以内に二次検査を実施しなければならない。	法令上、検査を「一次」「二次」に分類する規定はない。DWD は臨床管理または業務適性評価の一環として、再検査、追加検査、専門医紹介を行うことができる。
⑩ 評価と分類	医師は一般的に 5 段階評価を使用する：A（異常なし）、B（要精検を要しない軽微な異常）、C（要治療）、R（ばく露継続により悪化のおそれ）、T（業務に関係のない異常）。この分類は法定ではないが、行政指導として広く使用されている。	法定の分類制度はない。医師または産業保健専門家が、臨床判断とばく露リスクに基づき医学的リスクを評価し、使用者に必要な措置を助言する。	異常が認められた場合、医師は業務関連性と業務適性を判定し、使用者、労働者、労働省に報告する。HRA に基づくリスク分類（非常に低い～非常に高い）が検査頻度と項目の指針となる。	健康管理区分：A（健康）、C1（職業病観察）、C2（一般疾病観察）、D1（職業病所見）、D2（一般疾病所見）、R（二次検査要）等。業務適性判定：現条件で適合、一定条件で適合、一時的不適合、永続的不適合。	法令に検査結果の分類制度は規定されていない。DWD は労働者が有害業務に就労適合かどうかの評価を提供しなければならない。DWD は評価に基づき労働者を一時的または永続的に就業停止とすることができる。
⑪ プライバシー保護	使用者は労働者のプライバシーを確保しなければならない。検査結果は労働者に直接通知される。使用者と共有される情報は必要最小限の項目（業務適性等）に限定され、労働者の同意を要する。	法定健康診断と同様、結果は労働者に直接通知され、使用者のアクセスは制限される。	結果は機密として扱われる。無関係な者への開示は禁止されている。医師は労働者、使用者、労働省に報告する。公開は公益上の場合のみ認められる。	個人の健康診断結果は 30 日以内に労働者に送付しなければならない。使用者は、労働者の同意なく個人の医療詳細を除く集計結果を受け取る。医療の機密性は厳格に保護される。	DWD は健康診断結果を使用者に報告する責任を負う。人材開発省は、DWD が使用者に概要報告書、従業員登録簿、検査結果の写しを提供すると述べている。

⑫ 費用負担	使用者が特殊健診の費用全額を負担する。労働者との費用分担は認められない。	法定健康診断と同様、使用者が全額を負担し、労働者に費用負担はない。	使用者が検査費用を負担する。疾病が業務関連の場合は労災補償基金、そうでない場合は社会保険基金により医療が提供される。	検査費用は企業規模にかかわらず使用者が全額負担する。労働者との費用分担・自己負担はない。二次検査や事後措置の追加費用も使用者の責任である。中小企業向けの政府支援がある。	職場安全衛生（健康診断）規則に基づき、法定健康診断の費用は使用者が負担する。
⑬ 一般健康診断との関係	検査項目が一般健康診断と重複する場合、結果を共用できる。ただし、特殊健診に特有の項目は別途実施しなければならない。	一般健康診断の結果は関連がある場合に使用できるが、リスクアセスメントに基づく検査は物質特異的なスクリーニングを要する。したがって、追加検査が必要になることが多い。	一般健康診断とリスクに基づく健康診断は区別される。後者はより詳細な項目を含む。一般健康診断は義務ではないが、福利厚生として実施されることが多い。	特殊健診は一般健康診断とは別に実施される。他の法律に基づく同等の健康診断で同じ検査項目を含む場合、一般健康診断の代替とできるが、特殊健診の代替にはならない。	有害業務に従事しない労働者に対する定期一般健康診断の法的義務はない。配置前健康診断は使用者の裁量で実施される場合がある。
⑭ 事後措置	事後措置は分類結果に応じて規定されている。例えば、A は措置不要、B・R は就業制限や追加検査、C・T は有害業務の禁止と医療が必要となる場合がある。これらの措置は医師の勧告に基づき使用者が実施する。	事後措置には配置転換、作業環境改善、就業制限が含まれる場合がある。ただし、法律で詳細な義務は規定されておらず、医師の判断と使用者の裁量に基づき実施される。	異常が認められた場合、使用者は医療手配と原因調査を行わなければならない。医師は業務関連性を判定し、職務上の配慮を勧告できる。	健康管理区分に基づく義務的事後措置：作業場変更、配置転換、労働時間短縮、夜間勤務制限、保護具提供、追跡検査、勤務時間中の治療、職業病確認のための紹介、その他必要な措置。	職場安全衛生ガイドラインは、有害因子ごとの事後措置を詳述している：検査、リスク低減、届出、就業停止、専門医紹介、人材開発省への報告更新。

⑮ 従業員への開示	使用者は従業員に検査結果を速やかに通知する義務がある。	労働者への速やかなフィードバックが必要だが、開示の方法や様式に関する具体的な法的規定はない。	使用者は、職業上のリスク、予防措置、保護具の使用、検査結果について労働者に周知しなければならない。医師は労働者に直接フィードバックを行う。	検査機関は、医学的意見と必要な事後措置を含む個人の検査結果を30日以内に労働者に提供しなければならない。所見のある労働者には、詳細な説明が必要である。	DWDは、シンガポール医師会の倫理規定・倫理指針に従い、検査結果を適時に患者に伝達することが求められる。
⑯ 行政機関への報告	使用者は所轄の労働基準監督署に「特殊健診結果報告書」を提出しなければならない。報告書には、総従業員数、有害業務従事者数、受診者数、有所見者数、事後措置の状況が含まれる。	定期的な報告義務はない。ただし、監督時に健康診断やリスク管理の状況説明を求められる場合がある。	異常または職業病の疑いが認められた場合、使用者は30日以内に労働監督官に報告しなければならない。結果は健康手帳・健康管理表に記録される。	特殊健診機関は検査結果を30日以内に地方雇用労働庁に提出しなければならない。特定の措置が必要な場合、使用者は30日以内に事後措置結果報告書を提出しなければならない。違反には行政処分が科される。	使用者は人材開発省に「健康診断概要報告書」及び「従業員登録簿」を提出する義務がある。DWDは、労働者の就業停止または就労適合の認定時に、停止証明書・適合証明書を提出する義務がある。
⑰ 記録保存と保存期間	保存期間は物質により異なる：有機溶剤、鉛、特定化学物質は5年、粉じんは7年、発がん性物質は30年、石綿は40年。	記録は一般的に5年間保存しなければならない。発がん性物質に分類される物質については30年間の保存が必要である。	結果は個人の健康手帳・健康管理表またはデジタルファイルで事業場に記録しなければならない。雇用期間全体に加え2年間、発がん性物質へのばく露者は雇用期間全体に加え10年間保存しなければならない。	健康診断機関:診療記録10年、検査記録5年。使用者：健康診断結果5年、特別有害物質30年。電子記録：紙記録と同等に認められ、セキュリティ措置が必要。	責任者（使用者または元請）は法定健康診断の報告書を少なくとも5年間保存しなければならない。

⑱ 実施状況の監視	特殊健診の実施状況は労働基準監督署等により監視される。基準を満たさない事業場は是正措置の対象となる場合がある。	実施率の監視に関する明示的な法的義務はない。	登録サービス機関が検査データを担当官に報告し、担当官は疾病管理局に転送する。一部の企業で OSH 管理システムが導入されているが、データ提供は依然として課題である。	韓国産業安全保健公団による指定特殊健診機関の定期評価と品質審査。機関審査を通じた検査実施率と品質の監視。適切な実施のための行政指導・支援。基準不適合の場合は指定取消しの可能性がある。	人材開発省が遵守状況の確保を担当する。法定健康診断を実施しない場合は、職場安全衛生（健康診断）規則違反となり、執行措置の対象となる場合がある。
⑲ 職業病の認定と補償	職業病の認定は、業務歴、ばく露条件、医学的所見を考慮した労災保険法に基づく申請・審査プロセスによる。検査で発見された疾患が治療を要する場合、業務外と判断されれば公的医療保険、職業病と認定されれば労災保険（使用者負担）で補償される。	認定は労災保険法に基づき、業務歴、ばく露、医学的所見による。疾病が業務外と判断されれば公的医療保険、職業病と認定されれば労災補償（使用者負担）が適用される。	職業病は ILO R194（2010 年改定）に準拠して法的に定義されている。公衆衛生省が認定、調査、予防を担当する。非正規労働者も対象となる。	労災保険法に基づき、①有害因子へのばく露歴、②疾病発症の可能性、③医学的因果関係が認められる場合、職業病として認定される。特殊健診による早期発見・予防志向のアプローチは、労働者の立証負担を軽減し、作業環境の改善につながる。	職業病は職場安全衛生法で、第二附則に規定する疾病または業務中の化学的・生物学的因子へのばく露に起因するその他の疾病と規定されている。法定健康診断中に労働者が職業病と診断された場合、労災補償法に基づく補償の対象となる。

表 2）特殊健診の実施者、対象物質、検査項目の決定方法の各国比較

	日本	韓国	タイ	シンガポール
実施者	医師であれば 実施可能 （資格要件なし）	職業環境医学 専門医のみ ＋指定機関のみ	産業医学認定 医師または 8 週間研修 修了医師	DWD のみ （GDOM 取得必須： 6 ヶ月・120 時間）
対象物質	120+物質 ＋RA 約 2,900 物質 （2026 年度見込） （省令で個別指定）	180 項目 （化学物質 164、 粉じん 7、 物理的因子 8、 夜間作業） **日本と類似**	5 カテゴリ・85 物質 **HRA に基づき** **対象を決定**	19 要因のみ **極めて限定的**
検査項目の決定方法	法令で物質ごとに 詳細規定	法令で物質ごとに 一次・二次を 詳細規定	HRA に基づき 医師が決定 法令は項目を固定せず	法令で要因ごとに 規定するが DWD の裁量大