

Sa loob ng
isang taon (2025)

Bagong
naitalang kaso:

9,899 katao

Bilang ng
namatay (Humigit-kumulang):

1,474 katao

Karamihan sa bagong naitalang pasyente
ng TB ay nakatatanda na at halos 60% ang
nasa 60 taong gulang pataas.



May **TB** pa rin sa Japan sa kasalukuyan

Sa maagang

pagtuklas,

maagang

diagnosis

para sa tamang
paggamot!



Kung mahigit dalawang linggo ng
nagpapatuloy ang ubo o plema, o kung
patuloy ang sinat at pagkatamlay ng
katawan, magpatingin na tayo ng
maaga sa medikal na institusyon.




May iba't-ibang uri ang
impeksyong ito, kaya mabisa ang

pangunahing

pag-iingat

May mga impeksyon sa baga tulad
ng trangkaso, COVID-19, at
pulmonyang dulot ng bakteryang
mabisa laban dito ang pangunahing
pag-iingat: paghuhugas ng kamay,
pagpapahangin, at tamang
pag-ubo.



Alamin natin ang tama tungkol sa

mga impeksyon sa baga

Iba't ibang sintomas
ang dala ng

sakit dulot ng

nontuberculous

mycobacteria (NTM)

Maaaring magdulot ng iba't ibang
sintomas ang sakit dulot ng NTM tulad ng
matagal na ubo, plema, lagnat,
panghihina, at pagbaba ng timbang.
Ngunit hindi ito karaniwang naililipat sa
pagitan ng mga tao tulad ng TB.



Sa matagal na ubo, isaaisip ang

sakit dulot ng NTM


Kumonsulta sa

klinika ng

respiratory medicine

na malapit sa inyo

Dahil maaaring tumagal ang diagnosis at
pagpapagamot, agad kumonsulta sa
doktor kapag patuloy pa rin ang mga
sintomas.



※NTM(sakit dulot ng nontuberculous mycobacteria)

ORGANIZER



MHLW

Ministry of Health,
Labour and Welfare of Japan

SUPPORT



Cabinet Agency
for Infectious Disease Crisis Management



MEXT

MINISTRY OF EDUCATION,
CULTURE, SPORTS,
SCIENCE AND TECHNOLOGY-JAPAN

Tuberculosis



Sakit na Acute
Respiratory
Infection (ARI)



Sakit dulot ng
NTM

