

Dalam
satu tahun
(2025)

Kasus baru
terdaftar:

9.899

Kematian(perkiraan):

1.474

Sebagian besar pasien TB yang
baru terdaftar adalah lansia, sekitar
60% berusia 60 tahun atau lebih.

Di Jepang
saat ini
masih ada

Tuberkulosis

Deteksi

dini,

diagnosis

dini

untuk pengobatan
yang tepat!

Apabila Anda mengalami batuk atau
dahak selama dua minggu atau lebih,
atau jika Anda merasa demam ringan
atau kelelahan yang berkepanjangan,
segera cari bantuan medis.

**Pahami
dengan benar
tentang**

**Infeksi
Saluran
Pernapasan**

Meskipun ada banyak jenis
infeksi saluran pernapasan,

langkah pencegahan

dasar tetaplah efektif

Infeksi saluran pernapasan, termasuk
influenza, COVID-19, dan pneumonia
bakteri, kebanyakan dapat dicegah
dengan langkah pencegahan dasar,
seperti mencuci tangan, pergantian
udara, dan etika saat batuk.

Ada
berbagai
gejala pada

penyakit

mikobakteria

nontuberkulosis (NTM)

Penyakit NTM dapat menimbulkan berbagai
gejala seperti batuk berkepanjangan,
berdahak, demam, kelelahan, dan turunnya
berat badan. Berbeda dengan TB, penyakit ini
umumnya tidak menular antar-manusia.

※NTM(mikobakteria nontuberkulosis)

**Batuk
berkepanjangan?
Waspadai**

**Penyakit
NTM**

Periksakan diri ke
**klinik spesialis paru
terdekat**

Diagnosis dan pengobatan dapat
memakan waktu. Jika gejala berlanjut,
segera periksakan diri.

ORGANIZER



MHLW

Ministry of Health,
Labour and Welfare of Japan

SUPPORT



Cabinet Agency
for Infectious Disease Crisis Management



MEXT

MINISTRY OF EDUCATION,
CULTURE, SPORTS,
SCIENCE AND TECHNOLOGY-JAPAN

Tuberkulosis



Infeksi Saluran
Pernapasan Akut
(ISPA)



Penyakit NTM

