

事務連絡
令和元年10月19日

各 都道府県
保健所設置市
特別区 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康局結核感染症課

令和元年台風第19号に係る被害地域における感染症予防対策としての消毒等について

標記被害に際して、令和元年10月13日付事務連絡「令和元年台風第19号に係る被害地域における感染症予防対策について」及び令和元年10月16日付事務連絡「令和元年台風第19号に係る被害地域における感染症予防対策としての消毒及び害虫等対策の実施について」にて、感染症の発生及びまん延が懸念される場合の感染症予防対策として消毒及び害虫等対策（ねずみ族、昆虫等駆除）を円滑かつ適切に実施いただくようご連絡したところですが、当該消毒等に係る追加の留意事項を下記のとおり取りまとめましたので、対応に当たりご配慮いただきますようお願いします。

なお、標記被害地域を含まない地方公共団体におかれましても、今後の参考とされますよう本事務連絡を送付します。

記

（1）浸水した家屋等の消毒の手順の周知及び関連物資の配布について

浸水した家屋等の消毒の手順について、住民の方々に対する周知用資料を別添のとおり作成しましたので、周知の際にご活用いただきますようお願いします。また、住民の方々に対して消毒薬を配布する際には、必要に応じてマスクや手袋等の関連物資も併せて配布いただきますようお願いします。

（2）がれきの撤去等の作業に専門的に従事する方への防じんマスク着用の勧奨について

消毒を行う前提となるがれきの撤去等に際して、汚泥から生じるレジオネラ菌を含む微細な水滴を多量に吸引した場合には、レジオネラ症を発症する可能性があるため、特にがれきの撤去等の作業に専門的に従事する方については、防じんマスクの着用を勧奨していただきますようお願いします。

別添：浸水した家屋の感染症対策

浸水した家屋の感染症対策

- 感染症予防のためには、**清掃と乾燥**が最も重要です
清掃が不十分だと、消毒の効果を発揮できません！！
- **屋外（床下や庭）の消毒は原則不要**です

消毒の手順

消毒の前に十分清掃しましょう！

- ①ほこりから目や口を保護するため、**ゴーグル・マスクを着用**
- ②清掃中のケガ予防に、**手袋・底の厚い靴などを着用**
- ③ドアと窓をあけて、**しっかり換気**
- ④汚泥は**十分に取り除き、しっかり乾燥**
清掃が不十分だと、消毒の効果を発揮できません！！

主な消毒液と使用方法

● ゴム手袋・長靴、ゴーグル等を着用して作業しましょう！

● 次亜塩素酸ナトリウム

汚染の程度がひどい場合、長時間浸水していた場合に使います

● アルコール、塩化ベンザルコニウム

色あせ、腐食などにより次亜塩素酸ナトリウムが使用できない場合に使います


消毒薬	対象と使い方	
	食器類・流し台・浴槽	家具類・床
次亜塩素酸ナトリウム (家庭用塩素系漂白剤でも可)	0.02%に希釈する ①食器用洗剤と水で洗う。 ②希釈した消毒液に5分間漬けるか、消毒薬を含ませた布で拭き、その後、水洗い・水拭きする。 ③よく乾燥させる。	0.1%に希釈する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。 ③金属面や木面など色あせが気になる場所は、水で2度拭きする。
消毒用アルコール	希釈せず、原液のまま使用する ①洗剤と水で洗う。 ②アルコールを含ませた布で拭く。 ※70%以上のアルコール濃度のものを使用すること ※火気のあるところでは使用しない	希釈せず、原液のまま使用する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②アルコールを含ませた布で拭く。 ※70%以上のアルコール濃度のものを使用すること ※火気のあるところでは使用しない
10%塩化ベンザルコニウム (逆性石けん)	0.1%に希釈する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。	0.1%に希釈する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。

浸水した家屋の消毒手順

消毒液の希釀方法

- 薬液の濃度や用法など消毒薬は、薄めて（希釀して）使用するものがあります。使用上の注意事項を確認してから使用しましょう。

0.1%希釀の簡易的な方法



バケツ（10ℓ）を使用する場合

消毒液
コップ100cc

10%消毒液であれば…
コップ1杯（100cc）を入れて、水（10ℓ）を入れる




ペットボトル（1ℓ）を使用する場合

キャップ2杯
※キャップ1杯（4～5cc）

10%消毒液であれば…
ペットボトルのキャップ2杯を入れて、水（1ℓ）を入れる

0.02%希釀の簡易的な方法



ペットボトル（2ℓ）を使用する場合

キャップ1杯（4～5cc）
10%消毒液であれば…
ペットボトルのキャップ1杯を入れて、水（2ℓ）を入れる

清掃・消毒作業が終わったら

- 作業が終わったら**しっかり手洗い**
- ケガをした場合は**しっかり洗浄、消毒**
- 深い傷や汚れた傷**、目を洗浄しても充血する場合は**医師に相談**
- 消毒薬の使用後は、よく乾燥させてください