

新型コロナウイルスワクチンの投与開始初期の重点 的調査（コホート調査）健康観察日誌集計 の中間報告（8）

（令和3年6月23日の審議会資料）

令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業)

新型コロナワクチンの投与開始初期 の重点的調査(コホート調査)

課題番号 20HA2013

E protein

S protein

M protein


COVID-19

CDC

第62回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第11回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)

2021(令和3)年6月23日

資料
2



国立感染症研究所ホームページ



健康観察日誌集計の中間報告(8)



代表研究者

伊藤 澄信 順天堂大学医学部 臨床研究・治験センター、臨床薬理学 客員教授

分担研究者

楠 進 地域医療機能推進機構・本部・理事

土田 尚 国立病院機構本部総合研究センター 治験研究部長

金子 善博 労働者健康安全機構本部本部 研究ディレクター

飛田 護邦 順天堂大学革新的医療技術開発研究センター 先任准教授

研究事務局

順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床研究・治験センター

予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会&医薬品等安全対策部会安全対策調査会 2021/6/23



順天堂大学 コロナワクチン研究事務局

新型コロナワクチンの投与開始初期の 重点的調査（コホート調査）

リスクコミュニケーションの一環として治験と同様の方法で、1－2万人の安全性情報を収集し、厚労省の専門家会議を通じて、国民の皆様に本ワクチンの安全性情報を発信することを目的とする。免疫を惹起することに伴う発熱、倦怠感などの副反応疑いの情報を正確に把握し、医療機関の業務と両立したワクチン接種が遂行できるように情報発信する。

調査内容： SARS-CoV-2 ワクチン接種者の最終接種4週間までの安全性

- 体温、接種部位反応、全身反応（日誌）
- 主たる目的は副反応疑い、重篤なAE（因果関係問わず）のコホート調査による頻度調査
- NHO、JCHO、JOHASの職員（コミナティ筋注）
- 自衛隊職員（COVID-19ワクチンモデルナ筋注）
- 2万人調査すると0.015%（6,700人に一人）発現する副反応疑いが95%の可能性で捕捉できる（1万人なら0.03%、3,350人に一人）。



ワクチン接種者を対象とする前向き観察研究

コミナティ筋注被接種者数の推移（累計）



2021年


※ 同意撤回者2人あるため、研究当初同意者19,808人から2人減



コミュニティ筋注被接種者の人口統計学的特性


被接種者数 19,806人

年齢分布




(参考) 65歳以上 579 (2.9%)

男女比



職種



治療中疾患		(割合%)
高血圧	1,724	8.7%
脂質異常症	1,000	5.0%
糖尿病	411	2.1%
気管支喘息	430	2.2%
アトピー性皮膚炎	567	2.9%
その他	2,591	13.1%
なし	14,531	73.4%

n=19,806

既往歴		(割合%)
気管支喘息	1,941	9.8%
悪性腫瘍	412	2.1%
いずれもなし	17,488	88.3%


n=19,806

複数疾患をお持ちの方もあるため合計は100%ではありません

コミュニティ筋注被接種者の人口統計学的特性


2回目 被接種者数 19,635人 6月18日現在

年齢分布




(参考) 65歳以上 578 (2.9%)

男女比



職種



治療中疾患		(割合%)
高血圧	1,718	8.7%
脂質異常症	997	5.1%
糖尿病	406	2.1%
気管支喘息	423	2.2%
アトピー性皮膚炎	560	2.9%
その他	2,565	13.1%
なし	14,406	73.4%

n=19,635

既往歴		(割合%)
気管支喘息	1,917	9.8%
悪性腫瘍	408	2.1%
いずれもなし	17,345	88.3%



n=19,635

複数疾患をお持ちの方もあるため合計は100%ではありません



コミナティ筋注

発熱（37.5℃以上）



局所反応（投与部位）のAEの重症度判断基準




Grade AE名	1（軽度）	2（中等度）	3（高度）	4（重篤、生命の危険がある）
疼痛	痛みを感じるが、特に気にならない。	痛みを感じて鎮痛剤を1回服用した。	痛みを感じて鎮痛剤を2回以上服用した。	重症又は持続性の潰瘍、又は壊死、又は手術を要する。
発赤	長径が< 2.0 cm	長径が2.0 - 5.0 cm	長径が> 5.0 cm	
腫脹	長径が< 2.0 cm	長径が2.0 - 5.0 cm	長径が> 5.0 cm	
硬結	長径が< 2.0 cm	長径が2.0 - 5.0 cm	長径が> 5.0 cm	
掻痒感	—	痒みを感じるが、薬剤治療を要さない。	痒みを感じ、薬剤治療を要する。	
熱感	—	熱を感じるが、薬剤治療を要さない。	熱を感じ、薬剤治療を要する。	

全身性反応のAEの重症度判定基準

Grade AE名	1（軽度）	2（中等度）	3（高度）	4（重篤、生命の危険がある）
頭痛	日常感じる頭痛より軽度の頭痛の増強 薬剤治療を要さない	中等度の頭痛 薬剤治療を要する又は、日常生活の一部に困難が生じる	高度の頭痛、日常生活に支障あり	活動不能／動作不能
倦怠感	日常感じる疲労より軽度の疲労の増強 薬剤治療を要さない	中等度の疲労 薬剤治療を要する又は、日常生活の一部に困難を生じる	高度の疲労、日常生活に支障あり	活動不能／動作不能
鼻汁	日常より鼻汁はあるが、薬剤治療を要さない	中等度の鼻汁 薬剤治療を要する又は、日常生活の一部に困難が生じる	高度の鼻汁、日常生活に支障あり	—




1回目接種後

n=19,742 (99.7%)



2回目接種後

n=19,414 (98.9%)



コミュニティ筋注


接種部位反応 ②

Data Cutoff Date
2021/6/18 8:00


1回目接種後

n=19,742 (99.7%)


疼痛



熱感






かゆみ



2回目接種後

n=19,414 (98.9%)




コミナティ筋注

全身反応


1回目接種後

n=19,742(99.7%)


頭痛



全身倦怠感






鼻水



2回目接種後

n=19,414 (98.9%)





■軽度 ■中等度 ■高度

■軽度 ■中等度 ■高度

■軽度 ■中等度 ■高度






コミナティ筋注

接種部位疼痛


1回目接種後

n=19,742 (99.7%)





2回目接種後

n=19,414 (98.9%)




全身倦怠感



頭痛


1回目接種後

n=19,742 (99.7%)



2回目接種後

n=19,414 (98.9%)



9日目以降の健康観察日誌記録

		1回目接種後			2回目接種後		
被接種者数		18,670			18,579		
		Day9	Day10	Day10 以降	Day9	Day10	Day10 以降
局所反応	発熱	0.11%	0.08%	0.07%	0.23%	0.16%	0.11%
	発赤	0.89%	0.81%	0.53%	0.30%	0.23%	0.13%
	腫脹	0.46%	0.40%	0.22%	0.17%	0.14%	0.06%
	硬結	0.57%	0.49%	0.30%	0.24%	0.19%	0.10%
	疼痛	0.40%	0.32%	0.16%	0.41%	0.30%	0.15%
	熱感	0.29%	0.25%	0.14%	0.06%	0.04%	0.02%
全身反応	かゆみ	0.66%	0.53%	0.00%	0.31%	0.22%	0.00%
	頭痛	0.66%	0.53%	0.00%	1.65%	1.23%	0.46%
	倦怠感	0.71%	0.58%	0.62%	1.12%	0.93%	0.61%
	鼻水	1.16%	1.10%	0.62%	1.23%	1.12%	0.61%

報告番号	副反応疑い/SAE症例番号	報告回数	疾患・症状名	年齢・性別	ワクチン 接種日(1回目)	ワクチン 接種日(2回目)	症候発現日	転帰	転帰日
副反応1	SAE1/副反応1	第3報	皮膚及び口腔内のアレルギー反応	不明	2021/2/19-		2021/2/19	回復	2021/2/24
副反応2	SAE3/副反応2	第3報	脱力（手足があがらない）発熱	40代女性	2021/2/22-		2021/2/22	回復	2021/2/24
副反応3	SAE4/副反応3	第1報	冷感・悪寒戦慄	40代女性	2021/2/19-		2021/2/19	回復	2021/2/20
副反応4	SAE5/副反応4	第4報	突発性難聴	40代女性	2021/2/22	2021/3/15	2021/3/2	回復	2021/5/13
副反応5	SAE6/副反応6 ※因果関係否定のため取り下げ	第3報	肺炎	40代男性	2021/2/19-		2021/2/25	軽快	2021/3/4
副反応6	SAE10/副反応6	第3報	左三叉神経障害	40代女性	2021/2/22-		2021/2/23	回復	2021/4/12
副反応7	SAE12/副反応7	第1報	アナフィラキシー	40代女性	2021/2/17	2021/3/11	2021/3/11	回復	2021/3/12
副反応8	SAE13/副反応8	第3報	末梢性顔面神経麻痺 ※三叉神経障害から事象名変更	20代女性	2021/2/22-		2021/3/9	軽快	2021/3/25
副反応9	SAE14/副反応9	第2報	浮動感、左眼瞼挙上困難、左眼違和感	50代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/12	軽快	2021/3/13
副反応10	SAE15/副反応10	第2報	気分不良、動悸、視覚異常	40代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/12	軽快	2021/3/13
副反応11	SAE16/副反応11	第2報	食欲不振	30代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/14	軽快	2021/3/18
副反応12	SAE17/副反応12	第3報	肺炎	40代男性	2021/2/19-		2021/3/15	回復	2021/3/24
副反応13	副反応13 ※非重篤のためSAE番号なし	第1報	蕁麻疹	50代女性	2021/2/22	2021/3/15	2021/3/15	軽快	2021/3/16
副反応14	SAE19/副反応14	第2報	急性冠症候群及び心筋炎疑い	20代男性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/16	軽快	2021/4/5
副反応15	SAE21/副反応15	第2報	右前庭神経炎 ※前庭神経炎から事象名変更	40代男性	2021/2/19	2021/3/15	2021/3/17	軽快	2021/3/23
副反応16	SAE22/副反応16	第3報	アナフィラキシー ショック	40代女性	2021/2/25	2021/3/18	2021/3/18	回復	2021/3/19
副反応18	SAE25/副反応18	第2報	アナフィラキシー	30代女性	2021/2/25	2021/3/18	2021/3/18	回復	2021/3/22
副反応19	副反応19 ※非重篤のためSAE番号なし	第1報	血管迷走神経反射	20代女性	2021/2/24	2021/3/17	2021/3/18	回復	2021/3/18
副反応20	副反応20 ※非重篤のためSAE番号なし	第1報	けいれん	40代女性	2021/2/24	2021/3/17	2021/3/19	回復	2021/3/19
副反応21	副反応21 ※非重篤のためSAE番号なし	第2報	蕁麻疹	20代女性	2021/2/24	2021/3/17	2021/3/20	回復	2021/4/2
副反応22	SAE27/副反応22	第5報	発熱の長期化／中毒疹 ※事象名追加	20代男性	2021/2/24	2021/3/20	2021/3/20	軽快	2021/4/16
副反応23	SAE32/副反応23	第2報	肺動脈血栓塞栓症、深部静脈血栓症	40代女性	2021/2/22	2021/3/15	2021/4/2	軽快	2021/4/13

副反応疑い報告等一覧（コミナティ筋注）

SAE（因果関係問わず）

2021/6/18現在

報告番号	副反応疑い/SAE症例番号	報告回数	疾患・症状名	年齢・性別	ワクチン 接種日(1回目)	ワクチン 接種日(2回目)	症候発現日	転帰	転帰日
SAE1	SAE1/副反応1	第3報	皮膚及び口腔内のアレルギー反応	不明	2021/2/19-		2021/2/19	回復	2021/2/24
SAE2	SAE2	第2報	一過性全健忘	60代女性	2021/2/19-		2021/2/22	回復	2021/2/24
SAE3	SAE3/副反応2	第3報	脱力（手足があがらない）発熱	40代女性	2021/2/22-		2021/2/22	回復	2021/2/24
SAE4	SAE4/副反応3	第1報	冷感・悪寒戦慄	40代女性	2021/2/19-		2021/2/19	回復	2021/2/20
SAE5	SAE5/副反応4	第4報	突発性難聴	40代女性	2021/2/22	2021/3/15	2021/3/2	回復	2021/5/13
SAE6	SAE6/副反応5 ※因果関係なしに変更	第3報	肺炎	40代男性	2021/2/19-		2021/2/25	軽快	2021/3/4
SAE7	SAE7	第2報	左尿管結石	40代男性	2021/2/22-		2021/3/3	回復	2021/3/7
SAE8	SAE8	第2報	COVID-19	20代女性	2021/2/24-		2021/3/2	軽快	2021/3/5
SAE9	SAE9	第2報	急性虫垂炎	30代女性	2021/2/22-		2021/2/27	回復	2021/3/15
SAE10	SAE10/副反応6	第3報	左三叉神経障害	40代女性	2021/2/22-		2021/2/23	回復	2021/4/12
SAE11	SAE11	第1報	急性虫垂炎	40代女性	2021/2/20-		2021/2/25	回復	2021/3/2
SAE12	SAE12/副反応7	第1報	アナフィラキシー	40代女性	2021/2/17	2021/3/11	2021/3/11	回復	2021/3/12
SAE13	SAE13/副反応8	第3報	末梢性顔面神経麻痺 ※三叉神経障害から事象名変更	20代女性	2021/2/22-		2021/3/9	軽快	2021/3/25
SAE14	SAE14/副反応9	第2報	浮動感、左眼瞼挙上困難、左眼違和感	50代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/12	軽快	2021/3/13
SAE15	SAE15/副反応10	第2報	気分不良、動悸、視覚異常	40代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/12	軽快	2021/3/13
SAE16	SAE16/副反応11	第2報	食欲不振	30代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/14	軽快	2021/3/18
SAE17	SAE17/副反応12	第3報	肺炎	40代男性	2021/2/19-		2021/3/15	回復	2021/3/24
SAE18	SAE18	第1報	労作性狭心症	50代男性	2021/2/19	2021/3/15	2021/2/25	回復	2021/3/15
SAE19	SAE19/副反応14	第2報	急性冠症候群及び心筋炎疑い	20代男性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/16	軽快	2021/4/5
SAE20	SAE20	第2報	右鎖骨骨折	60代男性	2021/2/24	2021/3/15	2021/3/4	軽快	2021/3/19

副反応疑い報告等一覧（コミナティ筋注）

SAE（因果関係問わず）

2021/6/18現在

報告番号	副反応疑い/SAE症例番号	報告回数	疾患・症状名	年齢・性別	ワクチン 接種日(1回目)	ワクチン 接種日(2回目)	症候発現日	転帰	転帰日
SAE21	SAE21/副反応15	第2報	右前庭神経炎 ※前庭神経炎から事象名変更	40代男性	2021/2/19	2021/3/15	2021/3/17	軽快	2021/3/23
SAE22	SAE22/副反応16	第3報	アナフィラキシー ショック	40代女性	2021/2/25	2021/3/18	2021/3/18	回復	2021/3/19
SAE24	SAE24	第2報	癒着性イレウス	50代女性	2021/2/20-		2021/3/6	軽快	2021/3/25
SAE25	SAE25/副反応18	第2報	アナフィラキシー	30代女性	2021/2/25	2021/3/18	2021/3/18	回復	2021/3/22
SAE26	SAE26	第3報	トキシックショック症 候群	30代女性	2021/2/25-		2021/3/20	回復	2021/5/10
SAE27	SAE27/副反応22	第5報	発熱の長期化／中毒疹 ※事象名追加	20代男性	2021/2/24	2021/3/20	2021/3/20	軽快	2021/4/16
SAE28	SAE28	第2報	摂食障害	30代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/26	軽快	2021/4/15
SAE29	SAE29	第1報	S状結腸憩室炎	50代女性	2021/2/19	2021/3/12	2021/3/16	回復	2021/3/27
SAE30	SAE30	第2報	脳梗塞	60代男性	2021/2/22	2021/3/16	2021/3/23	軽快	2021/4/20
SAE31	SAE31	第3報	急性細菌性前立腺炎	50代男性	2021/2/19	2021/3/12	2021/4/2	回復	2021/4/19
SAE32	SAE32/副反応23	第2報	肺動脈血栓塞栓症、深 部静脈血栓症	40代女性	2021/2/22	2021/3/15	2021/4/2	軽快	2021/4/13

SAE23は4月8日同意撤回のため削除

コミナティ筋注 健康観察日誌(Day8まで) の自由記載欄の中間集計 (1)

Data Cutoff Date
2021/6/18 8:00

1回目接種後 (19,731人)			2回目接種後 (19,364人)		
10028411/筋肉痛/Myalgia	423	2.14%	10008531/悪寒/Chills	2017	10.39%
10008531/悪寒/Chills	374	1.89%	10003239/関節痛/Arthralgia	1980	10.20%
10003239/関節痛/Arthralgia	279	1.41%	病休	1249	6.43%
10076183/ワクチン接種部位運動障害/Vaccination site movement impairment	256	1.30%	10028813/悪心/Nausea	726	3.74%
10028813/悪心/Nausea	241	1.22%	10028411/筋肉痛/Myalgia	674	3.47%
10012735/下痢/Diarrhoea	203	1.03%	10003988/背部痛/Back pain	431	2.22%
10061224/四肢不快感/Limb discomfort	196	0.99%	10037660/発熱/Pyrexia	369	1.90%
10068319/口腔咽頭痛/Oropharyngeal pain	178	0.90%	10012735/下痢/Diarrhoea	323	1.66%
10041349/傾眠/Somnolence	165	0.84%	10068319/口腔咽頭痛/Oropharyngeal pain	245	1.26%
10013573/浮動性めまい/Dizziness	133	0.67%	10048750/腋窩痛/Axillary pain	224	1.15%
10068879/ワクチン接種部位疼痛/Vaccination site pain	126	0.64%	10013573/浮動性めまい/Dizziness	209	1.08%
10033371/疼痛/Pain	121	0.61%	10011224/咳嗽/Cough	176	0.91%
10020937/感覚鈍麻/Hypoaesthesia	118	0.60%	10019211/頭痛/Headache	165	0.85%
10011224/咳嗽/Cough	102	0.52%	10033371/疼痛/Pain	163	0.84%
10019211/頭痛/Headache	100	0.51%	10061428/食欲減退/Decreased appetite	156	0.80%
10003988/背部痛/Back pain	87	0.44%	10025197/リンパ節症/Lymphadenopathy	155	0.80%
10052904/筋骨格硬直/Musculoskeletal stiffness	81	0.41%	10000081/腹痛/Abdominal pain	140	0.72%
10069484/ワクチン接種部位内出血/Vaccination site bruising	80	0.41%	10020937/感覚鈍麻/Hypoaesthesia	125	0.64%
10016322/異常感/Feeling abnormal	78	0.40%	10041349/傾眠/Somnolence	119	0.61%
10033425/四肢痛/Pain in extremity	77	0.39%	10047700/嘔吐/Vomiting	115	0.59%
10000081/腹痛/Abdominal pain	73	0.37%	10052904/筋骨格硬直/Musculoskeletal stiffness	108	0.56%
10037844/発疹/Rash	60	0.30%	10000059/腹部不快感/Abdominal discomfort	100	0.52%
10016334/熱感/Feeling hot	59	0.30%	10076183/ワクチン接種部位運動障害/Vaccination site movement impairment	97	0.50%
10037087/そう痒症/Pruritus	59	0.30%	10033425/四肢痛/Pain in extremity	96	0.49%
10068318/口腔咽頭不快感/Oropharyngeal discomfort	58	0.29%	10061224/四肢不快感/Limb discomfort	93	0.48%



コミナティ筋注 健康観察日誌(Day8まで) の自由記載欄の中間集計 (2)

Data Cutoff Date
2021/6/18 8:00

1回目接種後 (19,731人)			2回目接種後 (19,364人)		
10046735/蕁麻疹/Urticaria	55	0.28%	10025182/リンパ節痛/Lymph node pain	81	0.42%
病休	52	0.26%	10028836/頸部痛/Neck pain	80	0.41%
10028372/筋力低下/Muscular weakness	51	0.26%	10025482/倦怠感/Malaise	78	0.40%
10037660/発熱/Pyrexia	46	0.23%	10016322/異常感/Feeling abnormal	76	0.39%
10000059/腹部不快感/Abdominal discomfort	45	0.23%	10046735/蕁麻疹/Urticaria	64	0.33%
10041232/<しゃみ/Sneezing	43	0.22%	10000087/上腹部痛/Abdominal pain upper	62	0.32%
10042128/口内炎/Stomatitis	37	0.19%	10013968/呼吸困難/Dyspnoea	57	0.29%
10028735/鼻閉/Nasal congestion	36	0.18%	10037087/そう痒症/Pruritus	55	0.28%
10028836/頸部痛/Neck pain	36	0.18%	10069484/ワクチン接種部位内出血 /Vaccination site bruising	54	0.28%
10047700/嘔吐/Vomiting	35	0.18%	10068879/ワクチン接種部位疼痛/Vaccination site pain	50	0.26%
10048750/腋窩痛/Axillary pain	34	0.17%	10037844/発疹/Rash	49	0.25%
10052140/眼そう痒症/Eye pruritus	33	0.17%	10016334/熱感/Feeling hot	47	0.24%
10033557/動悸/Palpitations	32	0.16%	10068318/口腔咽頭不快感/Oropharyngeal discomfort	46	0.24%
10048908/季節性アレルギー/Seasonal allergy	32	0.16%	10028735/鼻閉/Nasal congestion	44	0.23%
10069478/ワクチン接種部位不快感/Vaccination site discomfort	32	0.16%	10033557/動悸/Palpitations	43	0.22%
10060800/ほてり/Hot flush	30	0.15%	10028391/筋骨格痛/Musculoskeletal pain	39	0.20%
10025482/倦怠感/Malaise	25	0.13%	10060800/ほてり/Hot flush	33	0.17%
10000087/上腹部痛/Abdominal pain upper	24	0.12%	10003549/無力症/Asthenia	31	0.16%
10025197/リンパ節症/Lymphadenopathy	23	0.12%	10042128/口内炎/Stomatitis	28	0.14%
10020642/多汗症/Hyperhidrosis	23	0.12%	10020642/多汗症/Hyperhidrosis	28	0.14%
10074859/軟便/Faeces soft	21	0.11%	10043882/耳鳴/Tinnitus	27	0.14%
10053156/筋骨格不快感/Musculoskeletal discomfort	20	0.10%	10034568/末梢冷感/Peripheral coldness	26	0.13%
10068881/ワクチン接種部位そう痒感/Vaccination site pruritus	20	0.10%	10074859/軟便/Faeces soft	24	0.12%
10028334/筋痙縮/Muscle spasms	19	0.10%	10041232/<しゃみ/Sneezing	22	0.11%
10061428/食欲減退/Decreased appetite	19	0.10%	10028372/筋力低下/Muscular weakness	19	0.10%
			10022437/不眠症/Insomnia	19	0.10%



1回目接種後	5%以上	1%以上	0.1%以上	0.01%以上※	0.01%未満※
血液およびリンパ系障害			リンパ節症 (0.12%)	リンパ節痛	貧血
心臓障害			動悸 (0.16%)	頻脈	不整脈
耳および迷路障害				耳鳴, 耳不快感, 回転性めまい, 耳痛	片耳難聴
眼障害			眼そう痒症 (0.17%)	眼充血, 眼痛, 眼の異常感, 霧視, 視力障害, 結膜出血, 眼瞼浮腫, 眼瞼紅斑, 光視症, 眼瞼腫脹, ドライアイ, 眼窩周囲腫脹, 眼瞼機能障害	眼精疲労, 眼瞼痙攣, 眼瞼湿疹, 眼出血, 眼瞼下垂, 流涙増加, 硝子体浮遊物, 眼の異物感, 眼部不快感, 眼症状, 眼の異常感覚
胃腸障害		悪心 (1.22%), 下痢 (1.03%)	腹痛 (0.37%), 腹部不快感 (0.23%), 口内炎 (0.19%), 嘔吐 (0.18%), 上腹部痛 (0.12%), 軟便 (0.11%)	口の感覚鈍麻, 歯肉痛, 下腹部痛, 口内乾燥, 歯痛, 舌痛, 口の錯感覚, 鼓腸, 便秘, 消化不良, 嚥下障害, 歯肉腫脹, 耳下腺腫大, 唾液腺痛, 胃腸音異常	口角口唇炎, 大腸炎, 舌炎, 口唇痛, 嚥下痛, 口腔内不快感, 口腔内痛, 流涎過多, 食道不快感, 口腔障害, 歯肉不快感, 口腔粘膜のあれ
一般・全身障害および投与部位の状態	ワクチン接種部位疼痛 (92.2%), 倦怠感 (23.22%), ワクチン接種部位紅斑 (13.89%), ワクチン接種部位熱感 (12.89%), ワクチン接種部位腫脹 (12.51%), ワクチン接種部位硬結 (10.67%), ワクチン接種部位そう痒感 (8.03%)	悪寒 (1.89%), ワクチン接種部位運動障害 (1.30%)	疼痛 (0.61%), ワクチン接種部位内出血 (0.41%), 異常感 (0.40%), 熱感 (0.30%), 発熱 (0.23%), 腋窩痛 (0.17%), ワクチン接種部位不快感 (0.16%)	口渇, 浮腫, 不快感, 疲労, 腫脹, ワクチン接種部位知覚異常, 無力症, 胸部不快感, 胸痛圧痛, 末梢腫脹, 冷感, ワクチン接種部位変色, 顔面浮腫, ワクチン接種部位浮腫	凍瘡, 酩酊感, 顔面腫脹, ワクチン接種部位小水疱
免疫系障害			季節性アレルギー (0.16%)	アナフィラキシー反応	
感染症および寄生虫症				口腔ヘルペス, 上気道感染, 結膜炎, 膀胱炎, 単純ヘルペス, 麦粒腫, 副鼻腔炎, 膿性痰	アデノウイルス結膜炎, 虫垂炎, 胃腸炎, 歯肉炎, 咽頭炎, 膿疱, 扁桃炎, ヘルペス眼感染
傷害、中毒および処置合併症					皮膚裂傷
臨床検査				血圧上昇, 血圧低下	心拍数増加
代謝および栄養障害				食欲減退	
筋骨格系および結合組織障害		筋肉痛 (2.14%), 関節痛 (1.41%)	四肢不快感 (0.99%), 背部痛 (0.44%), 筋骨格硬直 (0.41%), 四肢痛 (0.39%), 筋力低下 (0.26%), 頸部痛 (0.18%), 筋骨格不快感 (0.10%)	筋痙攣, 筋骨格系胸痛, 筋骨格痛	関節障害, 筋膜炎, 顎関節症候群, 開口障害
神経系障害	頭痛 (21.4%)		傾眠 (0.84%), 浮動性めまい (0.67%), 感覚鈍麻 (0.60%)	錯感覚, 片頭痛, 味覚障害, 注意力障害, 振戦, 体位性めまい, 嗅覚錯乱, 失神寸前の状態, 肋間神経痛	頸腕症候群, 味覚不全, 記憶障害, 単麻痺, 坐骨神経痛, 一過性全健忘, 三叉神経痛, 神経痛
精神障害				不眠症, 精神障害	多幸気分, 中期不眠症, 悪夢, 睡眠障害, 抑うつ症状, 気分の落ち込み
腎および尿路障害					膀胱痛, 排尿困難, 尿管結石症
生殖系および乳房障害				月経困難症, 性器出血	乳房腫脹, 排卵痛, 性器分泌物
呼吸器、胸郭および縦隔障害	鼻漏 (10.23%),		口腔咽頭痛 (0.90%), 咳嗽 (0.52%), 口腔咽頭不快感 (0.29%), くしゃみ (0.22%), 鼻閉 (0.18%)	呼吸困難, 喀痰増加, 湿性咳嗽, 喉頭不快感, 発声障害, 鼻出血, 咽喉刺激感, 喘息, 鼻痛, 咽喉絞扼感, 咽喉乾燥, 労作性呼吸困難, アレルギー性鼻炎, 鼻部不快感	息詰まり感, 低酸素症, 口腔咽頭腫脹, いびき, 上気道性喘鳴, 喘鳴, 喉頭刺激感, 口唇そう痒症, 咽頭異常感覚
皮膚および皮下組織障害			発疹 (0.30%), そう痒症 (0.30%), 蕁麻疹 (0.28%), 多汗症 (0.12%)	湿疹, 癢汗, 紅斑, 冷汗, 紫斑, 皮膚乾燥, 皮膚剥脱, アトピー性皮膚炎	ざ瘡, 水疱, 皮下出血, そう痒性皮疹, 色素沈着障害
外科および内科処置				デンタルケア	
血管障害			ほてり (0.15%)	末梢冷感, 潮紅, 蒼白	

※0.1%未満は頻度を省略

n=19,742 (99.7%)



2回目接種後	5%以上	1%以上	0.1%以上	0.01%以上※	0.01%未満※
血液およびリンパ系障害			リンパ節症(0.80%),リンパ節痛(0.42%)	貧血	
心臓障害			動悸(0.22%)	頻脈,不整脈	徐脈,上室性頻脈
耳および迷路障害			耳鳴(0.14%)	耳痛,耳不快感,難聴,回転性めまい	聴力低下
眼障害				眼そう痒症,眼痛,眼瞼浮腫,霧視,眼部不快感,眼瞼痙攣,ドライアイ,眼充血,眼窩周囲腫脹,眼の異常感,結膜出血,眼の障害,眼瞼下垂,眼瞼腫脹,視力障害,眼球浮腫	眼精疲労,眼脂,眼刺激,流涙増加,眼窩周囲浮腫,羞明,網膜出血,閃輝暗点,眼の異物感,結膜充血,眼瞼機能障害,眼症状,眼の異常感覚
胃腸障害		悪心(3.74%),下痢(1.66%)	腹痛(0.72%),嘔吐(0.59%),腹部不快感(0.52%),上腹部痛(0.32%),口内炎(0.14%),軟便(0.12%)	口の感覚鈍麻,唾液腺痛,下腹部痛,消化不良,歯痛,歯肉痛,口唇腫脹,便秘,口内乾燥,排便回数増加,口腔内不快感,口腔内痛,耳下腺腫大,口の錯感覚	腹部膨満,アフタ性潰瘍,口唇炎,嚥下障害,小腸炎,歯肉腫脹,舌痛,口腔粘膜水疱形成,流涎過多,舌の運動障害,舌あられ,口腔そう痒症,直腸しぶり,歯の異常感覚,口唇紅斑,口腔粘膜のあれ
一般・全身障害および投与部位の状態	ワクチン接種部位疼痛(90.23%),倦怠感(69.37%),発熱(38.44%),ワクチン接種部位熱感(19.16%),ワクチン接種部位紅斑(16.08%),ワクチン接種部位腫脹(14.19%),ワクチン接種部位そう痒感(12.02%),悪寒(10.39%),ワクチン接種部位硬結(10.15%)	腋窩痛(1.15%)	疼痛(0.84%),ワクチン接種部位運動障害(0.50%),異常感(0.39%),ワクチン接種部位内出血(0.28%),熱感(0.24%),無力症(0.16%)	胸痛,不快感,ワクチン接種部位不快感,浮腫,胸部不快感,疲労,ワクチン接種部位変色,顔面痛,冷感,末梢腫脹,口渇,空腹,腫脹,ワクチン接種部位小水疱	顔面浮腫,歩行障害,顔面腫脹,圧痛,体調不良,ワクチン接種部位知覚異常
免疫系障害				季節性アレルギー,過敏症	アナフィラキシー反応,節足動物刺傷アレルギー
感染症および寄生虫症				上気道感染,口腔ヘルペス,膀胱炎,歯肉炎,ヘルペスウイルス感染,咽頭炎,副鼻腔炎	気管支炎,蜂巣炎,肺炎,膿疱,ヘルペス眼感染
傷害、中毒および処置合併症					足骨折,肋骨骨折
臨床検査				血圧上昇	血圧低下,身体的診察,体重増加
代謝および栄養障害			食欲減退(0.80%)		食欲障害
筋骨格系および結合組織障害	関節痛(10.20%)	筋肉痛(3.47%),背部痛(2.22%)	筋骨格硬直(0.56%),四肢痛(0.49%),四肢不快感(0.48%),頸部痛(0.41%),筋骨格痛(0.20%)	筋力低下,筋骨格不快感,筋痙攣,肩胛部痛,筋骨格系胸痛	関節硬直,腱鞘炎,弾発指,椎間板突出
神経系障害	頭痛(53.56%)	浮動性めまい(1.08%)	感覚鈍麻(0.64%),傾眠(0.61%)	錯感覚,振戦,体位性めまい,神経痛,味覚障害,味覚不全,片頭痛,注意力障害,意識消失,坐骨神経痛,肋間神経痛	脱力発作,精神的機能障害,感覚障害,失神,三叉神経痛,起立障害,顔面痙攣
精神障害				不眠症,中期不眠症	不安,易刺激性,睡眠障害,精神障害
腎および尿路障害				頻尿,排尿困難,血尿,尿閉	着色尿,多尿
生殖系および乳房障害				月経困難症,性器出血	乳房痛,精巣痛
呼吸器、胸部および縦隔障害	鼻漏(14.55%)	口腔咽頭痛(1.26%)	咳嗽(0.91%),呼吸困難(0.29%),口腔咽頭不快感(0.24%),鼻閉(0.23%),くしゃみ(0.11%)	喀痰増加,鼻出血,発声障害,湿性咳嗽,喉頭不快感,喘息,咽喉刺激感,労作性呼吸困難,咽喉絞扼感,扁桃肥大,喘鳴,口腔咽頭腫脹,上気道性喘鳴,喉頭刺激感	咽喉乾燥,過換気,鼻乾燥,呼吸障害,アレルギー性鼻炎,鼻痛,咽頭異常感覚,咽頭腫脹
皮膚および皮下組織障害			尋麻疹(0.33%),そう痒症(0.28%),発疹(0.25%),多汗症(0.14%)	湿疹,寝汗,冷汗,紅斑,皮膚乾燥,手掌紅斑,皮膚剥脱	水疱,アトピー性皮膚炎,皮下出血,皮膚疼痛,紫斑,色素沈着障害
外科および内科処置					尿管手術
血管障害			ほてり(0.17%),末梢冷感(0.13%)	潮紅	高血圧,内出血

※0.1%未満は頻度を省略

n=19,414 (98.9%)

接種直後（30分）以内のAE

Data Cutoff Date
2021/6/4 8:00

1回目集計		2回目集計	
症状名	例数	症状名	例数
10037844/発疹/Rash	11	10033557/動悸/Palpitations	11
10037087/そう痒症/Pruritus	10	10037844/発疹/Rash	11
10036653/失神寸前の状態/Presyncope	8	10028813/悪心/Nausea	8
10013573/浮動性めまい/Dizziness	7	10019211/頭痛/Headache	7
10016334/熱感/Feeling hot	6	10020937/感覚鈍麻/Hypoaesthesia	7
10020937/感覚鈍麻/Hypoaesthesia	6	10037087/そう痒症/Pruritus	7
10028813/悪心/Nausea	6	10013573/浮動性めまい/Dizziness	6
10033557/動悸/Palpitations	6	10046735/蕁麻疹/Urticaria	6
10046735/蕁麻疹/Urticaria	6	10060800/ほてり/Hot flush	4
10016322/異常感/Feeling abnormal	5	10025482/倦怠感/Malaise	4
10019211/頭痛/Headache	5	10011224/咳嗽/Cough	3
10020642/多汗症/Hyperhidrosis	5	10013968/呼吸困難/Dyspnoea	3
10061224/四肢不快感/Limb discomfort	4	10016322/異常感/Feeling abnormal	3
10068879/ワクチン接種部位疼痛/Vaccination site pain	4	10002198/アナフィラキシー反応/Anaphylactic reaction	2
10016825/潮紅/Flushing	3	10005750/血圧上昇/Blood pressure increased	2
10068318/口腔咽頭不快感/Oropharyngeal discomfort	3	10016334/熱感/Feeling hot	2
10005750/血圧上昇/Blood pressure increased	2	10019194/頭部不快感/Head discomfort	2
10028411/筋肉痛/Myalgia	2	10020751/過敏症/Hypersensitivity	2
10034568/末梢冷感/Peripheral coldness	2	10034568/末梢冷感/Peripheral coldness	2
10060800/ほてり/Hot flush	2	10047340/回転性めまい/Vertigo	2
10000087/上腹部痛/Abdominal pain upper	1	10047700/嘔吐/Vomiting	2
10002855/不安/Anxiety	1	10057371/口の感覚鈍麻/Hypoaesthesia oral	2
10008531/悪寒/Chills	1	10058670/喉頭刺激感/Larynx irritation	2
10013968/呼吸困難/Dyspnoea	1		
10020910/過換気/Hyperventilation	1		
10024860/足のもつれ/Loss of control of legs	1		
10025482/倦怠感/Malaise	1		
10033371/疼痛/Pain	1		
10033775/錯感覚/Paraesthesia	1		
10043071/頻脈/Tachycardia	1		
10043268/緊張/Tension	1		
10052894/口腔そう痒症/Oral pruritus	1		

30分以内にAEが発生した旨問診票に記載のあった例数
1回目接種88人（症状について記載がなかった4人含む）
2回目接種81人（症状について記載がなかった8人含む）



1回目接種と2回目接種両方で 接種直後（30分）以内のAEを認めた被接種者別AE

	1回目接種後	2回目接種後	同一事象を含むか否か
20歳代女性	10028813/悪心/Nausea、 10033557/動悸/Palpitations	10028813/悪心/Nausea	○
20歳代女性	10028813/悪心/Nausea	10028813/悪心/Nausea	○
20歳代女性	10020910/過換気/Hyperventilation	10069484/ワクチン接種部位内出血	
20歳代女性	10002855/不安/Anxiety	10002855/不安/Anxiety、 10016322/異常感/Feeling abnormal、	○
30歳代女性	10020937/感覚鈍麻/Hypoaesthesia、 10028813/悪心/Nausea	10015993/眼瞼浮腫/Eyelid oedema、10020751/ 過敏症/Hypersensitivity、	
30歳代女性	10019211/頭痛/Headache	10043071/頻脈/Tachycardia	
30歳代女性	10013968/呼吸困難/Dyspnoea	10037844/発疹/Rash	
30歳代女性	10016825/潮紅/Flushing	10016825/潮紅/Flushing	○
30歳代女性	10008531/悪寒/Chills、 10020642/多汗症/Hyperhidrosis	10016334/熱感/Feeling hot、 10020642/多汗症/Hyperhidrosis、 10047700/嘔吐/Vomiting、	○
30歳代女性	10011224/咳嗽/Cough、 10046735/蕁麻疹/Urticaria、	10002198/アナフィラキシー反応/Anaphylactic reaction、 10008531/悪寒/Chills、 10046735/蕁麻疹/Urticaria、	○
30歳代男性	10037844/発疹/Rash、 10046735/蕁麻疹/Urticaria	10037087/そう痒症/Pruritus、 10037844/発疹/Rash、 10060800/ほてり/Hot flush	○
40歳代女性	10009866/冷汗/Cold sweat、 10024860/足のもつれ/Loss of control of legs、 10033371/疼痛/Pain、 10043071/頻脈/Tachycardia、	10005750/血圧上昇/Blood pressure increased	
40歳代女性	10037844/発疹/Rash、 10060800/ほてり/Hot flush	10005750/血圧上昇/Blood pressure increased、 10033557/動悸/Palpitations、 10037844/発疹/Rash、	○
40歳代女性	10060800/ほてり/Hot flush	空欄	
50歳代女性	10016334/熱感/Feeling hot、 10037087/そう痒症/Pruritus	10011224/咳嗽/Cough、 10016334/熱感/Feeling hot、	○

問診票に記載のあった30分以内のAE
1回目接種88人、2回目接種81人のうち15
人が両接種時ともに30分以内にAEを発現した。
同一MedDRAコードを含むのは9人。

AEに対しての使用薬剤（Day8まで）

薬剤名	1回目接種後			2回目接種後		
被接種者数	19,731人			19,364人		
アセトアミノフェン	693人	3.51%	うちアセトアミノフェンとの重複	2,504人	12.93%	うちアセトアミノフェンとの重複
ロキソプロフェン	145人	0.73%	49人	370人	1.91%	249人
イブプロフェン	9人	0.05%	2人	20人	0.10%	13人
シクロフェナック	4人	0.02%	1人	13人	0.07%	6人
アスピリン	1人	0.01%	0人	0人		

終了報告時COVID-19感染が報告された人

終了報告 18,455人

Data Cutoff Date
2021/6/18 8:00

解熱鎮痛薬を飲んでいた人

1回目 799人（4.05%）

2回目 2,637人（13.62%）

7人のうち3人は
2回目接種実施

COVID-19感染報告率
0.72症例/10万人日
（49日間で7人が感染したものと算出）

施設名	1回目接種日	年齢	性別
A病院	2021/2/19	40歳代	女
B病院	2021/2/22	50歳代	男
C病院	2021/2/24	20歳代	女
D病院	2021/2/24	50歳代	女
E病院	2021/2/24	20歳代	女
C病院	2021/2/24	40歳代	女
F病院	2021/2/25	20歳代	女



2回目接種をされなかった人の背景

2回目接種されなかった人の年齢・性別

年齢	男	女
20歳代	6 (0.57%)	49 (1.58%)
30歳代	13 (0.74%)	30 (1.00%)
40歳代	8 (0.54%)	41 (1.19%)
50歳代	8 (0.52%)	18 (0.67%)
60歳代以上	1 (0.11%)	5 (0.59%)
	36人	143人

ロジスティック回帰分析 SPSS Ver.28

	オッズ比	95%信頼区間
1回目 SAE報告	61.067	(19.727 - 189.035)
接種直後 AE	14.838	(7.255 - 30.346)
男女	1.949	(1.305 - 2.912)
年齢	0.980	(0.967 - 0.994)
発熱	6.496	(4.358 - 9.682)
定数	0.004	

	2回目接種なし	2回目接種あり	接種なしの割合
1回目SAEあり	7	10	41.2%
1回目SAEなし	172	19,617	0.9%

	2回目接種なし	2回目接種あり	接種なしの割合
接種直後のAEあり	11	77	12.5%
接種直後のAEなし	168	19,718	0.9%

	2回目接種なし	2回目接種あり	接種なしの割合
発熱あり	35	620	5.3%
発熱なし	132	18,944	0.7%

	2回目接種なし	2回目接種あり	接種なしの割合
倦怠感あり	94	4,487	2.1%
倦怠感なし	73	15,077	0.5%

	2回目接種なし	2回目接種あり	接種なしの割合
全身症状あり	118	6,957	1.7%
全身症状なし	49	12,607	0.4%

2回目接種されなかった人は

- ・ 1回目接種でSAEがおきた
- ・ 接種直後にAEがあった
- ・ 発熱があった
- ・ 年齢が若い
- ・ 女性

平成 21 年 11 月 20 日
国立病院機構本部医療部研究課
課長:伊藤 澄信
電話: 03(5712)5075

報道関係者 各位

新型インフルエンザワクチンに関する 2 万人を対象とした安全性研究の中間報告について

【報告のポイント】

○22,112 名の医療関係者に新型インフルエンザ国産ワクチンを接種し安全性の検討を行った。現在、22,002 例の解析データがまとまった。

○新型インフルエンザワクチンの副反応報告基準に該当するものが 90 例あり、そのうち、重篤なものは、意識レベルの低下等 6 例であった。

○ワクチン接種後、局所反応、全身反応として、発赤、腫脹、疼痛、発熱、頭痛、倦怠感等があらわれた。

○発赤、腫脹は接種当日あるいは翌日に始まるが、3 日後には消失することが多かった。また、発熱は当日か翌日にあらわれることが多かった。

新型インフルエンザワクチンに関する

2 万人を対象とした安全性研究の中間報告について

新型インフルエンザワクチンの接種開始に伴い、早期に安全性を確認することを目的として、「新型インフルエンザ A (H1N1) に対するインフルエンザ HA ワクチンの安全性の研究」(国立病院機構指定研究、主任研究者:国立病院機構東京医療センター診療部長 岩田敏)において、国立病院機構 67 施設の計 22,112 名の医療関係者に新型インフルエンザワクチンを接種し安全性の検討を行った。このうち、22,002 名について集計を行ったので中間的な報告を行う。

1. 研究内容

対象者: 国立病院機構 67 施設の医療関係者計 22,112 名

接種時期: 10 月 19~21 日

投与経路・投与量: 皮下 15 μ g (0.5mL) を 1 回接種

調査項目: 以下に該当する事項について集計を行い、安全性を評価

ワクチン接種当日から 14 日目までに認められた副反応、有害事

*有害事象(ワクチン接種との因果関係は問わず、接種後に起きた健康上

2. 結果の概要(別添参照)

(1) 接種者の背景

性別: 男 25.6% 女 74.4%

年齢: 20~29 歳 34.3%

30~39 歳 25.5%

40~49 歳 21.5%

50~59 歳 16.7%

60 歳以上 1.9%

原疾患: 高血圧、脂質代謝異常、糖尿病などで、

気管支喘息を持っている接種者(治療

(2) 副反応の概要

○局所反応

2cm 以上の発赤(赤くなること)

2cm 以上の腫脹(はれ)

中等度以上の疼痛(痛み止めを用いる程度の

※発赤、腫脹の 96%は接種当日あるいは翌日に始まり

73%は 4 日以内に消失した。

○全身反応

発熱(37.5℃以上) 3.1%

頭痛 14.1%

倦怠感 19.0%

鼻水 10.4%

※発熱の 34%は発作当日か翌日に見られた。

関節痛、下痢、咳嗽、筋肉痛、悪心、嘔吐、口腔咽頭痛がみられた。

○新型インフルエンザワクチン副反応報告基準に該当する有害事象 90 名

重篤な有害事象 副反応報告基準に含めず報告された報告症例

事象名	人数	報告基準	副反応報告名	人数
動悸(同姓頻脈)	1	基準	アナフィラキシー	1
肩下腕筋痛	1		38℃以上の発熱	39
嘔吐・吐気	1		肘を超える局所の異常腫脹	1
発熱・意識レベルの低下・嘔吐	1		じんましん	28
吐気・嘔吐	1		湿疹	2
末梢性めまい	1		全身倦怠感・咽頭痛・胸痛	1
			全身の発疹	1
※ 後遺障害に至る転帰のものはない			頭痛・食欲不振	1
※ 重篤: 入院又は入院相当の疾病			頭痛・下痢・嘔吐	1
			上下肢筋痛	1
(その他)			下痢	1
死亡(交通事故による受傷)			喘息発作・発熱	1
			喘息発作・皮膚掻痒・頭痛	1
			倦怠感・腰痛・腹痛・下痢	1
			倦怠感・同上・下肢の脱力感	1
			頭痛	1
			嘔	1

(3) その他の有害事象報告

局所反応ならびに定型的全身反応以外に 463 件(因果関係が否定されたものも含む)が報告されたが、特に注意喚起を必要とするものは認められなかった。

3. 現時点での所見

接種 10 分後に発現したアナフィラキシーショック症例は緊急の治療を必要とした。重篤な有害事象(入院等) 6 件が報告されたが後遺障害に至る転帰のものはない。

海外試験とH1N1インフルエンザワクチンとの比較


BNT162b2 mRNAワクチン 筋注			H1N1pdm インフルエンザワクチン 不活化ワクチン 皮下注		
コミナティ筋注 先行接種		BNT162b2第Ⅲ相試験 (NEJM)		H1N1インフルエンザ	
2021年 (NHO,JCHO,JOHAS) 途中経過	19,742 1回目	19,414 2回目	2020年 海外 18,860人 1回目 2回目	2009年 (NHO) 22,112人	
発熱 (37.5℃以上)	3.3%	38.4%		発熱 (37.5℃以上)	3.1%
発熱 (38℃以上)	0.9%	21.5%	Fever (38.0℃以上) 4% 16%		
接種部位反応	92.8%	91.5%		接種部位反応	69.9%
発赤	13.9%	16.1%	Redness 5% 6%	発赤	60.1%
疼痛	92.2%	90.2%	Pain at injection site 83% 78%	疼痛	43.8%
腫脹	12.5%	14.2%	Swelling 6% 6%	腫脹	36.0%
硬結	10.7%	10.1%			
熱感	12.9%	19.2%		熱感	28.2%
かゆみ	8.0%	12.0%		かゆみ (中等度以上)	6.7%
全身症状	35.9%	76.0%		全身症状	26.7%
倦怠感	23.2%	69.4%	Fatigue 47% 59%	倦怠感	19.0%
頭痛	21.4%	53.6%	Headache 42% 52%	頭痛	14.1%
鼻水	10.2%	14.6%		鼻水	10.4%

コミナティ筋注 まとめ

2021/6/21現在

- 2月14日に特例承認となった新型コロナワクチン「コミナティ筋注」を2月17日から先行接種対象者に接種開始した。
- 2月25日に被接種者登録が終了し、19,806人が1回目接種し、コホート調査に登録された。
- 被接種者は20代から50代がそれぞれ21-25%、60歳以上が8.7%、男性33.8%、女性66.2%、医師16.7%、看護師46.6%であった。2回目接種は19,635人が接種した。
- 接種後8日目以降に回収した1回目接種19,742人（全体の99.7%）および2回目接種19,414人（98.9%）の健康観察日誌から、1回目接種後の発熱（37.5℃以上）は3.3%であったが、2回目は38.4%と高率であった。発熱する場合は翌日が多く、接種3日目には解熱した。接種部位の疼痛は90%を超える被接種者が自覚し、接種翌日が最も頻度が高かった。接種3日後には軽快した。1回目に比べ、2回目接種では接種翌日に頭痛（5割）、全身倦怠感（7割）を自覚した。年齢および性別によって、副反応の発現頻度は異なり、若年者・女性が高かった。65歳以上（578人）では発熱9%、全身倦怠感38%、頭痛21%であったが、接種部位疼痛は78%であった。
- 健康観察日誌の自由記載副反応から、腋窩リンパ節腫大を含む反応性リンパ節腫脹が2%程度にみられた。
- 研究班では2回目接種翌日の勤務は控えるように勧告をしていたが、それでも病休者は6.4%（時間休暇含む）にみられた。
- 2回目接種後に解熱鎮痛薬を使用した被接種者は13.6%で、12.9%はアセトアミノフェンを用いていたが、1.9%はロキソプロフェンを併用していた。ロキソプロフェン単剤使用は0.6%だった。
- 終了・中止報告のあった18,455人のうち7人がCOVID-19の感染を報告したが、うち3人は2回目接種をしていた。COVID-19感染報告率は0.72症例/10万人日であった。
- 2009年のH1N1pdmインフルエンザワクチンNHO 2万人調査と比較すると、コミナティ筋注は接種部位の疼痛の頻度が明らかに高く、2回目接種後の37.5℃以上の発熱（4割）、頭痛（5割）、全身倦怠感（7割）を認めた。
- 2回目接種後も接種30分以内の副反応疑いを認めた。1回目、2回目接種合わせて、顔面神経麻痺を含む末梢神経障害など22人がPMDAに報告された。

COVID-19ワクチンモデルナ筋注 コホート調査実施体制



- ・ EDC（診療録と日誌2回分）入力、報告基準該当副反応、重篤なAE発現時は研究事務局に報告（PMDA報告は研究事務局が代行）
- ・ 診療録は保険診療ではありません（電カル登録は不要です）。
- ・ 重篤な副反応は予防接種健康被害救済制度の臨時接種として市町村が補償
- ・ 被接種者には日誌記載のため、体温計と定規を配布


COVID-19ワクチンモデルナ筋注 mRNA-1273
は1万人程度、NHO17病院、JCHOの6病院
自衛隊9施設で実施

COVID-19ワクチンモデルナ筋注被接種者数の推移（累計）

(人)

登録者
6月21日15時現在

6,162人




2021年



COVID-19ワクチンモデルナ筋注被接種者の人口統計学的特性


被接種者数 6,162人 6月21日15時現在

年齢分布




(参考) 65歳以上 登録なし (0%)

男女比



職種



治療中疾患	(割合%)	
高血圧	286	4.6%
脂質異常症	194	3.1%
糖尿病	58	0.9%
気管支喘息	48	0.8%
アトピー性皮膚炎	105	1.7%
その他	358	5.8%
なし	5,298	86.0%

n=6,162

既往歴	(割合%)	
気管支喘息	264	4.3%
悪性腫瘍	28	0.5%
COVID-19	22	0.4%
いずれもなし	5,849	94.9%

n=6,162

複数疾患をお持ちの方もいるため合計は100%ではありません


発熱（37.5℃以上）

Data Cutoff Date 2021/6/18 8:00



COVID-19ワクチンモデルナ筋注

Data Cutoff Date 2021/6/21 16:30



接種部位反応 ①


Data Cutoff Date
2021/6/18 8:00

コミナティ筋注


1回目接種後

n=19,742 (99.7%)


発赤



腫脹



硬結






COVID-19ワクチンモデルナ筋注

1回目接種後

n=1,456

Data Cutoff Date 2021/6/21 16:30



■軽度 ■中等度 ■高度

■軽度 ■中等度 ■高度

■軽度 ■中等度 ■高度



接種部位反応 ②


Data Cutoff Date
2021/6/18 8:00

コミナティ筋注


1回目接種後

n=19,742 (99.7%)


疼痛



熱感



かゆみ






COVID-19ワクチンモデルナ筋注

1回目接種後

n=1,456

Data Cutoff Date 2021/6/21 16:30




全身反応

Data Cutoff Date
2021/6/18 8:00

コミナティ筋注


頭痛




1回目接種後

全身倦怠感

n=19,742 (99.7%)



鼻水






COVID-19ワクチンモデルナ筋注

1回目接種後

n=1,456

Data Cutoff Date 2021/6/21 16:30



■ 軽度 ■ 中等度 ■ 高度

■ 軽度 ■ 中等度 ■ 高度


■ 軽度 ■ 中等度 ■ 高度



1回目接種後（Day8まで）年齢別AEの頻度

COVID-19ワクチンモデルナ筋注

n=1,456



1回目接種後（Day8まで）年齢別AEの頻度

発熱等を従属変数として、モデルナ/コミナティ、
性別、年齢を共変量としたときの調整オッズ比

従属変数	モデルナ/コミナティ		女/男		年齢	
発熱	2.630	(2.003- 3.454)	1.890	(1.565 - 2.284)	0.958	(0.951 - 0.964)
疼痛	0.900	(0.753- 1.076)	1.857	(1.672 - 2.061)	0.986	(0.982 - 0.990)
倦怠感	1.885	(1.659- 2.141)	1.697	(1.576 - 1.827)	0.990	(0.987 - 0.993)
頭痛	1.549	(1.334- 1.797)	2.639	(2.428 - 2.867)	0.989	(0.987 - 0.992)
発赤	1.202	(0.995- 1.451)	2.370	(2.148 - 2.616)	1.002	(0.999 - 1.005)
腫脹	1.213	(1.004- 1.464)	1.993	(1.804 - 2.202)	0.995	(0.992 - 0.998)
硬結	1.002	(0.807- 1.243)	1.966	(1.766 - 2.188)	1.003	(1.000 - 1.007)
熱感	1.740	(1.452- 2.087)	2.716	(2.441 - 3.022)	0.980	(0.977 - 0.984)
かゆみ	1.525	(1.167- 1.993)	4.245	(3.644 - 4.946)	0.997	(0.993 - 1.001)
鼻水	0.725	(0.571- 0.920)	1.680	(1.511 - 1.868)	1.001	(0.997 - 1.005)

太字は有意差があるもの

コミナティ n=19,742、モデルナ n=1,456の合計21,198にロジスティック回帰分析 SPSS ver.28

COVID-19ワクチンモデルナ筋注 まとめ

2021/6/21現在

- 5月21日に特例承認となった新型コロナワクチン「COVID-19ワクチンモデルナ筋注」を5月24日からコホート調査対象者に接種開始した。
- 6月21日15時現在、6,162人が1回目接種し、コホート調査に登録された。
- 被接種者は20代が18.4%、30代が29.9%、40代が36.3%、50代が15.2%、60歳以上が0.2%、男性95.1%、女性4.9%、医師0.02%、看護師0.02%、自衛官96.2%、事務3.7%であった。
- 1回目接種後の副反応はコミナティ筋注とほぼ同様の傾向であったが、年齢、性別を調整したロジスティック回帰分析では発熱、全身倦怠感、頭痛、接種部位のかゆみ、熱感などでもモデルナ筋注がコミナティ筋注に比してオッズ比が高かった。
- 疼痛には年齢の違いがみられていないが、発熱、全身倦怠感、頭痛は年齢が若いほど頻度が高かった。
- コホート調査に登録された方において、現時点では、副反応疑いおよびSAE報告が必要な事例は発生していない。