

\*2023年6月改訂（第2版）

2023年2月作成

貯 法：-90～-60℃

\* 有効期間：24ヵ月

注意—特例承認医薬品

日本標準商品分類番号  
876313ウイルスワクチン類  
生物学的製剤基準承認番号 30400AMX00015  
販売開始 2023年3月

コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン（SARS-CoV-2）

劇薬、処方箋医薬品<sup>注</sup>

# コミナティ 筋注5～11歳用

(2価:起源株/オミクロン株BA.4-5)

## COMIRNATY intramuscular injection for 5 to 11 years old

(Bivalent:Original/Omicron BA.4-5)

本剤の使用にあたっては、あらかじめ被接種者又は代諾者に、本剤に関する最新の有効性及び安全性について文書で説明した上で、予診票等で文書による同意を得た上で接種すること。また、有害事象が認められた際には、必要に応じて予防接種法に基づく副反応疑い報告制度等に基づき報告すること。なお、本剤の製造販売後に収集された情報については、最新の情報を随時参照すること。

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

### 2. 接種不適当者（予防接種を受けることが適当でない者）

- 1 明らかな発熱を呈している者
- 2 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- 3 本剤の成分に対し重度の過敏症の既往歴のある者[8. 4、9. 1. 6、11. 1. 1参照]
- 4 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

### 3. 製法の概要及び組成・性状

#### 3.1 製法の概要

SARS-CoV-2（起源株及びオミクロン株BA.4-5）のスパイクタンパク質のアミノ酸配列をコードするDNAを鋳型として転写したRNAを精製し、脂質成分と混合する。

#### 3.2 組成

販売名	コミナティ筋注5～11歳用
有効成分	トジナメラン及びファムトジナメラン（RNA質量比として1：1）
容量	1.3mL
含量	0.130mg（RNA総量として）
添加剤	[（4-ヒドロキシブチル）アザンジール]ピス（ヘキサ-6,1-ジイル）ピス（2-ヘキシルデカン酸エステル） 1.86mg 2-[(ポリエチレングリコール)-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド 0.23mg 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン 0.40mg コレステロール 0.81mg 精製白糖 133.9mg トロメタモール 0.26mg トロメタモール塩酸塩 1.71mg

#### 3.3 製剤の性状

販売名	コミナティ筋注5～11歳用
pH	6.9～7.9
浸透圧比	約1.2（生理食塩液に対する比）
性状	本品は白濁した液である。

### 4. 効能又は効果

SARS-CoV-2による感染症の予防

### 5. 効能又は効果に関連する注意

5.1 本剤の予防効果の持続期間は確立していない。

### 6. 用法及び用量

本剤を日局生理食塩液1.3mLにて希釈する。  
追加免疫として、1回0.2mLを筋肉内に接種する。

### 7. 用法及び用量に関連する注意

#### 7.1 本剤の使用

本剤は追加免疫に使用する。初回免疫には使用しないこと。

#### 7.2 接種対象者

過去に初回免疫又は追加免疫としてSARS-CoV-2ワクチンの接種歴のある5歳以上11歳以下の者。SARS-CoV-2の流行状況や個々の背景因子等を踏まえ、ベネフィットとリスクを考慮し、追加免疫の可否を判断すること。

### 7.3 接種時期

通常、前回のSARS-CoV-2ワクチンの接種から少なくとも3ヵ月経過した後に接種することができる。

7.4 コミナティ筋注5～11歳用（起源株）以外のSARS-CoV-2ワクチンを接種した者に追加免疫として本剤を接種した際の有効性及び安全性は確立していない。

### 8. 重要な基本的注意

8.1 本剤は「予防接種実施規則」及び「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領」に準拠して使用すること。

8.2 被接種者について、接種前に必ず問診、検温及び診察によって健康状態を調べる。[9.1参照]

8.3 被接種者又はその保護者に、接種当日は過激な運動は避け、接種部位を清潔に保ち、また、接種後の健康監視に留意し、局所の異常反応や体調の変化、さらに高熱、痙攣等の異常な症状を呈した場合には速やかに医師の診察を受けるよう事前に知らせること。

8.4 ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるため、接種前に過敏症の既往歴等に関する問診を十分に行い、接種後一定時間、被接種者の状態を観察することが望ましい。また、本剤接種後にショック、アナフィラキシーが認められた被接種者に対しては、以降の本剤の接種を行わないこと。[2.3、9.1.6、11.1.1参照]

8.5 ワクチン接種直後又は接種後に注射による心因性反応を含む血管迷走神経反射として失神があらわれることがある。失神による転倒を避けるため、接種後一定時間は座らせるなどした上で被接種者の状態を観察することが望ましい。

8.6 心筋炎、心膜炎があらわれることがあるため、被接種者又はその保護者に対しては、心筋炎、心膜炎が疑われる症状（胸痛、動悸、むくみ、呼吸困難、頻呼吸等）が認められた場合には、速やかに医師の診察を受けるよう事前に知らせること。[11.1.2、15.1.1、15.1.2参照]

8.7 コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）接種後に、ギラン・バレー症候群が報告されている。被接種者又はその保護者に対しては、ギラン・バレー症候群が疑われる症状（四肢遠位から始まる弛緩性麻痺、腱反射の減弱ないし消失等）が認められた場合には直ちに医師等に相談するよう、あらかじめ説明すること。

8.8 本剤と他のSARS-CoV-2に対するワクチンの互換性に関するデータはない。

### 9. 特定の背景を有する者に関する注意

#### 9.1 接種要注者（接種の判断を行うに際し、注意を要する者）

被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質を勘案し、診察及び接種適否の判断を慎重に行い、予防接種の必要性、副反応、有用性について十分な説明を行い、同意を確実に得た上で、注意して接種すること。[8.2参照]

#### 9.1.1 抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者

本剤接種後に出血又は挫傷があらわれることがある。

- 9.1.2 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者  
本剤に対する免疫応答が低下する可能性がある。
- 9.1.3 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
- 9.1.4 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
- 9.1.5 過去に痙攣の既往のある者
- 9.1.6 本剤の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者  
[2.3、8.4、11.1.1参照]
- 9.2 腎機能障害を有する者  
接種要注意者である。
- 9.3 肝機能障害を有する者  
接種要注意者である。
- 9.5 妊婦  
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ接種すること。
- 9.6 授乳婦  
予防接種上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中への移行は不明である。
- 9.7 小児等  
5歳未満を対象とした臨床試験は実施していない。

## 11. 副反応

次の副反応があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副反応

#### 11.1.1 ショック、アナフィラキシー（頻度不明）

[2.3、8.4、9.1.6参照]

#### 11.1.2 心筋炎、心膜炎（頻度不明）

[8.6、15.1.1、15.1.2参照]

### 11.2 その他の副反応

	5%以上	1%～5%未満	1%未満	頻度不明
局所症状 (注射部位)	疼痛 (84.3%) <sup>a)</sup> 、 発赤・紅斑 (26.4%) <sup>a)</sup> 、腫脹 (20.4%) <sup>a)</sup>			そう痒感、熱感、内出血、浮腫
精神神経系	頭痛 (38.2%) <sup>a)</sup>			浮動性めまい、嗜眠、不眠症、顔面麻痺、錯感覚、感覚鈍麻
消化器	下痢 <sup>a)</sup>	嘔吐 <sup>a)</sup>	悪心、食欲減退	
呼吸器			口腔咽頭痛、鼻閉	
筋・骨格系	筋肉痛 (17.5%) <sup>a)</sup> 、 関節痛 <sup>a)</sup>			四肢痛、背部痛
皮膚			発疹	多汗症、寝汗
血液			リンパ節症	
免疫系				過敏症 (発疹、そう痒症、紅斑、蕁麻疹、血管性浮腫、顔面腫脹等)
その他	疲労 (51.7%) <sup>a)</sup> 、 悪寒 (12.4%) <sup>a)</sup> 、 発熱 <sup>a)</sup>		腋窩痛	疼痛、倦怠感、無力症、インフルエンザ様症状

a) 臨床試験において電子目録により収集した副反応の発現割合

注) コミナティ筋注5～11歳用(起源株)の海外第Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ相試験(C4591007試験)第Ⅱ/Ⅲ相パートの2回接種に関するデータより集計

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤調製時の注意

#### 14.1.1 解凍方法

- (1) 冷蔵庫(2～8℃)又は室温で解凍すること。
- (2) 解凍の際は、室内照明による曝露を最小限に抑えること。直射日光及び紫外線が当たらないようにすること。

#### 14.1.2 解凍後の保存管理

- (1) 解凍後は再凍結せず、有効期間内に使用すること。
- (2) 冷蔵庫(2～8℃)で解凍する場合は、2～8℃で10週間保存することができる。

- (3) 室温で解凍する場合は、解凍開始から24時間以内(一度針を刺した後の時間を含む)に使用すること。

### 14.1.3 希釈方法

- (1) 希釈前に室温に戻しておくこと。
- (2) 本剤は保存料を含まないため、操作にあたっては雑菌が迷入しないよう注意すること。
- (3) 本剤のバイアルに日局生理食塩液1.3mLを加え、白色の均一な液になるまでゆっくりと転倒混和すること。振り混ぜないこと。
- (4) 希釈前の液は白色の微粒子を含むことがある。希釈後に微粒子が認められる場合には、使用しないこと。
- (5) 希釈後の液は10回接種分(1回0.2mL)を有する。デッドポリユームの少ない注射針又は注射筒を使用した場合、10回分を採取することができる。標準的な注射針及び注射筒等を使用した場合、10回目の接種分を採取できないことがある。1回0.2mLを採取できない場合、残量は廃棄すること。
- (6) 希釈後の液は2～30℃で保存し、希釈後12時間以内に使用すること。希釈後12時間以内に使用しなかった液は廃棄すること。
- (7) 希釈後保存の際には、室内照明による曝露を最小限に抑えること。直射日光及び紫外線が当たらないようにすること。

## 14.2 薬剤接種時の注意

- 14.2.1 室温に戻した希釈後のバイアルから接種量0.2mLを取り、微粒子や変色がないことを目視で確認すること。異常が認められる場合は使用しないこと。
- 14.2.2 通常、三角筋に筋肉内接種すること。静脈内、皮内、皮下への接種は行わないこと。
- 14.2.3 組織・神経等への影響を避けるため下記の点に注意すること。
  - (1) 針長は筋肉内接種に足る長さで、組織や血管あるいは骨に到達しないよう、各被接種者に対して適切な針長を決定すること。
  - (2) 神経走行部位を避けること。
  - (3) 注射針を刺入したとき、激痛の訴えや血液の逆流がみられた場合は直ちに針を抜き、部位をかえて注射すること。

## 15. その他の注意

### 15.1 臨床使用に基づく情報

- 15.1.1 海外において、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)接種後に心筋炎、心膜炎が報告されている。初回免疫において報告された症例の多くは若年男性であり、特に2回目接種後数日以内に発現している。また、大多数の症例で、入院による安静臥床により症状が改善している<sup>1)</sup>。[8.6、11.1.2参照]
- 15.1.2 接種開始後の国内副反応疑い報告における心筋炎、心膜炎の報告率と、国内の医療情報データベースを用いて算出した一般集団から推測される心筋炎、心膜炎の発現率とを比較したところ、初回免疫としてコミナティ筋注(起源株)2回接種後の若年男性で頻度が高いことが示唆された<sup>2)</sup>。[8.6、11.1.2参照]
- 15.1.3 海外において、皮膚充填剤との関連性は不明であるが、皮膚充填剤注入歴のある被接種者において、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)接種後に、皮膚充填剤注入部位周辺の腫脹(特に顔面腫脹)が報告されている。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

#### 17.1.1 海外第Ⅱ/Ⅲ相試験(C4591044試験)(参考:コミナティRTU筋注(起源株/オミクロン株BA.4-5))

コミナティ筋注(起源株)30μgを3回接種済みで、3回目接種から5～12ヵ月経過した12歳以上の者を対象に、コミナティRTU筋注(起源株/オミクロン株BA.4-5)(以下、コミナティRTU筋注(起源株/BA.4-5))30μgを1回接種(4回目接種)したときの免疫原性及び安全性を検討することを目的として、12～17歳の年齢層は非盲検非対照試験、18～55歳及び55歳超の年齢層は無作為化評価者盲検並行群間比較試験として実施した。

本試験におけるSARS-CoV-2感染歴がない18～55歳の参加者32例及び55歳超の参加者40例を対象に、コナチンRTU筋注（起源株/BA. 4-5）接種後1ヵ月のSARS-CoV-2血清中和抗体価を評価した結果、表1のとおりコナチンRTU筋注（起源株/BA. 4-5）群における18～55歳及び55歳超の参加者の接種後1ヵ月時のBA. 4-5及び参照株に対する血清中和抗体価は、接種前に比べて上昇した<sup>3)</sup>。

表1 18～55歳及び55歳超の参加者のSARS-CoV-2血清中和抗体価（50%中和抗体価）の幾何平均比

		コナチンRTU筋注（起源株/BA. 4-5）30µg			
		18～55歳		55歳超	
測定対象株	測定時期	測定例数	GMT [両側95%信頼区間] <sup>a)</sup>	測定例数	GMT [両側95%信頼区間] <sup>a)</sup>
BA. 4-5	接種前	32	54.5 [41.3, 71.9]	40	76.0 [54.7, 105.7]
	接種後1ヵ月	32	1029.6 [702.6, 1508.9]	40	1668.1 [1089.6, 2553.7]
参照株	接種前	32	455.3 [286.2, 724.2]	40	881.9 [601.6, 1292.7]
	接種後1ヵ月	32	6431.7 [4542.9, 9106.0]	40	8386.3 [6235.4, 11279.2]

GMT：幾何平均抗体価

a) 抗体価が定量下限（LLOQ）未満の場合、解析には0.5×LLOQの値が用いられた

316例（12～17歳：107例、18～55歳：103例、55歳超：106例）を対象にコナチンRTU筋注（起源株/BA. 4-5）接種後の安全性を評価した。治験薬接種後7日間、電子日誌により副反応の発現状況を評価し、主な副反応の発現状況（事象全体及びGrade 3以上）は表2のとおりであった。注射部位疼痛は接種当日～翌日（中央値）に発現し、持続期間は1～2日（中央値）であった。その他の全身性の事象は接種翌日（中央値）に発現し、持続期間は1～2日（中央値）であった<sup>3)</sup>。

表2 主な副反応の発現状況

		発現例数（発現割合 [%]）								
		12～17歳			18～55歳			55歳超		
		コナチンRTU筋注 （起源株/BA. 4-5）			コナチンRTU筋注 （起源株/BA. 4-5）			コナチンRTU筋注 （起源株/BA. 4-5）		
	接種回数	評価例数 <sup>a)</sup>	事象全体	Grade 3以上 <sup>b)</sup>	評価例数 <sup>a)</sup>	事象全体	Grade 3以上 <sup>b)</sup>	評価例数 <sup>a)</sup>	事象全体	Grade 3以上 <sup>b)</sup>
注射部位疼痛	4	107	75 (70.1)	1 (0.9)	102	81 (79.4)	0 (—)	105	59 (56.2)	0 (—)
疲労	4	107	72 (67.3)	0 (—)	102	64 (62.7)	2 (2.0)	105	41 (39.0)	1 (1.0)
頭痛	4	107	54 (50.5)	0 (—)	102	45 (44.1)	0 (—)	105	31 (29.5)	0 (—)
筋肉痛	4	107	28 (26.2)	0 (—)	102	32 (31.4)	0 (—)	105	21 (20.0)	0 (—)
悪寒	4	107	25 (23.4)	0 (—)	102	15 (14.7)	0 (—)	105	13 (12.4)	0 (—)
関節痛	4	107	13 (12.1)	0 (—)	102	17 (16.7)	0 (—)	105	12 (11.4)	0 (—)
発熱 <sup>c)</sup>	4	107	10 (9.3)	1 (0.9)	102	5 (4.9)	0 (—)	105	8 (7.6)	0 (—)

a) 電子日誌により評価した例数

b) 重症度が「高度（日常活動を妨げる）」以上として報告された事象

c) 38.0℃以上、38.9℃を超えた場合に、重症度が高度（Grade 3）以上とした

### 17.1.2 海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591007試験）第Ⅱ／Ⅲ相パート（参考：コナチン筋注5～11歳用（起源株））

SARS-CoV-2ワクチン未接種の5～11歳の小児参加者を対象に、コナチン筋注5～11歳用（起源株）10µgを19～23日間隔で2回接種したときの免疫原性及び安全性を検討することを目的として、プラセボ対照無作為化多施設共同試験を実施した。さらに、本試験でコナチン筋注5～11歳用（起源株）10µgを2回接種済みの5～11歳の小児参加者にコナチン筋注5～11歳用（起源株）10µgを1回接種したときの免疫原性及び安全性も検討した。

### (1) 初回免疫（コナチン筋注5～11歳用（起源株）2回接種）

本試験における5～11歳群（コナチン筋注5～11歳用（起源株）10µg）のSARS-CoV-2感染歴がない264例及び海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591001試験）における16～25歳群（コナチン筋注（起源株）30µg）（17.1.2項参照）のSARS-CoV-2感染歴がない253例を対象に、コナチン筋注5～11歳用（起源株）2回目接種後1ヵ月のSARS-CoV-2血清中和抗体価及び抗体応答率を評価した結果、表3及び表4のとおり本試験における5～11歳群（コナチン筋注5～11歳用（起源株）10µg）の海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591001試験）における16～25歳群（コナチン筋注（起源株）30µg）に対する免疫ブリッジングの成功基準を満たした<sup>4)</sup>。

表3 5～11歳群の16～25歳群に対するSARS-CoV-2血清中和抗体価（50%中和抗体価）の幾何平均比

5～11歳群（コナチン筋注5～11歳用（起源株）10µg）		16～25歳群（コナチン筋注（起源株）30µg）		GMR [両側95%信頼区間] <sup>b)</sup>
測定例数	GMT [両側95%信頼区間] <sup>a)</sup> (2回目接種後1ヵ月)	測定例数	GMT [両側95%信頼区間] <sup>a)</sup> (2回目接種後1ヵ月)	
264	1197.6 [1106.1, 1296.6]	253	1146.5 [1045.5, 1257.2]	1.04 [0.93, 1.18]

GMR：幾何平均比、GMT：幾何平均抗体価

a) 抗体価が定量下限（LLOQ）未満の場合、解析には0.5×LLOQの値が用いられた

b) 免疫ブリッジングの成功基準：GMR（5～11歳/16～25歳）の両側95%信頼区間下限>0.67及びGMR点推定値>0.8

表4 5～11歳群の16～25歳群に対するSARS-CoV-2血清中和抗体応答率の差

5～11歳群（コナチン筋注5～11歳用（起源株）10µg）		16～25歳群（コナチン筋注（起源株）30µg）		差 (%) [両側95%信頼区間] <sup>b)</sup>
測定例数	n <sup>a)</sup> (抗体応答率 [%]) [両側95%信頼区間] (2回目接種後1ヵ月)	測定例数	n <sup>a)</sup> (抗体応答率 [%]) [両側95%信頼区間] (2回目接種後1ヵ月)	
264	262 (99.2) [97.3, 99.9]	253	251 (99.2) [97.2, 99.9]	0.0 [-2.0, 2.2]

a) 抗体価がベースライン値（ベースライン値が定量下限（LLOQ）未満の場合はLLOQ値）から4倍以上上昇した治験参加者数

b) 免疫ブリッジングの成功基準：抗体応答率の差（5～11歳 - 16～25歳）の両側95%信頼区間の下限が>-10.0%

2268例（コナチン筋注5～11歳用（起源株）接種群：1518例、プラセボ接種群：750例）を対象にコナチン筋注5～11歳用（起源株）接種後の安全性を評価した。治験薬接種後7日間、電子日誌により副反応の発現状況を評価し、主な副反応の発現状況（事象全体及びGrade 3以上）は表5のとおりであった<sup>4)</sup>。注射部位疼痛は接種当日（中央値）に発現し、持続期間は2日（中央値）であった。その他の全身性の事象は接種翌日（中央値）に発現し、持続期間は1日（中央値）であった<sup>5)</sup>。

表5 主な副反応の発現状況

		発現例数（発現割合 [%]）						
		コナチン筋注5～11歳用 （起源株）接種群			プラセボ接種群			
	接種回数	評価例数 <sup>a)</sup>	事象全体	Grade 3以上 <sup>b)</sup>	評価例数 <sup>a)</sup>	事象全体	Grade 3以上 <sup>b)</sup>	
注射部位疼痛	1	1511	1119 (74.1)	4 (0.3)	748	234 (31.3)	0 (—)	
	2	1501	1065 (71.0)	5 (0.3)	740	218 (29.5)	0 (—)	
疲労	1	1511	508 (33.6)	4 (0.3)	748	234 (31.3)	1 (0.1)	
	2	1501	592 (39.4)	11 (0.7)	740	180 (24.3)	1 (0.1)	
頭痛	1	1511	339 (22.4)	2 (0.1)	748	180 (24.1)	4 (0.5)	
	2	1501	420 (28.0)	3 (0.2)	740	138 (18.6)	0 (—)	
筋肉痛	1	1511	137 (9.1)	1 (0.1)	748	51 (6.8)	0 (—)	
	2	1501	175 (11.7)	1 (0.1)	740	55 (7.4)	0 (—)	
悪寒	1	1511	70 (4.6)	0 (—)	748	35 (4.7)	0 (—)	
	2	1501	147 (9.8)	2 (0.1)	740	32 (4.3)	1 (0.1)	
関節痛	1	1511	50 (3.3)	0 (—)	748	41 (5.5)	0 (—)	
	2	1501	78 (5.2)	0 (—)	740	27 (3.6)	0 (—)	
発熱 <sup>c)</sup>	1	1511	38 (2.5)	3 (0.2)	749	10 (1.3)	1 (0.1)	
	2	1501	98 (6.5)	9 (0.6)	741	9 (1.2)	1 (0.1)	

a) 電子日誌により評価した例数

b) 重症度が「高度（日常活動を妨げる）」以上として報告された事象

c) 38.0℃以上、38.9℃を超えた場合に、重症度が高度（Grade 3）以上とした

## (2) 追加免疫（コヒナティ筋注5～11歳用（起源株）3回目接種）

本試験でコヒナティ筋注5～11歳用（起源株）10 $\mu$ gを2回接種済みの5～11歳の小児参加者401例に、2回目接種から5～9ヵ月後にコヒナティ筋注5～11歳用（起源株）10 $\mu$ gを1回接種したときの安全性及び免疫原性を検討した。

SARS-CoV-2感染歴がない小児参加者におけるコヒナティ筋注5～11歳用（起源株）接種後のSARS-CoV-2血清中和抗体価を評価した結果、幾何平均抗体価は、表6のとおり2回目接種後1ヵ月時及び3回目接種前と比べて、3回目接種後1ヵ月時で上昇し、2回目接種後1ヵ月時の抗体価に対する3回目接種後1ヵ月時の抗体価の幾何平均比は、2.17（両側95%信頼区間：1.76, 2.68）であった。

表6 SARS-CoV-2血清中和抗体価（50%中和抗体価）

測定時点	合計	
	測定例数	GMT [両側95%信頼区間] <sup>a)</sup>
1回目接種前 <sup>b)</sup>	146	20.5 [20.5, 20.5]
2回目接種後1ヵ月 <sup>b)</sup>	96	1253.9 [1116.0, 1408.9]
3回目接種前	67	271.0 [229.1, 320.6]
3回目接種後1ヵ月	67	2720.9 [2280.1, 3247.0]

GMT：幾何平均抗体価

a) 抗体価が定量下限（LLOQ）未満の場合、解析には0.5 $\times$ LLOQの値が用いられた

b) 1回目接種前時点及び2回目接種後1ヵ月時点のデータには2回接種集団【初回免疫（2回接種）の免疫ブリッジング解析に用いた評価可能免疫原性集団から無作為に選定された参加者】のデータも含む

401例を対象にコヒナティ筋注5～11歳用（起源株）3回目接種後の安全性を評価した。治験薬接種後7日間、電子日誌により副反応の発現状況を評価し、主な副反応の発現状況（事象全体及びGrade 3以上）は表7のとおりであった。注射部位疼痛は接種当日（中央値）に発現し、持続期間は2日（中央値）であった。その他の全身性の事象は接種翌日（中央値）に発現し、持続期間は1日（中央値）であった<sup>6)</sup>。

表7 主な副反応の発現状況

	接種回数	発現例数（発現割合 [%]）		
		コヒナティ筋注5～11歳用（起源株）接種群		
		評価例数 <sup>a)</sup>	事象全体	Grade 3以上 <sup>b)</sup>
注射部位疼痛	3	371	274 (73.9)	2 (0.5)
疲労	3	371	169 (45.6)	7 (1.9)
頭痛	3	371	126 (34.0)	3 (0.8)
筋肉痛	3	371	68 (18.3)	0 (—)
悪寒	3	371	39 (10.5)	1 (0.3)
関節痛	3	371	25 (6.7)	0 (—)
発熱 <sup>c)</sup>	3	371	25 (6.7)	3 (0.8)

a) 電子日誌により評価した例数

b) 重症度が「高度（日常生活を妨げる）」以上として報告された事象

c) 38.0 $^{\circ}$ C以上、38.9 $^{\circ}$ Cを超えた場合に、重症度が高度（Grade 3）以上とした

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

本剤に含有される修飾ウリジンメッセンジャーRNA（mRNA）は脂質ナノ粒子に封入されており、それにより非複製性であるmRNAが宿主細胞に取り込まれ、mRNAにコードされるSARS-CoV-2のスパイクタンパク質が一過性に発現する。本剤接種によりスパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防に寄与すると考えられている。

### 18.2 変異株に対する中和抗体産生能

マウスに1価（起源株）製剤を21日間隔で2回投与し、その1ヵ月後に1価（起源株）製剤、2価（起源株/オミクロン株BA.1）製剤又は2価（起源株/オミクロン株BA.4-5）製剤を1回投与した。3回目投与から1ヵ月後、いずれの群でも起源株、デルタ株及びオミクロン株（BA.1、BA.2、BA.2.12.1及びBA.4/5）に対する中和抗体産生が認められ、オミクロン株BA.4/5に対する中和抗体価は、1価（起源株）製剤群及び2価（起源株/オミクロン株BA.1）製剤群よりも2価（起源株/オミクロン株BA.4-5）製剤群で高値を示した<sup>7)</sup>。

## 21. 承認条件

21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

21.2 現時点での知見が限られていることから、製造販売後、副作用情報等の本剤の安全性に関するデータを、あらかじめ定めた計画に基づき早期に収集するとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。その際、国が実施する健康調査等により得られた情報についても適切に反映すること。

21.3 現在国内外で実施中又は計画中の臨床試験の成績が得られた際には、速やかに当該成績を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出するとともに、本剤の有効性及び安全性に係る最新の情報を、医療従事者及び被接種者が容易に入手可能となるよう必要な措置を講じること。また、国が行う本剤の有効性及び安全性に係る情報の発信について、適切に協力すること。

21.4 本剤の接種に際し、本剤の有効性及び安全性については今後も情報が集積されることを踏まえ、あらかじめ被接種者又は代諾者に最新の有効性及び安全性に関する情報が文書をもって説明され、予診票等で文書による同意を得てから接種されるよう、医師に対して適切に説明すること。

## 22. 包装

10バイアル（オレンジキャップ）

## 23. 主要文献

- 1) Clinical Considerations: Myocarditis and Pericarditis after Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines Among Adolescents and Young Adults
- 2) 第73回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第23回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）資料
- 3) 社内資料：海外第Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591044試験）補助資料
- 4) 社内資料：海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591007試験）（2022年1月21日承認 CTD2.5.1.2、2.5.4.3、2.5.4.4、2.5.5.2、2.7.6.1）
- 5) 社内資料：海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591007試験）補助資料
- 6) 社内資料：海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591007試験）（2022年8月30日承認 CTD2.5.1.2、2.5.4.2、2.5.5.2、2.7.6.1）
- 7) 社内資料：マウス免疫原性試験 補助資料

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

ファイザー株式会社  
〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7  
新型コロナワクチン専用ダイヤル 0120-146-744  
FAX 03-3379-3053

## 25. 保険給付上の注意

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準未収載）。

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売元

ファイザー株式会社  
東京都渋谷区代々木3-22-7

### 26.2 技術提携

**BIONTECH**