

Ⅲ 調査結果

1. 医療処置項目別回答状況

資料1-2

		医師回答					看護師回答				
		現在について	今後について				現在について	今後について			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
		現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
医療処置項目				計	看護師一般	特定看護師(仮称)			計	看護師一般	特定看護師(仮称)
検査	1 動脈ラインからの採血	63.4%	6.2%	93.8%	78.4%	15.3%	52.4%	18.1%	81.9%	63.4%	18.6%
	2 直接動脈穿刺による採血	2.0%	36.8%	63.2%	17.0%	46.2%	1.7%	55.8%	44.2%	6.9%	37.3%
	3 動脈ラインの抜去・圧迫止血	33.0%	12.3%	87.7%	59.3%	28.3%	30.0%	27.1%	72.9%	46.2%	26.7%
	4 トリアージのための検体検査の実施の決定	5.3%	36.0%	64.0%	19.6%	44.4%	6.1%	41.1%	58.9%	11.9%	47.0%
	5 トリアージのための検体検査結果の評価	3.6%	58.2%	41.8%	10.4%	31.4%	4.2%	63.1%	36.9%	5.2%	31.6%
	6 治療効果判定のための検体検査の実施の決定	2.8%	56.6%	43.4%	10.9%	32.5%	3.6%	65.6%	34.4%	5.9%	28.5%
	7 治療効果判定のための検体検査結果の評価	2.8%	74.7%	25.3%	5.3%	20.0%	2.9%	81.7%	18.3%	2.8%	15.6%
	8 手術前検査の実施の決定	3.5%	48.4%	51.6%	19.6%	32.0%	3.8%	57.6%	42.4%	12.1%	30.3%
	9 単純X線撮影の実施の決定	2.8%	44.5%	55.5%	19.6%	35.9%	3.2%	46.8%	53.2%	12.5%	40.8%
	10 単純X線撮影の画像評価	1.4%	76.4%	23.6%	5.1%	18.5%	1.8%	77.9%	22.1%	2.7%	19.5%
	11 CT、MRI検査の実施の決定	1.5%	66.0%	34.0%	9.4%	24.6%	1.9%	69.7%	30.3%	4.5%	25.8%
	12 CT、MRI検査の画像評価	0.7%	87.1%	12.9%	2.5%	10.4%	0.8%	89.0%	11.0%	1.1%	9.9%
	13 造影剤使用検査時の造影剤の投与	31.6%	18.6%	81.4%	54.5%	26.9%	34.2%	40.4%	59.6%	34.8%	24.8%
	14 IVR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施	1.9%	60.1%	39.9%	6.1%	33.8%	0.6%	82.6%	17.4%	2.2%	15.2%
	15 経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施の決定	8.2%	39.3%	60.7%	27.3%	33.4%	10.4%	48.5%	51.5%	21.0%	30.5%
	16 経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施	10.9%	31.6%	68.4%	27.4%	41.0%	14.6%	46.1%	53.9%	23.4%	30.5%
	17 腹部超音波検査の実施の決定	1.1%	57.1%	42.9%	12.4%	30.5%	1.4%	65.7%	34.3%	5.3%	29.0%
	18 腹部超音波検査の実施	0.3%	49.0%	51.0%	5.9%	45.2%	0.4%	65.0%	35.0%	2.8%	32.2%
	19 腹部超音波検査の結果の評価	0.2%	75.2%	24.8%	3.2%	21.6%	0.4%	86.8%	13.2%	0.8%	12.3%
	20 心臓超音波検査の実施の決定	0.9%	59.1%	40.9%	10.1%	30.8%	1.2%	71.5%	28.5%	3.5%	25.0%
	21 心臓超音波検査の実施	0.3%	50.6%	49.4%	4.6%	44.8%	0.3%	70.9%	29.1%	1.7%	27.4%
	22 心臓超音波検査の結果の評価	0.3%	78.1%	21.9%	2.6%	19.3%	0.4%	89.2%	10.8%	0.6%	10.2%
	23 頸動脈超音波検査の実施の決定	0.6%	55.9%	44.1%	10.8%	33.2%	0.8%	71.9%	28.1%	3.4%	24.7%
	24 表在超音波検査の実施の決定	0.8%	53.7%	46.3%	11.9%	34.4%	1.3%	66.8%	33.2%	4.7%	28.5%
	25 下肢血管超音波検査の実施の決定	1.3%	52.1%	47.9%	12.8%	35.0%	1.8%	64.9%	35.1%	5.3%	29.8%
	26 術後下肢動脈ドップラー検査の実施の決定	8.7%	45.1%	54.9%	20.3%	34.6%	15.4%	51.1%	48.9%	20.4%	28.5%
	27 12誘導心電図検査の実施の決定	25.7%	24.3%	75.7%	48.4%	27.3%	36.7%	24.0%	76.0%	51.7%	24.3%
	28 12誘導心電図検査の実施	63.0%	4.7%	95.3%	78.8%	16.5%	66.7%	6.4%	93.6%	80.1%	13.5%
	29 12誘導心電図検査の結果の評価	6.0%	52.0%	48.0%	16.7%	31.2%	10.5%	55.1%	44.9%	18.0%	26.9%
	30 感染症検査(インフルエンザ・ノロウィルス等)の実施の決定	7.9%	29.0%	71.0%	39.6%	31.5%	8.5%	34.5%	65.5%	30.4%	35.1%
	31 感染症検査(インフルエンザ・ノロウィルス等)の実施	40.0%	10.7%	89.3%	66.6%	22.7%	46.3%	18.2%	81.8%	59.3%	22.4%
	32 感染症検査(インフルエンザ・ノロウィルス等)の結果の評価	9.3%	40.1%	59.9%	32.7%	27.1%	7.3%	55.1%	44.9%	20.4%	24.5%
	33 薬剤感受性検査実施の決定	2.4%	48.2%	51.8%	19.7%	32.1%	2.7%	63.3%	36.7%	8.3%	28.4%
	34 真菌検査の実施の決定	2.7%	44.3%	55.7%	22.9%	32.7%	4.4%	52.9%	47.1%	14.8%	32.3%
	35 真菌検査の結果の評価	1.3%	58.8%	41.2%	14.7%	26.4%	2.3%	70.5%	29.5%	7.5%	22.0%
	36 微生物学検査実施の決定	4.2%	43.2%	56.8%	24.1%	32.7%	2.9%	60.5%	39.5%	10.5%	29.0%
	37 微生物学検査の実施:スワブ法	39.7%	15.7%	84.3%	61.3%	23.1%	40.6%	32.0%	68.0%	49.3%	18.6%
	38 薬物血中濃度検査(TDM)実施の決定	1.7%	47.8%	52.2%	17.0%	35.1%	2.0%	64.8%	35.2%	6.7%	28.5%
	39 スパイロメトリーの実施の決定	2.2%	47.5%	52.5%	20.1%	32.5%	2.3%	59.7%	40.3%	10.1%	30.2%
	40 直腸内圧測定・肛門内圧測定実施の決定	0.8%	60.6%	39.4%	13.3%	26.1%	1.6%	70.1%	29.9%	4.6%	25.3%
	41 直腸内圧測定・肛門内圧測定の実施	3.3%	48.2%	51.8%	16.8%	35.0%	3.5%	63.4%	36.6%	8.1%	28.5%
	42 膀胱内圧測定実施の決定	0.7%	62.3%	37.7%	12.4%	25.3%	1.3%	69.0%	31.0%	5.0%	26.0%
	43 膀胱内圧測定の実施	2.0%	51.2%	48.8%	15.7%	33.1%	4.5%	63.9%	36.1%	8.7%	27.4%
	44 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施の決定	1.6%	50.5%	49.5%	17.3%	32.1%	1.5%	70.0%	30.0%	4.9%	25.1%
	45 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施	7.0%	31.7%	68.3%	28.8%	39.5%	2.2%	63.6%	36.4%	7.5%	28.9%
	46 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の結果の評価	0.6%	65.4%	34.6%	10.1%	24.4%	1.0%	82.1%	17.9%	2.3%	15.5%
	47 骨密度検査の実施の決定	1.4%	44.7%	55.3%	21.0%	34.4%	1.3%	58.8%	41.2%	10.8%	30.4%
	48 骨密度検査の結果の評価	0.8%	58.6%	41.4%	12.3%	29.1%	0.8%	72.3%	27.7%	5.7%	22.0%
	49 嚥下造影の実施の決定	1.6%	52.3%	47.7%	13.0%	34.7%	1.8%	55.7%	44.3%	7.1%	37.2%
	50 嚥下内視鏡検査の実施の決定	1.1%	58.3%	41.7%	10.0%	31.7%	1.2%	62.9%	37.1%	5.1%	32.0%
	51 嚥下内視鏡検査の実施	0.4%	75.5%	24.5%	3.9%	20.6%	0.3%	81.7%	18.3%	1.5%	16.8%
	52 眼底検査の実施の決定	0.5%	53.5%	46.5%	12.7%	33.7%	1.3%	68.4%	31.6%	5.6%	26.0%
	53 眼底検査の実施	2.3%	57.5%	42.5%	9.2%	33.3%	3.7%	67.6%	32.4%	8.2%	24.1%
	54 眼底検査の結果の評価	0.3%	79.9%	20.1%	3.3%	16.8%	0.4%	87.3%	12.7%	1.7%	11.1%
	55 ACT(活性化凝固時間)の測定実施の決定	7.1%	37.9%	62.1%	27.9%	34.2%	5.0%	59.5%	40.5%	12.4%	28.1%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき) :すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能) :すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般) :すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)) :すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

			医師回答					看護師回答						
			現在について	今後について				現在について	今後について					
				A	B	C	D		E	A	B	C	D	E
				現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			
医療処置項目					計	看護師一般	特定看護師（仮称）			計	看護師一般	特定看護師（仮称）		
呼吸器	56	酸素投与の開始、中止、投与量の調整の判断	37.3%	23.1%	76.9%	42.7%	34.3%	48.5%	16.4%	83.6%	50.7%	32.8%		
	57	気管カニューレの選択・交換	10.4%	34.0%	66.0%	19.1%	46.9%	12.3%	44.2%	55.8%	13.5%	42.3%		
	58	経皮的気管穿刺針（トラヘルパー等）の挿入	1.7%	71.6%	28.4%	3.3%	25.2%	0.9%	75.2%	24.8%	2.2%	22.6%		
	59	挿管チューブの位置調節（深さの調整）	24.1%	23.3%	76.7%	33.0%	43.6%	11.4%	40.4%	59.6%	15.0%	44.5%		
	60	経口・経鼻挿管の実施	6.1%	56.0%	44.0%	9.7%	34.2%	4.1%	60.2%	39.8%	4.4%	35.3%		
	61	経口・経鼻挿管チューブの抜管	10.9%	41.1%	58.9%	18.4%	40.6%	6.0%	45.5%	54.5%	11.8%	42.7%		
	62	人工呼吸器モードの設定・変更の判断・実施	11.1%	37.3%	62.7%	11.4%	51.3%	10.2%	42.6%	57.4%	8.8%	48.6%		
	63	人工呼吸管理下の鎮静管理	20.8%	36.5%	63.5%	20.2%	43.2%	23.7%	46.4%	53.6%	19.1%	34.5%		
	64	人工呼吸器装着中の患者のウイニングスケジュール作成と実施	4.3%	42.6%	57.4%	7.2%	50.2%	6.9%	38.7%	61.3%	6.9%	54.4%		
	65	小児の人工呼吸器の選択：HFO対応か否か	1.4%	68.1%	31.9%	2.6%	29.3%	0.8%	75.9%	24.1%	0.9%	23.2%		
処置・創傷処置	66	NPPV開始、中止、モード設定	5.4%	48.4%	51.6%	8.0%	43.6%	6.8%	50.0%	50.0%	7.1%	42.9%		
	67	浣腸の実施の決定	49.1%	16.2%	83.8%	63.6%	20.2%	56.8%	12.1%	87.9%	69.6%	18.3%		
	68	創部洗浄・消毒	57.4%	9.3%	90.7%	66.9%	23.8%	65.6%	11.0%	89.0%	67.5%	21.5%		
	69	褥瘡の壊死組織のデブリードマン	7.3%	46.7%	53.3%	12.5%	40.7%	9.0%	38.0%	62.0%	9.3%	52.7%		
	70	電気凝固メスによる止血（褥瘡部）	1.1%	60.7%	39.3%	4.7%	34.6%	0.5%	68.5%	31.5%	1.8%	29.7%		
	71	巻爪処置（ニッパー、ワイヤーを用いた処置）	23.8%	33.0%	67.0%	33.3%	33.7%	23.4%	36.5%	63.5%	22.9%	40.7%		
	72	胼胝・鶏眼処置（コーンカッター等用いた処置）	15.7%	33.0%	67.0%	30.1%	36.9%	14.0%	46.3%	53.7%	17.0%	36.7%		
	73	皮下膿瘍の切開・排膿：皮下組織まで	1.1%	65.2%	34.8%	6.1%	28.7%	1.2%	67.3%	32.7%	2.9%	29.8%		
	74	創傷の陰圧閉鎖療法の実施	9.1%	50.2%	49.8%	12.6%	37.3%	13.0%	57.4%	42.6%	11.1%	31.5%		
	75	表創（非感染創）の縫合：皮下組織まで（手術室外で）	1.0%	62.5%	37.5%	4.8%	32.7%	0.5%	72.9%	27.1%	1.3%	25.8%		
	76	非感染創の縫合：皮下組織から筋層まで（手術室外で）	1.1%	73.4%	26.6%	3.0%	23.6%	0.5%	85.7%	14.3%	0.9%	13.5%		
	77	医療用ホッチキスの使用（手術室外で）	1.4%	52.5%	47.5%	10.3%	37.2%	0.3%	69.3%	30.7%	3.5%	27.2%		
	78	体表面創の抜糸・抜鉤	1.8%	32.6%	67.4%	22.9%	44.5%	0.9%	47.0%	53.0%	11.8%	41.2%		
	79	動脈ライン確保	1.7%	58.0%	42.0%	5.0%	37.1%	0.7%	71.3%	28.7%	2.0%	26.7%		
	80	末梢静脈挿入式静脈カテーテル（PICC）挿入	3.3%	65.3%	34.7%	4.5%	30.2%	0.9%	84.9%	15.1%	1.3%	13.8%		
	81	中心静脈カテーテル挿入	0.9%	87.8%	12.2%	0.6%	11.6%	0.2%	93.9%	6.1%	0.1%	6.0%		
	82	中心静脈カテーテル抜去	3.0%	34.0%	66.0%	26.8%	39.3%	2.4%	57.6%	42.4%	10.7%	31.8%		
	83	膵管・胆管チューブの管理：洗浄	9.1%	48.0%	52.0%	17.2%	34.8%	6.6%	67.3%	32.7%	9.8%	22.8%		
	84	膵管・胆管チューブの入れ替え	1.2%	81.4%	18.6%	2.1%	16.5%	0.3%	95.8%	4.2%	0.3%	3.9%		
	85	腹腔穿刺（一時的なカテーテル留置を含む）	1.0%	86.2%	13.8%	1.1%	12.6%	0.2%	94.5%	5.5%	0.3%	5.2%		
	86	腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む）	2.7%	49.9%	50.1%	17.4%	32.6%	2.6%	68.8%	31.2%	8.6%	22.6%		
	87	胸腔穿刺	0.8%	89.2%	10.8%	0.9%	9.9%	0.1%	96.5%	3.5%	0.1%	3.4%		
	88	胸腔ドレーン抜去	1.7%	58.1%	41.9%	10.1%	31.8%	0.7%	79.3%	20.7%	3.1%	17.7%		
	89	胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更	13.1%	40.4%	59.6%	19.4%	40.2%	21.1%	53.3%	46.7%	20.5%	26.2%		
	90	心嚢ドレーン抜去	1.0%	64.1%	35.9%	8.2%	27.7%	0.3%	88.8%	11.2%	0.9%	10.2%		
	91	創部ドレーン抜去	1.3%	45.6%	54.4%	19.0%	35.4%	0.6%	66.1%	33.9%	7.8%	26.1%		
	92	創部ドレーン短切（カット）	2.1%	44.2%	55.8%	19.9%	35.9%	0.7%	64.3%	35.7%	8.7%	27.0%		
	93	「一時的ペースメーカー」の操作・管理	6.2%	52.2%	47.8%	8.3%	39.4%	10.7%	63.6%	36.4%	9.9%	26.5%		
	94	「一時的ペースメーカー」の抜去	0.7%	60.5%	39.5%	8.4%	31.1%	0.3%	83.8%	16.2%	1.6%	14.6%		
	95	PCPS等補助循環の管理・操作	2.7%	62.5%	37.5%	3.2%	34.4%	4.0%	77.6%	22.4%	3.4%	19.0%		
	96	大動脈バルーンパンピングチューブの抜去	0.7%	78.1%	21.9%	1.9%	20.0%	0.3%	93.1%	6.9%	0.5%	6.4%		
	97	小児のCT・MRI検査時の鎮静実施の決定	2.1%	67.4%	32.6%	8.1%	24.4%	1.1%	80.0%	20.0%	3.2%	16.9%		
	98	小児のCT・MRI検査時の鎮静の実施	11.6%	56.3%	43.7%	16.3%	27.3%	15.1%	70.4%	29.6%	14.4%	15.2%		
	99	小児の臍カテ：臍動脈の輸液路確保	1.1%	72.7%	27.3%	3.6%	23.8%	0.5%	92.0%	8.0%	0.2%	7.9%		
	100	幹細胞移植：接続と滴数調整	4.3%	60.4%	39.6%	9.3%	30.3%	5.2%	78.5%	21.5%	6.5%	15.0%		
	101	関節穿刺	1.0%	84.8%	15.2%	1.8%	13.4%	0.3%	93.6%	6.4%	0.4%	6.0%		
	102	導尿・留置カテーテルの挿入及び抜去の決定	28.3%	28.6%	71.4%	43.7%	27.7%	53.8%	16.6%	83.4%	65.5%	18.0%		
	103	導尿・留置カテーテルの挿入の実施	70.2%	8.0%	92.0%	74.7%	17.3%	86.5%	6.6%	93.4%	86.1%	7.3%		

【現在について】

・A（現在看護師が実施している）：すべての回答①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。）のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】（【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない）

・B（医師が実施すべき）：すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C（看護師が実施可能）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」のどちらかを選択した回答の割合

・D（看護師一般）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」を選択した回答の割合

・E（特定看護師（仮称））：すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」を選択した回答の割合

			医師回答					看護師回答						
			現在について	今後について				現在について	今後について					
				A	B	C	D		E	A	B	C	D	E
				医療処置項目	現在看護師が 実施している	医師が 実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が 実施している	医師が 実施すべき	看護師が実施可能		
計	看護師一般	特定看護師 (仮称)	計				看護師一般	特定看護師 (仮称)						
日常生活関係	104	飲水の開始・中止の決定	12.2%	37.4%	62.6%	28.2%	34.5%	18.2%	30.7%	69.3%	34.1%	35.2%		
	105	食事の開始・中止の決定	11.1%	39.8%	60.2%	26.0%	34.2%	17.3%	33.2%	66.8%	31.7%	35.1%		
	106	治療食(経腸栄養含む)内容の決定・変更	15.4%	32.1%	67.9%	25.9%	42.0%	16.2%	31.4%	68.6%	23.2%	45.4%		
	107	小児のミルクの種類・量・濃度の決定	14.4%	34.0%	66.0%	23.7%	42.3%	11.8%	40.0%	60.0%	18.4%	41.7%		
	108	小児の経口電解質液の開始と濃度、量の決定	7.0%	43.2%	56.8%	17.0%	39.8%	4.8%	53.9%	46.1%	9.4%	36.7%		
	109	腸ろうの管理、チューブの入れ替え	3.6%	53.3%	46.7%	10.5%	36.2%	2.0%	71.5%	28.5%	3.6%	24.9%		
	110	胃ろう、腸ろうのチューブ抜去	5.9%	37.8%	62.2%	21.3%	40.9%	2.9%	56.4%	43.6%	10.7%	32.9%		
	111	経管栄養用の胃管の挿入、入れ替え	23.9%	28.8%	71.2%	35.4%	35.8%	35.3%	30.9%	69.1%	43.4%	25.7%		
	112	胃ろうチューブ・ボタンの交換	5.3%	42.9%	57.1%	17.0%	40.1%	2.7%	62.2%	37.8%	8.1%	29.8%		
	113	膀胱ろうカテーテルの交換	8.1%	40.2%	59.8%	17.9%	42.0%	4.8%	66.1%	33.9%	7.7%	26.2%		
	114	安静度・活動や清潔の範囲の決定	23.4%	24.4%	75.6%	40.6%	35.0%	27.7%	22.6%	77.4%	46.9%	30.5%		
	115	隔離の開始と解除の判断	22.7%	28.3%	71.7%	36.3%	35.4%	25.0%	30.2%	69.8%	36.6%	33.2%		
	116	拘束の開始と解除の判断	41.9%	18.3%	81.7%	50.5%	31.1%	59.5%	16.1%	83.9%	62.3%	21.6%		
手術	117	全身麻酔の導入	0.8%	84.9%	15.1%	1.0%	14.1%	1.2%	90.6%	9.4%	1.0%	8.4%		
	118	術中の麻酔・呼吸・循環管理(麻酔深度の調節、薬剤・酸素投与濃度、輸血量等の調整)	2.1%	67.2%	32.8%	1.4%	31.4%	1.8%	85.5%	14.5%	1.3%	13.2%		
	119	麻酔の覚醒	0.8%	77.5%	22.5%	0.5%	22.0%	1.0%	86.2%	13.8%	1.1%	12.7%		
	120	局所麻酔(硬膜外・腰椎)	0.8%	85.7%	14.3%	0.8%	13.5%	0.5%	94.1%	5.9%	0.5%	5.4%		
	121	麻酔の補足説明:“麻酔医による患者とのリスク共有も含む説明”を補足する時間をかけた説明	11.8%	39.8%	60.2%	14.3%	45.9%	12.3%	62.7%	37.3%	11.9%	25.5%		
	122	神経ブロック	0.6%	91.2%	8.8%	0.8%	8.0%	0.3%	95.5%	4.5%	0.1%	4.4%		
	123	硬膜外チューブの抜去	1.7%	45.6%	54.4%	20.7%	33.8%	2.1%	66.4%	33.6%	8.5%	25.2%		
	124	皮膚表面の麻酔(注射)	0.6%	62.9%	37.1%	6.9%	30.2%	0.6%	75.6%	24.4%	2.7%	21.7%		
	125	手術執刀までの準備(体位、消毒)	25.6%	27.9%	72.1%	41.0%	31.1%	26.7%	41.3%	58.7%	33.6%	25.1%		
	126	手術時の臓器や手術器械の把持及び保持(手術の第一・第二助手)	10.8%	35.9%	64.1%	21.3%	42.8%	8.5%	64.0%	36.0%	11.3%	24.7%		
	127	手術時の臓器や手術器械の把持及び保持(気管切開等の小手術助手)	16.1%	25.1%	74.9%	30.7%	44.2%	13.6%	57.1%	42.9%	15.6%	27.3%		
	128	手術の補足説明:“術者による患者とのリスク共有も含む説明”を補足する時間をかけた説明	11.3%	35.2%	64.8%	20.5%	44.3%	12.7%	60.2%	39.8%	13.0%	26.8%		
	129	術前サマリーの作成	18.7%	36.4%	63.6%	26.2%	37.4%	14.5%	71.8%	28.2%	13.9%	14.4%		
130	手術サマリーの作成	12.4%	51.4%	48.6%	19.4%	29.2%	8.7%	79.8%	20.2%	8.6%	11.7%			
緊急時対応	131	血糖値に応じたインスリン投与量の判断	17.2%	35.3%	64.7%	24.7%	40.0%	22.2%	38.1%	61.9%	23.9%	38.0%		
	132	低血糖時のブドウ糖投与	66.1%	5.8%	94.2%	74.4%	19.8%	81.2%	5.1%	94.9%	83.1%	11.8%		
	133	脱水の判断と補正(点滴)	5.5%	43.6%	56.4%	18.1%	38.3%	11.0%	40.3%	59.7%	18.2%	41.5%		
	134	末梢血管静脈ルートの確保と輸液剤の投与	63.8%	7.4%	92.6%	72.2%	20.4%	77.1%	6.9%	93.1%	78.8%	14.3%		
	135	心肺停止患者への気道確保、マスク換気	40.5%	15.6%	84.4%	55.1%	29.3%	66.0%	13.5%	86.5%	68.0%	18.5%		
	136	心肺停止患者への電氣的除細動実施	18.9%	19.0%	81.0%	43.3%	37.7%	20.9%	29.6%	70.4%	34.9%	35.6%		
	137	血液透析・CHDFの操作、管理	12.1%	37.1%	62.9%	14.1%	48.8%	17.9%	45.9%	54.1%	15.3%	38.8%		
	138	救急時の輸液路確保目的の骨髄穿刺(小児)	1.3%	60.2%	39.8%	8.1%	31.7%	1.0%	82.6%	17.4%	2.6%	14.9%		
予防医療	139	予防接種の実施判断	4.1%	45.1%	54.9%	17.1%	37.8%	5.0%	61.0%	39.0%	9.2%	29.8%		
	140	予防接種の実施	40.3%	12.8%	87.2%	63.1%	24.1%	49.0%	24.1%	75.9%	57.9%	18.0%		
	141	特定健診などの健康診査の実施	19.2%	34.4%	65.6%	33.9%	31.7%	14.2%	52.3%	47.7%	17.9%	29.9%		
	142	子宮頸がん検診:細胞診のオーダー(一次スクリーニング)、検体採取	3.9%	35.3%	64.7%	18.2%	46.5%	0.8%	62.0%	38.0%	6.1%	31.9%		
	143	前立腺がん検診:触診・PSAオーダー(一次スクリーニング)	2.6%	47.5%	52.5%	16.6%	36.0%	0.7%	66.8%	33.2%	4.2%	29.0%		
	144	大腸がん検診:便潜血オーダー(一次スクリーニング)	9.0%	28.2%	71.8%	35.7%	36.1%	4.3%	49.6%	50.4%	16.6%	33.7%		
	145	乳がん検診:視診・触診(一次スクリーニング)	3.0%	47.3%	52.7%	13.2%	39.4%	1.1%	59.6%	40.4%	5.2%	35.2%		
(投与中薬剤の病態に応じた薬剤使用)	146	高脂血症用剤の選択・使用	6.2%	69.1%	30.9%	10.1%	20.8%	27.0%	55.5%	44.5%	28.7%	15.7%		
	147	降圧剤の選択・使用	10.4%	68.0%	32.0%	11.9%	20.1%	34.3%	53.1%	46.9%	32.3%	14.6%		
	148	糖尿病治療薬の選択・使用	8.5%	71.1%	28.9%	9.5%	19.4%	32.4%	52.9%	47.1%	30.6%	16.5%		
	149	排尿障害治療薬の選択・使用	6.1%	70.2%	29.8%	9.4%	20.5%	27.3%	57.6%	42.4%	27.9%	14.5%		
	150	子宮収縮抑制剤の選択・使用	5.8%	73.4%	26.6%	6.8%	19.8%	22.7%	64.7%	35.3%	21.3%	14.1%		
	151	K、Cl、Naの選択・使用	8.0%	68.5%	31.5%	10.5%	21.0%	28.5%	59.2%	40.8%	26.7%	14.2%		
	152	カテコラミンの選択・使用	11.0%	70.6%	29.4%	11.5%	17.9%	29.2%	61.1%	38.9%	26.5%	12.5%		
	153	利尿剤の選択・使用	12.4%	64.6%	35.4%	14.1%	21.4%	33.9%	53.9%	46.1%	32.3%	13.8%		
	154	基本的な輸液:高カロリー輸液	9.1%	57.8%	42.2%	12.4%	29.8%	31.7%	46.3%	53.7%	31.4%	22.3%		
	155	指示された期間内に薬がなくなった場合の継続薬剤(全般)の継続使用	19.2%	31.9%	68.1%	37.8%	30.3%	30.0%	36.4%	63.6%	37.2%	26.4%		

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき) :すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能) :すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般) :すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)) :すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

			医師回答					看護師回答						
			現在について	今後について				現在について	今後について					
				A	B	C	D		E	A	B	C	D	E
						看護師が実施可能			看護師が実施可能					
医療処置項目			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	計	看護師一般	特定看護師(仮称)	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	計	看護師一般	特定看護師(仮称)		
薬剤の選択・使用 (臨時薬)	156	下剤(坐薬も含む)の選択・使用	42.4%	22.1%	77.9%	56.6%	21.3%	63.1%	14.9%	85.1%	68.4%	16.7%		
	157	胃薬:制酸剤の選択・使用	19.7%	37.1%	62.9%	39.4%	23.5%	44.7%	26.3%	73.7%	54.1%	19.6%		
	158	胃薬:胃粘膜保護剤の選択・使用	20.7%	33.5%	66.5%	42.9%	23.7%	44.4%	26.1%	73.9%	54.2%	19.7%		
	159	整腸剤の選択・使用	23.5%	28.8%	71.2%	47.0%	24.2%	48.7%	21.0%	79.0%	59.6%	19.4%		
	160	制吐剤の選択・使用	30.6%	30.5%	69.5%	45.9%	23.6%	53.9%	21.7%	78.3%	59.1%	19.2%		
	161	止痢剤の選択・使用	26.2%	33.3%	66.7%	43.4%	23.3%	51.4%	22.1%	77.9%	58.6%	19.3%		
	162	鎮痛剤の選択・使用	34.9%	33.7%	66.3%	43.7%	22.6%	57.2%	22.5%	77.5%	57.4%	20.1%		
	163	解熱剤の選択・使用	37.1%	30.9%	69.1%	46.4%	22.7%	58.0%	22.2%	77.8%	59.4%	18.4%		
	164	去痰剤(小児)の選択・使用	16.4%	44.7%	55.3%	29.5%	25.8%	38.5%	42.6%	57.4%	38.9%	18.5%		
	165	抗けいれん薬(小児)の選択・使用	15.5%	57.5%	42.5%	20.5%	22.0%	36.7%	49.9%	50.1%	33.8%	16.3%		
	166	インフルエンザ薬の選択・使用	10.3%	54.3%	45.7%	20.7%	25.0%	30.2%	48.4%	51.6%	33.3%	18.3%		
	167	外用薬の選択・使用	37.0%	25.0%	75.0%	51.2%	23.8%	57.8%	17.7%	82.3%	61.6%	20.7%		
	168	創傷被覆材(ドレッシング材)の選択・使用	44.4%	19.6%	80.4%	50.6%	29.7%	73.4%	9.3%	90.7%	65.3%	25.4%		
	169	睡眠剤の選択・使用	31.8%	41.3%	58.7%	37.4%	21.4%	52.7%	30.8%	69.2%	50.8%	18.4%		
	170	抗精神病薬の選択・使用	15.3%	65.2%	34.8%	17.5%	17.3%	39.4%	50.0%	50.0%	35.4%	14.6%		
	171	抗不安薬の選択・使用	19.4%	58.1%	41.9%	22.6%	19.2%	41.2%	47.2%	52.8%	37.2%	15.6%		
	172	ネブライザーの開始、使用薬液の選択	26.8%	29.8%	70.2%	40.6%	29.6%	36.0%	26.0%	74.0%	45.1%	28.9%		
	173	感染徴候時の薬物(抗生剤等)の選択(全身投与・局所投与等)	4.8%	72.9%	27.1%	7.2%	20.0%	13.1%	67.8%	32.2%	12.1%	20.1%		
174	抗菌剤開始時期の決定、変更時期の決定	2.4%	76.3%	23.7%	4.4%	19.4%	7.1%	71.1%	28.9%	7.6%	21.3%			
175	基本的な輸液:糖質輸液、電解質輸液	9.9%	47.4%	52.6%	17.7%	34.9%	27.7%	40.2%	59.8%	28.8%	31.0%			
薬剤の選択・使用 (特殊な薬剤等)	176	血中濃度モニタリングに対応した抗不整脈剤の使用	3.2%	77.9%	22.1%	3.3%	18.7%	18.5%	69.4%	30.6%	13.3%	17.3%		
	177	化学療法副作用出現時の症状緩和の薬剤選択、処置	8.7%	57.5%	42.5%	8.1%	34.4%	27.9%	42.5%	57.5%	19.2%	38.3%		
	178	抗癌剤等の皮下漏出時のステロイド薬の選択、局所注射の実施	3.7%	57.7%	42.3%	7.2%	35.1%	8.2%	56.3%	43.7%	8.3%	35.4%		
	179	放射線治療による副作用出現時の外用薬の選択	5.0%	49.6%	50.4%	10.9%	39.5%	13.0%	41.9%	58.1%	14.1%	44.0%		
	180	副作用症状の確認による薬剤の中止、減量、変更の決定	3.3%	69.6%	30.4%	6.4%	24.0%	8.0%	63.1%	36.9%	8.2%	28.7%		
	181	家族計画(避妊)における低用量ピル	1.9%	53.2%	46.8%	6.8%	40.0%	4.4%	53.2%	46.8%	5.7%	41.1%		
	182	硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与(投与量の調整)	9.0%	50.7%	49.3%	14.5%	34.7%	18.8%	56.1%	43.9%	17.0%	26.9%		
	183	自己血糖測定開始の決定	8.7%	41.9%	58.1%	18.5%	39.6%	28.2%	25.0%	75.0%	37.4%	37.6%		
	184	痛みの強さや副作用症状に応じたオピオイドの投与量・用法調整、想定されたオピオイドローテーションの実施時期定:WHO方式がん疼痛治療法等	5.0%	49.3%	50.7%	7.2%	43.4%	11.1%	37.6%	62.4%	8.9%	53.5%		
	185	痛みの強さや副作用症状に応じた非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量・用法調整:WHO方式がん疼痛治療法等	6.0%	46.1%	53.9%	8.1%	45.8%	12.9%	35.5%	64.5%	9.9%	54.6%		
186	がんの転移、浸潤に伴う苦痛症状のための薬剤の選択と評価	4.6%	52.1%	47.9%	6.2%	41.7%	10.4%	39.5%	60.5%	7.8%	52.7%			
その他	187	訪問看護の必要性の判断、依頼	34.5%	13.8%	86.2%	47.3%	38.9%	66.4%	6.2%	93.8%	69.6%	24.2%		
	188	日々の病状、経過の補足説明(時間をかけた説明)	43.5%	17.0%	83.0%	49.7%	33.3%	59.0%	18.1%	81.9%	56.8%	25.0%		
	189	リハビリテーション(嚥下、呼吸、運動機能アップ等)の必要性の判断、依頼	16.5%	21.9%	78.1%	35.3%	42.8%	33.1%	15.4%	84.6%	45.2%	39.4%		
	190	整形外科領域の補助具の決定、注文	6.8%	42.5%	57.5%	16.0%	41.5%	7.4%	45.3%	54.7%	14.9%	39.9%		
	191	理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼	9.3%	23.5%	76.5%	32.4%	44.1%	15.1%	25.3%	74.7%	36.0%	38.7%		
	192	他科への診療依頼	3.7%	64.4%	35.6%	14.6%	21.0%	10.5%	56.8%	43.2%	17.9%	25.3%		
	193	他科・他院への診療情報提供書作成(紹介および返信)	2.0%	67.4%	32.6%	10.6%	22.1%	4.5%	73.4%	26.6%	7.4%	19.3%		
	194	在宅で終末期ケアを実施してきた患者の死亡確認	2.2%	60.4%	39.6%	13.4%	26.3%	4.0%	68.9%	31.1%	8.3%	22.8%		
	195	退院サマリー(病院全体)の作成	8.2%	56.0%	44.0%	18.1%	25.8%	30.2%	54.9%	45.1%	28.8%	16.3%		
	196	患者・家族・医療従事者教育	44.3%	15.0%	85.0%	44.5%	40.4%	78.8%	7.9%	92.1%	57.8%	34.2%		
	197	栄養士への食事指導依頼(既存の指示内容で)	22.7%	14.0%	86.0%	48.1%	37.9%	35.4%	13.2%	86.8%	56.9%	29.8%		
	198	他の介護サービスの実施可・不可の判断(リハビリ、血圧・体温など)	20.5%	24.3%	75.7%	42.6%	33.1%	45.2%	13.7%	86.3%	53.7%	32.7%		
	199	家族療法・カウンセリングの依頼	22.5%	16.2%	83.8%	41.1%	42.6%	31.5%	18.5%	81.5%	43.1%	38.4%		
	200	認知・行動療法の依頼	6.1%	31.4%	68.6%	28.1%	40.5%	13.7%	29.9%	70.1%	27.8%	42.3%		
	201	認知・行動療法の実施・評価	7.7%	38.1%	61.9%	21.2%	40.7%	10.5%	37.5%	62.5%	15.7%	46.8%		
	202	支持的精神療法の実施の決定	14.6%	30.8%	69.2%	27.3%	41.9%	14.7%	37.9%	62.1%	20.4%	41.8%		
	203	患者の入院と退院の判断	3.1%	78.0%	22.0%	6.2%	15.7%	4.7%	68.4%	31.6%	8.8%	22.8%		

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】(【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき) :すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能) :すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般) :すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)) :すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合