資料4-3

病床区分別回答状況： 1、20-199床 （n=621）

（医師169、看護師452）

	医療処置項目	医師回答					看護師回答				
		現在について	今後について				現在について	今後について			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
		現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
				計	看護師一般	特定看護師（仮称）			計	看護師一般	特定看護師（仮称）
検査	1 動脈ラインからの採血	75.3%	12.3%	87.7%	77.8%	9.9%	51.6%	20.6%	79.4%	64.7%	14.7%
	2 直接動脈穿刺による採血	8.3%	42.9%	57.1%	18.8%	38.3%	6.9%	53.6%	46.4%	12.2%	34.2%
	3 動脈ラインの抜去・圧迫止血	30.1%	15.7%	84.3%	56.6%	27.7%	28.8%	28.0%	72.0%	46.2%	25.8%
	4 トリアージのための検体検査の実施の決定	13.1%	41.4%	58.6%	23.2%	35.4%	8.1%	42.1%	57.9%	17.3%	40.6%
	5 トリアージのための検体検査結果の評価	3.0%	65.7%	34.3%	9.1%	25.3%	2.6%	66.2%	33.8%	5.7%	28.1%
	6 治療効果判定のための検体検査の実施の決定	9.0%	55.6%	44.4%	15.8%	28.6%	6.7%	61.4%	38.6%	12.0%	26.6%
	7 治療効果判定のための検体検査結果の評価	5.1%	75.9%	24.1%	5.1%	19.0%	2.7%	81.1%	18.9%	3.2%	15.7%
	8 手術前検査の実施の決定	11.5%	41.5%	58.5%	26.9%	31.5%	8.0%	54.5%	45.5%	18.9%	26.6%
	9 単純X線撮影の実施の決定	8.6%	41.7%	58.3%	21.6%	36.7%	8.6%	44.4%	55.6%	21.9%	33.7%
	10 単純X線撮影の画像評価	2.2%	82.7%	17.3%	2.9%	14.4%	2.2%	82.6%	17.4%	3.2%	14.1%
	11 CT、MRI検査の実施の決定	5.8%	59.1%	40.9%	17.5%	23.4%	5.6%	62.8%	37.2%	12.1%	25.1%
	12 CT、MRI検査の画像評価	0.0%	88.1%	11.9%	2.2%	9.6%	1.8%	89.5%	10.5%	1.7%	8.8%
	13 造影剤使用検査時の造影剤の投与	49.7%	18.4%	81.6%	81.2%	20.4%	62.9%	28.2%	71.8%	52.5%	19.3%
	14 IVR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施	5.2%	63.6%	36.4%	9.1%	27.3%	0.8%	71.3%	28.7%	5.3%	23.4%
	15 経腹部的膀胱超音波検査（残尿測定目的）の実施の決定	17.4%	46.5%	53.5%	27.9%	25.6%	16.0%	50.6%	49.4%	24.5%	24.8%
	16 経腹部的膀胱超音波検査（残尿測定目的）の実施	17.0%	29.8%	70.2%	28.7%	41.5%	19.7%	47.0%	53.0%	24.1%	28.9%
	17 腹部超音波検査の実施の決定	5.1%	54.0%	46.0%	16.1%	29.9%	4.2%	60.9%	39.1%	10.8%	28.3%
	18 腹部超音波検査の実施	0.0%	46.9%	53.1%	4.8%	48.3%	0.5%	60.2%	39.8%	3.4%	36.4%
	19 腹部超音波検査の結果の評価	0.0%	77.2%	22.8%	3.7%	19.1%	0.8%	83.9%	16.1%	1.6%	14.5%
	20 心臓超音波検査の実施の決定	4.5%	52.3%	47.7%	14.4%	33.3%	4.4%	64.3%	35.7%	8.9%	26.8%
	21 心臓超音波検査の実施	0.0%	47.5%	52.5%	5.7%	46.8%	1.1%	64.2%	35.8%	2.7%	33.1%
	22 心臓超音波検査の結果の評価	0.0%	80.6%	19.4%	1.6%	17.8%	0.9%	86.7%	13.3%	0.6%	12.7%
	23 頸動脈超音波検査の実施の決定	2.5%	47.1%	52.9%	14.3%	38.7%	2.6%	62.1%	37.9%	9.2%	28.7%
	24 表在超音波検査の実施の決定	2.4%	50.8%	49.2%	14.3%	34.9%	4.0%	62.4%	37.6%	8.9%	28.7%
	25 下肢血管超音波検査の実施の決定	4.4%	49.1%	50.9%	13.2%	37.7%	4.1%	60.5%	39.5%	8.3%	31.2%
	26 術後下肢動脈ドップラー検査の実施の決定	15.5%	42.7%	57.3%	25.2%	32.0%	16.3%	49.0%	51.0%	22.1%	28.9%
	27 12誘導心電図検査の実施の決定	35.8%	23.6%	76.4%	53.4%	23.0%	33.0%	25.7%	74.3%	52.7%	21.6%
	28 12誘導心電図検査の実施	67.9%	4.2%	95.8%	80.0%	15.8%	61.5%	7.7%	92.3%	78.8%	13.5%
	29 12誘導心電図検査の結果の評価	5.7%	56.4%	43.6%	15.7%	27.9%	7.4%	58.0%	42.0%	17.0%	25.0%
	30 感染症検査（インフルエンザ・ノロウィルス等）の実施の決定	17.0%	28.4%	71.6%	40.4%	31.2%	15.6%	32.8%	67.2%	39.3%	27.9%
	31 感染症検査（インフルエンザ・ノロウィルス等）の実施	53.0%	8.7%	91.3%	71.8%	19.5%	53.8%	17.1%	82.9%	65.2%	17.7%
	32 感染症検査（インフルエンザ・ノロウィルス等）の結果の評価	14.7%	44.1%	55.9%	32.2%	23.8%	10.8%	51.8%	48.2%	26.4%	21.7%
	33 薬剤感受性検査実施の決定	5.1%	46.0%	54.0%	28.5%	25.5%	6.1%	58.7%	41.3%	15.9%	25.5%
	34 真菌検査の実施の決定	7.2%	40.6%	59.4%	30.4%	29.0%	9.6%	46.4%	53.6%	25.5%	28.1%
	35 真菌検査の結果の評価	1.4%	54.0%	46.0%	20.9%	25.2%	3.9%	60.8%	39.2%	14.3%	24.9%
	36 微生物学検査実施の決定	5.0%	39.7%	60.3%	29.8%	30.5%	4.9%	55.4%	44.6%	17.2%	27.4%
	37 微生物学検査の実施：スワブ法	41.0%	21.5%	78.5%	61.1%	17.4%	40.7%	31.2%	68.8%	52.3%	16.5%
	38 薬物血中濃度検査(TDM)実施の決定	5.2%	47.4%	52.6%	27.4%	25.2%	4.4%	58.8%	41.2%	15.1%	26.1%
	39 スパイロメトリーの実施の決定	8.7%	40.9%	59.1%	33.1%	26.0%	6.8%	50.8%	49.2%	20.3%	28.8%
	40 直腸内圧測定・肛門内圧測定実施の決定	9.1%	63.6%	36.4%	9.1%	27.3%	1.6%	75.3%	24.7%	4.1%	20.5%
	41 直腸内圧測定・肛門内圧測定の実施	18.2%	63.6%	36.4%	18.2%	18.2%	0.0%	71.8%	28.2%	7.0%	21.1%
	42 膀胱内圧測定実施の決定	7.7%	69.2%	30.8%	7.7%	23.1%	1.4%	74.7%	25.3%	3.6%	21.7%
	43 膀胱内圧測定の実施	15.4%	69.2%	30.8%	15.4%	15.4%	5.3%	71.6%	28.4%	10.2%	18.2%
	44 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施の決定	6.7%	42.9%	57.1%	29.5%	27.6%	2.5%	59.6%	40.4%	14.6%	25.8%
	45 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施	10.3%	25.0%	75.0%	38.8%	36.2%	3.7%	46.1%	53.9%	20.6%	33.3%
	46 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の結果の評価	1.9%	58.5%	41.5%	18.9%	22.6%	0.8%	72.0%	28.0%	7.8%	20.2%
	47 骨密度検査の実施の決定	8.1%	42.3%	57.7%	27.0%	30.6%	4.5%	53.0%	47.0%	18.5%	28.5%
	48 骨密度検査の結果の評価	3.6%	58.6%	41.4%	17.1%	24.3%	0.7%	67.2%	32.8%	9.1%	23.7%
	49 嚥下造影の実施の決定	5.6%	47.2%	52.8%	14.6%	38.2%	5.0%	54.0%	46.0%	12.3%	33.7%
	50 嚥下内視鏡検査の実施の決定	6.8%	43.4%	56.6%	13.2%	43.4%	4.8%	58.1%	41.9%	12.1%	29.8%
	51 嚥下内視鏡検査の実施	2.9%	72.5%	27.5%	4.3%	23.2%	0.5%	77.0%	23.0%	1.9%	21.0%
	52 眼底検査の実施の決定	4.5%	49.4%	50.6%	15.7%	34.8%	4.1%	60.2%	39.8%	12.9%	26.9%
	53 眼底検査の実施	5.4%	51.1%	48.9%	14.1%	34.8%	8.8%	55.9%	44.1%	14.7%	29.4%
	54 眼底検査の結果の評価	1.1%	77.5%	22.5%	2.2%	20.2%	0.0%	82.3%	17.7%	2.8%	14.9%
	55 ACT(活性化凝固時間)の測定実施の決定	15.5%	42.7%	57.3%	31.8%	25.5%	7.4%	55.6%	44.4%	20.4%	24.0%

【現在について】

・A（現在看護師が実施している）：すべての回答①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。）のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】　（【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない）

・B（医師が実施すべき）：すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C（看護師が実施可能）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」のどちらかを選択した回答の割合

・D（看護師一般）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」を選択した回答の割合

・E（特定看護師（仮称））：すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」を選択した回答の割合

（医師169、看護師452）

		医師回答					看護師回答				
		現在について	今後について				現在について	今後について			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	医療処置項目	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
				計	看護師一般	特定看護師（仮称）			計	看護師一般	特定看護師（仮称）
呼吸器	56 酸素投与の開始、中止、投与量の調整の判断	43.0%	23.2%	76.8%	46.4%	30.5%	49.1%	18.7%	81.3%	49.8%	31.5%
	57 気管カニューレの選択・交換	16.8%	39.7%	60.3%	22.1%	38.2%	15.1%	43.7%	56.3%	18.1%	38.2%
	58 経皮的気管穿刺針（トラヘルパー等）の挿入	1.1%	66.3%	33.7%	4.2%	29.5%	0.4%	74.0%	26.0%	2.7%	23.4%
	59 挿管チューブの位置調節（深さの調整）	28.1%	30.2%	69.8%	28.8%	41.0%	10.9%	38.0%	62.0%	20.3%	41.8%
	60 経口・経鼻挿管の実施	5.3%	60.6%	39.4%	10.6%	28.8%	9.3%	57.8%	42.2%	8.1%	34.0%
	61 経口・経鼻挿管チューブの抜管	13.5%	45.1%	54.9%	18.0%	36.8%	11.1%	42.3%	57.7%	18.2%	39.5%
	62 人工呼吸器モードの設定・変更の判断・実施	17.7%	33.9%	66.1%	16.9%	49.2%	13.1%	41.1%	58.9%	12.6%	46.3%
	63 人工呼吸管理下の鎮静管理	25.4%	38.1%	61.9%	24.6%	37.3%	26.9%	43.7%	56.3%	22.9%	33.3%
	64 人工呼吸器装着中の患者のウイニングスケジュール作成と実施	7.4%	45.9%	54.1%	12.3%	41.8%	11.9%	39.8%	60.2%	11.5%	48.6%
	65 小児の人工呼吸器の選択：HFO対応か否か	3.2%	61.3%	38.7%	3.2%	35.5%	1.1%	78.7%	21.3%	0.8%	20.5%
	66 NPPV開始、中止、モード設定	8.9%	44.4%	55.6%	11.1%	44.4%	7.5%	52.0%	48.0%	8.5%	39.6%
処置・創傷処置	67 浣腸の実施の決定	57.0%	15.9%	84.1%	71.5%	12.6%	61.3%	15.0%	85.0%	74.0%	11.0%
	68 創部洗浄・消毒	67.9%	10.7%	89.3%	69.8%	19.5%	73.4%	11.3%	88.7%	73.1%	15.6%
	69 褥瘡の壊死組織のデブリードマン	9.0%	52.6%	47.4%	14.3%	33.1%	8.0%	44.8%	55.2%	13.2%	41.9%
	70 電気凝固メスによる止血（褥瘡部）	1.7%	60.2%	39.8%	8.5%	31.4%	0.0%	66.8%	33.2%	4.6%	28.6%
	71 巻爪処置（ニッパー、ワイヤーを用いた処置）	26.9%	30.3%	69.7%	41.2%	28.6%	21.3%	37.8%	62.2%	31.1%	31.1%
	72 胼胝・鶏眼処置（コーンカッター等用いた処置）	8.9%	31.7%	68.3%	34.7%	33.7%	16.8%	39.1%	60.9%	29.0%	31.9%
	73 皮下膿瘍の切開・排膿：皮下組織まで	0.8%	74.8%	25.2%	5.5%	19.7%	2.1%	72.4%	27.6%	4.5%	23.1%
	74 創傷の陰圧閉鎖療法の実施	12.0%	53.0%	47.0%	13.3%	33.7%	11.5%	59.8%	40.2%	11.3%	28.9%
	75 表創（非感染創）の縫合：皮下組織まで（手術室外で）	1.5%	71.2%	28.8%	3.0%	25.8%	0.6%	70.2%	29.8%	1.8%	28.1%
	76 非感染創の縫合：皮下組織から筋層まで（手術室外で）	1.6%	78.0%	22.0%	1.6%	20.5%	0.7%	82.5%	17.5%	1.4%	16.1%
	77 医療用ホッチキスの使用（手術室外で）	1.8%	52.3%	47.7%	13.5%	34.2%	0.7%	62.8%	37.2%	8.6%	28.6%
	78 体表面創の抜糸・抜鉤	0.0%	39.8%	60.2%	28.6%	31.6%	2.1%	44.5%	55.5%	21.0%	34.5%
	79 動脈ライン確保	2.5%	56.3%	43.8%	6.3%	37.5%	1.4%	70.6%	29.4%	2.2%	27.2%
	80 末梢静脈挿入式静脈カテーテル(PICC)挿入	6.8%	64.9%	35.1%	6.8%	28.4%	2.5%	79.4%	20.6%	3.9%	16.7%
	81 中心静脈カテーテル挿入	0.0%	87.6%	12.4%	0.0%	12.4%	0.3%	92.9%	7.1%	0.0%	7.1%
	82 中心静脈カテーテル抜去	6.0%	40.3%	59.7%	26.1%	33.6%	7.5%	51.1%	48.9%	18.8%	30.1%
	83 膀管・胆管チューブの管理：洗浄	9.1%	50.6%	49.4%	15.6%	33.8%	7.8%	63.2%	36.8%	13.5%	23.3%
	84 膀管・胆管チューブの入れ替え	1.3%	80.0%	20.0%	1.3%	18.7%	0.5%	92.4%	7.6%	0.7%	6.9%
	85 腹腔穿刺（一時的なカテーテル留置を含む）	0.0%	86.8%	13.2%	0.9%	12.3%	0.0%	92.7%	7.3%	0.5%	6.7%
	86 腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む）	1.9%	54.7%	45.3%	14.2%	31.1%	3.2%	63.6%	36.4%	11.9%	24.4%
	87 胸腔穿刺	0.0%	87.3%	12.7%	0.0%	12.7%	0.0%	94.4%	5.6%	0.0%	5.6%
	88 胸腔ドレーン抜去	0.9%	62.1%	37.9%	12.1%	25.9%	0.7%	73.8%	26.2%	6.1%	20.1%
	89 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更	12.8%	41.0%	59.0%	14.5%	44.4%	19.2%	53.6%	46.4%	17.0%	29.4%
	90 心嚢ドレーン抜去	1.6%	68.8%	31.3%	9.4%	21.9%	0.0%	83.5%	16.5%	4.0%	12.5%
	91 創部ドレーン抜去	0.8%	50.8%	49.2%	23.3%	25.8%	1.0%	59.1%	40.9%	15.5%	25.4%
	92 創部ドレーン短切（カット）	2.6%	51.3%	48.7%	22.6%	26.1%	0.4%	59.0%	41.0%	14.5%	26.5%
	93 「一時的ペースメーカー」の操作・管理	5.0%	48.3%	51.7%	5.0%	46.7%	11.8%	59.3%	40.7%	9.3%	31.5%
	94 「一時的ペースメーカー」の抜去	0.0%	50.9%	49.1%	12.3%	36.8%	0.0%	71.2%	28.8%	5.8%	23.1%
	95 PCPS等補助循環の管理・操作	0.0%	67.5%	32.5%	7.5%	25.0%	5.4%	70.2%	29.8%	6.1%	23.7%
	96 大動脈バルーンパンピングチューブの抜去	0.0%	73.8%	26.2%	2.4%	23.8%	0.0%	86.8%	13.2%	1.8%	11.4%
	97 小児のCT・MRI検査時の鎮静実施の決定	2.2%	60.9%	39.1%	8.7%	30.4%	3.3%	75.1%	24.9%	5.9%	18.9%
	98 小児のCT・MRI検査時の鎮静の実施	26.9%	42.3%	57.7%	26.9%	30.8%	17.5%	64.0%	36.0%	18.5%	17.4%
	99 小児の臍カテ：臍動脈の輸液路確保	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	66.7%	3.1%	72.7%	27.3%	2.3%	25.0%
	100 幹細胞移植：接続と滴数調整	6.7%	40.0%	60.0%	6.7%	53.3%	5.5%	71.4%	28.6%	4.3%	24.3%
	101 関節穿刺	0.0%	83.7%	16.3%	0.0%	16.3%	0.4%	91.2%	8.8%	0.5%	8.2%
	102 導尿・留置カテーテルの挿入及び抜去の決定	45.7%	28.6%	71.4%	53.6%	17.9%	62.3%	19.5%	80.5%	65.7%	14.8%
	103 導尿・留置カテーテルの挿入の実施	87.7%	5.2%	94.8%	83.2%	11.6%	92.2%	5.9%	94.1%	87.7%	6.4%

【現在について】

・A（現在看護師が実施している）：すべての回答（①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。）のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】　（【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない）

・B（医師が実施すべき）：すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C（看護師が実施可能）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」又は「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」のどちらかを選択した回答の割合

・D（看護師一般）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」を選択した回答の割合

・E（特定看護師（仮称））：すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」を選択した回答の割合

（医師169、看護師452）

		医師回答					看護師回答				
		現在について	今後について				現在について	今後について			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	医療処置項目	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
				II	看護師一般	特定看護師（仮称）			II	看護師一般	特定看護師（仮称）
日常生活関係	104 飲水の開始・中止の決定	12.3%	39.9%	60.1%	34.8%	25.4%	19.8%	34.9%	65.1%	35.1%	29.9%
	105 食事の開始・中止の決定	13.1%	42.3%	57.7%	31.4%	26.3%	17.0%	38.3%	61.7%	32.1%	29.5%
	106 治療食（経腸栄養含む）内容の決定・変更	15.4%	33.1%	66.9%	30.1%	36.8%	15.8%	33.9%	66.1%	26.8%	39.3%
	107 小児のミルクの種類・量・濃度の決定	14.3%	35.7%	64.3%	28.6%	35.7%	14.6%	49.6%	50.4%	18.8%	31.6%
	108 小児の経口電解質液の開始と濃度、量の決定	6.7%	43.3%	56.7%	23.3%	33.3%	2.3%	59.0%	41.0%	12.0%	29.1%
	109 腸ろうの管理、チューブの入れ替え	2.9%	59.2%	40.8%	9.7%	31.1%	2.3%	68.6%	31.4%	5.8%	25.6%
	110 胃ろう、腸ろうのチューブ抜去	5.9%	42.9%	57.1%	23.5%	33.6%	3.5%	54.3%	45.7%	15.1%	30.6%
	111 経管栄養用の胃管の挿入、入れ替え	47.2%	26.4%	73.6%	46.5%	27.1%	55.4%	26.8%	73.2%	52.8%	20.5%
	112 胃ろうチューブ・ボタンの交換	4.8%	52.8%	47.2%	15.2%	32.0%	4.4%	63.3%	36.7%	9.3%	27.4%
	113 膀胱ろうカテーテルの交換	14.1%	44.7%	55.3%	17.6%	37.6%	6.0%	62.6%	37.4%	10.4%	27.0%
	114 安静度・活動や清潔の範囲の決定	32.6%	23.6%	76.4%	46.5%	29.9%	28.8%	24.3%	75.7%	50.5%	25.2%
	115 隔離の開始と解除の判断	24.3%	34.6%	65.4%	37.5%	27.9%	22.1%	35.7%	64.3%	37.4%	26.9%
	116 拘束の開始と解除の判断	58.9%	21.2%	78.8%	58.2%	20.5%	63.3%	18.8%	81.2%	64.9%	16.2%
手術	117 全身麻酔の導入	1.3%	80.0%	20.0%	1.3%	18.8%	2.1%	84.8%	15.2%	1.3%	13.9%
	118 術中の麻酔・呼吸・循環管理（麻酔深度の調節、薬剤・酸素投与濃度、輸液量等の調整）	3.6%	66.3%	33.7%	1.2%	32.5%	5.4%	74.1%	25.9%	1.3%	24.6%
	119 麻酔の覚醒	0.0%	81.3%	18.8%	0.0%	18.8%	2.1%	81.4%	18.6%	1.3%	17.3%
	120 局所麻酔（硬膜外・腰椎）	1.2%	86.4%	13.6%	0.0%	13.6%	1.3%	91.8%	8.2%	0.9%	7.3%
	121 麻酔の補足説明："麻酔医による患者とのリスク共有も含む説明"を補足する時間をかけた説明	15.9%	39.0%	61.0%	18.3%	42.7%	19.5%	50.8%	49.2%	16.9%	32.2%
	122 神経ブロック	0.0%	92.1%	7.9%	0.0%	7.9%	0.0%	95.1%	4.9%	0.3%	4.6%
	123 硬膜外チューブの抜去	3.0%	47.5%	52.5%	23.8%	28.7%	3.0%	61.3%	38.7%	14.5%	24.2%
	124 皮膚表面の麻酔（注射）	0.0%	65.6%	34.4%	9.4%	25.0%	0.6%	74.4%	25.6%	3.8%	21.7%
	125 手術執刀までの準備（体位、消毒）	39.3%	28.1%	71.9%	48.3%	23.6%	34.4%	34.1%	65.9%	41.5%	24.4%
	126 手術時の臓器や手術器械の把持及び保持（手術の第一・第二助手）	31.0%	27.6%	72.4%	32.2%	40.2%	26.7%	40.5%	59.5%	27.8%	31.6%
	127 手術時の臓器や手術器械の把持及び保持（気管切開等の小手術助手）	44.4%	15.6%	84.4%	46.7%	37.8%	37.5%	32.6%	67.4%	35.1%	32.2%
	128 手術の補足説明："術者による患者とのリスク共有も含む説明"を補足する時間をかけた説明	17.4%	38.4%	61.6%	26.7%	34.9%	20.6%	46.5%	53.5%	23.2%	30.3%
	129 術前サマリーの作成	30.5%	29.3%	70.7%	37.8%	32.9%	25.8%	45.7%	54.3%	27.6%	26.7%
	130 手術サマリーの作成	17.9%	47.6%	52.4%	28.6%	23.8%	14.5%	60.5%	39.5%	18.1%	21.4%
緊急時対応	131 血糖値に応じたインスリン投与量の判断	21.4%	41.4%	58.6%	27.9%	30.7%	20.9%	43.1%	56.9%	23.8%	33.1%
	132 低血糖時のブドウ糖投与	70.6%	9.2%	90.8%	77.8%	13.1%	78.3%	6.8%	93.2%	82.2%	11.0%
	133 脱水の判断と補正（点滴）	8.1%	45.9%	54.1%	23.7%	30.4%	14.2%	41.2%	58.8%	22.0%	36.8%
	134 末梢血管静脈ルートの確保と輸液剤の投与	81.1%	7.5%	92.5%	80.5%	11.9%	85.7%	6.2%	93.8%	84.1%	9.7%
	135 心肺停止患者への気道確保、マスク換気	46.1%	24.3%	75.7%	53.9%	21.7%	62.1%	20.1%	79.9%	62.6%	17.4%
	136 心肺停止患者への電気的除細動実施	17.1%	29.3%	70.7%	37.1%	33.6%	12.5%	33.3%	66.7%	30.4%	36.2%
	137 血液透析・CHDFの操作、管理	12.2%	38.9%	61.1%	14.4%	46.7%	21.5%	37.1%	62.9%	17.1%	45.8%
	138 救急時の輸液路確保目的の骨髄穿刺（小児）	4.8%	57.1%	42.9%	4.8%	38.1%	0.0%	78.0%	22.0%	3.4%	18.6%
予防医療	139 予防接種の実施判断	2.1%	51.1%	48.9%	17.0%	31.9%	9.0%	60.4%	39.6%	14.9%	24.7%
	140 予防接種の実施	53.8%	11.5%	88.5%	71.2%	17.3%	61.9%	20.2%	79.8%	64.9%	14.9%
	141 特定健診などの健康診査の実施	13.3%	46.7%	53.3%	22.2%	31.1%	27.7%	44.0%	56.0%	29.4%	26.6%
	142 子宮頸がん検診：細胞診のオーダ（一次スクリーニング）、検体採取	0.0%	50.0%	50.0%	21.4%	28.6%	3.4%	66.3%	33.7%	5.9%	27.7%
	143 前立腺がん検診：触診・PSAオーダ（一次スクリーニング）	4.3%	69.6%	30.4%	13.0%	17.4%	3.3%	70.5%	29.5%	7.5%	21.9%
	144 大腸がん検診：便潜血オーダ（一次スクリーニング）	11.9%	45.2%	54.8%	28.6%	26.2%	12.5%	46.5%	53.5%	28.2%	25.2%
	145 乳がん検診：視診・触診（一次スクリーニング）	0.0%	75.0%	25.0%	8.3%	16.7%	0.9%	71.1%	28.9%	5.2%	23.7%
薬剤の選択・使用（投与中薬剤の病態に応じた薬剤使用）	146 高脂血症用剤の選択・使用	6.8%	73.7%	26.3%	11.3%	15.0%	24.9%	61.3%	38.7%	24.5%	14.2%
	147 降圧剤の選択・使用	13.7%	71.2%	28.8%	13.7%	15.1%	34.9%	56.1%	43.9%	29.4%	14.5%
	148 糖尿病治療薬の選択・使用	11.2%	75.4%	24.6%	11.2%	13.4%	31.2%	58.3%	41.7%	26.5%	15.2%
	149 排尿障害治療薬の選択・使用	6.8%	73.5%	26.5%	10.6%	15.9%	25.4%	61.6%	38.4%	23.8%	14.6%
	150 子宮収縮抑制剤の選択・使用	4.1%	78.4%	21.6%	6.8%	14.9%	20.3%	72.4%	27.6%	16.3%	11.4%
	151 K、Cl、Naの選択・使用	11.1%	70.4%	29.6%	14.8%	14.8%	27.0%	61.9%	38.1%	23.8%	14.4%
	152 カテコラミンの選択・使用	13.7%	69.8%	30.2%	12.9%	17.3%	28.2%	63.0%	37.0%	23.5%	13.5%
	153 利尿剤の選択・使用	12.9%	69.1%	30.9%	14.4%	16.5%	33.4%	56.6%	43.4%	29.5%	14.0%
	154 基本的な輸液：高カロリー輸液	11.0%	62.5%	37.5%	14.7%	22.8%	29.3%	52.9%	47.1%	26.7%	20.4%
	155 指示された期間内に薬がなくなった場合の継続薬剤（全般）の継続使用	29.0%	35.2%	64.8%	38.6%	26.2%	31.3%	37.4%	62.6%	40.1%	22.5%

【現在について】

・A（現在看護師が実施している）：すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】　（【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない）

・B（医師が実施すべき）：すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C（看護師が実施可能）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」⑥「看護師の実施が可能 特定看護師（仮称）」のどちらかを選択した回答の割合

・D（看護師一般）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」を選択した回答の割合

・E（特定看護師（仮称））：すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」を選択した回答の割合

（医師169、看護師452）

		医療処置項目	医師回答					看護師回答				
			現在について	今後について				現在について	今後について			
			A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
					計	看護師一般	特定看護師（仮称）			計	看護師一般	特定看護師（仮称）
薬剤の選択・使用（臨時薬）	156	下剤(坐薬も含む)の選択・使用	61.3%	20.0%	80.0%	65.3%	14.7%	68.6%	16.9%	83.1%	69.7%	13.4%
	157	胃薬:制酸剤の選択・使用	27.1%	34.7%	65.3%	47.2%	18.1%	47.1%	30.7%	69.3%	54.0%	15.3%
	158	胃薬:胃粘膜保護剤の選択・使用	27.8%	33.3%	66.7%	47.9%	18.8%	46.7%	30.4%	69.6%	54.3%	15.3%
	159	整腸剤の選択・使用	29.7%	31.7%	68.3%	52.4%	15.9%	49.4%	26.3%	73.7%	58.0%	15.7%
	160	制吐剤の選択・使用	37.2%	29.7%	70.3%	53.8%	16.6%	53.5%	26.0%	74.0%	57.8%	16.3%
	161	止痢剤の選択・使用	34.7%	32.0%	68.0%	50.3%	17.7%	52.8%	27.2%	72.8%	56.7%	16.1%
	162	鎮痛剤の選択・使用	45.6%	31.5%	68.5%	51.7%	16.8%	58.6%	27.8%	72.2%	58.0%	14.2%
	163	解熱剤の選択・使用	49.0%	27.8%	72.2%	53.0%	19.2%	60.8%	26.6%	73.4%	59.2%	14.2%
	164	去痰剤(小児)の選択・使用	20.6%	41.3%	58.7%	33.3%	25.4%	36.9%	46.3%	53.7%	33.9%	19.8%
	165	抗けいれん薬(小児)の選択・使用	17.7%	53.2%	46.8%	25.8%	21.0%	35.9%	56.4%	43.6%	28.0%	15.6%
	166	インフルエンザ薬の選択・使用	9.6%	57.8%	42.2%	22.2%	20.0%	29.7%	51.1%	48.9%	32.1%	16.8%
	167	外用薬の選択・使用	47.7%	21.5%	78.5%	60.4%	18.1%	62.4%	20.3%	79.7%	64.8%	14.8%
	168	創傷被覆材(ドレッシング材)の選択・使用	58.9%	16.4%	83.6%	61.6%	21.9%	70.2%	13.2%	86.8%	65.7%	21.1%
	169	睡眠剤の選択・使用	41.4%	32.4%	67.6%	51.7%	15.9%	54.7%	32.7%	67.3%	53.5%	13.8%
	170	抗精神病薬の選択・使用	19.0%	59.1%	40.9%	23.4%	17.5%	39.6%	52.8%	47.2%	33.7%	13.5%
	171	抗不安薬の選択・使用	26.6%	54.0%	46.0%	29.5%	16.5%	43.0%	48.9%	51.1%	37.3%	13.8%
	172	ネブライザーの開始、使用薬液の選択	37.8%	29.1%	70.9%	50.0%	20.9%	40.7%	28.5%	71.5%	49.1%	22.3%
	173	感染徴候時の薬物(抗生剤等)の選択(全身投与、局所投与等)	5.2%	71.9%	28.1%	7.4%	20.7%	15.2%	65.1%	34.9%	13.3%	21.7%
	174	抗菌剤開始時期の決定、変更時期の決定	3.7%	75.6%	24.4%	4.4%	20.0%	6.7%	69.7%	30.3%	8.7%	21.5%
	175	基本的な輸液:糖質輸液、電解質輸液	10.9%	55.8%	44.2%	20.3%	23.9%	28.5%	47.2%	52.8%	27.9%	25.0%
薬剤の選択・使用（特殊な薬剤等）	176	血中濃度モニタリングに対応した抗不整脈剤の使用	3.3%	75.6%	24.4%	0.8%	23.6%	22.5%	70.2%	29.8%	12.1%	17.8%
	177	化学療法副作用出現時の症状緩和の薬剤選択、処置	8.3%	58.3%	41.7%	5.6%	36.1%	23.1%	56.8%	43.2%	12.3%	30.8%
	178	抗癌剤等の皮下漏出時のステロイド薬の選択、局所注射の実施	2.2%	65.6%	34.4%	4.3%	30.1%	8.8%	65.1%	34.9%	6.4%	28.5%
	179	放射線治療による副作用出現時の外用薬の選択	4.4%	57.4%	42.6%	7.4%	35.3%	8.9%	61.1%	38.9%	8.4%	30.5%
	180	副作用症状の確認による薬剤の中止、減量、変更の決定	2.3%	67.9%	32.1%	3.1%	29.0%	9.8%	67.8%	32.2%	7.2%	25.1%
	181	家族計画(避妊)における低用量ピル	0.0%	80.0%	20.0%	0.0%	20.0%	9.3%	59.4%	40.6%	6.3%	34.4%
	182	硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与(投与量の調整)	9.8%	48.0%	52.0%	14.7%	37.3%	23.7%	54.9%	45.1%	18.6%	26.5%
	183	自己血糖測定開始の決定	13.2%	45.7%	54.3%	15.5%	38.8%	29.6%	34.6%	65.4%	31.8%	33.6%
	184	痛みの強さや副作用症状に応じたオピオイドの投与量・用法調整、想定されたオピオイドローテーションの実施時期定:WHO方式がん疼痛治療法等	4.4%	50.9%	49.1%	4.4%	44.7%	6.6%	52.3%	47.7%	4.9%	42.7%
	185	痛みの強さや副作用症状に応じた非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量・用法調整:WHO方式がん疼痛治療法等	4.4%	47.4%	52.6%	5.3%	47.4%	8.2%	50.6%	49.4%	6.6%	42.7%
	186	がんの転移、浸潤に伴う苦痛症状のための薬剤の選択と評価	3.7%	56.9%	43.1%	6.4%	36.7%	3.8%	54.8%	45.3%	6.0%	39.3%
その他	187	訪問看護の必要性の判断、依頼	36.7%	17.5%	82.5%	45.8%	36.7%	54.8%	12.7%	87.3%	58.5%	28.8%
	188	日々の病状、経過の補足説明(時間をかけた説明)	40.3%	23.6%	76.4%	42.4%	34.0%	56.4%	19.7%	80.3%	52.6%	27.6%
	189	リハビリテーション(嚥下、呼吸、運動機能アップ等)の必要性の判断、依頼	16.4%	29.3%	70.7%	27.1%	43.6%	31.1%	24.3%	75.7%	39.4%	36.3%
	190	整形外科領域の補助具の決定、注文	7.1%	54.8%	45.2%	11.9%	33.3%	4.2%	56.5%	43.5%	9.7%	33.8%
	191	理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼	12.6%	30.7%	69.3%	28.3%	40.9%	17.5%	32.8%	67.2%	33.3%	33.9%
	192	他科への診療依頼	7.5%	60.9%	39.1%	14.3%	24.8%	16.4%	58.9%	41.1%	20.4%	20.6%
	193	他科・他院への診療情報提供書作成(紹介および返信)	1.5%	60.2%	39.8%	12.0%	27.8%	5.0%	70.9%	29.1%	8.6%	20.6%
	194	在宅で終末期ケアを実施してきた患者の死亡確認	0.0%	70.0%	30.0%	7.5%	22.5%	2.0%	77.6%	22.4%	2.1%	20.3%
	195	退院サマリー(病院全体)の作成	14.6%	43.8%	56.2%	23.4%	32.8%	37.0%	45.1%	54.9%	32.7%	22.2%
	196	患者・家族・医療従事者教育	46.1%	23.7%	76.3%	43.4%	32.9%	72.7%	15.0%	85.0%	51.2%	33.9%
	197	栄養士への食事指導依頼(既存の指示内容で)	29.2%	18.8%	81.3%	44.4%	36.8%	37.1%	18.9%	81.1%	52.0%	29.1%
	198	他の介護サービスの実施可・不可の判断(リハビリ、血圧・体温など)	17.0%	31.9%	68.1%	36.2%	31.9%	48.1%	18.6%	81.4%	50.4%	30.9%
	199	家族療法・カウンセリングの依頼	29.1%	22.3%	77.7%	34.0%	43.7%	37.4%	22.9%	77.1%	45.1%	32.0%
	200	認知・行動療法の依頼	9.7%	38.7%	61.3%	22.6%	38.7%	15.3%	36.4%	63.6%	27.9%	35.7%
	201	認知・行動療法の実施・評価	13.3%	43.3%	56.7%	23.3%	33.3%	17.0%	40.4%	59.6%	24.3%	35.3%
	202	支持的精神療法の実施の決定	21.4%	35.7%	64.3%	28.6%	35.7%	21.9%	37.7%	62.3%	24.2%	38.1%
	203	患者の入院と退院の判断	4.4%	76.3%	23.7%	6.7%	17.0%	5.1%	68.7%	31.3%	7.4%	23.9%

【現在について】

・A（現在看護師が実施している）：すべての回答①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。）のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】　（【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない）

・B（医師が実施すべき）：すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C（看護師が実施可能）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」のどちらかを選択した回答の割合

・D（看護師一般）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」を選択した回答の割合

・E（特定看護師（仮称））：すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」を選択した回答の割合

病床区分別回答状況：2. 200-499床 (n=1,976)

(医師606、看護師1,370)

	医療処置項目	医師回答					看護師回答				
		現在について	今後について				現在について	今後について			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
		現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
				計	看護師一般	特定看護師(仮称)			計	看護師一般	特定看護師(仮称)
検査	1 動脈ラインからの採血	59.9%	6.6%	93.4%	75.7%	17.7%	48.8%	23.3%	76.7%	56.1%	20.6%
	2 直接動脈穿刺による採血	2.9%	35.1%	64.9%	15.4%	49.5%	2.1%	59.9%	40.1%	6.3%	33.8%
	3 動脈ラインの抜去・圧迫止血	39.5%	14.5%	85.5%	59.0%	26.5%	31.3%	31.4%	68.6%	42.0%	26.6%
	4 トリアージのための検体検査の実施の決定	6.2%	34.4%	65.6%	21.9%	43.7%	6.8%	43.8%	56.2%	12.1%	44.1%
	5 トリアージのための検体検査結果の評価	3.6%	58.6%	41.4%	12.5%	28.9%	3.9%	65.5%	34.5%	5.1%	29.4%
	6 治療効果判定のための検体検査の実施の決定	3.3%	59.9%	40.1%	9.8%	30.4%	3.7%	69.0%	31.0%	5.8%	25.2%
	7 治療効果判定のための検体検査結果の評価	3.3%	77.8%	22.2%	4.5%	17.7%	2.3%	82.5%	17.5%	2.8%	14.7%
	8 手術前検査の実施の決定	5.2%	51.2%	48.8%	17.1%	31.6%	6.1%	60.0%	40.0%	12.2%	27.8%
	9 単純X線撮影の実施の決定	3.8%	47.8%	52.2%	18.4%	33.8%	3.0%	52.4%	47.6%	11.3%	36.4%
	10 単純X線撮影の画像評価	2.0%	77.1%	22.9%	4.3%	18.6%	1.1%	80.9%	19.1%	2.7%	16.4%
	11 CT、MRI検査の実施の決定	1.2%	68.8%	31.2%	7.2%	24.0%	2.5%	73.9%	26.1%	4.4%	21.7%
	12 CT、MRI検査の画像評価	2.1%	88.3%	11.7%	2.9%	8.8%	0.5%	90.9%	9.1%	1.3%	7.8%
	13 造影剤使用検査時の造影剤の投与	43.4%	15.7%	84.3%	60.2%	24.1%	44.5%	37.6%	62.4%	40.2%	22.2%
	14 IVR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施	2.2%	65.6%	34.4%	5.9%	28.5%	1.2%	84.1%	15.9%	3.0%	13.0%
	15 経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施の決定	16.3%	35.3%	64.8%	35.0%	29.8%	12.2%	52.8%	47.2%	19.1%	28.1%
	16 経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施	20.0%	31.6%	68.4%	33.3%	35.0%	18.1%	48.5%	51.5%	22.8%	28.7%
	17 腹部超音波検査の実施の決定	1.3%	58.0%	42.0%	12.0%	30.0%	1.8%	69.7%	30.3%	4.9%	25.5%
	18 腹部超音波検査の実施	0.6%	50.9%	49.1%	5.4%	43.7%	0.1%	67.6%	32.4%	2.2%	30.2%
	19 腹部超音波検査の結果の評価	0.4%	76.4%	23.6%	3.5%	20.2%	0.4%	88.4%	11.6%	0.7%	10.9%
	20 心臓超音波検査の実施の決定	1.1%	60.8%	39.2%	9.3%	30.0%	1.3%	74.0%	26.0%	3.9%	22.1%
	21 心臓超音波検査の実施	0.4%	52.5%	47.5%	3.1%	44.4%	0.2%	72.2%	27.8%	1.6%	26.2%
	22 心臓超音波検査の結果の評価	0.6%	78.6%	21.4%	2.3%	19.1%	0.4%	90.4%	9.6%	0.6%	9.0%
	23 頸動脈超音波検査の実施の決定	0.7%	58.7%	41.3%	9.9%	31.4%	1.1%	74.9%	25.1%	3.4%	21.7%
	24 表在超音波検査の実施の決定	0.6%	54.4%	45.6%	10.4%	35.2%	1.3%	73.2%	26.8%	3.3%	23.5%
	25 下肢血管超音波検査の実施の決定	1.6%	51.9%	48.1%	11.9%	36.3%	1.7%	71.2%	28.8%	4.7%	24.1%
	26 術後下肢動脈ドップラー検査の実施の決定	8.1%	45.7%	54.3%	20.4%	33.9%	12.0%	59.2%	40.8%	15.1%	25.7%
	27 12誘導心電図検査の実施の決定	29.3%	22.7%	77.3%	52.8%	24.6%	33.8%	27.5%	72.5%	47.8%	24.6%
	28 12誘導心電図検査の実施	63.0%	4.3%	95.7%	80.6%	15.1%	62.7%	8.8%	91.2%	77.1%	14.1%
	29 12誘導心電図検査の結果の評価	7.3%	52.8%	47.2%	15.4%	31.8%	9.2%	57.5%	42.5%	17.0%	25.5%
	30 感染症検査(インフルエンザ・ノロウィルス等)の実施の決定	12.3%	27.3%	72.7%	39.9%	32.8%	10.4%	35.5%	64.5%	32.8%	31.7%
	31 感染症検査(インフルエンザ・ノロウィルス等)の実施	48.4%	12.2%	87.8%	66.4%	21.4%	56.1%	17.1%	82.9%	63.8%	19.0%
	32 感染症検査(インフルエンザ・ノロウィルス等)の結果の評価	10.1%	40.3%	59.7%	31.9%	27.8%	7.4%	55.7%	44.3%	21.3%	23.0%
	33 薬剤感受性検査実施の決定	2.9%	49.7%	50.3%	18.5%	31.8%	3.5%	66.1%	33.9%	7.2%	26.7%
	34 真菌検査の実施の決定	2.7%	44.2%	55.8%	21.4%	34.4%	5.1%	57.7%	42.3%	13.4%	28.9%
	35 真菌検査の結果の評価	1.6%	61.6%	38.4%	11.3%	27.0%	1.5%	74.9%	25.1%	6.2%	18.9%
	36 微生物学検査実施の決定	5.1%	44.0%	56.0%	21.8%	34.2%	3.4%	66.4%	33.6%	8.9%	24.7%
	37 微生物学検査の実施：スワブ法	48.3%	16.3%	83.7%	62.5%	21.2%	41.5%	35.9%	64.1%	48.3%	15.8%
	38 薬物血中濃度検査(TDM)実施の決定	1.7%	48.5%	51.5%	15.2%	36.3%	3.0%	70.5%	29.5%	5.6%	23.9%
	39 スパイロメトリーの実施の決定	2.2%	49.0%	51.0%	18.7%	32.3%	2.3%	64.3%	35.7%	9.0%	26.6%
	40 直腸内圧測定・肛門内圧測定実施の決定	1.0%	61.2%	38.8%	13.3%	25.5%	2.0%	79.8%	20.2%	3.3%	16.9%
	41 直腸内圧測定・肛門内圧測定の実施	2.9%	53.9%	46.1%	15.7%	30.4%	2.3%	73.1%	26.9%	7.3%	19.6%
	42 膀胱内圧測定実施の決定	0.9%	64.5%	35.5%	13.1%	22.4%	1.7%	77.2%	22.8%	5.1%	17.7%
	43 膀胱内圧測定の実施	2.8%	58.9%	41.1%	14.0%	27.1%	5.0%	72.5%	27.5%	8.8%	18.7%
	44 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施の決定	2.0%	54.6%	45.4%	14.1%	31.4%	1.7%	73.5%	26.5%	4.2%	22.3%
	45 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施	3.4%	39.8%	60.2%	22.1%	38.0%	1.3%	68.0%	32.0%	4.9%	27.1%
	46 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の結果の評価	0.7%	67.2%	32.8%	7.5%	25.3%	0.4%	84.8%	15.2%	1.6%	13.6%
	47 骨密度検査の実施の決定	0.7%	47.5%	52.5%	18.2%	34.3%	1.5%	61.7%	38.3%	10.6%	27.7%
	48 骨密度検査の結果の評価	0.7%	60.7%	39.3%	9.6%	29.7%	0.6%	75.4%	24.6%	4.7%	19.9%
	49 嚥下造影の実施の決定	2.0%	54.2%	45.8%	12.8%	33.0%	2.5%	56.4%	43.6%	8.0%	35.6%
	50 嚥下内視鏡検査の実施の決定	1.7%	61.0%	39.0%	9.1%	29.9%	1.4%	63.9%	36.1%	5.4%	30.7%
	51 嚥下内視鏡検査の実施	0.6%	77.6%	22.4%	3.5%	18.9%	0.4%	82.7%	17.3%	1.4%	15.9%
	52 眼底検査の実施の決定	0.7%	57.2%	42.8%	10.6%	32.2%	1.9%	71.0%	29.0%	5.1%	23.9%
	53 眼底検査の実施	2.9%	60.4%	39.6%	9.6%	30.0%	6.1%	68.3%	31.7%	8.5%	23.2%
	54 眼底検査の結果の評価	0.7%	81.4%	18.6%	3.0%	15.6%	0.4%	87.4%	12.6%	1.4%	11.2%
	55 ACT(活性化凝固時間)の測定実施の決定	7.3%	40.8%	59.2%	23.6%	35.6%	4.8%	65.1%	34.9%	10.6%	24.3%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している)：すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】　([現在について]で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき)　：すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能)　：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」⑥「看護師の実施が可能：特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般)　：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称))　：すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能：特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

（医師606、看護師1,370）

		医師回答					看護師回答				
		現在について	今後について				現在について	今後について			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	医療処置項目	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
				計	看護師一般	特定看護師（仮称）			計	看護師一般	特定看護師（仮称）
呼吸器	56 酸素投与の開始、中止、投与量の調整の判断	45.4%	18.9%	81.1%	48.4%	32.7%	49.7%	19.6%	80.4%	51.0%	29.4%
	57 気管カニューレの選択・交換	10.7%	31.9%	68.1%	17.6%	50.5%	12.6%	47.6%	52.4%	13.6%	38.8%
	58 経皮的気管穿刺針（トラヘルパー等）の挿入	3.2%	75.5%	24.5%	2.7%	21.8%	0.9%	78.3%	21.7%	2.2%	19.5%
	59 挿管チューブの位置調節（深さの調整）	29.2%	23.4%	76.6%	34.7%	41.9%	11.7%	43.9%	56.1%	15.0%	41.1%
	60 経口・経鼻挿管の実施	9.3%	58.7%	41.3%	9.9%	31.4%	4.6%	62.1%	37.9%	5.3%	32.6%
	61 経口・経鼻挿管チューブの抜管	12.7%	43.2%	56.8%	17.0%	39.8%	6.9%	48.5%	51.5%	13.0%	38.5%
	62 人工呼吸器モードの設定・変更の判断・実施	15.0%	37.2%	62.8%	14.0%	48.8%	12.2%	44.8%	55.2%	10.1%	45.1%
	63 人工呼吸管理下の鎮静管理	28.9%	31.5%	68.5%	26.5%	41.9%	27.9%	45.8%	54.2%	22.7%	31.5%
	64 人工呼吸器装着中の患者のウイニングスケジュール作成と実施	6.5%	45.2%	54.8%	7.1%	47.7%	7.5%	41.2%	58.8%	7.7%	51.1%
	65 小児の人工呼吸器の選択：HFO対応か否か	3.0%	74.2%	25.8%	2.5%	23.3%	0.3%	79.3%	20.7%	1.0%	19.7%
	66 NPPV開始、中止、モード設定	9.7%	49.5%	50.5%	11.2%	39.3%	7.1%	52.2%	47.8%	7.3%	40.5%
処置・創傷処置	67 浣腸の実施の決定	54.5%	15.1%	84.9%	65.3%	19.6%	57.8%	11.7%	88.3%	69.6%	18.7%
	68 創部洗浄・消毒	59.9%	8.9%	91.1%	67.8%	23.2%	65.5%	11.9%	88.1%	67.1%	21.0%
	69 褥瘡の壊死組織のデブリードマン	6.0%	48.2%	51.8%	8.7%	43.1%	8.1%	42.4%	57.6%	8.7%	48.8%
	70 電気凝固メスによる止血（褥瘡部）	1.2%	63.9%	36.1%	3.6%	32.5%	0.7%	72.7%	27.3%	1.8%	25.4%
	71 巻爪処置（ニッパー、ワイヤーを用いた処置）	20.0%	36.4%	63.6%	29.0%	34.7%	19.6%	39.2%	60.8%	19.0%	41.8%
	72 胼胝・鶏眼処置（コーンカッター等用いた処置）	14.2%	38.3%	61.7%	26.6%	35.1%	10.7%	48.5%	51.5%	14.8%	36.7%
	73 皮下膿瘍の切開・排膿：皮下組織まで	1.6%	65.7%	34.3%	5.8%	28.6%	0.9%	73.6%	26.4%	2.2%	24.2%
	74 創傷の陰圧閉鎖療法の実施	9.1%	53.1%	46.9%	10.6%	36.3%	11.5%	62.3%	37.7%	11.3%	26.4%
	75 表創（非感染創）の縫合：皮下組織まで（手術室外で）	1.2%	64.2%	35.8%	4.6%	31.2%	0.6%	77.1%	22.9%	1.2%	21.7%
	76 非感染創の縫合：皮下組織から筋層まで（手術室外で）	1.4%	76.8%	23.2%	2.6%	20.7%	0.5%	87.7%	12.3%	0.9%	11.4%
	77 医療用ホッチキスの使用（手術室外で）	2.0%	54.7%	45.3%	10.9%	34.3%	0.5%	72.4%	27.6%	3.5%	24.0%
	78 体表面創の抜糸・抜鉤	2.2%	34.5%	65.5%	21.3%	44.3%	0.3%	54.0%	46.0%	8.9%	37.1%
	79 動脈ライン確保	3.5%	61.5%	38.5%	3.8%	34.7%	0.5%	76.7%	23.3%	1.7%	21.6%
	80 末梢静脈挿入式静脈カテーテル(PICC)挿入	4.3%	69.2%	30.8%	4.0%	26.8%	1.1%	87.6%	12.4%	1.6%	10.7%
	81 中心静脈カテーテル挿入	1.4%	89.2%	10.8%	1.0%	9.7%	0.0%	94.6%	5.4%	0.1%	5.3%
	82 中心静脈カテーテル抜去	3.7%	34.0%	66.0%	27.2%	38.8%	2.6%	60.0%	40.0%	11.2%	28.8%
	83 膀管・胆管チューブの管理：洗浄	11.8%	46.8%	53.2%	18.5%	34.7%	7.3%	67.9%	32.1%	9.0%	23.1%
	84 膀管・胆管チューブの入れ替え	1.9%	87.0%	13.0%	1.9%	11.2%	0.1%	96.4%	3.6%	0.1%	3.5%
	85 腹腔穿刺（一時的なカテーテル留置を含む）	1.4%	89.8%	10.2%	1.4%	8.8%	0.1%	95.8%	4.2%	0.3%	3.9%
	86 腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む）	3.3%	49.6%	50.4%	19.0%	31.4%	3.1%	71.9%	28.1%	8.2%	19.9%
	87 胸腔穿刺	2.2%	91.2%	8.8%	1.5%	7.4%	0.2%	97.6%	2.4%	0.2%	2.2%
	88 胸腔ドレーン抜去	2.2%	61.4%	38.6%	9.3%	29.3%	0.5%	80.2%	19.8%	3.2%	16.6%
	89 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更	16.4%	40.9%	59.1%	22.8%	36.4%	22.8%	54.7%	45.3%	20.7%	24.6%
	90 心嚢ドレーン抜去	1.1%	67.2%	32.8%	7.7%	25.1%	0.4%	90.1%	9.9%	0.9%	9.0%
	91 創部ドレーン抜去	0.9%	48.2%	51.8%	17.8%	34.0%	0.5%	68.4%	31.6%	7.1%	24.5%
	92 創部ドレーン短切（カット）	2.7%	47.3%	52.7%	19.1%	33.6%	0.6%	65.6%	34.4%	9.3%	25.1%
	93 「一時的ペースメーカー」の操作・管理	10.4%	53.8%	46.2%	13.5%	32.7%	13.1%	63.8%	36.2%	11.0%	25.2%
	94 「一時的ペースメーカー」の抜去	2.1%	66.4%	33.6%	7.1%	26.5%	0.6%	82.1%	17.9%	2.2%	15.7%
	95 PCPS等補助循環の管理・操作	6.1%	65.6%	34.4%	4.2%	30.2%	5.0%	77.5%	22.5%	3.8%	18.7%
	96 大動脈バルーンパンピングチューブの抜去	2.0%	86.7%	13.3%	1.5%	11.8%	0.5%	92.0%	8.0%	0.9%	7.0%
	97 小児のCT・MRI検査時の鎮静実施の決定	3.1%	71.0%	29.0%	8.2%	20.8%	0.4%	81.7%	18.3%	3.7%	14.6%
	98 小児のCT・MRI検査時の鎮静の実施	18.9%	53.8%	46.2%	20.3%	25.9%	23.3%	67.1%	32.9%	20.5%	12.4%
	99 小児の臍カテ：臍動脈の輸液路確保	2.8%	83.0%	17.0%	2.8%	14.2%	0.4%	93.6%	6.4%	0.4%	6.0%
	100 幹細胞移植：接続と滴数調整	4.5%	70.7%	29.3%	10.2%	19.1%	2.8%	87.4%	12.6%	3.5%	9.1%
	101 関節穿刺	1.7%	89.2%	10.8%	1.5%	9.3%	0.1%	94.8%	5.2%	0.7%	4.5%
	102 導尿・留置カテーテルの挿入及び抜去の決定	38.1%	25.2%	74.8%	50.6%	24.2%	59.3%	15.9%	84.1%	68.8%	15.3%
	103 導尿・留置カテーテルの挿入の実施	79.6%	7.8%	92.2%	81.4%	10.8%	88.2%	6.9%	93.1%	87.4%	5.7%

【現在について】

・A（現在看護師が実施している）：すべての回答（①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。）のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】　（【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない）

・B（医師が実施すべき）：すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C（看護師が実施可能）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」のどちらかを選択した回答の割合

・D（看護師一般）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」を選択した回答の割合

・E（特定看護師（仮称））：すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」を選択した回答の割合

(医師606、看護師1,370)

		医師回答					看護師回答				
		現在について	今後について				現在について	今後について			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	医療処置項目	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
				計	看護師一般	特定看護師(仮称)			計	看護師一般	特定看護師(仮称)
日常生活関係	104 飲水の開始・中止の決定	15.3%	39.1%	60.9%	26.0%	34.8%	17.2%	35.4%	64.6%	33.8%	30.8%
	105 食事の開始・中止の決定	13.9%	42.4%	57.6%	24.5%	33.1%	16.6%	38.1%	61.9%	31.5%	30.4%
	106 治療食(経腸栄養含む)内容の決定・変更	18.3%	30.7%	69.3%	25.9%	43.4%	17.9%	33.9%	66.1%	24.3%	41.8%
	107 小児のミルクの種類・量・濃度の決定	19.8%	35.6%	64.4%	24.3%	40.1%	15.1%	42.3%	57.7%	19.8%	37.9%
	108 小児の経口電解質液の開始と濃度、量の決定	9.4%	43.3%	56.7%	19.2%	37.6%	6.5%	55.3%	44.7%	10.0%	34.7%
	109 腸ろうの管理、チューブの入れ替え	4.8%	57.0%	43.0%	10.6%	32.4%	1.9%	78.0%	22.0%	2.3%	19.7%
	110 胃ろう、腸ろうのチューブ抜去	6.0%	40.0%	60.0%	20.5%	39.5%	2.5%	63.1%	36.9%	8.5%	28.4%
	111 経管栄養用の胃管の挿入、入れ替え	34.6%	32.1%	67.9%	39.5%	28.4%	44.0%	31.4%	68.6%	47.3%	21.2%
	112 胃ろうチューブ・ボタンの交換	6.3%	50.0%	50.0%	13.0%	37.0%	2.7%	70.0%	30.0%	5.1%	24.8%
	113 膀胱ろうカテーテルの交換	9.7%	43.8%	56.2%	16.9%	39.3%	3.4%	71.3%	28.7%	5.9%	22.9%
	114 安静度・活動や清潔の範囲の決定	28.5%	25.0%	75.0%	41.6%	33.4%	26.4%	25.7%	74.3%	45.4%	28.9%
	115 隔離の開始と解除の判断	29.1%	27.3%	72.7%	36.9%	35.9%	23.4%	32.5%	67.5%	35.8%	31.7%
	116 拘束の開始と解除の判断	47.4%	17.5%	82.5%	54.7%	27.7%	60.8%	16.8%	83.2%	62.7%	20.5%
手術	117 全身麻酔の導入	1.1%	87.5%	12.5%	1.4%	11.1%	2.5%	93.2%	6.8%	1.7%	5.1%
	118 術中の麻酔・呼吸・循環管理(麻酔深度の調節、薬剤・酸素投与濃度、輸液量等の調整)	5.3%	72.3%	27.7%	1.8%	25.9%	2.5%	88.1%	11.9%	1.1%	10.8%
	119 麻酔の覚醒	1.4%	83.1%	16.9%	0.7%	16.2%	0.9%	89.0%	11.0%	0.6%	10.4%
	120 局所麻酔(硬膜外・腰椎)	1.4%	89.5%	10.5%	1.1%	9.4%	0.4%	96.2%	3.8%	0.0%	3.8%
	121 麻酔の補足説明:"麻酔医による患者とのリスク共有も含む説明"を補足する時間をかけた説明	16.0%	44.0%	56.0%	16.7%	39.4%	13.9%	62.2%	37.8%	11.7%	26.1%
	122 神経ブロック	1.0%	92.9%	7.1%	1.0%	6.1%	0.4%	96.9%	3.1%	0.1%	3.0%
	123 硬膜外チューブの抜去	1.0%	46.4%	53.6%	20.1%	33.4%	2.1%	69.1%	30.9%	9.2%	21.7%
	124 皮膚表面の麻酔(注射)	1.1%	65.4%	34.6%	6.8%	27.8%	0.8%	81.3%	18.7%	1.9%	16.8%
	125 手術執刀までの準備(体位、消毒)	34.3%	28.1%	71.9%	47.2%	24.8%	31.4%	39.3%	60.7%	36.9%	23.9%
	126 手術時の臓器や手術器械の把持及び保持(手術の第一・第二助手)	15.8%	35.6%	64.4%	27.1%	37.3%	11.4%	60.2%	39.8%	12.8%	27.1%
	127 手術時の臓器や手術器械の把持及び保持(気管切開等の小手術助手)	22.9%	23.6%	76.4%	36.4%	40.1%	19.7%	52.8%	47.2%	18.6%	28.6%
	128 手術の補足説明:"術者による患者とのリスク共有も含む説明"を補足する時間をかけた説明	13.4%	38.7%	61.3%	21.5%	39.8%	14.3%	59.2%	40.8%	13.2%	27.7%
	129 術前サマリーの作成	24.6%	36.3%	63.7%	29.9%	33.8%	17.9%	69.1%	30.9%	15.5%	15.3%
	130 手術サマリーの作成	17.0%	52.0%	48.0%	21.7%	26.4%	12.4%	75.8%	24.2%	10.7%	13.5%
緊急時対応	131 血糖値に応じたインスリン投与量の判断	18.4%	33.5%	66.5%	23.9%	42.7%	20.3%	43.1%	56.9%	21.3%	35.6%
	132 低血糖時のブドウ糖投与	72.4%	4.8%	95.2%	79.2%	16.0%	80.8%	6.1%	93.9%	81.0%	12.9%
	133 脱水の判断と補正(点滴)	5.4%	45.8%	54.2%	15.0%	39.2%	10.9%	44.4%	55.6%	16.9%	38.7%
	134 末梢血管静脈ルートの確保と輸液剤の投与	77.6%	5.6%	94.4%	80.9%	13.5%	83.7%	7.1%	92.9%	81.1%	11.8%
	135 心肺停止患者への気道確保、マスク換気	50.0%	13.9%	86.1%	58.6%	27.5%	69.5%	13.6%	86.4%	69.1%	17.3%
	136 心肺停止患者への電気的除細動実施	19.6%	20.0%	80.0%	41.6%	38.4%	19.6%	32.8%	67.2%	31.2%	35.9%
	137 血液透析・CHDFの操作、管理	16.6%	37.8%	62.2%	15.2%	47.0%	22.4%	44.0%	56.0%	18.9%	37.1%
	138 救急時の輸液路確保目的の骨髄穿刺(小児)	3.3%	69.4%	30.6%	6.6%	24.0%	1.4%	88.2%	11.8%	2.1%	9.8%
予防医療	139 予防接種の実施判断	4.2%	48.2%	51.8%	14.1%	37.7%	4.1%	66.6%	33.4%	8.7%	24.7%
	140 予防接種の実施	48.3%	15.9%	84.1%	63.3%	20.8%	52.8%	29.2%	70.8%	56.5%	14.2%
	141 特定健診などの健康診査の実施	19.2%	34.9%	65.1%	27.3%	37.8%	13.9%	56.6%	43.4%	16.6%	26.8%
	142 子宮頸がん検診:細胞診のオーダ(一次スクリーニング)、検体採取	3.7%	40.7%	59.3%	16.7%	42.6%	0.6%	68.8%	31.2%	4.5%	26.8%
	143 前立腺がん検診:触診・PSAオーダ(一次スクリーニング)	4.1%	52.1%	47.9%	14.0%	33.9%	0.3%	72.9%	27.1%	2.6%	24.5%
	144 大腸がん検診:便潜血オーダ(一次スクリーニング)	10.7%	31.4%	68.6%	29.6%	39.0%	4.8%	56.9%	43.1%	14.5%	28.6%
	145 乳がん検診:視診・触診(一次スクリーニング)	3.1%	54.3%	45.7%	9.3%	36.4%	0.3%	66.8%	33.2%	2.8%	30.4%
薬剤の選択・使用(投与中薬剤の病態に応じた薬剤使用)	146 高脂血症用剤の選択・使用	4.9%	70.2%	29.8%	10.3%	19.5%	30.5%	55.3%	44.7%	31.1%	13.6%
	147 降圧剤の選択・使用	11.8%	67.0%	33.0%	14.0%	19.0%	37.0%	54.2%	45.8%	33.4%	12.3%
	148 糖尿病治療薬の選択・使用	8.8%	69.7%	30.3%	10.2%	20.2%	35.0%	54.7%	45.3%	31.4%	13.9%
	149 排尿障害治療薬の選択・使用	5.3%	70.8%	29.2%	10.3%	18.9%	31.6%	57.6%	42.4%	30.4%	12.0%
	150 子宮収縮抑制剤の選択・使用	5.6%	74.5%	25.5%	5.6%	19.9%	25.5%	63.9%	36.1%	23.6%	12.5%
	151 K、Cl、Naの選択・使用	7.3%	69.8%	30.2%	9.5%	20.6%	32.2%	59.8%	40.2%	28.6%	11.6%
	152 カテコラミンの選択・使用	12.9%	68.6%	31.4%	13.6%	17.7%	33.2%	60.2%	39.8%	28.9%	11.0%
	153 利尿剤の選択・使用	15.3%	62.1%	37.9%	17.4%	20.5%	37.1%	54.7%	45.3%	33.9%	11.4%
	154 基本的な輸液:高カロリー輸液	9.4%	59.4%	40.6%	12.4%	28.3%	35.5%	47.3%	52.7%	33.5%	19.2%
	155 指示された期間内に薬がなくなった場合の継続薬剤(全般)の継続使用	22.9%	30.1%	69.9%	42.0%	27.9%	30.7%	40.0%	60.0%	37.1%	22.9%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】　([現在について]で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、[今後について]の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

（医師606、看護師1,370）

		医師回答					看護師回答				
		現在について	今後について				現在について	今後について			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	医療処置項目	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
				計	看護師一般	特定看護師（仮称）			計	看護師一般	特定看護師（仮称）
薬剤の選択・使用（頻時薬）	156 下剤(坐薬も含む)の選択・使用	49.4%	20.6%	79.4%	59.4%	20.0%	64.5%	17.8%	82.2%	68.0%	14.2%
	157 胃薬：制酸剤の選択・使用	22.3%	36.5%	63.5%	40.4%	23.1%	47.3%	28.9%	71.1%	55.5%	15.6%
	158 胃薬：胃粘膜保護剤の選択・使用	22.9%	32.7%	67.3%	44.6%	22.7%	46.6%	29.4%	70.6%	55.0%	15.6%
	159 整腸剤の選択・使用	27.4%	28.8%	71.2%	48.3%	22.9%	51.2%	24.5%	75.5%	59.7%	15.8%
	160 制吐剤の選択・使用	37.4%	28.4%	71.6%	50.0%	21.6%	56.2%	24.9%	75.1%	59.6%	15.5%
	161 止痢剤の選択・使用	31.3%	33.7%	66.3%	45.1%	21.2%	53.9%	25.0%	75.0%	59.2%	15.8%
	162 鎮痛剤の選択・使用	42.2%	29.7%	70.3%	48.8%	21.5%	59.7%	24.7%	75.3%	58.6%	16.7%
	163 解熱剤の選択・使用	44.2%	27.6%	72.4%	50.3%	22.1%	60.2%	24.4%	75.6%	60.3%	15.3%
	164 去痰剤(小児)の選択・使用	17.6%	46.5%	53.5%	28.9%	24.5%	42.2%	43.9%	56.1%	42.1%	14.1%
	165 抗けいれん薬(小児)の選択・使用	18.8%	58.5%	41.5%	23.1%	18.5%	40.3%	50.0%	50.0%	36.4%	13.6%
	166 インフルエンザ薬の選択・使用	10.3%	53.5%	46.5%	21.6%	24.9%	35.8%	46.3%	53.7%	37.7%	16.0%
	167 外用薬の選択・使用	44.4%	22.4%	77.6%	56.2%	21.4%	60.8%	18.9%	81.1%	62.6%	18.5%
	168 創傷被覆材(ドレッシング材)の選択・使用	50.5%	18.9%	81.1%	55.9%	25.1%	73.4%	10.3%	89.7%	63.6%	26.1%
	169 睡眠剤の選択・使用	38.4%	37.8%	62.2%	43.4%	18.8%	55.8%	32.2%	67.8%	52.9%	14.9%
	170 抗精神病薬の選択・使用	18.9%	62.2%	37.8%	21.0%	16.8%	42.7%	48.6%	51.4%	37.9%	13.5%
	171 抗不安薬の選択・使用	23.5%	55.4%	44.6%	26.9%	17.7%	44.0%	46.6%	53.4%	38.9%	14.5%
	172 ネブライザーの開始、使用薬液の選択	28.0%	30.4%	69.6%	41.2%	28.4%	35.5%	29.3%	70.7%	43.4%	27.2%
	173 感染徴候時の薬物(抗生剤等)の選択(全身投与、局所投与等)	4.4%	74.6%	25.4%	6.7%	18.8%	12.3%	72.1%	27.9%	11.7%	16.2%
	174 抗菌剤開始時期の決定、変更時期の決定	1.6%	77.4%	22.6%	3.2%	19.4%	7.5%	74.5%	25.5%	7.3%	18.2%
	175 基本的な輸液：糖質輸液、電解質輸液	10.4%	49.7%	50.3%	16.6%	33.7%	28.8%	43.5%	56.5%	28.4%	28.1%
薬剤の選択・使用（特殊な薬剤等）	176 血中濃度モニタリングに対応した抗不整脈剤の使用	4.2%	77.6%	22.4%	3.9%	18.4%	22.5%	70.0%	30.0%	14.8%	15.2%
	177 化学療法副作用出現時の症状緩和の薬剤選択、処置	10.1%	54.4%	45.6%	10.6%	35.0%	28.6%	46.0%	54.0%	18.3%	35.7%
	178 抗癌剤等の皮下漏出時のステロイド薬の選択、局所注射の実施	3.2%	55.3%	44.7%	6.3%	38.3%	10.0%	61.4%	38.6%	7.4%	31.1%
	179 放射線治療による副作用出現時の外用薬の選択	4.3%	45.0%	55.0%	11.9%	43.1%	12.5%	48.0%	52.0%	12.2%	39.8%
	180 副作用症状の確認による薬剤の中止、減量、変更の決定	3.5%	68.9%	31.1%	5.6%	25.5%	7.4%	67.9%	32.1%	7.0%	25.1%
	181 家族計画(避妊)における低用量ピル	1.0%	56.7%	43.3%	5.2%	38.1%	4.7%	59.4%	40.6%	6.3%	34.4%
	182 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与(投与量の調整)	11.9%	45.6%	54.4%	16.5%	37.9%	21.7%	57.7%	42.3%	17.7%	24.6%
	183 自己血糖測定開始の決定	10.9%	38.7%	61.3%	20.9%	40.4%	29.7%	27.2%	72.8%	37.0%	35.8%
	184 痛みの強さや副作用症状に応じたオピオイドの投与量・用法調整、想定されたオピオイドローテーションの実施時期定：WHO方式がん疼痛治療法等	5.3%	45.4%	54.6%	7.5%	47.0%	10.3%	38.4%	61.6%	8.4%	53.2%
	185 痛みの強さや副作用症状に応じた非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量・用法調整：WHO方式がん疼痛治療法等	6.8%	42.2%	57.8%	8.4%	49.4%	11.4%	36.7%	63.3%	9.2%	54.1%
	186 がんの転移、浸潤に伴う苦痛症状のための薬剤の選択と評価	5.5%	48.5%	51.5%	5.8%	45.7%	9.5%	38.9%	61.1%	6.7%	54.4%
その他	187 訪問看護の必要性の判断、依頼	36.4%	13.2%	86.8%	47.0%	39.8%	63.5%	7.4%	92.6%	66.9%	25.7%
	188 日々の病状、経過の補足説明(時間をかけた説明)	46.2%	17.8%	82.2%	50.2%	32.0%	57.8%	19.7%	80.3%	55.0%	25.3%
	189 リハビリテーション(嚥下、呼吸、運動機能アップ等)の必要性の判断、依頼	20.2%	23.2%	76.8%	34.7%	42.1%	30.8%	17.7%	82.3%	43.4%	38.9%
	190 整形外科領域の補助具の決定、注文	3.8%	45.3%	54.7%	14.5%	40.3%	6.2%	48.2%	51.8%	13.5%	38.3%
	191 理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼	10.4%	25.3%	74.7%	33.0%	41.8%	13.0%	28.1%	71.9%	35.6%	36.3%
	192 他科への診療依頼	5.5%	61.3%	38.7%	16.7%	22.0%	10.6%	59.8%	40.2%	18.0%	22.1%
	193 他科・他院への診療情報提供書作成(紹介および返信)	2.5%	67.6%	32.4%	10.1%	22.3%	3.2%	77.2%	22.8%	5.8%	17.0%
	194 在宅で終末期ケアを実施してきた患者の死亡確認	2.8%	57.4%	42.6%	16.3%	26.2%	1.7%	72.5%	27.5%	6.7%	20.7%
	195 退院サマリー(病院全体)の作成	8.4%	56.7%	43.3%	17.8%	25.5%	27.6%	58.6%	41.4%	25.4%	16.0%
	196 患者・家族・医療従事者教育	50.1%	13.7%	86.3%	48.8%	37.5%	76.9%	8.8%	91.2%	56.1%	35.2%
	197 栄養士への食事指導依頼(既存の指示内容で)	26.6%	12.3%	87.7%	54.0%	33.7%	35.8%	14.0%	86.0%	55.7%	30.3%
	198 他の介護サービスの実施可・不可の判断(リハビリ、血圧・体温など)	20.8%	20.3%	79.7%	47.4%	32.3%	41.5%	14.7%	85.3%	51.3%	34.0%
	199 家族療法・カウンセリングの依頼	26.2%	15.1%	84.9%	43.6%	41.3%	32.9%	18.3%	81.7%	42.5%	39.2%
	200 認知・行動療法の依頼	5.1%	29.7%	70.3%	32.2%	38.1%	13.0%	30.6%	69.4%	27.8%	41.5%
	201 認知・行動療法の実施・評価	9.2%	34.5%	65.5%	23.5%	42.0%	7.9%	36.4%	63.6%	16.2%	47.4%
	202 支持的精神療法の実施の決定	16.6%	30.0%	70.0%	28.5%	41.5%	13.9%	41.1%	58.9%	21.4%	37.5%
	203 患者の入院と退院の判断	3.2%	78.6%	21.4%	6.6%	14.8%	4.0%	69.6%	30.4%	9.5%	20.9%

【現在について】

・A（現在看護師が実施している）：すべての回答（①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。）のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】　（【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない）

・B（医師が実施すべき）：すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C（看護師が実施可能）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」のどちらかを選択した回答の割合

・D（看護師一般）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」を選択した回答の割合

・E（特定看護師（仮称））：すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」を選択した回答の割合

病床区分別回答状況：3．500床以上 （n=4,150）

（医師1,449、看護師2,701

		医師回答					看護師回答				
		現在について	今後について				現在について	今後について			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	医療処置項目	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
				計	看護師一般	特定看護師（仮称）			計	看護師一般	特定看護師（仮称）
検査	1 動脈ラインからの採血	63.7%	5.4%	94.6%	79.6%	14.9%	50.7%	17.0%	83.0%	64.4%	18.6%
	2 直接動脈穿刺による採血	1.0%	36.7%	63.3%	16.6%	46.6%	0.6%	59.0%	41.0%	5.4%	35.5%
	3 動脈ラインの抜去・圧迫止血	30.6%	11.1%	88.9%	59.8%	29.1%	27.2%	26.2%	73.8%	46.5%	27.2%
	4 トリアージのための検体検査の実施の決定	3.6%	35.3%	64.7%	18.3%	46.4%	3.8%	46.6%	53.4%	9.4%	44.0%
	5 トリアージのための検体検査結果の評価	3.4%	56.2%	43.8%	10.0%	33.8%	2.3%	68.3%	31.7%	4.1%	27.6%
	6 治療効果判定のための検体検査の実施の決定	1.3%	54.9%	45.1%	10.7%	34.4%	2.2%	70.9%	29.1%	4.1%	25.0%
	7 治療効果判定のための検体検査結果の評価	2.1%	72.3%	27.7%	5.7%	22.0%	1.5%	85.3%	14.7%	2.1%	12.5%
	8 手術前検査の実施の決定	1.9%	47.1%	52.9%	20.0%	32.8%	1.7%	61.2%	38.8%	9.7%	29.1%
	9 単純X線撮影の実施の決定	1.3%	42.1%	57.9%	19.8%	38.1%	1.5%	50.6%	49.4%	10.0%	39.4%
	10 単純X線撮影の画像評価	1.3%	74.1%	25.9%	6.1%	19.8%	0.9%	79.9%	20.1%	2.2%	17.9%
	11 CT、MRI検査の実施の決定	1.0%	65.7%	34.3%	9.6%	24.8%	0.7%	74.5%	25.5%	3.2%	22.3%
	12 CT、MRI検査の画像評価	0.3%	86.2%	13.8%	2.6%	11.1%	0.2%	90.7%	9.3%	0.8%	8.4%
	13 造影剤使用検査時の造影剤の投与	23.7%	19.2%	80.8%	50.9%	29.9%	20.6%	47.6%	52.4%	25.0%	27.5%
	14 IVR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施	1.4%	57.4%	42.6%	5.8%	36.8%	0.3%	83.5%	16.5%	1.7%	14.8%
	15 経腹部的膀胱超音波検査（残尿測定目的）の実施の決定	4.2%	40.2%	59.8%	23.9%	36.0%	7.2%	53.7%	46.3%	17.7%	28.6%
	16 経腹部的膀胱超音波検査（残尿測定目的）の実施	6.8%	30.9%	69.1%	25.2%	43.9%	10.6%	51.3%	48.7%	20.3%	28.4%
	17 腹部超音波検査の実施の決定	0.5%	56.5%	43.5%	11.7%	31.8%	0.6%	70.6%	29.4%	3.7%	25.7%
	18 腹部超音波検査の実施	0.3%	47.4%	52.6%	6.1%	46.5%	0.3%	68.7%	31.3%	2.5%	28.7%
	19 腹部超音波検査の結果の評価	0.1%	73.9%	26.1%	3.3%	22.8%	0.1%	89.5%	10.5%	0.5%	10.1%
	20 心臓超音波検査の実施の決定	0.4%	59.2%	40.8%	9.6%	31.2%	0.6%	75.8%	24.2%	2.3%	21.8%
	21 心臓超音波検査の実施	0.3%	49.5%	50.5%	5.0%	45.5%	0.1%	73.4%	26.6%	1.9%	24.7%
	22 心臓超音波検査の結果の評価	0.3%	77.4%	22.6%	2.9%	19.7%	0.1%	91.1%	8.9%	0.4%	8.5%
	23 頸動脈超音波検査の実施の決定	0.4%	55.7%	44.3%	10.6%	33.7%	0.4%	76.0%	24.0%	2.3%	21.7%
	24 表在超音波検査の実施の決定	0.6%	53.6%	46.4%	12.1%	34.4%	0.8%	71.7%	28.3%	3.7%	24.6%
	25 下肢血管超音波検査の実施の決定	0.9%	52.5%	47.5%	12.9%	34.6%	1.0%	70.1%	29.9%	4.2%	25.7%
	26 術後下肢動脈ドップラー検査の実施の決定	8.5%	45.2%	54.8%	19.7%	35.1%	16.1%	53.9%	46.1%	21.5%	24.6%
	27 12誘導心電図検査の実施の決定	25.0%	23.6%	76.4%	47.6%	28.7%	37.2%	25.9%	74.1%	51.8%	22.3%
	28 12誘導心電図検査の実施	59.9%	4.8%	95.2%	77.4%	17.8%	69.0%	5.7%	94.3%	81.2%	13.1%
	29 12誘導心電図検査の結果の評価	6.3%	49.2%	50.8%	18.3%	32.4%	9.3%	57.0%	43.0%	16.7%	26.3%
	30 感染症検査（インフルエンザ・ノロウィルス等）の実施の決定	4.6%	28.4%	71.6%	38.9%	32.7%	5.1%	39.4%	60.6%	25.6%	35.0%
	31 感染症検査（インフルエンザ・ノロウィルス等）の実施	33.0%	10.3%	89.7%	64.3%	25.4%	39.1%	20.9%	79.1%	54.6%	24.5%
	32 感染症検査（インフルエンザ・ノロウィルス等）の結果の評価	7.5%	38.3%	61.7%	33.2%	28.5%	4.3%	59.1%	40.9%	17.0%	23.9%
	33 薬剤感受性検査実施の決定	1.7%	46.9%	53.1%	19.5%	33.6%	1.3%	67.8%	32.2%	6.5%	25.7%
	34 真菌検査の実施の決定	1.7%	44.8%	55.2%	21.9%	33.3%	2.3%	59.0%	41.0%	11.3%	29.7%
	35 真菌検査の結果の評価	0.9%	57.7%	42.3%	15.1%	27.2%	1.3%	74.8%	25.2%	5.5%	19.7%
	36 微生物学検査実施の決定	3.5%	42.5%	57.5%	23.8%	33.8%	1.7%	65.3%	34.7%	8.2%	26.6%
	37 微生物学検査の実施：スワブ法	36.1%	14.4%	85.6%	59.8%	25.9%	38.1%	33.5%	66.5%	47.7%	18.8%
	38 薬物血中濃度検査(TDM)実施の決定	1.0%	46.7%	53.3%	16.5%	36.8%	1.2%	68.3%	31.7%	5.9%	25.9%
	39 スパイロメトリーの実施の決定	1.4%	47.4%	52.6%	19.0%	33.6%	1.0%	64.8%	35.2%	7.3%	27.9%
	40 直腸内圧測定・肛門内圧測定実施の決定	0.4%	60.8%	39.2%	14.0%	25.2%	0.8%	76.8%	23.2%	3.4%	19.8%
	41 直腸内圧測定・肛門内圧測定の実施	2.9%	45.4%	54.6%	17.6%	37.0%	2.6%	68.2%	31.8%	6.3%	25.5%
	42 膀胱内圧測定実施の決定	0.4%	62.0%	38.0%	12.7%	25.4%	0.8%	76.4%	23.6%	3.6%	20.0%
	43 膀胱内圧測定の実施	1.1%	47.4%	52.6%	16.2%	36.4%	3.0%	68.7%	31.3%	6.3%	25.0%
	44 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施の決定	0.6%	49.6%	50.4%	16.7%	33.7%	0.6%	75.2%	24.8%	3.9%	20.9%
	45 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施	3.9%	30.2%	69.8%	27.0%	42.9%	1.4%	68.3%	31.7%	5.9%	25.7%
	46 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の結果の評価	0.4%	65.1%	34.9%	10.2%	24.7%	0.3%	85.4%	14.6%	1.9%	12.7%
	47 骨密度検査の実施の決定	0.6%	43.4%	56.6%	20.9%	35.7%	0.6%	63.8%	36.2%	8.1%	28.1%
	48 骨密度検査の結果の評価	0.3%	56.5%	43.5%	12.9%	30.6%	0.3%	75.6%	24.4%	4.3%	20.2%
	49 嚥下造影の実施の決定	0.9%	51.8%	48.2%	13.3%	34.9%	0.8%	61.4%	38.6%	5.8%	32.8%
	50 嚥下内視鏡検査の実施の決定	0.2%	58.5%	41.5%	10.3%	31.2%	0.5%	67.7%	32.3%	4.0%	28.4%
	51 嚥下内視鏡検査の実施	0.1%	74.7%	25.3%	4.1%	21.2%	0.1%	83.8%	16.2%	1.3%	14.8%
	52 眼底検査の実施の決定	0.1%	52.4%	47.6%	13.4%	34.2%	0.5%	73.2%	26.8%	3.9%	22.9%
	53 眼底検査の実施	0.6%	57.5%	42.5%	7.3%	35.2%	1.3%	73.1%	26.9%	5.0%	21.9%
	54 眼底検査の結果の評価	0.0%	79.2%	20.8%	3.6%	17.2%	0.1%	90.1%	9.9%	0.8%	9.1%
	55 ACT(活性化凝固時間)の測定実施の決定	6.2%	36.3%	63.7%	29.3%	34.4%	4.1%	61.8%	38.2%	11.5%	26.8%

【現在について】

・A（現在看護師が実施している）：すべての回答（①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。）のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】　（【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない）

・B（医師が実施すべき）：すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C（看護師が実施可能）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」のどちらかを選択した回答の割合

・D（看護師一般）：すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能：一般看護師」を選択した回答の割合

・E（特定看護師（仮称））：すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能：特定看護師（仮称）」を選択した回答の割合