

施設区分別回答状況: 4. 訪問看護ステーション (n=196)
(看護師のみ)

* 訪問看護ステーションは慢性期質問票であるため、(一)印のある項目には回答なし。

	医療処置項目	看護師回答				
		現在について		今後について		
		A	B	C	D	E
		現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能 計	看護師一般	特定看護師(仮称)
1	動脈ラインからの採血	—	—	—	—	—
2	直接動脈穿刺による採血	3.3%	43.3%	56.7%	13.3%	43.3%
3	動脈ラインの抜去・圧迫止血	—	—	—	—	—
4	トリアージのための検体検査の実施の決定	7.1%	50.0%	50.0%	10.7%	39.3%
5	トリアージのための検体検査結果の評価	3.6%	60.7%	39.3%	7.1%	32.1%
6	治療効果判定のための検体検査の実施の決定	5.7%	65.7%	34.3%	5.7%	28.6%
7	治療効果判定のための検体検査結果の評価	2.9%	85.3%	14.7%	2.9%	11.8%
8	手術前検査の実施の決定	0.0%	60.0%	40.0%	4.0%	36.0%
9	単純X線撮影の実施の決定	0.0%	40.0%	60.0%	14.3%	45.7%
10	単純X線撮影の画像評価	0.0%	74.3%	25.7%	0.0%	25.7%
11	CT、MRI検査の実施の決定	0.0%	55.9%	44.1%	2.9%	41.2%
12	CT、MRI検査の画像評価	0.0%	87.9%	12.1%	0.0%	12.1%
13	造影剤使用検査時の造影剤の投与	41.9%	32.3%	67.7%	25.8%	41.9%
14	IVR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施	—	—	—	—	—
15	経腹部膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施の決定	3.6%	39.3%	60.7%	10.7%	50.0%
16	経腹部膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施	3.7%	48.1%	51.9%	7.4%	44.4%
17	腹部超音波検査の実施の決定	0.0%	59.4%	40.6%	3.1%	37.5%
18	腹部超音波検査の実施	0.0%	58.8%	41.2%	2.9%	38.2%
19	腹部超音波検査の結果の評価	0.0%	84.4%	15.6%	0.0%	15.6%
20	心臓超音波検査の実施の決定	0.0%	64.3%	35.7%	0.0%	35.7%
21	心臓超音波検査の実施	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	33.3%
22	心臓超音波検査の結果の評価	0.0%	82.1%	17.9%	0.0%	17.9%
23	頸動脈超音波検査の実施の決定	0.0%	67.9%	32.1%	0.0%	32.1%
24	表在超音波検査の実施の決定	0.0%	64.0%	36.0%	0.0%	36.0%
25	下肢血管超音波検査の実施の決定	0.0%	54.2%	45.8%	0.0%	45.8%
26	術後下肢動脈ドップラー検査の実施の決定	0.0%	52.2%	47.8%	0.0%	47.8%
27	12誘導心電図検査の実施の決定	23.3%	27.9%	72.1%	37.2%	34.9%
28	12誘導心電図検査の実施	55.4%	3.6%	96.4%	71.4%	25.0%
29	12誘導心電図検査の結果の評価	11.6%	53.5%	46.5%	18.6%	27.9%
30	感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の実施の決定	17.5%	27.5%	72.5%	40.0%	32.5%
31	感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の実施	56.3%	14.6%	85.4%	64.6%	20.8%
32	感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の結果の評価	23.3%	48.8%	51.2%	37.2%	14.0%
33	薬剤感受性検査実施の決定	10.8%	45.9%	54.1%	13.5%	40.5%
34	真菌検査の実施の決定	7.9%	28.9%	71.1%	28.9%	42.1%
35	真菌検査の結果の評価	5.1%	61.5%	38.5%	20.5%	17.9%
36	微生物学検査実施の決定	2.9%	51.4%	48.6%	11.4%	37.1%
37	微生物学検査の実施: スワブ法	43.6%	30.8%	69.2%	46.2%	23.1%
38	薬物血中濃度検査(TDM)実施の決定	2.9%	61.8%	38.2%	5.9%	32.4%
39	スパイロメトリーの実施の決定	3.7%	40.7%	59.3%	14.8%	44.4%
40	直腸内圧測定・肛門内圧測定実施の決定	0.0%	60.9%	39.1%	8.7%	30.4%
41	直腸内圧測定・肛門内圧測定の実施	4.3%	52.2%	47.8%	13.0%	34.8%
42	膀胱内圧測定実施の決定	4.2%	58.3%	41.7%	8.3%	33.3%
43	膀胱内圧測定の実施	0.0%	52.2%	47.8%	8.7%	39.1%
44	血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施の決定	0.0%	54.2%	45.8%	8.3%	37.5%
45	血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施	3.8%	50.0%	50.0%	19.2%	30.8%
46	血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の結果の評価	0.0%	70.8%	29.2%	8.3%	20.8%
47	骨密度検査の実施の決定	3.4%	31.0%	69.0%	17.2%	51.7%
48	骨密度検査の結果の評価	0.0%	57.1%	42.9%	17.9%	25.0%
49	嚥下造影の実施の決定	0.0%	40.7%	59.3%	7.4%	51.9%
50	嚥下内視鏡検査の実施の決定	0.0%	48.1%	51.9%	11.1%	40.7%
51	嚥下内視鏡検査の実施	0.0%	82.1%	17.9%	3.6%	14.3%
52	眼底検査の実施の決定	8.3%	58.3%	41.7%	8.3%	33.3%
53	眼底検査の実施	8.0%	60.0%	40.0%	12.0%	28.0%
54	眼底検査の結果の評価	0.0%	91.7%	8.3%	4.2%	4.2%
55	ACT(活性化凝固時間)の測定実施の決定	3.3%	63.3%	36.7%	16.7%	20.0%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している): すべての回答①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答を除く。②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき): すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能): すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能: 一般看護師」⑥「看護師の実施が可能: 特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般): すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能: 一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)): すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能: 特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

*訪問看護ステーションは慢性期質問票であるため、(一)印のある項目には回答なし。

		看護師回答				
	医療処置項目	現在について	今後について			
		A	B	C	D	E
		現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能	看護師一般	特定看護師(仮称)
呼吸器	56 酸素投与の開始、中止、投与量の調整の判断	54.8%	20.4%	79.6%	46.2%	33.3%
	57 気管カニューレの選択・交換	25.8%	45.5%	54.5%	21.2%	33.3%
	58 経皮的気管穿刺針(トラヘラバー等)の挿入	6.1%	75.8%	24.2%	3.0%	21.2%
	59 挿管チューブの位置調節(深さの調整)	14.6%	56.1%	43.9%	14.6%	29.3%
	60 経口・経鼻挿管の実施	29.5%	50.0%	50.0%	13.6%	36.4%
	61 経口・経鼻挿管チューブの抜管	41.3%	32.6%	67.4%	30.4%	37.0%
	62 人工呼吸器モードの設定・変更の判断・実施	9.6%	50.0%	50.0%	7.7%	42.3%
	63 人工呼吸器管理下の鎮静管理	13.3%	64.4%	35.6%	6.7%	28.9%
	64 人工呼吸器装着中の患者のウィニングスケジュール作成と実施	13.2%	52.6%	47.4%	5.3%	42.1%
	65 小児の人工呼吸器の選択:HFO対応か否か	3.7%	77.8%	22.2%	7.4%	14.8%
処置・創傷処置	66 NPPV開始、中止、モード設定	21.2%	50.0%	50.0%	15.4%	34.6%
	67 洗滌の実施の決定	89.8%	7.0%	93.0%	86.0%	7.0%
	68 創部洗浄・消毒	98.8%	2.4%	97.6%	90.9%	6.7%
	69 褥瘡の壊死組織のデブリードマン	34.9%	28.9%	71.1%	27.7%	43.4%
	70 電気凝固メスによる止血(褥瘡部)	2.9%	58.8%	41.2%	5.9%	35.3%
	71 巻爪処置(ニッパー、ワイヤーを用いた処置)	82.1%	7.5%	92.5%	74.5%	17.9%
	72 餅飯・鶏眼処置(コーンカッター等を用いた処置)	49.2%	17.5%	82.5%	58.7%	23.8%
	73 皮下膿瘍の切開・排膿:皮下組織まで	15.0%	41.7%	58.3%	18.3%	40.0%
	74 創傷の陰圧閉鎖療法の実施	32.4%	41.2%	58.8%	29.4%	29.4%
	75 表創(非感染創)の縫合:皮下組織まで(手術室外で)	2.6%	74.4%	25.6%	2.6%	23.1%
	76 非感染創の縫合:皮下組織から筋層まで(手術室外で)	2.8%	86.1%	13.9%	0.0%	13.9%
	77 医療用ホットキスの使用(手術室外で)	0.0%	69.6%	30.4%	4.3%	26.1%
	78 体表面創の抜糸・抜鉤	7.0%	41.9%	58.1%	25.6%	32.6%
	79 動脈ライン確保	—	—	—	—	—
	80 末梢静脈挿入式静脈カテーテル(PICC)挿入	3.8%	88.5%	11.5%	3.8%	7.7%
	81 中心静脈カテーテル挿入	2.7%	91.9%	8.1%	2.7%	5.4%
	82 中心静脈カテーテル抜去	10.0%	60.0%	40.0%	15.0%	25.0%
	83 尿管・胆管チューブの管理:洗浄	39.0%	41.5%	58.5%	34.1%	24.4%
	84 尿管・胆管チューブの入れ替え	0.0%	88.5%	11.5%	0.0%	11.5%
	85 腹腔穿刺(一時的なカテーテル留置を含む)	2.9%	91.2%	8.8%	0.0%	8.8%
	86 腹腔ドレーン抜去(腹腔穿刺後の抜針含む)	3.1%	68.8%	31.3%	3.1%	28.1%
	87 胸腔穿刺	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	88 胸腔ドレーン抜去	3.6%	78.6%	21.4%	3.6%	17.9%
	89 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更	7.4%	74.1%	25.9%	7.4%	18.5%
	90 心臓ドレーン抜去	0.0%	94.4%	5.6%	0.0%	5.6%
	91 創部ドレーン抜去	3.7%	55.6%	44.4%	3.7%	40.7%
	92 創部ドレーン短切(カット)	0.0%	48.0%	52.0%	4.0%	48.0%
	93 「一時的ペースメーカー」の操作・管理	—	—	—	—	—
	94 「一時的ペースメーカー」の抜去	—	—	—	—	—
	95 PCPS等補助循環の管理・操作	—	—	—	—	—
	96 大動脈バルーンポンピングチューブの抜去	—	—	—	—	—
	97 小児のCT・MRI検査時の鎮静実施の決定	0.0%	72.2%	27.8%	0.0%	27.8%
	98 小児のCT・MRI検査時の鎮静の実施	5.3%	73.7%	26.3%	5.3%	21.1%
	99 小児の脾カテ:脾動脈の輸液路確保	—	—	—	—	—
	100 幹細胞移植:接続と滴数調整	12.5%	75.0%	25.0%	6.3%	18.8%
	101 関節穿刺	3.7%	96.3%	3.7%	0.0%	3.7%
	102 導尿・留置カテーテルの挿入及び抜去の決定	65.1%	12.8%	87.2%	69.7%	17.4%
	103 導尿・留置カテーテルの挿入の実施	96.7%	3.3%	96.7%	89.5%	7.2%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答を除く。のうちの、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

* 訪問看護ステーションは慢性期質問票であるため、(一)印のある項目には回答なし。

	医療処置項目	看護師回答				
		現在について A	今後について			
			B	C	D	E
		現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能 計	看護師一般 (計)	特定看護師 (計)
日常生活関係	104 飲水の開始・中止の決定	50.9%	20.4%	79.6%	50.9%	28.7%
	105 食事の開始・中止の決定	49.5%	22.4%	77.6%	49.5%	28.0%
	106 治療食(経腸栄養含む)内容の決定・変更	33.3%	27.8%	72.2%	27.8%	44.4%
	107 小児のミルクの種類・量・濃度の決定	25.0%	19.4%	80.6%	30.6%	50.0%
	108 小児の経口薬液の開始と濃度、量の決定	24.2%	27.3%	72.7%	24.2%	48.5%
	109 腸ろうの管理、チューブの入れ替え	8.8%	64.9%	35.1%	5.3%	29.8%
	110 胃ろう、腸ろうのチューブ抜去	10.9%	46.9%	53.1%	17.2%	35.9%
	111 経管栄養用の胃管の挿入、入れ替え	57.0%	25.8%	74.2%	53.8%	20.4%
	112 胃ろうチューブ・ボタンの交換	3.1%	60.0%	40.0%	6.2%	33.8%
	113 膀胱ろうカテーテルの交換	31.8%	50.0%	50.0%	25.8%	24.2%
	114 安静度・活動や清潔の範囲の決定	62.0%	16.5%	83.5%	60.3%	23.1%
	115 隔離の開始と解除の判断	31.7%	38.3%	61.7%	33.3%	28.3%
	116 拘束の開始と解除の判断	54.2%	25.4%	74.6%	52.5%	22.0%
	117 全身麻酔の導入	—	—	—	—	—
手術	118 術中の麻酔・呼吸・循環管理(麻酔深度の調節、薬剤・酸素投与濃度、輸液量等の調整)	—	—	—	—	—
	119 麻酔の覚醒	—	—	—	—	—
	120 局所麻酔(硬膜外・腰椎)	—	—	—	—	—
	121 麻酔の補足説明:「麻酔医による患者とのリスク共有も含む説明」を補足する時間をかけた説明	—	—	—	—	—
	122 神経ブロック	0.0%	92.9%	7.1%	0.0%	7.1%
	123 硬膜外チューブの抜去	4.0%	76.0%	24.0%	4.0%	20.0%
	124 皮膚表面の麻酔(注射)	5.6%	75.0%	25.0%	8.3%	16.7%
	125 手術執刀までの準備(体位、消毒)	—	—	—	—	—
	126 手術時の臓器や手術器械の把持及び保持(手術の第一・第二助手)	—	—	—	—	—
	127 手術時の臓器や手術器械の把持及び保持(気管切開等の小手術助手)	—	—	—	—	—
	128 手術の補足説明:「術者による患者とのリスク共有も含む説明」を補足する時間をかけた説明	—	—	—	—	—
	129 術前サマリーの作成	—	—	—	—	—
	130 手術サマリーの作成	—	—	—	—	—
緊急時対応	131 血糖値に応じたインスリン投与量の判断	32.6%	33.7%	66.3%	28.1%	38.2%
	132 低血糖時のブドウ糖投与	94.6%	3.4%	96.6%	85.9%	10.7%
	133 脱水の判断と補正(点滴)	36.1%	18.6%	81.4%	43.3%	38.1%
	134 末梢血管静脈ルートの確保と輸液剤の投与	90.4%	4.4%	95.6%	82.2%	13.3%
	135 心肺停止患者への気道確保、マスク換気	73.6%	13.8%	86.2%	69.0%	17.2%
	136 心肺停止患者への電気的除細動実施	32.7%	25.0%	75.0%	48.1%	26.9%
	137 血液透析・CHDFの操作、管理	14.7%	50.0%	50.0%	8.8%	41.2%
	138 救急時の輸液確保目的の骨髄穿刺(小児)	—	—	—	—	—
予防医療	139 予防接種の実施判断	20.7%	50.0%	50.0%	19.0%	31.0%
	140 予防接種の実施	44.4%	31.7%	68.3%	46.0%	22.2%
	141 特定健診などの健康診査の実施	17.8%	48.9%	51.1%	20.0%	31.1%
	142 子宮頸がん検診:細胞診のオーダー(一次スクリーニング)、検体採取	0.0%	44.8%	55.2%	10.3%	44.8%
	143 前立腺がん検診:触診・PSAオーダー(一次スクリーニング)	0.0%	54.8%	45.2%	0.0%	45.2%
	144 大腸がん検診:便潜血オーダー(一次スクリーニング)	2.7%	35.1%	64.9%	13.5%	51.4%
	145 乳がん検診:視診・触診(一次スクリーニング)	5.9%	50.0%	50.0%	11.8%	38.2%
(投与中薬剤の病態に応じた薬剤使用)	146 高脂血症用剤の選択・使用	25.7%	60.8%	39.2%	27.0%	12.2%
	147 降圧剤の選択・使用	39.1%	51.7%	48.3%	32.2%	16.1%
	148 糖尿病治療薬の選択・使用	37.6%	54.1%	45.9%	32.9%	12.9%
	149 排尿障害治療薬の選択・使用	25.7%	63.5%	36.5%	24.3%	12.2%
	150 子宮収縮抑制剤の選択・使用	7.5%	70.0%	30.0%	5.0%	25.0%
	151 K、Cl、Naの選択・使用	18.8%	65.2%	34.8%	20.3%	14.5%
	152 カテコラミンの選択・使用	12.5%	73.2%	26.8%	10.7%	16.1%
	153 利尿剤の選択・使用	36.9%	56.0%	44.0%	31.0%	13.1%
	154 基本的な輸液:高カロリー輸液	38.6%	53.0%	47.0%	32.5%	14.5%
	155 指示された期間内に薬がなくなった場合の経腸薬剤(全錠)の経口使用	45.1%	37.8%	62.2%	39.0%	23.2%

【現在について】

-A(現在看護師が実施している):すべての回答①「この行為は実施されていない」を選択した回答を除く。のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

-B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

-C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

-D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

-E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

* 訪問看護ステーションは慢性期質問票であるため、(―)印のある項目には回答なし。

	医療処置項目	看護師回答				
		現在について A	今後について			
			B 医師が実施すべき	看護師が実施可能		
				C 計	D 看護師一般	E 特定看護師(仮称)
薬剤(随時薬)・使用	156 下剤(坐薬も含む)の選択・使用	85.6%	9.8%	90.2%	81.7%	8.5%
	157 胃薬・制酸剤の選択・使用	59.4%	21.7%	78.3%	63.2%	15.1%
	158 胃薬・胃粘膜保護剤の選択・使用	56.7%	21.2%	78.8%	63.5%	15.4%
	159 整腸剤の選択・使用	69.8%	14.0%	86.0%	72.9%	13.2%
	160 制吐剤の選択・使用	62.6%	18.3%	81.7%	67.0%	14.8%
	161 止瀉剤の選択・使用	65.9%	15.1%	84.9%	68.3%	16.7%
	162 鎮痛剤の選択・使用	72.3%	18.2%	81.8%	65.7%	16.1%
	163 解熱剤の選択・使用	74.3%	15.4%	84.6%	69.9%	14.7%
	164 去痰剤(小児)の選択・使用	37.0%	38.9%	61.1%	33.3%	27.8%
	165 抗けいれん薬(小児)の選択・使用	33.3%	50.9%	49.1%	26.3%	22.8%
	166 インフルエンザ薬の選択・使用	29.5%	57.7%	42.3%	32.1%	10.3%
	167 外用薬の選択・使用	76.6%	13.1%	86.9%	74.5%	12.4%
	168 創傷被覆材(ドレッシング材)の選択・使用	81.7%	7.7%	92.3%	73.9%	18.3%
	169 睡眠剤の選択・使用	56.3%	34.8%	65.2%	48.2%	17.0%
	170 抗精神薬の選択・使用	41.1%	54.4%	45.6%	28.9%	16.7%
	171 抗不安薬の選択・使用	45.4%	51.5%	48.5%	33.0%	15.5%
	172 ネブライザーの開始、使用薬液の選択	46.8%	23.4%	76.6%	50.0%	26.6%
薬剤(随時薬)・使用 特別な薬剤・使用	173 感染徴候時の薬物(抗生剤等)の選択(全身投与・局所投与等)	29.5%	59.1%	40.9%	26.1%	14.8%
	174 抗菌剤開始時期の決定、変更時期の決定	21.7%	63.9%	36.1%	20.5%	15.7%
	175 基本的な輸液:糖質輸液、電解質輸液	35.5%	35.5%	64.5%	34.4%	30.1%
	176 血中濃度モニタリングに対応した抗不整脈剤の使用	10.3%	82.8%	17.2%	10.3%	6.9%
	177 化学療法副作用出現時の症状緩和の薬剤選択、処置	15.5%	65.5%	34.5%	12.1%	22.4%
	178 抗癌剤等の皮下漏出時のステロイド薬の選択、局所注射の実施	4.5%	86.4%	13.6%	4.5%	9.1%
	179 放射線治療による副作用出現時の外用薬の選択	9.8%	65.9%	34.1%	9.8%	24.4%
	180 副作用症状の確認による薬剤の中止、減量、変更の決定	20.8%	63.9%	36.1%	15.3%	20.8%
	181 家族計画(避妊)における低用量ピル	6.7%	60.0%	40.0%	16.7%	23.3%
	182 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与(投与量の調整)	10.5%	60.5%	39.5%	5.3%	34.2%
その他	183 自己血糖測定開始の決定	33.7%	24.1%	75.9%	48.2%	27.7%
	184 痛みの強さや副作用症状に応じたオピオイドの投与量・用法調整、想定されたオピオイドローテーションの実施 時期定:WHO方式がん疼痛治療法等	26.6%	36.7%	63.3%	15.2%	48.1%
	185 痛みの強さや副作用症状に応じた非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量・用法調整:WHO方式がん疼痛治療法等	28.4%	30.9%	69.1%	17.3%	51.9%
	186 がんの転移、浸潤に伴う苦痛症状のための薬剤の選択と評価	18.1%	43.1%	56.9%	15.3%	41.7%
	187 訪問看護の必要性の判断、依頼	72.5%	12.0%	88.0%	72.5%	15.5%
	188 日々の病状、経過の補足説明(時間をかけた説明)	90.7%	12.0%	88.0%	74.0%	14.0%
	189 リハビリテーション(嚥下、呼吸、運動機能アップ等)の必要性の判断、依頼	76.9%	11.6%	88.4%	66.7%	21.8%
	190 整形外科領域の補助具の決定、注文	14.8%	33.0%	67.0%	21.6%	45.5%
	191 理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼	60.7%	17.2%	82.8%	61.5%	21.3%
	192 他科への診療依頼	56.5%	35.7%	64.3%	43.5%	20.9%
その他	193 他科・他院への診療情報提供書作成(紹介および返信)	35.5%	52.7%	47.3%	30.1%	17.2%
	194 在宅で終末期ケアを実施してきた患者の死亡確認	21.7%	59.0%	41.0%	28.9%	12.0%
	195 退院サマリー(病院全体)の作成	84.4%	10.4%	89.6%	71.9%	17.7%
	196 患者・家族・医療従事者教育	94.4%	3.5%	96.5%	74.1%	22.4%
	197 栄養士への食事指導依頼(既存の指示内容で)	55.7%	10.2%	89.8%	62.5%	27.3%
	198 他の介護サービスの実施可・不可の判断(リハビリ、血圧・体温など)	82.1%	12.1%	87.9%	75.0%	12.9%
	199 家族療法・カウンセリングの依頼	59.8%	17.2%	82.8%	50.6%	32.2%
	200 認知・行動療法の依頼	42.1%	21.1%	78.9%	44.7%	34.2%
	201 認知・行動療法の実施・評価	38.5%	21.8%	78.2%	39.7%	38.5%
	202 支持的精神療法の実施の決定	32.8%	28.1%	71.9%	37.5%	34.4%
その他	203 患者の入院と退院の判断	25.6%	53.8%	46.2%	25.6%	20.5%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答を除く。のうちの、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合


・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合


・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

◆施設区分別散布図: 1. 特定機能病院

■「現在」と「今後」に関する回答状況(医師の回答)




■「現在」と「今後」に関する回答状況(看護師回答)




- *1:【現在について】すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、
②「看護師が実施している」を選択した回答の割合
- *2:【今後について】すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:看護師一般」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合(ただし、【現在について】で①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】は回答していない)

■医師と看護師による回答状況
(現在「看護師が実施している」という回答の割合＊)



＊すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、
②「看護師が実施している」を選択した回答の割合


■医師と看護師による回答状況
(今後「看護師の実施が可能」という回答の割合＊)




＊すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:看護師一般」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを
選択した回答の割合(ただし、【現在について】で①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、
【今後について】は回答していない)

◆施設区分別散布図: 2. 特定機能病院以外の病院

■「現在」と「今後」に関する回答状況(医師の回答)




■「現在」と「今後」に関する回答状況(看護師回答)




- *1:【現在について】すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、
②「看護師が実施している」を選択した回答の割合
- *2:【今後について】すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:看護師一般」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合(ただし、【現在について】で①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】は回答していない)

■医師と看護師による回答状況
(現在「看護師が実施している」という回答の割合＊)



＊すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、
②「看護師が実施している」を選択した回答の割合


■医師と看護師による回答状況
(今後「看護師の実施が可能」という回答の割合＊)




＊すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:看護師一般」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを
選択した回答の割合(ただし、【現在について】で①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、
【今後について】は回答していない)

◆施設区分別散布図:3. 診療所(有床診療所)

■「現在」と「今後」に関する回答状況(医師の回答)




■「現在」と「今後」に関する回答状況(看護師回答)




- * 1:【現在について】すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、
②「看護師が実施している」を選択した回答の割合
- * 2:【今後について】すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:看護師一般」⑥「看護師の実施が可能:
特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合(ただし、【現在について】で①「この医行為は
実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】は回答していない)

■医師と看護師による回答状況
(現在「看護師が実施している」という回答の割合＊)



＊すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、
②「看護師が実施している」を選択した回答の割合


■医師と看護師による回答状況
(今後「看護師の実施が可能」という回答の割合＊)



＊すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:看護師一般」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを
選択した回答の割合(ただし、【現在について】で①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、
【今後について】は回答していない)

◆施設区分別散布図:4. 訪問看護ステーション

■「現在」と「今後」に関する回答状況(看護師回答)



- *1:【現在について】すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、
②「看護師が実施している」を選択した回答の割合
- *2:【今後について】すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:看護師一般」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合(ただし、【現在について】で①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】は回答していない)