

BCG接種後の骨炎・骨髄炎（副反応）の発生状況について

資料3

● 過去9年の医療機関からの副反応報告件数（※月齢及び年齢は接種時の患者の年齢）

報告年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度 (うち平成25年度 に接種されている もの)
骨 炎、 骨 髄 炎	1	4	2	9	2	5	7	6	10(1)
3月		1	1	7	1	1	5	1	3(0)
4月		1		2	1	4	2	3	4(0)
5月								2	2(1)
6月									
7月									
8月		1							
1歳		1							
不明	1		1						1(0)

※企業からの報告については、接種時月齢の報告がないため計上していない。

● 過去9年の健康被害救済認定件数（※年度は疾病障害認定審査会で認定とされた年度、年齢は接種時の年齢）

	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度※
骨 炎、 骨 髄 炎		1	2	2	6	7	7	8	4
1～3月 齢				2	4	5	5	6	2
4～6月 齢		1			2	2	2	2	2
6～11月 齢			1						
1歳			1						
2歳以上									

※平成25年度の認定については、全て平成24年度以前の接種症例

（参考）過去8年間のBCG接種者数（単位：千人）

	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
乳幼児（1歳未満）	994	978	1,089	1,067	1,015	991	987	970	—

平成25年4月に接種時期を
生後6月未満から1歳まで（標準的には生後5～8月）に変更

BCG接種後の骨炎・骨髄炎（副反応）とワクチン接種月齢

2005年以降に医療機関から報告された症例のうち接種月齢がわかった43症例について分析

