



宮城県

脳卒中は こんな病気



脳出血


脳内の血管が破れて出血する

くも膜下出血

脳動脈瘤の破裂により出血する

脳梗塞

血管が詰まる



- 宮城県では死因の第4位※で、10人に1人が脳卒中で亡くなっている
- 65歳以上の寝たきりの主な原因となっている

※出典：令和3年度人口動態統計（厚労省）

脳卒中は突然起こります

気づいたら一刻も早く救急車を呼びましょう！



顔

ある。
ゆがみが
顔の片側が
下がり



腕

片腕に力が
入らない。
手足がしびれる。



言葉

言葉が出てこない。
口がもつれて
それつがまわらない。




体

足が思うよう
に動かない、
歩けない。



頭

経験した事
のない
激しい頭痛
がする。



目

片方の目が見えない
物が2つに見える。
視野の半分が欠ける。

迅速な受診が死亡や重い後遺症を防ぎます。

生活習慣の見直しが 予防につながります



宮城県の各状況

減塩

1日当たりの食塩摂取量は**男性9g以下、女性8g以下**を目指して、調味料はかけすぎない、ラーメンのスープは残す等を心掛けましょう。

※ 出典：みやぎ21健康プラン



全国ワースト 1位

成人男性摂取量
11.9g*

* 出典：平成28年
国民健康・栄養調査

肥満 解消

バランスの良い食事を心がけ、体重は毎日測って管理しましょう。

※ メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか2つ以上を併せ持った状態です



全国ワースト 2位

メタボリックシンドローム
該当者・予備群割合
32.6%

※ 出典：特定健康診査・
特定保健指導等に関するデータ

運動

右記の歩数を目標に、外出時はなるべく車やエレベーターを使わず歩く等、日頃から歩きましょう。

※ 出典：みやぎ21健康プラン

	男性	女性
20～64歳	9,000歩	7,000歩
65歳以上	8,500歩	6,000歩

全国ワースト 7位

成人男性歩数
6,803歩/日

* 出典：平成28年
国民健康・栄養調査

禁煙

喫煙は血圧を上昇させるため、禁煙しましょう。
禁煙外来や禁煙支援薬局などのサポートを受けることもお勧めです。



男女ともに
全国ワースト 7位

喫煙率
男性 **33.2%**
女性 **9.7%**

* 出典：令和元年
国民生活基礎調査

節酒

飲みすぎは血圧を上昇させるため、**適量**を心掛け、週2日は休肝日にしましょう。



困ったときはかかりつけ医に相談を！

脳卒中・心臓病相談窓口もご利用ください



センターでは療養やリハビリに関する情報提供や、治療に関する一般的な情報提供を行っています

詳細は脳卒中・
心臓病等総合
支援センター
ホームページへ



脳卒中・心臓病相談窓口：東北大学病院 地域医療連携センター内

TEL：022-717-8735 (平日8:30～16:00受付)

Email : scd-support@hosp.tohoku.ac.jp