

令和元年度 健康実態調査結果の報告

令和2年1月

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課

1 調査の概要	1 -
1.1 調査の目的	1 -
1.2 調査の対象	1 -
1.3 調査期間	1 -
1.4 調査項目	1 -
1.5 調査結果の活用	1 -
1.6 調査の実施状況	1 -
2 調査結果	2 -
2.1 調査の実施状況	2 -
2.2 生活習慣について	3 -
2.2.1 1日の歩行時間について	3 -
2.2.2 運動（スポーツ）頻度	4 -
2.2.3 飲酒頻度	5 -
2.2.4 喫煙状況	7 -
2.2.5 労働時間	13 -
2.2.6 野菜摂取量	14 -
2.2.7 果物類摂取量	15 -
2.2.8 効果があると思われるサプリメント・健康食品・漢方薬	16 -
2.3 健康・悩み・ストレスについて	18 -
2.3.1 日常生活での悩みやストレスの有無	18 -
2.3.2 睡眠時間	21 -
2.3.3 睡眠時間のとれている度合い	22 -
2.3.4 座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚について	23 -
2.3.5 座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動について	24 -
2.4 介護や日常生活動作の状況について	28 -
2.4.1 病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況	28 -
2.4.2 要介護認定の状況	29 -
2.4.3 介助なしでできること	33 -
2.5 この1年間の治療状況について	35 -
2.5.1 現在の受診頻度について	35 -
2.5.2 医師の方から処方を受けている	36 -
2.5.3 現在の服用（塗布）の状況（薬の対象となる病気）	37 -
2.5.4 この一年間（または前回回答以降）に新たにかかった病気	38 -
2.6 油症患者受療券（受療券）の使用状況について	39 -
2.6.1 受療券の保有状況	39 -
2.6.2 受療券を使用せずに受診したことがあるか	40 -
2.6.3 受療券を利用せずに受診した理由	41 -
2.6.4 受療券の発行について	42 -
2.6.5 受療券について連絡先への送付について	43 -
2.6.6 受療券の発行を希望しない理由	44 -
2.6.7 受療券の使用を希望する医療機関	45 -
2.7 油症検診について	47 -
2.7.1 昨年度の油症検診の受診について	47 -
2.7.2 油症検診の受診を受けなかった理由	48 -
2.8 相談体制について	50 -
2.8.1 油症相談員や相談窓口への相談経験について	50 -
2.8.2 今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容	51 -
2.9 罹患と治療状況について	52 -
2.9.1 悪性腫瘍（がん）について	52 -

2.9.2 脳・精神・神経の病気・症状について	54
2.9.3 自律神経系の病気・症状について	54
2.9.4 眼の病気・症状について	55
2.9.5 口の中の病気・症状について	55
2.9.6 耳・鼻の病気・症状について	56
2.9.7 甲状腺の病気・症状について	56
2.9.8 のど・気管支・肺の病気・症状について	57
2.9.9 心臓の病気・症状について	58
2.9.10 高血圧や血管の病気・症状について	59
2.9.11 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について	60
2.9.12 すい臓の病気・症状について	61
2.9.13 腎臓・膀胱の病気・症状について	62
2.9.14 食道・胃・腸・肛門の病気・症状について	62
2.9.15 血液・リンパの病気・症状について	63
2.9.16 前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状について（男性のみ）	64
2.9.17 子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について（女性のみ）	64
2.9.18 月経・妊娠・出産に関することについて（女性のみ）	65
2.9.19 骨・関節の病気・症状について	67
2.9.20 皮膚・爪の病気・症状について	68
2.9.21 アレルギー疾患について	69
2.9.22 膠原病について	70
2.9.23 その他の病気・症状について	71
2.10 調査票の自由記入欄について	72
別表 調査結果の性・年齢（5歳階級）別集計表	75
（再掲） 2.10 調査票の自由記入欄について	289
参考資料 調査票	289

1 調査の概要

1.1 調査の目的

平成24年9月に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が施行され、「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（厚生労働省・農林水産省告示）に基づき、カネミ油症患者の生活習慣、病状、治療内容等について把握し、カネミ油症に関する調査研究を更に推進することを目的とする。

1.2 調査の対象

各都道府県で把握している1,554人（令和元年3月31日時点の調査対象見込者数、前年度1,588人）のうち、死亡や所在不明の方、調査への御協力の同意をいただくことができなかった方を除く1,384人に調査にご協力頂いた。

1.3 調査期間

令和元年4月～8月末

1.4 調査項目

平成20年度に厚生労働省が実施した油症患者に係る健康実態調査の調査項目を元に、全国油症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）で、カネミ油症患者の意見を聞きつつ決定した生活習慣、健康状態や悩み、治療状況、これまでにかかったことのある病気・症状などの項目を調査した。

1.5 調査結果の活用

調査結果については、アンケートに基づく調査の医学的・科学的解釈の限界に留意しつつ、全国油症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）において、過去の健康実態調査及び過去の検診結果等と併せてより詳細な解析を行い、翌年度以降の健康実態調査項目などカネミ油症に関する調査研究に活用される予定である。

1.6 調査の実施状況

各都道府県で把握している1,554人の認定患者（令和元年3月31日時点の調査対象見込者数、前年度1,588人）のうち、死亡や所在不明の方、非協力の意向を示された方等を除いた1,384人（前年度1,411人）から回答を得た。

以下の報告は、本調査に回答があった1,384人（前年度1,411人）についてとりまとめたものである。

「割合」の計算において使用する分母は、表中に記載しているNの値とする。

2 調査結果

2.1 調査の実施状況

回答者の性別は、男性 656 人、女性 728 人となっている（前年度 男性 666 人、女性 745 人）。回答者の平均年齢（回答時点での申告年齢）は 66.8 歳（男性 65.7 歳、女性 67.8 歳）となっている。

男性は、「60～64 歳」の者が 17.7%（前年度 18.0%）と最も多く、次いで、「55～59 歳」が 17.5%（前年度 18.3%）、「50～54 歳」（前年度 14.1%）と「65～69 歳」（前年度 11.3%）が共に 13.4%等の順となっている。

女性は、「55～59 歳」の者が 17.3%（前年度 17.0%）と最も多く、次いで、「60～64 歳」が 15.4%（前年度 14.9%）、「65～69 歳」が 13.2%（前年度 11.3%）等の順となっている。

各集団の男女比及び年齢階級については、表 1-1、1-2、図 1-1 のとおりである。

表 1-1 回答者の男女比

	回答者 (N=1384)	
	件数	割合
男	656	47.4%
女	728	52.6%
計	1,384	100.0%

図 1-1 回答者数及び年齢階級別回答者の割合




表 1-2 回答者数及び年齢階級別回答者の割合

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
30～34歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
35歳～39歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
40歳～44歳	2	0.3%	5	0.7%	7	0.5%
45歳～49歳	27	4.1%	20	2.7%	47	3.4%
50歳～54歳	88	13.4%	76	10.4%	164	11.8%
55歳～59歳	115	17.5%	126	17.3%	241	17.4%
60歳～64歳	116	17.7%	112	15.4%	228	16.5%
65歳～69歳	88	13.4%	96	13.2%	184	13.3%
70歳～74歳	59	9.0%	71	9.8%	130	9.4%
75歳～79歳	51	7.8%	61	8.4%	112	8.1%
80歳～84歳	54	8.2%	69	9.5%	123	8.9%
85歳～89歳	44	6.7%	50	6.9%	94	6.8%
90歳以上	12	1.8%	42	5.8%	54	3.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

2.2 生活習慣について


2.2.1 1日の歩行時間について

農作業・家事などを含め1日の平均的な歩行時間についてみると、「90分以上」と回答した方が30.3%（男性26.4%、女性33.9%）（前年度 男性23.9%、女性33.0%、全体28.7%）と最も多く、次いで、「30分以上～60分未満」27.8%（男性31.1%、女性24.9%）（前年度 男性31.5%、女性25.1%、全体28.1%）、「30分未満」23.1%（男性23.2%、女性23.1%）（前年度 男性24.3%、女性24.0%、全体24.2%）、「60分以上～90分未満」18.0%（男性18.4%、女性17.6%）（前年度 男性19.8%、女性17.4%、全体18.6%）の順となっている。（表2-1、図2-1）

表2-1 1日の歩行時間

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
90分以上	173	26.4%	247	33.9%	420	30.3%
60分以上～90分未満	121	18.4%	128	17.6%	249	18.0%
30分以上～60分未満	204	31.1%	181	24.9%	385	27.8%
30分未満	152	23.2%	168	23.1%	320	23.1%
未回答	6	0.9%	4	0.5%	10	0.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図2-1 1日の歩行時間




2.2.2 運動（スポーツ）頻度

ウォーキング、ジョギング、体操も含めた運動（スポーツ）頻度をみると、「ほとんどしていない」と回答の方が44.6%（男性41.8%、女性47.1%）（前年度 男性42.8%、女性49.5%、全体46.4%）と最も多く、次いで「週2～4回程度」が20.6%（男性20.1%、女性21.0%）（前年度 男性20.4%、女性20.3%、全体20.3%）、「ほぼ毎日」が17.1%（男性19.7%、女性14.8%）（前年度 男性16.8%、女性12.8%、全体14.7%）、「週1回程度」が13.9%（男性13.7%、女性14.0%）（前年度 男性12.6%、女性13.2%、全体12.9%）、「月1回程度」が3.4%（男性4.1%、女性2.7%）（前年度 男性6.8%、女性4.0%、全体5.3%）の順となっている。（表2-2、図2-2）

表2-2 運動（スポーツ）頻度

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ほぼ毎日	129	19.7%	108	14.8%	237	17.1%
週2～4回程度	132	20.1%	153	21.0%	285	20.6%
週1回程度	90	13.7%	102	14.0%	192	13.9%
月1回程度	27	4.1%	20	2.7%	47	3.4%
ほとんどしていない	274	41.8%	343	47.1%	617	44.6%
未回答	4	0.6%	2	0.3%	6	0.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図2-2 運動（スポーツ）頻度




2.2.3 飲酒頻度

飲酒頻度をみると、「飲まない」と回答した方が53.6%（男性34.6%、女性70.7%）（前年度 男性33.5%、女性70.1%、全体52.8%）と最も多くなっている。（表2-3-1、図2-3-1）

表2-3-1 飲酒頻度

	男性(N=656)		女性(N=728)		計(N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ほぼ毎日	216	32.9%	50	6.9%	266	19.2%
週3～5回程度	78	11.9%	34	4.7%	112	8.1%
週1～2回程度	46	7.0%	44	6.0%	90	6.5%
月1～3回程度	51	7.8%	35	4.8%	86	6.2%
年1～10回程度	27	4.1%	49	6.7%	76	5.5%
飲まない	227	34.6%	515	70.7%	742	53.6%
未回答	11	1.7%	1	0.1%	12	0.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図2-3-1 飲酒頻度




飲酒をすると回答した630人（前年度 650人）の1日の飲酒量（ビール大瓶換算）についてみると、男性では「1～2本未満」が44.0%（前年度 41.5%）と最も多く、女性では「0.5～1本未満」が47.2%（前年度 50.0%）と最も多くなっている。全体では、「1～2本未満」が39.2%（男性44.0%、女性29.7%）（前年度 男性41.5%、女性28.7%、全体37.2%）と最も多く、次いで「0.5～1本未満」が31.9%（男性24.2%、女性47.2%）（前年度 男性27.0%、女性50.0%、全体34.6%）等の順となっている。（表2-3-2、図2-3-2）

表2-3-2 飲酒量

	男性(N=418)		女性(N=212)		計(N=630)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0.5本未満	16	3.8%	30	14.2%	46	7.3%
0.5～1本未満	101	24.2%	100	47.2%	201	31.9%
1～2本未満	184	44.0%	63	29.7%	247	39.2%
2～3本未満	91	21.8%	13	6.1%	104	16.5%
3～4本未満	15	3.6%	4	1.9%	19	3.0%
4～5本未満	4	1.0%	1	0.5%	5	0.8%
5～10本未満	6	1.4%	0	0.0%	6	1.0%
10本以上	1	0.2%	1	0.5%	2	0.3%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	418	100.0%	212	100.0%	630	100.0%

図2-3-2 飲酒量




2.2.4 喫煙状況

喫煙状況についてみると、「吸わない」と回答した方が62.2%（男性36.3%、女性85.6%）（前年度 男性37.5%、女性83.9%、全体62.0%）と最も多くなっている。（表2-4-1、図2-4-1）

表2-4-1 喫煙状況

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
吸う	164	25.0%	51	7.0%	215	15.5%
やめた	175	26.7%	35	4.8%	210	15.2%
吸わない	238	36.3%	623	85.6%	861	62.2%
未回答	79	12.0%	19	2.6%	98	7.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図2-4-1 喫煙状況




たばこを吸うと回答した215人（前年度 272人）の喫煙年数をみると、男性では、「40年以上」43.9%（前年度 40.2%）と最も多く、次いで「30年～40年未満」39.0%（前年度 38.3%）、「20年～30年未満」14.6%（前年度 13.4%）等の順となっている。

女性では、「30年～40年未満」52.9%（前年度 41.3%）と最も多く、次いで「20年～30年未満」19.6%（前年度27.0%）、「10年～20年未満」（前年度 14.3%）、「40年以上」（前年度 15.9%）が共に11.8%等の順となっている。（表2－4－2、図2－4－2）

表2－4－2 喫煙状況（喫煙者 喫煙年数）

	男性 (N=164)		女性 (N=51)		計 (N=215)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0～2年未満	0	0.0%	1	2.0%	1	0.5%
2年～3年未満	2	1.2%	0	0.0%	2	0.9%
3年～5年未満	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%
5年～10年未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10年～20年未満	1	0.6%	6	11.8%	7	3.3%
20年～30年未満	24	14.6%	10	19.6%	34	15.8%
30年～40年未満	64	39.0%	27	52.9%	91	42.3%
40年以上	72	43.9%	6	11.8%	78	36.3%
未回答	0	0.0%	1	2.0%	1	0.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	164	100.0%	51	100.0%	215	100.0%

図2－4－2 喫煙状況（喫煙者 喫煙年数）




たばこを吸うと回答した215人（前年度 272人）の1日の平均喫煙本数をみると、男性では「20本～30本未満」が50.6%（前年度 51.7%）と最も多く、女性は「10本～20本未満」が45.1%（前年度 49.2%）と最も多くなっている。（表2-4-3、図2-4-3）

表2-4-3 喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）

	男性 (N=164)		女性 (N=51)		計 (N=215)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1～5本未満	5	3.0%	1	2.0%	6	2.8%
5本～10本未満	9	5.5%	11	21.6%	20	9.3%
10本～20本未満	45	27.4%	23	45.1%	68	31.6%
20本～30本未満	83	50.6%	15	29.4%	98	45.6%
30本～40本未満	16	9.8%	1	2.0%	17	7.9%
40本以上	6	3.7%	0	0.0%	6	2.8%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	164	100.0%	51	100.0%	215	100.0%

図2-4-3 喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）




たばこをやめたと回答した210人（前年度244人）の喫煙年数をみると、「20年～30年未満」26.7%（男性26.3%、女性28.6%）（前年度 男性27.6%、女性22.2%、全体26.6%）と最も多く、次いで「30年～40年未満」22.4%（男性22.3%、女性22.9%）（前年度 男性22.6%、女性26.7%、全体23.4%）、「40年以上」20.5%（男性21.7%、女性14.3%）（前年度 男性20.1%、女性15.6%、全体19.3%）等の順となっている。（表2-4-4、図2-4-4）

表2-4-4 喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）

	男性 (N=175)		女性 (N=35)		計 (N=210)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0～2年未満	2	1.1%	0	0.0%	2	1.0%
2年～3年未満	3	1.7%	0	0.0%	3	1.4%
3年～5年未満	4	2.3%	2	5.7%	6	2.9%
5年～10年未満	11	6.3%	4	11.4%	15	7.1%
10年～20年未満	30	17.1%	4	11.4%	34	16.2%
20年～30年未満	46	26.3%	10	28.6%	56	26.7%
30年～40年未満	39	22.3%	8	22.9%	47	22.4%
40年以上	38	21.7%	5	14.3%	43	20.5%
未回答	2	1.1%	2	5.7%	4	1.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	175	100.0%	35	100.0%	210	100.0%

図2-4-4 喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）




たばこをやめたと回答した210人（前年度244人）の過去の喫煙本数をみると、男性は「20本～30本未満」52.0%（前年度52.3%）が最も多く、次いで「10本～20本未満」16.6%（前年度13.6%）、「30本～40本未満」14.9%（前年度11.1%）等の順となっている。

女性は「10本～20本未満」62.9%（前年度37.8%）が最も多く、次いで「20本～30本未満」25.7%（前年度35.6%）、「5本～10本未満」（前年度8.9%）、「30本～40本未満」（前年度2.2%）が共に5.7%等の順となっている。（表2-4-5、図2-4-5）

表2-4-5 喫煙状況（卒煙者 喫煙本数）

	男性(N=175)		女性(N=35)		計(N=210)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1～5本未満	3	1.7%	0	0.0%	3	1.4%
5本～10本未満	5	2.9%	2	5.7%	7	3.3%
10本～20本未満	29	16.6%	22	62.9%	51	24.3%
20本～30本未満	91	52.0%	9	25.7%	100	47.6%
30本～40本未満	26	14.9%	2	5.7%	28	13.3%
40本以上	21	12.0%	0	0.0%	21	10.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	175	100.0%	35	100.0%	210	100.0%

図2-4-5 喫煙状況（卒煙者 喫煙本数）




たばこをやめたと回答した210人（前年度244人）が何年前に卒煙したかについてみると、男性は「10年～15年未満」21.1%（前年度 21.6%）が最も多く、次いで「30年以上」18.9%（前年度 22.6%）、「15年～20年未満」17.1%（前年度 12.1%）、「5年～10年未満」12.6%（前年度 17.1%）等の順となっている。

女性では「20年～30年未満」20.0%（前年度 17.8%）が最も多く、次いで「5年～10年未満」17.1%（前年度 11.1%）、「15年～20年」14.3%（前年度 6.7%）等の順となっている。（表2-4-6、図2-4-6）

表2-4-6 喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）

	男性 (N=175)		女性 (N=35)		計 (N=210)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1年未満	4	2.3%	2	5.7%	6	2.9%
1～2年未満	11	6.3%	1	2.9%	12	5.7%
2年～3年未満	5	2.9%	1	2.9%	6	2.9%
3年～4年未満	5	2.9%	4	11.4%	9	4.3%
4年～5年未満	6	3.4%	4	11.4%	10	4.8%
5年～10年未満	22	12.6%	6	17.1%	28	13.3%
10年～15年未満	37	21.1%	4	11.4%	41	19.5%
15年～20年未満	30	17.1%	5	14.3%	35	16.7%
20年～30年未満	21	12.0%	7	20.0%	28	13.3%
30年以上	33	18.9%	1	2.9%	34	16.2%
未回答	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	175	100.0%	35	100.0%	210	100.0%

図2-4-6 喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）



2.2.5 労働時間


労働時間についてみると、「4時間未満」と回答した方が33.9%と最も多く（男性32.5%、女性35.2%）（前年度 男性31.1%、女性35.6%、全体33.5%）、次いで男性は「8時間以上9時間未満」が21.0%（前年度 20.7%）、「9時間以上10時間未満」が11.7%（前年度 12.2%）等の順となっている。

女性は「4時間以上5時間未満」12.4%（前年度 10.5%）、「10時間以上」11.7%（前年度 12.2%）等の順となっている。（表2-5、図2-5）

表2-5 労働時間

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
10時間以上	73	11.1%	85	11.7%	158	11.4%
9時間以上10時間未満	77	11.7%	69	9.5%	146	10.5%
8時間以上9時間未満	138	21.0%	52	7.1%	190	13.7%
7時間以上8時間未満	60	9.1%	49	6.7%	109	7.9%
6時間以上7時間未満	24	3.7%	52	7.1%	76	5.5%
5時間以上6時間未満	20	3.0%	73	10.0%	93	6.7%
4時間以上5時間未満	36	5.5%	90	12.4%	126	9.1%
4時間未満	213	32.5%	256	35.2%	469	33.9%
未回答	15	2.3%	2	0.3%	17	1.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図2-5 労働時間



2.2.6 野菜摂取量


野菜摂取量についてみると、「70g以上140g未満（1～2つ）」と回答した方が29.9%と最も多く（男性30.6%、女性29.3%）（前年度 男性36.5%、女性29.3%、全体32.7%）、次いで男性は「70g未満（1つ未満）」26.4%（前年度 23.3%）、「140g以上210g未満（2～3つ）」22.4%（前年度 18.6%）等の順となっている。

女性は「140g以上210g未満（2～3つ）」が22.0%（前年度 24.4%）、「210g以上270g未満（3～4つ）」19.4%（前年度 17.6%）等の順となっている。（表2-6、図2-6）

表2-6 野菜摂取量

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
70g未満(1つ未満)	173	26.4%	110	15.1%	283	20.4%
70g以上140g未満(1～2つ)	201	30.6%	213	29.3%	414	29.9%
140g以上210g未満(2～3つ)	147	22.4%	160	22.0%	307	22.2%
210g以上270g未満(3～4つ)	76	11.6%	141	19.4%	217	15.7%
270g以上350g未満(4～5つ)	30	4.6%	61	8.4%	91	6.6%
350g以上(5つ以上)	20	3.0%	37	5.1%	57	4.1%
未回答	9	1.4%	6	0.8%	15	1.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図2-6 野菜摂取量




2.2.7 果物類摂取量

果物摂取量についてみると、「50g未満」と回答した方が46.7%（男性55.6%、女性38.6%）（前年度 男性58.3%、女性43.2%、全体50.3%）と最も多く、次いで「50g以上100g未満」が29.8%（男性25.5%、女性33.8%）（前年度 男性22.2%、女性30.7%、全体26.7%）、「100g以上150g未満」が16.3%（男性12.3%、女性19.9%）（前年度 男性14.3%、女性17.0%、全体15.7%）等の順となっている。（表2-7、図2-7）

表2-7 果物類摂取

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
50g未満	365	55.6%	281	38.6%	646	46.7%
50g以上100g未満	167	25.5%	246	33.8%	413	29.8%
100g以上150g未満	81	12.3%	145	19.9%	226	16.3%
150g以上	29	4.4%	48	6.6%	77	5.6%
未回答	14	2.1%	8	1.1%	22	1.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図2-7 果物類摂取




2.2.8 効果があると思われるサプリメント・健康食品・漢方薬

効果があると思われるサプリメント・健康食品・漢方薬の有無についてみると、「ある」と回答した方は17.1%（男性13.7%、女性20.2%）（前年度 男性17.0%、女性18.5%、全体17.8%）となっている。（表2-8-1、図2-8-1）

表2-8-1 効果があると思われるサプリメント・健康食品・漢方薬

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	90	13.7%	147	20.2%	237	17.1%
ない	536	81.7%	560	76.9%	1096	79.2%
未回答	30	4.6%	21	2.9%	51	3.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図2-8-1 効果があると思われるサプリメント・健康食品・漢方薬



また、効果があると思われるサプリメント・健康食品・漢方薬があると回答した235人から具体的な品目名について回答があった。「ビタミン」が48件と最も多く、次いで、「漢方薬」が27件、「青汁」が27件、「にんにく」が21件、「黒酢」が16件等の順となっている。（表2-8-2）

表2-8-2 効果があると思われるサプリメント・健康食品・漢方薬（上位品目）

	計
ビタミン	48
漢方薬	27
青汁	24
にんにく	21
黒酢	16
酵素	12
グルコサミン	11
DHA&EPA	10
ブルーベリー	10
ルテイン	7
カルシウム	6
ブルーベリー&ルテイン	6
プロポリス	6
ローヤルゼリー	6
鉄分	6
その他	193

（上記のうち、漢方薬の内訳）

	計
葛根湯（カッコントウ）	5
桂枝茯苓丸料（ケイシブクリョウガン）	4
人參養榮湯（ニンジンヨウエイトウ）	2
芍薬甘草湯（シャクヤクカンゾウトウ）	2
ヨクイニン末	1
加味逍遙散（カミショウヨウサン）	1
牛車腎気丸（ゴシャジンキガン）	1
柴胡加竜骨牡蛎湯（サイコカリュウコツボレイトウ）	1
十全大補湯（ジュウゼンタイホトウ）	1
潤腸湯（ジュンチョウトウ）	1
清肺湯（セイハイトウ）	1
大建中湯（ダイケンチュウトウ）	1
大柴胡湯（ダイサイコトウ）	1
猪苓湯（チョレイトウ）	1
麦門冬湯（バクモンドウトウ）	1
半夏白朮天麻湯（ハンゲビャクジュツテンマトウ）	1
半夏瀉心湯（ハンゲシャシントウ）	1
補中益気湯（ホチュウエキトウ）	1

2.3 健康・悩み・ストレスについて


2.3.1 日常生活での悩みやストレスの有無

日常生活での悩みやストレスの有無について、「ある」と回答した方が1000人（72.3%）男性434人（66.2%）、女性566人（77.7%）（前年度 男性451人（67.7%）、女性581人（78.0%）、全体1,032人（73.1%））となっている。（表3-1-1、図3-1-1）

表3-1-1 日常生活での悩みやストレス

	男性(N=656)		女性(N=728)		計(N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	434	66.2%	566	77.7%	1,000	72.3%
ない	205	31.3%	141	19.4%	346	25.0%
未回答	17	2.6%	21	2.9%	38	2.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図3-1-1 日常生活での悩みやストレス



日常生活での悩みやストレスが「ある」と回答した1000人（男性434人、女性566人）（前年度 男性451人、女性581人、全体1,032人）を対象に、悩みやストレスの原因を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が57.5%と最も多く（男性53.5%、女性60.6%）（前年度 男性55.4%、女性60.6%、全体58.3%）、次いで「家族の病気や介護」36.3%（男性30.9%、女性40.5%）（前年度 男性30.8%、女性36.8%、全体34.2%）、「収入・家計・借金等」33.9%（男性37.8%、女性30.9%）（前年度 男性37.9%、女性34.3%、全体35.9%）、「自分の仕事」29.3%（男性38.7%、女性22.1%）（前年度 男性40.4%、女性25.6%、全体32.1%）、「家族以外との人間関係」22.2%（男性24.2%、女性20.7%）（前年度 男性23.3%、女性23.9%、全体23.6%）等の順となっている。（表3-1-2）

表3-1-2 悩みやストレスの原因（複数回答）

	男性 (N=434)		女性 (N=566)		計 (N=1000)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
家族との人間関係	75	17.3%	144	25.4%	219	21.9%
家族以外との人間関係	105	24.2%	117	20.7%	222	22.2%
恋愛・性に関すること	6	1.4%	3	0.5%	9	0.9%
結婚	8	1.8%	7	1.2%	15	1.5%
離婚	1	0.2%	5	0.9%	6	0.6%
いじめ、セクハラ	6	1.4%	7	1.2%	13	1.3%
生きがいに関すること	77	17.7%	116	20.5%	193	19.3%
自由にできる時間がない	35	8.1%	38	6.7%	73	7.3%
収入・家計・借金等	164	37.8%	175	30.9%	339	33.9%
自分の病気や介護	232	53.5%	343	60.6%	575	57.5%
家族の病気や介護	134	30.9%	229	40.5%	363	36.3%
妊娠・出産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
育児	2	0.5%	1	0.2%	3	0.3%
家事	17	3.9%	74	13.1%	91	9.1%
自分の学業・受験・進学	2	0.5%	2	0.4%	4	0.4%
子どもの教育	20	4.6%	17	3.0%	37	3.7%
自分の仕事	168	38.7%	125	22.1%	293	29.3%
家族の仕事	35	8.1%	74	13.1%	109	10.9%
住まいや生活環境	28	6.5%	74	13.1%	102	10.2%
その他	19	4.4%	34	6.0%	53	5.3%
わからない	3	0.7%	13	2.3%	16	1.6%
未回答	7	1.6%	2	0.4%	9	0.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	1144	-	1,600	-	2,744	-

また、上記の悩みやストレスの原因のうち、最も気になる原因を質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が34.9%（男性29.3%、女性39.2%）（前年度 男性32.4%、女性35.1%、全体33.9%）と最も多く、次いで「収入・家計・借金等」13.5%（男性16.6%、女性11.1%）（前年度 男性16.2%、女性12.7%、全体14.2%）等の順となっている。（表3-1-3）

表3-1-3 悩みやストレスの最も気になる原因

	男性 (N=434)		女性 (N=566)		計 (N=1000)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
家族との人間関係	14	3.2%	32	5.7%	46	4.6%
家族以外との人間関係	21	4.8%	26	4.6%	47	4.7%
恋愛・性に関すること	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
結婚	1	0.2%	1	0.2%	2	0.2%
離婚	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
いじめ、セクハラ	3	0.7%	1	0.2%	4	0.4%
生きがいに関すること	13	3.0%	11	1.9%	24	2.4%
自由にできる時間がない	5	1.2%	8	1.4%	13	1.3%
収入・家計・借金等	72	16.6%	63	11.1%	135	13.5%
自分の病気や介護	127	29.3%	222	39.2%	349	34.9%
家族の病気や介護	43	9.9%	82	14.5%	125	12.5%
妊娠・出産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
育児	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
家事	0	0.0%	3	0.5%	3	0.3%
自分の学業・受験・進学	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
子どもの教育	5	1.2%	2	0.4%	7	0.7%
自分の仕事	73	16.8%	40	7.1%	113	11.3%
家族の仕事	6	1.4%	8	1.4%	14	1.4%
住まいや生活環境	5	1.2%	11	1.9%	16	1.6%
その他	8	1.8%	19	3.4%	27	2.7%
わからない	2	0.5%	6	1.1%	8	0.8%
未回答	35	8.1%	30	5.3%	65	6.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	434	100.0%	566	100.0%	1,000	100.0%

※なお、複数回答されたものは最初の記載を有効とした。


2.3.2 睡眠時間

睡眠時間についてみると、「6時間以上～7時間未満」が34.0%（男性36.0%、女性32.3%）（前年度 男性34.8%、女性32.8%、全体33.7%）と最も多く、次いで「5時間以上～6時間未満」23.8%（男性21.0%、女性26.2%）（前年度 男性20.1%、女性27.1%、全体23.8%）、「7時間以上～8時間未満」18.6%（男性20.1%、女性17.2%）（前年度 男性20.0%、女性16.2%、全体18.0%）等の順となっている。（表3-2、図3-2）

表3-2 睡眠時間

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
9時間以上	34	5.2%	40	5.5%	74	5.3%
8時間以上～9時間未満	69	10.5%	57	7.8%	126	9.1%
7時間以上～8時間未満	132	20.1%	125	17.2%	257	18.6%
6時間以上～7時間未満	236	36.0%	235	32.3%	471	34.0%
5時間以上～6時間未満	138	21.0%	191	26.2%	329	23.8%
5時間未満	45	6.9%	78	10.7%	123	8.9%
未回答	2	0.3%	2	0.3%	4	0.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図3-2 睡眠時間




2.3.3 睡眠時間のとれている度合い

睡眠時間のとれている度合いについてみると、「夜間、睡眠途中で目が覚めて困った。」が45.0%（男性42.1%、女性47.7%）（前年度 男性25.2%、女性22.8%、全体24.0%）と最も多く、次いで「日中、眠気を感じた。」が41.8%（男性39.6%、女性43.7%）（前年度 男性6.9%、女性8.7%、全体7.9%）、「睡眠全体の質に満足できなかった。」が31.1%（男性30.0%、女性32.0%）（前年度 男性6.8%、女性2.4%、全体4.5%）等の順となっている。（表3-3、図3-3）

表3-3 睡眠時間のとれている度合い（複数回答）

	男性(N=656)		女性(N=728)		計(N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
寝付き（布団に入ってから眠るまでに要する時間）に、時間がかった。	152	23.2%	238	32.7%	390	28.2%
夜間、睡眠途中で目が覚めて困った。	276	42.1%	347	47.7%	623	45.0%
起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった。	209	31.9%	211	29.0%	420	30.3%
睡眠時間が足りなかった。	130	19.8%	151	20.7%	281	20.3%
睡眠全体の質に満足できなかった。	197	30.0%	233	32.0%	430	31.1%
日中、眠気を感じた。	260	39.6%	318	43.7%	578	41.8%
上記のようなことはなかった。	129	19.7%	107	14.7%	236	17.1%
未回答	13	2.0%	10	1.4%	23	1.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	1366	-	1615	-	2,981	-

図3-3 睡眠時間のとれている度合い（複数回答）



2.3.4 座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚について


座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚があるかについてみると男性は「いいえ」が56.3%、「はい」が41.9%となっている。

女性は「はい」が49.6%、「いいえ」が48.5%となっている。（表3-4、図3-4）

表3-4 座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚があるか

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	275	41.9%	361	49.6%	636	46.0%
いいえ	369	56.3%	353	48.5%	722	52.2%
未回答	12	1.8%	14	1.9%	26	1.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図3-4 座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚があるか




2.3.5 座っているとき、または横になっている間に足を動かす必要性、または動かしたい衝動について

座っているとき、または横になっている間に足を動かす必要性、または動かしたい衝動があるか、またはこれまでにあったかについては「いいえ」が55.0%（男性56.7%、女性53.4%）、「はい」が39.1%（男性38.0%、女性40.1%）となっている。（表3-5-1、図3-5-1）

表3-5-1 座っているとき、または横になっている間に足を動かす必要性、または動かしたい衝動があるか

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	249	38.0%	292	40.1%	541	39.1%
いいえ	372	56.7%	389	53.4%	761	55.0%
未回答	35	5.3%	47	6.5%	82	5.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図3-5-1 座っているとき、または横になっている間に足を動かす必要性、または動かしたい衝動があるか




座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚について「はい」、または座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動について「はい」と回答した685人の、休んでいるとき（座っているとき、または横になっているとき）と、体を動かしているときのどちらでこのように感じやすいかについては、「休んでいるとき」が48.2%（男性49.3%、女性47.2%）が最も多く、次いで「両方」が35.0%（男性32.9%、女性36.7%）、「横になっているとき」が8.8%（男性10.2%、女性7.6%）等の順となっている。（表3-5-2、図3-5-2）

表3-5-2 休んでいるとき（座っているとき、または横になっているとき）と、
体を動かしているときのどちらでこのように感じやすいか

	男性 (N=304)		女性 (N=381)		計 (N=685)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
休んでいるとき	150	49.3%	180	47.2%	330	48.2%
横になっているとき	31	10.2%	29	7.6%	60	8.8%
両方	100	32.9%	140	36.7%	240	35.0%
わからない	15	4.9%	27	7.1%	42	6.1%
未回答	8	2.6%	5	1.3%	13	1.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	304	100.0%	381	100.0%	685	100.0%

図3-5-2 休んでいるとき（座っているとき、または横になっているとき）と、
体を動かしているときのどちらでこのように感じやすいか




座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚について「はい」、または座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動について「はい」と回答した685人の、このような感じがするときに起き上がったたり、動き回ったりすると、実際に動き続けているあいだは、その感じはいくらかでも軽くなるかについてみると「はい」が26.6%（男性26.5%、女性26.6%）が最も多く、男性は「わからない」が9.6%、「いいえ」が9.0%等の順となっている。

女性は「いいえ」が12.6%、「わからない」が11.8%等の順となっている。（表3-5-3、図3-5-3）

表3-5-3 このような感じがするときに起き上がったたり、動き回ったりすると、実際に動き続けているあいだは、その感じはいくらかでも軽くなるか

	男性 (N=304)		女性 (N=381)		計 (N=685)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	174	26.5%	194	26.6%	368	26.6%
いいえ	59	9.0%	92	12.6%	151	10.9%
わからない	63	9.6%	86	11.8%	149	10.8%
未回答	8	1.2%	9	1.2%	17	1.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	304	19.8%	381	25.7%	685	22.9%

図3-5-3 このような感じがするときに起き上がったたり、動き回ったりすると、実際に動き続けているあいだは、その感じはいくらかでも軽くなるか




座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚について「はい」、または座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動について「はい」と回答した685人の、脚のこの感じは1日のうちどの時間帯でもっとも起こりやすいかについては、「夜」が40.4%（男性41.4%、女性39.6%）が最も多く、次いで「すべての時間帯でほぼ同じ」が29.9%（男性26.6%、女性32.5%）、「朝」が16.4%（男性18.8%、女性14.4%）等の順となっている。（表3-5-4、図3-5-4）

表3-5-4 脚のこの感じは1日のうちどの時間帯でもっとも起こりやすいか（複数回答）

	男性 (N=304)		女性 (N=381)		計 (N=685)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
朝	57	18.8%	55	14.4%	112	16.4%
日中	42	13.8%	68	17.8%	110	16.1%
午後	20	6.6%	17	4.5%	37	5.4%
夕方	38	12.5%	52	13.6%	90	13.1%
夜	126	41.4%	151	39.6%	277	40.4%
すべての時間帯でほぼ同じ	81	26.6%	124	32.5%	205	29.9%
未回答	6	2.0%	9	2.4%	15	2.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	370	-	476	-	846	-

図3-5-4 脚のこの感じは1日のうちどの時間帯でもっとも起こりやすいか（複数回答）



2.4 介護や日常生活動作の状況について


2.4.1 病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況

病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況についてみると、6.9%（男性4.9%、女性8.7%）（前年度 男性3.0%、女性9.1%、全体6.2%）の者が入院中もしくは入所中となっている。（表4-1、図4-1）

表4-1 病院、診療所への入院、または介護施設への入所状況

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	32	4.9%	63	8.7%	95	6.9%
いいえ	621	94.7%	663	91.1%	1,284	92.8%
未回答	3	0.5%	2	0.3%	5	0.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図4-1 病院、診療所への入院、または介護施設への入所状況




2.4.2 要介護認定の状況

要介護認定の状況についてみると、40歳未満の回答者を除いた1384人（男性656人、女性728人）（前年度 男性666人、女性743人、全体1,409人）のうち、170人（12.3%）（男性56人（8.5%）、女性114人（15.7%））（前年度 173人（12.3%）、男性57人（8.6%）、女性116人（15.6%））の者が要介護認定を受けていた。（表4-2-1、図4-2-1）

表4-2-1 要介護認定の状況

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
受けている	56	8.5%	114	15.7%	170	12.3%
受けていない	587	89.5%	600	82.4%	1,187	85.8%
未回答	13	2.0%	14	1.9%	27	2.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図4-2-1 要介護認定の状況




要介護認定を受けている170人（前年度 173人）の調査日時点の要介護度の分布は、男性は「要支援2」が23.2%（前年度 35.1%）と最も多く、次いで「要支援1」が19.6%（前年度 14.0%）、「要介護2」が17.9%（前年度 17.5%）等の順となっている。

女性は「要支援1」が17.5%（前年度 15.5%）と最も多く、次いで「要介護2」が16.7%（前年度 11.2%）、「要介護1」が15.8%（前年度 15.5%）等の順となっている。（表4-2-2、図4-2-2）

表4-2-2 要介護認定を受けている場合の要介護度の状況

	男性 (N=56)		女性 (N=114)		計 (N=170)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
要支援1	11	19.6%	20	17.5%	31	18.2%
要支援2	13	23.2%	17	14.9%	30	17.6%
要介護1	8	14.3%	18	15.8%	26	15.3%
要介護2	10	17.9%	19	16.7%	29	17.1%
要介護3	5	8.9%	14	12.3%	19	11.2%
要介護4	6	10.7%	16	14.0%	22	12.9%
要介護5	2	3.6%	10	8.8%	12	7.1%
未回答	1	1.8%	0	0.0%	1	0.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	56	100.0%	114	100.0%	170	100.0%

表4-2-2 要介護認定を受けている場合の要介護度の状況




要介護認定を受けている170人（前年度 173人）の現在利用している介護保険サービス状況についてみると、男性は「通所介護（デイサービス）」が28.1%（前年度 37.0%）と最も多く、次いで「利用していない」18.8%（前年度 13.7%）、「ホームヘルパーの訪問介護・訪問看護」16.1%（前年度 19.3%）等の順となっている。

女性は「通所介護（デイサービス）」が27.2%（前年度 23.0%）と最も多く、次いで「ホームヘルパーの訪問介護・訪問看護」22.4%（前年度 26.7%）、「通所リハビリテーション」10.8%（前年度 6.5%）等の順となっている。（表4-2-3、図4-2-3）

表4-2-3 現在利用している介護保険サービスの状況（複数回答）

	男性 (N=56)		女性 (N=114)		計 (N=170)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ホームヘルパーの 訪問介護・訪問看護	9	16.1%	29	25.4%	38	22.4%
通所介護 (デイサービス)	18	28.1%	40	26.8%	58	27.2%
通所リハビリテーション	10	15.6%	13	8.7%	23	10.8%
短期入所生活介護	1	1.6%	5	3.4%	6	2.8%
有料老人ホーム	1	1.6%	12	8.1%	13	6.1%
認知症共同生活介護施設への 入所	2	3.1%	7	4.7%	9	4.2%
特別養護老人ホーム	3	4.7%	19	12.8%	22	10.3%
介護老人保健施設	3	4.7%	6	4.0%	9	4.2%
その他	4	6.3%	7	4.7%	11	5.2%
利用していない	12	18.8%	9	6.0%	21	9.9%
未回答	1	1.6%	2	1.3%	3	1.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	64	-	149	-	213	-

図4-2-3 現在利用している介護保険サービスの状況（複数回答）



要介護認定を受けている 170 人（前年度 173 人）について、介護が必要となった原因についてみると、男性は「脳血管疾患」が 23.2%（前年度 31.6%）と最も多く、次いで「骨折・転倒」17.9%（前年度 5.3%）、「心臓疾患」（前年度 15.8%）、「糖尿病」（前年度 5.3%）、「高齢による衰弱」（前年度 26.3%）がすべて 16.1%等の順となっている。

女性は「骨折・転倒」38.6%（前年度 32.8%）と最も多く、次いで「認知症」35.1%（前年度 32.8%）、「高齢による衰弱」28.1%（前年度 25.9%）等の順となっている。（表 4-2-4）

表 4-2-4 要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因（複数回答）

	男性 (N=56)		女性 (N=114)		計 (N=170)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳血管疾患	13	23.2%	15	13.2%	28	16.5%
心臓疾患	9	16.1%	23	20.2%	32	18.8%
がん	7	12.5%	4	3.5%	11	6.5%
呼吸器疾患	4	7.1%	9	7.9%	13	7.6%
関節疾患	8	14.3%	28	24.6%	36	21.2%
認知症	8	14.3%	40	35.1%	48	28.2%
糖尿病	9	16.1%	12	10.5%	21	12.4%
パーキンソン病	4	7.1%	5	4.4%	9	5.3%
視覚・聴覚障害	4	7.1%	9	7.9%	13	7.6%
骨折・転倒	10	17.9%	44	38.6%	54	31.8%
脊髄損傷	4	7.1%	5	4.4%	9	5.3%
高齢による衰弱	9	16.1%	32	28.1%	41	24.1%
その他	7	12.5%	7	6.1%	14	8.2%
わからない	0	0.0%	3	2.6%	3	1.8%
未回答	10	17.9%	7	6.1%	17	10.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	106	-	243	-	349	-

要介護認定を受けている170人（前年度 173人）について、要介護認定を受けた原因のうち、主たる原因については、男性では「心臓疾患」が11人（19.6%）（前年度 15人（26.3%））と最も多く、女性は「認知症」が29人（25.4%）（前年度 27人（23.3%））と最も多くなっている。（表 4-2-5）

表 4-2-5 要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因

	男性 (N=56)		女性 (N=114)		計 (N=170)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳血管疾患	11	19.6%	10	8.8%	21	12.4%
心臓疾患	4	7.1%	7	6.1%	11	6.5%
がん	2	3.6%	1	0.9%	3	1.8%
呼吸器疾患	0	0.0%	3	2.6%	3	1.8%
関節疾患	3	5.4%	14	12.3%	17	10.0%
認知症	7	12.5%	29	25.4%	36	21.2%
パーキンソン病	0	0.0%	3	2.6%	3	1.8%
糖尿病	1	1.8%	2	1.8%	3	1.8%
視覚・聴覚障害	0	0.0%	1	0.9%	1	0.6%
骨折・転倒	2	3.6%	17	14.9%	19	11.2%
脊髄損傷	3	5.4%	0	0.0%	3	1.8%
高齢による衰弱	6	10.7%	10	8.8%	16	9.4%
その他	3	5.4%	4	3.5%	7	4.1%
わからない	0	0.0%	1	0.9%	1	0.6%
未回答	14	25.0%	12	10.5%	26	15.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	56	100.0%	114	100.0%	170	100.0%

※複数回答されたものは最初の記載を有効とした。

2.4.3 介助なしでできること

介助なしで行うことができるものについてみると、全ての項目において男性は約85%以上（前年度 約80%以上）の方が、女性は約75%以上（前年度 70%以上）の方が「介助なしに自分で行うことができる」と回答した。（表4－3）

表4－3 介助なしでできること（複数回答）

	男性 (N=656)										
	介助なしに自分で 行うことができ る		介助や支えがあ ればできる		介助や支えが あってもできな い		無回答		不詳		計
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	617	94.1%	14	2.1%	5	0.8%	20	3.0%	0	0.0%	656
口腔清拭	618	94.2%	17	2.6%	2	0.3%	19	2.9%	0	0.0%	656
身体的清拭	603	91.9%	22	3.4%	11	1.7%	20	3.0%	0	0.0%	656
洗髪	607	92.5%	19	2.9%	11	1.7%	19	2.9%	0	0.0%	656
着替	608	92.7%	23	3.5%	6	0.9%	19	2.9%	0	0.0%	656
入浴	600	91.5%	26	4.0%	11	1.7%	19	2.9%	0	0.0%	656
体位交換・起居	620	94.5%	12	1.8%	5	0.8%	19	2.9%	0	0.0%	656
排泄	617	94.1%	14	2.1%	6	0.9%	19	2.9%	0	0.0%	656
食事の準備・後始末	577	88.0%	26	4.0%	34	5.2%	19	2.9%	0	0.0%	656
食事	622	94.8%	13	2.0%	3	0.5%	18	2.7%	0	0.0%	656
服薬	608	92.7%	27	4.1%	2	0.3%	19	2.9%	0	0.0%	656
散歩	584	89.0%	33	5.0%	20	3.0%	19	2.9%	0	0.0%	656
清掃	577	88.0%	23	3.5%	36	5.5%	20	3.0%	0	0.0%	656
洗濯	573	87.3%	27	4.1%	36	5.5%	20	3.0%	0	0.0%	656
買い物	577	88.0%	29	4.4%	30	4.6%	20	3.0%	0	0.0%	656
日常会話	612	93.3%	19	2.9%	6	0.9%	19	2.9%	0	0.0%	656

	女性 (N=728)										
	介助なしに自分で 行うことができ る		介助や支えがあ ればできる		介助や支えが あってもできな い		無回答		不詳		計
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	657	90.2%	32	4.4%	17	2.3%	22	3.0%	0	0.0%	728
口腔清拭	659	90.5%	37	5.1%	11	1.5%	21	2.9%	0	0.0%	728
身体的清拭	631	86.7%	46	6.3%	30	4.1%	21	2.9%	0	0.0%	728
洗髪	626	86.0%	41	5.6%	40	5.5%	21	2.9%	0	0.0%	728
着替	638	87.6%	48	6.6%	21	2.9%	21	2.9%	0	0.0%	728
入浴	619	85.0%	58	8.0%	28	3.8%	23	3.2%	0	0.0%	728
体位交換・起居	671	92.2%	21	2.9%	15	2.1%	21	2.9%	0	0.0%	728
排泄	658	90.4%	30	4.1%	19	2.6%	21	2.9%	0	0.0%	728
食事の準備・後始末	602	82.7%	44	6.0%	59	8.1%	23	3.2%	0	0.0%	728
食事	667	91.6%	31	4.3%	9	1.2%	21	2.9%	0	0.0%	728
服薬	646	88.7%	47	6.5%	12	1.6%	23	3.2%	0	0.0%	728
散歩	602	82.7%	62	8.5%	42	5.8%	22	3.0%	0	0.0%	728
清掃	591	81.2%	39	5.4%	75	10.3%	23	3.2%	0	0.0%	728
洗濯	599	82.3%	43	5.9%	64	8.8%	22	3.0%	0	0.0%	728
買い物	579	79.5%	57	7.8%	70	9.6%	22	3.0%	0	0.0%	728
日常会話	658	90.4%	36	4.9%	12	1.6%	22	3.0%	0	0.0%	728

	計 (N=1384)										
	介助なしに自分で 行うことができる		介助や支えがあ ればできる		介助や支えが あってもできな い		無回答		不詳		計
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	1,274	92.1%	46	3.3%	22	1.6%	42	3.0%	0	0.0%	1,384
口腔清拭	1,277	92.3%	54	3.9%	13	0.9%	40	2.9%	0	0.0%	1,384
身体の清拭	1,234	89.2%	68	4.9%	41	3.0%	41	3.0%	0	0.0%	1,384
洗髪	1,233	89.1%	60	4.3%	51	3.7%	40	2.9%	0	0.0%	1,384
着替	1,246	90.0%	71	5.1%	27	2.0%	40	2.9%	0	0.0%	1,384
入浴	1,219	88.1%	84	6.1%	39	2.8%	42	3.0%	0	0.0%	1,384
体位交換・起居	1,291	93.3%	33	2.4%	20	1.4%	40	2.9%	0	0.0%	1,384
排泄	1,275	92.1%	44	3.2%	25	1.8%	40	2.9%	0	0.0%	1,384
食事の準備・後始末	1,179	85.2%	70	5.1%	93	6.7%	42	3.0%	0	0.0%	1,384
食事	1,289	93.1%	44	3.2%	12	0.9%	39	2.8%	0	0.0%	1,384
服薬	1,254	90.6%	74	5.3%	14	1.0%	42	3.0%	0	0.0%	1,384
散歩	1,186	85.7%	95	6.9%	62	4.5%	41	3.0%	0	0.0%	1,384
清掃	1,168	84.4%	62	4.5%	111	8.0%	43	3.1%	0	0.0%	1,384
洗濯	1,172	84.7%	70	5.1%	100	7.2%	42	3.0%	0	0.0%	1,384
買い物	1,156	83.5%	86	6.2%	100	7.2%	42	3.0%	0	0.0%	1,384
日常会話	1,270	91.8%	55	4.0%	18	1.3%	41	3.0%	0	0.0%	1,384

2.5 この1年間の治療状況について


2.5.1 現在の受診頻度について

現在の受診頻度についてみると、「毎月1～3 回程度」が45.8%と最も多く（男性44.7%、女性46.8%）（前年度 男性45.2%、女性51.3%、全体48.4%）、次いで「数か月に1 回程度」が23.7%（男性23.9%、女性23.5%）（前年度 男性27.3%、女性25.4%、全体26.3%）等の順となっている。（表5－1、図5－1）

表5－1 受診頻度

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院中	14	2.1%	14	1.9%	28	2.0%
施設入所中で医療的ケアを受けている	8	1.2%	24	3.3%	32	2.3%
毎週1回以上	32	4.9%	61	8.4%	93	6.7%
毎月1～3回	293	44.7%	341	46.8%	634	45.8%
数か月に1回程度	157	23.9%	171	23.5%	328	23.7%
受診していない	129	19.7%	108	14.8%	237	17.1%
未回答	23	3.5%	9	1.2%	32	2.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1384	100.0%

図5－1 受診頻度




2.5.2 医師の方から処方を受けている

この1年間に医師の方から処方を受けた内容を見ると、何らかの処方を受けていると回答した方は963人（69.6%）男性429人（65.4%）、女性534人（73.4%）（前年度 男性446人（67.0%）、女性550人（73.8%）、全体996人（70.6%））となっている。（表5－2、図5－2）

表5－2 医師の方から処方を受けている

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
受けている	429	65.4%	534	73.4%	963	69.6%
受けていない	197	30.0%	175	24.0%	372	26.9%
未回答	30	4.6%	19	2.6%	49	3.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図5－2 医師の方から処方を受けている




2.5.3 現在の服用（塗布）の状況（薬の対象となる病気）

現在医師の処方により継続して飲んでいる（塗っている）薬の対象となる病気の内容をみると、「高血圧症」との回答が547件と最も多く、次いで「鎮痛・消炎」が210件、「胃潰瘍」が195件となっている。（表５－３－１、図５－３－１）

表５－３－１ 薬の対象となる病気（複数回答）

病名	男性 (N=427)		女性 (N=533)		計 (N=960)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧症	295	9.5%	252	47.3%	547	57.0%
鎮痛・消炎	70	2.3%	140	26.3%	210	21.9%
胃潰瘍	87	2.8%	108	20.3%	195	20.3%
糖尿病	80	2.6%	64	12.0%	144	15.0%
骨粗鬆症	9	0.3%	111	20.8%	120	12.5%
不眠症	29	0.9%	52	9.8%	81	8.4%
高コレステロール血症	34	1.1%	43	8.1%	77	8.0%
アレルギー性鼻炎	36	1.2%	35	6.6%	71	7.4%
高脂血症	18	0.6%	49	9.2%	67	7.0%
狭心症	21	0.7%	39	7.3%	60	6.3%
痛風	47	1.5%	10	1.9%	57	5.9%
胃・十二指腸潰瘍	23	0.7%	28	5.3%	51	5.3%
便秘	12	0.4%	37	6.9%	49	5.1%
気管支喘息	19	0.6%	29	5.4%	48	5.0%
湿疹・皮膚炎群	23	0.7%	20	3.8%	43	4.5%
その他	1876	60.6%	2646	496.4%	4522	471.0%
未回答	417	13.5%	525	98.5%	942	98.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	3,096	-	4,188	-	7,284	-

図５－３－１ 薬の対象となる病気



2.5.4 この一年間（または前回回答以降）に新たにかかった病気

この一年間（または前回回答以降）に新たにかかった病気の有無を質問したところ、237人（17.1%）（男性102人（15.5%）、女性135人（18.5%））が「はい」と回答した。

表5-4 この一年間（または前回回答以降）に新たにかかった病気はありますか？

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	102	15.5%	135	18.5%	237	17.1%
いいえ	428	65.2%	474	65.1%	902	65.2%
未回答	126	19.2%	119	16.3%	245	17.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

この一年間（または前回回答以降）に新たにかかった病気があると回答した237人に、具体的な病名を記述式で質問したところ、「糖尿病」20人（11.6%）で最も多く、続いて「高血圧症」が11人（6.4%）、「インフルエンザ」、「带状疱疹」、「白内障」がすべて7人（4.1%）等の順となっている。（表5-5）

表5-5 この1年間に新たにかかった病気（複数回答）

	男性 (N=105)		女性 (N=146)		計 (N=251)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
糖尿病	12	11.4%	8	5.5%	20	8.0%
高血圧症	5	4.8%	6	4.1%	11	4.4%
インフルエンザ	2	1.9%	5	3.4%	7	2.8%
带状疱疹	4	3.8%	3	2.1%	7	2.8%
白内障	4	3.8%	3	2.1%	7	2.8%
大腸ポリープ	3	2.9%	2	1.4%	5	2.0%
風邪	1	1.0%	4	2.7%	5	2.0%
花粉症	1	1.0%	3	2.1%	4	1.6%
尿管結石	3	2.9%	1	0.7%	4	1.6%
めまい	1	1.0%	2	1.4%	3	1.2%
腰痛	3	2.9%	0	0.0%	3	1.2%
骨折	3	2.9%	0	0.0%	3	1.2%
歯周病	0	0.0%	3	2.1%	3	1.2%
痔	2	1.9%	1	0.7%	3	1.2%
不整脈	2	1.9%	1	0.7%	3	1.2%
その他	123	117.1%	219	150.0%	342	136.3%
未回答	105	100.0%	144	98.6%	249	99.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	274	-	405	-	679	-

また、これらの方々に現在の治療状況を確認したところ、「医療機関での治療をへて治癒」と回答のあった方が201人（84.8%）と最も多くなっている。（表5-6）

表5-6 現在の治療状況（複数回答）

	男性 (N=102)		女性 (N=135)		計 (N=237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
医療機関での治療をへて治癒	81	79.4%	120	88.9%	201	84.8%
治療していない	14	13.7%	31	23.0%	45	19.0%
未回答	23	22.5%	30	22.2%	53	22.4%
不詳	0	0.0%	3	2.2%	3	1.3%

2.6 油症患者受療券（受療券）の使用状況について


2.6.1 受療券の保有状況

受療券を保有しているか質問したところ、「はい」と答えたのは893人（64.5%）（男性413人（63.0%）、女性480人（65.9%））（前年度 男性412人（61.9%）、女性497人（66.7%）、全体909人（64.4%））となっている。（表6－1、図6－1）

表6－1 カネミ倉庫が発行している受療券を持っていますか

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	413	63.0%	480	65.9%	893	64.5%
いいえ	236	36.0%	245	33.7%	481	34.8%
未回答	7	1.1%	3	0.4%	10	0.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図6－1 カネミ倉庫が発行している受療券を持っていますか




2.6.2 受療券を使用せずに受診したことがあるか

この1年間、受療券を使用せずに受診したことがあるかを質問したところ、532人（59.6%）（男性231人（55.9%）、女性301人（62.7%））（前年度 男性238人（57.8%）、女性312人（62.8%）、全体550人（60.5%））の方が「はい」と回答した。（表6－3、図6－3）

表6－2 この1年間で、受療券を使用せずに受診したことがあるか

	男性 (N=413)		女性 (N=480)		計 (N=893)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	231	55.9%	301	62.7%	532	59.6%
いいえ	177	42.9%	174	36.3%	351	39.3%
未回答	5	1.2%	5	1.0%	10	1.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	413	100.0%	480	100.0%	893	100.0%

図6－2 この1年間で、受療券を使用せずに受診したことがあるか




2.6.3 受療券を利用せずに受診した理由

受療券を利用せずに受診したことがあると回答した532人を対象に、受療券を利用せずに受診した理由を質問したところ、330人（37.0%）（男性142人（34.4%）、女性188人（39.2%））の方が「受療券を利用できない医療機関のため」と回答した。（表6－3、図6－3）

表6－3 受療券を利用せずに受診した理由（複数回答）

	男性 (N=231)		女性 (N=301)		計 (N=532)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
受療券を利用できない医療機関のため	142	34.4%	188	39.2%	330	37.0%
その他	92	22.3%	113	23.5%	205	23.0%
未回答	5	1.2%	6	1.3%	11	1.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	239	—	307	—	546	—

図6－3 受療券を利用せずに受診した理由（複数回答）




2.6.4 受療券の発行について

受療券を所持していないと回答した481人を対象に、受療券の発行の希望の有無を質問したところ、61人（12.7%）（男性35人（14.8%）、女性26人（10.6%））（前年度 男性56人（22.6%）、女性38人（15.7%）、全体94人（19.2%））の方が受療券の発行を希望していた。（表6-4、図6-4）

表6-4 受療券の発行を希望しているか

	男性 (N=236)		女性 (N=245)		計 (N=481)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	35	14.8%	26	10.6%	61	12.7%
いいえ	197	83.5%	214	87.3%	411	85.4%
未回答	4	1.7%	5	2.0%	9	1.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	236	100.0%	245	100.0%	481	100.0%

図6-4 受療券の発行を希望しているか




2.6.5 受療券について連絡先への送付について

受療券の発行を希望すると回答した61人を対象に、受療券について連絡先への送付を希望の有無を質問したところ、58人（95.1%）（男性33人（94.3%）、女性25人（96.2%））の方が連絡先への送付を希望していた。（表6－5、図6－5）

表6－5 受療券について連絡先への送付を希望しているか

	男性 (N=35)		女性 (N=26)		計 (N=61)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	33	94.3%	25	96.2%	58	95.1%
いいえ	1	2.9%	1	3.8%	2	3.3%
未回答	1	2.9%	0	0.0%	1	1.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	35	100.0%	26	100.0%	61	100.0%

図6－5 受療券について連絡先への送付を希望しているか




2.6.6 受療券の発行を希望しない理由

受療券の発行を希望しないと回答した411人を対象に、受療券の発行を希望しない理由を質問したところ、169人（29.4%）（男性79人（29.5%）、女性90人（29.3%））の方が「受療券が利用できる医療機関が限られるから」と回答した。（表6-6、図6-6）

表6-6 受療券の発行を希望しない理由（複数回答）

	男性 (N=197)		女性 (N=214)		計 (N=411)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
利用する予定がないから	65	24.3%	63	20.5%	128	22.3%
手続きがめんどうだから	27	10.1%	25	8.1%	52	9.0%
他の人に油症患者であると知られてしまうと思うから	67	25.0%	96	31.3%	163	28.3%
受療券が利用できる医療機関が限られるから	79	29.5%	90	29.3%	169	29.4%
その他	28	10.4%	30	9.8%	58	10.1%
未回答	2	0.7%	3	1.0%	5	0.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	268	100.0%	307	100.0%	575	100.0%

図6-6 受療券の発行を希望しない理由（複数回答）




2.6.7 受療券の使用を希望する医療機関

受療券の使用を希望する医療機関があるか質問したところ、91人（6.6%）（男性42人（6.4%）、女性49人（6.7%））が「はい」と回答した。（表6-7-1、図6-7-1）

表6-7-1 受療券の使用を希望する医療機関があるか

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	42	6.4%	49	6.7%	91	6.6%
いいえ	576	87.8%	642	88.2%	1,218	88.0%
未回答	38	5.8%	37	5.1%	75	5.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図6-7-1 受療券の使用を希望する医療機関があるか




受療券の使用を希望する医療機関と受診頻度を質問したところ、のべ118カ所（※）についての回答があり、受診頻度は入院中が1.1%（前年度1.7%）、毎週1回以上が5.5%（前年度5.5%）、毎月1～3回程度が49.5%（前年度19.4%）、数ヶ月に1回程度が63.7%（前年度18.1%）、受診していないが13.2%（前年度5.5%）、未回答が18.7%（前年度49.8%）となっている。（※一部、既に受療券が使用可能な医療機関を含む）

表6-7-2 受療券の使用を希望する医療機関と受診頻度（複数回答）

	男性(N=42)		女性(N=49)		計(N=91)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院中	1	2.4%	0	0.0%	1	1.1%
毎週1回以上	2	4.8%	3	6.1%	5	5.5%
毎月1～3回	22	52.4%	23	46.9%	45	49.5%
数か月に1回程度	28	66.7%	30	61.2%	58	63.7%
受診していない	3	7.1%	9	18.4%	12	13.2%
未回答	6	14.3%	11	22.4%	17	18.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	62		76		138	

図6-7-2 受療券の使用を希望する医療機関と受診頻度（複数回答）



2.7 油症検診について


2.7.1 昨年度の油症検診の受診について

昨年度の油症検診の受診をしたかどうかをみると、「はい」と答えたのは501人（36.2%）（男性248人（37.8%）、女性253人（34.8%））（前年度 男性246人（36.9%）、女性264人（35.4%）、全体510人（36.1%））となっている。（表7－1、図7－1）

表7－1 受診検診

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	248	37.8%	253	34.8%	501	36.2%
いいえ	403	61.4%	472	64.8%	875	63.2%
未回答	5	0.8%	3	0.4%	8	0.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図7－1 受診検診




2.7.2 油症検診の受診を受けなかった理由

油症検診を受けていない875人（男性403人、女性472人）（前年度 男性412人、女性478人、全体890人）を対象に、受けなかった理由を質問したところ、「仕事などで都合がつかなかったから」と回答した方が38.5%と最も多く（男性48.9%、女性29.7%）（前年度 男性41.7%、女性26.2%、全体33.4%）、次いで「検診の場所が遠かったから」が24.6%（男性20.6%、女性28.0%）（前年度 男性8.0%、女性11.9%、全体10.1%）等の順となっている。（表7-2、図7-2）

表7-2-1 油症検診の受診を受けなかった理由（複数回答）

	男性 (N=403)		女性 (N=472)		計 (N=875)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
知らなかったから（案内が届かなかった）	11	2.7%	9	1.9%	20	2.3%
仕事などで都合がつかなかったから	197	48.9%	140	29.7%	337	38.5%
体調が悪かったから	52	12.9%	97	20.6%	149	17.0%
検診の場所が遠かったから	83	20.6%	132	28.0%	215	24.6%
職場や自治体の検診をうけているため、必要性を感じないから	92	22.8%	96	20.3%	188	21.5%
健康に自信があり、必要性を感じないから	17	4.2%	10	2.1%	27	3.1%
その時、医療機関に入院していたから（介護施設への入所も含む）	29	7.2%	50	10.6%	79	9.0%
めんどうだから	33	8.2%	37	7.8%	70	8.0%
その他	44	10.9%	92	19.5%	136	15.5%
未回答	13	3.2%	15	3.2%	28	3.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	571	-	678	-	1249	-

図7-2-1 油症検診の受診を受けなかった理由（複数回答）




油症検診を受診しなかった主な理由は、「仕事などで都合がつかなかったから」26.3%（男性34.7%、19.1%）が最も多く、次いで「職場や自治体の検診をうけているため、必要性を感じないから」12.0%（男性10.4%、女性13.3%）、「検診の場所が遠かったから」11.1%（男性6.5%、女性15.0%）等の順となっている。（表7-2-2、図7-2-2）

表7-2-2 油症検診の受診を受けなかった主な理由

	男性 (N=403)		女性 (N=472)		計 (N=875)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
知らなかったから（案内が届かなかった）	10	2.5%	4	0.8%	14	1.6%
仕事などで都合がつかなかったから	140	34.7%	90	19.1%	230	26.3%
体調が悪かったから	31	7.7%	54	11.4%	85	9.7%
検診の場所が遠かったから	26	6.5%	71	15.0%	97	11.1%
職場や自治体の検診をうけているため、必要性を感じないから	42	10.4%	63	13.3%	105	12.0%
健康に自信があり、必要性を感じないから	8	2.0%	2	0.4%	10	1.1%
その時、医療機関に入院していたから（介護施設への入所も含む）	22	5.5%	30	6.4%	52	5.9%
めんどうだから	12	3.0%	8	1.7%	20	2.3%
その他	34	8.4%	62	13.1%	96	11.0%
未回答	77	19.1%	86	18.2%	163	18.6%
不詳	1	0.2%	2	0.4%	3	0.3%
計	403	100.0%	472	100.0%	875	100.0%

表7-2-3 油症検診の受診を受けなかった主な理由



2.8 相談体制について


2.8.1 油症相談員や相談窓口への相談経験について

油症相談員や相談窓口に相談をしたことがあるかどうかみると、「はい」と答えたのは202人（14.6%）（男性99人（15.1%）、女性103人（14.1%））（前年度 男性92人（13.8%）、女性91人（12.2%）、全体183人（13.0%））となっている。（表8－1、図8－1）

表8－1 相談経験がある

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	99	15.1%	103	14.1%	202	14.6%
いいえ	549	83.7%	618	84.9%	1,167	84.3%
未回答	8	1.2%	7	1.0%	15	1.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1,384	100.0%

図8－1 相談経験がある




2.8.2 今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容

油症相談員や相談窓口で相談経験を「ない」と回答した1,167人（男性549人、女性618人）を対象に、今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容について質問したところ、「自分の病気や介護」と回答した方が45.4%（男性45.7%、女性45.2%）（前年度 男性55.9%、女性55.0%、全体55.4%）と最も多く、次いで「家族の病気や介護」が20.2%（男性19.1%、女性21.3%）（前年度 男性6.9%、女性8.1%、全体7.5%）等の順となっている。（表8-2、図8-2）

表8-2 今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容（複数回答）

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
自分の病気や介護	300	45.7%	329	45.2%	629	45.4%
家族の病気や介護	125	19.1%	155	21.3%	280	20.2%
収入・家計・借金等	60	9.1%	46	6.3%	106	7.7%
家族又は家族以外との人間関係	26	4.0%	18	2.5%	44	3.2%
その他	79	12.0%	103	14.1%	182	13.2%
未回答	104	15.9%	131	18.0%	235	17.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	694	-	782	-	1,476	-

図8-2 今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容（複数回答）



2.9 罹患と治療状況について

※本年度は全員を対象に全数調査を行った。（平成 30 年度までは、本調査に初めて回答する者にのみ回答を求めている。）

2.9.1 悪性腫瘍（がん）について

悪性腫瘍（がん）にかかったことがあるかについてみると、172人（12.4%）（男性97人（14.8%）、女性75人（10.3%））が「はい」と回答した。（表 9－1－1）

表 9－1－1 悪性腫瘍（がん）にかかったことがあるか

	男性 (N=656)		女性 (N=728)		計 (N=1384)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	97	14.8%	75	10.3%	172	12.4%
いいえ	537	81.9%	628	86.3%	1165	84.2%
未回答	22	3.4%	25	3.4%	47	3.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	656	100.0%	728	100.0%	1384	100.0%

悪性腫瘍（がん）にかかったことがあると回答した172人に、具体的な病名を記述式で質問したところ、「その他のがん」26.0%（男性25人（21.6%）、女性25人（32.9%））と最も多く、次いで「大腸がん」15.6%（男性16人（13.8%）、女性14人（18.4%））、「胃がん」14.6%（男性23人（19.8%）、女性5人（6.6%））等の順となった。（表 9－1－2）

表 9－1－2 悪性腫瘍（がん）（複数回答）

	男性 (N=)		女性 (N=)		計 (N=)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸がん	16	13.8%	14	18.4%	30	15.6%
胃がん	23	19.8%	5	6.6%	28	14.6%
前立腺がん	17	14.7%	0	0.0%	17	8.9%
肺がん	11	9.5%	4	5.3%	15	7.8%
乳がん	0	0.0%	14	18.4%	14	7.3%
膀胱がん	8	6.9%	1	1.3%	9	4.7%
食道がん	6	5.2%	1	1.3%	7	3.6%
悪性リンパ腫	5	4.3%	1	1.3%	6	3.1%
甲状腺がん	1	0.9%	5	6.6%	6	3.1%
子宮がん	0	0.0%	5	6.6%	5	2.6%
直腸がん	4	3.4%	1	1.3%	5	2.6%
その他のがん	25	21.6%	25	32.9%	50	26.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	116	100.0%	76	100.0%	192	100.0%

悪性腫瘍（がん）にかかったことがあると回答した 172 人に治療歴を質問したところ、104 人（43.9%）（男性 71 人（50.0%）、女性 33 人（34.7%））の方が「がんに対する治療は終了し、定期的な検査のために通院中」と回答した。（表 9－1－3）

表 9－1－3 悪性腫瘍（がん）の種類と治療歴（複数回答）

	男性 (N=97)		女性 (N=75)		計 (N=172)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院治療中・外来（通院）治療中	29	20.4%	19	20.0%	48	20.3%
がんに対する治療は終了し、定期的な検査のために通院中	71	50.0%	33	34.7%	104	43.9%
治療が完了し、通院もしていない	38	26.8%	33	34.7%	71	30.0%
その他	4	2.8%	8	8.4%	12	5.1%
未回答	0	0.0%	2	2.1%	2	0.8%
計	142	100.0%	95	100.0%	237	100.0%

悪性腫瘍（がん）にかかったことがあると回答した172人に受けたすべての治療を質問したところ、121人（64.4%）（男性68人（60.2%）、女性53人（70.7%））の方が「外科手術（胸腔鏡・腹腔鏡手術を含む）」と回答した。（表9-1-4）

表9-1-4 悪性腫瘍（がん）の種類と治療歴（複数回答）

	男性 (N=97)		女性 (N=75)		計 (N=172)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
外科手術（胸腔鏡・腹腔鏡手術を含む）	86	42.8%	65	43.9%	151	43.3%
内視鏡治療	32	15.9%	20	13.5%	52	14.9%
薬物療法（抗がん剤・ホルモン剤など）	51	25.4%	36	24.3%	87	24.9%
放射線療法	24	11.9%	12	8.1%	36	10.3%
その他	5	2.5%	8	5.4%	13	3.7%
未回答	3	1.5%	7	4.7%	10	2.9%
計	201	-	148	-	349	-

2.9.2 脳・精神・神経の病気・症状について

脳・精神・神経の病気について、これまでかかったことがある病気をみると、「頭痛」と回答した方が313件（22.6%）（男性100件（15.2%）、女性213件（29.3%））と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」172件（12.4%）（男性60件（9.1%）、女性112件（15.4%））、「医療機関で治療中」105件（7.6%）（男性30件（4.6%）、女性75件（10.3%））、「医療機関での治療をへて治癒」35件（2.5%）（男性9件（1.4%）、女性26件（3.6%））となっている。（表9－2）

表9－2 脳・精神・神経の病気・症状（複数回答）

	男性 (N=102)										女性 (N=135)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	8	1.2%	3	0.5%	5	0.8%	0	0.0%	16	2.4%	9	1.2%	5	0.7%	3	0.4%	0	0.0%	17	2.3%
脳梗塞	26	4.0%	16	2.4%	3	0.5%	0	0.0%	45	6.9%	14	1.9%	7	1.0%	8	1.1%	0	0.0%	29	4.0%
頭痛	30	4.6%	9	1.4%	60	9.1%	1	0.2%	100	15.2%	75	10.3%	26	3.6%	112	15.4%	0	0.0%	213	29.3%
頭重	18	2.7%	3	0.5%	27	4.1%	0	0.0%	48	7.3%	39	5.4%	2	0.3%	62	8.5%	0	0.0%	103	14.1%
神経痛	23	3.5%	3	0.5%	31	4.7%	1	0.2%	58	8.8%	61	8.4%	16	2.2%	38	5.2%	0	0.0%	115	15.8%
知的障害	2	0.3%	0	0.0%	6	0.9%	0	0.0%	8	1.2%	2	0.3%	0	0.0%	7	1.0%	0	0.0%	9	1.2%
陣うつ病	13	2.0%	7	1.1%	8	1.2%	0	0.0%	28	4.3%	21	2.9%	14	1.9%	10	1.4%	0	0.0%	45	6.2%
統合失調症	9	1.4%	1	0.2%	5	0.8%	0	0.0%	15	2.3%	12	1.6%	3	0.4%	7	1.0%	0	0.0%	22	3.0%
幻覚	6	0.9%	4	0.6%	8	1.2%	0	0.0%	18	2.7%	4	0.5%	2	0.3%	8	1.1%	0	0.0%	14	1.9%
認知症	14	2.1%	0	0.0%	11	1.7%	0	0.0%	25	3.8%	40	5.3%	0	0.0%	11	1.5%	0	0.0%	51	7.0%
もの忘れ	18	2.7%	1	0.2%	67	10.2%	0	0.0%	86	13.1%	30	4.1%	1	0.1%	76	10.4%	0	0.0%	107	14.7%
かっとなりやすい・短気	11	1.7%	2	0.3%	50	7.6%	0	0.0%	63	9.6%	14	1.9%	0	0.0%	28	3.8%	0	0.0%	42	5.8%
その他	16	2.4%	3	0.5%	6	0.9%	2	0.3%	27	4.1%	11	1.5%	9	1.2%	5	0.7%	6	0.8%	31	4.3%
病気症状は特にない	327	49.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	327	49.8%	277	38.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	277	38.0%
未回答	69	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	10.5%	63	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	63	8.7%

	計 (N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	17	1.2%	8	0.6%	8	0.6%	0	0.0%	33	2.4%
脳梗塞	40	2.9%	23	1.7%	11	0.8%	0	0.0%	74	5.3%
頭痛	105	7.6%	35	2.5%	172	12.4%	1	0.1%	313	22.6%
頭重	57	4.1%	5	0.4%	89	6.4%	0	0.0%	151	10.9%
神経痛	84	6.1%	19	1.4%	69	5.0%	1	0.1%	173	12.5%
知的障害	4	0.3%	0	0.0%	13	0.9%	0	0.0%	17	1.2%
陣うつ病	34	2.5%	21	1.5%	18	1.3%	0	0.0%	73	5.3%
統合失調症	21	1.5%	4	0.3%	12	0.9%	0	0.0%	37	2.7%
幻覚	10	0.7%	6	0.4%	16	1.2%	0	0.0%	32	2.3%
認知症	54	3.9%	0	0.0%	22	1.6%	0	0.0%	76	5.5%
もの忘れ	48	3.5%	2	0.1%	143	10.3%	0	0.0%	193	13.9%
かっとなりやすい・短気	25	1.8%	2	0.1%	78	5.6%	0	0.0%	105	7.6%
その他	27	2.0%	12	0.9%	11	0.8%	8	0.6%	58	4.2%
病気症状は特にない	604	43.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	604	43.6%
未回答	132	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	132	9.5%

2.9.3 自律神経系の病気・症状について

自律神経系の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「不眠」と回答した方が248件（17.9%）（男性78件（11.9%）、女性170件（23.4%））と最も多く、その中で「医療機関で治療中」141件（10.2%）（男性40件（6.1%）、女性101件（13.9%））、「症状はあるが治療していない」91件（6.6%）（男性33件（5.0%）、女性58件（8.0%））、「医療機関での治療をへて治癒」16件（1.2%）（男性5件（0.8%）、女性11件（1.5%））となっている。（表9－3）

表9－3 自律神経系の病気・症状（複数回答）

	男性 (N=656)										女性 (N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	8	1.2%	0	0.0%	26	4.0%	0	0.0%	34	5.2%	15	2.1%	7	1.0%	46	6.3%	0	0.0%	68	9.3%
過敏性腸症候群	16	2.4%	2	0.3%	20	3.0%	0	0.0%	38	5.8%	22	3.0%	6	0.8%	19	2.6%	0	0.0%	47	6.5%
多汗症	6	0.9%	1	0.2%	12	1.8%	0	0.0%	19	2.9%	9	1.2%	2	0.3%	19	2.6%	0	0.0%	30	4.1%
汗が出にくい	5	0.8%	0	0.0%	11	1.7%	0	0.0%	16	2.4%	7	1.0%	0	0.0%	16	2.2%	0	0.0%	23	3.2%
不眠	40	6.1%	5	0.8%	33	5.0%	0	0.0%	78	11.9%	101	13.9%	11	1.5%	58	8.0%	0	0.0%	170	23.4%
不安神経症	14	2.1%	9	0.2%	14	2.1%	0	0.0%	29	4.4%	25	3.4%	4	0.5%	19	2.6%	0	0.0%	48	6.6%
自律神経失調症	14	2.1%	8	1.2%	14	2.1%	0	0.0%	36	5.5%	37	5.1%	23	3.2%	44	6.0%	0	0.0%	104	14.3%
その他	4	0.6%	1	0.2%	4	0.6%	1	0.2%	10	1.5%	3	0.4%	1	0.1%	4	0.5%	6	0.8%	14	1.9%
病気症状は特にない	396	60.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	396	60.4%	371	51.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	371	51.0%
未回答	89	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	89	13.6%	66	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	66	9.1%

	計 (N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	23	1.7%	7	0.5%	72	5.2%	0	0.0%	102	7.4%
過敏性腸症候群	38	2.7%	8	0.6%	39	2.8%	0	0.0%	85	6.1%
多汗症	15	1.1%	3	0.2%	31	2.2%	0	0.0%	49	3.5%
汗が出にくい	12	0.9%	0	0.0%	27	2.0%	0	0.0%	39	2.8%
不眠	141	10.2%	16	1.2%	91	6.6%	0	0.0%	248	17.9%
不安神経症	39	2.8%	5	0.4%	33	2.4%	0	0.0%	77	5.6%
自律神経失調症	51	3.7%	31	2.2%	58	4.2%	0	0.0%	140	10.1%
その他	7	0.5%	2	0.1%	8	0.6%	7	0.5%	24	1.7%
病気症状は特にない	767	55.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	767	55.4%
未回答	155	11.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	155	11.2%

2.9.4 眼の病気・症状について

眼の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「近視」と回答した方が159件（24.2%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」122件（18.6%）、「医療機関で治療中」29件（4.4%）、「医療機関での治療をへて治癒」7件（1.1%）となっている。

女性は「白内障」と回答した方が214件（29.4%）と最も多く、その中で「医療機関での治療中」105件（14.4%）、「医療機関での治療をへて治癒」71件（9.8%）、「症状はあるが治療していない」38件（5.2%）となっている。（表9-4）

表9-4 眼の病気・症状（複数回答）

	男性(N=656)										女性(N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多（めやにが多い）	28	4.3%	8	1.2%	63	9.6%	1	0.2%	100	15.2%	51	7.0%	14	1.9%	56	7.7%	0	0.0%	121	16.6%
睑板腺（まつ毛の根本）からチーズ様分泌物	5	0.8%	5	0.8%	14	2.1%	1	0.2%	25	3.8%	17	2.3%	7	1.0%	15	2.1%	0	0.0%	39	5.4%
結膜（白目）の色素沈着	0	0.0%	1	0.2%	10	1.5%	0	0.0%	11	1.7%	13	1.8%	3	0.4%	12	1.6%	0	0.0%	28	3.8%
白内障	47	7.2%	60	9.1%	19	2.9%	0	0.0%	126	19.2%	105	14.4%	71	9.8%	38	5.2%	0	0.0%	214	29.4%
緑内障	34	5.2%	2	0.3%	7	1.1%	0	0.0%	43	6.6%	38	5.2%	2	0.3%	7	1.0%	0	0.0%	47	6.5%
近視	29	4.4%	7	1.1%	122	18.6%	1	0.2%	159	24.2%	31	4.3%	13	1.8%	120	16.5%	1	0.1%	165	22.7%
遠視	11	1.7%	2	0.3%	68	10.4%	1	0.2%	82	12.5%	28	3.8%	5	0.7%	70	9.6%	0	0.0%	103	14.1%
乱視	27	4.1%	4	0.6%	122	18.6%	1	0.2%	154	23.5%	44	6.0%	11	1.5%	108	14.8%	1	0.1%	164	22.5%
弱視	1	0.2%	1	0.2%	6	0.9%	0	0.0%	8	1.2%	6	0.8%	0	0.0%	9	1.2%	0	0.0%	15	2.1%
その他	24	3.7%	7	1.1%	17	2.6%	14	2.1%	62	9.5%	44	6.0%	10	1.4%	22	3.0%	10	1.4%	86	11.8%
病気症状は特にならない	223	34.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	223	34.0%	202	27.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	202	27.7%
未回答	43	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	6.6%	34	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	4.7%

	計(N=1384)																			
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		不詳		合計											
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多（めやにが多い）	79	5.7%	22	1.6%	119	8.6%	1	0.1%	221	16.0%										
睑板腺（まつ毛の根本）からチーズ様分泌物	22	1.6%	12	0.9%	29	2.1%	1	0.1%	64	4.6%										
結膜（白目）の色素沈着	13	0.9%	4	0.3%	22	1.6%	0	0.0%	39	2.8%										
白内障	152	11.0%	131	9.5%	57	4.1%	0	0.0%	340	24.6%										
緑内障	72	5.2%	4	0.3%	14	1.0%	0	0.0%	90	6.5%										
近視	60	4.3%	20	1.4%	242	17.5%	2	0.1%	324	23.4%										
遠視	39	2.8%	7	0.5%	138	10.0%	1	0.1%	185	13.4%										
乱視	71	5.1%	15	1.1%	230	16.6%	2	0.1%	318	23.0%										
弱視	7	0.5%	1	0.1%	15	1.1%	0	0.0%	23	1.7%										
その他	68	4.9%	17	1.2%	39	2.8%	24	1.7%	148	10.7%										
病気症状は特にならない	425	30.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	425	30.7%										
未回答	77	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	77	5.6%										

2.9.5 口の中の病気・症状について

口の中の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「歯周病（歯槽膿漏）」と回答した方が424件（30.6%）（男性195件（29.7%）、女性229件（31.5%））と最も多く、その中で「医療機関で治療中」203件（14.7%）（男性80件（12.2%）、女性123件（16.9%））、「症状はあるが治療していない」130件（9.4%）（男性70件（10.7%）、女性60件（8.2%））、「医療機関での治療をへて治癒」91件（6.6%）（男性45件（6.9%）、女性46件（6.3%））となっている。（表9-5）

表9-5 口の中の病気・症状（複数回答）

	男性(N=656)										女性(N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
歯肉の色素沈着（歯茎が黒い）	9	1.4%	3	0.5%	31	4.7%	0	0.0%	43	6.6%	12	1.6%	6	0.8%	58	8.0%	0	0.0%	76	10.4%
歯牙形成不全（子どもの時に歯が生えなかった）	0	0.0%	0	0.0%	5	0.8%	0	0.0%	5	0.8%	1	0.1%	2	0.3%	9	1.2%	0	0.0%	12	1.6%
歯周病（歯槽膿漏）	80	12.2%	45	6.9%	70	10.7%	0	0.0%	195	29.7%	123	16.9%	46	6.3%	60	8.2%	0	0.0%	229	31.5%
歯肉炎（歯ぐきの病気）	34	5.2%	13	2.0%	27	4.1%	0	0.0%	74	11.3%	58	8.0%	28	3.8%	41	5.6%	0	0.0%	127	17.4%
顎関節症（あご関節の異常）	1	0.2%	6	0.9%	12	1.8%	0	0.0%	19	2.9%	15	2.1%	21	2.9%	22	3.0%	0	0.0%	58	8.0%
味覚異常	5	0.8%	1	0.2%	9	1.4%	0	0.0%	15	2.3%	10	1.4%	5	0.7%	16	2.2%	0	0.0%	31	4.3%
口内炎になりやすい	29	4.4%	19	2.9%	75	11.4%	0	0.0%	123	18.8%	66	9.1%	25	3.4%	98	13.5%	0	0.0%	189	26.0%
虫歯になりやすい	60	9.1%	46	7.0%	58	8.8%	0	0.0%	164	25.0%	83	11.4%	61	8.4%	53	7.3%	0	0.0%	197	27.1%
歯の知覚過敏（歯がしみる）	27	4.1%	13	2.0%	54	8.2%	1	0.2%	95	14.5%	54	7.4%	25	3.4%	71	9.8%	0	0.0%	150	20.6%
永久歯（歯）を早期に失った	20	3.0%	17	2.6%	29	4.4%	0	0.0%	66	10.1%	27	3.7%	26	3.6%	21	2.9%	0	0.0%	74	10.2%
その他	5	0.8%	5	0.8%	8	1.2%	7	1.1%	25	3.8%	10	1.4%	4	0.5%	8	1.1%	4	0.5%	26	3.6%
病気症状は特にならない	207	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	31.6%	167	22.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	167	22.9%
未回答	47	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	7.2%	39	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	5.4%

	計(N=1384)																			
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治療		症状はあるが治療していない		不詳		合計											
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
歯肉の色素沈着（歯茎が黒い）	21	1.5%	9	0.7%	89	6.4%	0	0.0%	119	8.6%										
歯牙形成不全（子どもの時に歯が生えなかった）	1	0.1%	2	0.1%	14	1.0%	0	0.0%	17	1.2%										
歯周病（歯槽膿漏）	203	14.7%	91	6.6%	130	9.4%	0	0.0%	424	30.6%										
歯肉炎（歯ぐきの病気）	92	6.6%	41	3.0%	68	4.9%	0	0.0%	201	14.5%										
顎関節症（あご関節の異常）	16	1.2%	27	2.0%	34	2.5%	0	0.0%	77	5.6%										
味覚異常	15	1.1%	6	0.4%	25	1.8%	0	0.0%	46	3.3%										
口内炎になりやすい	95	6.9%	44	3.2%	173	12.5%	0	0.0%	312	22.5%										
虫歯になりやすい	143	10.3%	107	7.7%	111	8.0%	0	0.0%	361	26.1%										
歯の知覚過敏（歯がしみる）	81	5.9%	38	2.7%	125	9.0%	1	0.1%	245	17.7%										
永久歯（歯）を早期に失った	47	3.4%	43	3.1%	50	3.6%	0	0.0%	140	10.1%										
その他	15	1.1%	9	0.7%	16	1.2%	11	0.8%	51	3.7%										
病気症状は特にならない	374	27.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	374	27.0%										
未回答	86	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	6.2%										

2.9.6 耳・鼻の病気・症状について

耳・鼻の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「難聴」と回答した方が109件（16.6%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」81件（12.3%）、「医療機関で治療中」24件（3.7%）、「医療機関での治療をへて治癒」4件（0.6%）となっている。

女性は「めまい」と回答した方が180件（24.7%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」80件（11.0%）、「医療機関で治療中」63件（8.7%）、「医療機関での治療をへて治癒」37件（5.1%）となっている。（表9-6）

表9-6 耳・鼻の病気・症状（複数回答）

	男性(N=656)										女性(N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	16	2.4%	15	2.3%	19	2.9%	0	0.0%	50	7.6%	31	4.3%	39	5.4%	19	2.6%	0	0.0%	89	12.2%
めまい	28	4.3%	7	1.1%	54	8.2%	0	0.0%	89	13.6%	63	8.7%	37	5.1%	80	11.0%	0	0.0%	180	24.7%
中耳炎	8	1.2%	38	5.8%	17	2.6%	0	0.0%	63	9.6%	10	1.4%	63	8.7%	12	1.6%	0	0.0%	85	11.7%
真珠腫性中耳炎	1	0.2%	7	1.1%	6	0.9%	0	0.0%	14	2.1%	4	0.5%	5	0.7%	7	1.0%	0	0.0%	16	2.2%
鼻炎を起こしやすい	32	4.9%	6	0.9%	64	9.8%	0	0.0%	102	15.5%	57	7.8%	18	2.5%	69	9.5%	0	0.0%	144	19.8%
難聴	24	3.7%	4	0.6%	81	12.3%	0	0.0%	109	16.6%	23	3.2%	13	1.8%	63	8.7%	0	0.0%	99	13.6%
蓄膿症	10	1.5%	23	3.5%	25	3.8%	0	0.0%	58	8.8%	15	2.1%	48	6.6%	20	2.7%	0	0.0%	83	11.4%
鼻血がよく出る	5	0.8%	2	0.3%	39	5.9%	0	0.0%	46	7.0%	12	1.6%	6	0.8%	32	4.4%	0	0.0%	50	6.9%
鼻血が止まりにくい	1	0.2%	2	0.3%	11	1.7%	0	0.0%	14	2.1%	2	0.3%	7	1.0%	9	1.2%	0	0.0%	18	2.5%
その他	7	1.1%	2	0.3%	17	2.6%	4	0.6%	30	4.6%	7	1.0%	5	0.7%	17	2.3%	5	0.7%	34	4.7%
病気症状は特にならない	282	43.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	282	43.0%	256	35.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	256	35.2%
未回答	52	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	7.9%	42	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	5.8%

	計(N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	47	3.4%	54	3.9%	38	2.7%	0	0.0%	139	10.0%
めまい	91	6.6%	44	3.2%	134	9.7%	0	0.0%	269	19.4%
中耳炎	18	1.3%	101	7.3%	29	2.1%	0	0.0%	148	10.7%
真珠腫性中耳炎	5	0.4%	12	0.9%	13	0.9%	0	0.0%	30	2.2%
鼻炎を起こしやすい	89	6.4%	24	1.7%	133	9.6%	0	0.0%	246	17.8%
難聴	47	3.4%	17	1.2%	144	10.4%	0	0.0%	208	15.0%
蓄膿症	25	1.8%	71	5.1%	45	3.3%	0	0.0%	141	10.2%
鼻血がよく出る	17	1.2%	8	0.6%	71	5.1%	0	0.0%	96	6.9%
鼻血が止まりにくい	3	0.2%	9	0.7%	20	1.4%	0	0.0%	32	2.3%
その他	14	1.0%	7	0.5%	34	2.5%	9	0.7%	64	4.6%
病気症状は特にならない	538	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	538	38.9%
未回答	94	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	94	6.8%

2.9.7 甲状腺の病気・症状について

甲状腺の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「甲状腺機能低下」と回答した方が54件（3.9%）（男性9件（1.4%）、女性45件（6.2%））と最も多く、その中で男性は「症状はあるが治療していない」6件（0.9%）、「医療機関で治療中」2件（0.3%）、「医療機関での治療をへて治癒」1件（0.2%）、女性は「医療機関で治療中」33件（4.5%）、「医療機関での治療をへて治癒」、「症状はあるが治療していない」が共に6件（0.8%）となっている。（表9-7）

表9-7 甲状腺の病気・症状（複数回答）

	男性(N=656)										女性(N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺腫	1	0.2%	3	0.5%	3	0.5%	0	0.0%	7	1.1%	12	1.6%	9	1.2%	6	0.8%	0	0.0%	27	3.7%
慢性甲状腺炎	1	0.2%	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	4	0.6%	1	0.1%	0	0.0%	5	0.7%	0	0.0%	6	0.8%
バセドウ病	1	0.2%	2	0.3%	3	0.5%	0	0.0%	6	0.9%	3	0.4%	7	1.0%	4	0.5%	0	0.0%	14	1.9%
甲状腺機能低下	2	0.3%	1	0.2%	6	0.9%	0	0.0%	9	1.4%	33	4.5%	6	0.8%	6	0.8%	0	0.0%	45	6.2%
その他	1	0.2%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	3	0.5%	1	0.1%	1	0.1%	8	1.1%	0	0.0%	10	1.4%
病気症状は特にならない	536	81.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	536	81.7%	544	74.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	544	74.7%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	16.0%	105	16.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	99	13.6%	99	13.6%

	計(N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺腫	13	0.9%	12	0.9%	9	0.7%	0	0.0%	34	2.5%
慢性甲状腺炎	2	0.1%	0	0.0%	8	0.6%	0	0.0%	10	0.7%
バセドウ病	4	0.3%	9	0.7%	7	0.5%	0	0.0%	20	1.4%
甲状腺機能低下	35	2.5%	7	0.5%	12	0.9%	0	0.0%	54	3.9%
その他	2	0.1%	1	0.1%	10	0.7%	0	0.0%	13	0.9%
病気症状は特にならない	1080	78.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1080	78.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	14.7%	204	14.7%

2.9.8 のど・気管支・肺の病気・症状について

のど・気管支・肺の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「たん」と回答した方が156件 (23.8%) と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」102件 (15.5%)、「医療機関で治療中」44件 (6.7%)、「医療機関での治療をへて治癒」10件 (1.5%) となっている。

女性は「せき」と回答した方が191件 (26.2%) と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」93件 (12.8%)、「医療機関で治療中」64件 (8.8%)、「医療機関での治療をへて治癒」34件 (4.7%) となっている。(表9-8)

表9-8 のど・気管支・肺の病気・症状 (複数回答)

	男性 (N=656)										女性 (N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺線維症 (慢性間質性肺炎)	2	0.3%	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	5	0.8%	1	0.1%	1	0.1%	5	0.7%	0	0.0%	7	1.0%
無気肺	0	0.0%	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.4%	0	0.0%	4	0.5%
肺水腫	1	0.2%	2	0.3%	3	0.5%	0	0.0%	6	0.9%	2	0.3%	3	0.4%	3	0.4%	0	0.0%	8	1.1%
肺炎	5	0.8%	25	3.8%	7	1.1%	0	0.0%	37	5.6%	6	0.8%	43	5.9%	5	0.7%	0	0.0%	54	7.4%
慢性気管支炎	13	2.0%	7	1.1%	12	1.8%	0	0.0%	32	4.9%	28	3.8%	12	1.6%	7	1.0%	0	0.0%	47	6.5%
喘声 (声がかれる)	7	1.1%	2	0.3%	30	4.6%	0	0.0%	39	5.9%	18	2.5%	5	0.7%	30	4.1%	0	0.0%	53	7.3%
呼吸困難	7	1.1%	1	0.2%	5	0.8%	0	0.0%	13	2.0%	15	2.1%	5	0.7%	9	1.2%	0	0.0%	29	4.0%
COPD (慢性閉塞性肺疾患、肺炎腫)	12	1.8%	2	0.3%	14	2.1%	0	0.0%	28	4.3%	2	0.3%	1	0.1%	4	0.5%	0	0.0%	7	1.0%
息切れ	23	3.5%	1	0.2%	68	10.4%	0	0.0%	92	14.0%	37	5.1%	5	0.7%	60	8.2%	0	0.0%	102	14.0%
風邪を引きやすい	25	3.8%	19	2.9%	65	9.9%	0	0.0%	109	16.6%	48	6.6%	30	4.1%	66	9.1%	0	0.0%	144	19.8%
風邪が治りにくい	11	1.7%	12	1.8%	44	6.7%	0	0.0%	67	10.2%	36	4.9%	18	2.5%	45	6.2%	0	0.0%	99	13.6%
せき	40	6.1%	14	2.1%	91	13.9%	0	0.0%	145	22.1%	64	8.8%	34	4.7%	93	12.8%	0	0.0%	191	26.2%
たん	44	6.7%	10	1.5%	102	15.5%	0	0.0%	156	23.8%	65	8.9%	21	2.9%	99	13.6%	0	0.0%	185	25.4%
その他	3	0.5%	6	0.9%	5	0.8%	4	0.6%	18	2.7%	9	1.2%	10	1.4%	8	1.1%	3	0.4%	30	4.1%
病気症状は特にならない	285	43.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	285	43.4%	321	44.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	321	44.1%
未回答	51	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	7.8%	51	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	7.0%

	計 (N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺線維症 (慢性間質性肺炎)	3	0.2%	1	0.1%	8	0.6%	0	0.0%	12	0.9%
無気肺	0	0.0%	1	0.1%	6	0.4%	0	0.0%	7	0.5%
肺水腫	3	0.2%	5	0.4%	6	0.4%	0	0.0%	14	1.0%
肺炎	11	0.8%	68	4.9%	12	0.9%	0	0.0%	91	6.6%
慢性気管支炎	41	3.0%	19	1.4%	19	1.4%	0	0.0%	79	5.7%
喘声 (声がかれる)	25	1.8%	7	0.5%	60	4.3%	0	0.0%	92	6.6%
呼吸困難	22	1.6%	6	0.4%	14	1.0%	0	0.0%	42	3.0%
COPD (慢性閉塞性肺疾患、肺炎腫)	14	1.0%	3	0.2%	18	1.3%	0	0.0%	35	2.5%
息切れ	60	4.3%	6	0.4%	128	9.2%	0	0.0%	194	14.0%
風邪を引きやすい	73	5.3%	49	3.5%	131	9.5%	0	0.0%	253	18.3%
風邪が治りにくい	47	3.4%	30	2.2%	89	6.4%	0	0.0%	166	12.0%
せき	104	7.5%	48	3.5%	184	13.3%	0	0.0%	336	24.3%
たん	109	7.9%	31	2.2%	201	14.5%	0	0.0%	341	24.6%
その他	12	0.9%	16	1.2%	13	0.9%	7	0.5%	48	3.5%
病気症状は特にならない	606	43.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	606	43.8%
未回答	102	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	7.4%

2.9.9 心臓の病気・症状について

心臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「不整脈（脈がとぶ）」と回答した方が201件（14.5%）（男性98件（14.9%）、女性103件（14.1%））で最も多く、その中で男性は「症状はあるが治療していない」48件（7.3%）、「医療機関で治療中」40件（6.1%）、「医療機関での治療をへて治癒」10件（1.5%）、女性は「医療機関で治療中」47件（6.5%）、「症状はあるが治療していない」44件（6.0%）、「医療機関での治療をへて治癒」12件（1.6%）となっている（表9-9）

表9-9 心臓の病気・症状（複数回答）

	男性(N=656)										女性(N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	11	1.7%	4	0.6%	1	0.2%	0	0.0%	16	2.4%	9	1.2%	4	0.5%	4	0.5%	0	0.0%	17	2.3%
狭心症	34	5.2%	7	1.1%	4	0.6%	0	0.0%	45	6.9%	35	4.8%	6	0.8%	3	0.4%	0	0.0%	44	6.0%
心不全	7	1.1%	2	0.3%	4	0.6%	0	0.0%	13	2.0%	24	3.3%	1	0.1%	6	0.8%	0	0.0%	31	4.3%
心肥大	13	2.0%	2	0.3%	11	1.7%	0	0.0%	26	4.0%	17	2.3%	4	0.5%	15	2.1%	0	0.0%	36	4.9%
不整脈（脈がとぶ）	40	6.1%	10	1.5%	48	7.3%	0	0.0%	98	14.9%	47	6.5%	12	1.6%	44	6.0%	0	0.0%	103	14.1%
頻脈（脈拍が増加している状態）	5	0.8%	2	0.3%	8	1.2%	0	0.0%	15	2.3%	11	1.5%	5	0.7%	13	1.8%	0	0.0%	29	4.0%
動悸（異状にドキドキする）	9	1.4%	0	0.0%	28	4.3%	0	0.0%	37	5.6%	24	3.3%	7	1.0%	58	8.0%	0	0.0%	89	12.2%
その他	3	0.5%	2	0.3%	3	0.5%	2	0.3%	10	1.5%	6	0.8%	4	0.5%	7	1.0%	3	0.4%	20	2.7%
病気症状は特にない	404	61.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	404	61.6%	445	61.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	445	61.1%
未回答	67	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	10.2%	71	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71	9.8%


	計(N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	20	1.4%	8	0.6%	5	0.4%	0	0.0%	33	2.4%
狭心症	69	5.0%	13	0.9%	7	0.5%	0	0.0%	89	6.4%
心不全	31	2.2%	3	0.2%	10	0.7%	0	0.0%	44	3.2%
心肥大	30	2.2%	6	0.4%	26	1.9%	0	0.0%	62	4.5%
不整脈（脈がとぶ）	87	6.3%	22	1.6%	92	6.6%	0	0.0%	201	14.5%
頻脈（脈拍が増加している状態）	16	1.2%	7	0.5%	21	1.5%	0	0.0%	44	3.2%
動悸（異状にドキドキする）	33	2.4%	7	0.5%	86	6.2%	0	0.0%	126	9.1%
その他	9	0.7%	6	0.4%	10	0.7%	5	0.4%	30	2.2%
病気症状は特にない	849	61.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	849	61.3%
未回答	138	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	138	10.0%

心臓の病気で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、「内服薬」130件（67.7%）（男性59件（63.4%）、女性71件（71.7%））が最も多くなっている。（表9-9-2、図9-9-2）

表9-9-2 心臓の病気、現在の治療内容

	男性(N=93)		女性(N=99)		計(N=192)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事又は運動療法のみ	11	11.8%	5	5.1%	16	8.3%
内服薬	59	63.4%	71	71.7%	130	67.7%
注射薬	2	2.2%	2	2.0%	4	2.1%
その他	10	10.8%	9	9.1%	19	9.9%
未回答	11	11.8%	12	12.1%	23	12.0%
不詳	0	-	0	-	0	-

図9-9-2 心臓の病気、現在の治療内容



2.9.10 高血圧や血管の病気・症状について

高血圧や血管の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「高血圧」と回答した方550件（39.7%）（男性277件（42.2%）、女性273件（37.5%））が最も多く、その中で「医療機関で治療中」493件（35.6%）（男性249件（38.0%）、女性244件（33.5%））、「症状はあるが治療していない」41件（3.0%）（男性22件（3.4%）、女性19件（2.6%））、「医療機関での治療をへて治癒」16件（1.2%）（男性6件（0.9%）、女性10件（1.4%））となっている。（表9-10-1）

表9-10-1 高血圧や血管の病気・症状（複数回答）

	男性(N=656)										女性(N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	249	38.0%	6	0.9%	22	3.4%	0	0.0%	277	42.2%	244	33.5%	10	1.4%	19	2.6%	0	0.0%	273	37.5%
低血圧	2	0.3%	0	0.0%	13	2.0%	0	0.0%	15	2.3%	7	1.0%	4	0.5%	37	5.1%	0	0.0%	48	6.6%
動脈硬化	7	1.1%	0	0.0%	10	1.5%	0	0.0%	17	2.6%	6	0.8%	0	0.0%	6	0.8%	0	0.0%	12	1.6%
動脈瘤	9	1.4%	4	0.6%	9	1.4%	0	0.0%	22	3.4%	10	1.4%	1	0.1%	11	1.5%	0	0.0%	22	3.0%
静脈炎	1	0.2%	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	4	0.6%	4	0.5%	1	0.1%	3	0.4%	0	0.0%	8	1.1%
静脈瘤	2	0.3%	4	0.6%	11	1.7%	0	0.0%	17	2.6%	6	0.8%	8	1.1%	22	3.0%	0	0.0%	36	4.9%
その他	0	0.0%	1	0.2%	4	0.6%	3	0.5%	8	1.2%	2	0.3%	0	0.0%	3	0.4%	2	0.3%	7	1.0%
病気症状は特にない	300	45.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	300	45.7%	333	45.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	333	45.7%
未回答	52	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	7.9%	46	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	6.3%


	計(N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	493	35.6%	16	1.2%	41	3.0%	0	0.0%	550	39.7%
低血圧	9	0.7%	4	0.3%	50	3.6%	0	0.0%	63	4.6%
動脈硬化	13	0.9%	0	0.0%	16	1.2%	0	0.0%	29	2.1%
動脈瘤	19	1.4%	5	0.4%	20	1.4%	0	0.0%	44	3.2%
静脈炎	5	0.4%	1	0.1%	6	0.4%	0	0.0%	12	0.9%
静脈瘤	8	0.6%	12	0.9%	33	2.4%	0	0.0%	53	3.8%
その他	2	0.1%	1	0.1%	7	0.5%	5	0.4%	15	1.1%
病気症状は特にない	633	45.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	633	45.7%
未回答	98	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	98	7.1%

高血圧や血管の病気で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、「内服薬」459件（93.1%）（男性228件（91.6%）、女性231件（94.7%））が最も多くなっている。（表9-10-2、図9-10-2）

表9-10-2 高血圧 治療方法（複数回答）

	男性(N=249)		女性(N=244)		計(N=493)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事又は運動療法のみ	21	8.4%	18	7.4%	39	7.9%
内服薬	228	91.6%	231	94.7%	459	93.1%
その他	3	1.2%	5	2.0%	8	1.6%
未回答	10	4.0%	6	2.5%	16	3.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-10-2 高血圧 治療方法（複数回答） 性別



2.9.11 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「肝機能障害」と回答した方が44件（6.7%）と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」18件（2.7%）、「医療機関で治療中」16件（2.4%）、「医療機関での治療をへて治癒」10件（1.5%）となっている。

女性は「胆石症」と回答した方が45件（6.2%）と最も多く、その中で「医療機関での治療をへて治癒」21件（2.9%）、「症状はあるが治療していない」16件（2.2%）、「医療機関で治療中」8件（1.1%）となっている。（表9－1 1）

表9－1 1 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答）

	男性 (N=656)										女性 (N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
B型肝炎	4	0.6%	4	0.6%	8	1.2%	0	0.0%	16	2.4%	7	1.0%	7	1.0%	12	1.6%	0	0.0%	26	3.6%
C型肝炎	4	0.6%	8	1.2%	2	0.3%	0	0.0%	14	2.1%	6	0.8%	5	0.7%	5	0.7%	0	0.0%	16	2.2%
肝機能障害	16	2.4%	10	1.5%	18	2.7%	0	0.0%	44	6.7%	14	1.9%	13	1.8%	8	1.1%	0	0.0%	35	4.8%
胆のう炎	2	0.3%	9	1.4%	3	0.5%	0	0.0%	14	2.1%	4	0.5%	11	1.5%	2	0.3%	0	0.0%	17	2.3%
胆石症	0	0.0%	18	2.7%	13	2.0%	0	0.0%	31	4.7%	8	1.1%	21	2.9%	16	2.2%	0	0.0%	45	6.2%
黄疸	1	0.2%	3	0.5%	2	0.3%	0	0.0%	6	0.9%	1	0.1%	4	0.5%	5	0.7%	0	0.0%	10	1.4%
脾腫(脾臓がはれる)	1	0.2%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	3	0.5%	1	0.1%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	3	0.4%
その他	3	0.5%	4	0.6%	4	0.6%	4	0.6%	15	2.3%	5	0.7%	4	0.5%	9	1.2%	2	0.3%	20	2.7%
病気症状は特にならない	455	69.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	455	69.4%	505	69.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	505	69.4%
未回答	86	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	13.1%	93	12.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	93	12.8%

	計 (N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
B型肝炎	11	0.8%	11	0.8%	20	1.4%	0	0.0%	42	3.0%
C型肝炎	10	0.7%	13	0.9%	7	0.5%	0	0.0%	30	2.2%
肝機能障害	30	2.2%	23	1.7%	26	1.9%	0	0.0%	79	5.7%
胆のう炎	6	0.4%	20	1.4%	5	0.4%	0	0.0%	31	2.2%
胆石症	8	0.6%	39	2.8%	29	2.1%	0	0.0%	76	5.5%
黄疸	2	0.1%	7	0.5%	7	0.5%	0	0.0%	16	1.2%
脾腫(脾臓がはれる)	2	0.1%	0	0.0%	4	0.3%	0	0.0%	6	0.4%
その他	8	0.6%	8	0.6%	13	0.9%	6	0.4%	35	2.5%
病気症状は特にならない	960	69.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	960	69.4%
未回答	179	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	179	12.9%

2.9.12 すい臓の病気・症状について

すい臓の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「糖尿病」と回答した方が176件（12.7%）（男性105件（16.0%）、女性71件（9.8%））と最も多く、その中で男性は「医療機関で治療中」93件（14.2%）、「症状はあるが治療していない」10件（1.5%）、「医療機関での治療をへて治癒」2件（0.3%）、女性は「医療機関で治療中」64件（8.8%）、「医療機関での治療をへて治癒」5件（0.7%）、「症状はあるが治療していない」2件（0.3%）となっている。（表9-12-1）

表9-12-1 すい臓の病気・症状（複数回答）

	男性(N=656)										女性(N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい炎	5	0.8%	6	0.9%	2	0.3%	0	0.0%	13	2.0%	4	0.5%	8	1.1%	2	0.3%	0	0.0%	14	1.9%
糖尿病	93	14.2%	2	0.3%	10	1.5%	0	0.0%	105	16.0%	64	8.8%	5	0.7%	2	0.3%	0	0.0%	71	9.8%
その他	2	0.3%	0	0.0%	4	0.6%	0	0.0%	6	0.9%	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.4%
病気症状は特にな	441	67.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	441	67.2%	541	74.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	541	74.3%
未回答	94	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	94	14.3%	102	14.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	14.0%


	計(N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい炎	9	0.7%	14	1.0%	4	0.3%	0	0.0%	27	2.0%
糖尿病	157	11.3%	7	0.5%	12	0.9%	0	0.0%	176	12.7%
その他	4	0.3%	0	0.0%	4	0.3%	1	0.1%	9	0.7%
病気症状は特にな	982	71.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	982	71.0%
未回答	196	14.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	196	14.2%

糖尿病で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、「内服薬」143件（91.1%）（男性86件（92.5%）、女性57件（89.1%））が最も多くなっている。（表9-12-2、図9-12-2）

表9-12-2 糖尿病 治療方法（複数回答）

	男性(N=93)		女性(N=64)		計(N=157)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事又は運動療法のみ	14	15.1%	18	28.1%	32	20.4%
内服薬	86	92.5%	57	89.1%	143	91.1%
インスリン	8	8.6%	9	14.1%	17	10.8%
その他	0	0.0%	1	1.6%	1	0.6%
未回答	1	1.1%	1	1.6%	2	1.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-12-2 糖尿病 治療方法



2.9.13 腎臓・膀胱の病気・症状について

腎臓・膀胱の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「尿管結石」と回答した方が69件（10.5%）と最も多く、その中で「医療機関での治療をへて治癒」54件（8.2%）、「症状はあるが治療していない」9件（1.4%）、「医療機関で治療中」6件（0.9%）となっている。

女性は「膀胱炎」と回答した方が179件（24.6%）と最も多く、その中で「医療機関での治療をへて治癒」144件（19.8%）、「症状はあるが治療していない」18件（2.5%）、「医療機関で治療中」17件（2.3%）となっている。（表9－13）

表9－13 腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答）

	男性 (N=656)										女性 (N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎炎	8	1.2%	2	0.3%	4	0.6%	0	0.0%	14	2.1%	9	1.2%	26	3.6%	7	1.0%	0	0.0%	42	5.8%
膀胱炎	7	1.1%	14	2.1%	2	0.3%	0	0.0%	23	3.5%	17	2.3%	144	19.8%	18	2.5%	0	0.0%	179	24.6%
腎結石	6	0.9%	13	2.0%	14	2.1%	0	0.0%	33	5.0%	3	0.4%	7	1.0%	6	0.8%	0	0.0%	16	2.2%
尿管結石	6	0.9%	54	8.2%	9	1.4%	0	0.0%	69	10.5%	1	0.1%	29	4.0%	4	0.5%	0	0.0%	34	4.7%
膀胱結石	4	0.6%	7	1.1%	3	0.5%	0	0.0%	14	2.1%	1	0.1%	3	0.4%	2	0.3%	0	0.0%	6	0.8%
血尿	6	0.9%	16	2.4%	9	1.4%	0	0.0%	31	4.7%	8	1.1%	29	4.0%	27	3.7%	0	0.0%	64	8.8%
蛋白尿	14	2.1%	4	0.6%	15	2.3%	0	0.0%	33	5.0%	11	1.5%	15	2.1%	12	1.6%	0	0.0%	38	5.2%
その他	16	2.4%	7	1.1%	13	2.0%	3	0.5%	39	5.9%	15	2.1%	5	0.7%	9	1.2%	2	0.3%	31	4.3%
病気症状は特にならない	420	64.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	420	64.0%	391	53.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	391	53.7%
未回答	77	11.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	77	11.7%	70	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	70	9.6%

	計 (N=1384)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎炎	17	1.2%	28	2.0%	11	0.8%	0	0.0%
膀胱炎	24	1.7%	158	11.4%	20	1.4%	0	0.0%
腎結石	9	0.7%	20	1.4%	20	1.4%	0	0.0%
尿管結石	7	0.5%	83	6.0%	13	0.9%	0	0.0%
膀胱結石	5	0.4%	10	0.7%	5	0.4%	0	0.0%
血尿	14	1.0%	45	3.2%	36	2.6%	0	0.0%
蛋白尿	25	1.8%	19	1.4%	27	2.0%	0	0.0%
その他	31	2.2%	12	0.9%	22	1.6%	5	0.4%
病気症状は特にならない	811	58.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	147	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.14 食道・胃・腸・肛門の病気・症状について

食道・胃・腸・肛門の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、男性は「大腸ポリープ」「痔疾（ち）」と回答した方が共に121件（18.4%）と最も多く、その中で「大腸ポリープ」は「医療機関での治療をへて治癒」77件（11.7%）、「医療機関で治療中」26件（4.0%）、「症状はあるが治療していない」18件（2.7%）、「痔疾（ち）」は「症状はあるが治療していない」50件（7.6%）、「医療機関での治療をへて治癒」49件（7.5%）、「医療機関で治療中」22件（3.4%）となっている。

女性は「便秘」回答した方が254件（34.9%）で、その中で「医療機関で治療中」119件（16.3%）、「症状はあるが治療していない」118件（16.2%）、「医療機関での治療をへて治癒」17件（2.3%）となっている。（表9－14）

表9－14 食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答）

	男性 (N=656)										女性 (N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸ポリープ	26	4.0%	77	11.7%	18	2.7%	0	0.0%	121	18.4%	10	1.4%	54	7.4%	16	2.2%	0	0.0%	80	11.0%
慢性胃炎	17	2.6%	12	1.8%	13	2.0%	0	0.0%	42	6.4%	38	5.2%	16	2.2%	12	1.6%	0	0.0%	66	9.1%
胃潰瘍	15	2.3%	64	9.8%	8	1.2%	0	0.0%	87	13.3%	15	2.1%	32	4.4%	2	0.3%	0	0.0%	49	6.7%
十二指腸潰瘍	10	1.5%	50	7.6%	6	0.9%	0	0.0%	66	10.1%	6	0.8%	22	3.0%	4	0.5%	0	0.0%	32	4.4%
下痢	17	2.6%	5	0.8%	80	12.2%	0	0.0%	102	15.5%	31	4.3%	21	2.9%	72	9.9%	0	0.0%	124	17.0%
便秘	58	8.8%	6	0.9%	56	8.5%	0	0.0%	120	18.3%	119	16.3%	17	2.3%	118	16.2%	0	0.0%	254	34.9%
腹部膨満感（おなかが張る）	11	1.7%	2	0.3%	33	5.0%	0	0.0%	46	7.0%	30	4.1%	6	0.8%	48	6.6%	0	0.0%	84	11.5%
痔疾（ち）	22	3.4%	49	7.5%	50	7.6%	0	0.0%	121	18.4%	17	2.3%	32	4.4%	55	7.6%	0	0.0%	104	14.3%
腹痛	9	1.4%	4	0.6%	35	5.3%	0	0.0%	48	7.3%	14	1.9%	13	1.8%	47	6.5%	0	0.0%	74	10.2%
逆流性食道炎	37	5.6%	13	2.0%	33	5.0%	0	0.0%	83	12.7%	50	6.9%	35	4.8%	33	4.5%	0	0.0%	118	16.2%
その他	14	2.1%	6	0.9%	3	0.5%	2	0.3%	25	3.8%	6	0.8%	12	1.6%	5	0.7%	2	0.3%	25	3.4%
病気症状は特にならない	215	32.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	215	32.8%	233	32.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	233	32.0%
未回答	48	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	7.3%	35	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	4.8%

	計 (N=1384)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸ポリープ	36	2.6%	131	9.5%	34	2.5%	0	0.0%
慢性胃炎	55	4.0%	28	2.0%	25	1.8%	0	0.0%
胃潰瘍	30	2.2%	96	6.9%	10	0.7%	0	0.0%
十二指腸潰瘍	16	1.2%	72	5.2%	10	0.7%	0	0.0%
下痢	48	3.5%	26	1.9%	152	11.0%	0	0.0%
便秘	177	12.8%	23	1.7%	174	12.6%	0	0.0%
腹部膨満感（おなかが張る）	41	3.0%	8	0.6%	81	5.9%	0	0.0%
痔疾（ち）	39	2.8%	81	5.9%	105	7.6%	0	0.0%
腹痛	23	1.7%	17	1.2%	82	5.9%	0	0.0%
逆流性食道炎	87	6.3%	48	3.5%	66	4.8%	0	0.0%
その他	20	1.4%	18	1.3%	8	0.6%	4	0.3%
病気症状は特にならない	448	32.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	83	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.9.15 血液・リンパの病気・症状について

血液・リンパの病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「脂質異常症（高脂血症）」と回答した方が279件（20.2%）（男性111件（16.9%）、女性168件（23.1%））と最も多く、その中で「医療機関で治療中」211件（15.2%）（男性82件（12.5%）、女性129件（17.7%））、「症状はあるが治療していない」57件（4.1%）（男性27件（4.1%）、女性30件（4.1%））、「医療機関での治療をへて治癒」11件（0.8%）（男性2件（0.3%）、女性9件（1.2%））となっている。（表9-15-1）

表9-15-1 血液・リンパの病気・症状（複数回答）

	男性 (N=656)										女性 (N=728)													
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計					
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脂質異常症(高脂血症)	82	12.5%	2	0.3%	27	4.1%	0	0.0%	111	16.9%	129	17.7%	9	1.2%	30	4.1%	0	0.0%	168	23.1%				
貧血	9	1.4%	3	0.5%	17	2.6%	0	0.0%	29	4.4%	26	3.6%	53	7.3%	49	6.7%	0	0.0%	128	17.6%				
リンパ節の腫大(リンパの腫れ)	4	0.6%	2	0.3%	5	0.8%	0	0.0%	11	1.7%	3	0.4%	2	0.3%	6	0.8%	0	0.0%	11	1.5%				
その他	4	0.6%	1	0.2%	1	0.2%	3	0.5%	9	1.4%	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.7%	8	1.1%				
病気症状は特になし	429	65.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	429	65.4%	372	51.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	372	51.1%				
未回答	82	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	82	12.5%	79	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	79	10.9%				


	計 (N=1384)													
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計					
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脂質異常症(高脂血症)	211	15.2%	11	0.8%	57	4.1%	0	0.0%	279	20.2%				
貧血	35	2.5%	56	4.0%	66	4.8%	0	0.0%	157	11.3%				
リンパ節の腫大(リンパの腫れ)	7	0.5%	4	0.3%	11	0.8%	0	0.0%	22	1.6%				
その他	7	0.5%	1	0.1%	1	0.1%	8	0.6%	17	1.2%				
病気症状は特になし	801	57.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	801	57.9%				
未回答	161	11.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	161	11.6%				

脂質異常症（高脂血症）を現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、「内服薬」189件（89.6%）（男性71件（86.6%）、女性118件（91.5%））が最も多くなっている。（表9-15-2、図9-15-2）

表9-15-2 脂質異常症（高脂血症）治療方法（複数回答）

	男性 (N=82)		女性 (N=129)		計 (N=211)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事又は運動療法のみ	9	11.0%	14	10.9%	23	10.9%
内服薬	71	86.6%	118	91.5%	189	89.6%
その他	1	1.2%	2	1.6%	3	1.4%
未回答	3	3.7%	2	1.6%	5	2.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-15-2 脂質異常症（高脂血症）治療方法（複数回答）



2.9.16 前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状について（男性のみ）

男性に対し、これまでにかかったことがある前立腺・男性機能に関する病気・症状をみると、「前立腺肥大」と回答した方が70件（10.7%）と最も多く、その中で「医療機関で治療中」35件（5.3%）、「症状はあるが治療していない」18件（2.7%）、「医療機関での治療をへて治癒」17件（2.6%）となっている。（表9－16）

表9－16 前立腺・男性機能に関する病気・症状（複数回答） 男性

	男性(N=656)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
前立腺肥大	35	5.3%	17	2.6%	18	2.7%	0	0.0%	70	10.7%
男性不妊(子供ができない)	0	0.0%	1	0.2%	4	0.6%	0	0.0%	5	0.8%
インポテンツ	6	0.9%	0	0.0%	19	2.9%	0	0.0%	25	3.8%
その他	8	1.2%	3	0.5%	3	0.5%	3	0.5%	17	2.6%
病気症状は特にならない	360	54.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	360	54.9%
未回答	192	29.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	192	29.3%

2.9.17 子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について（女性のみ）

女性に対し、これまでにかかったことがある子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状をみると、「子宮筋腫」と回答した方が117件（17.8%）と最も多く、「医療機関での治療をへて治癒」65件（9.9%）、「症状はあるが治療していない」39件（5.9%）、「医療機関で治療中」13件（2.0%）となっている。（表9－17）

表9－17 子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 女性

	女性(N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
子宮内膜症	3	0.5%	27	4.1%	5	0.8%	0	0.0%	35	5.3%
子宮筋腫	13	2.0%	65	9.9%	39	5.9%	0	0.0%	117	17.8%
卵巣のう腫	4	0.6%	32	4.9%	5	0.8%	0	0.0%	41	6.3%
月経困難症(生理痛)	4	0.6%	13	2.0%	24	3.7%	1	0.2%	42	6.4%
不正出血	3	0.5%	20	3.0%	11	1.7%	0	0.0%	34	5.2%
月経不順	3	0.5%	14	2.1%	29	4.4%	0	0.0%	46	7.0%
過多月経(月経が多い)	5	0.8%	12	1.8%	15	2.3%	0	0.0%	32	4.9%
過小月経(月経が少ない)	2	0.3%	0	0.0%	8	1.2%	0	0.0%	10	1.5%
その他	12	1.8%	9	1.4%	1	0.2%	5	0.8%	27	4.1%
病気症状は特にならない	321	48.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	321	48.9%
未回答	184	28.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	184	28.0%

2.9.18 月経・妊娠・出産に関することについて（女性のみ）

女性に対し、初経「あり」と回答した419人の平均年齢は、13.4歳となっている。（表9-18-1）

表9-18-1 初経のあり・なし 女性

	女性 (N=728)		
	件数	割合	平均年齢
あり	419	57.6%	13.4
なし	2	0.3%	-
未回答	307	42.2%	
不詳	0	0.0%	
計	728	100.0%	-

女性に対し、閉経「あり」と回答した386人の平均年齢は、49.0歳となっている。（表9-18-2）

表9-18-2 閉経のあり・なし 女性

	女性 (N=728)		
	件数	割合	平均年齢
あり	386	53.0%	49.0
なし	44	6.0%	-
未回答	298	40.9%	
不詳	0	0.0%	
計	728	100.0%	-

女性に対し、不妊症についてみると、「あり」と回答した方は27人となっている。（表9-18-3）

表9-18-3 不妊症 女性

	女性 (N=728)	
	件数	割合
あり	27	3.7%
なし	510	70.1%
未回答	191	26.2%
不詳	0	0.0%
計	728	100.0%

女性に対し、妊娠回数についてみると、「2回」と回答した方が212件（29.1%）と最も多く、次いで「3回」161件（22.1%）、「4回」86件（11.8%）等の順となっている。（表9-18-4）

表9-18-4 妊娠回数 女性

	女性 (N=728)	
	件数	割合
0	84	11.5%
1	64	8.8%
2	212	29.1%
3	161	22.1%
4	86	11.8%
5	27	3.7%
6	21	2.9%
7	6	0.8%
8	6	0.8%
9	1	0.1%
10	0	0.0%
11回以上	3	0.4%
未回答	57	7.8%
不詳	0	0.0%
計	728	100.0%

女性に対し、記載のあった妊娠中の状況を集計してみると、「とくになし」1053件（76.1%）と最も多い。（表9－18－5）

表9－18－5 妊娠中の状況（複数回答） 女性

	女性 (N=587)	
	件数	割合
とくになし	1053	76.1%
切迫流産	106	7.7%
切迫早産	20	1.4%
妊娠中毒症	47	3.4%
その他	66	4.8%
未回答	92	6.6%
不詳	0	0.0%
計	1384	100.0%

女性に対し、記載のあった出産等の状況を集計してみると、「正常分娩」1157件（75.1%）と最も多い。次いで、「自然流産」112件（7.3%）、「人工流産」86件（5.6%）、「帝王切開」64件（4.2%）等の順となっている。（表9－18－6）

表9－18－6 出産等の状況（複数回答） 女性

	女性 (N=587)	
	件数	割合
正常分娩	1157	75.1%
帝王切開	64	4.2%
早産	28	1.8%
死産	19	1.2%
自然流産	112	7.3%
人工流産	86	5.6%
その他	24	1.6%
未回答	50	3.2%
不詳	0	0.0%
計	1540	100.0%

記載のあった出産時の出血量を集計してみると、「中」620件（55.1%）と最も多い。（表9－18－7）

表9－18－7 出産時の出血量（複数回答） 女性

	女性 (N=587)	
	件数	割合
小	191	17.0%
中	620	55.1%
多	81	7.2%
未回答	234	20.8%
不詳	0	0.0%
計	1126	100.0%

記載のあった新生児の状況を集計してみると、「とくになし」1057件（89.6%）と最も多い。（表9－18－8）

表9－18－8 新生児の状況（複数回答） 女性

	女性 (N=1249)	
	件数	割合
とくになし	1057	89.6%
低出生体重児	40	3.4%
先天異常	7	0.6%
奇形	7	0.6%
その他	49	4.2%
未回答	20	1.7%
不詳	0	0.0%
計	1180	100.0%

2.9.19 骨・関節の病気・症状について

骨・関節の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「腰痛」と回答した方が680件（49.1%）（男性308件（47.0%）、女性372件（51.1%））と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」350件（25.3%）（男性167件（25.5%）、女性183件（25.1%））、「医療機関で治療中」268件（19.4%）（男性112件（17.1%）、女性156件（21.4%））、「医療機関での治療をへて治癒」62件（4.5%）（男性29件（4.4%）、女性33件（4.5%））となっている。（表9-19-1）

表9-19-1 骨・関節の病気・症状（複数回答）

	男性(N=656)										女性(N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨折	17	2.6%	79	12.0%	6	0.9%	0	0.0%	102	15.5%	21	2.9%	123	16.9%	9	1.2%	0	0.0%	153	21.0%
椎間板ヘルニア	29	4.4%	34	5.2%	19	2.9%	0	0.0%	82	12.5%	19	2.6%	11	1.5%	14	1.9%	0	0.0%	44	6.0%
骨粗しょう症	19	2.9%	1	0.2%	12	1.8%	0	0.0%	32	4.9%	149	20.5%	7	1.0%	30	4.1%	0	0.0%	186	25.5%
骨の変形	7	1.1%	2	0.3%	10	1.5%	0	0.0%	19	2.9%	43	5.9%	3	0.4%	42	5.8%	0	0.0%	88	12.1%
痛風	48	7.3%	10	1.5%	13	2.0%	0	0.0%	71	10.8%	5	0.7%	2	0.3%	3	0.4%	0	0.0%	10	1.4%
関節痛	38	5.8%	2	0.3%	62	9.5%	0	0.0%	102	15.5%	100	13.7%	19	2.6%	75	10.3%	0	0.0%	194	26.6%
ガングリオン	4	0.6%	18	2.7%	10	1.5%	0	0.0%	32	4.9%	11	1.5%	39	5.4%	27	3.7%	0	0.0%	77	10.6%
骨痛(骨がうずくような痛み)	5	0.8%	1	0.2%	16	2.4%	0	0.0%	22	3.4%	26	3.6%	0	0.0%	26	3.6%	0	0.0%	52	7.1%
肩こり	49	7.5%	7	1.1%	124	18.9%	0	0.0%	180	27.4%	122	16.8%	11	1.5%	213	29.3%	0	0.0%	346	47.5%
腰痛	112	17.1%	29	4.4%	167	25.5%	0	0.0%	308	47.0%	156	21.4%	33	4.5%	183	25.1%	0	0.0%	372	51.1%
その他	13	2.0%	4	0.6%	7	1.1%	2	0.3%	26	4.0%	9	1.2%	3	0.4%	7	1.0%	6	0.8%	25	3.4%
病気症状は特にない	164	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	164	25.0%	103	14.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	103	14.1%
未回答	44	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	6.7%	24	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	3.3%


	計(N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨折	38	2.7%	202	14.6%	15	1.1%	0	0.0%	255	18.4%
椎間板ヘルニア	48	3.5%	45	3.3%	33	2.4%	0	0.0%	126	9.1%
骨粗しょう症	168	12.1%	8	0.6%	42	3.0%	0	0.0%	218	15.8%
骨の変形	50	3.6%	5	0.4%	52	3.8%	0	0.0%	107	7.7%
痛風	53	3.8%	12	0.9%	16	1.2%	0	0.0%	81	5.9%
関節痛	138	10.0%	21	1.5%	137	9.9%	0	0.0%	296	21.4%
ガングリオン	15	1.1%	57	4.1%	37	2.7%	0	0.0%	109	7.9%
骨痛(骨がうずくような痛み)	31	2.2%	1	0.1%	42	3.0%	0	0.0%	74	5.3%
肩こり	171	12.4%	18	1.3%	337	24.3%	0	0.0%	526	38.0%
腰痛	268	19.4%	62	4.5%	350	25.3%	0	0.0%	680	49.1%
その他	22	1.6%	7	0.5%	14	1.0%	8	0.6%	51	3.7%
病気症状は特にない	267	19.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	267	19.3%
未回答	68	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	68	4.9%

骨粗しょう症で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、「内服薬」135件（80.4%）（男性14件（73.7%）、女性121件（81.2%））が最も多くなっている。（表9-19-2、図9-19-2）

表9-19-2 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法

	男性(N=19)		女性(N=149)		計(N=168)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事又は運動療法のみ	2	10.5%	19	12.8%	21	12.5%
内服薬	14	73.7%	121	81.2%	135	80.4%
注射薬	4	21.1%	32	21.5%	36	21.4%
その他	3	15.8%	7	4.7%	10	6.0%
未回答	1	5.3%	3	2.0%	4	2.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-19-2 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法 性別



2.9.20 皮膚・爪の病気・症状について

皮膚・爪の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「皮膚の掻痒（かゆみ）」と回答した方が485件（35.0%）（男性230件（35.1%）、女性255件（35.0%））と最も多く、その中は「症状はあるが治療していない」266件（19.2%）（男性133件（20.3%）、女性133件（18.3%））、「医療機関で治療中」191件（13.8%）（男性85件（13.0%）、女性106件（14.6%））、「医療機関での治療をへて治癒」28件（2.0%）（男性12件（1.8%）、女性16件（2.2%））となっている。（表9-20-1）

表9-20-1 皮膚・爪の病気・症状（複数回答）

	男性(N=656)										女性(N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ざ瘡(にきび)	11	1.7%	11	1.7%	68	10.4%	0	0.0%	90	13.7%	13	1.8%	24	3.3%	67	9.2%	0	0.0%	104	14.3%
毛孔の開大・面皰毛穴が広がる、黒にきび	3	0.5%	6	0.9%	45	6.9%	0	0.0%	54	8.2%	13	1.8%	8	1.1%	62	8.5%	0	0.0%	83	11.4%
色素沈着(肌が黒くなる)	14	2.1%	4	0.6%	48	7.3%	0	0.0%	66	10.1%	14	1.9%	11	1.5%	76	10.4%	0	0.0%	101	13.9%
爪の変形	26	4.0%	3	0.5%	120	18.3%	0	0.0%	149	22.7%	50	6.9%	6	0.8%	143	19.6%	0	0.0%	199	27.3%
粉瘤(皮膚のふくら)	11	1.7%	18	2.7%	39	5.9%	1	0.2%	69	10.5%	20	2.7%	21	2.9%	44	6.0%	0	0.0%	85	11.7%
粘液囊腫(関節のふくら)	1	0.2%	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	4	0.6%	4	0.5%	3	0.4%	5	0.7%	0	0.0%	12	1.6%
掌蹼腫瘍症	3	0.5%	2	0.3%	10	1.5%	0	0.0%	15	2.3%	4	0.5%	10	1.4%	7	1.0%	0	0.0%	21	2.9%
湿疹がでやすい	61	9.3%	7	1.1%	64	9.8%	0	0.0%	132	20.1%	100	13.7%	15	2.1%	86	11.8%	1	0.1%	202	27.7%
皮膚の掻痒(かゆみ)	85	13.0%	12	1.8%	133	20.3%	0	0.0%	230	35.1%	106	14.6%	16	2.2%	133	18.3%	0	0.0%	255	35.0%
乾燥肌(さめ肌)	38	5.8%	2	0.3%	72	11.0%	0	0.0%	112	17.1%	56	7.7%	4	0.5%	96	13.2%	0	0.0%	156	21.4%
眉毛	9	1.4%	5	0.8%	32	4.9%	0	0.0%	46	7.0%	10	1.4%	10	1.4%	27	3.7%	0	0.0%	47	6.5%
白斑	3	0.5%	0	0.0%	12	1.8%	0	0.0%	15	2.3%	6	0.8%	0	0.0%	15	2.1%	0	0.0%	21	2.9%
紫斑(内出血)	9	1.4%	0	0.0%	19	2.9%	0	0.0%	28	4.3%	15	2.1%	2	0.3%	50	6.9%	0	0.0%	67	9.2%
その他	10	1.5%	4	0.6%	8	1.2%	7	1.1%	29	4.4%	13	1.8%	4	0.5%	10	1.4%	5	0.7%	32	4.4%
病気症状は特にな	198	30.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	198	30.2%	200	27.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	200	27.5%
未回答	60	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	60	9.1%	43	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	5.9%


	計(N=1384)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ざ瘡(にきび)	24	1.7%	35	2.5%	135	9.8%	0	0.0%
毛孔の開大・面皰毛穴が広がる、黒にきび	16	1.2%	14	1.0%	107	7.7%	0	0.0%
色素沈着(肌が黒くなる)	28	2.0%	15	1.1%	124	9.0%	0	0.0%
爪の変形	76	5.5%	9	0.7%	263	19.0%	0	0.0%
粉瘤(皮膚のふくら)	31	2.2%	39	2.8%	83	6.0%	0	0.0%
粘液囊腫(関節のふくら)	5	0.4%	3	0.2%	8	0.6%	0	0.0%
掌蹼腫瘍症	7	0.5%	12	0.9%	17	1.2%	0	0.0%
湿疹がでやすい	161	11.6%	22	1.6%	150	10.8%	1	0.1%
皮膚の掻痒(かゆみ)	191	13.8%	28	2.0%	266	19.2%	0	0.0%
乾燥肌(さめ肌)	94	6.8%	6	0.4%	168	12.1%	0	0.0%
眉毛	19	1.4%	15	1.1%	59	4.3%	0	0.0%
白斑	9	0.7%	0	0.0%	27	2.0%	0	0.0%
紫斑(内出血)	24	1.7%	2	0.1%	69	5.0%	0	0.0%
その他	23	1.7%	8	0.6%	18	1.3%	12	0.9%
病気症状は特にな	388	28.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	103	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

湿疹がでやすいと回答した方について、湿疹が特にでやすい場所をみると、「体躯(胸、背中、腹、腰)」223件（48.9%）（男性99件（56.9%）、女性124件（44.0%））が最も多くなっている。（表9-20-2、図9-20-2）

表9-20-2 湿疹が特にでやすい場所

	男性(N=174)		女性(N=282)		計(N=456)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節の裏(ひじ、ひざ)	17	9.8%	35	12.4%	52	11.4%
顔面	27	15.5%	57	20.2%	84	18.4%
体躯(胸、背中、腹、腰)	99	56.9%	124	44.0%	223	48.9%
その他	28	16.1%	56	19.9%	84	18.4%
未回答	3	1.7%	10	3.5%	13	2.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-20-2 湿疹が特にでやすい場所 性別



2.9.21 アレルギー疾患について

アレルギー疾患について、これまでかかったことがある病気をみると、「花粉症」349件（25.2%）（男性140件（21.3%）、女性209件（28.7%））と最も多く、その中で男性は「症状はあるが治療していない」70件（10.7%）、「医療機関で治療中」62件（9.5%）、「医療機関での治療をへて治癒」7件（1.1%）、女性は「医療機関で治療中」108件（14.8%）、「症状はあるが治療していない」84件（11.5%）、「医療機関での治療をへて治癒」17件（2.3%）となっている。（表9－21）

表9－21 アレルギー疾患の病気・症状（複数回答）

	男性 (N=656)										女性 (N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	8	1.2%	3	0.5%	11	1.7%	0	0.0%	22	3.4%	10	1.4%	7	1.0%	13	1.8%	0	0.0%	30	4.1%
アレルギー性鼻炎	33	5.0%	9	1.4%	44	6.7%	0	0.0%	86	13.1%	72	9.9%	24	3.3%	57	7.8%	0	0.0%	153	21.0%
花粉症	62	9.5%	7	1.1%	70	10.7%	1	0.2%	140	21.3%	108	14.8%	17	2.3%	84	11.5%	0	0.0%	209	28.7%
喘息	16	2.4%	15	2.3%	17	2.6%	0	0.0%	48	7.3%	37	5.1%	21	2.9%	12	1.6%	0	0.0%	70	9.6%
蕁麻疹	16	2.4%	20	3.0%	22	3.4%	0	0.0%	58	8.8%	28	3.8%	65	8.9%	31	4.3%	0	0.0%	124	17.0%
食物アレルギー	4	0.6%	3	0.5%	29	4.4%	0	0.0%	36	5.5%	13	1.8%	12	1.6%	33	4.5%	0	0.0%	58	8.0%
薬物アレルギー	3	0.5%	7	1.1%	16	2.4%	0	0.0%	26	4.0%	8	1.1%	14	1.9%	32	4.4%	0	0.0%	54	7.4%
その他	3	0.5%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	5	0.8%	7	1.0%	2	0.3%	5	0.7%	11	1.5%	25	3.4%
病気症状は特にない	334	50.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	334	50.9%	281	38.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	281	38.6%
未回答	67	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	10.2%	48	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	6.6%

	計 (N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	18	1.3%	10	0.7%	24	1.7%	0	0.0%	52	3.8%
アレルギー性鼻炎	105	7.6%	33	2.4%	101	7.3%	0	0.0%	239	17.3%
花粉症	170	12.3%	24	1.7%	154	11.1%	1	0.1%	349	25.2%
喘息	53	3.8%	38	2.6%	29	2.1%	0	0.0%	119	8.5%
蕁麻疹	44	3.2%	85	6.1%	53	3.8%	0	0.0%	182	13.2%
食物アレルギー	17	1.2%	15	1.1%	62	4.5%	0	0.0%	94	6.8%
薬物アレルギー	11	0.8%	21	1.5%	48	3.5%	0	0.0%	80	5.8%
その他	10	0.7%	2	0.1%	7	0.5%	11	0.8%	30	2.2%
病気症状は特にない	615	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	615	44.4%
未回答	115	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	115	8.3%

2.9.22 膠原病について

膠原病について、これまでかかったことがある病気をみると、「関節リウマチ」36件（2.6%）（男性11件（1.7%）、女性25件（3.4%））と最も多く、その中で「医療機関で治療中」27件（2.0%）（男性7件（1.1%）、女性20件（2.7%））、「症状はあるが治療していない」6件（0.4%）（男性3件（0.5%）、女性3件（0.4%））、「医療機関での治療をへて治癒」3件（0.2%）（男性1件（0.2%）、女性2件（0.3%））となっている。（表9-22-1）

表9-22-1 膠原病（複数回答）

	男性(N=656)												女性(N=728)												合計	
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計							
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合						
関節リウマチ	7	1.1%	1	0.2%	3	0.5%	0	0.0%	11	1.7%	20	2.7%	2	0.3%	3	0.4%	0	0.0%	25	3.4%						
全身性エリテマトーデスSLE	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.3%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	4	0.5%						
強皮症	0	0.0%	1	0.2%	2	0.3%	0	0.0%	3	0.5%	3	0.4%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	5	0.7%						
皮膚筋炎	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	2	0.3%						
シェーグレン症候群	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.3%	5	0.7%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	8	1.1%						
ベーチェット病	1	0.2%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	2	0.3%						
その他	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	5	0.8%	7	1.0%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.4%	13	1.8%						
病気症状は特にない	517	78.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	517	78.8%	564	77.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	564	77.5%						
未回答	121	18.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	121	18.4%	120	16.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	120	16.5%						


	計(N=1384)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療 をへて治癒		症状はあるが治療 していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	27	2.0%	3	0.2%	6	0.4%	0	0.0%	36	2.6%
全身性エリテマトーデスSLE	2	0.1%	0	0.0%	4	0.3%	0	0.0%	6	0.4%
強皮症	3	0.2%	1	0.1%	4	0.3%	0	0.0%	8	0.6%
皮膚筋炎	1	0.1%	0	0.0%	3	0.2%	0	0.0%	4	0.3%
シェーグレン症候群	5	0.4%	0	0.0%	5	0.4%	0	0.0%	10	0.7%
ベーチェット病	1	0.1%	1	0.1%	3	0.2%	0	0.0%	5	0.4%
その他	10	0.7%	1	0.1%	2	0.1%	5	0.4%	18	1.3%
病気症状は特にない	1081	78.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1081	78.1%
未回答	241	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	241	17.4%

膠原病で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、「内服薬」26件（54.2%）（男性6件（54.5%）、女性20件（54.1%））が最も多くなっている。（表9-22-2、図9-22-2）

表9-22-2 膠原病 過去・現在の治療状況 治療方法

	男性(N=11)		女性(N=36)		計(N=47)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事又は運動療法のみ	0	0.0%	3	8.3%	3	6.4%
内服薬	6	54.5%	20	55.6%	26	55.3%
注射薬	0	0.0%	5	13.9%	5	10.6%
その他	0	0.0%	3	8.3%	3	6.4%
未回答	5	45.5%	5	13.9%	10	21.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図9-19-2 膠原病 過去・現在の治療状況 治療方法 性別



2.9.23 その他の病気・症状について

その他の病気・症状について、これまでかかったことがある病気をみると、「手足のしびれ」503件（36.3%）（男性216件（32.9%）、女性287件（39.4%））と最も多く、その中で「症状はあるが治療していない」330件（23.8%）（男性145件（22.1%）、女性185件（25.4%））、「医療機関で治療中」160件（11.6%）（男性63件（9.6%）、女性97件（13.3%））、「医療機関での治療をへて治癒」12件（0.9%）（男性7件（1.1%）、女性5件（0.7%））となっている。（表9－23）

表9－23 その他の病気・症状（複数回答）

	男性(N=656)										女性(N=728)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計		医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感(体がだるい)	39	5.9%	3	0.5%	142	21.6%	0	0.0%	184	28.0%	75	10.3%	2	0.3%	179	24.6%	0	0.0%	256	35.2%
手足のしびれ	63	9.6%	7	1.1%	145	22.1%	1	0.2%	216	32.9%	97	13.3%	5	0.7%	185	25.4%	0	0.0%	287	39.4%
体がつる	31	4.7%	1	0.2%	118	18.0%	1	0.2%	151	23.0%	53	7.3%	1	0.1%	120	16.5%	0	0.0%	174	23.9%
のどがつる	2	0.3%	0	0.0%	9	1.4%	0	0.0%	11	1.7%	5	0.7%	0	0.0%	16	2.2%	0	0.0%	21	2.9%
筋肉の痛み	36	5.5%	0	0.0%	68	10.4%	0	0.0%	104	15.9%	66	9.1%	2	0.3%	83	11.4%	0	0.0%	151	20.7%
体がむくむ	22	3.4%	1	0.2%	48	7.3%	0	0.0%	71	10.8%	68	9.3%	7	1.0%	85	11.7%	0	0.0%	160	22.0%
日光に当たると肌が腫れたり湿疹がでたりする	5	0.8%	1	0.2%	18	2.7%	0	0.0%	24	3.7%	21	2.9%	8	1.1%	47	6.5%	0	0.0%	76	10.4%
指が腫れる	8	1.2%	0	0.0%	30	4.6%	0	0.0%	38	5.8%	41	5.6%	1	0.1%	73	10.0%	0	0.0%	115	15.8%
全身に痛みがある	13	2.0%	0	0.0%	19	2.9%	0	0.0%	32	4.9%	33	4.5%	1	0.1%	42	5.8%	0	0.0%	76	10.4%
手足に痛みがある	39	5.9%	2	0.3%	79	12.0%	0	0.0%	120	18.3%	115	15.8%	3	0.4%	127	17.4%	0	0.0%	245	33.7%
その他	7	1.1%	0	0.0%	18	2.7%	10	1.5%	35	5.3%	9	1.2%	1	0.1%	17	2.3%	10	1.4%	37	5.1%
病気症状は特にならない	217	33.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	217	33.1%	171	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	171	23.5%
未回答	65	9.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	9.9%	38	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	5.2%

	計(N=1384)							
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		症状はあるが治療していない		不詳	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感(体がだるい)	114	8.2%	5	0.4%	321	23.2%	0	0.0%
手足のしびれ	160	11.6%	12	0.9%	330	23.8%	1	0.1%
体がつる	84	6.1%	2	0.1%	238	17.2%	1	0.1%
のどがつる	7	0.5%	0	0.0%	25	1.8%	0	0.0%
筋肉の痛み	102	7.4%	2	0.1%	151	10.9%	0	0.0%
体がむくむ	90	6.5%	8	0.6%	133	9.6%	0	0.0%
日光に当たると肌が腫れたり湿疹がでたりする	26	1.9%	9	0.7%	65	4.7%	0	0.0%
指が腫れる	49	3.5%	1	0.1%	103	7.4%	0	0.0%
全身に痛みがある	46	3.3%	1	0.1%	61	4.4%	0	0.0%
手足に痛みがある	154	11.1%	5	0.4%	206	14.9%	0	0.0%
その他	16	1.2%	1	0.1%	35	2.5%	20	1.4%
病気症状は特にならない	388	28.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	103	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2.10 調査票の自由記入欄について

本調査では、「これまでの症状や病気について、書ききれなかったことや、特に研究してもらいたいこと、要望など」について自由記入欄を設けたところ、251人から回答があった。いずれも、回答いただいた一人一人の貴重なご意見ではあるが、ここでは代表的な内容のみを要約して記載するにとどめることとした。（記載は可能な限り原文のままとしている。）

なお、以下を含め、回答いただいたご意見については、「（再掲）2.10 調査票の自由記入欄について」に再掲している。

また、個別の相談支援が必要な、お困りの状況についての記載があった方については、都道府県に設置している相談支援員等が、詳しく状況をお聴きし、相談支援を行っています。

<自由記載欄の主な記入内容>

○自分、家族の健康に関する不安、生活上のストレス等について（183件）

- ・歯科も今年から異常がなければ定期的で良くなり内科も外科も症状が悪い時にだけ病院に行くのでとても楽になりほっとしています。これ迄の病院通いの事を考えるとこれほど体と心の負担が大きかったかが今さらながら感じます。今迄は信じられない体の異常と心の痛みの毎日でした。二度とこの五十年間のつらい日にもどりたくありません。自分の心の問題は他人（身内でも）には絶対記したくない。いつもここに書く事によって気持ちがおさまります。相手は見えないし、私だけの一方的な言葉で思った事を言えた事で、長く胸の中にたまっていたわだかまりが取れました。
- ・指の変形により人の前に手が出しにくい
- ・今まで体質の弱さとはばかり思っていたことが、今回の認定により全てがつながっていく思いだ。60才を前にはっきりしたことがわかりよかったと思う反面、怖さPやいろいろな思いも交錯する。当時一緒に暮らしていた兄姉に私から認定申請を勧めることはむずかしい。自ら疑問に思い検診を受けることを願うだけである。
- ・苦しんでいる者が少しでも楽に病気と向き合っていくにはどうしたらよいのか問題の大きさを感ずる。
- ・こんなものだと思い 何十年も過ごしてきましたので持病のようなものだと思っています。 痛い時、などは痛み止めをのんですごして、自分と向き合っています。
- ・孫がヒフが弱く、蚊にさされても治療が必要なことがある。子は、特に何も無いが、隔世遺伝の様に、子でなく、孫に影響することがあるのか。心配に思っている
- ・今後、年齢をかさねるにつれ、将来が不安で夜も眠れない事もしばしばあります。
- ・家族に油症患者の事を伝えてないため、体に不調になると、両親に相談をし、1人で悩んでいる事が多くなり、精神的にも辛い日々を送っております。
- ・私事です、娘が秋に出産します。聞いた時にすぐおめでとう言葉が出るのでしょうか、私は言えませんでした。喜んで話している娘の声を聞きながら、五体満足の赤ちゃんが産まれてくるだろうか まさか黒い赤ちゃんは産まれないよねとカネミ油症の症状をいろいろ考えました。
- ・私達、カネミ油症看者は自分の事はもちろんですが、子供、孫、ひ孫と次の世代への心配と不安はつきません。この苦しみ、悲しみ、憤りはどこにぶつければいいですか。カネカですか。カネミ倉庫ですか。それさえできません。
- ・だんだん子供がカネミ油症の症状がでてきています。すべて何もなかった事にしたいくらい申し分けなくて誰にも公言してませんから、私が経験したことはさせたくありませんからすべてが早く終ってほしいです。
- ・結婚も就職も相手にしらせたくない。今、思うと、その事がどれだけ自分をセーブしていたかと思う。人の人生を変えてしまう事である。
- ・深刻な次世代の健康被害を分かっている。そして助けてほしい。油を食べていない子供達までも苦悩の日々を送っています。親として見るに忍びないです。
- ・油症の事の発端はもう50年前。高校の授業中先生から皆の前で君のその顔色は異常だ気持ちが悪いから帰きなさいとひどい事を言われ、次々と異常な吹き出物が多く始め、体調も不調が増すばかり。
- ・人生が狂ってしまいました。母は、自分が油症患者とは知らずに30年間、癌や難病に苦しみ続け、命を終えようとしています。

○職業（仕事）に関する苦勞について（5件）

- ・油症のため、結婚もまた、まともな仕事も出来ず、めちゃくちゃな人生です。

○経済的な苦勞について（4件）

- ・外国に移住とまでは考えていませんが、長期に渡った場合の医療費が、やはり気になります。旅行中は、医療保険等に加入して渡航はしますが、高額になるとの事なのでやはり気になります。県の担当者の方を通してでも良いので現状等をお話し頂けませんか？

○治療法の研究開発への要望、期待（32件）

- ・ 今後は2世の研究が進んでいくことを希望する。
- ・ 根本原因の究明にはまだ時間がかかりますか？
- ・ 何世代まで影響がありますか？
- ・ 粉瘤を手術してきれいに直したい。外科手術は大きなキズが残ると聞くと、きれいに治る方法を検討して下さい。
- ・ 出来ましたら頭皮について研究して頂きたいです。
- ・ 2世への遺伝子の影響。
- ・ 2世・3世の健康が気になります。誕生後から気になる症状はたくさんありましたが、診断名が見つからないこともありました。
- ・ 永久歯に筋が入っています。又、現在歯科受診をしています。歯の根が浅いと言われてます。歯の形成とカネミの関係の事研究して欲しいです。
- ・ ダイオキシンが体から排除される研究を今後ともしっかり進めてほしいです。
- ・ 不信感を毎日抱いていて油症研究はなんも今頃になって遅過ぎる。51年もたったにもかかわらずここまでたってしまった以上自分で生き方を考えるしかないようですね。
- ・ 研究機関が九州大学から変更とかはないのでしょうか？ 毎回研究報告会に参加していますが、変化や成果が期待できない。

○病院、医師、検診に関する要望（16件）

- ・ 統一した検診を ある県には婦人科があったり、なかったりしているの。
- ・ 全身倦怠感や医療機関に相談する科は内科なのか、その際、薬など服用してもらえるのか不安で、認定患者以外の人も倦怠感がある人も多いので、その差を認めてもらえないような感じがします。
- ・ 去年、入院していたので検査が出来ませんでした。それで第一希望ではなく第二希望に電話したのですが、人が多いので出来ないと言われました。一人位は出来そうでも出来ないのでしょうか。年に一度の検査なのではいりよしてもらえればと思いました。
- ・ 油症検診の結果が4か月はありえないです。
- ・ すべての医療機関で使用出来たらいいと思います。領収書をまとめて送付するのは手間がかかる為。
- ・ 検診会場を交通の便が良いところで実施してほしい。

○行政機関に対する要望（24件）

- ・ 2世を含む未確定被害者の実態調査を求む。
- ・ 認定基準は、血中濃度PCDFの残留濃度に力点をおかず、症状による判断を求める。
- ・ 年令的に年々病院通いが増え、もの忘れが多くなり今回の調査の様に今迄の全てに回答は疲れました。
- ・ 質問がわかりにくく書き直した項目も少なくありません。次回よりもう少しわかりやすくしてほしいです。
- ・ 日頃より大変お世話様になりまして、本当にありがとうございます。私達油症患者のため温かいご配慮下さいまして心より感謝いたしております。
- ・ 今回のアンケートの回答のしかたが、治療中、治癒、治療していないの3つでしたが、非常に答えにくいと思いました。
- ・ これからも、私たち油症患者を見捨てないで下さい。
- ・ 国は油症の改善に研究に尽力してほしいと思います。
- ・ 毎回同じ様毎年、同様な調査票に回答しているが、食品公害「カネミ油症」事件が発覚してから50年、半世紀が経過しようとしている。これほど三者協議(国、カネミ倉庫、患者)での会議でも、ただ単に過去を過去を踏襲してマンネリ化して進展が全く見られない。厚労省、農水省のお役人にしても、人事異動をくりかえし、患者に寄添って行く行政が見られない。又カネミ倉庫、九州大学の研究者についても、ご本人たちには、痛くもかゆくもなく、苦しみ悲しみもない。その苦痛は、患者のみが感じている。したがってもうすこし(いかばかりか?)患者サイドに寄添った行政を希望して止まない。な内容ですが、本人が高齢で書けなくなっています。また、文章に理解ができない所が多いです。
- ・ 本要望を書くにあたり回答が全く得られていない。一方通行では何の意味もありません。具体的にアンケート調査などを実施してはいかがでしょうか？

○カネミ倉庫に対する要望（5件）

- ・ 病気で入院になると家族に、せつめいがある時などカネミ倉庫方は、つきそいの交通と宿泊の分はだしてくれませんか
- ・ 欠損歯が生まれつき有る。永久歯がなかったのが大事にしてきた乳歯が抜けた。医者には今後の事も有るのでインプラントを

すすめられた。自費となるため、現在治療を中断しています。治療費を出していただきたい。生まれながらの油症患者です。黒い赤ちゃんで新聞にも出てます。

- ・受療券を使用できる医療機関に於いて風邪で受診した場合、窓口で費用負担を求められます。風邪は油症とは関連のない治療として加害企業への請求枠から除外されています。風邪は誰でもが罹る疾患ではありますが、油症被害者の場合風邪ひきやすく、又免疫力が弱い為、中々治りづらい傾向にあります。加害企業の負担の枠から除外されていることに疑問を感じます。
- ・病院から介護施設に移った時に介護保険を使った時に、カネミが、介護保険を使った場合の支払いをしない事。具体的な理由が知りたい。
- ・病院が遠隔の地域でバス通院は無理です。タクシー等の通院に支援をしていただきたいと思います、よろしくお願いします。

○その他（19件）

- ・「油症受療券」を提出したところ、「カネミ油症との因果関係が見当たらないので」という事でお断わりをされました。昨年のこのアンケートの中に入っていた「受療券契約医療機関一覧」のとじた用紙を持参していたので、病院名が書いている事を説明すると、事務の方がカネミ倉庫に電話してくれて、数十分待たされた後に、やっと手続きをしてくれる事になりました。数年前にも同じように言われたので今回一覧表を持参していたのできちんと対応して頂けました。しかし、一覧表に載っている医療機関でも説明しても無理な病院が多いのが現状です。嫌な顔をされる事もあるので領収書をもらってカネミ倉庫に送らせて頂いています。
- ・健康実態調査及び検診は毎年実施していただき、自分の健康状態が把握でき助かっています。

※お一人から複数の趣旨の回答を頂いている場合があるため、各件数の合計と回答者数とは必ずしも一致しません。

別表 調査結果の性・年齢（5歳階級）別集計表

別表 1

1 日の歩行時間、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	90分以上	60分以上 ～90分未 満	30分以上 ～60分未 満	30分未満	未回答	不詳
総数	1,384	420	249	385	320	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	5	0	2	0	0	0
45～49	47	23	5	14	5	0	0
50～54	164	65	25	43	31	0	0
55～59	241	88	42	77	33	1	0
60～64	228	79	51	59	39	0	0
65～69	184	70	33	49	31	1	0
70～74	130	34	28	47	20	1	0
75～79	112	26	21	38	26	1	0
80～84	123	17	23	29	49	5	0
85～89	94	9	17	21	46	1	0
90歳以上	54	4	4	6	40	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	656	173	121	204	152	6	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	1	0	0	0
45～49	27	11	4	9	3	0	0
50～54	88	26	15	25	22	0	0
55～59	115	32	14	46	22	1	0
60～64	116	34	28	32	22	0	0
65～69	88	28	14	30	15	1	0
70～74	59	16	18	16	8	1	0
75～79	51	12	8	19	12	0	0
80～84	54	6	7	14	24	3	0
85～89	44	5	11	10	18	0	0
90歳以上	12	2	2	2	6	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	728	247	128	181	168	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	4	0	1	0	0	0
45～49	20	12	1	5	2	0	0
50～54	76	39	10	18	9	0	0
55～59	126	56	28	31	11	0	0
60～64	112	45	23	27	17	0	0
65～69	96	42	19	19	16	0	0
70～74	71	18	10	31	12	0	0
75～79	61	14	13	19	14	1	0
80～84	69	11	16	15	25	2	0
85～89	50	4	6	11	28	1	0
90歳以上	42	2	2	4	34	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 2

運動（スポーツ）頻度、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	ほぼ毎日	週2～4回 程度	週1回程度	月1回程度	ほとんど していない	未回答	不詳
総数	1,384	237	285	192	47	617	6	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	1	2	0	3	0	0
45～49	47	3	9	9	1	25	0	0
50～54	164	20	26	22	9	86	1	0
55～59	241	32	42	37	15	114	1	0
60～64	228	30	48	28	11	111	0	0
65～69	184	32	52	29	4	66	1	0
70～74	130	32	31	19	2	46	0	0
75～79	112	30	32	14	4	31	1	0
80～84	123	34	18	22	1	46	2	0
85～89	94	20	18	6	0	50	0	0
90歳以上	54	3	8	4	0	39	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	129	132	90	27	274	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	1	1	0	0	0	0
45～49	27	0	6	7	1	13	0	0
50～54	88	10	13	14	7	43	1	0
55～59	115	15	16	21	11	51	1	0
60～64	116	17	23	15	5	56	0	0
65～69	88	18	22	12	2	33	1	0
70～74	59	17	16	5	0	21	0	0
75～79	51	18	17	4	1	11	0	0
80～84	54	18	6	8	0	21	1	0
85～89	44	15	10	2	0	17	0	0
90歳以上	12	1	2	1	0	8	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	108	153	102	20	343	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	1	0	3	0	0
45～49	20	3	3	2	0	12	0	0
50～54	76	10	13	8	2	43	0	0
55～59	126	17	26	16	4	63	0	0
60～64	112	13	25	13	6	55	0	0
65～69	96	14	30	17	2	33	0	0
70～74	71	15	15	14	2	25	0	0
75～79	61	12	15	10	3	20	1	0
80～84	69	16	12	14	1	25	1	0
85～89	50	5	8	4	0	33	0	0
90歳以上	42	2	6	3	0	31	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3

飲酒頻度、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	ほぼ毎日	週3～5回 程度	週1～2回 程度	月1～3回 程度	年1～10回 程度	飲まない	未回答	不詳
総数	1,384	266	112	90	86	76	742	12	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	3	0	1	1	1	0	0
45～49	47	8	7	7	4	8	13	0	0
50～54	164	45	13	19	17	11	58	1	0
55～59	241	52	30	19	18	21	97	4	0
60～64	228	59	22	12	13	16	105	1	0
65～69	184	34	17	13	9	6	103	2	0
70～74	130	30	5	9	7	6	72	1	0
75～79	112	15	6	5	8	3	74	1	0
80～84	123	14	3	4	3	3	95	1	0
85～89	94	6	5	2	6	1	73	1	0
90歳以上	54	2	1	0	0	0	51	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	216	78	46	51	27	227	11	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45～49	27	8	5	3	2	4	5	0	0
50～54	88	33	10	9	9	5	21	1	0
55～59	115	36	20	10	11	3	31	4	0
60～64	116	52	14	8	7	7	27	1	0
65～69	88	26	12	8	6	2	32	2	0
70～74	59	26	3	1	6	4	19	0	0
75～79	51	14	5	3	3	2	23	1	0
80～84	54	13	2	2	3	0	33	1	0
85～89	44	6	4	2	4	0	27	1	0
90歳以上	12	2	1	0	0	0	9	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	50	34	44	35	49	515	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	1	0	1	1	1	0	0
45～49	20	0	2	4	2	4	8	0	0
50～54	76	12	3	10	8	6	37	0	0
55～59	126	16	10	9	7	18	66	0	0
60～64	112	7	8	4	6	9	78	0	0
65～69	96	8	5	5	3	4	71	0	0
70～74	71	4	2	8	1	2	53	1	0
75～79	61	1	1	2	5	1	51	0	0
80～84	69	1	1	2	0	3	62	0	0
85～89	50	0	1	0	2	1	46	0	0
90歳以上	42	0	0	0	0	0	42	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 4

飲酒量（ビール大瓶換算）、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	0.5本未満	0.5～1.0 本未満	1～2本未 満	2～3本未 満	3～4本未 満	4～5本未 満	5～10本未 満	10本以上	未回答	不詳
総数	630	23	201	247	104	19	5	6	2	23	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	6	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0
45～49	34	0	11	13	6	0	0	1	0	3	0
50～54	105	1	32	44	22	3	1	1	1	0	0
55～59	140	5	49	45	24	10	2	1	1	3	0
60～64	122	1	33	51	28	5	0	2	0	2	0
65～69	79	7	23	35	9	1	2	1	0	1	0
70～74	57	3	18	21	10	0	0	0	0	5	0
75～79	37	2	10	16	3	0	0	0	0	6	0
80～84	27	3	10	13	1	0	0	0	0	0	0
85～89	20	1	12	5	0	0	0	0	0	2	0
90歳以上	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	418	3	101	184	91	15	4	6	1	13	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
45～49	22	0	4	10	5	0	0	1	0	2	0
50～54	66	0	14	25	21	3	1	1	1	0	0
55～59	80	0	18	29	21	8	2	1	0	1	0
60～64	88	0	16	41	25	3	0	2	0	1	0
65～69	54	2	12	30	7	1	1	1	0	0	0
70～74	40	1	12	18	7	0	0	0	0	2	0
75～79	27	0	7	12	3	0	0	0	0	5	0
80～84	20	0	7	12	1	0	0	0	0	0	0
85～89	16	0	10	5	0	0	0	0	0	1	0
90歳以上	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	212	20	100	63	13	4	1	0	1	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
45～49	12	0	7	3	1	0	0	0	0	1	0
50～54	39	1	18	19	1	0	0	0	0	0	0
55～59	60	5	31	16	3	2	0	0	1	2	0
60～64	34	1	17	10	3	2	0	0	0	1	0
65～69	25	5	11	5	2	0	1	0	0	1	0
70～74	17	2	6	3	3	0	0	0	0	3	0
75～79	10	2	3	4	0	0	0	0	0	1	0
80～84	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
85～89	4	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 5

喫煙状況、性、年齢（5歳階級）別

性 年齢階層	総数	吸う	やめた	吸わない	未回答	不詳
総数	1,384	215	210	861	98	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	7	2	1	3	1	0
45～49	47	13	11	16	7	0
50～54	164	43	28	80	13	0
55～59	241	53	28	142	18	0
60～64	228	45	40	123	20	0
65～69	184	22	34	115	13	0
70～74	130	15	29	80	6	0
75～79	112	12	14	78	8	0
80～84	123	7	11	97	8	0
85～89	94	3	9	79	3	0
90歳以上	54	0	5	48	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	656	164	175	238	79	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	1	0	0	0
45～49	27	10	8	5	4	0
50～54	88	33	20	25	10	0
55～59	115	38	24	37	16	0
60～64	116	34	36	32	14	0
65～69	88	17	27	32	12	0
70～74	59	11	24	20	4	0
75～79	51	10	12	22	7	0
80～84	54	7	11	28	8	0
85～89	44	3	8	30	3	0
90歳以上	12	0	4	7	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	728	51	35	623	19	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	3	1	0
45～49	20	3	3	11	3	0
50～54	76	10	8	55	3	0
55～59	126	15	4	105	2	0
60～64	112	11	4	91	6	0
65～69	96	5	7	83	1	0
70～74	71	4	5	60	2	0
75～79	61	2	2	56	1	0
80～84	69	0	0	69	0	0
85～89	50	0	1	49	0	0
90歳以上	42	0	1	41	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 6

喫煙状況（喫煙者 喫煙年数）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	2年未満	2年～3年 未満	3年～5年 未満	5年～10年 未満	10年～20 年未満	20年～30 年未満	30年～40 年未満	40年以上	未回答	不詳
総数	215	1	2	1	0	7	34	91	78	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
45～49	13	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0
50～54	43	0	0	0	0	0	6	36	0	1	0
55～59	53	1	0	0	0	2	7	35	8	0	0
60～64	45	0	1	0	0	2	7	9	26	0	0
65～69	22	0	0	1	0	1	2	4	14	0	0
70～74	15	0	1	0	0	1	0	1	12	0	0
75～79	12	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0
80～84	7	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0
85～89	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	164	0	2	1	0	1	24	64	72	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45～49	10	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
50～54	33	0	0	0	0	0	4	29	0	0	0
55～59	38	0	0	0	0	0	6	24	8	0	0
60～64	34	0	1	0	0	0	5	5	23	0	0
65～69	17	0	0	1	0	0	0	3	13	0	0
70～74	11	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0
75～79	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
80～84	7	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0
85～89	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	51	1	0	0	0	6	10	27	6	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
45～49	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
50～54	10	0	0	0	0	0	2	7	0	1	0
55～59	15	1	0	0	0	2	1	11	0	0	0
60～64	11	0	0	0	0	2	2	4	3	0	0
65～69	5	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0
70～74	4	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0
75～79	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7

喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	1～5本未 満	5本～10本 未満	10本～20 本未満	20本～30 本未満	30本～40 本未満	40本以上	未回答	不詳
総数	215	6	20	68	98	17	6	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	2	0	0	0	0	0
45～49	13	0	0	2	9	2	0	0	0
50～54	43	0	2	13	24	3	1	0	0
55～59	53	2	5	14	24	7	1	0	0
60～64	45	0	4	14	23	1	3	0	0
65～69	22	1	2	6	9	4	0	0	0
70～74	15	0	1	5	8	0	1	0	0
75～79	12	2	2	7	1	0	0	0	0
80～84	7	1	2	4	0	0	0	0	0
85～89	3	0	2	1	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	164	5	9	45	83	16	6	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	1	0	0	0	0	0
45～49	10	0	0	1	7	2	0	0	0
50～54	33	0	0	8	21	3	1	0	0
55～59	38	1	1	8	21	6	1	0	0
60～64	34	0	2	9	19	1	3	0	0
65～69	17	1	0	4	8	4	0	0	0
70～74	11	0	1	3	6	0	1	0	0
75～79	10	2	1	6	1	0	0	0	0
80～84	7	1	2	4	0	0	0	0	0
85～89	3	0	2	1	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	51	1	11	23	15	1	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	1	0	0	0	0	0
45～49	3	0	0	1	2	0	0	0	0
50～54	10	0	2	5	3	0	0	0	0
55～59	15	1	4	6	3	1	0	0	0
60～64	11	0	2	5	4	0	0	0	0
65～69	5	0	2	2	1	0	0	0	0
70～74	4	0	0	2	2	0	0	0	0
75～79	2	0	1	1	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8

喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	0～2年未 満	2年～3年 未満	3年～5年 未満	5年～10年 未満	10年～20 年未満	20年～30 年未満	30年～40 年未満	40年以上	未回答	不詳
総数	210	2	3	6	15	34	56	47	43	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45～49	11	0	0	0	0	2	8	0	0	1	0
50～54	28	0	1	0	3	3	14	7	0	0	0
55～59	28	0	1	0	2	4	12	8	1	0	0
60～64	40	1	0	4	3	9	9	9	4	1	0
65～69	34	0	0	1	3	6	4	9	11	0	0
70～74	29	0	1	1	1	4	2	5	15	0	0
75～79	14	0	0	0	1	4	4	1	2	2	0
80～84	11	1	0	0	0	0	0	6	4	0	0
85～89	9	0	0	0	1	1	2	2	3	0	0
90歳以上	5	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	175	2	3	4	11	30	46	39	38	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45～49	8	0	0	0	0	1	6	0	0	1	0
50～54	20	0	1	0	1	3	9	6	0	0	0
55～59	24	0	1	0	1	4	11	6	1	0	0
60～64	36	1	0	4	3	8	8	8	4	0	0
65～69	27	0	0	0	3	5	4	6	9	0	0
70～74	24	0	1	0	0	3	2	4	14	0	0
75～79	12	0	0	0	1	4	3	1	2	1	0
80～84	11	1	0	0	0	0	0	6	4	0	0
85～89	8	0	0	0	1	1	2	2	2	0	0
90歳以上	4	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	35	0	0	2	4	4	10	8	5	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
50～54	8	0	0	0	2	0	5	1	0	0	0
55～59	4	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0
60～64	4	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
65～69	7	0	0	1	0	1	0	3	2	0	0
70～74	5	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
75～79	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9

喫煙状況（卒煙者 喫煙本数）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	1～5本未 満	5本～10本 未満	10本～20 本未満	20本～30 本未満	30本～40 本未満	40本以上	未回答	不詳
総数	210	3	7	51	100	28	21	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	1	0	0	0	0
45～49	11	0	0	5	2	1	3	0	0
50～54	28	1	3	9	11	2	2	0	0
55～59	28	1	1	5	13	5	3	0	0
60～64	40	0	0	8	19	9	4	0	0
65～69	34	1	0	10	16	3	4	0	0
70～74	29	0	1	4	18	3	3	0	0
75～79	14	0	0	3	6	4	1	0	0
80～84	11	0	1	1	7	1	1	0	0
85～89	9	0	1	5	3	0	0	0	0
90歳以上	5	0	0	1	4	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	175	3	5	29	91	26	21	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	1	0	0	0	0
45～49	8	0	0	2	2	1	3	0	0
50～54	20	1	1	3	11	2	2	0	0
55～59	24	1	1	4	12	3	3	0	0
60～64	36	0	0	5	18	9	4	0	0
65～69	27	1	0	7	12	3	4	0	0
70～74	24	0	1	1	16	3	3	0	0
75～79	12	0	0	1	6	4	1	0	0
80～84	11	0	1	1	7	1	1	0	0
85～89	8	0	1	4	3	0	0	0	0
90歳以上	4	0	0	1	3	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	35	0	2	22	9	2	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	3	0	0	3	0	0	0	0	0
50～54	8	0	2	6	0	0	0	0	0
55～59	4	0	0	1	1	2	0	0	0
60～64	4	0	0	3	1	0	0	0	0
65～69	7	0	0	3	4	0	0	0	0
70～74	5	0	0	3	2	0	0	0	0
75～79	2	0	0	2	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	1	0	0	1	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 10

喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	1年未満	1年～2年 未満	2年～3年 未満	3年～4年 未満	4年～5年 未満	5年～10年 未満	10年～15 年未満	15年～20 年未満	20年～30 年未満	30年以上	未回答	不詳
総数	210	6	12	6	9	10	28	41	35	28	34	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45～49	11	0	1	0	1	1	2	4	1	1	0	0	0
50～54	28	3	0	2	0	3	5	6	4	5	0	0	0
55～59	28	0	4	1	3	0	4	6	6	3	1	0	0
60～64	40	0	3	1	1	2	7	6	5	7	8	0	0
65～69	34	2	3	2	1	1	3	6	9	3	4	0	0
70～74	29	0	1	0	1	3	4	8	5	1	6	0	0
75～79	14	0	0	0	0	0	0	3	3	2	5	1	0
80～84	11	1	0	0	1	0	1	1	1	3	3	0	0
85～89	9	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	0	0
90歳以上	5	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	175	4	11	5	5	6	22	37	30	21	33	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45～49	8	0	0	0	1	0	2	3	1	1	0	0	0
50～54	20	2	0	2	0	1	3	6	3	3	0	0	0
55～59	24	0	4	1	2	0	3	6	5	3	0	0	0
60～64	36	0	3	1	1	2	6	5	5	5	8	0	0
65～69	27	1	3	1	0	1	2	5	8	2	4	0	0
70～74	24	0	1	0	0	2	3	8	4	0	6	0	0
75～79	12	0	0	0	0	0	0	2	3	1	5	1	0
80～84	11	1	0	0	1	0	1	1	1	3	3	0	0
85～89	8	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	0
90歳以上	4	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	35	2	1	1	4	4	6	4	5	7	1	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
50～54	8	1	0	0	0	2	2	0	1	2	0	0	0
55～59	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
60～64	4	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0
65～69	7	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
70～74	5	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
75～79	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1

労働時間、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	10時間以上	9時間以上 ～10時間 未満	8時間以上 ～9時間未 満	7時間以上 ～8時間未 満	6時間以上 ～7時間未 満	5時間以上 ～6時間未 満	4時間以上 ～5時間未 満	4時間未満	未回答	不詳
総数	1,384	158	146	190	109	76	93	126	469	17	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0
45～49	47	10	9	13	3	5	2	0	5	0	0
50～54	164	50	31	40	16	6	7	6	7	1	0
55～59	241	46	45	49	31	12	12	17	26	3	0
60～64	228	30	33	52	22	21	16	14	40	0	0
65～69	184	10	11	21	17	13	19	26	66	1	0
70～74	130	8	6	6	9	9	15	23	52	2	0
75～79	112	0	5	2	5	7	9	17	66	1	0
80～84	123	0	3	5	3	2	9	17	78	6	0
85～89	94	2	0	1	2	1	3	4	80	1	0
90歳以上	54	0	0	0	0	0	1	2	49	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	73	77	138	60	24	20	36	213	15	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45～49	27	6	6	11	0	1	0	0	3	0	0
50～54	88	24	17	31	9	3	0	0	3	1	0
55～59	115	16	28	33	13	8	2	0	12	3	0
60～64	116	16	15	40	17	6	6	2	14	0	0
65～69	88	4	8	13	10	2	6	11	33	1	0
70～74	59	5	1	6	6	1	3	8	27	2	0
75～79	51	0	2	2	2	2	0	8	35	0	0
80～84	54	0	0	1	1	0	3	4	39	6	0
85～89	44	1	0	0	2	1	0	3	36	1	0
90歳以上	12	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	85	69	52	49	52	73	90	256	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0
45～49	20	4	3	2	3	4	2	0	2	0	0
50～54	76	26	14	9	7	3	7	6	4	0	0
55～59	126	30	17	16	18	4	10	17	14	0	0
60～64	112	14	18	12	5	15	10	12	26	0	0
65～69	96	6	3	8	7	11	13	15	33	0	0
70～74	71	3	5	0	3	8	12	15	25	0	0
75～79	61	0	3	0	3	5	9	9	31	1	0
80～84	69	0	3	4	2	2	6	13	39	0	0
85～89	50	1	0	1	0	0	3	1	44	0	0
90歳以上	42	0	0	0	0	0	1	2	38	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2

一日平均野菜摂取量、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	70g未満(1 つ未満)	70g以上(1 ～2つ)	140g以上 210g未満 (2～3つ)	210g以上 280g未満 (3～4つ)	280g以上 350g未満 (4～5つ)	350g以上 (5つ以上)	未回答	不詳
総数	1,384	283	414	307	217	91	57	15	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	2	1	3	0	1	0	0	0
45～49	47	15	17	8	3	4	0	0	0
50～54	164	51	52	35	12	8	4	2	0
55～59	241	59	87	46	34	7	6	2	0
60～64	228	43	73	49	35	17	11	0	0
65～69	184	29	58	47	31	16	3	0	0
70～74	130	21	28	35	31	6	9	0	0
75～79	112	14	27	33	19	5	10	4	0
80～84	123	23	25	31	26	8	6	4	0
85～89	94	17	28	16	19	8	4	2	0
90歳以上	54	9	18	4	7	11	4	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	173	201	147	76	30	20	9	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	1	0	1	0	0	0
45～49	27	10	11	3	2	1	0	0	0
50～54	88	35	26	17	4	3	1	2	0
55～59	115	43	36	18	8	4	4	2	0
60～64	116	32	42	22	12	2	6	0	0
65～69	88	17	25	27	11	8	0	0	0
70～74	59	11	17	18	10	2	1	0	0
75～79	51	4	15	16	10	1	4	1	0
80～84	54	10	13	15	9	3	1	3	0
85～89	44	9	13	9	9	2	2	0	0
90歳以上	12	2	3	1	1	3	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	110	213	160	141	61	37	6	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	2	1	2	0	0	0	0	0
45～49	20	5	6	5	1	3	0	0	0
50～54	76	16	26	18	8	5	3	0	0
55～59	126	16	51	28	26	3	2	0	0
60～64	112	11	31	27	23	15	5	0	0
65～69	96	12	33	20	20	8	3	0	0
70～74	71	10	11	17	21	4	8	0	0
75～79	61	10	12	17	9	4	6	3	0
80～84	69	13	12	16	17	5	5	1	0
85～89	50	8	15	7	10	6	2	2	0
90歳以上	42	7	15	3	6	8	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3

一日平均果物類摂取量、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	50g未満	50g以上 100g未満	100g以上 150g未満	150g以上	未回答	不詳
総数	1,384	646	413	226	77	22	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	3	1	2	1	0	0
45～49	47	39	5	2	0	1	0
50～54	164	100	46	15	1	2	0
55～59	241	140	65	24	9	3	0
60～64	228	114	57	42	15	0	0
65～69	184	74	61	36	11	2	0
70～74	130	44	52	25	9	0	0
75～79	112	36	42	22	9	3	0
80～84	123	40	37	28	13	5	0
85～89	94	34	27	22	6	5	0
90歳以上	54	22	20	8	3	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	656	365	167	81	29	14	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	1	1	0	0	0
45～49	27	22	4	0	0	1	0
50～54	88	58	21	7	0	2	0
55～59	115	81	21	6	5	2	0
60～64	116	72	21	17	6	0	0
65～69	88	43	32	8	4	1	0
70～74	59	28	20	9	2	0	0
75～79	51	20	17	11	2	1	0
80～84	54	21	13	11	5	4	0
85～89	44	16	13	10	3	2	0
90歳以上	12	4	4	1	2	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	728	281	246	145	48	8	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	3	0	1	1	0	0
45～49	20	17	1	2	0	0	0
50～54	76	42	25	8	1	0	0
55～59	126	59	44	18	4	1	0
60～64	112	42	36	25	9	0	0
65～69	96	31	29	28	7	1	0
70～74	71	16	32	16	7	0	0
75～79	61	16	25	11	7	2	0
80～84	69	19	24	17	8	1	0
85～89	50	18	14	12	3	3	0
90歳以上	42	18	16	7	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4

常用しているサプリメント、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1,384	237	1,096	51	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	0	7	0	0
45～49	47	9	38	0	0
50～54	164	28	129	7	0
55～59	241	43	187	11	0
60～64	228	39	186	3	0
65～69	184	34	144	6	0
70～74	130	29	95	6	0
75～79	112	14	92	6	0
80～84	123	19	98	6	0
85～89	94	15	76	3	0
90歳以上	54	7	44	3	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	90	536	30	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	0	2	0	0
45～49	27	3	24	0	0
50～54	88	12	73	3	0
55～59	115	14	93	8	0
60～64	116	18	95	3	0
65～69	88	11	75	2	0
70～74	59	9	48	2	0
75～79	51	5	43	3	0
80～84	54	8	41	5	0
85～89	44	8	34	2	0
90歳以上	12	2	8	2	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	147	560	21	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	0	5	0	0
45～49	20	6	14	0	0
50～54	76	16	56	4	0
55～59	126	29	94	3	0
60～64	112	21	91	0	0
65～69	96	23	69	4	0
70～74	71	20	47	4	0
75～79	61	9	49	3	0
80～84	69	11	57	1	0
85～89	50	7	42	1	0
90歳以上	42	5	36	1	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 1 5

日常生活での悩みやストレス、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1,384	1,000	346	38	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	5	2	0	0
45～49	47	37	10	0	0
50～54	164	124	37	3	0
55～59	241	194	38	9	0
60～64	228	176	47	5	0
65～69	184	129	48	7	0
70～74	130	76	50	4	0
75～79	112	75	34	3	0
80～84	123	87	33	3	0
85～89	94	60	31	3	0
90歳以上	54	37	16	1	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	434	205	17	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	1	1	0	0
45～49	27	19	8	0	0
50～54	88	60	26	2	0
55～59	115	83	27	5	0
60～64	116	89	26	1	0
65～69	88	56	30	2	0
70～74	59	27	30	2	0
75～79	51	29	20	2	0
80～84	54	34	18	2	0
85～89	44	29	14	1	0
90歳以上	12	7	5	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	566	141	21	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	4	1	0	0
45～49	20	18	2	0	0
50～54	76	64	11	1	0
55～59	126	111	11	4	0
60～64	112	87	21	4	0
65～69	96	73	18	5	0
70～74	71	49	20	2	0
75～79	61	46	14	1	0
80～84	69	53	15	1	0
85～89	50	31	17	2	0
90歳以上	42	30	11	1	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 1 6

悩みやストレスの原因（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	家族との 人間関係	家族以外 との人間 関係	恋愛・性 に関する こと	結婚	離婚	いじめ、 セクシャ ルハラス メント	生きがい に関する こと	自由にで きる時間 がない
総数	2,728	219	222	9	15	6	13	193	73
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	19	1	3	0	1	1	0	1	1
45～49	100	5	8	0	0	0	0	6	7
50～54	364	27	38	4	7	1	3	19	19
55～59	605	52	59	4	4	1	0	32	12
60～64	478	35	41	1	2	1	5	37	12
65～69	357	26	26	0	0	0	2	27	11
70～74	233	26	16	0	1	1	2	19	4
75～79	174	18	9	0	0	0	1	16	3
80～84	198	16	14	0	0	1	0	16	2
85～89	125	9	4	0	0	0	0	12	1
90歳以上	75	4	4	0	0	0	0	8	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1138	75	105	6	8	1	6	77	35
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	9	0	1	0	1	1	0	1	1
45～49	50	1	8	0	0	0	0	3	4
50～54	168	10	20	3	4	0	2	10	10
55～59	245	15	24	3	3	0	0	13	6
60～64	228	13	24	0	0	0	3	16	4
65～69	161	11	10	0	0	0	1	14	6
70～74	71	7	5	0	0	0	0	4	1
75～79	61	8	5	0	0	0	0	5	0
80～84	76	6	5	0	0	0	0	6	2
85～89	57	4	3	0	0	0	0	4	1
90歳以上	12	0	0	0	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1,590	144	117	3	7	5	7	116	38
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	10	1	2	0	0	0	0	0	0
45～49	50	4	0	0	0	0	0	3	3
50～54	196	17	18	1	3	1	1	9	9
55～59	360	37	35	1	1	1	0	19	6
60～64	250	22	17	1	2	1	2	21	8
65～69	196	15	16	0	0	0	1	13	5
70～74	162	19	11	0	1	1	2	15	3
75～79	113	10	4	0	0	0	1	11	3
80～84	122	10	9	0	0	1	0	10	0
85～89	68	5	1	0	0	0	0	8	0
90歳以上	63	4	4	0	0	0	0	7	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7

悩みやストレスの原因（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	収入・家 計・借金 等	自分の病 気や介護	家族の病 気や介護	妊娠・出 産	育児	家事	自分の学 業・受 験・進学	子どもの 教育
総数	2,728	339	575	363	0	3	91	4	37
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	19	3	2	1	0	0	0	0	2
45～49	100	18	16	10	0	0	4	0	8
50～54	364	45	43	39	0	3	4	4	11
55～59	605	86	91	77	0	0	19	0	10
60～64	478	59	79	68	0	0	14	0	5
65～69	357	56	86	50	0	0	12	0	0
70～74	233	33	55	28	0	0	11	0	1
75～79	174	17	56	27	0	0	7	0	0
80～84	198	10	67	36	0	0	9	0	0
85～89	125	6	49	17	0	0	8	0	0
90歳以上	75	6	31	10	0	0	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1138	164	232	134	0	2	17	2	20
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	9	1	1	1	0	0	0	0	0
45～49	50	9	8	3	0	0	1	0	2
50～54	168	22	18	14	0	2	1	2	4
55～59	245	41	38	26	0	0	4	0	8
60～64	228	30	38	28	0	0	2	0	5
65～69	161	33	36	17	0	0	3	0	0
70～74	71	13	20	10	0	0	1	0	1
75～79	61	6	19	9	0	0	0	0	0
80～84	76	4	27	15	0	0	1	0	0
85～89	57	4	21	9	0	0	4	0	0
90歳以上	12	1	6	2	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1,590	175	343	229	0	1	74	2	17
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	10	2	1	0	0	0	0	0	2
45～49	50	9	8	7	0	0	3	0	6
50～54	196	23	25	25	0	1	3	2	7
55～59	360	45	53	51	0	0	15	0	2
60～64	250	29	41	40	0	0	12	0	0
65～69	196	23	50	33	0	0	9	0	0
70～74	162	20	35	18	0	0	10	0	0
75～79	113	11	37	18	0	0	7	0	0
80～84	122	6	40	21	0	0	8	0	0
85～89	68	2	28	8	0	0	4	0	0
90歳以上	63	5	25	8	0	0	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 18

悩みやストレスの原因（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	自分の仕事	家族の仕事	住まいや生活環境 (公害、安全及び交通事情を含む)	その他	わからない	未回答	不詳
総数	2,744	293	109	102	53	16	9	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	19	3	0	0	0	0	0	0
45～49	100	15	2	1	0	0	0	0
50～54	364	72	10	10	3	1	1	0
55～59	605	87	37	24	8	0	2	0
60～64	480	71	28	12	9	0	1	0
65～69	358	31	7	16	5	3	0	0
70～74	234	8	9	16	2	1	1	0
75～79	177	3	6	4	7	2	1	0
80～84	204	2	6	11	12	1	1	0
85～89	126	1	3	5	5	5	1	0
90歳以上	77	0	1	3	2	3	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1144	168	35	28	19	3	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	9	1	0	0	0	0	0	0
45～49	50	10	1	0	0	0	0	0
50～54	168	40	2	2	0	1	1	0
55～59	245	43	10	6	3	0	2	0
60～64	229	45	12	5	3	0	1	0
65～69	162	22	2	5	2	0	0	0
70～74	71	3	3	3	0	0	0	0
75～79	62	2	3	0	3	1	1	0
80～84	79	2	1	4	6	0	0	0
85～89	57	0	1	2	2	1	1	0
90歳以上	12	0	0	1	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1,600	125	74	74	34	13	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	10	2	0	0	0	0	0	0
45～49	50	5	1	1	0	0	0	0
50～54	196	32	8	8	3	0	0	0
55～59	360	44	27	18	5	0	0	0
60～64	251	26	16	7	6	0	0	0
65～69	196	9	5	11	3	3	0	0
70～74	163	5	6	13	2	1	1	0
75～79	115	1	3	4	4	1	0	0
80～84	125	0	5	7	6	1	1	0
85～89	69	1	2	3	3	4	0	0
90歳以上	65	0	1	2	2	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 9

悩みやストレスの最も気になる原因 1、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	家族との 人間関係	家族以外 との人間 関係	恋愛・性 に関する こと	結婚	離婚	いじめ、 セクシャ ルハラス メント	生きがい に関する こと	自由にで きる時間 がない
総数	1,000	46	47	0	2	1	4	24	13
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	1	0	0	0	0	0	0
45～49	37	2	2	0	0	0	0	0	1
50～54	124	2	7	0	1	1	1	2	3
55～59	194	6	10	0	0	0	0	4	4
60～64	176	12	9	0	1	0	1	7	2
65～69	129	5	6	0	0	0	1	4	3
70～74	76	6	5	0	0	0	0	1	0
75～79	75	7	1	0	0	0	1	1	0
80～84	87	4	3	0	0	0	0	3	0
85～89	60	2	2	0	0	0	0	0	0
90歳以上	37	0	1	0	0	0	0	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	434	14	21	0	1	0	3	13	5
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	19	1	2	0	0	0	0	0	0
50～54	60	0	4	0	1	0	1	1	1
55～59	83	0	6	0	0	0	0	1	2
60～64	89	5	6	0	0	0	1	5	1
65～69	56	2	1	0	0	0	1	3	1
70～74	27	1	0	0	0	0	0	0	0
75～79	29	4	0	0	0	0	0	0	0
80～84	34	0	1	0	0	0	0	2	0
85～89	29	1	1	0	0	0	0	0	0
90歳以上	7	0	0	0	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	566	32	26	0	1	1	1	11	8
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	0	1	0	0	0	0	0	0
45～49	18	1	0	0	0	0	0	0	1
50～54	64	2	3	0	0	1	0	1	2
55～59	111	6	4	0	0	0	0	3	2
60～64	87	7	3	0	1	0	0	2	1
65～69	73	3	5	0	0	0	0	1	2
70～74	49	5	5	0	0	0	0	1	0
75～79	46	3	1	0	0	0	1	1	0
80～84	53	4	2	0	0	0	0	1	0
85～89	31	1	1	0	0	0	0	0	0
90歳以上	30	0	1	0	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 20

悩みやストレスの最も気になる原因 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	収入・家 計・借金 等	自分の病 気や介護	家族の病 気や介護	妊娠・出 産	育児	家事	自分の学 業・受 験・進学	子どもの 教育
総数	1,000	135	349	125	0	0	3	1	7
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	2	1	0	0	0	0	0	0
45～49	37	7	8	4	0	0	0	0	1
50～54	124	15	14	16	0	0	0	1	3
55～59	194	30	48	30	0	0	0	0	3
60～64	176	24	49	30	0	0	1	0	0
65～69	129	28	47	12	0	0	0	0	0
70～74	76	12	32	8	0	0	0	0	0
75～79	75	7	40	6	0	0	1	0	0
80～84	87	5	48	9	0	0	0	0	0
85～89	60	2	40	6	0	0	0	0	0
90歳以上	37	3	22	4	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	434	72	127	43	0	0	0	1	5
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	1	0	0	0	0	0	0	0
45～49	19	2	3	2	0	0	0	0	1
50～54	60	8	4	2	0	0	0	1	2
55～59	83	13	25	9	0	0	0	0	2
60～64	89	14	22	11	0	0	0	0	0
65～69	56	19	16	2	0	0	0	0	0
70～74	27	7	12	3	0	0	0	0	0
75～79	29	2	11	5	0	0	0	0	0
80～84	34	3	12	4	0	0	0	0	0
85～89	29	2	17	5	0	0	0	0	0
90歳以上	7	1	5	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	566	63	222	82	0	0	3	0	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	1	1	0	0	0	0	0	0
45～49	18	5	5	2	0	0	0	0	0
50～54	64	7	10	14	0	0	0	0	1
55～59	111	17	23	21	0	0	0	0	1
60～64	87	10	27	19	0	0	1	0	0
65～69	73	9	31	10	0	0	0	0	0
70～74	49	5	20	5	0	0	0	0	0
75～79	46	5	29	1	0	0	1	0	0
80～84	53	2	36	5	0	0	0	0	0
85～89	31	0	23	1	0	0	0	0	0
90歳以上	30	2	17	4	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 2 1

悩みやストレスの最も気になる原因 3、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	自分の仕事	家族の仕事	住まいや 生活環境 (公害、安全及び交通事情を含む)	その他	わからない	未回答	不詳
総数	1,000	113	14	16	27	8	65	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	0	0	0	0	0
45～49	37	9	0	1	0	0	2	0
50～54	124	40	1	4	1	0	12	0
55～59	194	32	8	2	4	0	13	0
60～64	176	22	1	2	8	0	7	0
65～69	129	5	1	3	5	2	7	0
70～74	76	3	1	2	1	1	4	0
75～79	75	0	1	0	4	1	5	0
80～84	87	1	0	1	2	0	11	0
85～89	60	0	1	1	2	2	2	0
90歳以上	37	0	0	0	0	2	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	434	73	6	5	8	2	35	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	0	0	0
45～49	19	7	0	0	0	0	1	0
50～54	60	25	0	1	0	0	9	0
55～59	83	17	2	0	1	0	5	0
60～64	89	18	0	2	2	0	2	0
65～69	56	3	1	1	2	0	4	0
70～74	27	2	1	1	0	0	0	0
75～79	29	0	1	0	1	1	4	0
80～84	34	1	0	0	1	0	10	0
85～89	29	0	1	0	1	1	0	0
90歳以上	7	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	566	40	8	11	19	6	30	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	1	0	0	0	0	0	0
45～49	18	2	0	1	0	0	1	0
50～54	64	15	1	3	1	0	3	0
55～59	111	15	6	2	3	0	8	0
60～64	87	4	1	0	6	0	5	0
65～69	73	2	0	2	3	2	3	0
70～74	49	1	0	1	1	1	4	0
75～79	46	0	0	0	3	0	1	0
80～84	53	0	0	1	1	0	1	0
85～89	31	0	0	1	1	1	2	0
90歳以上	30	0	0	0	0	2	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

※複数回答されたものは最初の記載を有効とした。

別表 2 2

睡眠時間、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	9時間以上	8時間以上 ～9時間未 満	7時間以上 ～8時間未 満	6時間以上 ～7時間未 満	5時間以上 ～6時間未 満	5時間未満	未回答	不詳
総数	1,384	74	126	257	471	329	123	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	4	3	0	0	0	0
45～49	47	0	4	12	18	9	3	1	0
50～54	164	1	11	21	66	48	17	0	0
55～59	241	4	17	34	96	70	19	1	0
60～64	228	5	18	31	102	53	19	0	0
65～69	184	5	14	41	57	53	14	0	0
70～74	130	6	8	32	39	29	16	0	0
75～79	112	3	10	25	39	27	6	2	0
80～84	123	15	18	30	26	21	13	0	0
85～89	94	20	16	16	17	12	13	0	0
90歳以上	54	15	10	11	8	7	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	34	69	132	236	138	45	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	1	1	0	0	0	0
45～49	27	0	3	8	9	4	3	0	0
50～54	88	1	8	10	39	23	7	0	0
55～59	115	3	10	26	39	27	9	1	0
60～64	116	1	12	20	54	18	11	0	0
65～69	88	2	11	18	31	23	3	0	0
70～74	59	5	2	17	21	11	3	0	0
75～79	51	1	6	11	19	13	0	1	0
80～84	54	10	9	11	10	12	2	0	0
85～89	44	8	4	8	12	6	6	0	0
90歳以上	12	3	4	2	1	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	40	57	125	235	191	78	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	3	2	0	0	0	0
45～49	20	0	1	4	9	5	0	1	0
50～54	76	0	3	11	27	25	10	0	0
55～59	126	1	7	8	57	43	10	0	0
60～64	112	4	6	11	48	35	8	0	0
65～69	96	3	3	23	26	30	11	0	0
70～74	71	1	6	15	18	18	13	0	0
75～79	61	2	4	14	20	14	6	1	0
80～84	69	5	9	19	16	9	11	0	0
85～89	50	12	12	8	5	6	7	0	0
90歳以上	42	12	6	9	7	6	2	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 2 3

睡眠時間の十分度（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	寝付き （布団に 入ってから 眠るまで に要する 時間）に、 時間がか かった。	夜間、睡 眠途中に 目が覚め て困った。	起きよう とする時 刻よりも 早く目が 覚め、そ れ以上眠 れなかつ た。	睡眠時 間が足り なかつた。	睡眠全体 の質に満 足できな かつた。	日中、眠 気を感じ た。	左記のよ うなこ とはなかつ た。	未回答	不詳
総数	2,981	390	623	420	281	430	578	236	23	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	14	2	3	2	1	2	2	2	0	0
45～49	80	10	8	9	8	15	21	9	0	0
50～54	342	39	54	43	48	57	68	30	3	0
55～59	508	54	98	67	62	80	98	45	4	0
60～64	523	61	115	81	51	89	96	29	1	0
65～69	399	57	84	62	34	57	70	33	2	0
70～74	301	41	67	41	25	38	62	24	3	0
75～79	250	41	61	39	17	28	42	18	4	0
80～84	262	41	62	40	20	29	50	19	1	0
85～89	207	31	45	25	14	28	46	15	3	0
90歳以上	95	13	26	11	1	7	23	12	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1366	152	276	209	130	197	260	129	13	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	2	1	1	1	1	1	0	0	0
45～49	44	5	4	5	4	9	11	6	0	0
50～54	181	18	24	28	26	31	34	17	3	0
55～59	225	17	44	34	26	31	43	28	2	0
60～64	278	25	59	49	30	48	48	19	0	0
65～69	177	23	40	28	14	27	29	15	1	0
70～74	125	15	27	18	9	13	26	15	2	0
75～79	108	12	27	15	7	13	19	12	3	0
80～84	109	18	25	16	8	11	24	7	0	0
85～89	92	13	21	13	5	12	18	9	1	0
90歳以上	20	4	4	2	0	1	7	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1615	238	347	211	151	233	318	107	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	2	1	0	1	1	2	0	0
45～49	36	5	4	4	4	6	10	3	0	0
50～54	161	21	30	15	22	26	34	13	0	0
55～59	283	37	54	33	36	49	55	17	2	0
60～64	245	36	56	32	21	41	48	10	1	0
65～69	222	34	44	34	20	30	41	18	1	0
70～74	176	26	40	23	16	25	36	9	1	0
75～79	142	29	34	24	10	15	23	6	1	0
80～84	153	23	37	24	12	18	26	12	1	0
85～89	115	18	24	12	9	16	28	6	2	0
90歳以上	75	9	22	9	1	6	16	11	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 2 4

脚に不快な感じ、または感覚があるか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,384	636	722	26	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	1	6	0	0
45～49	47	13	34	0	0
50～54	164	51	112	1	0
55～59	241	99	141	1	0
60～64	228	104	120	4	0
65～69	184	93	90	1	0
70～74	130	59	65	6	0
75～79	112	59	49	4	0
80～84	123	73	46	4	0
85～89	94	56	36	2	0
90歳以上	54	28	23	3	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	275	369	12	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	0	2	0	0
45～49	27	8	19	0	0
50～54	88	21	66	1	0
55～59	115	45	70	0	0
60～64	116	54	61	1	0
65～69	88	43	45	0	0
70～74	59	23	34	2	0
75～79	51	21	29	1	0
80～84	54	29	21	4	0
85～89	44	26	17	1	0
90歳以上	12	5	5	2	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	361	353	14	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	1	4	0	0
45～49	20	5	15	0	0
50～54	76	30	46	0	0
55～59	126	54	71	1	0
60～64	112	50	59	3	0
65～69	96	50	45	1	0
70～74	71	36	31	4	0
75～79	61	38	20	3	0
80～84	69	44	25	0	0
85～89	50	30	19	1	0
90歳以上	42	23	18	1	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 2 5

動かしたい衝動、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,384	541	761	82	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	1	6	0	0
45～49	47	11	34	2	0
50～54	164	55	108	1	0
55～59	241	77	155	9	0
60～64	228	87	129	12	0
65～69	184	75	94	15	0
70～74	130	52	66	12	0
75～79	112	51	53	8	0
80～84	123	64	50	9	0
85～89	94	45	40	9	0
90歳以上	54	23	26	5	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	249	372	35	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	0	2	0	0
45～49	27	6	20	1	0
50～54	88	26	62	0	0
55～59	115	43	68	4	0
60～64	116	48	62	6	0
65～69	88	36	46	6	0
70～74	59	19	36	4	0
75～79	51	17	32	2	0
80～84	54	28	20	6	0
85～89	44	21	19	4	0
90歳以上	12	5	5	2	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	292	389	47	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	1	4	0	0
45～49	20	5	14	1	0
50～54	76	29	46	1	0
55～59	126	34	87	5	0
60～64	112	39	67	6	0
65～69	96	39	48	9	0
70～74	71	33	30	8	0
75～79	61	34	21	6	0
80～84	69	36	30	3	0
85～89	50	24	21	5	0
90歳以上	42	18	21	3	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 2 6

どちらで感じやすいか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	休んでい るとき	横になっ ていると き	両方	わからな い	未回答	不詳
総数	685	330	60	240	42	13	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	1	0	0	0	0	0
45～49	15	11	0	3	1	0	0
50～54	63	36	2	19	4	2	0
55～59	105	56	7	37	3	2	0
60～64	109	57	12	32	7	1	0
65～69	100	53	7	34	5	1	0
70～74	64	26	5	28	5	0	0
75～79	62	27	8	21	5	1	0
80～84	78	31	9	32	4	2	0
85～89	57	24	6	22	3	2	0
90歳以上	31	8	4	12	5	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	304	150	31	100	15	8	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	9	8	0	1	0	0	0
50～54	29	14	2	10	1	2	0
55～59	50	25	2	19	2	2	0
60～64	56	30	9	15	2	0	0
65～69	47	26	3	15	3	0	0
70～74	25	9	1	13	2	0	0
75～79	22	12	3	5	1	1	0
80～84	34	12	7	10	3	2	0
85～89	26	13	3	9	1	0	0
90歳以上	6	1	1	3	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	381	180	29	140	27	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	1	0	0	0	0	0
45～49	6	3	0	2	1	0	0
50～54	34	22	0	9	3	0	0
55～59	55	31	5	18	1	0	0
60～64	53	27	3	17	5	1	0
65～69	53	27	4	19	2	1	0
70～74	39	17	4	15	3	0	0
75～79	40	15	5	16	4	0	0
80～84	44	19	2	22	1	0	0
85～89	31	11	3	13	2	2	0
90歳以上	25	7	3	9	5	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 2 7

軽くなるか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	わからない	未回答	不詳
総数	685	368	151	149	17	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	1	1	0	0	0	0
45～49	15	9	2	4	0	0
50～54	63	42	9	9	3	0
55～59	105	61	22	21	1	0
60～64	109	69	16	22	2	0
65～69	100	48	29	21	2	0
70～74	64	33	14	17	0	0
75～79	62	30	17	13	2	0
80～84	78	37	21	17	3	0
85～89	57	25	15	16	1	0
90歳以上	31	13	6	9	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	304	174	59	63	8	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	9	7	1	1	0	0
50～54	29	18	6	3	2	0
55～59	50	28	12	10	0	0
60～64	56	38	8	10	0	0
65～69	47	23	13	10	1	0
70～74	25	15	3	7	0	0
75～79	22	11	5	5	1	0
80～84	34	17	5	9	3	0
85～89	26	15	4	7	0	0
90歳以上	6	2	2	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	381	194	92	86	9	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	1	1	0	0	0	0
45～49	6	2	1	3	0	0
50～54	34	24	3	6	1	0
55～59	55	33	10	11	1	0
60～64	53	31	8	12	2	0
65～69	53	25	16	11	1	0
70～74	39	18	11	10	0	0
75～79	40	19	12	8	1	0
80～84	44	20	16	8	0	0
85～89	31	10	11	9	1	0
90歳以上	25	11	4	8	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 28

どの時間帯か（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	朝	日中	午後	夕方	夜	すべての 時間帯で ほぼ同じ	未回答	不詳
総数	846	112	110	37	90	277	205	15	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	1	0	0	0
45～49	17	4	1	0	0	6	6	0	0
50～54	76	10	9	2	7	37	9	2	0
55～59	132	16	22	6	18	44	25	1	0
60～64	139	26	14	3	17	50	27	2	0
65～69	117	12	15	1	14	41	31	3	0
70～74	88	9	14	9	9	28	17	2	0
75～79	76	13	7	0	7	23	23	3	0
80～84	97	12	15	10	12	19	28	1	0
85～89	68	7	6	6	4	22	22	1	0
90歳以上	35	3	7	0	2	6	17	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	370	57	42	20	38	126	81	6	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	11	2	0	0	0	5	4	0	0
50～54	34	3	4	1	4	16	4	2	0
55～59	60	9	8	3	7	22	11	0	0
60～64	70	15	10	2	7	23	13	0	0
65～69	56	8	7	1	7	18	15	0	0
70～74	34	3	5	2	3	12	8	1	0
75～79	27	5	2	0	1	10	6	3	0
80～84	38	7	2	5	7	7	10	0	0
85～89	33	3	2	6	2	13	7	0	0
90歳以上	7	2	2	0	0	0	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	476	55	68	17	52	151	124	9	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	1	0	0	0
45～49	6	2	1	0	0	1	2	0	0
50～54	42	7	5	1	3	21	5	0	0
55～59	72	7	14	3	11	22	14	1	0
60～64	69	11	4	1	10	27	14	2	0
65～69	61	4	8	0	7	23	16	3	0
70～74	54	6	9	7	6	16	9	1	0
75～79	49	8	5	0	6	13	17	0	0
80～84	59	5	13	5	5	12	18	1	0
85～89	35	4	4	0	2	9	15	1	0
90歳以上	28	1	5	0	2	6	14	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 2 9

病院、診療所への入院、または介護保険施設への入所状況、性、年齢
(5歳階級) 別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,384	95	1,284	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	0	7	0	0
45～49	47	2	45	0	0
50～54	164	1	163	0	0
55～59	241	4	235	2	0
60～64	228	5	223	0	0
65～69	184	8	176	0	0
70～74	130	6	123	1	0
75～79	112	4	107	1	0
80～84	123	18	105	0	0
85～89	94	22	72	0	0
90歳以上	54	25	28	1	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	32	621	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	0	2	0	0
45～49	27	1	26	0	0
50～54	88	0	88	0	0
55～59	115	3	110	2	0
60～64	116	1	115	0	0
65～69	88	5	83	0	0
70～74	59	4	55	0	0
75～79	51	1	50	0	0
80～84	54	8	46	0	0
85～89	44	7	37	0	0
90歳以上	12	2	9	1	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	63	663	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	0	5	0	0
45～49	20	1	19	0	0
50～54	76	1	75	0	0
55～59	126	1	125	0	0
60～64	112	4	108	0	0
65～69	96	3	93	0	0
70～74	71	2	68	1	0
75～79	61	3	57	1	0
80～84	69	10	59	0	0
85～89	50	15	35	0	0
90歳以上	42	23	19	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 3 0

要介護認定の状況（40歳未満の回答者は除く）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,384	170	1,187	27	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	0	7	0	0
45～49	47	0	43	4	0
50～54	164	0	161	3	0
55～59	241	2	232	7	0
60～64	228	1	222	5	0
65～69	184	7	175	2	0
70～74	130	7	121	2	0
75～79	112	16	95	1	0
80～84	123	43	78	2	0
85～89	94	51	43	0	0
90歳以上	54	43	10	1	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	56	587	13	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	0	2	0	0
45～49	27	0	26	1	0
50～54	88	0	87	1	0
55～59	115	1	109	5	0
60～64	116	0	115	1	0
65～69	88	3	83	2	0
70～74	59	3	55	1	0
75～79	51	9	42	0	0
80～84	54	19	33	2	0
85～89	44	14	30	0	0
90歳以上	12	7	5	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	114	600	14	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	0	5	0	0
45～49	20	0	17	3	0
50～54	76	0	74	2	0
55～59	126	1	123	2	0
60～64	112	1	107	4	0
65～69	96	4	92	0	0
70～74	71	4	66	1	0
75～79	61	7	53	1	0
80～84	69	24	45	0	0
85～89	50	37	13	0	0
90歳以上	42	36	5	1	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 3 1

要介護認定を受けている場合の要介護度の状況、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	未回答	不詳
総数	170	31	30	26	29	19	22	12	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
65～69	7	1	1	0	0	0	3	2	0	0
70～74	7	1	1	1	2	0	2	0	0	0
75～79	16	1	2	3	7	1	1	0	1	0
80～84	43	10	6	11	6	4	4	2	0	0
85～89	51	12	11	5	9	6	5	3	0	0
90歳以上	43	6	8	5	5	8	7	4	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	56	11	13	8	10	5	6	2	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0
70～74	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0
75～79	9	0	2	1	4	1	0	0	1	0
80～84	19	4	2	4	3	2	3	1	0	0
85～89	14	4	5	2	2	0	1	0	0	0
90歳以上	7	2	1	1	1	2	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	114	20	17	18	19	14	16	10	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
65～69	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0
70～74	4	1	0	1	2	0	0	0	0	0
75～79	7	1	0	2	3	0	1	0	0	0
80～84	24	6	4	7	3	2	1	1	0	0
85～89	37	8	6	3	7	6	4	3	0	0
90歳以上	36	4	7	4	4	6	7	4	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 2

現在利用している介護保険サービス（複数回答）、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	ホームヘルパーの 訪問介護・訪問 看護	通所介護 （デイサ ビス）	通所リハ ビリテー ション	短期入所 生活介護 （ショ ース テイ）	有料老人 ホームへ の入所	認知症共 同生活介 護施設へ の入所	特別養護 老人ホー ムへの入 所	介護老人 保健施設 への入所	その他	利用して いない	未回答	不詳
総数	213	38	58	23	6	13	9	22	9	11	21	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
65～69	8	1	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0
70～74	10	2	4	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
75～79	18	4	5	4	1	1	0	0	0	1	2	0	0
80～84	50	9	16	5	2	2	4	2	2	2	5	1	0
85～89	67	9	21	7	0	5	3	6	2	3	9	2	0
90歳以上	57	13	12	4	3	3	2	12	4	2	2	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	64	9	18	10	1	1	2	3	3	4	12	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
70～74	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
75～79	11	3	1	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0
80～84	20	2	7	3	0	0	1	2	1	1	3	0	0
85～89	18	2	6	1	0	1	1	0	1	1	4	1	0
90歳以上	8	2	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	149	29	40	13	5	12	7	19	6	7	9	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
65～69	5	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
70～74	7	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
75～79	7	1	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
80～84	30	7	9	2	2	2	3	0	1	1	2	1	0
85～89	49	7	15	6	0	4	2	6	1	2	5	1	0
90歳以上	49	11	10	3	3	3	2	11	3	2	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 3

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因 1 (複数回答)、
性、年齢 (5 歳階級) 別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	脳血管疾 患	心臓疾患	がん	呼吸器疾 患	関節疾患	認知症	パーキン ソン病	糖尿病
総数	349	28	32	11	13	36	48	21	9
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65～69	9	1	0	0	0	2	0	1	2
70～74	11	2	1	0	1	1	0	0	1
75～79	26	2	3	2	1	3	6	1	1
80～84	77	8	6	3	2	7	11	4	2
85～89	130	9	11	3	7	14	17	13	1
90歳以上	93	4	11	3	2	9	14	2	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	106	13	9	7	4	8	8	9	4
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	1	0	0	0	1	0	1	0
70～74	3	2	0	0	0	0	0	0	0
75～79	15	2	2	2	0	2	1	1	1
80～84	36	6	3	2	1	1	4	2	2
85～89	37	2	3	2	3	3	3	5	1
90歳以上	11	0	1	1	0	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	243	15	23	4	9	28	40	12	5
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65～69	6	0	0	0	0	1	0	0	2
70～74	8	0	1	0	1	1	0	0	1
75～79	11	0	1	0	1	1	5	0	0
80～84	41	2	3	1	1	6	7	2	0
85～89	93	7	8	1	4	11	14	8	0
90歳以上	82	4	10	2	2	8	14	2	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 4

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因 2 (複数回答)、
性、年齢 (5 歳階級) 別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	視覚・聴 覚障害	骨折・転 倒	脊髄損傷	高齢によ る衰弱	その他	わからな い	未回答	不詳
総数	349	13	54	9	41	14	3	17	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	0	0	0	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	9	0	1	1	0	1	0	0	0
70～74	11	0	2	0	0	1	1	1	0
75～79	26	0	3	0	2	0	0	2	0
80～84	77	4	8	3	10	3	1	5	0
85～89	130	5	25	5	11	6	0	3	0
90歳以上	93	4	15	0	18	3	1	5	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	106	4	10	4	9	7	0	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	3	0	0	0	0	0	0	1	0
75～79	15	0	1	0	1	0	0	2	0
80～84	36	2	4	3	2	2	0	2	0
85～89	37	1	5	1	3	3	0	2	0
90歳以上	11	1	0	0	3	2	0	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	243	9	44	5	32	7	3	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	6	0	1	1	0	1	0	0	0
70～74	8	0	2	0	0	1	1	0	0
75～79	11	0	2	0	1	0	0	0	0
80～84	41	2	4	0	8	1	1	3	0
85～89	93	4	20	4	8	3	0	1	0
90歳以上	82	3	15	0	15	1	1	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 5

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	脳血管疾患	心臓疾患	がん	呼吸器疾患	関節疾患	認知症	パーキンソン病	糖尿病
総数	170	21	11	3	3	17	36	3	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	2	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65～69	7	1	0	0	0	1	0	0	2
70～74	7	2	0	1	0	0	0	0	0
75～79	16	1	1	0	1	2	5	0	0
80～84	43	6	2	1	1	5	10	0	0
85～89	51	4	4	1	0	5	10	3	1
90歳以上	43	4	4	0	1	4	11	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	56	11	4	2	0	3	7	0	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	1	0	0	0	1	0	0	0
70～74	3	2	0	1	0	0	0	0	0
75～79	9	1	1	0	0	1	0	0	0
80～84	19	5	1	1	0	0	4	0	0
85～89	14	0	2	0	0	1	3	0	1
90歳以上	7	1	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	114	10	7	1	3	14	29	3	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65～69	4	0	0	0	0	0	0	0	2
70～74	4	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	7	0	0	0	1	1	5	0	0
80～84	24	1	1	0	1	5	6	0	0
85～89	37	4	2	1	0	4	7	3	0
90歳以上	36	3	4	0	1	4	11	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 6

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因 2、性、年齢（5 歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	視覚・聴 覚障害	骨折・転 倒	脊髄損傷	高齢によ る衰弱	その他	わからな い	未回答	不詳
総数	170	1	19	3	16	7	1	26	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	7	0	0	0	0	1	0	2	0
70～74	7	0	2	0	0	0	1	1	0
75～79	16	0	1	0	0	0	0	5	0
80～84	43	1	3	3	3	2	0	6	0
85～89	51	0	10	0	6	2	0	5	0
90歳以上	43	0	3	0	7	2	0	7	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	56	0	2	3	6	3	0	14	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	0	0	0	0	0	0	1	0
70～74	3	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	9	0	1	0	0	0	0	5	0
80～84	19	0	0	3	1	1	0	3	0
85～89	14	0	1	0	3	1	0	2	0
90歳以上	7	0	0	0	2	1	0	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	114	1	17	0	10	4	1	12	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	4	0	0	0	0	1	0	1	0
70～74	4	0	2	0	0	0	1	1	0
75～79	7	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	24	1	3	0	2	1	0	3	0
85～89	37	0	9	0	3	1	0	3	0
90歳以上	36	0	3	0	5	1	0	4	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 7

介助なしでできること 1、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)													
性 年齢階層	洗顔						口腔清拭						
	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳	
総数	1,384	1,274	46	22	42	0	1,384	1,277	54	13	40	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
45～49	47	42	0	0	5	0	47	42	0	0	5	0	
50～54	164	158	0	0	6	0	164	158	0	0	6	0	
55～59	241	232	0	0	9	0	241	232	0	0	9	0	
60～64	228	219	1	1	7	0	228	220	1	1	6	0	
65～69	184	172	2	2	8	0	184	172	2	2	8	0	
70～74	130	125	4	0	1	0	130	125	4	0	1	0	
75～79	112	105	4	1	2	0	112	106	3	1	2	0	
80～84	123	110	7	4	2	0	123	109	12	1	1	0	
85～89	94	71	14	8	1	0	94	73	15	5	1	0	
90歳以上	54	33	14	6	1	0	54	33	17	3	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
男	656	617	14	5	20	0	656	618	17	2	19	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
45～49	27	26	0	0	1	0	27	26	0	0	1	0	
50～54	88	85	0	0	3	0	88	85	0	0	3	0	
55～59	115	110	0	0	5	0	115	110	0	0	5	0	
60～64	116	113	1	0	2	0	116	113	1	0	2	0	
65～69	88	81	0	1	6	0	88	81	0	1	6	0	
70～74	59	57	2	0	0	0	59	57	2	0	0	0	
75～79	51	49	1	0	1	0	51	50	0	0	1	0	
80～84	54	47	3	3	1	0	54	46	8	0	0	0	
85～89	44	40	3	1	0	0	44	40	3	1	0	0	
90歳以上	12	7	4	0	1	0	12	8	3	0	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
女	728	657	32	17	22	0	728	659	37	11	21	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
45～49	20	16	0	0	4	0	20	16	0	0	4	0	
50～54	76	73	0	0	3	0	76	73	0	0	3	0	
55～59	126	122	0	0	4	0	126	122	0	0	4	0	
60～64	112	106	0	1	5	0	112	107	0	1	4	0	
65～69	96	91	2	1	2	0	96	91	2	1	2	0	
70～74	71	68	2	0	1	0	71	68	2	0	1	0	
75～79	61	56	3	1	1	0	61	56	3	1	1	0	
80～84	69	63	4	1	1	0	69	63	4	1	1	0	
85～89	50	31	11	7	1	0	50	33	12	4	1	0	
90歳以上	42	26	10	6	0	0	42	25	14	3	0	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

別表 3 8

介助なしでできること 2、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)													
性 年齢階層	身体の清拭(体を拭う)						洗髪						
	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳	
総数	1,384	1,234	68	41	41	0	1,384	1,233	61	50	40	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
45～49	47	42	0	0	5	0	47	42	0	0	5	0	
50～54	164	158	0	0	6	0	164	158	0	0	6	0	
55～59	241	232	0	0	9	0	241	232	0	0	9	0	
60～64	228	218	3	1	6	0	228	218	3	1	6	0	
65～69	184	170	2	4	8	0	184	171	1	4	8	0	
70～74	130	124	2	3	1	0	130	125	3	1	1	0	
75～79	112	105	3	2	2	0	112	104	4	2	2	0	
80～84	123	98	16	8	1	0	123	96	15	11	1	0	
85～89	94	61	20	11	2	0	94	61	17	15	1	0	
90歳以上	54	19	22	12	1	0	54	19	18	16	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
男	656	603	22	11	20	0	656	607	19	11	19	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
45～49	27	26	0	0	1	0	27	26	0	0	1	0	
50～54	88	85	0	0	3	0	88	85	0	0	3	0	
55～59	115	110	0	0	5	0	115	110	0	0	5	0	
60～64	116	112	2	0	2	0	116	112	2	0	2	0	
65～69	88	80	1	1	6	0	88	81	0	1	6	0	
70～74	59	57	1	1	0	0	59	57	2	0	0	0	
75～79	51	49	1	0	1	0	51	49	1	0	1	0	
80～84	54	42	5	7	0	0	54	43	5	6	0	0	
85～89	44	35	7	1	1	0	44	37	5	2	0	0	
90歳以上	12	5	5	1	1	0	12	5	4	2	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
女	728	631	46	30	21	0	728	626	42	39	21	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
45～49	20	16	0	0	4	0	20	16	0	0	4	0	
50～54	76	73	0	0	3	0	76	73	0	0	3	0	
55～59	126	122	0	0	4	0	126	122	0	0	4	0	
60～64	112	106	1	1	4	0	112	106	1	1	4	0	
65～69	96	90	1	3	2	0	96	90	1	3	2	0	
70～74	71	67	1	2	1	0	71	68	1	1	1	0	
75～79	61	56	2	2	1	0	61	55	3	2	1	0	
80～84	69	56	11	1	1	0	69	53	10	5	1	0	
85～89	50	26	13	10	1	0	50	24	12	13	1	0	
90歳以上	42	14	17	11	0	0	42	14	14	14	0	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

別表 3 9

介助なしでできること 3、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)													
性 年齢階層	着替						入浴						
	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあっ てもでき ない	未回答	不詳	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあっ てもでき ない	未回答	不詳	
総数	1,384	1,246	71	27	40	0	1,384	1,219	84	39	42	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
45～49	47	42	0	0	5	0	47	42	0	0	5	0	
50～54	164	158	0	0	6	0	164	158	0	0	6	0	
55～59	241	232	0	0	9	0	241	231	0	1	9	0	
60～64	228	218	3	1	6	0	228	218	3	1	6	0	
65～69	184	169	3	4	8	0	184	171	1	4	8	0	
70～74	130	125	4	0	1	0	130	122	4	2	2	0	
75～79	112	106	3	1	2	0	112	102	6	2	2	0	
80～84	123	103	15	4	1	0	123	91	23	7	2	0	
85～89	94	63	21	9	1	0	94	59	24	10	1	0	
90歳以上	54	23	22	8	1	0	54	18	23	12	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
男	656	608	23	6	19	0	656	600	26	11	19	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
45～49	27	26	0	0	1	0	27	26	0	0	1	0	
50～54	88	85	0	0	3	0	88	85	0	0	3	0	
55～59	115	110	0	0	5	0	115	109	0	1	5	0	
60～64	116	112	2	0	2	0	116	112	2	0	2	0	
65～69	88	80	1	1	6	0	88	81	0	1	6	0	
70～74	59	57	2	0	0	0	59	56	2	1	0	0	
75～79	51	50	0	0	1	0	51	47	3	0	1	0	
80～84	54	43	8	3	0	0	54	41	8	5	0	0	
85～89	44	37	6	1	0	0	44	36	7	1	0	0	
90歳以上	12	6	4	1	1	0	12	5	4	2	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
女	728	638	48	21	21	0	728	619	58	28	23	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
45～49	20	16	0	0	4	0	20	16	0	0	4	0	
50～54	76	73	0	0	3	0	76	73	0	0	3	0	
55～59	126	122	0	0	4	0	126	122	0	0	4	0	
60～64	112	106	1	1	4	0	112	106	1	1	4	0	
65～69	96	89	2	3	2	0	96	90	1	3	2	0	
70～74	71	68	2	0	1	0	71	66	2	1	2	0	
75～79	61	56	3	1	1	0	61	55	3	2	1	0	
80～84	69	60	7	1	1	0	69	50	15	2	2	0	
85～89	50	26	15	8	1	0	50	23	17	9	1	0	
90歳以上	42	17	18	7	0	0	42	13	19	10	0	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

別表 4 0

介助なしでできること 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)		体位交換・起居(寝返りや体を起こすなど)					排泄(トイレ)					
性 年齢階層	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳
総数	1,384	1,291	33	20	40	0	1,384	1,275	44	25	40	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
45～49	47	42	0	0	5	0	47	42	0	0	5	0
50～54	164	158	0	0	6	0	164	158	0	0	6	0
55～59	241	231	1	0	9	0	241	232	0	0	9	0
60～64	228	218	4	0	6	0	228	219	2	1	6	0
65～69	184	172	2	2	8	0	184	171	2	3	8	0
70～74	130	128	1	0	1	0	130	125	4	0	1	0
75～79	112	107	2	1	2	0	112	106	2	2	2	0
80～84	123	111	6	5	1	0	123	109	8	5	1	0
85～89	94	77	10	6	1	0	94	71	15	7	1	0
90歳以上	54	40	7	6	1	0	54	35	11	7	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	620	12	5	19	0	656	617	14	6	19	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
45～49	27	26	0	0	1	0	27	26	0	0	1	0
50～54	88	85	0	0	3	0	88	85	0	0	3	0
55～59	115	109	1	0	5	0	115	110	0	0	5	0
60～64	116	112	2	0	2	0	116	113	1	0	2	0
65～69	88	81	0	1	6	0	88	81	0	1	6	0
70～74	59	58	1	0	0	0	59	57	2	0	0	0
75～79	51	50	0	0	1	0	51	48	2	0	1	0
80～84	54	47	3	4	0	0	54	48	2	4	0	0
85～89	44	40	4	0	0	0	44	37	6	1	0	0
90歳以上	12	10	1	0	1	0	12	10	1	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	671	21	15	21	0	728	658	30	19	21	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
45～49	20	16	0	0	4	0	20	16	0	0	4	0
50～54	76	73	0	0	3	0	76	73	0	0	3	0
55～59	126	122	0	0	4	0	126	122	0	0	4	0
60～64	112	106	2	0	4	0	112	106	1	1	4	0
65～69	96	91	2	1	2	0	96	90	2	2	2	0
70～74	71	70	0	0	1	0	71	68	2	0	1	0
75～79	61	57	2	1	1	0	61	58	0	2	1	0
80～84	69	64	3	1	1	0	69	61	6	1	1	0
85～89	50	37	6	6	1	0	50	34	9	6	1	0
90歳以上	42	30	6	6	0	0	42	25	10	7	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 4 1

介助なしでできること 5、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)													
性 年齢階層	食事の準備・後始末(調理を含む)						食事						
	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳	
総数	1,384	1,179	70	93	42	0	1,384	1,289	44	12	39	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
45～49	47	42	0	0	5	0	47	42	0	0	5	0	
50～54	164	157	1	0	6	0	164	158	0	0	6	0	
55～59	241	227	4	1	9	0	241	232	0	1	8	0	
60～64	228	213	5	4	6	0	228	217	5	0	6	0	
65～69	184	169	2	5	8	0	184	173	2	2	7	0	
70～74	130	121	2	6	1	0	130	126	3	0	1	0	
75～79	112	96	7	7	2	0	112	107	2	1	2	0	
80～84	123	88	17	16	2	0	123	110	8	3	2	0	
85～89	94	45	19	29	1	0	94	78	13	2	1	0	
90歳以上	54	14	13	25	2	0	54	39	11	3	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
男	656	577	26	34	19	0	656	622	13	3	18	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
45～49	27	26	0	0	1	0	27	26	0	0	1	0	
50～54	88	85	0	0	3	0	88	85	0	0	3	0	
55～59	115	105	4	1	5	0	115	110	0	1	4	0	
60～64	116	110	3	1	2	0	116	112	2	0	2	0	
65～69	88	80	1	1	6	0	88	82	0	1	5	0	
70～74	59	55	0	4	0	0	59	57	2	0	0	0	
75～79	51	42	3	5	1	0	51	50	0	0	1	0	
80～84	54	37	6	11	0	0	54	47	5	1	1	0	
85～89	44	30	7	7	0	0	44	41	3	0	0	0	
90歳以上	12	5	2	4	1	0	12	10	1	0	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
女	728	602	44	59	23	0	728	667	31	9	21	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
45～49	20	16	0	0	4	0	20	16	0	0	4	0	
50～54	76	72	1	0	3	0	76	73	0	0	3	0	
55～59	126	122	0	0	4	0	126	122	0	0	4	0	
60～64	112	103	2	3	4	0	112	105	3	0	4	0	
65～69	96	89	1	4	2	0	96	91	2	1	2	0	
70～74	71	66	2	2	1	0	71	69	1	0	1	0	
75～79	61	54	4	2	1	0	61	57	2	1	1	0	
80～84	69	51	11	5	2	0	69	63	3	2	1	0	
85～89	50	15	12	22	1	0	50	37	10	2	1	0	
90歳以上	42	9	11	21	1	0	42	29	10	3	0	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

別表 4 2

介助なしでできること 6、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)													
性 年齢階層	服薬(薬を含む)						散歩						
	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあっ てもでき ない	未回答	不詳	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあっ てもでき ない	未回答	不詳	
総数	1,384	1,254	74	14	42	0	1,384	1,186	95	62	41	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
45～49	47	42	0	0	5	0	47	42	0	0	5	0	
50～54	164	157	0	0	7	0	164	156	1	0	7	0	
55～59	241	230	2	0	9	0	241	229	3	0	9	0	
60～64	228	219	3	0	6	0	228	214	5	3	6	0	
65～69	184	171	4	2	7	0	184	169	4	4	7	0	
70～74	130	124	4	0	2	0	130	122	5	2	1	0	
75～79	112	104	5	1	2	0	112	98	7	5	2	0	
80～84	123	104	15	2	2	0	123	87	24	11	1	0	
85～89	94	67	22	4	1	0	94	50	25	18	1	0	
90歳以上	54	29	19	5	1	0	54	12	21	19	2	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
男	656	608	27	2	19	0	656	584	33	20	19	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
45～49	27	26	0	0	1	0	27	26	0	0	1	0	
50～54	88	85	0	0	3	0	88	85	0	0	3	0	
55～59	115	108	2	0	5	0	115	108	2	0	5	0	
60～64	116	113	1	0	2	0	116	110	3	1	2	0	
65～69	88	81	1	1	5	0	88	80	2	1	5	0	
70～74	59	56	3	0	0	0	59	56	2	1	0	0	
75～79	51	49	1	0	1	0	51	45	3	2	1	0	
80～84	54	44	8	1	1	0	54	34	11	8	1	0	
85～89	44	38	6	0	0	0	44	33	6	5	0	0	
90歳以上	12	6	5	0	1	0	12	5	4	2	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
女	728	646	47	12	23	0	728	602	62	42	22	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
45～49	20	16	0	0	4	0	20	16	0	0	4	0	
50～54	76	72	0	0	4	0	76	71	1	0	4	0	
55～59	126	122	0	0	4	0	126	121	1	0	4	0	
60～64	112	106	2	0	4	0	112	104	2	2	4	0	
65～69	96	90	3	1	2	0	96	89	2	3	2	0	
70～74	71	68	1	0	2	0	71	66	3	1	1	0	
75～79	61	55	4	1	1	0	61	53	4	3	1	0	
80～84	69	60	7	1	1	0	69	53	13	3	0	0	
85～89	50	29	16	4	1	0	50	17	19	13	1	0	
90歳以上	42	23	14	5	0	0	42	7	17	17	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

別表 4 3

介助なしでできること 7、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)													
性 年齢階層	掃除						洗濯						
	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳	
総数	1,384	1,168	62	111	43	0	1,384	1,172	70	100	42	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	
45～49	47	42	0	0	5	0	47	42	0	0	5	0	
50～54	164	155	1	1	7	0	164	156	0	1	7	0	
55～59	241	229	2	1	9	0	241	229	2	1	9	0	
60～64	228	212	5	5	6	0	228	215	5	2	6	0	
65～69	184	168	3	6	7	0	184	167	4	6	7	0	
70～74	130	120	1	7	2	0	130	121	2	6	1	0	
75～79	112	98	6	6	2	0	112	99	5	6	2	0	
80～84	123	82	19	19	3	0	123	81	22	17	3	0	
85～89	94	45	18	30	1	0	94	44	20	29	1	0	
90歳以上	54	10	7	36	1	0	54	11	10	32	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
男	656	577	23	36	20	0	656	573	27	36	20	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
45～49	27	26	0	0	1	0	27	26	0	0	1	0	
50～54	88	84	0	1	3	0	88	84	0	1	3	0	
55～59	115	107	2	1	5	0	115	108	1	1	5	0	
60～64	116	109	3	2	2	0	116	111	2	1	2	0	
65～69	88	80	1	2	5	0	88	78	3	2	5	0	
70～74	59	55	0	4	0	0	59	55	1	3	0	0	
75～79	51	45	2	3	1	0	51	45	2	3	1	0	
80～84	54	32	9	11	2	0	54	31	10	11	2	0	
85～89	44	31	6	7	0	0	44	29	7	8	0	0	
90歳以上	12	6	0	5	1	0	12	4	1	6	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
女	728	591	39	75	23	0	728	599	43	64	22	0	
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	
45～49	20	16	0	0	4	0	20	16	0	0	4	0	
50～54	76	71	1	0	4	0	76	72	0	0	4	0	
55～59	126	122	0	0	4	0	126	121	1	0	4	0	
60～64	112	103	2	3	4	0	112	104	3	1	4	0	
65～69	96	88	2	4	2	0	96	89	1	4	2	0	
70～74	71	65	1	3	2	0	71	66	1	3	1	0	
75～79	61	53	4	3	1	0	61	54	3	3	1	0	
80～84	69	50	10	8	1	0	69	50	12	6	1	0	
85～89	50	14	12	23	1	0	50	15	13	21	1	0	
90歳以上	42	4	7	31	0	0	42	7	9	26	0	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

別表 4 4

介助なしでできること 8、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)	買い物						日常会話					
性 年齢階層	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳	総数	介助なし に自分で 行うこと ができる	介助や支 えがあれ ばできる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳
総数	1,384	1,156	86	100	42	0	1,384	1,270	55	18	41	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
45～49	47	42	0	0	5	0	47	42	0	0	5	0
50～54	164	155	1	1	7	0	164	157	0	0	7	0
55～59	241	226	6	0	9	0	241	231	1	0	9	0
60～64	228	215	5	2	6	0	228	219	2	1	6	0
65～69	184	167	5	5	7	0	184	174	1	1	8	0
70～74	130	120	4	5	1	0	130	128	1	0	1	0
75～79	112	99	5	6	2	0	112	105	3	2	2	0
80～84	123	75	27	18	3	0	123	102	16	4	1	0
85～89	94	42	21	30	1	0	94	74	16	3	1	0
90歳以上	54	8	12	33	1	0	54	31	15	7	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	577	29	30	20	0	656	612	19	6	19	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
45～49	27	26	0	0	1	0	27	26	0	0	1	0
50～54	88	84	0	1	3	0	88	85	0	0	3	0
55～59	115	107	3	0	5	0	115	109	1	0	5	0
60～64	116	110	4	0	2	0	116	112	1	1	2	0
65～69	88	79	3	1	5	0	88	83	0	0	5	0
70～74	59	56	0	3	0	0	59	59	0	0	0	0
75～79	51	45	2	3	1	0	51	49	0	1	1	0
80～84	54	32	9	11	2	0	54	42	9	2	1	0
85～89	44	32	5	7	0	0	44	38	5	1	0	0
90歳以上	12	4	3	4	1	0	12	7	3	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	579	57	70	22	0	728	658	36	12	22	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
45～49	20	16	0	0	4	0	20	16	0	0	4	0
50～54	76	71	1	0	4	0	76	72	0	0	4	0
55～59	126	119	3	0	4	0	126	122	0	0	4	0
60～64	112	105	1	2	4	0	112	107	1	0	4	0
65～69	96	88	2	4	2	0	96	91	1	1	3	0
70～74	71	64	4	2	1	0	71	69	1	0	1	0
75～79	61	54	3	3	1	0	61	56	3	1	1	0
80～84	69	43	18	7	1	0	69	60	7	2	0	0
85～89	50	10	16	23	1	0	50	36	11	2	1	0
90歳以上	42	4	9	29	0	0	42	24	12	6	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 4 5

受診頻度、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	入院中	施設入所 中で医療 的ケアを 受けてい る	毎週1回以 上	毎月1～3 回程度	数か月に1 回程度	受診して いない	未回答	不詳
総数	1,384	28	32	93	634	328	237	32	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	1	3	2	1	0	0
45～49	47	0	0	2	13	14	18	0	0
50～54	164	2	0	5	43	46	64	4	0
55～59	241	2	1	13	93	70	57	5	0
60～64	228	0	1	10	96	69	49	3	0
65～69	184	5	0	9	97	47	23	3	0
70～74	130	3	1	12	67	30	9	8	0
75～79	112	3	0	12	68	20	7	2	0
80～84	123	8	9	9	74	16	5	2	0
85～89	94	3	8	16	53	7	3	4	0
90歳以上	54	2	12	4	27	7	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	14	8	32	293	157	129	23	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	1	1	0	0	0	0
45～49	27	0	0	1	5	9	12	0	0
50～54	88	1	0	1	22	24	36	4	0
55～59	115	1	1	4	47	28	29	5	0
60～64	116	0	0	5	46	35	29	1	0
65～69	88	3	0	3	47	22	11	2	0
70～74	59	2	0	3	31	15	5	3	0
75～79	51	1	0	4	29	13	2	2	0
80～84	54	4	4	4	30	7	3	2	0
85～89	44	2	2	6	26	2	2	4	0
90歳以上	12	0	1	0	9	2	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	14	24	61	341	171	108	9	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	2	2	1	0	0
45～49	20	0	0	1	8	5	6	0	0
50～54	76	1	0	4	21	22	28	0	0
55～59	126	1	0	9	46	42	28	0	0
60～64	112	0	1	5	50	34	20	2	0
65～69	96	2	0	6	50	25	12	1	0
70～74	71	1	1	9	36	15	4	5	0
75～79	61	2	0	8	39	7	5	0	0
80～84	69	4	5	5	44	9	2	0	0
85～89	50	1	6	10	27	5	1	0	0
90歳以上	42	2	11	4	18	5	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 4 6

医師の処方により継続して飲んでいる（塗っている）薬、性、年齢（5
歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,384	963	372	49	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	5	2	0	0
45～49	47	24	23	0	0
50～54	164	70	88	6	0
55～59	241	137	96	8	0
60～64	228	150	74	4	0
65～69	184	138	42	4	0
70～74	130	100	21	9	0
75～79	112	93	13	6	0
80～84	123	107	9	7	0
85～89	94	89	3	2	0
90歳以上	54	50	1	3	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	429	197	30	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	2	0	0	0
45～49	27	12	15	0	0
50～54	88	35	50	3	0
55～59	115	62	48	5	0
60～64	116	72	41	3	0
65～69	88	64	20	4	0
70～74	59	44	11	4	0
75～79	51	43	5	3	0
80～84	54	45	5	4	0
85～89	44	40	2	2	0
90歳以上	12	10	0	2	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	534	175	19	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	3	2	0	0
45～49	20	12	8	0	0
50～54	76	35	38	3	0
55～59	126	75	48	3	0
60～64	112	78	33	1	0
65～69	96	74	22	0	0
70～74	71	56	10	5	0
75～79	61	50	8	3	0
80～84	69	62	4	3	0
85～89	50	49	1	0	0
90歳以上	42	40	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 4 7

この一年間に新たに雇った病気、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,384	237	902	245	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	2	4	1	0
45～49	47	3	35	9	0
50～54	164	25	110	29	0
55～59	241	31	177	33	0
60～64	228	40	164	24	0
65～69	184	42	115	27	0
70～74	130	27	75	28	0
75～79	112	16	65	31	0
80～84	123	29	68	26	0
85～89	94	17	51	26	0
90歳以上	54	5	38	11	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	102	428	126	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	1	1	0	0
45～49	27	1	21	5	0
50～54	88	10	62	16	0
55～59	115	11	87	17	0
60～64	116	21	82	13	0
65～69	88	16	58	14	0
70～74	59	14	34	11	0
75～79	51	6	29	16	0
80～84	54	14	24	16	0
85～89	44	8	21	15	0
90歳以上	12	0	9	3	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	135	474	119	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	1	3	1	0
45～49	20	2	14	4	0
50～54	76	15	48	13	0
55～59	126	20	90	16	0
60～64	112	19	82	11	0
65～69	96	26	57	13	0
70～74	71	13	41	17	0
75～79	61	10	36	15	0
80～84	69	15	44	10	0
85～89	50	9	30	11	0
90歳以上	42	5	29	8	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 4 8

受療券を持っているか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,384	893	481	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	3	4	0	0
45～49	47	25	22	0	0
50～54	164	95	68	1	0
55～59	241	154	87	0	0
60～64	228	138	87	3	0
65～69	184	118	65	1	0
70～74	130	98	31	1	0
75～79	112	72	39	1	0
80～84	123	88	34	1	0
85～89	94	71	21	2	0
90歳以上	54	31	23	0	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	413	236	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	1	1	0	0
45～49	27	13	14	0	0
50～54	88	49	39	0	0
55～59	115	75	40	0	0
60～64	116	73	40	3	0
65～69	88	50	37	1	0
70～74	59	46	13	0	0
75～79	51	30	20	1	0
80～84	54	37	16	1	0
85～89	44	32	11	1	0
90歳以上	12	7	5	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	480	245	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	2	3	0	0
45～49	20	12	8	0	0
50～54	76	46	29	1	0
55～59	126	79	47	0	0
60～64	112	65	47	0	0
65～69	96	68	28	0	0
70～74	71	52	18	1	0
75～79	61	42	19	0	0
80～84	69	51	18	0	0
85～89	50	39	10	1	0
90歳以上	42	24	18	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 4 9

この 1 年間で、受療券を使用せずに受診したことがあるか、性、年齢
(5 歳階級) 別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	893	532	351	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	3	1	2	0	0
45～49	25	14	11	0	0
50～54	95	68	27	0	0
55～59	154	98	53	3	0
60～64	138	85	53	0	0
65～69	118	76	41	1	0
70～74	98	53	45	0	0
75～79	72	32	36	4	0
80～84	88	48	38	2	0
85～89	71	43	28	0	0
90歳以上	31	14	17	0	0
不詳	0	0	0	0	0
男	413	231	177	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	1	1	0	0	0
45～49	13	8	5	0	0
50～54	49	35	14	0	0
55～59	75	41	31	3	0
60～64	73	40	33	0	0
65～69	50	24	26	0	0
70～74	46	19	27	0	0
75～79	30	14	14	2	0
80～84	37	25	12	0	0
85～89	32	22	10	0	0
90歳以上	7	2	5	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	480	301	174	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	0	2	0	0
45～49	12	6	6	0	0
50～54	46	33	13	0	0
55～59	79	57	22	0	0
60～64	65	45	20	0	0
65～69	68	52	15	1	0
70～74	52	34	18	0	0
75～79	42	18	22	2	0
80～84	51	23	26	2	0
85～89	39	21	18	0	0
90歳以上	24	12	12	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 5 0

受療券を使用せずに受診した理由、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	受療券を 使用でき ない医療 機関のため	その他	未回答	不詳
総数	546	330	205	11	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	1	1	0	0	0
45～49	14	10	4	0	0
50～54	70	45	25	0	0
55～59	100	64	36	0	0
60～64	87	52	33	2	0
65～69	81	50	30	1	0
70～74	53	37	14	2	0
75～79	33	16	17	0	0
80～84	50	26	20	4	0
85～89	43	24	17	2	0
90歳以上	14	5	9	0	0
不詳	0	0	0	0	0
男	239	142	92	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	1	1	0	0	0
45～49	8	6	2	0	0
50～54	35	25	10	0	0
55～59	43	24	19	0	0
60～64	42	27	14	1	0
65～69	25	13	11	1	0
70～74	19	14	5	0	0
75～79	15	7	8	0	0
80～84	27	12	12	3	0
85～89	22	13	9	0	0
90歳以上	2	0	2	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	307	188	113	6	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	6	4	2	0	0
50～54	35	20	15	0	0
55～59	57	40	17	0	0
60～64	45	25	19	1	0
65～69	56	37	19	0	0
70～74	34	23	9	2	0
75～79	18	9	9	0	0
80～84	23	14	8	1	0
85～89	21	11	8	2	0
90歳以上	12	5	7	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 5 1

受療券の発行を希望しているか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	481	61	411	9	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	4	0	4	0	0
45～49	22	3	18	1	0
50～54	68	8	59	1	0
55～59	87	10	75	2	0
60～64	87	12	74	1	0
65～69	65	10	53	2	0
70～74	31	1	29	1	0
75～79	39	9	30	0	0
80～84	34	7	27	0	0
85～89	21	1	20	0	0
90歳以上	23	0	22	1	0
不詳	0	0	0	0	0
男	236	35	197	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	1	0	1	0	0
45～49	14	3	10	1	0
50～54	39	4	35	0	0
55～59	40	4	34	2	0
60～64	40	8	32	0	0
65～69	37	5	31	1	0
70～74	13	0	13	0	0
75～79	20	6	14	0	0
80～84	16	5	11	0	0
85～89	11	0	11	0	0
90歳以上	5	0	5	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	245	26	214	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	3	0	3	0	0
45～49	8	0	8	0	0
50～54	29	4	24	1	0
55～59	47	6	41	0	0
60～64	47	4	42	1	0
65～69	28	5	22	1	0
70～74	18	1	16	1	0
75～79	19	3	16	0	0
80～84	18	2	16	0	0
85～89	10	1	9	0	0
90歳以上	18	0	17	1	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 5 2

受療券の送付を希望しているか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	61	58	2	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	3	3	0	0	0
50～54	8	6	1	1	0
55～59	10	10	0	0	0
60～64	12	12	0	0	0
65～69	10	9	1	0	0
70～74	1	1	0	0	0
75～79	9	9	0	0	0
80～84	7	7	0	0	0
85～89	1	1	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0
男	35	33	1	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	3	3	0	0	0
50～54	4	3	0	1	0
55～59	4	4	0	0	0
60～64	8	8	0	0	0
65～69	5	4	1	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	6	6	0	0	0
80～84	5	5	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	26	25	1	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	4	3	1	0	0
55～59	6	6	0	0	0
60～64	4	4	0	0	0
65～69	5	5	0	0	0
70～74	1	1	0	0	0
75～79	3	3	0	0	0
80～84	2	2	0	0	0
85～89	1	1	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 5 3

受療券の発行を希望しない理由（複数回答）、性、年齢（5歳階級）

別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	利用する 予定がな いから	手続がめ んどうだ から	他の人に 油症患者 であると 知られて しまうと 思うから	受療券が 利用できる 医療機 関に限ら れるから	その他	未回答	不詳
総数	575	128	52	163	169	58	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	6	1	0	3	1	1	0	0
45～49	23	4	2	6	8	2	1	0
50～54	87	23	8	25	26	5	0	0
55～59	107	25	10	39	29	4	0	0
60～64	115	23	16	37	31	8	0	0
65～69	69	17	5	19	20	6	2	0
70～74	44	5	4	11	16	7	1	0
75～79	39	7	4	8	10	9	1	0
80～84	34	9	1	8	13	3	0	0
85～89	27	7	2	4	8	6	0	0
90歳以上	24	7	0	3	7	7	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	268	65	27	67	79	28	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	1	1	0	0	0
45～49	14	3	1	4	4	2	0	0
50～54	51	13	6	13	15	4	0	0
55～59	43	12	3	13	15	0	0	0
60～64	54	11	10	16	14	3	0	0
65～69	40	12	3	9	10	5	1	0
70～74	16	3	1	3	6	3	0	0
75～79	17	3	3	3	4	3	1	0
80～84	14	3	0	3	6	2	0	0
85～89	12	3	0	1	3	5	0	0
90歳以上	5	2	0	1	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	307	63	25	96	90	30	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	1	0	2	0	1	0	0
45～49	9	1	1	2	4	0	1	0
50～54	36	10	2	12	11	1	0	0
55～59	64	13	7	26	14	4	0	0
60～64	61	12	6	21	17	5	0	0
65～69	29	5	2	10	10	1	1	0
70～74	28	2	3	8	10	4	1	0
75～79	22	4	1	5	6	6	0	0
80～84	20	6	1	5	7	1	0	0
85～89	15	4	2	3	5	1	0	0
90歳以上	19	5	0	2	6	6	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 5 4

受療券の使用を希望する医療機関があるか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,384	91	1,218	75	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	0	6	1	0
45～49	47	2	43	2	0
50～54	164	6	150	8	0
55～59	241	13	220	8	0
60～64	228	9	208	11	0
65～69	184	19	155	10	0
70～74	130	8	113	9	0
75～79	112	11	92	9	0
80～84	123	15	104	4	0
85～89	94	5	79	10	0
90歳以上	54	3	48	3	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	42	576	38	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	0	2	0	0
45～49	27	1	24	2	0
50～54	88	4	79	5	0
55～59	115	7	103	5	0
60～64	116	4	106	6	0
65～69	88	5	79	4	0
70～74	59	4	53	2	0
75～79	51	5	42	4	0
80～84	54	7	43	4	0
85～89	44	4	35	5	0
90歳以上	12	1	10	1	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	49	642	37	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	0	4	1	0
45～49	20	1	19	0	0
50～54	76	2	71	3	0
55～59	126	6	117	3	0
60～64	112	5	102	5	0
65～69	96	14	76	6	0
70～74	71	4	60	7	0
75～79	61	6	50	5	0
80～84	69	8	61	0	0
85～89	50	1	44	5	0
90歳以上	42	2	38	2	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 5 5

受療券の使用を希望する医療機関の受診頻度、性、年齢（5歳階級）

別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	外科手術 (胸腔鏡・ 胸腔鏡手 術を含 む)	内視鏡治 療	薬物療法 (抗がん 剤・ホル モン剤 など)	放射線治 療	その他	未回答	不詳
総数	349	151	52	87	36	13	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	22	12	1	5	3	0	1	0
55～59	16	8	3	3	1	0	1	0
60～64	41	18	7	6	5	5	0	0
65～69	38	16	8	12	1	1	0	0
70～74	56	25	8	17	4	0	2	0
75～79	57	19	7	17	11	2	1	0
80～84	64	25	11	16	7	1	4	0
85～89	41	20	7	8	3	3	0	0
90歳以上	14	8	0	3	1	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	201	86	32	51	24	5	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	8	4	1	2	1	0	0	0
55～59	8	5	2	1	0	0	0	0
60～64	29	14	5	4	4	2	0	0
65～69	19	8	5	5	0	1	0	0
70～74	25	12	2	6	4	0	1	0
75～79	28	7	5	10	5	0	1	0
80～84	45	16	7	14	7	0	1	0
85～89	33	17	5	7	2	2	0	0
90歳以上	6	3	0	2	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	148	65	20	36	12	8	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	14	8	0	3	2	0	1	0
55～59	8	3	1	2	1	0	1	0
60～64	12	4	2	2	1	3	0	0
65～69	19	8	3	7	1	0	0	0
70～74	31	13	6	11	0	0	1	0
75～79	29	12	2	7	6	2	0	0
80～84	19	9	4	2	0	1	3	0
85～89	8	3	2	1	1	1	0	0
90歳以上	8	5	0	1	0	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 5 6

油症検診を受診したか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,384	501	875	8	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	1	6	0	0
45～49	47	10	37	0	0
50～54	164	48	116	0	0
55～59	241	63	176	2	0
60～64	228	71	155	2	0
65～69	184	81	103	0	0
70～74	130	70	59	1	0
75～79	112	56	55	1	0
80～84	123	60	62	1	0
85～89	94	29	64	1	0
90歳以上	54	12	42	0	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	248	403	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	1	1	0	0
45～49	27	8	19	0	0
50～54	88	26	62	0	0
55～59	115	28	85	2	0
60～64	116	38	78	0	0
65～69	88	30	58	0	0
70～74	59	36	23	0	0
75～79	51	30	20	1	0
80～84	54	28	25	1	0
85～89	44	20	23	1	0
90歳以上	12	3	9	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	253	472	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	0	5	0	0
45～49	20	2	18	0	0
50～54	76	22	54	0	0
55～59	126	35	91	0	0
60～64	112	33	77	2	0
65～69	96	51	45	0	0
70～74	71	34	36	1	0
75～79	61	26	35	0	0
80～84	69	32	37	0	0
85～89	50	9	41	0	0
90歳以上	42	9	33	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 5 7

検診受診を受けなかった理由（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	知らな かったか ら(案内が 届かなか った)	仕事など で都合が つかなか ったから	体調が悪 かったか ら	検診の場 所が遠 かったか ら	職場や自 治体の検 診を受け ているた め、必要 性を感じ ないから	健康に自 信があ り、必要 性を感じ ないから
総数	1,219	20	337	149	215	188	27
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	11	0	5	0	2	2	0
45～49	56	0	26	2	9	10	2
50～54	163	4	77	5	20	31	5
55～59	262	7	96	14	51	52	3
60～64	227	4	75	15	40	41	5
65～69	143	4	33	20	25	24	3
70～74	78	0	18	13	16	9	1
75～79	72	0	5	21	16	6	3
80～84	82	1	1	25	21	8	2
85～89	76	0	1	23	9	5	2
90歳以上	49	0	0	11	6	0	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	561	11	197	52	83	92	17
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	1	0	0	0	0
45～49	35	0	14	0	6	8	2
50～54	86	2	41	2	9	20	3
55～59	119	4	53	6	18	21	3
60～64	113	2	46	6	15	22	4
65～69	82	3	23	8	13	11	2
70～74	27	0	14	3	3	2	0
75～79	25	0	5	6	3	0	0
80～84	34	0	0	10	10	4	0
85～89	29	0	0	8	4	4	2
90歳以上	10	0	0	3	2	0	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	658	9	140	97	132	96	10
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	10	0	4	0	2	2	0
45～49	21	0	12	2	3	2	0
50～54	77	2	36	3	11	11	2
55～59	143	3	43	8	33	31	0
60～64	114	2	29	9	25	19	1
65～69	61	1	10	12	12	13	1
70～74	51	0	4	10	13	7	1
75～79	47	0	0	15	13	6	3
80～84	48	1	1	15	11	4	2
85～89	47	0	1	15	5	1	0
90歳以上	39	0	0	8	4	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 5 8

検診受診を受けなかった理由（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	その時、 医療機関 に入院し ていたか ら（介護施 設への入 所も含む）	めんどろ うだから	その他	未回答	不詳
総数	1,249	79	70	136	28	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	11	1	0	1	0	0
45～49	57	0	3	3	2	0
50～54	163	1	5	12	3	0
55～59	268	2	14	25	4	0
60～64	229	8	16	22	3	0
65～69	144	9	11	12	3	0
70～74	81	5	3	14	2	0
75～79	80	4	9	15	1	0
80～84	84	13	2	8	3	0
85～89	81	20	5	13	3	0
90歳以上	51	16	2	11	4	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	571	29	33	44	13	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	0
45～49	35	0	3	2	0	0
50～54	86	1	1	5	2	0
55～59	122	2	7	5	3	0
60～64	114	4	8	7	0	0
65～69	82	6	6	7	3	0
70～74	29	2	0	5	0	0
75～79	26	2	6	3	1	0
80～84	35	6	0	3	2	0
85～89	31	5	2	5	1	0
90歳以上	10	1	0	2	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	678	50	37	92	15	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	10	1	0	1	0	0
45～49	22	0	0	1	2	0
50～54	77	0	4	7	1	0
55～59	146	0	7	20	1	0
60～64	115	4	8	15	3	0
65～69	62	3	5	5	0	0
70～74	52	3	3	9	2	0
75～79	54	2	3	12	0	0
80～84	49	7	2	5	1	0
85～89	50	15	3	8	2	0
90歳以上	41	15	2	9	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 5 9

検診受診を受けなかった主な理由 1、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	知らな かったか ら(案内が 届かなか った)	仕事など で都合が つかなか ったから	体調が悪 かったか ら	検診の場 所が遠 かったか ら	職場や自 治体の検 診を受け ているた め、必要 性を感じ ないから	健康に自 信があ り、必要 性を感じ ないから
総数	875	14	230	85	97	105	10
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	6	0	3	0	0	0	0
45～49	37	0	19	1	4	5	1
50～54	116	4	54	4	4	17	0
55～59	176	3	61	5	24	32	2
60～64	155	3	50	7	18	18	1
65～69	103	1	23	13	14	15	2
70～74	59	0	15	8	9	5	1
75～79	55	0	3	11	12	3	1
80～84	62	3	1	15	6	6	0
85～89	64	0	1	12	2	4	1
90歳以上	42	0	0	9	4	0	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	403	10	140	31	26	42	8
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	1	0	0	0	0
45～49	19	0	9	0	2	3	1
50～54	62	2	30	2	1	11	0
55～59	85	3	38	2	6	11	2
60～64	78	3	31	3	3	7	1
65～69	58	1	17	5	7	5	2
70～74	23	0	11	2	2	0	0
75～79	20	0	3	4	1	0	0
80～84	25	1	0	6	2	2	0
85～89	23	0	0	4	1	3	1
90歳以上	9	0	0	3	1	0	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	472	4	90	54	71	63	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	2	0	0	0	0
45～49	18	0	10	1	2	2	0
50～54	54	2	24	2	3	6	0
55～59	91	0	23	3	18	21	0
60～64	77	0	19	4	15	11	0
65～69	45	0	6	8	7	10	0
70～74	36	0	4	6	7	5	1
75～79	35	0	0	7	11	3	1
80～84	37	2	1	9	4	4	0
85～89	41	0	1	8	1	1	0
90歳以上	33	0	0	6	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 0

検診受診を受けなかった主な理由 2、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	その時、 医療機関 に入院し ていたか ら(介護施 設への入 所も含む)	めんどう だから	その他	未回答	不詳
総数	875	52	20	96	163	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	6	0	0	1	2	0
45～49	37	0	1	3	3	0
50～54	116	0	2	11	19	1
55～59	176	1	2	18	28	0
60～64	155	6	5	17	30	0
65～69	103	7	3	10	15	0
70～74	59	2	0	8	11	0
75～79	55	4	3	6	11	1
80～84	62	10	0	6	14	1
85～89	64	13	3	8	20	0
90歳以上	42	9	1	8	10	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	403	22	12	34	77	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	0	0
45～49	19	0	1	2	1	0
50～54	62	0	0	5	11	0
55～59	85	1	2	3	17	0
60～64	78	4	3	6	17	0
65～69	58	4	1	6	10	0
70～74	23	1	0	4	3	0
75～79	20	2	3	1	5	1
80～84	25	5	0	3	6	0
85～89	23	4	2	2	6	0
90歳以上	9	1	0	2	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	472	30	8	62	86	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	2	0
45～49	18	0	0	1	2	0
50～54	54	0	2	6	8	1
55～59	91	0	0	15	11	0
60～64	77	2	2	11	13	0
65～69	45	3	2	4	5	0
70～74	36	1	0	4	8	0
75～79	35	2	0	5	6	0
80～84	37	5	0	3	8	1
85～89	41	9	1	6	14	0
90歳以上	33	8	1	6	9	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 6 1

油症相談員、相談窓口への相談経験、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1,384	202	1,167	15	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	0	7	0	0
45～49	47	3	44	0	0
50～54	164	15	149	0	0
55～59	241	23	215	3	0
60～64	228	22	203	3	0
65～69	184	34	149	1	0
70～74	130	25	103	2	0
75～79	112	22	88	2	0
80～84	123	27	94	2	0
85～89	94	23	70	1	0
90歳以上	54	8	45	1	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	99	549	8	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	0	2	0	0
45～49	27	1	26	0	0
50～54	88	7	81	0	0
55～59	115	12	101	2	0
60～64	116	12	103	1	0
65～69	88	20	67	1	0
70～74	59	11	47	1	0
75～79	51	8	42	1	0
80～84	54	14	39	1	0
85～89	44	12	31	1	0
90歳以上	12	2	10	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	103	618	7	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	0	5	0	0
45～49	20	2	18	0	0
50～54	76	8	68	0	0
55～59	126	11	114	1	0
60～64	112	10	100	2	0
65～69	96	14	82	0	0
70～74	71	14	56	1	0
75～79	61	14	46	1	0
80～84	69	13	55	1	0
85～89	50	11	39	0	0
90歳以上	42	6	35	1	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 6 2

油症相談員、相談窓口へ今後考えられる相談内容（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	自分の病 気や介護	家族の病 気や介護	収入・家 計・借金 等	家族又は 家族以外 との人間 関係	その他	未回答	不詳
総数	1,476	629	280	106	44	182	235	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	8	4	2	0	0	0	2	0
45～49	52	20	14	2	1	2	13	0
50～54	192	81	43	13	6	23	26	0
55～59	274	107	67	13	12	31	44	0
60～64	268	124	45	32	10	23	34	0
65～69	191	82	31	21	5	18	34	0
70～74	133	51	23	11	1	25	22	0
75～79	107	46	18	6	2	16	19	0
80～84	114	51	18	4	6	16	19	0
85～89	87	45	14	2	1	13	12	0
90歳以上	50	18	5	2	0	15	10	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	694	300	125	60	26	79	104	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	0	0	2	0
45～49	32	14	8	1	1	2	6	0
50～54	103	47	17	7	5	10	17	0
55～59	123	46	27	7	7	17	19	0
60～64	134	64	23	18	5	8	16	0
65～69	92	44	12	15	3	4	14	0
70～74	60	23	11	6	0	15	5	0
75～79	50	19	8	3	1	7	12	0
80～84	45	18	6	2	3	8	8	0
85～89	42	21	11	1	1	4	4	0
90歳以上	11	4	2	0	0	4	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	782	329	155	46	18	103	131	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	6	4	2	0	0	0	0	0
45～49	20	6	6	1	0	0	7	0
50～54	89	34	26	6	1	13	9	0
55～59	151	61	40	6	5	14	25	0
60～64	134	60	22	14	5	15	18	0
65～69	99	38	19	6	2	14	20	0
70～74	73	28	12	5	1	10	17	0
75～79	57	27	10	3	1	9	7	0
80～84	69	33	12	2	3	8	11	0
85～89	45	24	3	1	0	9	8	0
90歳以上	39	14	3	2	0	11	9	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 3

悪性腫瘍（がん）にかかったことがあるか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1384	172	1165	47	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	7	0	7	0	0
45～49	47	0	47	0	0
50～54	164	10	153	1	0
55～59	241	11	225	5	0
60～64	228	22	202	4	0
65～69	184	23	158	3	0
70～74	130	21	102	7	0
75～79	112	25	81	6	0
80～84	123	30	86	7	0
85～89	94	19	63	12	0
90歳以上	54	11	41	2	0
不詳	0	0	0	0	0
男	656	97	537	22	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	2	0	2	0	0
45～49	27	0	27	0	0
50～54	88	4	84	0	0
55～59	115	6	105	4	0
60～64	116	14	102	0	0
65～69	88	13	72	3	0
70～74	59	10	48	1	0
75～79	51	14	33	4	0
80～84	54	17	32	5	0
85～89	44	15	24	5	0
90歳以上	12	4	8	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	75	628	25	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	0	5	0	0
45～49	20	0	20	0	0
50～54	76	6	69	1	0
55～59	126	5	120	1	0
60～64	112	8	100	4	0
65～69	96	10	86	0	0
70～74	71	11	54	6	0
75～79	61	11	48	2	0
80～84	69	13	54	2	0
85～89	50	4	39	7	0
90歳以上	42	7	33	2	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 6 4

悪性腫瘍（がん）の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	入院治療 中・外来 (通院)治 療中	がんに対 する治療 は終了 し、定期的な健診 のため通 院中	治療が完 了し、通 院もして いない	その他	未回答	不詳
総数	237	48	104	71	12	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	14	4	6	3	0	1	0
55～59	12	1	6	4	0	1	0
60～64	29	5	14	6	4	0	0
65～69	25	2	16	7	0	0	0
70～74	35	8	15	12	0	0	0
75～79	39	11	14	12	2	0	0
80～84	43	10	13	17	3	0	0
85～89	28	4	16	6	2	0	0
90歳以上	12	3	4	4	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	142	29	71	38	4	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	4	0	2	2	0	0	0
55～59	7	1	3	3	0	0	0
60～64	19	4	11	3	1	0	0
65～69	15	1	10	4	0	0	0
70～74	19	6	9	4	0	0	0
75～79	22	6	7	8	1	0	0
80～84	27	7	12	7	1	0	0
85～89	24	3	14	6	1	0	0
90歳以上	5	1	3	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	95	19	33	33	8	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	10	4	4	1	0	1	0
55～59	5	0	3	1	0	1	0
60～64	10	1	3	3	3	0	0
65～69	10	1	6	3	0	0	0
70～74	16	2	6	8	0	0	0
75～79	17	5	7	4	1	0	0
80～84	16	3	1	10	2	0	0
85～89	4	1	2	0	1	0	0
90歳以上	7	2	1	3	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 5

受けた悪性腫瘍（がん）治療、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	外科手術 (胸腔鏡・ 胸腔鏡手 術を含 む)	内視鏡治 療	薬物療法 (抗がん 剤・ホル モン剤 など)	放射線治 療	その他	未回答
総数	349	151	52	87	36	13	10
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	22	12	1	5	3	0	1
55～59	16	8	3	3	1	0	1
60～64	41	18	7	6	5	5	0
65～69	38	16	8	12	1	1	0
70～74	56	25	8	17	4	0	2
75～79	57	19	7	17	11	2	1
80～84	64	25	11	16	7	1	4
85～89	41	20	7	8	3	3	0
90歳以上	14	8	0	3	1	1	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	201	86	32	51	24	5	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	8	4	1	2	1	0	0
55～59	8	5	2	1	0	0	0
60～64	29	14	5	4	4	2	0
65～69	19	8	5	5	0	1	0
70～74	25	12	2	6	4	0	1
75～79	28	7	5	10	5	0	1
80～84	45	16	7	14	7	0	1
85～89	33	17	5	7	2	2	0
90歳以上	6	3	0	2	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	148	65	20	36	12	8	7
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	14	8	0	3	2	0	1
55～59	8	3	1	2	1	0	1
60～64	12	4	2	2	1	3	0
65～69	19	8	3	7	1	0	0
70～74	31	13	6	11	0	0	1
75～79	29	12	2	7	6	2	0
80～84	19	9	4	2	0	1	3
85～89	8	3	2	1	1	1	0
90歳以上	8	5	0	1	0	1	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 6

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級） 別

（単位：人）

性 年齢階層	脳卒中・脳出血・くも膜下出血						脳梗塞					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	17	8	8	1351	0	1384	40	23	11	1310	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	0	0	46	0	47	2	0	0	45	0
50～54	164	1	1	2	160	0	164	0	1	1	162	0
55～59	241	2	1	2	236	0	241	1	1	1	238	0
60～64	228	2	1	2	223	0	228	4	2	2	220	0
65～69	184	1	1	2	180	0	184	4	1	2	177	0
70～74	130	2	1	0	127	0	130	4	3	0	123	0
75～79	112	1	0	0	111	0	112	7	1	1	103	0
80～84	123	4	1	0	118	0	123	11	6	2	104	0
85～89	94	2	1	0	91	0	94	5	5	1	83	0
90歳以上	54	1	1	0	52	0	54	2	3	1	48	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	8	3	5	640	0	656	26	16	3	611	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	0	0	26	0	27	2	0	0	25	0
50～54	88	0	1	1	86	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	2	0	1	112	0	115	1	1	0	113	0
60～64	116	0	1	1	114	0	116	3	2	1	110	0
65～69	88	1	0	2	85	0	88	2	1	2	83	0
70～74	59	1	1	0	57	0	59	3	2	0	54	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	4	1	0	46	0
80～84	54	2	0	0	52	0	54	9	6	0	39	0
85～89	44	0	0	0	44	0	44	2	2	0	40	0
90歳以上	12	1	0	0	11	0	12	0	1	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	9	5	3	711	0	728	14	7	8	699	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	1	0	1	74	0	76	0	1	1	74	0
55～59	126	0	1	1	124	0	126	0	0	1	125	0
60～64	112	2	0	1	109	0	112	1	0	1	110	0
65～69	96	0	1	0	95	0	96	2	0	0	94	0
70～74	71	1	0	0	70	0	71	1	1	0	69	0
75～79	61	1	0	0	60	0	61	3	0	1	57	0
80～84	69	2	1	0	66	0	69	2	0	2	65	0
85～89	50	2	1	0	47	0	50	3	3	1	43	0
90歳以上	42	0	1	0	41	0	42	2	2	1	37	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 7

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級） 別

（単位：人）

性 年齢階層	頭痛						頭重（頭が重い）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	105	35	172	1071	1	1384	57	5	89	1233	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	2	1	3	1	0	7	2	0	1	4	0
45～49	47	3	1	14	29	0	47	1	0	6	40	0
50～54	163	9	6	25	123	1	164	5	0	14	145	0
55～59	241	14	4	40	183	0	241	8	0	19	214	0
60～64	228	16	3	28	181	0	228	8	0	17	203	0
65～69	184	10	9	24	141	0	184	5	1	15	163	0
70～74	130	6	1	17	106	0	130	5	0	6	119	0
75～79	112	10	6	5	91	0	112	7	2	3	100	0
80～84	123	16	2	10	95	0	123	10	0	4	109	0
85～89	94	13	2	4	75	0	94	4	2	4	84	0
90歳以上	54	6	0	2	46	0	54	2	0	0	52	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	30	9	60	556	1	656	18	3	27	608	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0
45～49	27	2	0	5	20	0	27	1	0	1	25	0
50～54	87	3	1	4	79	1	88	2	0	2	84	0
55～59	115	4	1	10	100	0	115	2	0	3	110	0
60～64	116	4	0	13	99	0	116	4	0	8	104	0
65～69	88	3	3	15	67	0	88	1	0	6	81	0
70～74	59	1	1	5	52	0	59	0	0	2	57	0
75～79	51	2	2	2	45	0	51	2	1	0	48	0
80～84	54	5	0	3	46	0	54	4	0	2	48	0
85～89	44	5	1	3	35	0	44	1	2	3	38	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	75	26	112	515	0	728	39	2	62	625	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	1	3	0	0	5	1	0	1	3	0
45～49	20	1	1	9	9	0	20	0	0	5	15	0
50～54	76	6	5	21	44	0	76	3	0	12	61	0
55～59	126	10	3	30	83	0	126	6	0	16	104	0
60～64	112	12	3	15	82	0	112	4	0	9	99	0
65～69	96	7	6	9	74	0	96	4	1	9	82	0
70～74	71	5	0	12	54	0	71	5	0	4	62	0
75～79	61	8	4	3	46	0	61	5	1	3	52	0
80～84	69	11	2	7	49	0	69	6	0	2	61	0
85～89	50	8	1	1	40	0	50	3	0	1	46	0
90歳以上	42	6	0	2	34	0	42	2	0	0	40	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 8

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級） 別

（単位：人）

性 年齢階層	神経痛						知的障害					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	84	19	69	1211	1	1384	4	0	13	1367	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	2	2	3	40	0	47	0	0	0	47	0
50～54	163	7	4	8	144	1	164	1	0	2	161	0
55～59	241	10	4	17	210	0	241	1	0	3	237	0
60～64	228	5	1	12	210	0	228	0	0	4	224	0
65～69	184	14	2	16	152	0	184	0	0	3	181	0
70～74	130	4	1	2	123	0	130	0	0	0	130	0
75～79	112	9	1	3	99	0	112	0	0	1	111	0
80～84	123	16	2	4	101	0	123	2	0	0	121	0
85～89	94	10	1	3	80	0	94	0	0	0	94	0
90歳以上	54	7	1	1	45	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	23	3	31	598	1	656	2	0	6	648	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	0	2	24	0	27	0	0	0	27	0
50～54	87	2	1	1	83	1	88	0	0	0	88	0
55～59	115	3	0	5	107	0	115	1	0	2	112	0
60～64	116	2	1	7	106	0	116	0	0	2	114	0
65～69	88	5	0	11	72	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	0	0	1	58	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	1	0	0	50	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	6	1	2	45	0	54	1	0	0	53	0
85～89	44	2	0	2	40	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	1	0	0	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	61	16	38	613	0	728	2	0	7	719	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	1	2	1	16	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	5	3	7	61	0	76	1	0	2	73	0
55～59	126	7	4	12	103	0	126	0	0	1	125	0
60～64	112	3	0	5	104	0	112	0	0	2	110	0
65～69	96	9	2	5	80	0	96	0	0	1	95	0
70～74	71	4	1	1	65	0	71	0	0	0	71	0
75～79	61	8	1	3	49	0	61	0	0	1	60	0
80～84	69	10	1	2	56	0	69	1	0	0	68	0
85～89	50	8	1	1	40	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	6	1	1	34	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 9

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級） 別

（単位：人）

性 年齢階層	躁うつ病						統合失調症					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	34	21	18	1311	0	1384	21	4	12	1347	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	2	1	0	44	0	47	1	0	0	46	0
50～54	164	4	3	2	155	0	164	3	0	1	160	0
55～59	241	7	5	3	226	0	241	6	1	3	231	0
60～64	228	6	1	5	216	0	228	1	0	2	225	0
65～69	184	4	4	6	170	0	184	5	1	2	176	0
70～74	130	3	1	0	126	0	130	2	0	2	126	0
75～79	112	2	1	1	108	0	112	0	1	0	111	0
80～84	123	4	3	1	115	0	123	2	1	0	120	0
85～89	94	1	1	0	92	0	94	1	0	1	92	0
90歳以上	54	1	1	0	52	0	54	0	0	1	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	13	7	8	628	0	656	9	1	5	641	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	2	0	0	25	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	1	2	0	85	0	88	1	0	0	87	0
55～59	115	3	3	1	108	0	115	4	0	1	110	0
60～64	116	3	0	3	110	0	116	0	0	1	115	0
65～69	88	2	1	3	82	0	88	3	0	2	83	0
70～74	59	1	0	0	58	0	59	1	0	0	58	0
75～79	51	1	0	0	50	0	51	0	1	0	50	0
80～84	54	0	1	1	52	0	54	0	0	0	54	0
85～89	44	0	0	0	44	0	44	0	0	1	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	21	14	10	683	0	728	12	3	7	706	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	1	0	19	0	20	1	0	0	19	0
50～54	76	3	1	2	70	0	76	2	0	1	73	0
55～59	126	4	2	2	118	0	126	2	1	2	121	0
60～64	112	3	1	2	106	0	112	1	0	1	110	0
65～69	96	2	3	3	88	0	96	2	1	0	93	0
70～74	71	2	1	0	68	0	71	1	0	2	68	0
75～79	61	1	1	1	58	0	61	0	0	0	61	0
80～84	69	4	2	0	63	0	69	2	1	0	66	0
85～89	50	1	1	0	48	0	50	1	0	0	49	0
90歳以上	42	1	1	0	40	0	42	0	0	1	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 0

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級） 別

（単位：人）

性 年齢階層	幻覚						認知症					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	10	6	16	1352	0	1384	54	0	22	1308	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	0	1	1	162	0	164	0	0	1	163	0
55～59	241	2	1	3	235	0	241	0	0	3	238	0
60～64	228	1	1	1	225	0	228	1	0	2	225	0
65～69	184	2	1	2	179	0	184	1	0	2	181	0
70～74	130	1	0	2	127	0	130	2	0	2	126	0
75～79	112	1	0	1	110	0	112	6	0	1	105	0
80～84	123	1	0	2	120	0	123	17	0	2	104	0
85～89	94	1	2	1	90	0	94	14	0	5	75	0
90歳以上	54	1	0	3	50	0	54	13	0	4	37	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	6	4	8	638	0	656	14	0	11	631	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	1	0	87	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	2	1	1	111	0	115	0	0	2	113	0
60～64	116	1	1	1	113	0	116	1	0	1	114	0
65～69	88	2	1	2	83	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	0	0	1	58	0	59	1	0	2	56	0
75～79	51	1	0	1	49	0	51	2	0	0	49	0
80～84	54	0	0	1	53	0	54	7	0	2	45	0
85～89	44	0	0	1	43	0	44	3	0	1	40	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	1	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	4	2	8	714	0	728	40	0	11	677	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	0	1	75	0	76	0	0	1	75	0
55～59	126	0	0	2	124	0	126	0	0	1	125	0
60～64	112	0	0	0	112	0	112	0	0	1	111	0
65～69	96	0	0	0	96	0	96	1	0	0	95	0
70～74	71	1	0	1	69	0	71	1	0	0	70	0
75～79	61	0	0	0	61	0	61	4	0	1	56	0
80～84	69	1	0	1	67	0	69	10	0	0	59	0
85～89	50	1	2	0	47	0	50	11	0	4	35	0
90歳以上	42	1	0	3	38	0	42	13	0	3	26	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 1

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）

別

(単位：人)

性 年齢階層	もの忘れ						かっとなりやすい・短気					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	48	2	143	1191	0	1384	25	2	78	1279	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	2	0	3	42	0	47	1	0	2	44	0
50～54	164	1	0	7	156	0	164	1	0	12	151	0
55～59	241	2	0	16	223	0	241	2	0	15	224	0
60～64	228	4	0	23	201	0	228	0	0	10	218	0
65～69	184	0	1	22	161	0	184	1	1	14	168	0
70～74	130	7	0	16	107	0	130	4	1	6	119	0
75～79	112	8	0	12	92	0	112	4	0	9	99	0
80～84	123	10	1	21	91	0	123	5	0	5	113	0
85～89	94	9	0	19	66	0	94	6	0	4	84	0
90歳以上	54	5	0	4	45	0	54	1	0	1	52	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	18	1	67	570	0	656	11	2	50	593	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	2	0	2	23	0	27	1	0	1	25	0
50～54	88	0	0	3	85	0	88	1	0	7	80	0
55～59	115	1	0	8	106	0	115	1	0	6	108	0
60～64	116	3	0	11	102	0	116	0	0	6	110	0
65～69	88	0	1	11	76	0	88	1	1	11	75	0
70～74	59	0	0	8	51	0	59	0	1	5	53	0
75～79	51	2	0	6	43	0	51	3	0	6	42	0
80～84	54	6	0	6	42	0	54	3	0	4	47	0
85～89	44	2	0	11	31	0	44	1	0	4	39	0
90歳以上	12	2	0	1	9	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	30	1	76	621	0	728	14	0	28	686	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	1	19	0	20	0	0	1	19	0
50～54	76	1	0	4	71	0	76	0	0	5	71	0
55～59	126	1	0	8	117	0	126	1	0	9	116	0
60～64	112	1	0	12	99	0	112	0	0	4	108	0
65～69	96	0	0	11	85	0	96	0	0	3	93	0
70～74	71	7	0	8	56	0	71	4	0	1	66	0
75～79	61	6	0	6	49	0	61	1	0	3	57	0
80～84	69	4	1	15	49	0	69	2	0	1	66	0
85～89	50	7	0	8	35	0	50	5	0	0	45	0
90歳以上	42	3	0	3	36	0	42	1	0	1	40	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 2

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 7、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	1378	27	12	11	1326	8	604	604	132	132
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	1	0	6	0	0	0	1	1
45～49	47	1	2	0	44	0	17	17	3	3
50～54	164	4	1	1	157	1	78	78	16	16
55～59	241	4	0	2	235	0	120	120	16	16
60～64	228	7	0	1	218	2	125	125	22	22
65～69	184	3	4	2	175	0	87	87	13	13
70～74	130	3	1	2	123	1	55	55	21	21
75～79	112	3	0	0	106	3	46	46	12	12
80～84	123	1	0	0	121	1	34	34	13	13
85～89	94	1	0	2	91	0	27	27	11	11
90歳以上	54	0	3	1	50	0	15	15	4	4
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	16	3	6	629	2	327	327	69	69
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1
45～49	27	1	1	0	25	0	13	13	1	1
50～54	88	3	0	0	85	0	51	51	14	14
55～59	115	2	0	2	111	0	61	61	12	12
60～64	116	6	0	0	110	0	69	69	12	12
65～69	88	0	1	1	86	0	46	46	6	6
70～74	59	1	0	1	57	0	30	30	8	8
75～79	51	2	0	0	48	1	21	21	6	6
80～84	54	1	0	0	52	1	16	16	5	5
85～89	44	0	0	2	42	0	15	15	4	4
90歳以上	12	0	1	0	11	0	5	5	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	722	11	9	5	697	6	277	277	63	63
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	1	0	4	0	0	0	0	0
45～49	20	0	1	0	19	0	4	4	2	2
50～54	76	1	1	1	72	1	27	27	2	2
55～59	126	2	0	0	124	0	59	59	4	4
60～64	112	1	0	1	108	2	56	56	10	10
65～69	96	3	3	1	89	0	41	41	7	7
70～74	71	2	1	1	66	1	25	25	13	13
75～79	61	1	0	0	58	2	25	25	6	6
80～84	69	0	0	0	69	0	18	18	8	8
85～89	50	1	0	0	49	0	12	12	7	7
90歳以上	42	0	2	1	39	0	10	10	4	4
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 3

自律神経系の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	起立性低血圧						過敏性腸症候群					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	23	7	72	1282	0	1384	38	8	39	1299	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	1	6	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	1	2	43	0	47	0	1	2	44	0
50～54	164	4	0	12	148	0	164	2	0	5	157	0
55～59	241	3	0	17	221	0	241	5	4	3	229	0
60～64	228	3	1	10	214	0	228	6	0	8	214	0
65～69	184	1	3	8	172	0	184	4	0	10	170	0
70～74	130	2	2	5	121	0	130	3	1	5	121	0
75～79	112	3	0	4	105	0	112	6	1	2	103	0
80～84	123	3	0	7	113	0	123	4	1	1	117	0
85～89	94	2	0	2	90	0	94	7	0	2	85	0
90歳以上	54	1	0	4	49	0	54	1	0	1	52	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	8	0	26	622	0	656	16	2	20	618	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	2	25	0	27	0	1	1	25	0
50～54	88	2	0	3	83	0	88	1	0	1	86	0
55～59	115	1	0	3	111	0	115	2	1	1	111	0
60～64	116	1	0	6	109	0	116	3	0	4	109	0
65～69	88	0	0	4	84	0	88	3	0	8	77	0
70～74	59	0	0	2	57	0	59	1	0	3	55	0
75～79	51	1	0	1	49	0	51	1	0	1	49	0
80～84	54	2	0	3	49	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	1	0	0	43	0	44	5	0	0	39	0
90歳以上	12	0	0	2	10	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	15	7	46	660	0	728	22	6	19	681	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	1	1	0	18	0	20	0	0	1	19	0
50～54	76	2	0	9	65	0	76	1	0	4	71	0
55～59	126	2	0	14	110	0	126	3	3	2	118	0
60～64	112	2	1	4	105	0	112	3	0	4	105	0
65～69	96	1	3	4	88	0	96	1	0	2	93	0
70～74	71	2	2	3	64	0	71	2	1	2	66	0
75～79	61	2	0	3	56	0	61	5	1	1	54	0
80～84	69	1	0	4	64	0	69	4	1	0	64	0
85～89	50	1	0	2	47	0	50	2	0	2	46	0
90歳以上	42	1	0	2	39	0	42	1	0	1	40	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 4

自律神経系の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	多汗症						汗が出にくい					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	15	3	31	1335	0	1384	12	0	27	1345	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	1	2	44	0	47	1	0	2	44	0
50～54	164	0	0	4	160	0	164	1	0	5	158	0
55～59	241	3	0	8	230	0	241	2	0	5	234	0
60～64	228	2	1	5	220	0	228	0	0	1	227	0
65～69	184	5	1	5	173	0	184	2	0	8	174	0
70～74	130	2	0	3	125	0	130	3	0	1	126	0
75～79	112	0	0	1	111	0	112	0	0	3	109	0
80～84	123	2	0	1	120	0	123	2	0	1	120	0
85～89	94	1	0	2	91	0	94	1	0	1	92	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	6	1	12	637	0	656	5	0	11	640	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	1	2	24	0	27	1	0	0	26	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	1	0	1	86	0
55～59	115	3	0	2	110	0	115	0	0	3	112	0
60～64	116	1	0	2	113	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	1	0	4	83	0	88	1	0	4	83	0
70～74	59	0	0	0	59	0	59	1	0	0	58	0
75～79	51	0	0	1	50	0	51	0	0	2	49	0
80～84	54	1	0	0	53	0	54	1	0	0	53	0
85～89	44	0	0	1	43	0	44	0	0	1	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	9	2	19	698	0	728	7	0	16	705	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	2	18	0
50～54	76	0	0	4	72	0	76	0	0	4	72	0
55～59	126	0	0	6	120	0	126	2	0	2	122	0
60～64	112	1	1	3	107	0	112	0	0	1	111	0
65～69	96	4	1	1	90	0	96	1	0	4	91	0
70～74	71	2	0	3	66	0	71	2	0	1	68	0
75～79	61	0	0	0	61	0	61	0	0	1	60	0
80～84	69	1	0	1	67	0	69	1	0	1	67	0
85～89	50	1	0	1	48	0	50	1	0	0	49	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 5

自律神経系の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	不眠						不安神経症					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	141	16	91	1136	0	1384	39	5	33	1307	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	0	6	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	3	0	1	43	0	47	2	0	0	45	0
50～54	164	11	1	14	138	0	164	2	0	6	156	0
55～59	241	18	7	17	199	0	241	4	1	7	229	0
60～64	228	16	3	20	189	0	228	8	2	5	213	0
65～69	184	19	3	13	149	0	184	7	1	6	170	0
70～74	130	19	0	5	106	0	130	5	0	3	122	0
75～79	112	15	1	8	88	0	112	3	0	1	108	0
80～84	123	20	1	3	99	0	123	3	0	1	119	0
85～89	94	12	0	8	74	0	94	3	1	2	88	0
90歳以上	54	7	0	2	45	0	54	2	0	2	50	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	40	5	33	578	0	656	14	1	14	627	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	0	0	26	0	27	1	0	0	26	0
50～54	88	2	1	4	81	0	88	0	0	2	86	0
55～59	115	6	1	3	105	0	115	2	0	2	111	0
60～64	116	6	2	11	97	0	116	4	1	2	109	0
65～69	88	6	1	5	76	0	88	4	0	4	80	0
70～74	59	2	0	2	55	0	59	0	0	2	57	0
75～79	51	5	0	6	40	0	51	2	0	0	49	0
80～84	54	7	0	0	47	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	4	0	2	38	0	44	0	0	1	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	1	0	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	101	11	58	558	0	728	25	4	19	680	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	2	0	1	17	0	20	1	0	0	19	0
50～54	76	9	0	10	57	0	76	2	0	4	70	0
55～59	126	12	6	14	94	0	126	2	1	5	118	0
60～64	112	10	1	9	92	0	112	4	1	3	104	0
65～69	96	13	2	8	73	0	96	3	1	2	90	0
70～74	71	17	0	3	51	0	71	5	0	1	65	0
75～79	61	10	1	2	48	0	61	1	0	1	59	0
80～84	69	13	1	3	52	0	69	3	0	0	66	0
85～89	50	8	0	6	36	0	50	3	1	1	45	0
90歳以上	42	7	0	2	33	0	42	1	0	2	39	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 6

自律神経系の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	自律神経失調症						その他					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	51	31	58	1244	0	1377	7	2	8	1360	7
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	3	2	3	39	0	46	0	0	1	45	1
50～54	164	6	6	7	145	0	164	1	0	1	162	0
55～59	241	6	3	11	221	0	241	1	0	0	240	0
60～64	228	8	6	10	204	0	227	2	0	0	225	1
65～69	184	9	4	6	165	0	184	0	1	1	182	0
70～74	130	6	5	8	111	0	130	0	0	3	127	0
75～79	112	3	1	3	105	0	108	1	0	1	106	4
80～84	123	6	2	4	111	0	122	1	0	0	121	1
85～89	94	2	2	5	85	0	94	0	1	1	92	0
90歳以上	54	2	0	1	51	0	54	1	0	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	14	8	14	620	0	655	4	1	4	646	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	1	1	24	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	2	1	0	85	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	3	0	1	111	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	4	3	2	107	0	116	2	0	0	114	0
65～69	88	1	2	3	82	0	88	0	1	1	86	0
70～74	59	0	0	3	56	0	59	0	0	2	57	0
75～79	51	1	1	0	49	0	50	1	0	0	49	1
80～84	54	2	0	1	51	0	54	1	0	0	53	0
85～89	44	0	0	3	41	0	44	0	0	1	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	37	23	44	624	0	722	3	1	4	714	6
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	2	1	2	15	0	19	0	0	1	18	1
50～54	76	4	5	7	60	0	76	1	0	1	74	0
55～59	126	3	3	10	110	0	126	1	0	0	125	0
60～64	112	4	3	8	97	0	111	0	0	0	111	1
65～69	96	8	2	3	83	0	96	0	0	0	96	0
70～74	71	6	5	5	55	0	71	0	0	1	70	0
75～79	61	2	0	3	56	0	58	0	0	1	57	3
80～84	69	4	2	3	60	0	68	0	0	0	68	1
85～89	50	2	2	2	44	0	50	0	1	0	49	0
90歳以上	42	2	0	1	39	0	42	1	0	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 7

自律神経系の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	767	767	155	155
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	3	3	2	2
45～49	26	26	4	4
50～54	98	98	16	16
55～59	148	148	17	17
60～64	134	134	19	19
65～69	103	103	24	24
70～74	60	60	17	17
75～79	55	55	15	15
80～84	59	59	20	20
85～89	49	49	15	15
90歳以上	32	32	6	6
不詳	0	0	0	0
男	396	396	89	89
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	16	16	2	2
50～54	61	61	14	14
55～59	78	78	12	12
60～64	69	69	12	12
65～69	53	53	12	12
70～74	35	35	8	8
75～79	24	24	8	8
80～84	26	26	12	12
85～89	25	25	7	7
90歳以上	9	9	1	1
不詳	0	0	0	0
女	371	371	66	66
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	3	3	1	1
45～49	10	10	2	2
50～54	37	37	2	2
55～59	70	70	5	5
60～64	65	65	7	7
65～69	50	50	12	12
70～74	25	25	9	9
75～79	31	31	7	7
80～84	33	33	8	8
85～89	24	24	8	8
90歳以上	23	23	5	5
不詳	0	0	0	0

別表 7 8

眼の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	眼脂過多（めやにが多い）						瞼板腺（まつげの根元）からチーズ様分泌物					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	79	22	119	1163	1	1384	22	12	29	1320	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	1	2	44	0	47	0	0	1	46	0
50～54	163	3	0	11	149	1	163	0	1	4	158	1
55～59	241	7	6	17	211	0	241	0	2	4	235	0
60～64	228	10	1	28	189	0	228	3	1	4	220	0
65～69	184	8	2	17	157	0	184	2	1	7	174	0
70～74	130	13	4	13	100	0	130	4	4	2	120	0
75～79	112	9	4	11	88	0	112	4	1	3	104	0
80～84	123	16	1	11	95	0	123	5	0	3	115	0
85～89	94	9	2	5	78	0	94	4	2	1	87	0
90歳以上	54	4	1	4	45	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	28	8	63	556	1	656	5	5	14	631	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	1	1	25	0	27	0	0	1	26	0
50～54	87	2	0	6	79	1	87	0	1	1	85	1
55～59	115	2	1	6	106	0	115	0	0	1	114	0
60～64	116	4	0	17	95	0	116	0	0	1	115	0
65～69	88	1	0	11	76	0	88	0	0	6	82	0
70～74	59	6	1	9	43	0	59	0	2	0	57	0
75～79	51	2	1	7	41	0	51	2	1	1	47	0
80～84	54	5	1	4	44	0	54	2	0	2	50	0
85～89	44	5	2	2	35	0	44	1	1	1	41	0
90歳以上	12	1	1	0	10	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	51	14	56	607	0	728	17	7	15	689	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	1	19	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	1	0	5	70	0	76	0	0	3	73	0
55～59	126	5	5	11	105	0	126	0	2	3	121	0
60～64	112	6	1	11	94	0	112	3	1	3	105	0
65～69	96	7	2	6	81	0	96	2	1	1	92	0
70～74	71	7	3	4	57	0	71	4	2	2	63	0
75～79	61	7	3	4	47	0	61	2	0	2	57	0
80～84	69	11	0	7	51	0	69	3	0	1	65	0
85～89	50	4	0	3	43	0	50	3	1	0	46	0
90歳以上	42	3	0	4	35	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 9

眼の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	結膜（白目）の色素沈着						白内障					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	13	4	22	1345	0	1384	152	131	57	1044	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	1	0	46	0
50～54	164	1	1	6	156	0	164	1	2	3	158	0
55～59	241	0	0	6	235	0	241	6	3	4	228	0
60～64	228	2	0	2	224	0	228	7	10	13	198	0
65～69	184	1	0	5	178	0	184	12	12	8	152	0
70～74	130	3	0	0	127	0	130	23	10	5	92	0
75～79	112	1	2	1	108	0	112	31	19	6	56	0
80～84	123	4	0	2	117	0	123	32	32	6	53	0
85～89	94	1	1	0	92	0	94	29	24	7	34	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	11	18	5	20	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	0	1	10	645	0	656	47	60	19	530	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	1	0	26	0
50～54	88	0	0	2	86	0	88	1	1	0	86	0
55～59	115	0	0	2	113	0	115	3	2	1	109	0
60～64	116	0	0	1	115	0	116	3	3	5	105	0
65～69	88	0	0	2	86	0	88	2	7	3	76	0
70～74	59	0	0	0	59	0	59	7	5	3	44	0
75～79	51	0	1	1	49	0	51	12	8	3	28	0
80～84	54	0	0	2	52	0	54	6	14	3	31	0
85～89	44	0	0	0	44	0	44	11	14	1	18	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	2	5	0	5	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	13	3	12	700	0	728	105	71	38	514	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	1	1	4	70	0	76	0	1	3	72	0
55～59	126	0	0	4	122	0	126	3	1	3	119	0
60～64	112	2	0	1	109	0	112	4	7	8	93	0
65～69	96	1	0	3	92	0	96	10	5	5	76	0
70～74	71	3	0	0	68	0	71	16	5	2	48	0
75～79	61	1	1	0	59	0	61	19	11	3	28	0
80～84	69	4	0	0	65	0	69	26	18	3	22	0
85～89	50	1	1	0	48	0	50	18	10	6	16	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	9	13	5	15	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 0

眼の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	緑内障						近視					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	72	4	14	1294	0	1384	60	20	242	1060	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	1	0	1	5	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	3	1	10	33	0
50～54	164	0	0	2	162	0	163	6	4	39	114	1
55～59	241	4	0	2	235	0	240	13	5	76	146	1
60～64	228	7	1	0	220	0	228	10	3	54	161	0
65～69	184	7	0	2	175	0	184	9	2	27	146	0
70～74	130	9	0	1	120	0	130	8	2	11	109	0
75～79	112	4	2	3	103	0	112	2	1	9	100	0
80～84	123	17	1	1	104	0	123	4	1	9	109	0
85～89	94	11	0	3	80	0	94	3	1	5	85	0
90歳以上	54	13	0	0	41	0	54	1	0	1	52	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	34	2	7	613	0	656	29	7	122	497	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	2	0	7	18	0
50～54	88	0	0	0	88	0	87	3	0	17	67	1
55～59	115	3	0	0	112	0	115	7	2	37	69	0
60～64	116	5	1	0	110	0	116	4	1	31	80	0
65～69	88	4	0	2	82	0	88	4	1	13	70	0
70～74	59	3	0	1	55	0	59	1	0	3	55	0
75～79	51	2	1	2	46	0	51	0	1	4	46	0
80～84	54	10	0	1	43	0	54	3	1	7	43	0
85～89	44	5	0	1	38	0	44	3	1	3	37	0
90歳以上	12	2	0	0	10	0	12	1	0	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	38	2	7	681	0	728	31	13	120	563	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	1	4	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	1	1	3	15	0
50～54	76	0	0	2	74	0	76	3	4	22	47	0
55～59	126	1	0	2	123	0	125	6	3	39	77	1
60～64	112	2	0	0	110	0	112	6	2	23	81	0
65～69	96	3	0	0	93	0	96	5	1	14	76	0
70～74	71	6	0	0	65	0	71	7	2	8	54	0
75～79	61	2	1	1	57	0	61	2	0	5	54	0
80～84	69	7	1	0	61	0	69	1	0	2	66	0
85～89	50	6	0	2	42	0	50	0	0	2	48	0
90歳以上	42	11	0	0	31	0	42	0	0	1	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 1

眼の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	遠視						乱視					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	39	7	138	1199	1	1384	71	15	230	1066	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	1	0	3	3	0
45～49	47	0	0	6	41	0	47	1	1	11	34	0
50～54	163	3	1	17	142	1	163	9	3	38	113	1
55～59	241	5	2	29	205	0	240	8	2	55	175	1
60～64	228	4	1	27	196	0	228	9	3	47	169	0
65～69	184	4	2	21	157	0	184	13	1	34	136	0
70～74	130	7	0	8	115	0	130	8	3	16	103	0
75～79	112	5	0	12	95	0	112	4	0	9	99	0
80～84	123	7	1	5	110	0	123	9	2	6	106	0
85～89	94	4	0	10	80	0	94	8	0	10	76	0
90歳以上	54	0	0	3	51	0	54	1	0	1	52	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	11	2	68	574	1	656	27	4	122	502	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
45～49	27	0	0	4	23	0	27	1	0	8	18	0
50～54	87	1	0	8	78	1	87	5	1	19	62	1
55～59	115	1	0	13	101	0	115	4	0	31	80	0
60～64	116	1	1	15	99	0	116	5	1	22	88	0
65～69	88	0	0	13	75	0	88	2	0	19	67	0
70～74	59	1	0	3	55	0	59	1	0	9	49	0
75～79	51	3	0	6	42	0	51	1	0	5	45	0
80～84	54	3	1	1	49	0	54	4	2	4	44	0
85～89	44	1	0	5	38	0	44	3	0	5	36	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	28	5	70	625	0	728	44	11	108	564	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	3	2	0
45～49	20	0	0	2	18	0	20	0	1	3	16	0
50～54	76	2	1	9	64	0	76	4	2	19	51	0
55～59	126	4	2	16	104	0	125	4	2	24	95	1
60～64	112	3	0	12	97	0	112	4	2	25	81	0
65～69	96	4	2	8	82	0	96	11	1	15	69	0
70～74	71	6	0	5	60	0	71	7	3	7	54	0
75～79	61	2	0	6	53	0	61	3	0	4	54	0
80～84	69	4	0	4	61	0	69	5	0	2	62	0
85～89	50	3	0	5	42	0	50	5	0	5	40	0
90歳以上	42	0	0	3	39	0	42	1	0	1	40	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 2

眼の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	弱視						その他					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	7	1	15	1361	0	1384	68	17	39	1236	24
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	1	46	0	47	3	0	2	42	0
50～54	164	1	0	2	161	0	162	6	1	5	150	2
55～59	241	1	0	2	238	0	236	7	4	8	217	5
60～64	228	1	0	0	227	0	227	16	6	6	199	1
65～69	184	0	0	4	180	0	178	12	1	7	158	6
70～74	130	2	0	0	128	0	126	7	2	5	112	4
75～79	112	0	0	0	112	0	111	4	0	1	106	1
80～84	123	2	1	4	116	0	122	9	0	3	110	1
85～89	94	0	0	2	92	0	91	1	2	1	87	3
90歳以上	54	0	0	0	54	0	53	3	1	1	48	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	1	1	6	648	0	656	24	7	17	594	14
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	1	26	0	27	1	0	1	25	0
50～54	88	0	0	0	88	0	87	3	0	2	82	1
55～59	115	0	0	0	115	0	112	1	1	2	108	3
60～64	116	0	0	0	116	0	115	5	3	5	102	1
65～69	88	0	0	2	86	0	85	4	0	4	77	3
70～74	59	0	0	0	59	0	58	4	1	1	52	1
75～79	51	0	0	0	51	0	51	1	0	0	50	0
80～84	54	1	1	2	50	0	53	4	0	1	48	1
85～89	44	0	0	1	43	0	41	1	2	1	37	3
90歳以上	12	0	0	0	12	0	11	0	0	0	11	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	6	0	9	713	0	728	44	10	22	642	10
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	2	0	1	17	0
50～54	76	1	0	2	73	0	75	3	1	3	68	1
55～59	126	1	0	2	123	0	124	6	3	6	109	2
60～64	112	1	0	0	111	0	112	11	3	1	97	0
65～69	96	0	0	2	94	0	93	8	1	3	81	3
70～74	71	2	0	0	69	0	68	3	1	4	60	3
75～79	61	0	0	0	61	0	60	3	0	1	56	1
80～84	69	1	0	2	66	0	69	5	0	2	62	0
85～89	50	0	0	1	49	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	3	1	1	37	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 3

眼の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	425	425	77	77
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	1	1	2	2
45～49	17	17	5	5
50～54	67	67	12	12
55～59	89	89	10	10
60～64	83	83	8	8
65～69	64	64	13	13
70～74	31	31	11	11
75～79	22	22	3	3
80～84	22	22	6	6
85～89	18	18	6	6
90歳以上	11	11	1	1
不詳	0	0	0	0
男	223	223	43	43
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	11	11	2	2
50～54	40	40	9	9
55～59	43	43	8	8
60～64	42	42	5	5
65～69	37	37	6	6
70～74	15	15	4	4
75～79	10	10	2	2
80～84	13	13	3	3
85～89	9	9	3	3
90歳以上	3	3	0	0
不詳	0	0	0	0
女	202	202	34	34
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	1	1	1	1
45～49	6	6	3	3
50～54	27	27	3	3
55～59	46	46	2	2
60～64	41	41	3	3
65～69	27	27	7	7
70～74	16	16	7	7
75～79	12	12	1	1
80～84	9	9	3	3
85～89	9	9	3	3
90歳以上	8	8	1	1
不詳	0	0	0	0

別表 8 4

口の中の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	歯肉の色素沈着（歯茎が黒い）						歯牙形成不全（子どもの時に歯が生えなかった）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	21	9	89	1265	0	1384	1	2	14	1367	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	1	5	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	5	42	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	2	0	12	150	0	164	0	1	4	159	0
55～59	241	2	1	25	213	0	241	1	1	5	234	0
60～64	228	3	0	14	211	0	228	0	0	1	227	0
65～69	184	3	0	13	168	0	184	0	0	2	182	0
70～74	130	0	3	7	120	0	130	0	0	0	130	0
75～79	112	5	0	3	104	0	112	0	0	1	111	0
80～84	123	2	2	5	114	0	123	0	0	1	122	0
85～89	94	3	3	4	84	0	94	0	0	0	94	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	9	3	31	613	0	656	0	0	5	651	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	3	24	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	3	85	0	88	0	0	1	87	0
55～59	115	0	1	9	105	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	1	0	4	111	0	116	0	0	1	115	0
65～69	88	2	0	6	80	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	0	0	1	58	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	1	0	1	49	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	2	0	2	50	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	2	2	2	38	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	12	6	58	652	0	728	1	2	9	716	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	2	18	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	2	0	9	65	0	76	0	1	3	72	0
55～59	126	2	0	16	108	0	126	1	1	5	119	0
60～64	112	2	0	10	100	0	112	0	0	0	112	0
65～69	96	1	0	7	88	0	96	0	0	0	96	0
70～74	71	0	3	6	62	0	71	0	0	0	71	0
75～79	61	4	0	2	55	0	61	0	0	1	60	0
80～84	69	0	2	3	64	0	69	0	0	0	69	0
85～89	50	1	1	2	46	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 5

口の中の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	歯周病（歯槽膿漏）						歯肉炎（歯ぐきの病気）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	203	91	130	960	0	1384	92	41	68	1183	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	2	0	0	5	0	7	2	0	0	5	0
45～49	47	10	2	4	31	0	47	0	2	2	43	0
50～54	164	10	6	23	125	0	164	6	4	11	143	0
55～59	241	36	18	25	162	0	241	7	14	15	205	0
60～64	228	41	16	24	147	0	228	19	7	6	196	0
65～69	184	21	17	20	126	0	184	12	7	14	151	0
70～74	130	21	8	9	92	0	130	11	1	4	114	0
75～79	112	26	8	7	71	0	112	14	2	3	93	0
80～84	123	22	9	8	84	0	123	11	3	4	105	0
85～89	94	8	6	9	71	0	94	7	0	9	78	0
90歳以上	54	6	1	1	46	0	54	3	1	0	50	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	80	45	70	461	0	656	34	13	27	582	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0
45～49	27	4	2	4	17	0	27	0	1	2	24	0
50～54	88	2	4	9	73	0	88	3	2	3	80	0
55～59	115	14	10	11	80	0	115	3	4	2	106	0
60～64	116	17	10	14	75	0	116	5	4	3	104	0
65～69	88	9	8	13	58	0	88	7	2	7	72	0
70～74	59	10	4	5	40	0	59	4	0	2	53	0
75～79	51	8	2	2	39	0	51	4	0	0	47	0
80～84	54	13	1	7	33	0	54	3	0	3	48	0
85～89	44	2	3	5	34	0	44	4	0	5	35	0
90歳以上	12	0	1	0	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	123	46	60	499	0	728	58	28	41	601	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	0	4	0	5	1	0	0	4	0
45～49	20	6	0	0	14	0	20	0	1	0	19	0
50～54	76	8	2	14	52	0	76	3	2	8	63	0
55～59	126	22	8	14	82	0	126	4	10	13	99	0
60～64	112	24	6	10	72	0	112	14	3	3	92	0
65～69	96	12	9	7	68	0	96	5	5	7	79	0
70～74	71	11	4	4	52	0	71	7	1	2	61	0
75～79	61	18	6	5	32	0	61	10	2	3	46	0
80～84	69	9	8	1	51	0	69	8	3	1	57	0
85～89	50	6	3	4	37	0	50	3	0	4	43	0
90歳以上	42	6	0	1	35	0	42	3	1	0	38	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 6

口の中の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	顎関節症（あごの関節の異常）						味覚異常					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	16	27	34	1307	0	1384	15	6	25	1338	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	1	5	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	1	2	44	0	47	0	0	1	46	0
50～54	164	1	7	6	150	0	164	3	1	3	157	0
55～59	241	5	4	11	221	0	241	1	2	2	236	0
60～64	228	1	5	7	215	0	228	2	1	2	223	0
65～69	184	2	3	3	176	0	184	0	2	5	177	0
70～74	130	2	2	1	125	0	130	4	0	3	123	0
75～79	112	1	0	1	110	0	112	1	0	2	109	0
80～84	123	3	4	1	115	0	123	1	0	3	119	0
85～89	94	0	0	1	93	0	94	2	0	3	89	0
90歳以上	54	0	1	0	53	0	54	1	0	1	52	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	1	6	12	637	0	656	5	1	9	641	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	1	0	26	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	1	3	84	0	88	1	0	0	87	0
55～59	115	1	0	3	111	0	115	1	1	1	112	0
60～64	116	0	1	3	112	0	116	1	0	0	115	0
65～69	88	0	1	2	85	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	0	1	0	58	0	59	1	0	2	56	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	0	1	1	52	0	54	1	0	3	50	0
85～89	44	0	0	0	44	0	44	0	0	1	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	15	21	22	670	0	728	10	5	16	697	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	1	3	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	2	18	0	20	0	0	1	19	0
50～54	76	1	6	3	66	0	76	2	1	3	70	0
55～59	126	4	4	8	110	0	126	0	1	1	124	0
60～64	112	1	4	4	103	0	112	1	1	2	108	0
65～69	96	2	2	1	91	0	96	0	2	3	91	0
70～74	71	2	1	1	67	0	71	3	0	1	67	0
75～79	61	1	0	1	59	0	61	1	0	2	58	0
80～84	69	3	3	0	63	0	69	0	0	0	69	0
85～89	50	0	0	1	49	0	50	2	0	2	46	0
90歳以上	42	0	1	0	41	0	42	1	0	1	40	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 7

口の中の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	口内炎になりやすい						虫歯になりやすい					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	95	44	173	1072	0	1384	143	107	111	1023	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	1	6	0	7	2	0	0	5	0
45～49	47	0	2	6	39	0	47	3	6	8	30	0
50～54	164	7	4	27	126	0	164	14	19	18	113	0
55～59	241	9	9	34	189	0	241	31	29	23	158	0
60～64	228	14	4	31	179	0	228	20	20	21	167	0
65～69	184	8	8	21	147	0	184	27	22	15	120	0
70～74	130	15	7	18	90	0	130	11	4	11	104	0
75～79	112	17	3	13	79	0	112	12	1	8	91	0
80～84	123	14	3	9	97	0	123	13	2	6	102	0
85～89	94	7	3	11	73	0	94	6	4	1	83	0
90歳以上	54	4	1	2	47	0	54	4	0	0	50	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	29	19	75	533	0	656	60	46	58	492	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
45～49	27	0	2	3	22	0	27	2	1	4	20	0
50～54	88	5	1	13	69	0	88	8	11	8	61	0
55～59	115	2	3	15	95	0	115	13	9	10	83	0
60～64	116	6	2	17	91	0	116	8	13	13	82	0
65～69	88	3	3	9	73	0	88	12	6	8	62	0
70～74	59	2	3	7	47	0	59	5	3	9	42	0
75～79	51	4	1	5	41	0	51	5	1	2	43	0
80～84	54	4	1	1	48	0	54	4	0	3	47	0
85～89	44	3	3	3	35	0	44	1	2	1	40	0
90歳以上	12	0	0	2	10	0	12	1	0	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	66	25	98	539	0	728	83	61	53	531	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	5	1	0	0	4	0
45～49	20	0	0	3	17	0	20	1	5	4	10	0
50～54	76	2	3	14	57	0	76	6	8	10	52	0
55～59	126	7	6	19	94	0	126	18	20	13	75	0
60～64	112	8	2	14	88	0	112	12	7	8	85	0
65～69	96	5	5	12	74	0	96	15	16	7	58	0
70～74	71	13	4	11	43	0	71	6	1	2	62	0
75～79	61	13	2	8	38	0	61	7	0	6	48	0
80～84	69	10	2	8	49	0	69	9	2	3	55	0
85～89	50	4	0	8	38	0	50	5	2	0	43	0
90歳以上	42	4	1	0	37	0	42	3	0	0	39	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 8

口の中の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	歯の知覚過敏（歯がしみる）						永久歯（全歯）を早期に失った					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	81	38	125	1139	1	1384	47	43	50	1244	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	1	5	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	2	1	5	39	0	47	2	1	2	42	0
50～54	163	6	5	19	133	1	164	2	1	3	158	0
55～59	241	15	10	33	183	0	241	3	5	8	225	0
60～64	228	15	10	21	182	0	228	4	6	7	211	0
65～69	184	9	6	19	150	0	184	8	7	5	164	0
70～74	130	11	1	10	108	0	130	4	4	5	117	0
75～79	112	12	0	5	95	0	112	4	4	4	100	0
80～84	123	7	3	8	105	0	123	10	6	5	102	0
85～89	94	2	2	4	86	0	94	6	5	7	76	0
90歳以上	54	1	0	0	53	0	54	4	4	4	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	27	13	54	561	1	656	20	17	29	590	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	1	3	22	0	27	2	1	1	23	0
50～54	87	2	1	6	78	1	88	1	1	2	84	0
55～59	115	6	1	12	96	0	115	1	3	6	105	0
60～64	116	5	5	12	94	0	116	2	4	5	105	0
65～69	88	4	3	8	73	0	88	6	2	3	77	0
70～74	59	2	0	6	51	0	59	1	1	4	53	0
75～79	51	3	0	2	46	0	51	1	2	2	46	0
80～84	54	2	1	3	48	0	54	3	1	2	48	0
85～89	44	1	1	2	40	0	44	3	1	3	37	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	1	1	10	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	54	25	71	578	0	728	27	26	21	654	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	1	0	2	17	0	20	0	0	1	19	0
50～54	76	4	4	13	55	0	76	1	0	1	74	0
55～59	126	9	9	21	87	0	126	2	2	2	120	0
60～64	112	10	5	9	88	0	112	2	2	2	106	0
65～69	96	5	3	11	77	0	96	2	5	2	87	0
70～74	71	9	1	4	57	0	71	3	3	1	64	0
75～79	61	9	0	3	49	0	61	3	2	2	54	0
80～84	69	5	2	5	57	0	69	7	5	3	54	0
85～89	50	1	1	2	46	0	50	3	4	4	39	0
90歳以上	42	1	0	0	41	0	42	4	3	3	32	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 9

口の中の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	1380	15	9	16	1333	11	374	374	86	86
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	1	1	1	1
45～49	47	1	0	0	46	0	11	11	3	3
50～54	164	1	1	2	160	0	51	51	13	13
55～59	241	1	2	2	235	1	49	49	11	11
60～64	228	2	2	1	222	1	64	64	9	9
65～69	184	0	0	2	182	0	51	51	8	8
70～74	130	1	1	2	126	0	32	32	12	12
75～79	112	1	2	1	107	1	32	32	7	7
80～84	123	1	0	3	117	2	37	37	10	10
85～89	94	2	0	2	86	4	29	29	10	10
90歳以上	54	5	1	1	45	2	17	17	2	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	5	5	8	631	7	207	207	47	47
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1
45～49	27	1	0	0	26	0	9	9	1	1
50～54	88	1	1	1	85	0	30	30	8	8
55～59	115	0	2	1	111	1	30	30	8	8
60～64	116	0	1	1	114	0	36	36	6	6
65～69	88	0	0	1	87	0	29	29	4	4
70～74	59	0	0	0	59	0	20	20	4	4
75～79	51	0	1	1	49	0	18	18	6	6
80～84	54	1	0	1	50	2	14	14	5	5
85～89	44	1	0	2	38	3	16	16	4	4
90歳以上	12	1	0	0	10	1	5	5	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	724	10	4	8	702	4	167	167	39	39
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	1	1	0	0
45～49	20	0	0	0	20	0	2	2	2	2
50～54	76	0	0	1	75	0	21	21	5	5
55～59	126	1	0	1	124	0	19	19	3	3
60～64	112	2	1	0	108	1	28	28	3	3
65～69	96	0	0	1	95	0	22	22	4	4
70～74	71	1	1	2	67	0	12	12	8	8
75～79	61	1	1	0	58	1	14	14	1	1
80～84	69	0	0	2	67	0	23	23	5	5
85～89	50	1	0	0	48	1	13	13	6	6
90歳以上	42	4	1	1	35	1	12	12	2	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 0

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	メニエール病						めまい					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	47	54	38	1245	0	1384	91	44	134	1115	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	1	0	6	0	7	0	0	1	6	0
45～49	47	1	1	1	44	0	47	2	2	3	40	0
50～54	164	5	4	2	153	0	164	7	4	17	136	0
55～59	241	3	5	10	223	0	241	10	13	31	187	0
60～64	228	4	7	5	212	0	228	10	7	22	189	0
65～69	184	5	9	4	166	0	184	13	5	18	148	0
70～74	130	7	9	5	109	0	130	11	2	14	103	0
75～79	112	5	4	4	99	0	112	8	6	7	91	0
80～84	123	9	5	5	104	0	123	14	2	11	96	0
85～89	94	6	7	0	81	0	94	9	3	7	75	0
90歳以上	54	2	2	2	48	0	54	7	0	3	44	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	16	15	19	606	0	656	28	7	54	567	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	1	1	24	0	27	1	0	2	24	0
50～54	88	0	0	1	87	0	88	2	1	5	80	0
55～59	115	1	0	3	111	0	115	3	0	8	104	0
60～64	116	2	2	2	110	0	116	4	3	9	100	0
65～69	88	2	3	3	80	0	88	3	0	9	76	0
70～74	59	2	2	4	51	0	59	3	0	9	47	0
75～79	51	1	2	2	46	0	51	2	3	4	42	0
80～84	54	3	1	3	47	0	54	5	0	4	45	0
85～89	44	4	4	0	36	0	44	4	0	3	37	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	1	0	1	10	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	31	39	19	639	0	728	63	37	80	548	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	1	0	4	0	5	0	0	1	4	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	1	2	1	16	0
50～54	76	5	4	1	66	0	76	5	3	12	56	0
55～59	126	2	5	7	112	0	126	7	13	23	83	0
60～64	112	2	5	3	102	0	112	6	4	13	89	0
65～69	96	3	6	1	86	0	96	10	5	9	72	0
70～74	71	5	7	1	58	0	71	8	2	5	56	0
75～79	61	4	2	2	53	0	61	6	3	3	49	0
80～84	69	6	4	2	57	0	69	9	2	7	51	0
85～89	50	2	3	0	45	0	50	5	3	4	38	0
90歳以上	42	2	2	2	36	0	42	6	0	2	34	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 1

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	中耳炎						真珠腫性中耳炎					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	18	101	29	1236	0	1384	5	12	13	1354	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	5	1	40	0	47	0	1	0	46	0
50～54	164	1	20	5	138	0	164	1	2	1	160	0
55～59	241	1	28	6	206	0	241	1	3	1	236	0
60～64	228	3	19	3	203	0	228	1	0	3	224	0
65～69	184	2	11	6	165	0	184	1	1	4	178	0
70～74	130	1	5	0	124	0	130	1	0	0	129	0
75～79	112	0	3	3	106	0	112	0	0	1	111	0
80～84	123	5	6	4	108	0	123	0	3	3	117	0
85～89	94	3	4	1	86	0	94	0	2	0	92	0
90歳以上	54	1	0	0	53	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	8	38	17	593	0	656	1	7	6	642	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	3	0	23	0	27	0	1	0	26	0
50～54	88	1	9	3	75	0	88	1	1	0	86	0
55～59	115	0	10	4	101	0	115	0	3	0	112	0
60～64	116	2	8	1	105	0	116	0	0	2	114	0
65～69	88	1	2	4	81	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	0	2	0	57	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	0	0	2	49	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	1	2	2	49	0	54	0	1	2	51	0
85～89	44	2	2	1	39	0	44	0	1	0	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	10	63	12	643	0	728	4	5	7	712	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	2	1	17	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	11	2	63	0	76	0	1	1	74	0
55～59	126	1	18	2	105	0	126	1	0	1	124	0
60～64	112	1	11	2	98	0	112	1	0	1	110	0
65～69	96	1	9	2	84	0	96	1	1	2	92	0
70～74	71	1	3	0	67	0	71	1	0	0	70	0
75～79	61	0	3	1	57	0	61	0	0	1	60	0
80～84	69	4	4	2	59	0	69	0	2	1	66	0
85～89	50	1	2	0	47	0	50	0	1	0	49	0
90歳以上	42	1	0	0	41	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 2

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	鼻炎を起こしやすい						難聴					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	89	24	133	1138	0	1384	47	17	144	1176	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	0	6	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	2	2	42	0	47	1	1	1	44	0
50～54	164	7	4	22	131	0	164	3	4	14	143	0
55～59	241	16	5	31	189	0	241	3	4	16	218	0
60～64	228	11	3	29	185	0	228	7	1	26	194	0
65～69	184	12	5	17	150	0	184	7	1	19	157	0
70～74	130	17	2	8	103	0	130	7	1	14	108	0
75～79	112	7	1	5	99	0	112	3	3	8	98	0
80～84	123	9	1	12	101	0	123	9	1	21	92	0
85～89	94	6	1	6	81	0	94	4	0	17	73	0
90歳以上	54	2	0	1	51	0	54	3	1	8	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	32	6	64	554	0	656	24	4	81	547	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	1	1	25	0	27	1	0	1	25	0
50～54	88	2	1	10	75	0	88	2	1	5	80	0
55～59	115	5	1	11	98	0	115	3	2	12	98	0
60～64	116	3	1	15	97	0	116	4	1	16	95	0
65～69	88	6	1	13	68	0	88	5	0	10	73	0
70～74	59	6	0	3	50	0	59	4	0	9	46	0
75～79	51	3	1	1	46	0	51	0	0	3	48	0
80～84	54	4	0	6	44	0	54	3	0	11	40	0
85～89	44	3	0	4	37	0	44	2	0	9	33	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	5	7	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	57	18	69	584	0	728	23	13	63	629	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	0	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	1	1	1	17	0	20	0	1	0	19	0
50～54	76	5	3	12	56	0	76	1	3	9	63	0
55～59	126	11	4	20	91	0	126	0	2	4	120	0
60～64	112	8	2	14	88	0	112	3	0	10	99	0
65～69	96	6	4	4	82	0	96	2	1	9	84	0
70～74	71	11	2	5	53	0	71	3	1	5	62	0
75～79	61	4	0	4	53	0	61	3	3	5	50	0
80～84	69	5	1	6	57	0	69	6	1	10	52	0
85～89	50	3	1	2	44	0	50	2	0	8	40	0
90歳以上	42	2	0	1	39	0	42	3	1	3	35	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 3

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	蓄膿症						鼻血がよく出る					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	25	71	45	1243	0	1384	17	8	71	1288	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	0	6	0	7	0	0	1	6	0
45～49	47	1	2	1	43	0	47	0	0	3	44	0
50～54	164	3	8	5	148	0	164	2	3	6	153	0
55～59	241	2	17	9	213	0	241	3	3	14	221	0
60～64	228	2	19	8	199	0	228	2	0	13	213	0
65～69	184	3	8	10	163	0	184	1	0	9	174	0
70～74	130	4	2	4	120	0	130	3	0	8	119	0
75～79	112	1	4	2	105	0	112	1	1	7	103	0
80～84	123	4	6	4	109	0	123	3	1	6	113	0
85～89	94	2	4	1	87	0	94	2	0	4	88	0
90歳以上	54	2	1	1	50	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	10	23	25	598	0	656	5	2	39	610	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
45～49	27	1	2	1	23	0	27	0	0	2	25	0
50～54	88	0	4	4	80	0	88	0	1	3	84	0
55～59	115	1	6	5	103	0	115	2	1	7	105	0
60～64	116	2	5	6	103	0	116	0	0	5	111	0
65～69	88	1	3	5	79	0	88	1	0	4	83	0
70～74	59	2	0	0	57	0	59	0	0	6	53	0
75～79	51	0	2	0	49	0	51	0	0	3	48	0
80～84	54	2	1	3	48	0	54	1	0	5	48	0
85～89	44	1	0	1	42	0	44	1	0	3	40	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	15	48	20	645	0	728	12	6	32	678	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	0	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	1	19	0
50～54	76	3	4	1	68	0	76	2	2	3	69	0
55～59	126	1	11	4	110	0	126	1	2	7	116	0
60～64	112	0	14	2	96	0	112	2	0	8	102	0
65～69	96	2	5	5	84	0	96	0	0	5	91	0
70～74	71	2	2	4	63	0	71	3	0	2	66	0
75～79	61	1	2	2	56	0	61	1	1	4	55	0
80～84	69	2	5	1	61	0	69	2	1	1	65	0
85～89	50	1	4	0	45	0	50	1	0	1	48	0
90歳以上	42	2	1	1	38	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 4

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	鼻血が止まりにくい						その他					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	3	9	20	1352	0	1391	14	7	34	1327	9
30～34歳	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	1	1	45	0	46	0	2	2	42	1
50～54	164	0	0	3	161	0	164	1	0	6	157	0
55～59	241	2	1	3	235	0	241	4	1	3	233	0
60～64	228	0	0	1	227	0	225	0	1	3	221	3
65～69	184	0	1	2	181	0	183	3	1	7	172	1
70～74	130	0	2	1	127	0	129	1	1	5	122	1
75～79	112	0	1	4	107	0	112	3	1	4	104	0
80～84	123	1	2	3	117	0	122	0	0	3	119	1
85～89	94	0	1	2	91	0	93	2	0	1	90	1
90歳以上	54	0	0	0	54	0	53	0	0	0	53	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	1	2	11	642	0	658	7	2	17	628	4
30～34歳	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	1	1	25	0	27	0	1	1	25	0
50～54	88	0	0	1	87	0	88	0	0	3	85	0
55～59	115	1	0	2	112	0	115	1	0	2	112	0
60～64	116	0	0	0	116	0	115	0	0	2	113	1
65～69	88	0	1	2	85	0	87	2	0	4	81	1
70～74	59	0	0	0	59	0	59	1	1	1	56	0
75～79	51	0	0	2	49	0	51	2	0	2	47	0
80～84	54	0	0	2	52	0	53	0	0	1	52	1
85～89	44	0	0	1	43	0	43	1	0	1	41	1
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	2	7	9	710	0	733	7	5	17	699	5
30～34歳	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	19	0	1	1	17	1
50～54	76	0	0	2	74	0	76	1	0	3	72	0
55～59	126	1	1	1	123	0	126	3	1	1	121	0
60～64	112	0	0	1	111	0	110	0	1	1	108	2
65～69	96	0	0	0	96	0	96	1	1	3	91	0
70～74	71	0	2	1	68	0	70	0	0	4	66	1
75～79	61	0	1	2	58	0	61	1	1	2	57	0
80～84	69	1	2	1	65	0	69	0	0	2	67	0
85～89	50	0	1	1	48	0	50	1	0	0	49	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	41	0	0	0	41	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 5

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	538	538	94	94
30～34歳	3	3	0	0
35～39	15	15	0	0
40～44	67	67	0	0
45～49	86	86	2	2
50～54	92	92	11	11
55～59	74	74	15	15
60～64	43	43	11	11
65～69	48	48	10	10
70～74	46	46	13	13
75～79	34	34	11	11
80～84	30	30	9	9
85～89	0	0	10	10
90歳以上	0	0	2	2
不詳	0	0	0	0
男	282	282	52	52
30～34歳	1	1	0	0
35～39	8	8	0	0
40～44	43	43	0	0
45～49	48	48	1	1
50～54	51	51	9	9
55～59	39	39	11	11
60～64	26	26	5	5
65～69	21	21	5	5
70～74	24	24	5	5
75～79	15	15	6	6
80～84	6	6	6	6
85～89	0	0	3	3
90歳以上	0	0	1	1
不詳	0	0	0	0
女	256	256	42	42
30～34歳	2	2	0	0
35～39	7	7	0	0
40～44	24	24	0	0
45～49	38	38	1	1
50～54	41	41	2	2
55～59	35	35	4	4
60～64	17	17	6	6
65～69	27	27	5	5
70～74	22	22	8	8
75～79	19	19	5	5
80～84	24	24	3	3
85～89	0	0	7	7
90歳以上	0	0	1	1
不詳	0	0	0	0

別表 9 6

甲状腺の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	甲状腺腫						慢性甲状腺炎					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	13	12	9	1350	0	1384	2	0	8	1374	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	1	0	46	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	1	2	1	160	0	164	0	0	1	163	0
55～59	241	1	0	2	238	0	241	0	0	1	240	0
60～64	228	1	2	1	224	0	228	0	0	2	226	0
65～69	184	0	0	3	181	0	184	0	0	2	182	0
70～74	130	1	4	0	125	0	130	1	0	0	129	0
75～79	112	3	1	1	107	0	112	1	0	1	110	0
80～84	123	5	0	1	117	0	123	0	0	1	122	0
85～89	94	1	1	0	92	0	94	0	0	0	94	0
90歳以上	54	0	1	0	53	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	1	3	3	649	0	656	1	0	3	652	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	1	0	87	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	0	0	2	86	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	0	1	0	58	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	1	0	0	50	0
80～84	54	1	0	1	52	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	0	1	0	43	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	12	9	6	701	0	728	1	0	5	722	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	1	0	19	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	1	1	1	73	0	76	0	0	1	75	0
55～59	126	1	0	2	123	0	126	0	0	1	125	0
60～64	112	1	2	1	108	0	112	0	0	2	110	0
65～69	96	0	0	1	95	0	96	0	0	0	96	0
70～74	71	1	3	0	67	0	71	1	0	0	70	0
75～79	61	3	1	1	56	0	61	0	0	1	60	0
80～84	69	4	0	0	65	0	69	0	0	0	69	0
85～89	50	1	0	0	49	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	0	1	0	41	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 7

甲状腺の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	バセドウ病						甲状腺機能低下					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	4	9	7	1364	0	1384	35	7	12	1330	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	1	0	46	0
50～54	164	1	0	2	161	0	164	2	2	1	159	0
55～59	241	1	2	1	237	0	241	1	0	1	239	0
60～64	228	2	1	0	225	0	228	5	0	2	221	0
65～69	184	0	4	2	178	0	184	7	1	2	174	0
70～74	130	0	1	0	129	0	130	3	1	2	124	0
75～79	112	0	1	1	110	0	112	7	0	1	104	0
80～84	123	0	0	1	122	0	123	5	1	1	116	0
85～89	94	0	0	0	94	0	94	4	1	2	87	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	1	0	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	1	2	3	650	0	656	2	1	6	647	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	0	0	1	87	0
55～59	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	1	1	0	114	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	0	1	2	85	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	0	0	0	59	0	59	0	0	1	58	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	0	0	1	53	0	54	1	1	1	51	0
85～89	44	0	0	0	44	0	44	1	0	1	42	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	3	7	4	714	0	728	33	6	6	683	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	1	0	19	0
50～54	76	1	0	2	73	0	76	2	2	0	72	0
55～59	126	1	2	1	122	0	126	1	0	1	124	0
60～64	112	1	0	0	111	0	112	5	0	2	105	0
65～69	96	0	3	0	93	0	96	7	1	0	88	0
70～74	71	0	1	0	70	0	71	3	1	1	66	0
75～79	61	0	1	1	59	0	61	7	0	1	53	0
80～84	69	0	0	0	69	0	69	4	0	0	65	0
85～89	50	0	0	0	50	0	50	3	1	1	45	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	1	0	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 8

甲状腺の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	1380	2	1	10	1367	4	1080	1080	204	204
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	5	5	2	2
45～49	47	0	0	0	47	0	42	42	4	4
50～54	164	1	0	2	160	1	131	131	22	22
55～59	241	0	0	1	240	0	205	205	29	29
60～64	228	0	0	0	228	0	184	184	28	28
65～69	184	0	0	1	183	0	144	144	26	26
70～74	130	0	0	2	128	0	90	90	26	26
75～79	112	0	0	1	109	2	83	83	17	17
80～84	123	1	1	1	119	1	84	84	24	24
85～89	94	0	0	1	93	0	67	67	20	20
90歳以上	54	0	0	1	53	0	45	45	6	6
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	1	0	2	653	0	536	536	105	105
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
45～49	27	0	0	0	27	0	26	26	1	1
50～54	88	1	0	0	87	0	71	71	14	14
55～59	115	0	0	0	115	0	97	97	18	18
60～64	116	0	0	0	116	0	97	97	17	17
65～69	88	0	0	1	87	0	74	74	12	12
70～74	59	0	0	0	59	0	48	48	9	9
75～79	51	0	0	0	51	0	42	42	8	8
80～84	54	0	0	0	54	0	36	36	14	14
85～89	44	0	0	1	43	0	33	33	10	10
90歳以上	12	0	0	0	12	0	11	11	1	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	724	1	1	8	714	4	544	544	99	99
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	4	4	1	1
45～49	20	0	0	0	20	0	16	16	3	3
50～54	76	0	0	2	73	1	60	60	8	8
55～59	126	0	0	1	125	0	108	108	11	11
60～64	112	0	0	0	112	0	87	87	11	11
65～69	96	0	0	0	96	0	70	70	14	14
70～74	71	0	0	2	69	0	42	42	17	17
75～79	61	0	0	1	58	2	41	41	9	9
80～84	69	1	1	1	65	1	48	48	10	10
85～89	50	0	0	0	50	0	34	34	10	10
90歳以上	42	0	0	1	41	0	34	34	5	5
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 9

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	肺線維症（慢性間質性肺炎）						無気肺					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	3	1	8	1372	0	1384	0	1	6	1377	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	0	0	1	163	0	164	0	0	1	163	0
55～59	241	0	0	1	240	0	241	0	1	1	239	0
60～64	228	1	0	1	226	0	228	0	0	0	228	0
65～69	184	1	0	2	181	0	184	0	0	2	182	0
70～74	130	1	0	0	129	0	130	0	0	0	130	0
75～79	112	0	0	1	111	0	112	0	0	1	111	0
80～84	123	0	1	2	120	0	123	0	0	1	122	0
85～89	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	2	0	3	651	0	656	0	0	3	653	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	1	0	2	85	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	1	0	0	58	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	0	0	1	53	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	1	1	5	721	0	728	0	1	3	724	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	0	1	75	0	76	0	0	1	75	0
55～59	126	0	0	1	125	0	126	0	1	1	124	0
60～64	112	1	0	1	110	0	112	0	0	0	112	0
65～69	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0
70～74	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0
75～79	61	0	0	1	60	0	61	0	0	1	60	0
80～84	69	0	1	1	67	0	69	0	0	0	69	0
85～89	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 0 0

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	肺水腫						肺炎					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	3	5	6	1370	0	1384	11	68	12	1293	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	3	0	44	0
50～54	164	0	0	1	163	0	164	0	8	2	154	0
55～59	241	0	0	1	240	0	241	1	9	1	230	0
60～64	228	0	1	0	227	0	228	0	11	4	213	0
65～69	184	0	1	2	181	0	184	0	8	2	174	0
70～74	130	0	1	0	129	0	130	2	3	0	125	0
75～79	112	1	0	1	110	0	112	0	3	2	107	0
80～84	123	1	0	1	121	0	123	3	8	1	111	0
85～89	94	0	2	0	92	0	94	4	10	0	80	0
90歳以上	54	1	0	0	53	0	54	1	5	0	48	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	1	2	3	650	0	656	5	25	7	619	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	2	0	25	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	0	3	1	84	0
55～59	115	0	0	0	115	0	115	0	2	0	113	0
60～64	116	0	1	0	115	0	116	0	6	2	108	0
65～69	88	0	0	2	86	0	88	0	1	2	85	0
70～74	59	0	0	0	59	0	59	1	1	0	57	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	0	0	1	50	0
80～84	54	1	0	1	52	0	54	2	5	1	46	0
85～89	44	0	1	0	43	0	44	2	4	0	38	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	1	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	2	3	3	720	0	728	6	43	5	674	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	1	0	19	0
50～54	76	0	0	1	75	0	76	0	5	1	70	0
55～59	126	0	0	1	125	0	126	1	7	1	117	0
60～64	112	0	0	0	112	0	112	0	5	2	105	0
65～69	96	0	1	0	95	0	96	0	7	0	89	0
70～74	71	0	1	0	70	0	71	1	2	0	68	0
75～79	61	1	0	1	59	0	61	0	3	1	57	0
80～84	69	0	0	0	69	0	69	1	3	0	65	0
85～89	50	0	1	0	49	0	50	2	6	0	42	0
90歳以上	42	1	0	0	41	0	42	1	4	0	37	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 0 1

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）
別

（単位：人）

性 年齢階層	慢性気管支炎						嚔声（声がかれる）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	41	19	19	1305	0	1384	25	7	60	1292	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	0	6	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	2	2	5	155	0	164	1	1	5	157	0
55～59	241	9	5	1	226	0	241	0	1	13	227	0
60～64	228	3	3	2	220	0	228	2	1	12	213	0
65～69	184	1	3	3	177	0	184	0	1	11	172	0
70～74	130	4	2	2	122	0	130	8	0	4	118	0
75～79	112	6	1	3	102	0	112	1	1	4	106	0
80～84	123	9	1	3	110	0	123	7	1	5	110	0
85～89	94	2	1	0	91	0	94	4	0	6	84	0
90歳以上	54	4	1	0	49	0	54	2	1	0	51	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	13	7	12	624	0	656	7	2	30	617	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	2	0	2	84	0	88	0	0	3	85	0
55～59	115	0	2	0	113	0	115	0	1	5	109	0
60～64	116	3	1	2	110	0	116	1	0	7	108	0
65～69	88	1	2	3	82	0	88	0	0	5	83	0
70～74	59	0	1	2	56	0	59	2	0	2	55	0
75～79	51	3	0	1	47	0	51	0	1	2	48	0
80～84	54	2	1	2	49	0	54	2	0	3	49	0
85～89	44	1	0	0	43	0	44	2	0	3	39	0
90歳以上	12	1	0	0	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	28	12	7	681	0	728	18	5	30	675	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	0	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	2	3	71	0	76	1	1	2	72	0
55～59	126	9	3	1	113	0	126	0	0	8	118	0
60～64	112	0	2	0	110	0	112	1	1	5	105	0
65～69	96	0	1	0	95	0	96	0	1	6	89	0
70～74	71	4	1	0	66	0	71	6	0	2	63	0
75～79	61	3	1	2	55	0	61	1	0	2	58	0
80～84	69	7	0	1	61	0	69	5	1	2	61	0
85～89	50	1	1	0	48	0	50	2	0	3	45	0
90歳以上	42	3	1	0	38	0	42	2	1	0	39	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 0 2

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）
別

（単位：人）

性 年齢階層	呼吸困難						COPD（慢性閉塞性肺疾患、肺気腫）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	22	6	14	1342	0	1384	14	3	18	1349	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	0	0	2	162	0	164	0	2	4	158	0
55～59	241	2	0	3	236	0	241	1	0	2	238	0
60～64	228	2	0	2	224	0	228	1	0	3	224	0
65～69	184	1	1	3	179	0	184	4	0	4	176	0
70～74	130	5	0	0	125	0	130	6	0	1	123	0
75～79	112	0	2	1	109	0	112	0	1	2	109	0
80～84	123	6	2	2	113	0	123	1	0	2	120	0
85～89	94	3	1	1	89	0	94	1	0	0	93	0
90歳以上	54	3	0	0	51	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	7	1	5	643	0	656	12	2	14	628	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	0	1	3	84	0
55～59	115	1	0	0	114	0	115	1	0	1	113	0
60～64	116	0	0	1	115	0	116	0	0	3	113	0
65～69	88	1	0	2	85	0	88	4	0	3	81	0
70～74	59	2	0	0	57	0	59	5	0	1	53	0
75～79	51	0	1	0	50	0	51	0	1	1	49	0
80～84	54	3	0	1	50	0	54	1	0	2	51	0
85～89	44	0	0	1	43	0	44	1	0	0	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	15	5	9	699	0	728	2	1	4	721	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	0	2	74	0	76	0	1	1	74	0
55～59	126	1	0	3	122	0	126	0	0	1	125	0
60～64	112	2	0	1	109	0	112	1	0	0	111	0
65～69	96	0	1	1	94	0	96	0	0	1	95	0
70～74	71	3	0	0	68	0	71	1	0	0	70	0
75～79	61	0	1	1	59	0	61	0	0	1	60	0
80～84	69	3	2	1	63	0	69	0	0	0	69	0
85～89	50	3	1	0	46	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	3	0	0	39	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 0 3

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	息切れ						風邪をひきやすい					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	60	6	128	1190	0	1384	73	49	131	1131	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	2	0	1	4	0
45～49	47	0	0	5	42	0	47	1	1	3	42	0
50～54	164	1	0	14	149	0	164	1	7	18	138	0
55～59	241	4	1	22	214	0	241	8	7	31	195	0
60～64	228	6	3	30	189	0	228	10	8	25	185	0
65～69	184	12	0	15	157	0	184	6	8	18	152	0
70～74	130	9	0	9	112	0	130	7	6	9	108	0
75～79	112	3	0	5	104	0	112	12	3	8	89	0
80～84	123	11	2	12	98	0	123	18	6	14	85	0
85～89	94	8	0	12	74	0	94	6	3	4	81	0
90歳以上	54	6	0	4	44	0	54	2	0	0	52	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	23	1	68	564	0	656	25	19	65	547	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0
45～49	27	0	0	2	25	0	27	1	1	1	24	0
50～54	88	0	0	4	84	0	88	1	2	7	78	0
55～59	115	1	0	14	100	0	115	1	2	14	98	0
60～64	116	4	1	20	91	0	116	3	4	15	94	0
65～69	88	7	0	9	72	0	88	3	2	11	72	0
70～74	59	4	0	3	52	0	59	1	1	5	52	0
75～79	51	0	0	2	49	0	51	5	1	3	42	0
80～84	54	3	0	7	44	0	54	5	4	5	40	0
85～89	44	3	0	7	34	0	44	3	2	3	36	0
90歳以上	12	1	0	0	11	0	12	1	0	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	37	5	60	626	0	728	48	30	66	584	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	1	0	0	4	0
45～49	20	0	0	3	17	0	20	0	0	2	18	0
50～54	76	1	0	10	65	0	76	0	5	11	60	0
55～59	126	3	1	8	114	0	126	7	5	17	97	0
60～64	112	2	2	10	98	0	112	7	4	10	91	0
65～69	96	5	0	6	85	0	96	3	6	7	80	0
70～74	71	5	0	6	60	0	71	6	5	4	56	0
75～79	61	3	0	3	55	0	61	7	2	5	47	0
80～84	69	8	2	5	54	0	69	13	2	9	45	0
85～89	50	5	0	5	40	0	50	3	1	1	45	0
90歳以上	42	5	0	4	33	0	42	1	0	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 0 4

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）

別

(単位：人)

性 年齢階層	風邪が治りにくい						せき					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	47	30	89	1218	0	1384	104	48	184	1048	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	0	6	0	7	0	1	0	6	0
45～49	47	1	2	1	43	0	47	1	3	6	37	0
50～54	164	1	2	13	148	0	164	6	7	18	133	0
55～59	241	8	5	17	211	0	241	9	10	33	189	0
60～64	228	6	4	20	198	0	228	12	7	37	172	0
65～69	184	6	6	17	155	0	184	10	8	28	138	0
70～74	130	5	1	6	118	0	130	17	3	17	93	0
75～79	112	4	2	4	102	0	112	14	4	16	78	0
80～84	123	11	5	8	99	0	123	18	3	14	88	0
85～89	94	4	3	3	84	0	94	12	1	15	66	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	5	1	0	48	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	11	12	44	589	0	656	40	14	91	511	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	1	1	24	0	27	1	2	3	21	0
50～54	88	0	1	5	82	0	88	4	1	9	74	0
55～59	115	0	2	9	104	0	115	3	4	17	91	0
60～64	116	3	1	14	98	0	116	6	1	18	91	0
65～69	88	1	1	8	78	0	88	5	2	14	67	0
70～74	59	1	1	2	55	0	59	3	1	9	46	0
75～79	51	0	1	1	49	0	51	7	2	7	35	0
80～84	54	3	2	2	47	0	54	6	0	5	43	0
85～89	44	1	2	2	39	0	44	3	1	9	31	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	2	0	0	10	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	36	18	45	629	0	728	64	34	93	537	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	1	0	4	0
45～49	20	0	1	0	19	0	20	0	1	3	16	0
50～54	76	1	1	8	66	0	76	2	6	9	59	0
55～59	126	8	3	8	107	0	126	6	6	16	98	0
60～64	112	3	3	6	100	0	112	6	6	19	81	0
65～69	96	5	5	9	77	0	96	5	6	14	71	0
70～74	71	4	0	4	63	0	71	14	2	8	47	0
75～79	61	4	1	3	53	0	61	7	2	9	43	0
80～84	69	8	3	6	52	0	69	12	3	9	45	0
85～89	50	3	1	1	45	0	50	9	0	6	35	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	3	1	0	38	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 105

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 7、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	たん						その他					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	109	31	201	1043	0	1384	12	16	13	1336	7
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	1	5	0	7	0	2	0	5	0
45～49	47	1	1	3	42	0	47	0	1	0	46	0
50～54	164	6	3	26	129	0	164	2	1	1	160	0
55～59	241	13	6	37	185	0	239	3	2	1	233	2
60～64	228	11	5	40	172	0	227	2	1	4	220	1
65～69	184	15	5	30	134	0	183	0	2	5	176	1
70～74	130	17	3	16	94	0	130	1	4	2	123	0
75～79	112	11	3	17	81	0	112	1	1	0	110	0
80～84	123	15	1	15	92	0	121	2	1	0	118	2
85～89	94	12	3	15	64	0	93	0	1	0	92	1
90歳以上	54	7	1	1	45	0	54	1	0	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	44	10	102	500	0	656	3	6	5	638	4
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	1	0	25	0	27	0	1	0	26	0
50～54	88	3	1	13	71	0	88	1	0	0	87	0
55～59	115	4	2	18	91	0	114	1	1	1	111	1
60～64	116	6	1	23	86	0	116	0	1	1	114	0
65～69	88	7	1	17	63	0	88	0	2	3	83	0
70～74	59	4	1	11	43	0	59	0	1	0	58	0
75～79	51	6	1	7	37	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	6	0	7	41	0	52	1	0	0	51	2
85～89	44	6	2	6	30	0	43	0	0	0	43	1
90歳以上	12	1	0	0	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	65	21	99	543	0	728	9	10	8	698	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	1	3	0	5	0	2	0	3	0
45～49	20	0	0	3	17	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	3	2	13	58	0	76	1	1	1	73	0
55～59	126	9	4	19	94	0	125	2	1	0	122	1
60～64	112	5	4	17	86	0	111	2	0	3	106	1
65～69	96	8	4	13	71	0	95	0	0	2	93	1
70～74	71	13	2	5	51	0	71	1	3	2	65	0
75～79	61	5	2	10	44	0	61	1	1	0	59	0
80～84	69	9	1	8	51	0	69	1	1	0	67	0
85～89	50	6	1	9	34	0	50	0	1	0	49	0
90歳以上	42	6	1	1	34	0	42	1	0	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 0 6

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答） 8、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	606	606	102	102
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	27	27	3	3
50～54	75	75	14	14
55～59	110	110	14	14
60～64	100	100	19	19
65～69	85	85	11	11
70～74	55	55	7	7
75～79	42	42	10	10
80～84	48	48	10	10
85～89	35	35	10	10
90歳以上	29	29	4	4
不詳	0	0	0	0
男	285	285	51	51
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	16	16	1	1
50～54	41	41	9	9
55～59	50	50	8	8
60～64	48	48	12	12
65～69	41	41	5	5
70～74	29	29	2	2
75～79	18	18	4	4
80～84	18	18	5	5
85～89	16	16	4	4
90歳以上	8	8	1	1
不詳	0	0	0	0
女	321	321	51	51
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	11	11	2	2
50～54	34	34	5	5
55～59	60	60	6	6
60～64	52	52	7	7
65～69	44	44	6	6
70～74	26	26	5	5
75～79	24	24	6	6
80～84	30	30	5	5
85～89	19	19	6	6
90歳以上	21	21	3	3
不詳	0	0	0	0

別表 1 0 7

心臓の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	心筋梗塞						狭心症					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	20	8	5	1351	0	1384	69	13	7	1295	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	0	0	1	163	0	164	3	0	1	160	0
55～59	241	1	1	1	238	0	241	4	1	2	234	0
60～64	228	2	0	0	226	0	228	5	1	0	222	0
65～69	184	2	2	0	180	0	184	6	2	1	175	0
70～74	130	1	2	0	127	0	130	7	0	0	123	0
75～79	112	2	1	1	108	0	112	9	2	1	100	0
80～84	123	7	0	2	114	0	123	20	1	1	101	0
85～89	94	4	2	0	88	0	94	7	4	1	82	0
90歳以上	54	1	0	0	53	0	54	8	2	0	44	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	11	4	1	640	0	656	34	7	4	611	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	3	0	0	85	0
55～59	115	1	1	0	113	0	115	2	1	1	111	0
60～64	116	2	0	0	114	0	116	4	1	0	111	0
65～69	88	2	1	0	85	0	88	4	1	1	82	0
70～74	59	1	1	0	57	0	59	5	0	0	54	0
75～79	51	1	1	0	49	0	51	2	2	0	47	0
80～84	54	2	0	1	51	0	54	8	0	1	45	0
85～89	44	2	0	0	42	0	44	5	2	1	36	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	1	0	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	9	4	4	711	0	728	35	6	3	684	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	0	1	75	0	76	0	0	1	75	0
55～59	126	0	0	1	125	0	126	2	0	1	123	0
60～64	112	0	0	0	112	0	112	1	0	0	111	0
65～69	96	0	1	0	95	0	96	2	1	0	93	0
70～74	71	0	1	0	70	0	71	2	0	0	69	0
75～79	61	1	0	1	59	0	61	7	0	1	53	0
80～84	69	5	0	1	63	0	69	12	1	0	56	0
85～89	50	2	2	0	46	0	50	2	2	0	46	0
90歳以上	42	1	0	0	41	0	42	7	2	0	33	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 0 8

心臓の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	心不全						心肥大					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	31	3	10	1340	0	1384	30	6	26	1322	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	1	0	1	45	0
50～54	164	0	0	1	163	0	164	1	0	2	161	0
55～59	241	0	0	1	240	0	241	1	1	7	232	0
60～64	228	1	0	0	227	0	228	1	1	4	222	0
65～69	184	3	0	2	179	0	184	6	2	5	171	0
70～74	130	1	1	1	127	0	130	2	0	1	127	0
75～79	112	6	0	1	105	0	112	5	0	3	104	0
80～84	123	8	0	2	113	0	123	4	0	3	116	0
85～89	94	7	2	1	84	0	94	6	1	0	87	0
90歳以上	54	5	0	1	48	0	54	3	1	0	50	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	7	2	4	643	0	656	13	2	11	630	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	1	0	1	25	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	1	0	0	87	0
55～59	115	0	0	0	115	0	115	1	0	5	109	0
60～64	116	0	0	0	116	0	116	1	0	2	113	0
65～69	88	2	0	1	85	0	88	4	2	2	80	0
70～74	59	1	1	0	57	0	59	1	0	0	58	0
75～79	51	1	0	0	50	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	2	0	1	51	0	54	3	0	1	50	0
85～89	44	1	1	1	41	0	44	1	0	0	43	0
90歳以上	12	0	0	1	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	24	1	6	697	0	728	17	4	15	692	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	0	1	75	0	76	0	0	2	74	0
55～59	126	0	0	1	125	0	126	0	1	2	123	0
60～64	112	1	0	0	111	0	112	0	1	2	109	0
65～69	96	1	0	1	94	0	96	2	0	3	91	0
70～74	71	0	0	1	70	0	71	1	0	1	69	0
75～79	61	5	0	1	55	0	61	5	0	3	53	0
80～84	69	6	0	1	62	0	69	1	0	2	66	0
85～89	50	6	1	0	43	0	50	5	1	0	44	0
90歳以上	42	5	0	0	37	0	42	3	1	0	38	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 0 9

心臓の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	不整脈（脈がとぶ）						頻脈（脈拍が増加している状態）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	87	22	92	1183	0	1384	16	7	21	1340	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	0	0	46	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	0	3	11	150	0	164	0	0	2	162	0
55～59	241	3	0	13	225	0	241	2	1	4	234	0
60～64	228	7	3	20	198	0	228	1	0	5	222	0
65～69	184	15	3	15	151	0	184	3	1	3	177	0
70～74	130	10	2	8	110	0	130	1	0	1	128	0
75～79	112	11	4	6	91	0	112	2	3	3	104	0
80～84	123	19	2	9	93	0	123	6	1	3	113	0
85～89	94	13	5	8	68	0	94	1	0	0	93	0
90歳以上	54	8	0	2	44	0	54	0	1	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	40	10	48	558	0	656	5	2	8	641	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	0	0	26	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	3	6	79	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	1	0	4	110	0	115	0	0	3	112	0
60～64	116	4	1	11	100	0	116	1	0	1	114	0
65～69	88	8	1	8	71	0	88	2	1	1	84	0
70～74	59	7	1	5	46	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	4	1	2	44	0	51	0	0	1	50	0
80～84	54	6	2	6	40	0	54	1	1	2	50	0
85～89	44	9	1	5	29	0	44	1	0	0	43	0
90歳以上	12	0	0	1	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	47	12	44	625	0	728	11	5	13	699	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	0	5	71	0	76	0	0	2	74	0
55～59	126	2	0	9	115	0	126	2	1	1	122	0
60～64	112	3	2	9	98	0	112	0	0	4	108	0
65～69	96	7	2	7	80	0	96	1	0	2	93	0
70～74	71	3	1	3	64	0	71	1	0	1	69	0
75～79	61	7	3	4	47	0	61	2	3	2	54	0
80～84	69	13	0	3	53	0	69	5	0	1	63	0
85～89	50	4	4	3	39	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	8	0	1	33	0	42	0	1	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 0

心臓の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	動悸（異常にドキドキする）						その他					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	33	7	86	1258	0	1384	9	6	10	1354	5
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	2	45	0	47	1	0	0	46	0
50～54	164	0	2	12	150	0	164	0	1	0	163	0
55～59	241	2	1	15	223	0	241	0	0	1	240	0
60～64	228	4	0	20	204	0	227	0	1	2	224	1
65～69	184	4	0	14	166	0	184	2	1	4	177	0
70～74	130	2	0	8	120	0	129	2	0	0	127	1
75～79	112	4	2	5	101	0	111	1	0	3	107	1
80～84	123	10	0	5	108	0	123	2	2	0	119	0
85～89	94	4	2	4	84	0	93	0	0	0	93	1
90歳以上	54	3	0	1	50	0	53	1	1	0	51	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	9	0	28	619	0	656	3	2	3	646	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	1	0	0	26	0
50～54	88	0	0	2	86	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	0	0	4	111	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	2	0	11	103	0	116	0	1	1	114	0
65～69	88	2	0	5	81	0	88	1	1	0	86	0
70～74	59	0	0	2	57	0	58	0	0	0	58	1
75～79	51	0	0	1	50	0	51	0	0	2	49	0
80～84	54	2	0	2	50	0	54	1	0	0	53	0
85～89	44	3	0	1	40	0	43	0	0	0	43	1
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	24	7	58	639	0	728	6	4	7	708	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	2	18	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	2	10	64	0	76	0	1	0	75	0
55～59	126	2	1	11	112	0	126	0	0	1	125	0
60～64	112	2	0	9	101	0	111	0	0	1	110	1
65～69	96	2	0	9	85	0	96	1	0	4	91	0
70～74	71	2	0	6	63	0	71	2	0	0	69	0
75～79	61	4	2	4	51	0	60	1	0	1	58	1
80～84	69	8	0	3	58	0	69	1	2	0	66	0
85～89	50	1	2	3	44	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	3	0	1	38	0	41	1	1	0	39	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 1

心臓の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	849	849	138	138
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	5	5	2	2
45～49	39	39	4	4
50～54	117	117	17	17
55～59	178	178	22	22
60～64	151	151	20	20
65～69	108	108	18	18
70～74	72	72	17	17
75～79	64	64	10	10
80～84	56	56	9	9
85～89	31	31	16	16
90歳以上	28	28	3	3
不詳	0	0	0	0
男	404	404	67	67
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	1	1	1	1
45～49	24	24	1	1
50～54	63	63	11	11
55～59	83	83	13	13
60～64	73	73	10	10
65～69	54	54	7	7
70～74	34	34	5	5
75～79	32	32	5	5
80～84	19	19	7	7
85～89	11	11	7	7
90歳以上	10	10	0	0
不詳	0	0	0	0
女	445	445	71	71
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	4	4	1	1
45～49	15	15	3	3
50～54	54	54	6	6
55～59	95	95	9	9
60～64	78	78	10	10
65～69	54	54	11	11
70～74	38	38	12	12
75～79	32	32	5	5
80～84	37	37	2	2
85～89	20	20	9	9
90歳以上	18	18	3	3
不詳	0	0	0	0

別表 1 1 2

心臓の病気・症状 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総数	192	16	130	4	19	23	0
30～34歳	1	0	0	1	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	1	0	0
50～54	4	2	2	0	0	0	0
55～59	10	1	7	0	0	2	0
60～64	16	2	12	0	2	0	0
65～69	21	1	15	0	3	2	0
70～74	20	1	10	0	3	6	0
75～79	27	3	18	0	2	4	0
80～84	44	2	29	2	3	8	0
85～89	30	4	23	0	3	0	0
90歳以上	18	0	14	1	2	1	0
男	93	11	59	2	10	11	0
30～34歳	1	0	0	1	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	1	0	0
50～54	4	2	2	0	0	0	0
55～59	5	1	4	0	0	0	0
60～64	12	2	9	0	1	0	0
65～69	12	1	7	0	3	1	0
70～74	11	1	6	0	1	3	0
75～79	8	1	5	0	0	2	0
80～84	19	1	11	1	1	5	0
85～89	19	2	15	0	2	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0
女	99	5	71	2	9	12	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	5	0	3	0	0	2	0
60～64	4	0	3	0	1	0	0
65～69	9	0	8	0	0	1	0
70～74	9	0	4	0	2	3	0
75～79	19	2	13	0	2	2	0
80～84	25	1	18	1	2	3	0
85～89	11	2	8	0	1	0	0
90歳以上	17	0	14	1	1	1	0

別表 1 1 3

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	高血圧						低血圧					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	493	16	41	833	1	1384	9	4	50	1321	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	1	6	0
45～49	47	6	0	2	39	0	47	1	0	2	44	0
50～54	164	21	1	8	134	0	164	1	0	12	151	0
55～59	241	52	1	8	180	0	241	1	1	13	226	0
60～64	228	76	3	5	144	0	228	0	0	3	225	0
65～69	184	61	1	10	112	0	184	2	1	8	173	0
70～74	130	62	3	2	63	0	130	0	1	2	127	0
75～79	112	58	1	2	51	0	112	1	1	1	109	0
80～84	122	65	2	0	55	1	123	2	0	5	116	0
85～89	94	57	3	2	32	0	94	0	0	3	91	0
90歳以上	54	35	1	2	16	0	54	1	0	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	249	6	22	378	1	656	2	0	13	641	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	4	0	1	22	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	13	0	5	70	0	88	0	0	4	84	0
55～59	115	33	0	5	77	0	115	0	0	2	113	0
60～64	116	43	2	1	70	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	37	0	6	45	0	88	0	0	3	85	0
70～74	59	31	1	1	26	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	31	1	1	18	0	51	1	0	0	50	0
80～84	53	24	1	0	28	1	54	1	0	3	50	0
85～89	44	26	1	1	16	0	44	0	0	1	43	0
90歳以上	12	7	0	1	4	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	244	10	19	455	0	728	7	4	37	680	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	1	4	0
45～49	20	2	0	1	17	0	20	1	0	2	17	0
50～54	76	8	1	3	64	0	76	1	0	8	67	0
55～59	126	19	1	3	103	0	126	1	1	11	113	0
60～64	112	33	1	4	74	0	112	0	0	3	109	0
65～69	96	24	1	4	67	0	96	2	1	5	88	0
70～74	71	31	2	1	37	0	71	0	1	2	68	0
75～79	61	27	0	1	33	0	61	0	1	1	59	0
80～84	69	41	1	0	27	0	69	1	0	2	66	0
85～89	50	31	2	1	16	0	50	0	0	2	48	0
90歳以上	42	28	1	1	12	0	42	1	0	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 4

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	動脈硬化						動脈瘤					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	13	0	16	1355	0	1384	19	5	20	1340	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	1	6	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	1	0	2	161	0	164	1	1	1	161	0
55～59	241	0	0	4	237	0	241	0	0	8	233	0
60～64	228	2	0	1	225	0	228	1	0	0	227	0
65～69	184	1	0	2	181	0	184	2	0	7	175	0
70～74	130	1	0	2	127	0	130	5	0	1	124	0
75～79	112	2	0	0	110	0	112	2	1	1	108	0
80～84	123	5	0	2	116	0	123	4	1	1	117	0
85～89	94	1	0	2	91	0	94	3	2	1	88	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	1	0	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	7	0	10	639	0	656	9	4	9	634	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	1	1	0	86	0
55～59	115	0	0	2	113	0	115	0	0	4	111	0
60～64	116	2	0	1	113	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	1	0	2	85	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	1	0	1	57	0	59	2	0	1	56	0
75～79	51	1	0	0	50	0	51	2	0	0	49	0
80～84	54	2	0	2	50	0	54	2	1	1	50	0
85～89	44	0	0	2	42	0	44	2	2	1	39	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	6	0	6	716	0	728	10	1	11	706	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	1	0	2	73	0	76	0	0	1	75	0
55～59	126	0	0	2	124	0	126	0	0	4	122	0
60～64	112	0	0	0	112	0	112	1	0	0	111	0
65～69	96	0	0	0	96	0	96	2	0	5	89	0
70～74	71	0	0	1	70	0	71	3	0	0	68	0
75～79	61	1	0	0	60	0	61	0	1	1	59	0
80～84	69	3	0	0	66	0	69	2	0	0	67	0
85～89	50	1	0	0	49	0	50	1	0	0	49	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	1	0	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 5

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	静脈炎						静脈瘤					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	5	1	6	1372	0	1384	8	12	33	1331	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	1	46	0
50～54	164	0	0	1	163	0	164	1	3	3	157	0
55～59	241	0	0	1	240	0	241	0	1	4	236	0
60～64	228	0	0	1	227	0	228	0	0	8	220	0
65～69	184	1	1	2	180	0	184	0	2	5	177	0
70～74	130	3	0	0	127	0	130	3	2	2	123	0
75～79	112	1	0	0	111	0	112	0	0	7	105	0
80～84	123	0	0	1	122	0	123	2	2	1	118	0
85～89	94	0	0	0	94	0	94	1	2	2	89	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	1	0	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	1	0	3	652	0	656	2	4	11	639	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	1	26	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	0	0	0	115	0	115	0	1	1	113	0
60～64	116	0	0	0	116	0	116	0	0	2	114	0
65～69	88	0	0	2	86	0	88	0	0	3	85	0
70～74	59	1	0	0	58	0	59	0	1	0	58	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	0	0	3	48	0
80～84	54	0	0	1	53	0	54	0	1	1	52	0
85～89	44	0	0	0	44	0	44	1	1	0	42	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	1	0	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	4	1	3	720	0	728	6	8	22	692	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	0	1	75	0	76	1	3	3	69	0
55～59	126	0	0	1	125	0	126	0	0	3	123	0
60～64	112	0	0	1	111	0	112	0	0	6	106	0
65～69	96	1	1	0	94	0	96	0	2	2	92	0
70～74	71	2	0	0	69	0	71	3	1	2	65	0
75～79	61	1	0	0	60	0	61	0	0	4	57	0
80～84	69	0	0	0	69	0	69	2	1	0	66	0
85～89	50	0	0	0	50	0	50	0	1	2	47	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 6

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	1382	2	1	7	1369	5	633	633	98	98
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	4	4	1	1
45～49	47	0	0	0	47	0	31	31	4	4
50～54	164	0	0	2	162	0	106	106	12	12
55～59	241	1	0	0	239	1	144	144	15	15
60～64	228	1	0	2	225	0	115	115	14	14
65～69	184	0	1	3	180	0	84	84	11	11
70～74	130	0	0	0	129	1	42	42	11	11
75～79	112	0	0	0	111	1	37	37	7	7
80～84	123	0	0	0	122	1	35	35	13	13
85～89	94	0	0	0	93	1	24	24	6	6
90歳以上	54	0	0	0	54	0	11	11	4	4
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	0	1	4	648	3	300	300	52	52
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
45～49	27	0	0	0	27	0	19	19	2	2
50～54	88	0	0	0	88	0	56	56	9	9
55～59	115	0	0	0	114	1	59	59	11	11
60～64	116	0	0	1	115	0	58	58	8	8
65～69	88	0	1	3	84	0	42	42	2	2
70～74	59	0	0	0	59	0	18	18	6	6
75～79	51	0	0	0	51	0	15	15	2	2
80～84	54	0	0	0	53	1	17	17	7	7
85～89	44	0	0	0	43	1	11	11	4	4
90歳以上	12	0	0	0	12	0	4	4	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	726	2	0	3	721	2	333	333	46	46
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	3	3	0	0
45～49	20	0	0	0	20	0	12	12	2	2
50～54	76	0	0	2	74	0	50	50	3	3
55～59	126	1	0	0	125	0	85	85	4	4
60～64	112	1	0	1	110	0	57	57	6	6
65～69	96	0	0	0	96	0	42	42	9	9
70～74	71	0	0	0	70	1	24	24	5	5
75～79	61	0	0	0	60	1	22	22	5	5
80～84	69	0	0	0	69	0	18	18	6	6
85～89	50	0	0	0	50	0	13	13	2	2
90歳以上	42	0	0	0	42	0	7	7	4	4
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 7

高血圧 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	その他	未回答	不詳
総数	522	39	459	8	16	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	6	1	5	0	0	0
50～54	22	5	16	0	1	0
55～59	55	5	47	1	2	0
60～64	79	2	73	2	2	0
65～69	65	5	59	0	1	0
70～74	67	5	58	2	2	0
75～79	65	8	53	1	3	0
80～84	66	2	63	0	1	0
85～89	62	6	51	2	3	0
90歳以上	35	0	34	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	262	21	228	3	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	4	1	3	0	0	0
50～54	14	3	10	0	1	0
55～59	33	2	30	0	1	0
60～64	44	1	41	1	1	0
65～69	40	4	35	0	1	0
70～74	33	3	29	0	1	0
75～79	34	3	27	1	3	0
80～84	25	2	23	0	0	0
85～89	28	2	23	1	2	0
90歳以上	7	0	7	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	260	18	231	5	6	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	2	0	0	0
50～54	8	2	6	0	0	0
55～59	22	3	17	1	1	0
60～64	35	1	32	1	1	0
65～69	25	1	24	0	0	0
70～74	34	2	29	2	1	0
75～79	31	5	26	0	0	0
80～84	41	0	40	0	1	0
85～89	34	4	28	1	1	0
90歳以上	28	0	27	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 8

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	B型肝炎						C型肝炎					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	11	11	20	1342	0	1384	10	13	7	1354	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	1	1	44	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	2	0	4	158	0	164	0	0	0	164	0
55～59	241	0	1	2	238	0	241	1	3	1	236	0
60～64	228	0	0	4	224	0	228	2	0	0	226	0
65～69	184	3	2	4	175	0	184	1	3	1	179	0
70～74	130	2	0	2	126	0	130	3	1	0	126	0
75～79	112	0	4	1	107	0	112	0	2	1	109	0
80～84	123	2	2	1	118	0	123	2	2	1	118	0
85～89	94	1	1	1	91	0	94	1	1	1	91	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	0	1	2	51	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	4	4	8	640	0	656	4	8	2	642	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	1	0	1	86	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	0	1	0	114	0	115	1	1	0	113	0
60～64	116	0	0	2	114	0	116	1	0	0	115	0
65～69	88	1	0	2	85	0	88	1	2	1	84	0
70～74	59	1	0	1	57	0	59	1	1	0	57	0
75～79	51	0	3	0	48	0	51	0	1	0	50	0
80～84	54	1	0	1	52	0	54	0	2	1	51	0
85～89	44	0	0	1	43	0	44	0	1	0	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	7	7	12	702	0	728	6	5	5	712	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	1	1	1	17	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	1	0	3	72	0	76	0	0	0	76	0
55～59	126	0	0	2	124	0	126	0	2	1	123	0
60～64	112	0	0	2	110	0	112	1	0	0	111	0
65～69	96	2	2	2	90	0	96	0	1	0	95	0
70～74	71	1	0	1	69	0	71	2	0	0	69	0
75～79	61	0	1	1	59	0	61	0	1	1	59	0
80～84	69	1	2	0	66	0	69	2	0	0	67	0
85～89	50	1	1	0	48	0	50	1	0	1	48	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	1	2	39	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 9

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	肝機能障害						胆のう炎					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	30	23	26	1305	0	1384	6	20	5	1353	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	2	1	0	44	0	47	0	1	0	46	0
50～54	164	4	5	3	152	0	164	0	0	0	164	0
55～59	241	3	1	6	231	0	241	0	1	1	239	0
60～64	228	4	2	7	215	0	228	0	2	0	226	0
65～69	184	3	5	3	173	0	184	2	4	2	176	0
70～74	130	6	2	3	119	0	130	0	0	0	130	0
75～79	112	4	2	2	104	0	112	1	3	1	107	0
80～84	123	2	2	2	117	0	123	1	5	1	116	0
85～89	94	2	3	0	89	0	94	0	3	0	91	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	2	1	0	51	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	16	10	18	612	0	656	2	9	3	642	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	2	1	0	24	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	3	2	3	80	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	1	0	4	110	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	2	2	5	107	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	2	1	3	82	0	88	1	3	2	82	0
70～74	59	3	0	1	55	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	0	1	1	49	0	51	0	1	0	50	0
80～84	54	2	1	1	50	0	54	1	3	1	49	0
85～89	44	1	2	0	41	0	44	0	2	0	42	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	14	13	8	693	0	728	4	11	2	711	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	1	0	19	0
50～54	76	1	3	0	72	0	76	0	0	0	76	0
55～59	126	2	1	2	121	0	126	0	1	1	124	0
60～64	112	2	0	2	108	0	112	0	2	0	110	0
65～69	96	1	4	0	91	0	96	1	1	0	94	0
70～74	71	3	2	2	64	0	71	0	0	0	71	0
75～79	61	4	1	1	55	0	61	1	2	1	57	0
80～84	69	0	1	1	67	0	69	0	2	0	67	0
85～89	50	1	1	0	48	0	50	0	1	0	49	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	2	1	0	39	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 0

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	胆石症						黄疸					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	8	39	29	1308	0	1384	2	7	7	1368	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	2	1	44	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	0	3	1	160	0	164	0	1	1	162	0
55～59	241	0	7	6	228	0	241	0	0	1	240	0
60～64	228	0	7	3	218	0	228	1	1	0	226	0
65～69	184	1	5	6	172	0	184	0	2	1	181	0
70～74	130	2	2	3	123	0	130	0	0	1	129	0
75～79	112	1	2	2	107	0	112	0	1	1	110	0
80～84	123	2	2	2	117	0	123	0	1	2	120	0
85～89	94	0	6	3	85	0	94	1	1	0	92	0
90歳以上	54	2	3	2	47	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	0	18	13	625	0	656	1	3	2	650	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	2	1	85	0	88	0	1	0	87	0
55～59	115	0	3	2	110	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	0	3	2	111	0	116	1	1	0	114	0
65～69	88	0	3	3	82	0	88	0	1	1	86	0
70～74	59	0	2	1	56	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	0	1	0	50	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	0	2	2	50	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	0	2	1	41	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	0	0	1	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	8	21	16	683	0	728	1	4	5	718	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	2	1	17	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	1	0	75	0	76	0	0	1	75	0
55～59	126	0	4	4	118	0	126	0	0	1	125	0
60～64	112	0	4	1	107	0	112	0	0	0	112	0
65～69	96	1	2	3	90	0	96	0	1	0	95	0
70～74	71	2	0	2	67	0	71	0	0	1	70	0
75～79	61	1	1	2	57	0	61	0	1	1	59	0
80～84	69	2	0	0	67	0	69	0	1	1	67	0
85～89	50	0	4	2	44	0	50	1	1	0	48	0
90歳以上	42	2	3	1	36	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 1

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	脾腫（脾臓がはれる）						その他					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	2	0	4	1378	0	1384	8	8	13	1349	6
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	0	0	0	164	0	162	1	3	1	157	2
55～59	241	0	0	1	240	0	240	0	0	3	237	1
60～64	228	1	0	0	227	0	225	2	1	3	219	3
65～69	184	1	0	1	182	0	184	0	0	2	182	0
70～74	130	0	0	0	130	0	130	2	1	0	127	0
75～79	112	0	0	1	111	0	112	0	2	1	109	0
80～84	123	0	0	1	122	0	123	2	0	2	119	0
85～89	94	0	0	0	94	0	94	0	1	1	92	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	1	0	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	1	0	2	653	0	656	3	4	4	641	4
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	0	88	0	87	0	2	0	85	1
55～59	115	0	0	0	115	0	114	0	0	1	113	1
60～64	116	1	0	0	115	0	114	1	0	1	112	2
65～69	88	0	0	1	87	0	88	0	0	0	88	0
70～74	59	0	0	0	59	0	59	1	1	0	57	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	0	1	0	50	0
80～84	54	0	0	1	53	0	54	1	0	1	52	0
85～89	44	0	0	0	44	0	44	0	0	1	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	1	0	2	725	0	728	5	4	9	708	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	0	0	76	0	75	1	1	1	72	1
55～59	126	0	0	1	125	0	126	0	0	2	124	0
60～64	112	0	0	0	112	0	111	1	1	2	107	1
65～69	96	1	0	0	95	0	96	0	0	2	94	0
70～74	71	0	0	0	71	0	71	1	0	0	70	0
75～79	61	0	0	1	60	0	61	0	1	1	59	0
80～84	69	0	0	0	69	0	69	1	0	1	67	0
85～89	50	0	0	0	50	0	50	0	1	0	49	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	1	0	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 2

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	960	960	179	179
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	5	5	2	2
45～49	35	35	3	3
50～54	115	115	21	21
55～59	188	188	24	24
60～64	168	168	24	24
65～69	123	123	23	23
70～74	79	79	23	23
75～79	76	76	17	17
80～84	78	78	21	21
85～89	57	57	15	15
90歳以上	36	36	6	6
不詳	0	0	0	0
男	455	455	86	86
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	1	1	1	1
45～49	23	23	1	1
50～54	59	59	14	14
55～59	87	87	14	14
60～64	83	83	13	13
65～69	61	61	9	9
70～74	38	38	8	8
75～79	37	37	7	7
80～84	31	31	10	10
85～89	25	25	8	8
90歳以上	10	10	1	1
不詳	0	0	0	0
女	505	505	93	93
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	4	4	1	1
45～49	12	12	2	2
50～54	56	56	7	7
55～59	101	101	10	10
60～64	85	85	11	11
65～69	62	62	14	14
70～74	41	41	15	15
75～79	39	39	10	10
80～84	47	47	11	11
85～89	32	32	7	7
90歳以上	26	26	5	5
不詳	0	0	0	0

別表 1 2 3

すい臓の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	すい炎						糖尿病					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	9	14	4	1357	0	1384	157	7	12	1208	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	1	0	0	6	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	2	0	0	45	0
50～54	164	0	0	0	164	0	164	5	1	0	158	0
55～59	241	1	4	1	235	0	241	20	1	1	219	0
60～64	228	0	3	0	225	0	228	25	1	2	200	0
65～69	184	1	3	1	179	0	184	22	0	3	159	0
70～74	130	2	1	1	126	0	130	22	1	1	106	0
75～79	112	1	2	1	108	0	112	14	1	0	97	0
80～84	123	3	0	0	120	0	123	24	0	1	98	0
85～89	94	1	1	0	92	0	94	20	2	3	69	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	2	0	1	51	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	5	6	2	643	0	656	93	2	10	551	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	1	0	0	26	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	1	1	0	86	0
55～59	115	1	1	0	113	0	115	15	0	0	100	0
60～64	116	0	1	0	115	0	116	16	0	2	98	0
65～69	88	0	3	1	84	0	88	14	0	3	71	0
70～74	59	1	0	1	57	0	59	12	0	1	46	0
75～79	51	0	1	0	50	0	51	10	1	0	40	0
80～84	54	2	0	0	52	0	54	14	0	1	39	0
85～89	44	1	0	0	43	0	44	8	0	2	34	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	1	0	1	10	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	4	8	2	714	0	728	64	5	2	657	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	1	0	0	19	0
50～54	76	0	0	0	76	0	76	4	0	0	72	0
55～59	126	0	3	1	122	0	126	5	1	1	119	0
60～64	112	0	2	0	110	0	112	9	1	0	102	0
65～69	96	1	0	0	95	0	96	8	0	0	88	0
70～74	71	1	1	0	69	0	71	10	1	0	60	0
75～79	61	1	1	1	58	0	61	4	0	0	57	0
80～84	69	1	0	0	68	0	69	10	0	0	59	0
85～89	50	0	1	0	49	0	50	12	2	1	35	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	1	0	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 4

すい臓の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	1383	4	0	4	1375	1	982	982	196	196
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	5	5	1	1
45～49	47	0	0	0	47	0	41	41	4	4
50～54	164	0	0	1	163	0	135	135	22	22
55～59	241	1	0	1	239	0	183	183	29	29
60～64	228	1	0	1	226	0	169	169	26	26
65～69	184	0	0	0	184	0	132	132	23	23
70～74	130	1	0	0	128	1	74	74	27	27
75～79	112	0	0	0	112	0	77	77	17	17
80～84	123	0	0	0	123	0	74	74	22	22
85～89	94	0	0	1	93	0	51	51	16	16
90歳以上	54	1	0	0	53	0	41	41	9	9
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	2	0	4	650	0	441	441	94	94
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
45～49	27	0	0	0	27	0	25	25	1	1
50～54	88	0	0	1	87	0	71	71	14	14
55～59	115	1	0	1	113	0	78	78	18	18
60～64	116	0	0	1	115	0	83	83	13	13
65～69	88	0	0	0	88	0	57	57	11	11
70～74	59	1	0	0	58	0	34	34	10	10
75～79	51	0	0	0	51	0	32	32	7	7
80～84	54	0	0	0	54	0	28	28	10	10
85～89	44	0	0	1	43	0	23	23	9	9
90歳以上	12	0	0	0	12	0	9	9	1	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	727	2	0	0	725	1	541	541	102	102
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	4	4	1	1
45～49	20	0	0	0	20	0	16	16	3	3
50～54	76	0	0	0	76	0	64	64	8	8
55～59	126	0	0	0	126	0	105	105	11	11
60～64	112	1	0	0	111	0	86	86	13	13
65～69	96	0	0	0	96	0	75	75	12	12
70～74	71	0	0	0	70	1	40	40	17	17
75～79	61	0	0	0	61	0	45	45	10	10
80～84	69	0	0	0	69	0	46	46	12	12
85～89	50	0	0	0	50	0	28	28	7	7
90歳以上	42	1	0	0	41	0	32	32	8	8
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 5

糖尿病 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	インスリン	その他	未回答	不詳
総数	193	32	143	17	1	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	1	0	0	0	0
45～49	2	0	1	1	0	0	0
50～54	7	2	4	1	0	0	0
55～59	23	4	18	1	0	0	0
60～64	29	3	24	2	0	0	0
65～69	26	1	21	4	0	1	0
70～74	29	7	21	1	0	0	0
75～79	17	3	14	0	0	0	0
80～84	33	7	21	4	1	0	0
85～89	24	5	16	3	0	1	0
90歳以上	2	0	2	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	108	14	86	8	0	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	1	0	0	0	0
45～49	1	0	1	0	0	0	0
50～54	1	0	1	0	0	0	0
55～59	16	2	14	0	0	0	0
60～64	20	3	15	2	0	0	0
65～69	14	0	13	1	0	1	0
70～74	15	2	12	1	0	0	0
75～79	11	1	10	0	0	0	0
80～84	19	4	12	3	0	0	0
85～89	9	2	6	1	0	0	0
90歳以上	1	0	1	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	85	18	57	9	1	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	1	0	0	0
50～54	6	2	3	1	0	0	0
55～59	7	2	4	1	0	0	0
60～64	9	0	9	0	0	0	0
65～69	12	1	8	3	0	0	0
70～74	14	5	9	0	0	0	0
75～79	6	2	4	0	0	0	0
80～84	14	3	9	1	1	0	0
85～89	15	3	10	2	0	1	0
90歳以上	1	0	1	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 6

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	腎炎						膀胱炎					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	17	28	11	1328	0	1384	24	158	20	1182	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	0	6	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	2	0	45	0	47	1	6	0	40	0
50～54	164	1	3	1	159	0	164	1	23	5	135	0
55～59	241	2	5	2	232	0	241	1	31	4	205	0
60～64	228	3	5	1	219	0	228	1	27	3	197	0
65～69	184	2	4	2	176	0	184	2	25	2	155	0
70～74	130	3	0	2	125	0	130	2	14	2	112	0
75～79	112	0	6	1	105	0	112	2	12	2	96	0
80～84	123	4	1	2	116	0	123	7	11	2	103	0
85～89	94	1	1	0	92	0	94	5	8	0	81	0
90歳以上	54	0	1	0	53	0	54	2	1	0	51	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	8	2	4	642	0	656	7	14	2	633	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	0	2	0	86	0
55～59	115	2	0	1	112	0	115	0	1	0	114	0
60～64	116	0	1	0	115	0	116	0	4	0	112	0
65～69	88	2	0	2	84	0	88	1	2	1	84	0
70～74	59	1	0	0	58	0	59	0	2	0	57	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	1	0	0	50	0
80～84	54	3	0	1	50	0	54	3	1	1	49	0
85～89	44	0	1	0	43	0	44	2	2	0	40	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	9	26	7	686	0	728	17	144	18	549	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	0	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	2	0	18	0	20	1	6	0	13	0
50～54	76	1	3	1	71	0	76	1	21	5	49	0
55～59	126	0	5	1	120	0	126	1	30	4	91	0
60～64	112	3	4	1	104	0	112	1	23	3	85	0
65～69	96	0	4	0	92	0	96	1	23	1	71	0
70～74	71	2	0	2	67	0	71	2	12	2	55	0
75～79	61	0	6	1	54	0	61	1	12	2	46	0
80～84	69	1	1	1	66	0	69	4	10	1	54	0
85～89	50	1	0	0	49	0	50	3	6	0	41	0
90歳以上	42	0	1	0	41	0	42	2	1	0	39	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 7

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	腎結石						尿管結石					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	9	20	20	1335	0	1384	7	83	13	1281	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	0	2	44	0	47	1	5	0	41	0
50～54	164	1	3	2	158	0	164	1	10	3	150	0
55～59	241	1	4	4	232	0	241	0	18	4	219	0
60～64	228	1	3	2	222	0	228	0	12	1	215	0
65～69	184	2	1	3	178	0	184	2	14	1	167	0
70～74	130	0	3	1	126	0	130	0	3	0	127	0
75～79	112	0	3	1	108	0	112	1	8	2	101	0
80～84	123	2	3	3	115	0	123	1	5	2	115	0
85～89	94	0	0	2	92	0	94	1	8	0	85	0
90歳以上	54	1	0	0	53	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	6	13	14	623	0	656	6	54	9	587	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	0	1	25	0	27	1	4	0	22	0
50～54	88	1	3	2	82	0	88	1	5	3	79	0
55～59	115	1	3	1	110	0	115	0	11	2	102	0
60～64	116	0	1	1	114	0	116	0	8	0	108	0
65～69	88	2	0	3	83	0	88	2	10	1	75	0
70～74	59	0	2	1	56	0	59	0	2	0	57	0
75～79	51	0	2	0	49	0	51	1	6	1	43	0
80～84	54	1	2	3	48	0	54	1	3	2	48	0
85～89	44	0	0	2	42	0	44	0	5	0	39	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	3	7	6	712	0	728	1	29	4	694	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	1	19	0	20	0	1	0	19	0
50～54	76	0	0	0	76	0	76	0	5	0	71	0
55～59	126	0	1	3	122	0	126	0	7	2	117	0
60～64	112	1	2	1	108	0	112	0	4	1	107	0
65～69	96	0	1	0	95	0	96	0	4	0	92	0
70～74	71	0	1	0	70	0	71	0	1	0	70	0
75～79	61	0	1	1	59	0	61	0	2	1	58	0
80～84	69	1	1	0	67	0	69	0	2	0	67	0
85～89	50	0	0	0	50	0	50	1	3	0	46	0
90歳以上	42	1	0	0	41	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 8

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	膀胱結石						血尿					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	5	10	5	1364	0	1384	14	45	36	1289	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	0	0	46	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	1	1	1	161	0	164	2	6	6	150	0
55～59	241	1	1	1	238	0	241	2	5	3	231	0
60～64	228	0	2	0	226	0	228	3	6	9	210	0
65～69	184	1	0	1	182	0	184	3	10	7	164	0
70～74	130	0	1	0	129	0	130	2	8	1	119	0
75～79	112	1	2	1	108	0	112	0	4	6	102	0
80～84	123	0	2	1	120	0	123	1	3	3	116	0
85～89	94	0	1	0	93	0	94	1	2	0	91	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	0	1	1	52	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	4	7	3	642	0	656	6	16	9	625	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	0	0	26	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	1	0	1	86	0	88	1	1	1	85	0
55～59	115	1	1	0	113	0	115	1	2	0	112	0
60～64	116	0	1	0	115	0	116	1	3	3	109	0
65～69	88	1	0	1	86	0	88	1	3	3	81	0
70～74	59	0	0	0	59	0	59	1	3	0	55	0
75～79	51	0	2	0	49	0	51	0	1	0	50	0
80～84	54	0	2	1	51	0	54	1	2	2	49	0
85～89	44	0	1	0	43	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	1	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	1	3	2	722	0	728	8	29	27	664	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	1	0	75	0	76	1	5	5	65	0
55～59	126	0	0	1	125	0	126	1	3	3	119	0
60～64	112	0	1	0	111	0	112	2	3	6	101	0
65～69	96	0	0	0	96	0	96	2	7	4	83	0
70～74	71	0	1	0	70	0	71	1	5	1	64	0
75～79	61	1	0	1	59	0	61	0	3	6	52	0
80～84	69	0	0	0	69	0	69	0	1	1	67	0
85～89	50	0	0	0	50	0	50	1	2	0	47	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	0	1	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 9

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	蛋白尿						その他					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	25	19	27	1313	0	1384	31	12	22	1314	5
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	0	6	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	0	1	45	0	47	0	0	1	46	0
50～54	164	3	2	3	156	0	164	1	2	2	159	0
55～59	241	3	3	6	229	0	241	2	1	4	234	0
60～64	228	3	4	5	216	0	228	3	1	4	220	0
65～69	184	4	4	6	170	0	184	5	3	2	174	0
70～74	130	3	2	2	123	0	129	2	1	2	124	1
75～79	112	0	2	1	109	0	112	2	0	2	108	0
80～84	123	3	1	2	117	0	122	7	1	3	111	1
85～89	94	2	0	1	91	0	92	5	3	1	83	2
90歳以上	54	2	1	0	51	0	53	4	0	1	48	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	14	4	15	623	0	656	16	7	13	617	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	1	26	0	27	0	0	1	26	0
50～54	88	1	1	1	85	0	88	1	1	0	86	0
55～59	115	2	1	2	110	0	115	2	0	1	112	0
60～64	116	1	0	4	111	0	116	0	1	4	111	0
65～69	88	4	1	4	79	0	88	4	1	2	81	0
70～74	59	3	0	1	55	0	59	1	1	1	56	0
75～79	51	0	1	0	50	0	51	1	0	1	49	0
80～84	54	2	0	1	51	0	53	4	1	2	46	1
85～89	44	0	0	1	43	0	43	2	2	1	38	1
90歳以上	12	1	0	0	11	0	11	1	0	0	10	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	11	15	12	690	0	728	15	5	9	697	2
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	0	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	1	0	0	19	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	2	1	2	71	0	76	0	1	2	73	0
55～59	126	1	2	4	119	0	126	0	1	3	122	0
60～64	112	2	4	1	105	0	112	3	0	0	109	0
65～69	96	0	3	2	91	0	96	1	2	0	93	0
70～74	71	0	2	1	68	0	70	1	0	1	68	1
75～79	61	0	1	1	59	0	61	1	0	1	59	0
80～84	69	1	1	1	66	0	69	3	0	1	65	0
85～89	50	2	0	0	48	0	49	3	1	0	45	1
90歳以上	42	1	1	0	40	0	42	3	0	1	38	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 0

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	811	811	147	147
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	5	5	1	1
45～49	27	27	4	4
50～54	98	98	16	16
55～59	153	153	18	18
60～64	145	145	21	21
65～69	102	102	17	17
70～74	70	70	22	22
75～79	62	62	14	14
80～84	61	61	15	15
85～89	52	52	13	13
90歳以上	36	36	6	6
不詳	0	0	0	0
男	420	420	77	77
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	1	1	1	1
45～49	17	17	2	2
50～54	59	59	13	13
55～59	79	79	14	14
60～64	81	81	14	14
65～69	53	53	8	8
70～74	37	37	7	7
75～79	34	34	5	5
80～84	24	24	8	8
85～89	26	26	4	4
90歳以上	9	9	1	1
不詳	0	0	0	0
女	391	391	70	70
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	4	4	0	0
45～49	10	10	2	2
50～54	39	39	3	3
55～59	74	74	4	4
60～64	64	64	7	7
65～69	49	49	9	9
70～74	33	33	15	15
75～79	28	28	9	9
80～84	37	37	7	7
85～89	26	26	9	9
90歳以上	27	27	5	5
不詳	0	0	0	0

別表 1 3 1

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答）、性、年齢（5歳階級）

別

(単位：人)

性 年齢階層	大腸ポリープ						慢性胃炎					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	36	131	34	1183	0	1384	55	28	25	1276	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	5	1	41	0	47	0	2	0	45	0
50～54	164	3	4	4	153	0	164	2	2	1	159	0
55～59	241	4	15	6	216	0	241	8	9	10	214	0
60～64	228	3	24	2	199	0	228	9	6	7	206	0
65～69	184	3	27	2	152	0	184	5	5	3	171	0
70～74	130	6	19	4	101	0	130	8	2	1	119	0
75～79	112	4	10	7	91	0	112	8	1	1	102	0
80～84	123	5	14	5	99	0	123	8	1	1	113	0
85～89	94	8	10	2	74	0	94	6	0	1	87	0
90歳以上	54	0	3	1	50	0	54	1	0	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	26	77	18	535	0	656	17	12	13	614	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	4	0	23	0	27	0	2	0	25	0
50～54	88	2	1	0	85	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	2	10	4	99	0	115	3	3	4	105	0
60～64	116	3	15	2	96	0	116	4	4	3	105	0
65～69	88	3	17	2	66	0	88	2	1	3	82	0
70～74	59	4	12	3	40	0	59	2	1	1	55	0
75～79	51	2	6	3	40	0	51	2	1	0	48	0
80～84	54	3	6	3	42	0	54	1	0	1	52	0
85～89	44	7	5	1	31	0	44	3	0	1	40	0
90歳以上	12	0	1	0	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	10	54	16	648	0	728	38	16	12	662	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	1	1	18	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	1	3	4	68	0	76	2	2	1	71	0
55～59	126	2	5	2	117	0	126	5	6	6	109	0
60～64	112	0	9	0	103	0	112	5	2	4	101	0
65～69	96	0	10	0	86	0	96	3	4	0	89	0
70～74	71	2	7	1	61	0	71	6	1	0	64	0
75～79	61	2	4	4	51	0	61	6	0	1	54	0
80～84	69	2	8	2	57	0	69	7	1	0	61	0
85～89	50	1	5	1	43	0	50	3	0	0	47	0
90歳以上	42	0	2	1	39	0	42	1	0	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 2

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	胃潰瘍						十二指腸潰瘍					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	30	96	10	1248	0	1384	16	72	10	1286	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	5	0	42	0	47	0	6	0	41	0
50～54	164	3	10	0	151	0	164	3	11	1	149	0
55～59	241	5	19	2	215	0	241	3	13	2	223	0
60～64	228	7	22	1	198	0	228	3	11	2	212	0
65～69	184	3	7	1	173	0	184	1	10	1	172	0
70～74	130	4	11	2	113	0	130	1	8	0	121	0
75～79	112	1	4	0	107	0	112	1	5	0	106	0
80～84	123	6	6	3	108	0	123	2	3	3	115	0
85～89	94	1	12	1	80	0	94	2	4	1	87	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	0	1	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	15	64	8	569	0	656	10	50	6	590	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	5	0	22	0	27	0	5	0	22	0
50～54	88	1	7	0	80	0	88	2	6	1	79	0
55～59	115	3	13	1	98	0	115	2	6	0	107	0
60～64	116	5	13	1	97	0	116	2	10	0	104	0
65～69	88	3	5	1	79	0	88	1	9	1	77	0
70～74	59	1	8	1	49	0	59	0	7	0	52	0
75～79	51	0	2	0	49	0	51	1	2	0	48	0
80～84	54	2	3	3	46	0	54	2	1	3	48	0
85～89	44	0	8	1	35	0	44	0	4	1	39	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	15	32	2	679	0	728	6	22	4	696	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	1	0	19	0
50～54	76	2	3	0	71	0	76	1	5	0	70	0
55～59	126	2	6	1	117	0	126	1	7	2	116	0
60～64	112	2	9	0	101	0	112	1	1	2	108	0
65～69	96	0	2	0	94	0	96	0	1	0	95	0
70～74	71	3	3	1	64	0	71	1	1	0	69	0
75～79	61	1	2	0	58	0	61	0	3	0	58	0
80～84	69	4	3	0	62	0	69	0	2	0	67	0
85～89	50	1	4	0	45	0	50	2	0	0	48	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	1	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 3

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	下痢						便秘					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	48	26	152	1158	0	1384	177	23	174	1010	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	1	5	41	0	47	0	1	10	36	0
50～54	164	5	2	22	135	0	164	9	1	23	131	0
55～59	241	8	7	34	192	0	241	15	5	32	189	0
60～64	228	7	3	39	179	0	228	14	1	30	183	0
65～69	184	3	4	22	155	0	184	15	2	27	140	0
70～74	130	6	2	10	112	0	130	18	5	8	99	0
75～79	112	5	2	6	99	0	112	20	2	13	77	0
80～84	123	8	3	2	110	0	123	38	2	17	66	0
85～89	94	5	1	11	77	0	94	32	1	10	51	0
90歳以上	54	1	1	1	51	0	54	16	3	4	31	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	17	5	80	554	0	656	58	6	56	536	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	3	24	0	27	0	0	3	24	0
50～54	88	2	0	10	76	0	88	1	0	4	83	0
55～59	115	4	1	15	95	0	115	5	0	6	104	0
60～64	116	3	0	24	89	0	116	7	0	9	100	0
65～69	88	1	1	11	75	0	88	4	1	10	73	0
70～74	59	1	0	7	51	0	59	4	0	5	50	0
75～79	51	0	1	3	47	0	51	3	1	4	43	0
80～84	54	3	0	1	50	0	54	18	0	7	29	0
85～89	44	3	1	6	34	0	44	14	1	7	22	0
90歳以上	12	0	1	0	11	0	12	2	3	1	6	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	31	21	72	604	0	728	119	17	118	474	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	1	2	17	0	20	0	1	7	12	0
50～54	76	3	2	12	59	0	76	8	1	19	48	0
55～59	126	4	6	19	97	0	126	10	5	26	85	0
60～64	112	4	3	15	90	0	112	7	1	21	83	0
65～69	96	2	3	11	80	0	96	11	1	17	67	0
70～74	71	5	2	3	61	0	71	14	5	3	49	0
75～79	61	5	1	3	52	0	61	17	1	9	34	0
80～84	69	5	3	1	60	0	69	20	2	10	37	0
85～89	50	2	0	5	43	0	50	18	0	3	29	0
90歳以上	42	1	0	1	40	0	42	14	0	3	25	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 4

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	腹部膨満感（おなかが張る）						痔疾（ぢ）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	41	8	81	1254	0	1384	39	81	105	1159	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	3	44	0	47	1	2	4	40	0
50～54	164	8	0	12	144	0	164	4	4	8	148	0
55～59	241	5	0	19	217	0	241	4	10	17	210	0
60～64	228	9	1	16	202	0	228	6	20	22	180	0
65～69	184	2	3	12	167	0	184	6	19	18	141	0
70～74	130	7	3	4	116	0	130	2	11	13	104	0
75～79	112	2	1	3	106	0	112	8	3	6	95	0
80～84	123	4	0	4	115	0	123	4	6	10	103	0
85～89	94	4	0	7	83	0	94	2	5	6	81	0
90歳以上	54	0	0	1	53	0	54	2	1	1	50	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	11	2	33	610	0	656	22	49	50	535	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	2	25	0	27	1	1	1	24	0
50～54	88	3	0	5	80	0	88	1	4	4	79	0
55～59	115	2	0	5	108	0	115	3	5	8	99	0
60～64	116	5	0	8	103	0	116	4	12	12	88	0
65～69	88	0	0	5	83	0	88	5	10	8	65	0
70～74	59	0	1	3	55	0	59	0	8	7	44	0
75～79	51	0	1	0	50	0	51	3	1	3	44	0
80～84	54	0	0	2	52	0	54	4	4	4	42	0
85～89	44	1	0	3	40	0	44	0	3	3	38	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	1	1	0	10	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	30	6	48	644	0	728	17	32	55	624	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	1	19	0	20	0	1	3	16	0
50～54	76	5	0	7	64	0	76	3	0	4	69	0
55～59	126	3	0	14	109	0	126	1	5	9	111	0
60～64	112	4	1	8	99	0	112	2	8	10	92	0
65～69	96	2	3	7	84	0	96	1	9	10	76	0
70～74	71	7	2	1	61	0	71	2	3	6	60	0
75～79	61	2	0	3	56	0	61	5	2	3	51	0
80～84	69	4	0	2	63	0	69	0	2	6	61	0
85～89	50	3	0	4	43	0	50	2	2	3	43	0
90歳以上	42	0	0	1	41	0	42	1	0	1	40	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 5

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	腹痛						逆流性食道炎					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	23	17	82	1262	0	1384	87	48	66	1183	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	0	6	0	7	1	1	1	4	0
45～49	47	0	2	5	40	0	47	3	4	2	38	0
50～54	164	4	2	12	146	0	164	11	7	10	136	0
55～59	241	2	4	19	216	0	241	10	7	13	211	0
60～64	228	4	2	15	207	0	228	17	7	10	194	0
65～69	184	1	2	11	170	0	184	8	8	13	155	0
70～74	130	4	1	4	121	0	130	8	4	4	114	0
75～79	112	1	1	3	107	0	112	11	5	4	92	0
80～84	123	3	1	4	115	0	123	8	3	4	108	0
85～89	94	3	1	9	81	0	94	7	0	4	83	0
90歳以上	54	0	1	0	53	0	54	3	2	1	48	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	9	4	35	608	0	656	37	13	33	573	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0
45～49	27	0	0	3	24	0	27	2	3	2	20	0
50～54	88	2	1	2	83	0	88	4	4	7	73	0
55～59	115	0	0	5	110	0	115	6	1	3	105	0
60～64	116	2	0	9	105	0	116	9	3	6	98	0
65～69	88	0	0	6	82	0	88	3	0	7	78	0
70～74	59	0	0	3	56	0	59	4	0	2	53	0
75～79	51	0	1	1	49	0	51	2	2	1	46	0
80～84	54	2	0	1	51	0	54	3	0	2	49	0
85～89	44	2	1	5	36	0	44	3	0	3	38	0
90歳以上	12	0	1	0	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	14	13	47	654	0	728	50	35	33	610	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	1	1	3	0
45～49	20	0	2	2	16	0	20	1	1	0	18	0
50～54	76	2	1	10	63	0	76	7	3	3	63	0
55～59	126	2	4	14	106	0	126	4	6	10	106	0
60～64	112	2	2	6	102	0	112	8	4	4	96	0
65～69	96	1	2	5	88	0	96	5	8	6	77	0
70～74	71	4	1	1	65	0	71	4	4	2	61	0
75～79	61	1	0	2	58	0	61	9	3	3	46	0
80～84	69	1	1	3	64	0	69	5	3	2	59	0
85～89	50	1	0	4	45	0	50	4	0	1	45	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	3	2	1	36	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 6

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	1382	20	18	8	1334	4	448	448	83	83
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	1	6	0	3	3	1	1
45～49	47	1	3	0	42	1	12	12	2	2
50～54	164	1	1	1	161	0	61	61	12	12
55～59	241	2	1	3	235	0	88	88	11	11
60～64	228	3	0	0	225	0	77	77	9	9
65～69	184	2	3	0	178	1	59	59	10	10
70～74	130	4	3	1	122	0	40	40	12	12
75～79	112	3	1	0	108	0	40	40	6	6
80～84	123	1	1	1	120	0	34	34	8	8
85～89	94	2	1	0	89	2	18	18	9	9
90歳以上	54	1	4	1	48	0	16	16	3	3
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	14	6	3	631	2	215	215	48	48
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1
45～49	27	1	2	0	23	1	7	7	1	1
50～54	88	1	1	1	85	0	36	36	9	9
55～59	115	2	1	1	111	0	45	45	9	9
60～64	116	1	0	0	115	0	39	39	6	6
65～69	88	2	0	0	86	0	29	29	6	6
70～74	59	3	2	0	54	0	18	18	5	5
75～79	51	2	0	0	49	0	17	17	4	4
80～84	54	1	0	1	52	0	15	15	3	3
85～89	44	1	0	0	42	1	5	5	3	3
90歳以上	12	0	0	0	12	0	4	4	1	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	726	6	12	5	703	2	233	233	35	35
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	3	3	0	0
45～49	20	0	1	0	19	0	5	5	1	1
50～54	76	0	0	0	76	0	25	25	3	3
55～59	126	0	0	2	124	0	43	43	2	2
60～64	112	2	0	0	110	0	38	38	3	3
65～69	96	0	3	0	92	1	30	30	4	4
70～74	71	1	1	1	68	0	22	22	7	7
75～79	61	1	1	0	59	0	23	23	2	2
80～84	69	0	1	0	68	0	19	19	5	5
85～89	50	1	1	0	47	1	13	13	6	6
90歳以上	42	1	4	1	36	0	12	12	2	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 7

血液・リンパの病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	脂質異常症（高脂血症）						貧血					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	211	11	57	1105	0	1384	35	56	66	1227	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	1	6	0	7	0	0	2	5	0
45～49	47	4	0	1	42	0	47	3	2	3	39	0
50～54	164	13	1	5	145	0	164	4	11	14	135	0
55～59	241	34	1	15	191	0	241	4	16	14	207	0
60～64	228	34	1	14	179	0	228	3	10	12	203	0
65～69	184	38	4	7	135	0	184	2	8	3	171	0
70～74	130	29	0	5	96	0	130	3	3	5	119	0
75～79	112	22	0	3	87	0	112	2	2	5	103	0
80～84	123	18	2	2	101	0	123	3	3	5	112	0
85～89	94	13	1	3	77	0	94	6	1	3	84	0
90歳以上	54	6	1	1	46	0	54	5	0	0	49	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	82	2	27	545	0	656	9	3	17	627	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	3	0	1	23	0	27	0	0	1	26	0
50～54	88	6	0	3	79	0	88	1	0	2	85	0
55～59	115	13	0	6	96	0	115	2	1	2	110	0
60～64	116	15	1	8	92	0	116	1	0	4	111	0
65～69	88	15	1	4	68	0	88	1	1	1	85	0
70～74	59	9	0	1	49	0	59	0	0	2	57	0
75～79	51	5	0	0	46	0	51	1	1	1	48	0
80～84	54	8	0	2	44	0	54	1	0	2	51	0
85～89	44	7	0	2	35	0	44	2	0	2	40	0
90歳以上	12	1	0	0	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	129	9	30	560	0	728	26	53	49	600	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	5	0	0	2	3	0
45～49	20	1	0	0	19	0	20	3	2	2	13	0
50～54	76	7	1	2	66	0	76	3	11	12	50	0
55～59	126	21	1	9	95	0	126	2	15	12	97	0
60～64	112	19	0	6	87	0	112	2	10	8	92	0
65～69	96	23	3	3	67	0	96	1	7	2	86	0
70～74	71	20	0	4	47	0	71	3	3	3	62	0
75～79	61	17	0	3	41	0	61	1	1	4	55	0
80～84	69	10	2	0	57	0	69	2	3	3	61	0
85～89	50	6	1	1	42	0	50	4	1	1	44	0
90歳以上	42	5	1	1	35	0	42	5	0	0	37	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 8

血液・リンパの病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	リンパ節の腫大（リンパの腫れ）						その他					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	7	4	11	1362	0	1384	7	1	1	1367	8
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	0	2	1	161	0	164	1	0	0	163	0
55～59	241	1	0	4	236	0	240	0	0	0	240	1
60～64	228	2	0	1	225	0	225	0	0	0	225	3
65～69	184	1	0	1	182	0	184	2	1	0	181	0
70～74	130	0	1	1	128	0	128	2	0	0	126	2
75～79	112	1	0	2	109	0	110	0	0	0	110	2
80～84	123	1	1	1	120	0	123	2	0	1	120	0
85～89	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0
90歳以上	54	1	0	0	53	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	4	2	5	645	0	656	4	1	1	647	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	1	0	87	0	88	1	0	0	87	0
55～59	115	0	0	1	114	0	114	0	0	0	114	1
60～64	116	1	0	1	114	0	115	0	0	0	115	1
65～69	88	0	0	1	87	0	88	0	1	0	87	0
70～74	59	0	1	0	58	0	59	1	0	0	58	0
75～79	51	1	0	1	49	0	50	0	0	0	50	1
80～84	54	1	0	1	52	0	54	2	0	1	51	0
85～89	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	1	0	0	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	3	2	6	717	0	728	3	0	0	720	5
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	1	1	74	0	76	0	0	0	76	0
55～59	126	1	0	3	122	0	126	0	0	0	126	0
60～64	112	1	0	0	111	0	110	0	0	0	110	2
65～69	96	1	0	0	95	0	96	2	0	0	94	0
70～74	71	0	0	1	70	0	69	1	0	0	68	2
75～79	61	0	0	1	60	0	60	0	0	0	60	1
80～84	69	0	1	0	68	0	69	0	0	0	69	0
85～89	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 9

血液・リンパの病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	801	801	161	161
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	3	3	1	1
45～49	32	32	2	2
50～54	99	99	19	19
55～59	143	143	22	22
60～64	138	138	18	18
65～69	103	103	20	20
70～74	60	60	24	24
75～79	62	62	17	17
80～84	68	68	20	20
85～89	56	56	15	15
90歳以上	37	37	3	3
不詳	0	0	0	0
男	429	429	82	82
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	1	1	1	1
45～49	22	22	0	0
50～54	61	61	13	13
55～59	78	78	14	14
60～64	73	73	12	12
65～69	57	57	9	9
70～74	37	37	9	9
75～79	33	33	8	8
80～84	31	31	9	9
85～89	27	27	6	6
90歳以上	9	9	1	1
不詳	0	0	0	0
女	372	372	79	79
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	2	2	0	0
45～49	10	10	2	2
50～54	38	38	6	6
55～59	65	65	8	8
60～64	65	65	6	6
65～69	46	46	11	11
70～74	23	23	15	15
75～79	29	29	9	9
80～84	37	37	11	11
85～89	29	29	9	9
90歳以上	28	28	2	2
不詳	0	0	0	0

別表 1 4 0

脂質異常症（高脂血症） 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	その他	未回答	不詳
総数	220	23	189	3	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	4	1	3	0	0	0
50～54	13	5	8	0	0	0
55～59	36	1	32	2	1	0
60～64	35	1	34	0	0	0
65～69	39	5	32	1	1	0
70～74	30	4	26	0	0	0
75～79	23	3	19	0	1	0
80～84	21	3	16	0	2	0
85～89	13	0	13	0	0	0
90歳以上	6	0	6	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	84	9	71	1	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	3	1	2	0	0	0
50～54	6	2	4	0	0	0
55～59	14	1	11	1	1	0
60～64	15	0	15	0	0	0
65～69	15	2	13	0	0	0
70～74	9	2	7	0	0	0
75～79	5	0	5	0	0	0
80～84	9	1	6	0	2	0
85～89	7	0	7	0	0	0
90歳以上	1	0	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	136	14	118	2	2	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	1	0	0	0
50～54	7	3	4	0	0	0
55～59	22	0	21	1	0	0
60～64	20	1	19	0	0	0
65～69	24	3	19	1	1	0
70～74	21	2	19	0	0	0
75～79	18	3	14	0	1	0
80～84	12	2	10	0	0	0
85～89	6	0	6	0	0	0
90歳以上	5	0	5	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 1

前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	前立腺肥大						男性不妊（子供ができない）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	656	35	17	18	586	0	656	0	1	4	651	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	1	26	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	1	87	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	1	0	2	112	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	3	1	4	108	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	1	2	4	81	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	3	3	2	51	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	9	4	1	37	0	51	0	0	1	50	0
80～84	54	9	2	2	41	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	7	5	1	31	0	44	0	1	0	43	0
90歳以上	12	2	0	0	10	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	35	17	18	586	0	656	0	1	4	651	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	1	26	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	1	87	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	1	0	2	112	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	3	1	4	108	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	1	2	4	81	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	3	3	2	51	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	9	4	1	37	0	51	0	0	1	50	0
80～84	54	9	2	2	41	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	7	5	1	31	0	44	0	1	0	43	0
90歳以上	12	2	0	0	10	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 2

前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	インポテンツ						その他					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	656	6	0	19	631	0	656	8	3	3	639	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	1	87	0	88	1	0	1	86	0
55～59	115	0	0	4	111	0	115	1	0	1	113	0
60～64	116	1	0	3	112	0	116	0	0	1	115	0
65～69	88	2	0	4	82	0	88	1	0	0	87	0
70～74	59	0	0	2	57	0	59	2	1	0	56	0
75～79	51	2	0	1	48	0	50	1	0	0	49	1
80～84	54	1	0	3	50	0	52	1	1	0	50	2
85～89	44	0	0	0	44	0	44	1	0	0	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	1	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	6	0	19	631	0	656	8	3	3	639	3
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	1	87	0	88	1	0	1	86	0
55～59	115	0	0	4	111	0	115	1	0	1	113	0
60～64	116	1	0	3	112	0	116	0	0	1	115	0
65～69	88	2	0	4	82	0	88	1	0	0	87	0
70～74	59	0	0	2	57	0	59	2	1	0	56	0
75～79	51	2	0	1	48	0	50	1	0	0	49	1
80～84	54	1	0	3	50	0	52	1	1	0	50	2
85～89	44	0	0	0	44	0	44	1	0	0	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	1	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 3

前立腺・男性機能に関する病気の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	360	360	192	192
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	19	19	7	7
50～54	58	58	26	26
55～59	74	74	32	32
60～64	66	66	37	37
65～69	54	54	21	21
70～74	27	27	22	22
75～79	27	27	7	7
80～84	18	18	17	17
85～89	12	12	18	18
90歳以上	5	5	4	4
不詳	0	0	0	0
男	360	360	192	192
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	19	19	7	7
50～54	58	58	26	26
55～59	74	74	32	32
60～64	66	66	37	37
65～69	54	54	21	21
70～74	27	27	22	22
75～79	27	27	7	7
80～84	18	18	17	17
85～89	12	12	18	18
90歳以上	5	5	4	4
不詳	0	0	0	0
女	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0

別表 1 4 4

子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）

別

(単位：人)

性 年齢階層	子宮内膜症						子宮筋腫					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	728	3	27	5	693	0	728	13	65	39	611	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	1	0	0	4	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	2	2	2	14	0
50～54	76	0	4	1	71	0	76	3	5	7	61	0
55～59	126	0	5	2	119	0	126	2	9	12	103	0
60～64	112	1	7	1	103	0	112	0	15	10	87	0
65～69	96	0	6	1	89	0	96	2	5	2	87	0
70～74	71	1	2	0	68	0	71	1	10	3	57	0
75～79	61	0	1	0	60	0	61	0	6	0	55	0
80～84	69	1	0	0	68	0	69	2	7	2	58	0
85～89	50	0	2	0	48	0	50	0	4	1	45	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	2	0	40	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	3	27	5	693	0	728	13	65	39	611	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	1	0	0	4	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	2	2	2	14	0
50～54	76	0	4	1	71	0	76	3	5	7	61	0
55～59	126	0	5	2	119	0	126	2	9	12	103	0
60～64	112	1	7	1	103	0	112	0	15	10	87	0
65～69	96	0	6	1	89	0	96	2	5	2	87	0
70～74	71	1	2	0	68	0	71	1	10	3	57	0
75～79	61	0	1	0	60	0	61	0	6	0	55	0
80～84	69	1	0	0	68	0	69	2	7	2	58	0
85～89	50	0	2	0	48	0	50	0	4	1	45	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	2	0	40	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 5

子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）

別

(単位：人)

性 年齢階層	卵巣のう腫						月経困難症（生理痛）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	728	4	32	5	687	0	728	4	13	24	686	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	1	19	0
50～54	76	1	3	1	71	0	76	1	3	3	69	0
55～59	126	1	5	2	118	0	126	2	3	8	113	0
60～64	112	0	8	2	102	0	112	0	1	4	107	0
65～69	96	0	5	0	91	0	95	0	1	2	92	1
70～74	71	0	5	0	66	0	71	1	2	2	66	0
75～79	61	0	2	0	59	0	61	0	1	2	58	0
80～84	69	1	2	0	66	0	69	0	1	1	67	0
85～89	50	1	2	0	47	0	50	0	0	1	49	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	1	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	4	32	5	687	0	728	4	13	24	686	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	1	19	0
50～54	76	1	3	1	71	0	76	1	3	3	69	0
55～59	126	1	5	2	118	0	126	2	3	8	113	0
60～64	112	0	8	2	102	0	112	0	1	4	107	0
65～69	96	0	5	0	91	0	95	0	1	2	92	1
70～74	71	0	5	0	66	0	71	1	2	2	66	0
75～79	61	0	2	0	59	0	61	0	1	2	58	0
80～84	69	1	2	0	66	0	69	0	1	1	67	0
85～89	50	1	2	0	47	0	50	0	0	1	49	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	1	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 6

子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級） 別

(単位：人)

性 年齢階層	不正出血						月経不順					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	728	3	20	11	694	0	728	3	14	29	682	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	2	18	0
50～54	76	1	5	5	65	0	76	1	3	6	66	0
55～59	126	1	5	3	117	0	126	0	2	6	118	0
60～64	112	0	2	0	110	0	112	0	3	4	105	0
65～69	96	0	2	0	94	0	96	1	1	3	91	0
70～74	71	1	3	0	67	0	71	1	1	2	67	0
75～79	61	0	1	0	60	0	61	0	1	1	59	0
80～84	69	0	0	0	69	0	69	0	1	3	65	0
85～89	50	0	0	2	48	0	50	0	1	2	47	0
90歳以上	42	0	2	0	40	0	42	0	1	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	3	20	11	694	0	728	3	14	29	682	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	2	18	0
50～54	76	1	5	5	65	0	76	1	3	6	66	0
55～59	126	1	5	3	117	0	126	0	2	6	118	0
60～64	112	0	2	0	110	0	112	0	3	4	105	0
65～69	96	0	2	0	94	0	96	1	1	3	91	0
70～74	71	1	3	0	67	0	71	1	1	2	67	0
75～79	61	0	1	0	60	0	61	0	1	1	59	0
80～84	69	0	0	0	69	0	69	0	1	3	65	0
85～89	50	0	0	2	48	0	50	0	1	2	47	0
90歳以上	42	0	2	0	40	0	42	0	1	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 7

子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）
別

(単位：人)

性 年齢階層	過多月経（月経が多い）						過少月経（月経が少ない）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	728	5	12	15	696	0	728	2	0	8	718	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	1	4	0
45～49	20	2	0	1	17	0	20	0	0	1	19	0
50～54	76	0	3	4	69	0	76	1	0	2	73	0
55～59	126	2	2	3	119	0	126	0	0	1	125	0
60～64	112	0	4	1	107	0	112	0	0	1	111	0
65～69	96	1	0	1	94	0	96	0	0	0	96	0
70～74	71	0	1	1	69	0	71	1	0	0	70	0
75～79	61	0	1	1	59	0	61	0	0	1	60	0
80～84	69	0	1	1	67	0	69	0	0	1	68	0
85～89	50	0	0	2	48	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	5	12	15	696	0	728	2	0	8	718	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	1	4	0
45～49	20	2	0	1	17	0	20	0	0	1	19	0
50～54	76	0	3	4	69	0	76	1	0	2	73	0
55～59	126	2	2	3	119	0	126	0	0	1	125	0
60～64	112	0	4	1	107	0	112	0	0	1	111	0
65～69	96	1	0	1	94	0	96	0	0	0	96	0
70～74	71	0	1	1	69	0	71	1	0	0	70	0
75～79	61	0	1	1	59	0	61	0	0	1	60	0
80～84	69	0	1	1	67	0	69	0	0	1	68	0
85～89	50	0	0	2	48	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 8

子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）

別

(単位：人)

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	728	12	9	1	701	5	321	321	184	184
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	0	4	0	3	3	0	0
45～49	20	0	0	0	20	0	6	6	4	4
50～54	76	0	2	0	74	0	30	30	16	16
55～59	126	2	2	0	122	0	59	59	23	23
60～64	112	3	3	0	105	1	47	47	22	22
65～69	96	2	1	0	93	0	45	45	27	27
70～74	71	0	0	1	69	1	29	29	20	20
75～79	61	1	0	0	59	1	34	34	18	18
80～84	69	2	1	0	66	0	25	25	23	23
85～89	50	0	0	0	50	0	23	23	17	17
90歳以上	42	1	0	0	39	2	20	20	14	14
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	12	9	1	701	5	321	321	184	184
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	0	4	0	3	3	0	0
45～49	20	0	0	0	20	0	6	6	4	4
50～54	76	0	2	0	74	0	30	30	16	16
55～59	126	2	2	0	122	0	59	59	23	23
60～64	112	3	3	0	105	1	47	47	22	22
65～69	96	2	1	0	93	0	45	45	27	27
70～74	71	0	0	1	69	1	29	29	20	20
75～79	61	1	0	0	59	1	34	34	18	18
80～84	69	2	1	0	66	0	25	25	23	23
85～89	50	0	0	0	50	0	23	23	17	17
90歳以上	42	1	0	0	39	2	20	20	14	14
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 9

初経のあり・なし、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	728	419	2	307	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	2	0	3	0
45～49	20	9	0	11	0
50～54	76	50	0	26	0
55～59	126	84	0	42	0
60～64	112	63	0	49	0
65～69	96	64	0	32	0
70～74	71	29	1	41	0
75～79	61	32	0	29	0
80～84	69	43	0	26	0
85～89	50	22	1	27	0
90歳以上	42	21	0	21	0
不詳	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	419	2	307	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	2	0	3	0
45～49	20	9	0	11	0
50～54	76	50	0	26	0
55～59	126	84	0	42	0
60～64	112	63	0	49	0
65～69	96	64	0	32	0
70～74	71	29	1	41	0
75～79	61	32	0	29	0
80～84	69	43	0	26	0
85～89	50	22	1	27	0
90歳以上	42	21	0	21	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 1 5 0

閉経のあり・なし、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	728	386	44	298	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	0	4	1	0
45～49	20	1	15	4	0
50～54	76	31	22	23	0
55～59	126	84	1	41	0
60～64	112	62	0	50	0
65～69	96	64	0	32	0
70～74	71	27	1	43	0
75～79	61	31	0	30	0
80～84	69	43	0	26	0
85～89	50	22	1	27	0
90歳以上	42	21	0	21	0
不詳	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	386	44	298	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	0	4	1	0
45～49	20	1	15	4	0
50～54	76	31	22	23	0
55～59	126	84	1	41	0
60～64	112	62	0	50	0
65～69	96	64	0	32	0
70～74	71	27	1	43	0
75～79	61	31	0	30	0
80～84	69	43	0	26	0
85～89	50	22	1	27	0
90歳以上	42	21	0	21	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 1 5 1

不妊症、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	728	27	510	191	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	0	4	1	0
45～49	20	1	11	8	0
50～54	76	3	56	17	0
55～59	126	8	93	25	0
60～64	112	4	79	29	0
65～69	96	5	70	21	0
70～74	71	3	40	28	0
75～79	61	2	46	13	0
80～84	69	1	48	20	0
85～89	50	0	32	18	0
90歳以上	42	0	31	11	0
不詳	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	728	27	510	191	0
30～34歳	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0
40～44	5	0	4	1	0
45～49	20	1	11	8	0
50～54	76	3	56	17	0
55～59	126	8	93	25	0
60～64	112	4	79	29	0
65～69	96	5	70	21	0
70～74	71	3	40	28	0
75～79	61	2	46	13	0
80～84	69	1	48	20	0
85～89	50	0	32	18	0
90歳以上	42	0	31	11	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 1 5 2

妊娠回数 1、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	0	1	2	3	4	5	6
総数	728	84	64	212	161	86	27	21
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	2	1	0	1	0	0	0
45～49	17	2	2	5	4	4	0	0
50～54	72	16	11	19	14	7	4	1
55～59	121	23	12	44	26	14	1	1
60～64	104	18	13	37	24	9	2	1
65～69	87	10	8	27	24	12	5	1
70～74	63	6	6	25	12	9	3	2
75～79	51	4	2	20	19	5	1	0
80～84	62	2	5	18	17	9	7	4
85～89	39	0	0	11	10	10	4	4
90歳以上	35	1	4	6	10	7	0	7
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	84	64	212	161	86	27	21
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	2	1	0	1	0	0	0
45～49	17	2	2	5	4	4	0	0
50～54	72	16	11	19	14	7	4	1
55～59	121	23	12	44	26	14	1	1
60～64	104	18	13	37	24	9	2	1
65～69	87	10	8	27	24	12	5	1
70～74	63	6	6	25	12	9	3	2
75～79	51	4	2	20	19	5	1	0
80～84	62	2	5	18	17	9	7	4
85～89	39	0	0	11	10	10	4	4
90歳以上	35	1	4	6	10	7	0	7
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 5 3

妊娠回数 2、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	7	8	9	10	11回以上	未回答	不詳
総数	728	6	6	1	0	3	57	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	0	0	0	0	0	1	0
45～49	17	1	1	0	0	0	1	0
50～54	72	0	0	0	0	0	4	0
55～59	121	0	0	0	0	0	5	0
60～64	104	0	1	0	0	0	7	0
65～69	87	0	0	0	0	0	9	0
70～74	63	0	0	0	0	0	8	0
75～79	51	1	2	0	0	0	7	0
80～84	62	1	0	1	0	1	4	0
85～89	39	2	1	0	0	0	8	0
90歳以上	35	1	1	0	0	2	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	6	6	1	0	3	57	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	0	0	0	0	0	1	0
45～49	17	1	1	0	0	0	1	0
50～54	72	0	0	0	0	0	4	0
55～59	121	0	0	0	0	0	5	0
60～64	104	0	1	0	0	0	7	0
65～69	87	0	0	0	0	0	9	0
70～74	63	0	0	0	0	0	8	0
75～79	51	1	2	0	0	0	7	0
80～84	62	1	0	1	0	1	4	0
85～89	39	2	1	0	0	0	8	0
90歳以上	35	1	1	0	0	2	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 5 4

妊娠中の状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	とくにな し	切迫流産	切迫早産	妊娠中毒 症	その他	未回答	不詳
総数	1384	1053	106	20	47	66	92	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	3	0	1	0	0	0	0
45～49	42	29	5	1	3	2	2	0
50～54	119	90	12	1	4	5	7	0
55～59	207	144	22	8	7	13	13	0
60～64	191	131	21	4	11	14	10	0
65～69	168	128	14	1	10	9	6	0
70～74	120	82	13	1	5	4	15	0
75～79	120	98	7	0	2	4	9	0
80～84	178	144	10	2	4	9	9	0
85～89	129	112	0	0	1	6	10	0
90歳以上	106	92	2	1	0	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1384	1053	106	20	47	66	92	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	3	0	1	0	0	0	0
45～49	42	29	5	1	3	2	2	0
50～54	119	90	12	1	4	5	7	0
55～59	207	144	22	8	7	13	13	0
60～64	191	131	21	4	11	14	10	0
65～69	168	128	14	1	10	9	6	0
70～74	120	82	13	1	5	4	15	0
75～79	120	98	7	0	2	4	9	0
80～84	178	144	10	2	4	9	9	0
85～89	129	112	0	0	1	6	10	0
90歳以上	106	92	2	1	0	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 5 5

出産について、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	正常分娩	帝王切開	早産	死産	自然流産	人工流産	その他	未回答	不詳
総数	1540	1157	64	28	19	112	86	24	50	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	51	30	7	0	0	8	4	0	2	0
50～54	132	89	13	0	1	15	10	1	3	0
55～59	233	184	13	5	3	17	5	1	5	0
60～64	199	146	8	5	2	13	16	2	7	0
65～69	199	139	10	5	2	21	9	11	2	0
70～74	138	95	7	5	0	5	16	4	6	0
75～79	136	108	3	2	2	6	8	2	5	0
80～84	191	148	2	3	5	17	7	2	7	0
85～89	143	115	1	2	4	5	11	1	4	0
90歳以上	114	99	0	1	0	5	0	0	9	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1540	1157	64	28	19	112	86	24	50	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	51	30	7	0	0	8	4	0	2	0
50～54	132	89	13	0	1	15	10	1	3	0
55～59	233	184	13	5	3	17	5	1	5	0
60～64	199	146	8	5	2	13	16	2	7	0
65～69	199	139	10	5	2	21	9	11	2	0
70～74	138	95	7	5	0	5	16	4	6	0
75～79	136	108	3	2	2	6	8	2	5	0
80～84	191	148	2	3	5	17	7	2	7	0
85～89	143	115	1	2	4	5	11	1	4	0
90歳以上	114	99	0	1	0	5	0	0	9	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 5 6

出産時の出血量、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	小	中	多	未回答	不詳
総数	1126	191	620	81	234	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	4	0	4	0	0	0
45～49	35	10	13	7	5	0
50～54	103	17	56	14	16	0
55～59	172	37	90	12	33	0
60～64	158	40	81	10	27	0
65～69	147	21	89	10	27	0
70～74	87	6	36	8	37	0
75～79	109	7	79	8	15	0
80～84	141	28	77	9	27	0
85～89	91	14	52	1	24	0
90歳以上	79	11	43	2	23	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	1126	191	620	81	234	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	4	0	4	0	0	0
45～49	35	10	13	7	5	0
50～54	103	17	56	14	16	0
55～59	172	37	90	12	33	0
60～64	158	40	81	10	27	0
65～69	147	21	89	10	27	0
70～74	87	6	36	8	37	0
75～79	109	7	79	8	15	0
80～84	141	28	77	9	27	0
85～89	91	14	52	1	24	0
90歳以上	79	11	43	2	23	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 1 5 7

新生児の状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	とくにな し	低出生体 重児	先天異常	奇形	その他	未回答	不詳
総数	1180	1057	40	7	7	49	20	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	4	0	0	0	0	0	0
45～49	36	34	1	0	0	1	0	0
50～54	99	88	3	2	0	5	1	0
55～59	193	178	4	0	0	8	3	0
60～64	150	139	5	2	0	2	2	0
65～69	145	133	4	1	4	2	1	0
70～74	96	84	3	0	0	8	1	0
75～79	110	90	9	1	1	8	1	0
80～84	145	121	7	0	2	10	5	0
85～89	112	101	3	0	0	5	3	0
90歳以上	90	85	1	1	0	0	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1180	1057	40	7	7	49	20	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	4	4	0	0	0	0	0	0
45～49	36	34	1	0	0	1	0	0
50～54	99	88	3	2	0	5	1	0
55～59	193	178	4	0	0	8	3	0
60～64	150	139	5	2	0	2	2	0
65～69	145	133	4	1	4	2	1	0
70～74	96	84	3	0	0	8	1	0
75～79	110	90	9	1	1	8	1	0
80～84	145	121	7	0	2	10	5	0
85～89	112	101	3	0	0	5	3	0
90歳以上	90	85	1	1	0	0	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 5 8

骨・関節の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	骨折						椎間板ヘルニア					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	38	202	15	1129	0	1384	48	45	33	1258	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	1	0	6	0	7	1	0	0	6	0
45～49	47	0	6	0	41	0	47	2	4	1	40	0
50～54	164	1	24	1	138	0	164	5	4	5	150	0
55～59	241	5	35	2	199	0	241	12	5	6	218	0
60～64	228	1	25	1	201	0	228	6	10	7	205	0
65～69	184	1	32	1	150	0	184	4	6	4	170	0
70～74	130	10	18	0	102	0	130	6	8	2	114	0
75～79	112	3	10	1	98	0	112	6	4	1	101	0
80～84	123	6	16	5	96	0	123	3	2	4	114	0
85～89	94	8	22	4	60	0	94	2	2	3	87	0
90歳以上	54	3	13	0	38	0	54	1	0	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	17	79	6	554	0	656	29	34	19	574	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	5	0	22	0	27	1	3	1	22	0
50～54	88	1	16	0	71	0	88	4	2	2	80	0
55～59	115	4	16	0	95	0	115	11	4	2	98	0
60～64	116	1	11	0	104	0	116	3	7	5	101	0
65～69	88	0	13	1	74	0	88	2	5	2	79	0
70～74	59	5	6	0	48	0	59	2	7	1	49	0
75～79	51	1	4	0	46	0	51	4	4	0	43	0
80～84	54	2	3	4	45	0	54	0	0	4	50	0
85～89	44	3	5	1	35	0	44	2	2	2	38	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	21	123	9	575	0	728	19	11	14	684	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	1	0	4	0	5	1	0	0	4	0
45～49	20	0	1	0	19	0	20	1	1	0	18	0
50～54	76	0	8	1	67	0	76	1	2	3	70	0
55～59	126	1	19	2	104	0	126	1	1	4	120	0
60～64	112	0	14	1	97	0	112	3	3	2	104	0
65～69	96	1	19	0	76	0	96	2	1	2	91	0
70～74	71	5	12	0	54	0	71	4	1	1	65	0
75～79	61	2	6	1	52	0	61	2	0	1	58	0
80～84	69	4	13	1	51	0	69	3	2	0	64	0
85～89	50	5	17	3	25	0	50	0	0	1	49	0
90歳以上	42	3	13	0	26	0	42	1	0	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 5 9

骨・関節の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	骨粗しょう症						骨の変形					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	168	8	42	1166	0	1384	50	5	52	1277	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	1	46	0	47	0	1	0	46	0
50～54	164	2	0	1	161	0	164	2	0	4	158	0
55～59	241	7	0	3	231	0	241	3	2	7	229	0
60～64	228	14	1	8	205	0	228	4	0	10	214	0
65～69	184	21	0	8	155	0	184	8	0	8	168	0
70～74	130	30	0	6	94	0	130	9	0	0	121	0
75～79	112	29	2	3	78	0	112	5	1	8	98	0
80～84	123	32	0	4	87	0	123	12	0	9	102	0
85～89	94	17	3	4	70	0	94	5	1	5	83	0
90歳以上	54	16	2	4	32	0	54	2	0	1	51	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	19	1	12	624	0	656	7	2	10	637	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	1	0	26	0
50～54	88	0	0	1	87	0	88	0	0	1	87	0
55～59	115	1	0	0	114	0	115	1	0	1	113	0
60～64	116	2	1	2	111	0	116	0	0	1	115	0
65～69	88	2	0	3	83	0	88	2	0	2	84	0
70～74	59	4	0	3	52	0	59	2	0	0	57	0
75～79	51	3	0	0	48	0	51	0	1	2	48	0
80～84	54	3	0	3	48	0	54	1	0	3	50	0
85～89	44	4	0	0	40	0	44	1	0	0	43	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	149	7	30	542	0	728	43	3	42	640	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	1	19	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	2	0	0	74	0	76	2	0	3	71	0
55～59	126	6	0	3	117	0	126	2	2	6	116	0
60～64	112	12	0	6	94	0	112	4	0	9	99	0
65～69	96	19	0	5	72	0	96	6	0	6	84	0
70～74	71	26	0	3	42	0	71	7	0	0	64	0
75～79	61	26	2	3	30	0	61	5	0	6	50	0
80～84	69	29	0	1	39	0	69	11	0	6	52	0
85～89	50	13	3	4	30	0	50	4	1	5	40	0
90歳以上	42	16	2	4	20	0	42	2	0	1	39	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 0

骨・関節の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	痛風						関節痛					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	53	12	16	1303	0	1384	138	21	137	1088	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	1	6	0
45～49	47	2	1	1	43	0	47	2	1	4	40	0
50～54	164	4	2	2	156	0	164	10	1	18	135	0
55～59	241	10	4	2	225	0	241	11	1	32	197	0
60～64	228	12	1	2	213	0	228	18	6	27	177	0
65～69	184	5	2	3	174	0	184	24	4	19	137	0
70～74	130	10	0	1	119	0	130	14	1	5	110	0
75～79	112	5	0	1	106	0	112	21	1	9	81	0
80～84	123	2	1	2	118	0	123	20	2	9	92	0
85～89	94	3	1	2	88	0	94	10	1	8	75	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	8	3	5	38	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	48	10	13	585	0	656	38	2	62	554	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
45～49	27	2	1	1	23	0	27	0	1	3	23	0
50～54	88	4	0	2	82	0	88	3	0	7	78	0
55～59	115	10	4	1	100	0	115	2	0	13	100	0
60～64	116	10	1	0	105	0	116	7	1	11	97	0
65～69	88	5	2	3	78	0	88	9	0	10	69	0
70～74	59	9	0	1	49	0	59	5	0	4	50	0
75～79	51	5	0	1	45	0	51	4	0	5	42	0
80～84	54	1	1	2	50	0	54	3	0	4	47	0
85～89	44	2	1	2	39	0	44	1	0	4	39	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	4	0	0	8	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	5	2	3	718	0	728	100	19	75	534	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	2	0	1	17	0
50～54	76	0	2	0	74	0	76	7	1	11	57	0
55～59	126	0	0	1	125	0	126	9	1	19	97	0
60～64	112	2	0	2	108	0	112	11	5	16	80	0
65～69	96	0	0	0	96	0	96	15	4	9	68	0
70～74	71	1	0	0	70	0	71	9	1	1	60	0
75～79	61	0	0	0	61	0	61	17	1	4	39	0
80～84	69	1	0	0	68	0	69	17	2	5	45	0
85～89	50	1	0	0	49	0	50	9	1	4	36	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	4	3	5	30	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 1

骨・関節の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	ガングリオン						骨痛（骨がうずくような痛み）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	15	57	37	1275	0	1384	31	1	42	1310	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	1	46	0	47	0	0	2	45	0
50～54	164	1	7	4	152	0	164	1	0	5	158	0
55～59	241	2	13	8	218	0	241	5	0	7	229	0
60～64	228	2	14	7	205	0	228	1	1	10	216	0
65～69	184	2	13	5	164	0	184	6	0	3	175	0
70～74	130	4	0	2	124	0	130	5	0	2	123	0
75～79	112	1	1	5	105	0	112	3	0	4	105	0
80～84	123	2	2	1	118	0	123	9	0	4	110	0
85～89	94	0	6	3	85	0	94	1	0	5	88	0
90歳以上	54	1	1	1	51	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	4	18	10	624	0	656	5	1	16	634	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	2	25	0
50～54	88	0	1	2	85	0	88	0	0	3	85	0
55～59	115	1	4	3	107	0	115	1	0	1	113	0
60～64	116	2	7	1	106	0	116	0	1	4	111	0
65～69	88	0	4	2	82	0	88	1	0	1	86	0
70～74	59	1	0	0	58	0	59	0	0	1	58	0
75～79	51	0	0	1	50	0	51	1	0	1	49	0
80～84	54	0	1	1	52	0	54	2	0	3	49	0
85～89	44	0	1	0	43	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	11	39	27	651	0	728	26	0	26	676	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	1	19	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	1	6	2	67	0	76	1	0	2	73	0
55～59	126	1	9	5	111	0	126	4	0	6	116	0
60～64	112	0	7	6	99	0	112	1	0	6	105	0
65～69	96	2	9	3	82	0	96	5	0	2	89	0
70～74	71	3	0	2	66	0	71	5	0	1	65	0
75～79	61	1	1	4	55	0	61	2	0	3	56	0
80～84	69	2	1	0	66	0	69	7	0	1	61	0
85～89	50	0	5	3	42	0	50	1	0	5	44	0
90歳以上	42	1	1	1	39	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 2

骨・関節の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	肩こり						腰痛					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	171	18	337	858	0	1384	268	62	350	704	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	3	4	0	7	1	0	4	2	0
45～49	47	2	0	20	25	0	47	5	3	16	23	0
50～54	164	13	2	58	91	0	164	20	8	52	84	0
55～59	241	25	4	82	130	0	241	31	13	82	115	0
60～64	228	20	5	58	145	0	228	34	11	64	119	0
65～69	184	19	3	44	118	0	184	35	7	45	97	0
70～74	130	28	2	22	78	0	130	36	7	21	66	0
75～79	112	12	0	17	83	0	112	31	5	22	54	0
80～84	123	34	1	17	71	0	123	40	3	22	58	0
85～89	94	10	1	11	72	0	94	22	3	17	52	0
90歳以上	54	8	0	5	41	0	54	13	2	5	34	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	49	7	124	476	0	656	112	29	167	348	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0
45～49	27	1	0	7	19	0	27	3	2	7	15	0
50～54	88	3	1	19	65	0	88	6	4	24	54	0
55～59	115	9	2	29	75	0	115	12	4	40	59	0
60～64	116	11	2	19	84	0	116	19	7	31	59	0
65～69	88	4	0	20	64	0	88	17	2	22	47	0
70～74	59	7	1	10	41	0	59	15	4	13	27	0
75～79	51	1	0	10	40	0	51	11	3	10	27	0
80～84	54	9	0	6	39	0	54	13	1	9	31	0
85～89	44	3	1	4	36	0	44	12	2	8	22	0
90歳以上	12	1	0	0	11	0	12	3	0	2	7	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	122	11	213	382	0	728	156	33	183	356	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	3	2	0	5	0	0	3	2	0
45～49	20	1	0	13	6	0	20	2	1	9	8	0
50～54	76	10	1	39	26	0	76	14	4	28	30	0
55～59	126	16	2	53	55	0	126	19	9	42	56	0
60～64	112	9	3	39	61	0	112	15	4	33	60	0
65～69	96	15	3	24	54	0	96	18	5	23	50	0
70～74	71	21	1	12	37	0	71	21	3	8	39	0
75～79	61	11	0	7	43	0	61	20	2	12	27	0
80～84	69	25	1	11	32	0	69	27	2	13	27	0
85～89	50	7	0	7	36	0	50	10	1	9	30	0
90歳以上	42	7	0	5	30	0	42	10	2	3	27	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 3

骨・関節の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	1378	22	7	14	1333	8	267	267	68	68
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	0	0	1	1
45～49	47	0	1	0	46	0	8	8	1	1
50～54	164	2	2	2	158	0	39	39	7	7
55～59	241	4	1	3	232	1	50	50	7	7
60～64	228	2	1	1	223	1	42	42	13	13
65～69	184	3	1	1	177	2	39	39	12	12
70～74	130	1	0	3	126	0	19	19	6	6
75～79	112	6	0	0	104	2	24	24	5	5
80～84	123	2	1	0	119	1	21	21	8	8
85～89	94	0	0	3	91	0	18	18	6	6
90歳以上	54	2	0	1	50	1	7	7	2	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	13	4	7	630	2	164	164	44	44
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
45～49	27	0	1	0	26	0	6	6	0	0
50～54	88	2	1	0	85	0	28	28	5	5
55～59	115	3	0	1	110	1	28	28	6	6
60～64	116	1	0	0	115	0	24	24	10	10
65～69	88	2	1	1	83	1	20	20	7	7
70～74	59	0	0	2	57	0	12	12	3	3
75～79	51	4	0	0	47	0	17	17	4	4
80～84	54	0	1	0	53	0	14	14	6	6
85～89	44	0	0	3	41	0	11	11	3	3
90歳以上	12	1	0	0	11	0	4	4	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	722	9	3	7	703	6	103	103	24	24
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	0	0	1	1
45～49	20	0	0	0	20	0	2	2	1	1
50～54	76	0	1	2	73	0	11	11	2	2
55～59	126	1	1	2	122	0	22	22	1	1
60～64	112	1	1	1	108	1	18	18	3	3
65～69	96	1	0	0	94	1	19	19	5	5
70～74	71	1	0	1	69	0	7	7	3	3
75～79	61	2	0	0	57	2	7	7	1	1
80～84	69	2	0	0	66	1	7	7	2	2
85～89	50	0	0	0	50	0	7	7	3	3
90歳以上	42	1	0	1	39	1	3	3	2	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 4

骨粗しょう症 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総数	206	21	135	36	10	4	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	1	0	1	0	0
55～59	9	1	4	3	0	1	0
60～64	16	1	13	2	0	0	0
65～69	22	2	14	4	0	2	0
70～74	35	5	24	4	2	0	0
75～79	40	4	26	7	2	1	0
80～84	46	4	28	10	4	0	0
85～89	19	1	14	4	0	0	0
90歳以上	17	3	11	2	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	24	2	14	4	3	1	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	0	1	0
60～64	3	1	2	0	0	0	0
65～69	2	0	0	2	0	0	0
70～74	5	0	4	1	0	0	0
75～79	5	0	3	1	1	0	0
80～84	4	0	2	0	2	0	0
85～89	4	1	3	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	182	19	121	32	7	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	2	0	1	0	1	0	0
55～59	8	1	4	3	0	0	0
60～64	13	0	11	2	0	0	0
65～69	20	2	14	2	0	2	0
70～74	30	5	20	3	2	0	0
75～79	35	4	23	6	1	1	0
80～84	42	4	26	10	2	0	0
85～89	15	0	11	4	0	0	0
90歳以上	17	3	11	2	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 5

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	ざ瘡（にきび）						毛孔の開大・面疱（毛穴が広がる、黒にきび）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	24	35	135	1190	0	1384	16	14	107	1247	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	1	6	0	7	0	0	1	6	0
45～49	47	1	1	2	43	0	47	0	1	0	46	0
50～54	164	4	4	23	133	0	164	1	1	14	148	0
55～59	241	2	6	27	206	0	241	1	3	22	215	0
60～64	228	0	9	26	193	0	228	0	3	19	206	0
65～69	184	5	4	19	156	0	184	4	2	18	160	0
70～74	130	3	3	13	111	0	130	3	2	12	113	0
75～79	112	4	3	8	97	0	112	3	0	9	100	0
80～84	123	4	3	8	108	0	123	3	0	4	116	0
85～89	94	1	2	6	85	0	94	1	2	7	84	0
90歳以上	54	0	0	2	52	0	54	0	0	1	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	11	11	68	566	0	656	3	6	45	602	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	1	0	25	0	27	0	1	0	26	0
50～54	88	2	0	12	74	0	88	0	0	8	80	0
55～59	115	1	1	11	102	0	115	0	2	6	107	0
60～64	116	0	3	16	97	0	116	0	1	5	110	0
65～69	88	3	1	14	70	0	88	2	1	12	73	0
70～74	59	0	1	6	52	0	59	0	0	5	54	0
75～79	51	2	3	2	44	0	51	0	0	4	47	0
80～84	54	1	0	2	51	0	54	0	0	0	54	0
85～89	44	1	1	3	39	0	44	1	1	5	37	0
90歳以上	12	0	0	2	10	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	13	24	67	624	0	728	13	8	62	645	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	5	0	0	1	4	0
45～49	20	0	0	2	18	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	2	4	11	59	0	76	1	1	6	68	0
55～59	126	1	5	16	104	0	126	1	1	16	108	0
60～64	112	0	6	10	96	0	112	0	2	14	96	0
65～69	96	2	3	5	86	0	96	2	1	6	87	0
70～74	71	3	2	7	59	0	71	3	2	7	59	0
75～79	61	2	0	6	53	0	61	3	0	5	53	0
80～84	69	3	3	6	57	0	69	3	0	4	62	0
85～89	50	0	1	3	46	0	50	0	1	2	47	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	0	1	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 6

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	色素沈着（肌が黒くなる）						爪の変形					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	28	15	124	1217	0	1384	76	9	263	1036	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	1	0	1	5	0
45～49	47	0	0	6	41	0	47	3	0	9	35	0
50～54	164	2	1	17	144	0	164	4	0	29	131	0
55～59	241	3	4	18	216	0	241	6	0	43	192	0
60～64	228	2	0	27	199	0	228	7	2	48	171	0
65～69	184	4	0	16	164	0	184	4	2	45	133	0
70～74	130	6	3	9	112	0	130	13	0	15	102	0
75～79	112	3	2	13	94	0	112	10	3	27	72	0
80～84	123	5	2	10	106	0	123	16	2	15	90	0
85～89	94	3	3	7	81	0	94	7	0	21	66	0
90歳以上	54	0	0	1	53	0	54	5	0	10	39	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	14	4	48	590	0	656	26	3	120	507	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	2	25	0	27	1	0	6	20	0
50～54	88	1	0	5	82	0	88	1	0	13	74	0
55～59	115	1	1	6	107	0	115	3	0	20	92	0
60～64	116	2	0	13	101	0	116	4	1	23	88	0
65～69	88	3	0	10	75	0	88	0	0	25	63	0
70～74	59	2	0	4	53	0	59	4	0	7	48	0
75～79	51	1	1	4	45	0	51	2	2	11	36	0
80～84	54	1	0	2	51	0	54	5	0	6	43	0
85～89	44	3	2	2	37	0	44	6	0	6	32	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	3	9	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	14	11	76	627	0	728	50	6	143	529	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	1	0	1	3	0
45～49	20	0	0	4	16	0	20	2	0	3	15	0
50～54	76	1	1	12	62	0	76	3	0	16	57	0
55～59	126	2	3	12	109	0	126	3	0	23	100	0
60～64	112	0	0	14	98	0	112	3	1	25	83	0
65～69	96	1	0	6	89	0	96	4	2	20	70	0
70～74	71	4	3	5	59	0	71	9	0	8	54	0
75～79	61	2	1	9	49	0	61	8	1	16	36	0
80～84	69	4	2	8	55	0	69	11	2	9	47	0
85～89	50	0	1	5	44	0	50	1	0	15	34	0
90歳以上	42	0	0	1	41	0	42	5	0	7	30	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 7

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	粉瘤（皮膚のふくら）						粘液嚢腫（関節のふくら）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	31	39	83	1230	1	1384	5	3	8	1368	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	1	6	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	2	2	43	0	47	0	0	0	47	0
50～54	163	1	6	8	148	1	164	0	0	1	163	0
55～59	241	6	9	16	210	0	241	1	0	2	238	0
60～64	228	1	4	18	205	0	228	0	0	1	227	0
65～69	184	4	5	14	161	0	184	2	0	2	180	0
70～74	130	3	3	4	120	0	130	0	1	0	129	0
75～79	112	7	4	10	91	0	112	1	0	1	110	0
80～84	123	8	2	4	109	0	123	1	0	0	122	0
85～89	94	0	3	4	87	0	94	0	2	1	91	0
90歳以上	54	1	1	2	50	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	11	18	39	587	1	656	1	0	3	652	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	2	0	25	0	27	0	0	0	27	0
50～54	87	0	3	3	81	1	88	0	0	0	88	0
55～59	115	4	3	7	101	0	115	0	0	1	114	0
60～64	116	0	2	9	105	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	2	3	9	74	0	88	1	0	2	85	0
70～74	59	0	1	2	56	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	2	2	4	43	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	2	0	3	49	0	54	0	0	0	54	0
85～89	44	0	1	2	41	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	1	1	0	10	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	20	21	44	643	0	728	4	3	5	716	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	2	18	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	1	3	5	67	0	76	0	0	1	75	0
55～59	126	2	6	9	109	0	126	1	0	1	124	0
60～64	112	1	2	9	100	0	112	0	0	1	111	0
65～69	96	2	2	5	87	0	96	1	0	0	95	0
70～74	71	3	2	2	64	0	71	0	1	0	70	0
75～79	61	5	2	6	48	0	61	1	0	1	59	0
80～84	69	6	2	1	60	0	69	1	0	0	68	0
85～89	50	0	2	2	46	0	50	0	2	1	47	0
90歳以上	42	0	0	2	40	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 8

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	掌跖膿疱症						湿疹がしやすい					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	7	12	17	1348	0	1384	161	22	150	1050	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	2	5	0
45～49	47	2	0	1	44	0	47	6	1	3	37	0
50～54	164	1	2	1	160	0	164	17	2	19	126	0
55～59	241	1	1	5	234	0	241	14	5	33	189	0
60～64	228	0	2	1	225	0	228	14	2	31	181	0
65～69	184	1	0	3	180	0	184	25	1	22	136	0
70～74	130	1	0	1	128	0	130	21	2	11	96	0
75～79	112	1	2	3	106	0	111	24	1	10	76	1
80～84	123	0	0	1	122	0	123	22	1	7	93	0
85～89	94	0	4	1	89	0	94	14	5	8	67	0
90歳以上	54	0	1	0	53	0	54	4	2	4	44	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	3	2	10	641	0	656	61	7	64	524	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
45～49	27	1	0	1	25	0	27	2	0	1	24	0
50～54	88	1	1	1	85	0	88	8	0	9	71	0
55～59	115	1	0	3	111	0	115	3	3	11	98	0
60～64	116	0	1	1	114	0	116	7	1	17	91	0
65～69	88	0	0	3	85	0	88	12	0	10	66	0
70～74	59	0	0	0	59	0	59	9	0	4	46	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	5	1	5	40	0
80～84	54	0	0	0	54	0	54	6	0	1	47	0
85～89	44	0	0	1	43	0	44	8	2	4	30	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	1	0	1	10	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	4	10	7	707	0	728	100	15	86	526	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	1	4	0
45～49	20	1	0	0	19	0	20	4	1	2	13	0
50～54	76	0	1	0	75	0	76	9	2	10	55	0
55～59	126	0	1	2	123	0	126	11	2	22	91	0
60～64	112	0	1	0	111	0	112	7	1	14	90	0
65～69	96	1	0	0	95	0	96	13	1	12	70	0
70～74	71	1	0	1	69	0	71	12	2	7	50	0
75～79	61	1	2	3	55	0	60	19	0	5	36	1
80～84	69	0	0	1	68	0	69	16	1	6	46	0
85～89	50	0	4	0	46	0	50	6	3	4	37	0
90歳以上	42	0	1	0	41	0	42	3	2	3	34	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 9

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	皮膚の掻痒（かゆみ）						乾燥肌（さめ肌）					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	191	28	266	899	0	1384	94	6	168	1116	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	2	5	0
45～49	47	4	1	12	30	0	47	1	1	9	36	0
50～54	164	15	5	30	114	0	164	5	1	19	139	0
55～59	241	19	6	51	165	0	241	8	1	44	188	0
60～64	228	27	5	54	142	0	228	8	0	25	195	0
65～69	184	20	1	37	126	0	184	10	2	21	151	0
70～74	130	20	2	24	84	0	130	12	1	10	107	0
75～79	112	25	3	20	64	0	112	15	0	9	88	0
80～84	123	32	3	18	70	0	123	20	0	14	89	0
85～89	94	22	2	16	54	0	94	12	0	12	70	0
90歳以上	54	7	0	4	43	0	54	3	0	3	48	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	85	12	133	426	0	656	38	2	72	544	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	2	0	7	18	0	27	1	0	5	21	0
50～54	88	8	1	14	65	0	88	2	1	8	77	0
55～59	115	8	3	21	83	0	115	4	0	18	93	0
60～64	116	14	2	26	74	0	116	6	0	10	100	0
65～69	88	12	1	19	56	0	88	3	1	11	73	0
70～74	59	9	1	15	34	0	59	3	0	7	49	0
75～79	51	7	2	13	29	0	51	3	0	4	44	0
80～84	54	13	1	8	32	0	54	9	0	5	40	0
85～89	44	11	1	9	23	0	44	7	0	3	34	0
90歳以上	12	1	0	1	10	0	12	0	0	1	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	106	16	133	473	0	728	56	4	96	572	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	2	3	0
45～49	20	2	1	5	12	0	20	0	1	4	15	0
50～54	76	7	4	16	49	0	76	3	0	11	62	0
55～59	126	11	3	30	82	0	126	4	1	26	95	0
60～64	112	13	3	28	68	0	112	2	0	15	95	0
65～69	96	8	0	18	70	0	96	7	1	10	78	0
70～74	71	11	1	9	50	0	71	9	1	3	58	0
75～79	61	18	1	7	35	0	61	12	0	5	44	0
80～84	69	19	2	10	38	0	69	11	0	9	49	0
85～89	50	11	1	7	31	0	50	5	0	9	36	0
90歳以上	42	6	0	3	33	0	42	3	0	2	37	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 0

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	脱毛						白斑					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	19	15	59	1291	0	1384	9	0	27	1348	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	0	6	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	1	46	0
50～54	164	1	2	4	157	0	164	0	0	1	163	0
55～59	241	2	3	10	226	0	241	1	0	6	234	0
60～64	228	4	2	12	210	0	228	2	0	4	222	0
65～69	184	3	1	15	165	0	184	0	0	5	179	0
70～74	130	3	2	4	121	0	130	3	0	2	125	0
75～79	112	0	4	5	103	0	112	2	0	3	107	0
80～84	123	3	1	2	117	0	123	1	0	2	120	0
85～89	94	2	0	5	87	0	94	0	0	3	91	0
90歳以上	54	0	0	2	52	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	9	5	32	610	0	656	3	0	12	641	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	1	4	83	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	1	1	6	107	0	115	0	0	3	112	0
60～64	116	3	0	7	106	0	116	2	0	1	113	0
65～69	88	1	0	11	76	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	1	0	1	57	0	59	1	0	1	57	0
75～79	51	0	2	1	48	0	51	0	0	2	49	0
80～84	54	1	1	0	52	0	54	0	0	2	52	0
85～89	44	1	0	1	42	0	44	0	0	1	43	0
90歳以上	12	0	0	1	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	10	10	27	681	0	728	6	0	15	707	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	1	19	0
50～54	76	1	1	0	74	0	76	0	0	1	75	0
55～59	126	1	2	4	119	0	126	1	0	3	122	0
60～64	112	1	2	5	104	0	112	0	0	3	109	0
65～69	96	2	1	4	89	0	96	0	0	3	93	0
70～74	71	2	2	3	64	0	71	2	0	1	68	0
75～79	61	0	2	4	55	0	61	2	0	1	58	0
80～84	69	2	0	2	65	0	69	1	0	0	68	0
85～89	50	1	0	4	45	0	50	0	0	2	48	0
90歳以上	42	0	0	1	41	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 1

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 7、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	紫斑（内出血）						その他					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	24	2	69	1289	0	1384	23	8	18	1323	12
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	1	0	0	6	0
45～49	47	0	0	0	47	0	46	0	0	0	46	1
50～54	164	0	0	6	158	0	164	2	2	1	159	0
55～59	241	1	1	9	230	0	239	4	1	4	230	2
60～64	228	1	1	13	213	0	226	2	1	2	221	2
65～69	184	1	0	10	173	0	183	5	1	5	172	1
70～74	130	4	0	6	120	0	129	1	1	5	122	1
75～79	112	4	0	10	98	0	111	0	0	0	111	1
80～84	123	7	0	6	110	0	121	3	0	1	117	2
85～89	94	5	0	8	81	0	92	3	0	0	89	2
90歳以上	54	1	0	1	52	0	54	2	2	0	50	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	9	0	19	628	0	656	10	4	8	627	7
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	26	0	0	0	26	1
50～54	88	0	0	1	87	0	88	1	2	1	84	0
55～59	115	0	0	2	113	0	115	2	0	2	111	0
60～64	116	1	0	1	114	0	116	1	0	1	114	0
65～69	88	1	0	4	83	0	87	0	0	3	84	1
70～74	59	1	0	2	56	0	58	1	1	1	55	1
75～79	51	1	0	4	46	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	3	0	2	49	0	52	2	0	0	50	2
85～89	44	2	0	3	39	0	42	2	0	0	40	2
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	1	1	0	10	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	15	2	50	661	0	728	13	4	10	696	5
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	1	0	0	4	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	0	5	71	0	76	1	0	0	75	0
55～59	126	1	1	7	117	0	124	2	1	2	119	2
60～64	112	0	1	12	99	0	110	1	1	1	107	2
65～69	96	0	0	6	90	0	96	5	1	2	88	0
70～74	71	3	0	4	64	0	71	0	0	4	67	0
75～79	61	3	0	6	52	0	60	0	0	0	60	1
80～84	69	4	0	4	61	0	69	1	0	1	67	0
85～89	50	3	0	5	42	0	50	1	0	0	49	0
90歳以上	42	1	0	1	40	0	42	1	1	0	40	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 2

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 8、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	398	398	103	103
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	13	13	2	2
50～54	51	51	12	12
55～59	79	79	15	15
60～64	69	69	12	12
65～69	54	54	11	11
70～74	33	33	18	18
75～79	21	21	9	9
80～84	35	35	10	10
85～89	24	24	9	9
90歳以上	19	19	4	4
不詳	0	0	0	0
男	198	198	60	60
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	10	10	1	1
50～54	29	29	9	9
55～59	40	40	11	11
60～64	35	35	9	9
65～69	29	29	4	4
70～74	17	17	6	6
75～79	11	11	8	8
80～84	14	14	7	7
85～89	10	10	4	4
90歳以上	3	3	1	1
不詳	0	0	0	0
女	200	200	43	43
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	3	3	1	1
50～54	22	22	3	3
55～59	39	39	4	4
60～64	34	34	3	3
65～69	25	25	7	7
70～74	16	16	12	12
75～79	10	10	1	1
80～84	21	21	3	3
85～89	14	14	5	5
90歳以上	16	16	3	3
不詳	0	0	0	0

別表 1 7 3

湿疹が特にしやすい場所、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	関節の裏 (ひじ、じ ざ)	顔面	体躯(胸、 背中、 腹、腰)	その他	未回答	不詳
総数	456	52	84	223	84	13	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	1	1	0	0
45～49	15	1	4	7	3	0	0
50～54	47	1	9	24	13	0	0
55～59	67	8	13	27	14	5	0
60～64	63	9	15	29	8	2	0
65～69	67	8	11	36	10	2	0
70～74	47	5	9	24	9	0	0
75～79	49	7	6	25	10	1	0
80～84	45	7	9	23	4	2	0
85～89	41	6	6	18	10	1	0
90歳以上	13	0	2	9	2	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	174	17	27	99	28	3	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	1	0	0	0
45～49	5	0	1	3	1	0	0
50～54	21	1	1	13	6	0	0
55～59	19	2	3	10	4	0	0
60～64	34	5	7	16	4	2	0
65～69	31	4	4	18	4	1	0
70～74	13	0	1	10	2	0	0
75～79	17	3	3	9	2	0	0
80～84	12	1	4	6	1	0	0
85～89	18	1	2	11	4	0	0
90歳以上	3	0	1	2	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	282	35	57	124	56	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1	0	0	0	1	0	0
45～49	10	1	3	4	2	0	0
50～54	26	0	8	11	7	0	0
55～59	48	6	10	17	10	5	0
60～64	29	4	8	13	4	0	0
65～69	36	4	7	18	6	1	0
70～74	34	5	8	14	7	0	0
75～79	32	4	3	16	8	1	0
80～84	33	6	5	17	3	2	0
85～89	23	5	4	7	6	1	0
90歳以上	10	0	1	7	2	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 4

アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）
別

（単位：人）

性 年齢階層	アトピー性皮膚炎						アレルギー性鼻炎					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	18	10	24	1332	0	1384	105	33	101	1145	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	2	1	43	0	47	2	2	2	41	0
50～54	164	0	2	5	157	0	164	11	3	17	133	0
55～59	241	3	3	6	229	0	241	26	10	24	181	0
60～64	228	5	1	4	218	0	228	24	7	19	178	0
65～69	184	2	1	2	179	0	184	11	7	9	157	0
70～74	130	3	0	0	127	0	130	15	3	9	103	0
75～79	112	2	0	2	108	0	112	4	0	7	101	0
80～84	123	0	0	2	121	0	123	8	0	8	107	0
85～89	94	2	1	2	89	0	94	3	1	5	85	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	1	0	1	52	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	8	3	11	634	0	656	33	9	44	570	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	2	1	24	0	27	1	1	2	23	0
50～54	88	0	1	3	84	0	88	1	1	7	79	0
55～59	115	1	0	2	112	0	115	9	4	5	97	0
60～64	116	3	0	1	112	0	116	10	1	10	95	0
65～69	88	2	0	1	85	0	88	4	1	6	77	0
70～74	59	0	0	0	59	0	59	5	1	4	49	0
75～79	51	1	0	0	50	0	51	0	0	2	49	0
80～84	54	0	0	1	53	0	54	2	0	4	48	0
85～89	44	1	0	2	41	0	44	1	0	4	39	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	10	7	13	698	0	728	72	24	57	575	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	1	0	0	19	0	20	1	1	0	18	0
50～54	76	0	1	2	73	0	76	10	2	10	54	0
55～59	126	2	3	4	117	0	126	17	6	19	84	0
60～64	112	2	1	3	106	0	112	14	6	9	83	0
65～69	96	0	1	1	94	0	96	7	6	3	80	0
70～74	71	3	0	0	68	0	71	10	2	5	54	0
75～79	61	1	0	2	58	0	61	4	0	5	52	0
80～84	69	0	0	1	68	0	69	6	0	4	59	0
85～89	50	1	1	0	48	0	50	2	1	1	46	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	1	0	1	40	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 5

アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）
別

(単位：人)

性 年齢階層	花粉症						喘息					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	170	24	154	1035	1	1384	53	36	29	1266	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	2	0	0	5	0	7	0	2	0	5	0
45～49	47	9	1	6	31	0	47	0	1	0	46	0
50～54	163	20	1	27	115	1	164	1	6	7	150	0
55～59	241	42	7	36	156	0	241	8	7	8	218	0
60～64	228	35	3	23	167	0	228	6	7	5	210	0
65～69	184	20	5	17	142	0	184	6	6	3	169	0
70～74	130	21	2	13	94	0	130	8	0	1	121	0
75～79	112	11	0	15	86	0	112	7	1	1	103	0
80～84	123	8	1	9	105	0	123	13	1	3	106	0
85～89	94	0	4	6	84	0	94	1	4	1	88	0
90歳以上	54	2	0	2	50	0	54	3	1	0	50	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	62	7	70	516	1	656	16	15	17	608	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	3	0	3	21	0	27	0	1	0	26	0
50～54	87	6	0	14	67	1	88	1	3	4	80	0
55～59	115	19	2	16	78	0	115	0	3	5	107	0
60～64	116	10	1	10	95	0	116	4	2	3	107	0
65～69	88	11	0	7	70	0	88	3	3	2	80	0
70～74	59	6	0	5	48	0	59	1	0	0	58	0
75～79	51	2	0	8	41	0	51	4	1	0	46	0
80～84	54	3	1	4	46	0	54	3	1	2	48	0
85～89	44	0	3	3	38	0	44	0	1	1	42	0
90歳以上	12	1	0	0	11	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	108	17	84	519	0	728	37	21	12	658	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	0	4	0	5	0	2	0	3	0
45～49	20	6	1	3	10	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	14	1	13	48	0	76	0	3	3	70	0
55～59	126	23	5	20	78	0	126	8	4	3	111	0
60～64	112	25	2	13	72	0	112	2	5	2	103	0
65～69	96	9	5	10	72	0	96	3	3	1	89	0
70～74	71	15	2	8	46	0	71	7	0	1	63	0
75～79	61	9	0	7	45	0	61	3	0	1	57	0
80～84	69	5	0	5	59	0	69	10	0	1	58	0
85～89	50	0	1	3	46	0	50	1	3	0	46	0
90歳以上	42	1	0	2	39	0	42	3	1	0	38	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 6

アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）

別

(単位：人)

性 年齢階層	蕁麻疹						食物アレルギー					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	44	85	53	1202	0	1384	17	15	62	1290	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	1	0	5	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	2	2	3	40	0	47	0	1	0	46	0
50～54	164	8	8	11	137	0	164	6	0	10	148	0
55～59	241	5	20	9	207	0	241	5	4	14	218	0
60～64	228	2	21	9	196	0	228	0	2	11	215	0
65～69	184	6	16	7	155	0	184	1	5	9	169	0
70～74	130	10	2	6	112	0	130	2	0	5	123	0
75～79	112	5	5	1	101	0	112	2	2	3	105	0
80～84	123	2	3	4	114	0	123	0	0	4	119	0
85～89	94	3	6	1	84	0	94	1	1	3	89	0
90歳以上	54	0	1	2	51	0	54	0	0	3	51	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	16	20	22	598	0	656	4	3	29	620	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	2	2	22	0	27	0	1	0	26	0
50～54	88	2	4	6	76	0	88	1	0	6	81	0
55～59	115	2	4	1	108	0	115	2	1	8	104	0
60～64	116	1	5	4	106	0	116	0	1	5	110	0
65～69	88	5	2	4	77	0	88	1	0	4	83	0
70～74	59	2	1	3	53	0	59	0	0	4	55	0
75～79	51	2	1	1	47	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	0	0	1	53	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	1	1	0	42	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	1	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	28	65	31	604	0	728	13	12	33	670	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	1	0	3	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	1	0	1	18	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	6	4	5	61	0	76	5	0	4	67	0
55～59	126	3	16	8	99	0	126	3	3	6	114	0
60～64	112	1	16	5	90	0	112	0	1	6	105	0
65～69	96	1	14	3	78	0	96	0	5	5	86	0
70～74	71	8	1	3	59	0	71	2	0	1	68	0
75～79	61	3	4	0	54	0	61	2	2	3	54	0
80～84	69	2	3	3	61	0	69	0	0	3	66	0
85～89	50	2	5	1	42	0	50	1	1	3	45	0
90歳以上	42	0	1	2	39	0	42	0	0	2	40	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 7

アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）
別

(単位：人)

性 年齢階層	薬物アレルギー						その他					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	11	21	48	1304	0	1384	10	2	7	1354	11
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	1	1	44	0	46	1	0	1	44	1
50～54	164	2	1	8	153	0	162	0	0	0	162	2
55～59	241	2	6	8	225	0	241	3	0	0	238	0
60～64	228	0	2	7	219	0	225	1	1	1	222	3
65～69	184	1	4	10	169	0	183	0	1	1	181	1
70～74	130	3	2	3	122	0	130	3	0	1	126	0
75～79	112	0	3	3	106	0	109	1	0	0	108	3
80～84	123	0	0	4	119	0	123	0	0	1	122	0
85～89	94	2	2	4	86	0	93	0	0	0	93	1
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	1	0	2	51	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	3	7	16	630	0	656	3	0	2	651	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	1	1	25	0	27	1	0	1	25	0
50～54	88	1	0	3	84	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	1	1	3	110	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	0	1	3	112	0	116	1	0	0	115	0
65～69	88	0	2	3	83	0	88	0	0	0	88	0
70～74	59	0	0	1	58	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	0	1	1	49	0	51	1	0	0	50	0
80～84	54	0	0	1	53	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	1	1	0	42	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	8	14	32	674	0	728	7	2	5	703	11
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	1	0	0	19	0	19	0	0	0	19	1
50～54	76	1	1	5	69	0	74	0	0	0	74	2
55～59	126	1	5	5	115	0	126	3	0	0	123	0
60～64	112	0	1	4	107	0	109	0	1	1	107	3
65～69	96	1	2	7	86	0	95	0	1	1	93	1
70～74	71	3	2	2	64	0	71	3	0	1	67	0
75～79	61	0	2	2	57	0	58	0	0	0	58	3
80～84	69	0	0	3	66	0	69	0	0	0	69	0
85～89	50	1	1	4	44	0	49	0	0	0	49	1
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	1	0	2	39	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 8

アレルギー疾患の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）

別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	615	615	115	115
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	2	2	1	1
45～49	20	20	3	3
50～54	64	64	12	12
55～59	84	84	12	12
60～64	100	100	17	17
65～69	83	83	14	14
70～74	57	57	11	11
75～79	52	52	14	14
80～84	69	69	14	14
85～89	53	53	12	12
90歳以上	31	31	5	5
不詳	0	0	0	0
男	334	334	67	67
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	0	0	1	1
45～49	14	14	1	1
50～54	38	38	8	8
55～59	48	48	10	10
60～64	60	60	13	13
65～69	46	46	8	8
70～74	35	35	4	4
75～79	24	24	9	9
80～84	33	33	7	7
85～89	27	27	5	5
90歳以上	9	9	1	1
不詳	0	0	0	0
女	281	281	48	48
30～34歳	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0
40～44	2	2	0	0
45～49	6	6	2	2
50～54	26	26	4	4
55～59	36	36	2	2
60～64	40	40	4	4
65～69	37	37	6	6
70～74	22	22	7	7
75～79	28	28	5	5
80～84	36	36	7	7
85～89	26	26	7	7
90歳以上	22	22	4	4
不詳	0	0	0	0

別表 1 7 9

膠原病（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	関節リウマチ						全身性エリテマトーデス (SLE)					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	27	3	6	1348	0	1384	2	0	4	1378	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0
35～39	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47	0
40～44	7	0	0	0	7	0	164	0	0	1	163	0
45～49	47	0	0	0	47	0	241	0	0	1	240	0
50～54	164	2	0	1	161	0	228	2	0	0	226	0
55～59	241	5	0	1	235	0	184	0	0	1	183	0
60～64	228	6	0	0	222	0	130	0	0	0	130	0
65～69	184	4	2	2	176	0	112	0	0	0	112	0
70～74	130	1	1	1	127	0	123	0	0	1	122	0
75～79	112	4	0	0	108	0	94	0	0	0	94	0
80～84	123	4	0	1	118	0	54	0	0	0	54	0
85～89	94	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	54	1	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	7	1	3	645	0	656	0	0	2	654	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
35～39	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27	0
40～44	2	0	0	0	2	0	88	0	0	0	88	0
45～49	27	0	0	0	27	0	115	0	0	0	115	0
50～54	88	0	0	0	88	0	116	0	0	0	116	0
55～59	115	1	0	0	114	0	88	0	0	1	87	0
60～64	116	1	0	0	115	0	59	0	0	0	59	0
65～69	88	3	1	1	83	0	51	0	0	0	51	0
70～74	59	0	0	1	58	0	54	0	0	1	53	0
75～79	51	2	0	0	49	0	44	0	0	0	44	0
80～84	54	0	0	1	53	0	12	0	0	0	12	0
85～89	44	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	20	2	3	703	0	728	2	0	2	724	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0
35～39	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0
40～44	5	0	0	0	5	0	76	0	0	1	75	0
45～49	20	0	0	0	20	0	126	0	0	1	125	0
50～54	76	2	0	1	73	0	112	2	0	0	110	0
55～59	126	4	0	1	121	0	96	0	0	0	96	0
60～64	112	5	0	0	107	0	71	0	0	0	71	0
65～69	96	1	1	1	93	0	61	0	0	0	61	0
70～74	71	1	1	0	69	0	69	0	0	0	69	0
75～79	61	2	0	0	59	0	50	0	0	0	50	0
80～84	69	4	0	0	65	0	42	0	0	0	42	0
85～89	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	42	1	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 8 0

膠原病（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	強皮症						皮膚筋炎					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	3	1	4	1376	0	1384	1	0	3	1380	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0
55～59	241	1	0	1	239	0	241	0	0	1	240	0
60～64	228	2	0	0	226	0	228	0	0	0	228	0
65～69	184	0	1	1	182	0	184	0	0	1	183	0
70～74	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0
75～79	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0
80～84	123	0	0	1	122	0	123	1	0	1	121	0
85～89	94	0	0	1	93	0	94	0	0	0	94	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	0	1	2	653	0	656	0	0	2	654	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	0	1	1	86	0	88	0	0	1	87	0
70～74	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	0	0	1	53	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	3	0	2	723	0	728	1	0	1	726	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0
55～59	126	1	0	1	124	0	126	0	0	1	125	0
60～64	112	2	0	0	110	0	112	0	0	0	112	0
65～69	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0
70～74	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0
75～79	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0
80～84	69	0	0	0	69	0	69	1	0	0	68	0
85～89	50	0	0	1	49	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 8 1

膠原病（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	シェーグレン症候群						ベーチェット病					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	5	0	5	1374	0	1384	1	1	3	1379	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0
50～54	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0
55～59	241	0	0	1	240	0	241	0	1	1	239	0
60～64	228	3	0	2	223	0	228	1	0	0	227	0
65～69	184	0	0	1	183	0	184	0	0	1	183	0
70～74	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0
75～79	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0
80～84	123	2	0	1	120	0	123	0	0	1	122	0
85～89	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0
90歳以上	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	0	0	2	654	0	656	1	0	2	653	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0
55～59	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0
60～64	116	0	0	0	116	0	116	1	0	0	115	0
65～69	88	0	0	1	87	0	88	0	0	1	87	0
70～74	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	0	0	1	53	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	5	0	3	720	0	728	0	1	1	726	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
50～54	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0
55～59	126	0	0	1	125	0	126	0	1	1	124	0
60～64	112	3	0	2	107	0	112	0	0	0	112	0
65～69	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0
70～74	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0
75～79	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0
80～84	69	2	0	0	67	0	69	0	0	0	69	0
85～89	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0
90歳以上	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 8 2

膠原病（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	1381	10	1	2	1366	5	1081	1081	241	241
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	5	5	2	2
45～49	47	1	0	0	46	0	38	38	8	8
50～54	164	1	0	0	163	0	138	138	21	21
55～59	241	2	1	0	237	1	199	199	30	30
60～64	228	3	0	0	224	1	181	181	33	33
65～69	184	2	0	0	182	0	143	143	31	31
70～74	130	0	0	1	128	1	91	91	34	34
75～79	112	1	0	0	110	1	83	83	23	23
80～84	123	0	0	0	122	1	89	89	27	27
85～89	94	0	0	1	93	0	70	70	23	23
90歳以上	54	0	0	0	54	0	44	44	9	9
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	3	0	0	651	2	517	517	121	121
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
45～49	27	0	0	0	27	0	23	23	4	4
50～54	88	1	0	0	87	0	73	73	14	14
55～59	115	1	0	0	113	1	92	92	20	20
60～64	116	1	0	0	115	0	95	95	18	18
65～69	88	0	0	0	88	0	67	67	15	15
70～74	59	0	0	0	59	0	48	48	10	10
75～79	51	0	0	0	51	0	37	37	12	12
80～84	54	0	0	0	53	1	38	38	14	14
85～89	44	0	0	0	44	0	33	33	11	11
90歳以上	12	0	0	0	12	0	10	10	2	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	725	7	1	2	715	3	564	564	120	120
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	4	4	1	1
45～49	20	1	0	0	19	0	15	15	4	4
50～54	76	0	0	0	76	0	65	65	7	7
55～59	126	1	1	0	124	0	107	107	10	10
60～64	112	2	0	0	109	1	86	86	15	15
65～69	96	2	0	0	94	0	76	76	16	16
70～74	71	0	0	1	69	1	43	43	24	24
75～79	61	1	0	0	59	1	46	46	11	11
80～84	69	0	0	0	69	0	51	51	13	13
85～89	50	0	0	1	49	0	37	37	12	12
90歳以上	42	0	0	0	42	0	34	34	7	7
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 8 3

膠原病（複数回答） 現在の治療状況、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	食事または運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総数	47	3	26	5	3	10	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	1	0	0	0	0
50～54	4	0	2	1	0	1	0
55～59	8	0	4	0	0	4	0
60～64	14	1	8	2	2	1	0
65～69	5	0	2	0	0	3	0
70～74	1	0	0	0	0	1	0
75～79	5	1	3	0	1	0	0
80～84	7	1	5	1	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	2	0	1	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	11	0	6	0	0	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	1	0	0	0	0	1	0
55～59	2	0	1	0	0	1	0
60～64	3	0	2	0	0	1	0
65～69	3	0	1	0	0	2	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	2	0	2	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	36	3	20	5	3	5	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	1	0	0	0	0
50～54	3	0	2	1	0	0	0
55～59	6	0	3	0	0	3	0
60～64	11	1	6	2	2	0	0
65～69	2	0	1	0	0	1	0
70～74	1	0	0	0	0	1	0
75～79	3	1	1	0	1	0	0
80～84	7	1	5	1	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	2	0	1	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 8 4

その他の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	全身倦怠感（体がだるい）						手足のしびれ					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	114	5	321	944	0	1384	160	12	330	881	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	5	1	0	7	0	0	2	5	0
45～49	47	4	0	13	30	0	47	3	0	8	36	0
50～54	164	11	0	35	118	0	163	11	0	30	122	1
55～59	241	16	1	66	158	0	241	17	2	71	151	0
60～64	228	16	1	60	151	0	228	15	2	62	149	0
65～69	184	13	1	52	118	0	184	20	4	55	105	0
70～74	130	9	1	33	87	0	130	22	2	23	83	0
75～79	112	11	0	18	83	0	112	17	0	24	71	0
80～84	123	12	0	20	91	0	123	28	1	26	68	0
85～89	94	13	1	14	66	0	94	18	1	18	57	0
90歳以上	54	8	0	5	41	0	54	9	0	11	34	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	39	3	142	472	0	656	63	7	145	440	1
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	8	19	0	27	1	0	6	20	0
50～54	88	2	0	15	71	0	87	7	0	11	69	1
55～59	115	7	1	26	81	0	115	9	0	32	74	0
60～64	116	7	1	30	78	0	116	6	2	30	78	0
65～69	88	4	0	26	58	0	88	9	2	26	51	0
70～74	59	4	0	18	37	0	59	5	1	14	39	0
75～79	51	2	0	7	42	0	51	5	0	11	35	0
80～84	54	6	0	5	43	0	54	10	1	8	35	0
85～89	44	4	1	5	34	0	44	9	1	6	28	0
90歳以上	12	2	0	1	9	0	12	2	0	1	9	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	75	2	179	472	0	728	97	5	185	441	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	4	1	0	5	0	0	2	3	0
45～49	20	4	0	5	11	0	20	2	0	2	16	0
50～54	76	9	0	20	47	0	76	4	0	19	53	0
55～59	126	9	0	40	77	0	126	8	2	39	77	0
60～64	112	9	0	30	73	0	112	9	0	32	71	0
65～69	96	9	1	26	60	0	96	11	2	29	54	0
70～74	71	5	1	15	50	0	71	17	1	9	44	0
75～79	61	9	0	11	41	0	61	12	0	13	36	0
80～84	69	6	0	15	48	0	69	18	0	18	33	0
85～89	50	9	0	9	32	0	50	9	0	12	29	0
90歳以上	42	6	0	4	32	0	42	7	0	10	25	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 8 5

その他の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	体がつる						のどがつる					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	84	2	238	1059	1	1384	7	0	25	1352	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	2	4	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	2	0	4	41	0	47	1	0	1	45	0
50～54	163	7	0	24	132	1	164	0	0	4	160	0
55～59	241	8	0	45	188	0	241	1	0	6	234	0
60～64	228	10	0	53	165	0	228	0	0	1	227	0
65～69	184	13	0	40	131	0	184	1	0	3	180	0
70～74	130	10	1	19	100	0	130	1	0	1	128	0
75～79	112	9	0	21	82	0	112	0	0	1	111	0
80～84	123	13	0	14	96	0	123	1	0	3	119	0
85～89	94	4	1	15	74	0	94	1	0	5	88	0
90歳以上	54	7	0	1	46	0	54	1	0	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	31	1	118	505	1	656	2	0	9	645	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	1	0	2	24	0	27	0	0	1	26	0
50～54	87	4	0	12	71	1	88	0	0	2	86	0
55～59	115	3	0	21	91	0	115	0	0	1	114	0
60～64	116	5	0	29	82	0	116	0	0	0	116	0
65～69	88	6	0	23	59	0	88	0	0	2	86	0
70～74	59	2	0	14	43	0	59	0	0	1	58	0
75～79	51	2	0	8	41	0	51	0	0	0	51	0
80～84	54	2	0	5	47	0	54	0	0	1	53	0
85～89	44	3	1	3	37	0	44	1	0	1	42	0
90歳以上	12	2	0	0	10	0	12	1	0	0	11	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	53	1	120	554	0	728	5	0	16	707	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	1	4	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	1	0	2	17	0	20	1	0	0	19	0
50～54	76	3	0	12	61	0	76	0	0	2	74	0
55～59	126	5	0	24	97	0	126	1	0	5	120	0
60～64	112	5	0	24	83	0	112	0	0	1	111	0
65～69	96	7	0	17	72	0	96	1	0	1	94	0
70～74	71	8	1	5	57	0	71	1	0	0	70	0
75～79	61	7	0	13	41	0	61	0	0	1	60	0
80～84	69	11	0	9	49	0	69	1	0	2	66	0
85～89	50	1	0	12	37	0	50	0	0	4	46	0
90歳以上	42	5	0	1	36	0	42	0	0	0	42	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 8 6

その他の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	筋肉の痛み						体がむくむ					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	102	2	151	1129	0	1384	90	8	133	1153	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	2	5	0
45～49	47	2	0	3	42	0	47	1	1	4	41	0
50～54	164	5	0	15	144	0	164	6	1	20	137	0
55～59	241	12	0	29	200	0	241	8	2	26	205	0
60～64	228	15	0	28	185	0	228	9	0	20	199	0
65～69	184	12	1	20	151	0	184	9	2	24	149	0
70～74	130	11	1	13	105	0	130	9	0	6	115	0
75～79	112	10	0	15	87	0	112	12	0	7	93	0
80～84	123	20	0	16	87	0	123	12	0	11	100	0
85～89	94	10	0	10	74	0	94	12	0	10	72	0
90歳以上	54	5	0	2	47	0	54	12	2	3	37	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	36	0	68	552	0	656	22	1	48	585	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	2	25	0	27	0	0	3	24	0
50～54	88	2	0	5	81	0	88	2	0	8	78	0
55～59	115	5	0	10	100	0	115	2	0	9	104	0
60～64	116	10	0	16	90	0	116	3	0	8	105	0
65～69	88	4	0	14	70	0	88	2	1	10	75	0
70～74	59	2	0	7	50	0	59	2	0	2	55	0
75～79	51	3	0	5	43	0	51	2	0	2	47	0
80～84	54	5	0	5	44	0	54	3	0	3	48	0
85～89	44	3	0	4	37	0	44	3	0	3	38	0
90歳以上	12	2	0	0	10	0	12	3	0	0	9	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	66	2	83	577	0	728	68	7	85	568	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	2	3	0
45～49	20	2	0	1	17	0	20	1	1	1	17	0
50～54	76	3	0	10	63	0	76	4	1	12	59	0
55～59	126	7	0	19	100	0	126	6	2	17	101	0
60～64	112	5	0	12	95	0	112	6	0	12	94	0
65～69	96	8	1	6	81	0	96	7	1	14	74	0
70～74	71	9	1	6	55	0	71	7	0	4	60	0
75～79	61	7	0	10	44	0	61	10	0	5	46	0
80～84	69	15	0	11	43	0	69	9	0	8	52	0
85～89	50	7	0	6	37	0	50	9	0	7	34	0
90歳以上	42	3	0	2	37	0	42	9	2	3	28	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 8 7

その他の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	日光に当たると顔が腫れたり湿疹ができたりする						指が腫れる					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	26	9	65	1284	0	1384	49	1	103	1231	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	1	0	2	4	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	1	0	2	44	0	47	2	0	1	44	0
50～54	164	4	3	5	152	0	164	2	0	12	150	0
55～59	241	4	1	14	222	0	241	5	1	17	218	0
60～64	228	4	2	15	207	0	228	6	0	24	198	0
65～69	184	3	0	8	173	0	184	7	0	21	156	0
70～74	130	3	1	8	118	0	130	10	0	7	113	0
75～79	112	1	2	3	106	0	112	8	0	4	100	0
80～84	123	3	0	3	117	0	123	5	0	10	108	0
85～89	94	2	0	4	88	0	94	3	0	7	84	0
90歳以上	54	0	0	1	53	0	54	1	0	0	53	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	5	1	18	632	0	656	8	0	30	618	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	2	25	0	27	0	0	0	27	0
50～54	88	1	0	0	87	0	88	1	0	4	83	0
55～59	115	0	0	5	110	0	115	1	0	4	110	0
60～64	116	2	1	5	108	0	116	2	0	7	107	0
65～69	88	1	0	3	84	0	88	2	0	7	79	0
70～74	59	0	0	1	58	0	59	1	0	1	57	0
75～79	51	0	0	0	51	0	51	0	0	2	49	0
80～84	54	0	0	1	53	0	54	0	0	3	51	0
85～89	44	1	0	1	42	0	44	1	0	2	41	0
90歳以上	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	21	8	47	652	0	728	41	1	73	613	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	1	0	2	2	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	1	0	0	19	0	20	2	0	1	17	0
50～54	76	3	3	5	65	0	76	1	0	8	67	0
55～59	126	4	1	9	112	0	126	4	1	13	108	0
60～64	112	2	1	10	99	0	112	4	0	17	91	0
65～69	96	2	0	5	89	0	96	5	0	14	77	0
70～74	71	3	1	7	60	0	71	9	0	6	56	0
75～79	61	1	2	3	55	0	61	8	0	2	51	0
80～84	69	3	0	2	64	0	69	5	0	7	57	0
85～89	50	1	0	3	46	0	50	2	0	5	43	0
90歳以上	42	0	0	1	41	0	42	1	0	0	41	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 8 8

その他の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	全身に痛みがある						手足に痛みがある					
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	1384	46	1	61	1276	0	1384	154	5	206	1019	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
45～49	47	2	0	2	43	0	47	2	1	7	37	0
50～54	164	3	0	4	157	0	164	12	0	19	133	0
55～59	241	3	0	8	230	0	241	12	2	42	185	0
60～64	228	7	0	6	215	0	228	20	1	43	164	0
65～69	184	4	0	10	170	0	184	21	0	25	138	0
70～74	130	6	0	5	119	0	130	18	0	22	90	0
75～79	112	5	1	6	100	0	112	21	0	9	82	0
80～84	123	6	0	13	104	0	123	23	0	19	81	0
85～89	94	6	0	6	82	0	94	15	1	12	66	0
90歳以上	54	4	0	1	49	0	54	10	0	8	36	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	13	0	19	624	0	656	39	2	79	536	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
45～49	27	0	0	2	25	0	27	0	0	4	23	0
50～54	88	1	0	1	86	0	88	5	0	5	78	0
55～59	115	1	0	2	112	0	115	4	1	16	94	0
60～64	116	3	0	2	111	0	116	6	0	21	89	0
65～69	88	1	0	5	82	0	88	7	0	12	69	0
70～74	59	2	0	2	55	0	59	2	0	12	45	0
75～79	51	1	0	1	49	0	51	4	0	2	45	0
80～84	54	2	0	3	49	0	54	4	0	4	46	0
85～89	44	1	0	1	42	0	44	5	1	3	35	0
90歳以上	12	1	0	0	11	0	12	2	0	0	10	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	728	33	1	42	652	0	728	115	3	127	483	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
45～49	20	2	0	0	18	0	20	2	1	3	14	0
50～54	76	2	0	3	71	0	76	7	0	14	55	0
55～59	126	2	0	6	118	0	126	8	1	26	91	0
60～64	112	4	0	4	104	0	112	14	1	22	75	0
65～69	96	3	0	5	88	0	96	14	0	13	69	0
70～74	71	4	0	3	64	0	71	16	0	10	45	0
75～79	61	4	1	5	51	0	61	17	0	7	37	0
80～84	69	4	0	10	55	0	69	19	0	15	35	0
85～89	50	5	0	5	40	0	50	10	0	9	31	0
90歳以上	42	3	0	1	38	0	42	8	0	8	26	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 8 9

その他の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関 で治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	1374	16	1	35	1312	20	388	388	103	103
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	7	0	0	0	7	0	1	1	0	0
45～49	47	0	0	0	46	1	14	14	3	3
50～54	164	0	0	3	158	3	63	63	11	11
55～59	241	2	1	6	229	3	71	71	16	16
60～64	228	0	0	3	224	1	62	62	16	16
65～69	184	3	0	5	173	3	48	48	9	9
70～74	130	2	0	6	119	3	30	30	12	12
75～79	112	7	0	7	97	1	26	26	11	11
80～84	123	2	0	2	117	2	28	28	12	12
85～89	94	0	0	1	91	2	28	28	10	10
90歳以上	54	0	0	2	51	1	17	17	3	3
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	656	7	0	18	621	10	217	217	65	65
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
45～49	27	0	0	0	26	1	11	11	2	2
50～54	88	0	0	1	86	1	41	41	10	10
55～59	115	1	0	3	110	1	40	40	8	8
60～64	116	0	0	1	115	0	33	33	10	10
65～69	88	0	0	3	82	3	25	25	8	8
70～74	59	0	0	4	55	0	19	19	4	4
75～79	51	4	0	4	43	0	14	14	9	9
80～84	54	2	0	0	50	2	16	16	8	8
85～89	44	0	0	1	41	2	14	14	4	4
90歳以上	12	0	0	1	11	0	4	4	2	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	718	9	1	17	691	10	171	171	38	38
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	5	0	0	0	5	0	1	1	0	0
45～49	20	0	0	0	20	0	3	3	1	1
50～54	76	0	0	2	72	2	22	22	1	1
55～59	126	1	1	3	119	2	31	31	8	8
60～64	112	0	0	2	109	1	29	29	6	6
65～69	96	3	0	2	91	0	23	23	1	1
70～74	71	2	0	2	64	3	11	11	8	8
75～79	61	3	0	3	54	1	12	12	2	2
80～84	69	0	0	2	67	0	12	12	4	4
85～89	50	0	0	0	50	0	14	14	6	6
90歳以上	42	0	0	1	40	1	13	13	1	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(再掲) 2.10 調査票の自由記入欄について

72 ページに掲載したものを含め、「これまでの症状や病気について、書ききれなかったことや、特に研究してもらいたいこと、要望など」についての自由記入欄に回答があった内容を以下に記載している。記載は可能な限り原文のままとしているが、判読が困難な文字や記載した本人が特定されるおそれがある記載（年齢、地名、医療機関名、具体的な年月日、具体的な検査数値等）については、「●」と表記している。

また、回答中に公表を望まない旨の記載があったもの等、ここに記載するのが適当でないものについても割愛している。

- 「眼の方は今の所変化ないですが陰査に行く度ピクピクです。
ヒザは毎月注射をうっているので歩くのに支障はないです。
これからもお世話になりますよろしくお願いします」
- 「娘の顔面、背中の耐えず出る、湿疹、発疹、膿●●と月経不順
自身の遺伝だと思うが、本人の精神的ショックを考えると告げるわけにはいかない。
単なるにきびとはいえない、自身の幼少時の皮フ症状と類似している。
顔面が余りにも目立つため、申し訳なさと、辛さが消えることはない。
自身から産まれなければ、他の友人と同様、きれいな肌であつただろうにと、
本当にカネミをうらんでも、うらみ切れないです。」
- 「検診会場を●●や●●など交通の便が良いところで実施してほしい。」
- 「このカネミの油症の為に自分の人生が変わった。
つまり、この為にセーブしてしまう。
結婚も就職も相手にしらせたくない。
今、思うと、その事がどれだけ自分をセーブしていたかと思う。
そういう事をしなければいけない1/2程にしてしまう事に青春を●●で欲しいと思う。
人の人生を変えてしまう事である。」
- 「数ヶ月に1度の程度ですが、左の胸あたりが痛くなり、20分～30分間は動けなくなる。
最初は背中やアゴのあたりが痛くなり、その後で左胸あたりが痛くなる。
心臓の検査をしたが異常はないとの事。
弟や甥も同じ症状らしい
病院の先生もどうしてそうなるのか原因が不明との事！」
- 「ピーナッツ等のナッツ類を食べすぎると湿疹が出ます。
心配です。」
- 「脊柱管狭窄症を患い、腰痛がひどい。
昨年度手術を行ったが、現在も痛みがあるため30分以上立っていることができない。」
- 「2015年頃から脂漏性皮膚炎に罹りなかなか完治しません。
出来ましたら頭皮について研究して頂きたいです。
宜しくお願い致します。」
- 「眼脂過多、瞼板線からの分泌物、巻き爪、掌蹠膿疱症は相変わらず症状が続いています。
腕のしびれも最近をよくあります。」
- 「体が疲れやすい。」
- 「足のひざ裏に水疱がたびたびできるので水をぬいてもらっている(ベーカーのう腫)」
- 「●代に肝炎を発症。
出産後、血液の比重低下 貧血（特に下記）がひどくなってきた。
最近体の左半分に白斑が発症してきた
化学物質によるメラニン異常の可能性あり」
- 「・脱毛の研究をしてほしい。
・対処方法を知りたい。」
- 「娘が1人いるが仕事はなんとかやっているが疲れやすい
子宮内膜症の治療はずっとやっている。体調面で心配が多い
母乳のみで育てたので心配。認定されないので年1回の健診は受けさせて下さい。
私は●才すぎでいろいろな膝とかの痛みでできた
老化が人より5年ぐらい早いようだ。
仕事も少しずつになっている状況です。
65才まで仕事できるか不安ある。」

- 「毎年、同様な調査票に回答しているが、食品公害「カネミ油症」事件が発覚してから 50 年、半世紀が経過しようとしている。これほど三者協議(国、カネミ倉庫、患者)での会議でも、ただ単に過去を過去を踏襲してマンネリ化して進展が全ったく見られない。厚生省、農水省のお役人にしても、人事異動をくりかえし、患者に寄添って行く行政が見られない。又カネミ倉庫、九州大学の研究者についても、ご本人たちには、痛くもかゆくもなく、苦しみ悲しみもない。その苦痛は、患者のみが感じている。したがってもうすこし(いかばかりか?)患者サイドに寄添った行政を希望して止まない。早急に解決策！又、本要●を書くにあたり回答が全く得られていない。一方通行では何の意味もありません。具体的にアンケート調査などを実施してはいかがでしょうか？」
- 「ダイオキシンは子から孫へと続くものか？子供もふき出ものが出やすい。」
- 「CA19-9 ●●位になる いつも心配しています。」
- 「昨年から左肩の痛みがあり、今年の●月より整形外科を受診して、注射や痛み止めの薬を処方してもらっています。肩胛板断裂により肩関節の動きが悪い為、週に 1~2 回リハビリも受けていますがまだ完治していません。以上の例のように年令を重ねる度に思いもよらぬ体の不調が出てきます。健康診断の血液検査にも脂質異常の数値が基準値をこえる事もありこれから先も病院通いが増えていくと思います。食事や運動等、意識はして努力しています。毎年 1 回の油症検診は例年●●でジュシンシテいましたが、昨年から●●に替わりました。交通のアクセスには便利がよくなりましたが、後に送られてくる検診結果のデータを見ると、医療センターの時だったデータの方が自分の数値の異常がわかりやすくなっています。医療センターの時のようなデータが欲しいです。今後自分の体がどう変化するか不安でたまりません。ダイオキシンの体から排除される研究を今後ともしっかりと進めてほしいです。」
- 「毎年、市の特定健康診断は受けています。」
- 「年令があがるたびに体の不調もありますが骨にもえいきょうがあるのでしょうか。」
- 「最近寝苦しいことが多い。」
- 「カネミ検査で抗シトルリン化ペプチド抗体の値(●.●)その後、カネミ検査でこれはなくなったので今年近くの病院でしらべてもらったら(●.●)に値がなっていました症状がないので、リウマチとは、言えないといわれました。」
- 「特になし。ただし 本来の身体に直せ、どうおれの 1 生をつぐなう？こたえろ」
- 「・根本原因の究明にはまだ時間がかかりますか？・何世代まで影響がありますか？」
- 「二世の子供が変—●番目の娘の子供男、●人 性器に異じょう。三角形だったまま。三角錐 3 c m 二世の子供 ●番目の娘の子供男●人一体が異じょうに大きい。太っている●番目の娘の子供娘 はだの色が異じょうにくろい二世の子供の—●男の子供一女の子 はだの色が異じょうにくろい 歯—永久歯が 1 本ない—二世の子供の娘 ●女—頭いたい、血に異状。話せば長くなる 私の子供は—あまり長生き出来ないような気がする。1 度、とくに二世の子供はひどいように思う。なんとかしなければと思いますか？どうして良いかわからない。助けて下さい。心も体もボロボロのような気がする。私は●の時に油をたべた。もうすでに 60 非の細ぼうができ上がっていた時だと思う。しかし私の子供、二世の子供たちは、腹の中からのおせんだと思う。もっとくわしく二世子供をしらべるべきだと思う。本当に調べる気があるのならそうすべき。これは日本国中の問題だ。たいへんな事に世の中なっていくと思う。医療費がもっともっと多くなると思います。私の意見を聞いてほしい。」

- 「足の裏がすべり氷の上を歩いているみたい。
いつも床にしがみついて歩くので疲れます
どこか、いい病院はないでしょうか。」
- 「気のせいか、わかりませんが！タバコをやめてから胃のむかつき、もたれがひどくなったように感じます
酒を飲むのですが、ついつい早く寝てしまうので胃の中の消化が悪くて胃のむかつき、
もたれがあるのでしょうか！
タバコをやめた方法は病院に行って禁煙外来で飲み薬でやめました！
タバコをやめられたのは本当に良かったと思うのですが薬を飲んでいる時は
仕事中でも胃もたれがひどくてたいへんだった事を今でも思います！」
- 「油症検診の結果が4か月はありえないです。」
- 「●オくらいから毎日背部痛出現（特に朝方〜）し痛みを共に目覚めます。
ピラティスや体操もしていますが・・・なかなかすっきりしないのですが。
知人に話したら胸筋が弱いのでは・・・と言われました。
私は週2回（毎・水・土曜日）2時間30分バレーボールをしていて運動後もきちんとストレッチをしています。
時々整骨院にも行っています。
何が原因なのか知りたいと思います。」
- 「朝起きた時頭痛がする」
- 「右顎チタンプレートと折れ、右足、腓骨を移植しました。
又、折れないかと心配です。
足の痛みが中々治らなく、仕事に支障が出ています。」
- 「すべての医療機関で使用出来たらいいと思います。
領収書をまとめて送付するのは手間がかかる為。（カネミあてへ）」
- 「亡父・母ともにがんを患っているので、高齢になるにつれて不安が大きい。（自分もがんになるのでは・・・）
睡眠が浅く、すぐに目覚めてしまいその都度トイレに行き、疲れを翌日に繰り返してしまうため日中眠たい。
子供や孫に与える影響が心配（自分はないが、子供はアトピーやアレルギー性鼻炎あり）
これからも実態調査を続けてほしい。」
- 「認知症の為、はっきり記憶してない部分があります。
（本人から聞き出せず、記入することができない項目がありました）」
- 「定年退職で●●県へ移ります。
糖、糖尿、下肢動脈硬化症は●●の専門医で検診する予定です。
和歌山にいい病院がいまのところなく、しばらく●●通いになりそうです。
仕事を終えることで、生活がすべて変わり、しばらくは不安定な状態が続きそうです。
（老化も進んでいるようです）
常に前向きに生きていこうと思いますので、引き続きのご支援・ご指導宜しくお願い致します。」
- 「ダイオキシンの排出方法の研究」
- 「毎年ありがとうございます
今年より腰痛が強くなり しばらく我慢していましたが●月整形後圧迫骨折にてMRIを・・・
結果がんの疑いにてがんセンター受診 結果左じんぞうがんあり、骨転移と診断されました。
これから手術治療が予定されています・・・これから先の事を心配しています頑張ります。」
- 「受療券の適応範囲がわかりません。全ての病気（カゼ、腹痛等）に可能か？油症患者特有の病気に対してのみか？」
- 「最近になりまして記憶力がなくなって来ました。 」
- 「発がんとの関係性が気になりました。」
- 「カネミ油症患者に関するさまざまな施策を実施していただきありがとうございます。
ひき続き、長期的にこの支援が受けられることを願っております。」
- 「昨年の一斉検診で高血圧や高い中性脂肪やコレステロールやリウマチ因子が高いことがわかりました。
何か関係するのか知りたいです。
今年も福岡で検診を受けたいと思います。」
- 「油症の事の発端はもう50年前。
高校の授業中先生から皆の前で君のその顔色は異常だ気持ちが悪いから帰りなさいとひどい事を言われ、
次々と異常な吹き出物が多く出始め、体調も不調が増すばかり。
それから市民病院、岡大医学部、九州大医付属病院にも入院。特にひどい死ぬほどつらい頭痛、
神経痛に悩まされつづけても治療してもらえず、モルモットになっただけです。

治療法もないまま、身体に良いと聞けば、わらにもすがる気持ちで各地をさまよい、色々体験、入院もしたがどうにもならなかった。

症状には個人差があり私の例は珍しいと思う。理屈や理論ばかりが先行し、現実の症状が理解してもらえないつらいなさけない長い年月が過ぎ去っただけです。

油症のため、結婚もまた、まともな仕事も出来ず、めちゃくちゃな人生です。

油を食べさせたという自責の念の強かった母親がまさかの脳腫瘍で亡くなり今年が七回忌です。

お金がなく身体も悪いので法事が出来ません、くやしいです。

私は約3年前の脳卒中の後遺症で左半身麻痺状態です

アンケートの結果では一人で何事も出来るようになっているが、それがいかに苦しく大変な事か、油症と脳卒中が複合して異様な身体の不具合です。

(治療法がない油症、脳が壊死、治ること、良くなる事絶対にありえません。)

田舎の医者は油症の理解度はとても低いです。話しても無駄です。

専門家の理屈、理論では高血圧だからと言う事でしょう。

話してもストレスが増すだけです。

私は脳腫瘍も脳卒中もすべての症状もまた死んだ父もPCBが関係していると確信しています。

精神的、肉体的、経済的何もうまい事ない残りの人生悲しくむなしいだけです。」

- 「以前より白血球の数値が高いと言われている。
 - 月末より体がだるく、血液検査で白血球が高く、朝・夕に抗せい剤をのみ、毎日抗せい剤の点滴を受けているがあまり症状がよくなりず
 - のどに物がつかえる感じや胃のあたりに物がつかえた感じが続いている。」
- 「体調及び精神面及び生活面にももう限かいなのでこの後の生活にぜつぼうを感じている。
文章が余り書けなくなっているのですみません。」
- 「左目の視力が低下し、広大眼科で治療して頂いてますが原因が分からない
網膜剥離で手術を3回しましたけれど視力は上らず困っています。
不自由で自分の事は出来ていたんですが手助けをしてもらいたくないので・・・後は神だのみです」
- 「私は●才になって発病し、
全体にシッシンが出来て現在も背中や手足に出来物が出て「カユク」なる事が続いています。」
- 「当時の様な症状はありませんが何かにつけて思い出されます。宜しく願い申し上げます。」
- 「一分でも一秒でも早く特効薬が出来ることを毎日願っています。
だんだん子供がカネミ油症の症状がでてきています。
すべて何もなかった事にしたいくらい申し分けなくて
誰にも公言してませんから、私が経験したことはさせたくありませんから
すべてが早く終わってほしいです。」
- 「以前から何が原因か分からないが、息切れ、立ちくらみ、ふらつき、
目まいの様な症状などがあり、かかりつけの先生に言われて、
大きい病院の耳鼻科で診てもらいましたが、異状なしでした。
こんな状態がいつまでも続くのが心配であり、不安です。
昨年食道がんになり、●月に手術を受け、入院中に本当の目まいで病室とトイレで2度転倒しました。
目まいは4日位いで治まりましたが、院内の耳鼻科で診察を受けたところ、
検査結果は寝た状態から立ち上がった時に急激に血圧が下がると言われました。
私は急な動きはいけないのでもっぱらスローモーな動きをしています。
手術以来5ヶ月になるのに今だに咳が出ます。手術をして下さった先生は、
肺を動かした関係で咳が出やすいがそれも次第に治まると言われました。
咳が昼間に出るのはまだ良いのですが、夜中に突然咳き込むことがあって、眠れないことがあります。」
- 「自分は過去2回の外科手術を受けて現在も治療中です
病氣の原因は油症によるものか否かは定かではありませんが高令でもあり治癒は諦めています、
まだ若い人にも油症で苦しむ人も多くいます。国は油症の改善に研究に尽力してほしいと思います。
現在は妻の車で通院していますがそれも限界が来ています。病院が遠隔の地域でバス通院は無理です。
タクシー等の通院に支援をしていただきたいと思います、よろしくお願いします。」
- 「昨年から胸が90秒くらいいくなります
トイレに行ったり、急な行動したりするといたみます。
足のつめがねもとからはがれ、下のつめがはえるまで、ゆびが、いたみます。」

- 「自分で心配な事
 - ①睡眠 夜トイレに行き 1時間は眠つけない
 - ②排便 ほとんどやわらかい (毎日便は出ている)」
- 「(花粉症) 毎年2月頃から、くしゃみ鼻水で病院の治療薬で良くなっていたが
 今年は2か月以上たっても治らず今尚、病性が続いて困っている。
 これまでこのような状況はなかった。現在ものの痛み、鼻水、くしゃみが続いている。
 (皮膚のかゆみ) 湿疹状これまでは病院の薬で良くなっていたが昨年秋頃から
 背中、もも、ひざに、あせも状にぶつぶつができ、薬をぬっても良くならず
 夜間かゆくて目がさめることもしばしば、風呂で洗けんを使うと特にかゆくなり、
 使用しないようにしているが、良くならない。良い治療法はないでしょうか・・・」
- 「毎回記入しているのですが私が●才の頃に
 その当時はまだ日本ではほとんど認知されていなかったパニック障害を発症し
 ものすごい不安発作(気が狂う程の強い動き)を毎日起こし
 診断はその当時 ただの神経症と言われちゃんとした治療と投薬がなされず
 完治が 出来ず 症状は軽くなりましたが今も苦しんでいます
 兄もほぼ同時期にパニック障害になり 今はほぼ完治に近いですが 時々症状があるみたいで
 それと母はカネミ発症と共に乳がんになり 闘病生活 6年近くで早くに亡くなり
 私も●才の時に乳がんになりました(ステージⅢ)
 兄も早期発見ですが 胃がんを経験しており 同じような病気のたえない家族です。
 カネミに人生を狂わされたのは事実です。
 カネミと病気との因果関係をはっきり解めい(研究)して頂き、良い治療薬を待ちのぞんでいます。
 もう私達は若くないのですから。」
- 「指の変形により人の前に手が出しにくい」
- 「尾てい骨付近におできが出たり入ったりする。
 顔 特に口のまわりに出来物が出る
 夕方になると足が腫れる」
- 「今は施設でお世話になっていますが1年前おしりをついただけで下半身マヒになってしまいました。
 どうしてこんな骨が悪くなったのかわかりません。
 それに両手 ひじ〜手首にかけて血管が出ていて一寸打っただけで血が出ます。
 パーキンソン病にもなり食べ物がのどを通りにくくなり、
 今では水分は(とろみ) 食べ物は(きざみ食)です。
 声も聞き取にくくなっており会話も十分には出来ません
 ●●●●」
- 「夜、入浴をする為衣服をぬいだ途端倒れました。
 意識が有ったのですが、全身硬直して全く動く事が出来なかった。
 何分か何時間は分からないが少しずつ手足が動く様になり 現在は普通に生活出来ています。
 一週間後位整形にてリハビリに行くと手足が青タンになっているのを看護師に問われ、状態を話す。
 私は金縛り位に思っていたが、それでは無いと言われ病院に行き脳のMRI、
 心電図等の検査をしましたが特に異常は無いとの事でした。
 一瞬脳の血管がつまったのかと思います?現在は血流を良くする薬飲んで居ります。
 車の運転中で無くて心より思った次第ですこの様な経験をすると日々、又起こるのかなと思う次第です。」
- 「いつもお世話になっております。今後ともよろしくお願い致します。」
- 「以前にも記載していますが
 - ①歯の変形
 永久歯に筋が入っています。又、現在歯科受診をしています歯の根が浅いと言われてます。
 歯の形成とカネミの関係の事研究して欲しいです。
 - ②不妊
 2回の流産を経験していますが、不妊にも悩み排卵誘発剤を飲み、
 5年目に妊娠、出産しました。又、排卵誘発剤を飲み●子を授かりました。
 その●女も生理が無く治療中です。
 その関係も調査して欲しいです。」

- 「お世話になります。
- 以前から足が重苦しくはれたりしてましたが、
- 最近いたくなってきたので内科の先生に相談しましたら●●病院を紹介してくれました。
- 行って手術をすすめられて●月●日にすることになりました。（静脈瘤です）
- よろしくお願いします。」
- 「私は小学●年生から中学●年で前歯4本が抜けました。
- 子供の頃の事です、当時の歯医者さんが「不思議だね」と言っておられたのが心に残っています。」
- 「若い頃から胃が悪く現在に至る
- よく胃薬をのむ
- 胃カメラの検診では異常なしです
- この1年間で体重が5kg少なくなり心配です
- 立ちくらみ、めまい、又、耳鳴があります
- ・白内症、緑内障があり現在薬による治療中です
- ・2016年C型慢性肝炎を治療した」
- 「高令のためが歩くのも困難になっています
- 日常生活がだんだん難かしくなっています」
- 「自分の方からは特にありません」
- 「現在通院中の●●クリニックさんと●●の●●先生は連絡を取って居られるようです。
- 年3回は血液検査をしています。
- カリウム値に変化がありましたので漢方ツムラ25は休止しています。
- 只今、発症時に戻ったようです。身体全体の“痛み”と腰から下の“しびれ”。
- 整形でくすりとりハビリとウォーターベット温熱で治療していますが、良好な兆しは有りません。
- 年齢的な事も有りましょうから。
- ◎最初●●センター振り出しに戻ってみようかと考えています。
- 温泉に通ってみるのも一考かと思えます。
- 自宅から45分くらい(バスで)でしょうか、車に乗れないので無理でしょう。
- ※他に良い方法があると願って探してみます。●才は必至(ひっし)です。」
- 「数年前から人間ドックのマンモグラフィーで小さな石灰化がみられ、定期的に経過観察中。
- 今年の検査(マンモグラフィーとエコー)で3ヶ月後に再検査と言われた。
- 去年に人間ドック 胸部CTを撮り左下葉浸潤影を指摘され、
- セカンドオピニオンで宇部医療センターを受診。
- 血液検査とCTの検査で気管支拡張により何らかが感染して器質化(かさぶた)ができた。
- 悪い物ではない。●月に再度CT検査をすると影が小さくなっており、
- 月にCT検査をした時点でほぼ完治といわれた。
- 念のため、●月に再度CT検査を受ける。免疫力を高めようと思い、
- サプリメントでブラセンタを飲んで、
- 月の血液検査でγ-GTが上がったので1カ月飲まずに検査したら下がった。
- 残念ながら体に合っていなかったようだ。」
- 「●才を過ぎた頃より病院通院が多くなりました。
- 例えば歯科(虫歯になりやすかったり)腰痛になってたり、
- 人の名前が出なかったりさまざまですが。
- これは年の精だと思いますが、油症としてどこまで病院扱いできるかわかりません。
- 今年は直腸腫瘍にかかりました。
- ポリープでしたが直腸の出口だったため切除することになり9月に入院をしました。
- 結果は良好でした。痛みもなく元気に生活をしています5月11日で切除1カ月となります。
- 私は腸には自信がありましたがわからないですね。と実感しました。
- ただ私なりに体操、ダンス等々を取り入れて頑張っています。
- 野菜は自分の手で作ったものを食べて畑で動ける喜びを感じています。
- 退院後外の空気がおいしかったです。」
- 「昨年の脂性検診にて、肺のレントゲン映像から担当の先生より、
- 肺気腫(COPD)の疑いがあるといわれそのご、
- まず長年吹いてタバコをやめ翌年1月に光市立光総合病院にて、検査を受けました。

結果COPDまではなっていないがぜんそくであると診断されました（特に症状はでていませんが）

また1年間様子を見て来年●月に同じ先生で診察と検査を受けることになっています。」

○「昨年度、ここに記入した内容についての回答は如何か？」

○「本人が入院中のため聞きながら書きましたが、年のせいか忘れてきているようです。

油症検診もうけて研究してもらおうと、

意気込んでいますが、なかなか体調がすぐれずいけませんでした。

そのうちパーキンソン病が悪化して入院になってしまいました。

あまり、お役に立てずに申し訳ないです。」

○「右手の人差指第一関節の腫れと痛みの原因・治療があれば知りたいです。

両足(親指を除く)4本の指の爪が変形して正常に生えてこない、

指の裏側は乾そうがひどくて皮膚科へ受診したけど、

ただの乾燥と云われてワセリンの投薬のみでした。

中々治らないものですが、年齢から来るものか?おたずねしたいです。」

○「母が返答が困難になってきました。

疾患については私の記憶にあるものを記入していますが、治療をしたか不明なところもあります。」

○「孫がヒフが弱く、蚊にさされても治療が必要なことがある。

子は、特に何も無いが、隔世遺伝の様に、子でなく、孫に影響することがあるのか。心配に思っている」

○「・遠き昔の事となり、自分の年や子供の年など～～～

色々の事にきょうみ・感心等がなくなり小さな事は忘れてしまいました。

・日々を生きてゆく事だけでせい1杯なのであまり物をわずらわずに生きています。

・ボケの始まりかも知れませんが――。

・本はよく読みますが字を書く事がないので漢字等は、辞書が手元にないので忘れていきます――。

・台風、低気圧の走る前は、耳なりがしたり、気分が悪くなったり

体がだるくいたくなったりしますが習れましたのであまり気にしません。（雨の降る時とか）

・手(指)がへん形する時が

神経に沿って全身が痛む時が多い（毎日のようです）がそれもあまり気にしません

こんなものだと思います 何十年も過ごしてきましたので持病のようなものだと思います。

痛い時、などは痛み止めをのんですごして、自分と向き合っています。

●●●●」

○「昨年までとそれほど変わらないですが、身体（全身）の倦怠感により増して来ました。

子供の全身の湿疹がひどく、妻が毎日薬を塗っていますが、あまり良くなりません。

油症の事は家族にも話してないですが、自分は関係していると思います。」

○「昨年の暮れ、重い物を持ち上げた瞬間激痛がはしり、動くことが出来なくなり、

31年に整形外科を受診する。腰部椎管狭窄症と診断される。

即入院となり、12日間入院し治療を受ける。

退院してからもふとした事で痛みが現われ、リハビリに通っていますが

名医と云われる医師に最近受診したところ、手術することも、選択するよう勧められています。

それと、右脛が内側に典り痛みを共ない歩行が困難で日頃の生活にも支障をきたしています。

その方も手術をしなければならない状態です。」

○「全身の痛み原因不命で治りようがない状態。

不信感を毎日抱いていて

油症研究は人も今頃になって遅過ぎる。

51年もたったにもかかわらず

ここまでたってしまった以上自分で生き方を考えるしかないようですね。

ちなみにこの調査票は

わずかながら息子の私も協力して

書かせていただきました。

●● ●●。」

○「今年は、アレルギー症状が少し良いみたいで、

薬を控えたので症状は、昨年と同じぐらいでした。

何度も鼻水をかむと耳が痛くなりやがて頭痛を招きます。

今年一番困った事は、LDL コレステロール値を下げる薬を呑み始めましたが、

ほぼ同時期に以前患った帯状疱疹での神経痛が、再び発症した事です。
痛みは、以前より弱いですが、継続的に痛み、一番楽な姿勢をとっても、
左手はしびれている状態で、時々けいれんします。（左手、親指、人差し指）
この症状を、腎臓内科の先生に診てもらいましたが、50肩ではないかとの事で、
薬をいったんお休みする事になりましたが、左腕の神経痛は、改善されていません。
両ヒザの痛み、相変わらず有り、動かしていないと固くなって次の動作が、
痛過ぎてこわいので、ムリにでも歩く様にしています。
この一年で腰の痛みも頻繁に起こるようになりました。

（特に力仕事をした訳でもないのに、不意な動作で起こります。）

外国に移住とまでは考えていませんが、長期に渡った場合の医療費が、やはり気になります。
旅行中は、医療保険等に加入して渡航はしますが、高額になるとの事なのでやはり気になります。

●●県の担当者の方を通してでも良いので現状等をお話し頂けませんか？
よろしくお願い致します。」

- 「●才で蓄膿症の手術をした。その時の医師からこんなにひどい症状は初めてだと言われた。
一般的な蓄膿症の症状ではなかったと考えられる。ひどい濃みに悩まされていた。
あの粘液を調べるとPCBが検出されたのではないだろうか。
今まで体質の弱さとはばかり思っていたことが、今回の認定により全てがつながっていく思いだ。
●才を前にはっきりしたことがわかりよかったと思う反面、怖さやいろいろな思いも交錯する。
当時一緒に暮らしていた姉に私から認定申請を勧めることはむずかしい。
自ら疑問に思い検診を受けることを願うだけである。
私は健診に携わる仕事をしているため、受診の低抗はあまりなかった。
住んでいる地域も油症と関係のうすい街に住み、
家族の理解も大きいと判断し認定のための健診を受けこのような結果となった。
しかし、発症場所に住んでいる者や家族の理解が得られないものが
認定を申し込むのはむずかしいのかもしれない。
差別や毒を体に持っていることの恐怖などいろいろなものに立ち向かう覚悟が必要となる。
苦しんでいる者が少しでも楽に病氣と向き合っていくにはどうしたらよいのか問題の大きさを感じる。
今回息子と夫にも話をした。今後は2世となる息子たちのことが気がかりである。
●人の息子のうち ●男は知的障害で自閉症
●男は疲れやすく異常に汗をかくところが気になっている。
今後は2世の研究が進んでいくことを希望する。」

- 「・小学生の頃は、運動会の練習中、長時間立っていると、倒れていた。
日射病(草とり中)にもかかった事がある。
・中学校時代、Saxを担当していたが、少し出歯気味のせいか、
脱関節炎と診断されあごが痛んでいた。
あごの脱関節炎は、しばらくなかったか、最近右あごが痛い。
・目の異物は子供の頃から有。
疲れた時などに痛んでいた。
●才頃に、手術して取りのぞく。悪性ではなかった。
・イビキはカネミとは関係ないと思うが、知人から無呼吸だと言われる事がある。
・手のひらが異常にかゆみを感じる事がある。
氷など冷たい物を長時間さわった時によく出る気がする。」

- 「治療法の早期発見
未認定期間の保証
子供達への影響」

- 「全身のかゆみは毎日のことです。
城皮膚科の内服薬と軟膏塗布で、どうにか落ちついていきます。
全身の倦怠感も継続しています。
仕事をしているので、まずは身体を休めて無理をしないようにしています。
カネミ油症が公害に認定されることを常に願っています。」

- 「今年度、白内障の治療したい。」

- 「健康実態調査及び検診は毎年実施していただき、自分の健康状態が把握でき助かっています。」

- 「以前顔のほくろや首にできているできものをとってくれるということでしたか？
今でも、してもらえるでしょうか？
たくさんあるのでストレスです。」
- 「病院から介護施設に移った時に介護保険を使った時に、
カネミが、介護保険を使った場合の支払いをしない事。具体的な理由が知りたい。」
- 「欠損歯が生まれつき有る。永久歯がなかったので大事にしてきた乳歯が抜けた。
医者には今後の事も有るのでインプラントをすすめられた。
自費となるため、現在治療を中断しています。治療費を出していただきたい。
生まれながらの油症患者です。黒い赤ちゃんで新聞にも出てます。」
- 「両肩、首が痛む。こかんせつが痛く歩いていてカクンとなっていたい。
腰が、ねても、すわってもいたい。左ひじ手首までがうずく(痛む)。
両ひざが痛む。両指がこわばり、痛んで。」
- 「30 年●月
内視鏡検査 胃
大腸
30 年●月
脳外科 CT 検査
むね肺 CT 検査

するが今の所とくに異常なし
でも自分では時々各所に調子の悪い●がある」
- 「・今診療所からいただいているお薬です。
・●●診療所に毎月かかってます。
・いろんな検査も受けてます。
・年に一度のカネミ検診にもかかさず行ってます。
・自分の体は自分で守らないと思っ出来る事はしているつもりです。
(無理はしないようにマイペースで)
・負担額もカネミさんがみてくれてるので助かります。” 」
- 「主人の事
自分の事
子供達 心配」
- 「私はカネミ油症に成って四十数年顔に吹き出物が出来足にも出来て
毎回「かゆく」で成りませんぬくもとかゆいので薬をぬっても(こうか)ないです
油症に成って病院もなんべんもかわりましたが今だにわるいです。
若い頃から化粧はした事有りません毎日ストレスがたまります
今から夏日にあたると顔が赤く成り大変こまります又かゆいです。
どうにかならないですか髪は抜けるし私の姉も油症で(ぜんたいかつら)かぶってました
3 年前亡くなりました私も半分カツラです
●●●●」
- 「今回も調査ありがとうございました。
これからも、私たち油症患者を見捨てないで下さい。
早期解決を望んでいます。」
- 「何年か前から、顔面、首の後ろ、耳たぶ等が赤くはれ上がり●●に通院しています。
薬をぬった時は良くなるのですが又すぐに悪くなり
医師も「どうして良くならないのか・・・」と困惑していたので
カネミ油症の患者であることを話すと、
油症患者を何人も見て来た事があるので、すぐ納得されていました。
その後、体質改善の為、注射を 20 本近く打ち、
免疫を高める治療をしたのですが、あまり改善はありませんでした。
現在体で一番気になる事は、寝起きの時に左手のむくみ、こわばりがひどく、
握力がかなり弱いです。一日中むくんでいる感じで、重い物が持てません。
昨年のがん検診で子宮がんの再検査で何度か細胞の検査をして、

クラス 3b の ASC-H である為、3 ヶ月に一度、検査を受け治療をすることになりました。

●●病院で検査を受けているのですが、「油症受療券」を提出したところ、

「カネミ油症との因果関係が見当たらないので」という事でお断わりをされました。

昨年のこのアンケートの中に入っていた「受療券契約医療機関一覧」のとじた用紙を持参していたので

「●●病院」と書いている事を説明すると、事務の方がカネミ倉庫に電話してくれて、

数十分待たされた後に、やっと手続きをしてくれる事になりました。

数年前にも同じように言われたので今回一覧表を持参していたのできちんと対応して頂けました。

しかし、一覧表に載っている医療機関でも説明しても無理な病院が多いのが現状です。

嫌な顔をされる事もあるので領収書をもらってカネミ倉庫に送らせて頂いています。」

○「第3子の認定をしてほしい。

二世 孫 いろんな症状が出て苦しんでいます」

○「リンパシュ●●の MR を半年後体でとっています

今だに、にきび常の出来物が出きます」

○「●●市内に油症患者受療券を使用できる医療機関がない。」

○「症状に付いては特にありません

妻の認定申請(1~3 を満たしているが)を思案中です」

○「●●で右足ヒザ関節鏡下半月板を切除術をしました。

その後、余り直りが悪く、左足指シビレ、右足指変形シビレ甲が腫れて、

両足のヒザが痛く、歩くのが、とても困難でひどい時は、夜も痛くて寝むられません。

近くの整形外科には、マッサージ、ヒyalロンサンをしています、

なかへ痛みがとれなく、歩きすぎると、足が腫れます。

この頃、ロキソニンを出してもらって、毎日飲んでいました。

少しは、痛みがやわらいで、歩けます。内科にも行きましたが、別に異常はない様です。

又、足の甲の腫れは、開張足、偏平足、変形性膝関節症と診断され、

1 回目は●月●日に右足低板を作りましたが、

また、今度は両足に前回と違う、足低板を作る事になりました。●月●日出来ます。」

○「・母が3、4 日前より少しおかしくなり看病して眠っておらず、字も汚くなりすみません。

・今まで通りの生活をし信頼してる医師に相談しながら過します。

・少しおかしな回答になってるかもしれませんすみません」

○「両親共にがんで亡くなっており、老後発病しないか常に不安があります。

治療薬の開発と支援を希望します。」

○「歯科も今年から異常がなければ定期的で良くなり

内科も外科も症状が悪い時にだけ病院に行くのでとても楽になりほっとしています。

これ迄の病院通いの事を考えるとこれほど体と心の負担が大きかったかが今さらながら感じます。

今●●は信じられない体の異常と心の痛みの毎日でした。

現在は、時々後遺症、トラウマになやまされる時はありますが、

それも今年は心安まる日、日●●す。

これからもこの様な日が続く事を願っています。

二度とこの五十年間のつらい日にもどりたくありません。

自分の心の問題は他人(身内でも)には絶体記したくない。

いつもここに書く事によって気持ちがおさまります。

相手は見えないし、私だけの一方的な言葉で思った事を言えた事で、

長く胸の中にたまっていたわだかまりが取れました。

油症患者受療券や医療機関。心ではとてもありがたい事と思っていますが、

これからもお願いする事はありません。

※野ぶどう(馬ぶどう)が体質改善(関節炎、花粉症、肝臓、不整脈)に良いとの事で

三ヶ月ほどで症状がわかるとの事でまず三ヶ月分取りよせて飲んでみます。

もともとひどい便秘症で四十年間センナを毎日飲んでいるのですが、

野ぶどう茶を飲むと便秘の薬のがきかないほどひどく何んとかなれないかとがんばりましたが、

私の体質にあわないみたいでした。(痛み止め●●●・・・。)」

- 「今年から体のだるさがひどく●間からごろごろしています。
目のつかれもひどくテレビ新聞も見みにくいです。
手術にふみきれずにいます。この●●も●の目もつかって書きさぞよみにくいと思いますすみません。」
- 「子供への遺伝その他どんな影響が出る可能性を知らせてほしい。」
- 「睡眠
若い頃より上向でしたが、寝返りもしました。
現在は寝返りして起きようとすると全身が痛く、
上向きになって 1～10 分位に起きるのが多くなりました。
歩行
左膝がつらく、痛い時は 30 分位、多少の痛みがあったも 1 時間位、
杖をつきながらなので距離は人様より少ないです。
食事
主人の介護で習慣になり今はランチです。
パン食が●いですが毎回味噌汁にしています。
5 日分位を 5～6 種の具材を入れます。チルド室に入れレンジで温めてすりごまを入れます。
夕食は 2 軒隣の娘宅で、食欲あり(米食)おいしくたべてます。
その後手作りのジンタマジャム(玉ねぎ、生姜、レモン汁、甘味)(大 1.5 杯位)
糖尿病に良いとのこと」
- 「皮膚沈着
・昭和 55 年頃までこの●●黒くなってました。
・今は自分では消えていると思ってます。
今現在時々うずく様な痛み
●の固りの様な感じ」
- 「寝る時に、おしりから足に違和感があり、足をむしょうに動かしたくなり、寝れない。
どの、医療機関を受けたら、いいかわからない。
去年も、同じ事を書いたが、何の返答もなく、何のために書かせているのか？
本当に寝れず、寝不足でくるしいんです。足を切りたくなる時もある。助けて下さい。
3 日に 1 日は寝れず、朝になる事とも、寝れても、2 時とか 3 時くらい、
6 時には起きないといけないから、3～4 時間の睡眠時間です。」
- 「受療券契約医療機関の中に
●●クリニックに今かかってます。
●●病院におられた先生でカネミ油症の事もしってらっしゃいます。
ぜひ受療券をお願いします。
●●●
●●●
追伸
●●クリニックが一覧表で見えて知りました。
こちらも受療券をお願いします。
●●●」
- 「カネミ発症から暫くしてみかんの食べすぎでもないのに、
手の平や足の裏が黄色くなって不思議に思った事を憶えています。(私、小学●の子供も)
今回調査項目の中に肌の黒ずみとありましたが、
私の場合は、体全体の皮フが黄色いのです(肝機能その他正常)
これってダイオキシンの関連があるのか。
単に私が黄色人種の典型人というだけなのかと思う今頃です。
それはさておき、ホルモン異常、粘膜異常に翻●されました。ダイオキシンはしたたかです。」
- 「・2、3 日前より頭が少しおかしくなった様に思われます。
・関節が全部まがって介護ばしを使ってましたがここ 2、3 日前よりはしを使う事ができなくなりました。」
- 「こちらこそ、アリガトウございます。」
- 「精巣腫瘍で片側摘出手術。
のち精巣腫瘍由来のびまん性悪性リンパ腫と診断され、リンパ節 1 ヶ所に転移有(PET 検査)
抗がん剤治療を 6 回入院して行い、転移箇所縮小。

現在は経過観察中。

入院中の血液検査で結核菌があるということで、検査、現在外に結核菌は出ておらず(たんに異常なし)

昔、感染はしたが、発病はしていなかったのだろーと言われた。」

○「薬の名前も良く分かりません。」

○「子供●人に出産時の異常はありませんでしたが、幼い頃から体が弱く、現在も色々な症状があります。
今後のことが大変心配です。

私自身、足の親指に力が入らず、歩行障害で、もともと歩けません。

両下肢の痛みが酷いことが大きな負担です。」

○「以前にも増して、体がだるく、気力もなく、ただじっとしてたいです。眠いばかりです。

漢方薬をいろいろかえて、服用していますが改善しません。

ここ、2年位前から顔に赤味がでて、痒いし、広がってきて、ひどくなっているみたいです。

(処方された軟膏を塗っています)」

○「平成29年にはすい炎

平成30年、心臓ペースメーカー

次に入院するときは？心配です。収入も少ないし。」

○「グループホームに入所していて、嘱託医が、頻繁にかわり、十分な検査や診察が出来ないことが心配です。」

○「原因不明→障害●級の全身体マヒと統合性失調症→障害●級を発病しています。

仕事ができないので収入が障害年金のみです。

今年65才になれば今の施設を出なければいけません。

受け入れてくれる介護施設があるか不安です。」

○「あたまにできるはれもをなをしたい

目やにをなくしたい

足のつりをなをしたい

せきのときに出る白いたんをなをしたい

ときどきのはなじをとめたい

足のみずむをなくしたい

ひだのいたみときどきつよくいたみます」

○「腹部の腫ようは小さくなったが又これが大きくならないか心配です。

悪性リンパしゅは治療中」

○「S43年発症当時は顔面にきび状が●●●●出来高熱食事は受け付けず入院

身長も伸びず心配しましたがカネミ油症の事を先方様に話していませんので

現在の事は詳しい事が聞けません

現在頭の中にコブみたいのが出来ている相です。

治療はしていないようです」

○「子宮全摘出したため閉経ははっきり判りません

第●子を妊娠中に重度の貧血で何度も倒れて頭を打ったりしました

目まい等しますが病院にはか●っていません

右上腕皮下腫よう摘出手術しましたが現在悪性か否かは検査中です」

○「油症のいろいろな症状が治るように研究してほしい。」

○「●月より耳が悪くなり直らないので●●病院に替えました

年をとる毎に色々な病気になるのでなるべく考えないで前向に行こうと思います。」

○「肩こり、首すじの痛みが、年々ひどくなっているように思います。

手、足が赤く膨れて健康な人の肌の色と違います。

足のつめが黒くなっています。」

○「しびれとつ全倒れる。

2. レジに並べない。

3. トイレがあぶない。」

○「30年より次々骨接合に、足、腰、頭がいたい

気力で少しづつ良くなりつつあるが今だに続いている

テレビ等見る気がしない8時に床につく

この苦しみから早くのがれたい

足、腰合計7本折った」

- 「にきび跡のあざ、しみを治したいが、国民健康保険を使って治療できないのか、美容成刑でしかできないのか、を知りたい。」
- 「2年前までは検診に参加出来てましたが昨年から疲れと息苦しさで外出もほとんど出来なくなりました。病院で薬かふえる事に不安を感じます。
ストレス(病氣)とか多くなった為か帯状疱疹とかにもなり痛みました。
ダイオキシンの数値が高いのが気になっています。
体調が悪いと食欲も減り体重も 10kg マイナスになりました。
精神的に強くしていないと「うつ」になりそうです。」
- 「“私が油症である事を他の人、●●に知られたくない。”
宜しく願い致します。」
- 「お世話になります。
連絡や書類の送付については本人あて、必ず親展で。
今後とも宜しく願い致します。」
- 「胸椎の圧迫骨折をしてから逆流性食道炎になりゲップがひどく
草取りや下を向いてする仕事が苦痛になりました。
今も続いています。
H30 年から膝痛がひどく眠れない夜が 1 ヶ月位続き、
ヒアルロン酸の注射をしています但し又 4 月中旬に痛みがひどくなり注射と体操をしています。
やる気、疲れで洗濯、掃除等主人に手伝ってもらっています。」
- 「☆左の質問ですが、カネミになって 40 年以上もたっているのに、
自然に治癒した事項もあり(歯ぐきの黒ずみなど)医療機関での治療以外だと、
治療していないことになるのですか？
自然治療の欄がなかったので△にしたものもあります。
(治療していなかったが自然に治癒などの項目などです)
☆質問がわかりにくく書き直した項目も少なくありません。
60 才の私でもわかりにくいので、次回よりもう少しわかりやすくしてほしいです。」
- 「昨年に●●病院へ入院して九州大学病院から●●病院から現在に至る。
私は妹で奈良からときどき博多へ来ています。
兄は一人で生活していたので、これからが大変です。今介護要介護●です。
今のところ落ちついてます。」
- 「去年、入院していたので陰査が出来ませんでした。
それで第一希望ではなく第二希望に電話したのですが、人が多いので出来ないと言われました。
一人位は出来そうでも出来ないのでしょうか
年に一度の陰査なのではいりょしてもらえと思いました」
- 「両足に皮●に常にかゆみがあり変色している。
頭部に粉瘤がある。過去に 2 回手術した。」
- 「顔の油肥が多い」
- 「今でも季節の変わごろにわきの下やまたの所にふきでものが出来る。
場所によっては痛い、特にまたの所は大きくはれて歩くのに不自由な時がある。
(うみを出しければす〜っとする)がそのうみがくさい。」
- 「歯が総入れ歯になってしまいました。」
- 「今年は●オとなり、体力、気力の限界を痛感しておりますが、
関係のお医者さんや、近所の方々、娘たちの応援で何とか人並の生活が出来ています。
家内も今年から要支援 1 と認められ、週 1 回通所サービスを受けていますが、
今月下旬の心臓の入院検査が心配です。」
- 「高令生活で特に足が不自由、手は指先がしびれて、よくお落ものをします。
二人で協力してご近所に助けていただきながら送迎車で出かけて若い人の話で元気をもらってます。
●月から心臓弁膜症が狭窄症になって●月に検査して手術と聞いてます。
相変わらず去年からの扁桃の化膿が治らず風邪をすぐ引きます。
化膿がいまだにつづいております。
主人がまだ米寿を迎えて、自分の事、買い物などが出来ますので、助ってます。

高令で手術となると私も心配してますが先生におまかせしたいとも思ってます。」

- 「今年は私が心臓弁膜症で心配かけてます。」

- 「現在でも、首の後ろ、耳の下、背中に、吹出物が出れます。

カネミを患って以来、ずっと、出来づづけており、大変困っております。」

- 家族のことも考えるといつもつらい思いをしています。治療方法が見つかる事を願っています。」

- 「現在、便びと下痢に悩まされています。

最近は、おなかのはりもひどく、トイレも近くなっていて困ることが多いです。

また、数年前帯状疱疹を患ったことで、つかれると、足のしびれがあり、睡眠にも影響がでています。

人よりも疲れ易く、何をするにもおっくうなこともあり、

日常生活の質も悪くなってしまい、困ることが多いです。」

- 「日頃から、頭痛や貧血の症状に悩まされています。

症状を抱えながらも、仕事をせざるを得ず、毎日、くたくたになって帰宅しております。」

- 「貧血の為、人よりも疲れる。

腹痛が多いので、外出の際困っている。

早期にカネミ油症が解決して、身体に効く薬が開発される事を願っております。」

- 「毎日の食事には気をつけてバランスの良い物をとるようにしています。

加齢と共に体のだるさは増すばかりでこの先を考えるとゆうつになるばかりです。」

- 「2世への遺伝子の影響。」

- 「☆頸椎・胸椎・腰椎にヘルニアができていますが、因果関係はありますか。

また狭窄症にもなっています。

☆「治療しても治癒しないからやめた」という項目はもうないのか？」

- 「今回のアンケートの回答のしかたが、治療中、治癒、治療していないの3つでしたが、非常に答えにくいと思いました。

治癒の意味がよくわからないと思いました。完全によくなったものは、

何ひとつない気がするけれど治療を受けたけどよくならないから治療をやめたものもあり、

私のように幼い頃より患者だった者にとっては、治癒し、

健康だった状態がよくわからない者には、何とも答えにくいものでした。

治療したから治癒したかどうかよくわからないのです。

治ゆしたかどうかはよくわかりません。」

- 「あえてうけません。心がいたむだけです！！から！！

つらい〜〜〜！！それだけです！！

はもボロボロ、こしもボロボロ、色黒、ハダ、カサカサ。

50年間本当につらかった！！しかないです！！！！！！！！！！」

- 「子宮筋腫、昨年

●●病院で診察

乳児の頭大の筋腫があり、他●大きい。

現在腹痛とかないので見守状態。

認知症、認定は受けていないが、名前だけは書けます。

いつも(週に2回)私が行く時、患者、面会人と書いてある所に、

私が(●●●)と書いて患者の所に、自分の名前を書くよう言うと、

●●●●●、●●●●●、●●●●●とか書きます。

出来るだけ漢字で書くよう言っています。

本人も●●●●●と多く書きます。」

- 「体調不良が続いています。

病院へいっても、結果は出ません。

こうげん病の疑いがあると言われ、病院へ行ってもわからない状況です。

体はいつもだるい状況

顔色は悪いといつも言われ、やせて病気の人としか見られません

手足のしびれは年々増します
原因がわからないので治すという事が出来ません
本当に毎日つらい日々を送っています。
今年は特に病院ばかりです
でも原因は全くわかりません
今は、右うでが全くあがりません
先生にはカネミ油症患者と伝えてますが、それにはふれません。
もうわかりません。
毎朝、だるくて、きつくての日々を送ってます
以上です。」

- 「疲れが取れる薬を月一びんとか許可して欲しい。」
- 「手の指の第1関節のみ痛みが続いた後腫れ、現在は太く、曲がっている変形している。
(●才頃より徐々に進行した。)受診せず治療はしていません。
親指、第2関節など他はまったく同じ症状は出ません。」
- 「●女がアトピー性皮膚炎、食物アレルギーでアナフィラキシーになった。全身にすいほうができた。
●男がうつ。」
- 「毎年書いているのですが、
子供●人共病気を患っているので(現在は治癒)遺伝的な影響について研究してもらいたいです。
毎年、集団検診で細かく検査していただき、安心できます。
ありがとうございます。」
- 「人生が狂ってしまいました。
母は、自分が油症患者とは知らずに30年間、がんや難病に苦しみ続け、命を終えようとしています。
母も私も、がんを乗り越えたと思ったら一生、難病に苦しむ人生を歩んできました。

油症発生当時、母が代表で油症の検診に行きましたが、皮膚症状のひどい人が多く、
足の爪が紫色になっている程度では認定されなかったのも、母は油症ではなかったと思って帰ってきました。
母は家族に毒を食べさせたとの自責の念に苦しみ、父は母が傷つかないように
家の中ではカネミ油症の話はタブーでし、子供には油症の情報は一切入ってきませんでした。

発生当時●歳くらいだった私は、まずニワトリがバタバタ死ぬという事件があったのに原因が調査されず、
とうとう人にまで被害が広がったというニュースは聞いて覚えています。

●●の人たちは地域のつながりが強く情報を共有できたようですが、
新興住宅地に住んでいた私たちは、誰がカネミ油を食べていたのかなど知る由もありませんでした。
被害者は孤立していて情報もなく、かなりの患者が埋もれているのではないかと思います。

私は、油を食べたから油症というのだと勝手に思い込んでいましたが、
60歳近くになってやっと、体から油がにじみ出るから油症というのだと知りました。
私は、体の中から油がふき出ているかのように、ブラウスや上着にまでひどい油のシミができ、
胸や背中にも吹き出物ができ、破れては血が出ていました。
現在は、ヒートテックのような新素材の肌着は、私の油が染み込んでヨレヨレに伸びてしまい
すぐに着られなくなります。
同級生はクリーム石けんを簡単に泡立てるのに、私は抱が立たないのが不思議でしたが、
私は手の平からも油が出ていたから泡立たなかったんだということにやっと気づきました。

色白だった顔は色素沈着で浅黒くなり、思春期からは吹き出物に悩まされ続けました。
顔は常に油でベトベトで、臭いし不潔だからニキビができるのよねと陰口をたたかれました。
皮膚科通いをして抗生物質を飲むと、肝臓が悪化するのか、さらに吹き出物が激しくなり、
顔中にウミがたまって真っ赤に腫れあがり、顔は化け物のようでした。

機会があるごとに●●病院に行きましたが、昭和●年頃に●●病院の皮膚科を
受診した時は、PCBはすでに排泄されていて油症患者はもういないのですよと言われました。

●歳でブドウ膜炎になり失明寸前になりましたが、その時は原因がわかりませんでした。
10年後に肺がんで間質性肺炎になり、その時サルコイドーシスと診断されました。

病気の百貨店のように体がおかしかったので病院に行くものの、
どの病院でも原因がわからぬまま完治するということはありませんでした。
揚げ物などに少し古い油が使われていると、私だけが腹痛で下痢をしてしまうので、
食事や外食の後は不安で気が気ではありません。

発生当時、油症と認定されませんでしたが、
あまりに身体が異常なので、検診を受けましたら認定されました。

私は知能が低下し、ホルモンの働きが阻害され、小学6年から身体も精神も成長がストップしてしまい、
見た目には大人でも、中身は子供のままでのようです。兄の事も、考えが子供だと親が嘆きます。
卵巣に炎症があったり、1cm大のかたまりが見つかったりしました。
不妊治療では子宮が人の3倍もあると驚かれ、基礎体温表は一度も正常な形にはならず、
子供は産めませんでした。

これまでずっと人間関係に悩み、社会生活がまともにできなかった原因は、
発達障害になっていたからだとやっと気付いたところです。

体力がなく病弱で頭は回転せず、人並みに仕事ができませんでした。
特殊な発達障害で、人とのかかわりが難しく家に引きこもっています。
経済的にも老後が心配で、人生を返してほしいと思います。」

- 「1年前に、左腕の手術(橈骨神経麻痺)●受けましたが、
現在も思い通りに自由に手首から指先が動かす事ができずに日常生活に支障がでています。
今後、年齢をかさねるにつれ、将来が不安で夜も眠れない事もしばしばあります。
家族に油症患者の事を伝えてないため、体に不調になると、
両親に相談をし、1人で悩んでいる事が多くなり、精神的にも辛い日々を送っております。
左腕の手術は原因不明によるもので手術にいたりしましたが、
今後も原因不明の症状が出る可能性もあり、不安です。」
- 「発症以来50年を過ぎ、体内から毒素が出る事なく、油症患者を苦しめています。
皮膚の出来物(頭、顔、お尻、色々な所に出来、毎日薬を付けない日は有りません。
息苦しく近頃、頭のふらつき、腸の方も悪く成り、
年々と不安で毎日安定剤、飲みながら過しています。
また膠原病の検査を数年前から年一度咳と息苦さで国立病院に受けに行っています。
年を取るにつれ病気が増え不安な毎です。
安心して生活が出来ればと思い頑張って生きています。」
- 「死が1ヶ月と思い早く和解金をと二、三日前迄言っていました。
現在意識はあるものの言葉が出ません。」
- 「深刻な次世代の健康被害を分かかってほしい。そして助けてほしい。
油を食べていない子供達までも苦悩の日々を送っています。
親として見るに忍びないです。」
- 「・年令的に年々病院通いが増え、もの忘れが多くなり今回の調査の様に今迄の全てに回答は疲れました。
・花粉症が今年は特にひどく医者からまだまだ続くと言われ、がっかりしてます。
足の衰えと、乾燥肌に悩まされています。」
- 「夜間睡眠時に足がケイレンして起きることがしばしばある。
65才をすぎたころより経験するようになりました。年齢的な筋力の衰えと考えています。
漢方薬芍薬甘草湯が著効します。」
- 「毎回同じ様な内容ですが、本人が高齢で書けなくなっています。
また、文章に理解ができない所が多いです。

●●

毎日の生活に風を引かない用に気付いています

風引くとなおらないのがあります

肺がんの治療を進められますがしたくない 半年に一度けんさを受けております」

○「骨の治療について

病院にて注射の治療をしています、カルシウムはとってはいけない、
あるいは牛乳は飲んではいけないとかで注射だけでは不安です。
筋肉はきたえて効果は出ますが骨の再成は時間がかかりこの先不安です
実際加齢によ筋肉がおとえて歩行に不安です。」

○「油症にかかってから、年も取っているけど、ますます骨がもろくなっています。」

○「油症にかかってから首にできているきずでいまでもなやんで居ります。

かるい人と、ひどい人の区別をしてほしいです。

いつもそんな思っ居ります。宜しくお願いします。」

○「現在●歳の息子、産まれた時は何の以上もなかった。

●歳の時脳出血で倒れ手術、脳動静脈奇形と診断される。先天性の異常でした。

治療により、3m×6m 程の頭がい骨欠損、右前頭部硬膜外腫瘍の治療・手術・再発と、今も投薬による治療が続いている。

息子の病気とカネミを結びつけようとは思っていないが、完治しない事で、

ついつい、私のせいでこうなったのでは…と考えてしまう事がある。」

○「腰部隋柱管狭窄症、また手根管症候群の病気で手、足のしびれがあり

今の所薬を飲んで治療していますが手術しないとなおらないのでわと心配になります。」

○「昨年腰痛を発症してから痛みが腰から下肢へと発症する 立てなくなる事もある。」

○「早く治療を確立してほしい。」

○「・2世を含む未確定被害者の実態調査を求む。

・認定基準は、血中濃度 PCDF の残留濃度に力点をおかず、症状による判断を求める。

(50才代～60才の血中濃度は、50以下が多数を占め、認定被害者を未認定でも区別する根拠は?)

・油症検診の診療科が県毎に●達している様に思える統一した検診を

ある県には婦人科があったり、なかったりしているのです。」

○「昨年に手首、関節を骨折したのですが、骨は完治したのですが、

手の指(手首)が良く動かなくなりました。時間がかかるのでしょうか心配です。

私の身内にかんにかかり"ステージ4"と言われ、今とても心配です。

がんにかかる確率が高いのでしょうか?

年のせいもあるのですが.....

毎年色々お世話頂き感謝しております。

どうぞよろしくお願いします。」

○「ホームでの食事ですが、飲み込むのをスムーズにするために、とろみをつけて食べています。

面会にいても、私達の事や、名前などわからない状態です。」

○「姉、妹もガングリオンになっていて、なにか、あるのかと...遺伝...子どもたちがならないか心配です」

○「私も姉もガングリオンになっている。遺伝なのか?子どもたちもならないか心配している」

○「油症検診血液検査の中で、異常に高い数値、項目があるので、

何か原因で高いのか、早急に研究してもらいたい。

①抗核抗体

②白血球数」

○「私はお蔭さまで、これまでに手術とか骨折は免れているのですが

何かの検査を新たな再検査等を指摘されることがこの年になってもあります。

そのたびに落ち込みます。

やはり、カネミ油症と言う公害は恐ろしいものです。

研究の成果が生きている間にと願ひ祈っております。

年を重ねる不安と発病の不安が日々心配です。」

○「コレステロールと骨の薬をいまだに飲み続けている」

○「平成14年頃乳がんて左乳房を切除し、うでの腫れや、左脇の皮フの異和感は続いていたが、

昨年より、左手が腫れ、病院に行ったが、効果なし

現在はリンパ専門の病院で、リンパ管と静脈をつなぐ手術をうけ、

いくらか引いたが、しまうと、腫れ、右手と同じ様にはもどらない現状あり。

リンパ液が普通に流れて、腫れが引く方法はないのかなと気になっています。

今のところは痛みはあまり感じていない。できれば、もとにもどしたい。」

- 「心筋梗そくのためいつ死んでもおかしくない状態と云われていますが、あまり死にそうにもないので、こうして、まだお世話になっています。よろしくお願いします。特に体力もなくなり、一人での動きは禁じられていますので、特に外出の時病院に行く時は同はん者が必ず心用です。足、要が痛み、手、足、のしびれが、ひどく困っていますが一日一日を大切にすべてを神様から与えられた命をくいのないように生きて行かねばと思っています。生きている限り 皆不美のお仕事の上に神様の祝福を祈っています。どうぞよろしくお願いします。」

- 「・油症検診で骨粗しょう症といわれ診療所で骨の薬を頂いて、週に一回のんでいますが時々、よるに休んでいる時とか、仕事をする時等、小々、いたみがあります。

・目になみだが出て仕事に支障きたしています。

目薬は診療所から頂いています

・耳の中が痛く聞こえにくい状態にな H31 年に●●耳鼻科咽喉科に受診しました。

液状の薬を頂き、一日に朝、夕、両耳に差し 20 分ずつおさえて治療するよう指示されました。

再診しどうか、治療しました。薬名はわかりません。

なくしたのでわかりません。

薬を頂いた所は、●●薬局です。」

- 「・ダイオキシンと人体の関係と影響についての研究、
・化学物質を体外に出す方法、また治療方法など
・断食療法や発汗、運動療法はどのくらい効果があるのか、性や年齢にも関係すのかなど、」

- 「月 1 回の片頭痛発作に悩んでいます。痛みのため 1 回寝込みます。
レルパックス（鎮痛剤）依存になることを恐れて現在は服用していません。
油症と関係があるのか研究してほしいです。」

- 「<改善していただきたいこと>

医療機関での治療をへて治癒…◎

↓

この文言ですが、医療機関での治療をへても治癒しなかった例もたくさんあると思うので、来年は、考えていただけたらありがたいです。

病院に行ったかどうかを知りたいのか、目的によって変わると思いますが。

<研究してもらいたいこと>

カネミ油症の方は化学物質過敏症になっている方が多いと思います。

私もその様な自覚は全くなかったのですが、

化学物質の入っていない歯みがき粉を使うようになって歯茎の腫れが止まったことや、ヘキササン抽出の食用油（普通に売られているサラダ油など）を止めて。

圧搾絞りの油を食べるようになってから、

油物を食べてもムカムカしなくなったりしたことで、わかりました。

それから、化学物質を体内に入れないように努力したことで健康回復への扉が開かれて行きました。

自営業を長くやってきましたが、最近、学校や保育園に努めるようになってから、

化学物質過敏症の体では、一般の仕事をするのが困難であることを思い知らされました。

小学校で使っているレモン石けんで手がとても荒れました。

これは安くて化学物質がたくさん入っています。

保育園で使っていたブッシュ式の手洗いソープで指紋がなくなり、スマホが指紋認識なくなりました。

保育園で窓をふくためのアルコール剤は、嗅ぐと具合が悪くなりました。

毎日行う由香の掃除で塩素系消毒剤を水に入れるのですが、

薄手の手袋をしてその中でぞうきんを洗ったら、手の骨が痛くなって大変でした。

私は化学物質を排除する生活で、何とか健康を保っているのですが、

一般の就職先では必ず化学物質にばくろしてしまいます。

油症患者は、働くこともとても困難だと感じています。

化学物質過敏症になっていることを研究でも明らかにしていただきたいです。」

- 「全身力が抜けた様な感じに突然なったり お腹の痛みは感じない時 急にげりしたり、病院や子供達の所へ行こうとする時突然で精神的な事？みたいに言われました、体力を考えると検査が難しくあきらめています 両膝、せなか左側の痛みヘルニアは知ってはいましたが、痛みでねむれず家事すら元気な時は、少しだけですごく気分が良いと感じる時がなくて最近は、主人も病気したので特に不安がつのりました。
- 友達と楽しく会話している時と食事の仕支している時、子供達が里帰り時、すごいめまいを数回経てんして病院で上手に伝える事が出来なく主人が漁師なので夜から次の日まで帰宅しないので1人の時 困った事が有ります。
- 入院生活をくり返していたので通院は、頑張っていますが何故体がこんな事に食事をした時も水みたいなげりが続き、耳は突発性で雑音だけで左が全くきこえない。夕方になると夜遅くは何故か具合が悪く 薬をのんで寝る生活口の奥がかんそう？息が辛くなります。
- 油症ひがいがあった時小3年か4年生の時のさわぎが●に出て ●、●の記憶が失っています。
- 子供●人いますが私と同じ、似た症状で心配しています
- 女には、話していますが●女には話せていません。
- 私にとって孫各1人ずついますが●女は男児、●女女児、4日違いで産まれています
- 脳にちょっと障害らしき事を最近聞かされました。
- 遺伝は、どの位まであるのでしょうか？
- 子供達も又その子、孫 病院通いが多いらしいので心配でなりません
- 油症患者と知れたら私みたいにいじめにもあうのでは？とか
- 笑顔を心がけていますが調子が悪いとどうしても顔に出ているみたいで皆から遠ざかっているみたいで ダイオキシンの恐さ知りませんでした。」
- 「認知症が進み 車いす生活をしていますので、わかる所を記入しました。
- これからますます、自分のこともわからなくなると思います。
- 健康調査の記入が出来なくなるのではと思っています。」
- 「問8は、治療はしていないのでほとんど△にしましたが 母は、体がきついのでもうすこし簡単にして回答できるようにして下さい。
- 才の母にとって聞き取りも、大変です。
- 「今回のアンケート問8以降は回答にこまる所が多かったように思います。
- もう少しわかりやすとすかります。
- (また、体調が悪くなくて病院にかかっても、どこもわるくないことがあります。
- そんな時は、治療はできませんで自分ではしょうじょうがあっても治療はしていません。」
- 「特にありません(どうしようもないから)
- 病気について、不安や心配はずっとついてきます。
- 治るとか、体の中からなくなるとか、消しすることはできない問題です。
- かかえている不安を話したところで…とそう思う気持ちが、先にたちます。」
- 「油症になって五十年です。
- 年をかさねる事により色々な病気になり、心配になります
- 年金の内から、健康保険、かいごほけん、の、ひきおとしです。
- 金が少なくて生活に困ります。
- 病気で入院になると家族に、せつめいがある時などカネミ倉庫方は、つきそいの交通ヒ 宿泊の分はだしてくれません
- 手術の時は家族に色々説明が有りますが、一円の金もだしてもらえません、
- 主人は、13年前に他界しました。スイズウがんでした
- 主人がなくなった時にカネミさんから3万円だけ送って来ました
- 男は主人がなくなってから、カコキュ病から神経障害の病気になりはたらく事ができず、私の年金で生活していましたが、苦して生活ほごのお世話で暮しています。
- 衣類も買えず人様の古着ですごしています
- 平成27年に私は心臓の中にシュヨウがみつきり福岡の大学病院で手術を受けました
- 病名は(シンボウネンマクシュウ)でした。
- 病院で二人目だったそうです、私達油症の方は、色々な病気をします。
- きんせんと子供達の事で心配です

年を老いて行 私達は、せいしんてき、これからの事が心配です

どうか国の方で、えんじょをお願いします どうか国の方で私達を、おたすけ下さいませ
手がふるえるので字が●し筆にない読みづらいでしょうが、どうかどうかお願いします」

- 「昨年の油症検診で高感度 CRP で異常があり大腸ポリープは取りのぞきましたが

心臓の血管が 50%程つまっているとの診断をいただきました。

運動と禁煙を進められ、現在それに取りくんでいます

禁煙が不安障害の事もありなかなかいかんせんしません。

また、脳の血管は調べていませんので、これらの方も不安です。」

- 「2 世・3 世の健康が気になります。

誕生後から気になる症状はたくさんありましたが、診断名が見つからないこともありました。

症状的にはいくつもあり、本人もきつい、つらいとよく言っています。

医療費が高額になりそうな時は、本当に困るし、受診することすらせずにがまんしているようです。

医療面での救済をお願い致します。

以上」

- 「両足の痛みで下記の症状で困惑しています。

記

1. 両足の甲の表面が赤くなること

2. 寝台や椅子に足を下げて座ると痛みがでてきて長く座れない。

3. 夜は同じ方向で寝ると痛みがでてきて目がさめ睡眠不足となっています。

4. 塗薬のヒルドイド 0.3%を塗り少し和らげて寝る毎日です。

私のこれまでの検診でタイオキシンの血中濃度は 95 でした排泄は到底困難と思います。

少しでも痛を和らげる薬の研究開発を要望致します。」

- 「医療費の支払に関する要望。

受療券を使用できる医療機関に於いて風邪で受診した場合、窓口で費用負担を求められます。

風邪は油症とは関連のない治療として加害企業への請求枠から除外されています。

風邪は誰でもが罹る疾患ではありますが、油症被害者の場合風邪ひきやすく、

又免疫力が弱い為、中々治りづらい傾向にあります。

加害企業の負担の枠から除外されていることに疑問を感じます。

油症は病名がつく病いと、はっきりとした病名等なく様々な煩わしさに日々悩まされている全身痛です。

改善を望みます。」

- 「・粉瘤を手術してきれいに直したい。

外科手術は大きなキズが残ると聞くが、きれいに治る方法を検討して下さい。

・食物アレルギーの数が多く、自由に食べられるものが少ない。

油症と関連があるのか？（50 代にわかったこと）」

- 「◎今年の調査票は症状も前にあったり、現在も症状はあるけど、

治療してないとかで、○◎△の記入はまよって、しにくいー。」

- 「1. 全身倦怠感は医療機関に相談する科は内科なのか、その際、薬など服用してもらえるのか不安で、

認定患者以外の人も倦怠感がある人も多いので、その差を認めてもらえないような感じがします。

2. 市販の滋養強壮剤などを服用して、日々暮らしていますが、休みの日など、倦怠感で、横になってばかりです。

その研究と研究機関が九州大学から変更とかはないのでしょうか？

毎回研究報告会に参加していますが、変化や成果が期待できない。」

- 「毎年、毎年、毎日がだるくて足がふらついてきつくて

自分でも気づかないうちに声に出してため息ばかりついています

生きているうちに治療薬はできないでしょうか。」

- 「50 年経った今でも、毎日疲れやすくてだるくて日々の生活を送るのが精一杯の毎日です。

私事です、娘が秋に出産します。

聞いた時にすぐおめでとうと言葉が出るのでしょうか、私は言えませんでした。

喜んで話している娘の声を聞きながら、五体満足の子ちゃんが産まれてくるだろうか

まさか黒い赤ちゃんは産まれないよねとカネミ油症の症状をいろいろ考えました。

健康で元気な赤ちゃんを願う気持ちは皆さん同じです。

でも油症である私は、出産は母子共に大丈夫だろうか、

カネミの影響はないだろうか、不安ばかりがつのりました。

私達、カネミ油症看者は自分の事はもちろんですが、
子供、孫、ひ孫と次の世代への心配と不安はつきません。
この苦しみ、悲しみ、憤りはどこにぶつければいいですか。
カネカですか。カネミ倉庫ですか。それさえできません。」

- 「今まで皮膚科に受診することがありませんでしたが、2・3年前からヘルペスだったり、その他皮膚の重なるところがお腹やわきの下などが炎しょうして行くことが多くなりました。」
- 「ご支援ありがとうございます。動ける間は、がんばって働こうと思ってます。
高齢になる母が心配ですが、今のところ自分で、生活できてますので少し安心してます。
私もいつまで働けるかわかりません…
これからもよろしくお願いします。」
- 「今更ながら何をという感じですがー。
身体がなえて本当にだるくなりーこういう事がしょつ中です。
何が出来ると問われれば自分で出来ます。
でも身体のかちかちを取る事が出来れば本当に幸せを感じると思います。
整体、耳ツボ、リンパマッサージ、ありとあらゆる事をしています。
でもこれはとてもお金を使っています。
痛院で薬をもらって治ればこれ程良い事はないと思います。
でも保険で出来るものではないので、でも仕方ない事です。
何かしらやって楽になりたいと思何十年もこの様な生活を送って来ました。
ほんの一時でも楽になれば…と思いつつです。
でもこれはたまたま購入した油を自分で使っているのだからどうしようもありません。
子供、孫ー皆んなにわびながら今から先を生きてしょう。
主人は文句も言わずに肺がんでなくなりましたがー。
くやしくてなりません。こんな気持、お分かりでしょうか？」
- 「男の子は元気ですが娘現在通院中。
いろいろな痛みで心配（子供の時より歯が少なかった事、側わん症と言われたり）」
- 「自力での体動が出きない為不快は感じていると思います。」
- 「強皮症によるレイノー症状の頻度が増え、手足の指のしびれや痛みがあります。
手指が腫れたり、指先の色がなかなか戻らなかったりするので、
寒い時期は常に使い捨てカイロが手放せません。
油症との関連はないのでしょうか。血液の病気なので今後が心配です。
治る病気ではないことはわかっているのですが、関連性があるかどうか…
研究をして頂けると幸いです。」
- 「これまで油症検診で「再検査」を求められても、近くの病院で「対応」できるところがなかったのが、
●●県の担当課・者の御努力で、受診できる所ができました。
大変助かりました。ありがとうございました。」
- 「網膜剥離で左目の手術を受け、10日間の入院後現在家で療養しています。
昨年より眼の状態があまりよくなかったので注意していましたが突然のことでショックでした。
順調に回復はしていますが、時間はかかりそうで視力が完全に戻るか不安です。
仕事や家族の病気のケアも続くのでどうやって対処していくか悩んでいます。」

参考資料 調査票

