

# 令和7年度 健康実態調査結果の報告

令和8年1月

厚生労働省 健康・生活衛生局 食品監視安全課



1	調査の概要	1
1.1	調査の目的	1
1.2	調査の対象	1
1.3	調査期間	1
1.4	調査項目	1
1.5	調査結果の活用	1
1.6	調査の実施状況	1
2	調査結果	2
2.1	調査の実施状況について	2
2.2	生活習慣について	3
2.2.1	1日の歩行時間	3
2.2.2	運動（スポーツ）頻度	4
2.2.3	飲酒頻度	5
2.2.4	喫煙状況	7
2.2.5	労働時間	13
2.2.6	野菜摂取量	14
2.2.7	果物類摂取量	15
2.2.8	効果があると思われるサプリメント・健康食品	16
2.2.9	漢方薬の服用	18
2.3	健康・悩み・ストレス・睡眠について	21
2.3.1	日常生活での悩みやストレス	21
2.3.2	睡眠時間	24
2.3.3	睡眠時間のとれている度合い	25
2.3.4	座っているとき、または横になっている間の脚の不快感や不快な感覚の有無	26
2.3.5	座っているとき、または横になっている間の脚を動かす必要性や動かしたい衝動の有無	27
2.4	介護や日常生活動作の状況について	31
2.4.1	病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況	31
2.4.2	要介護認定の状況	32
2.4.3	介助なしでできること	36
2.5	現在の治療状況について	38
2.5.1	現在の受診頻度	38
2.5.2	医師の方から処方されているお薬	39
2.5.3	現在の服用（塗布）の状況（薬の対象となる病気）	40
2.6	油症患者受療券（受療券）の利用状況について	41
2.6.1	受療券の保有状況	41
2.6.2	受療券を使用せずに受診したことがあるか	42
2.6.3	受療券を利用せずに受診した理由	43
2.6.4	受療券を持たない理由	44
2.6.5	受療券の利用を希望する医療機関	45
2.7	油症検診について	47
2.7.1	昨年度の油症検診の受診	47
2.7.2	油症検診の受診を受けなかった理由	48
2.8	相談体制について	50
2.8.1	油症相談員や相談窓口への相談経験	50
2.8.2	今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容	51
2.9	罹患と治療状況について	52
2.9.1	この一年間（または前回回答以降）に新たに罹った病気	52
2.10	罹患と治療状況について	54
2.10.1	悪性腫瘍（がん）について	54
2.10.2	脳・精神・神経の病気・症状について	56
2.10.3	自律神経系の病気・症状について	57
2.10.4	眼の病気・症状について	58
2.10.5	口の中の病気・症状について	59
2.10.6	耳・鼻の病気・症状について	60
2.10.7	甲状腺の病気・症状について	61

2.10.8	のど・気管支・肺の病気・症状について	62
2.10.9	心臓の病気・症状について	63
2.10.10	高血圧や血管の病気・症状について	65
2.10.11	肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について	67
2.10.12	すい臓の病気・症状について	68
2.10.13	腎臓・膀胱の病気・症状について	69
2.10.14	食道・胃・腸・肛門の病気・症状について	70
2.10.15	血液・リンパの病気・症状について	71
2.10.16	前立腺・男性機能に関する病気・症状について（男性のみ）	73
2.10.17	子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について（女性のみ）	73
2.10.18	月経・妊娠・出産に関することについて（女性のみ）	74
2.10.19	骨・関節の病気・症状について	76
2.10.20	皮膚・爪の病気・症状について	78
2.10.21	アレルギー疾患について	80
2.10.22	膠原病について	81
2.10.23	その他の病気・症状について	83
2.11	調査票の自由記入欄について	85
別表	調査結果の性・年齢（5歳階級）別集計表	87
（再掲）	2.12 調査票の自由記入欄について（すべての回答）	279
参考資料	調査票	293

## 1 調査の概要

### 1.1 調査の目的

平成 24 年 9 月に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が施行され、「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（厚生労働省・農林水産省告示）に基づき、カネミ油症患者の生活習慣、病状、治療内容等について把握し、カネミ油症に関する調査研究を更に推進することを目的とする。

### 1.2 調査の対象

各都道府県で把握している 1,440 人（令和 7 年 3 月 31 日時点の調査対象見込者数、前年度 1,498 人）のうち、死亡や所在不明の方、非協力の意向を示された方を除く 1,237 人に調査にご協力いただいた。

### 1.3 調査期間

令和 7 年 4 月～6 月末

### 1.4 調査項目

平成 20 年度に厚生労働省が実施した油症患者に係る健康実態調査の調査項目を元に、全国油症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）で、カネミ油症患者の意見を聞きつつ決定した生活習慣、健康状態や悩み、治療状況、これまでにかかったことのある病気・症状などの項目を調査した。

### 1.5 調査結果の活用

調査結果については、アンケートに基づく調査の医学的・科学的解釈の限界に留意しつつ、全国油症治療研究班（厚生労働科学研究費補助金による）において、過去の健康実態調査及び過去の検診結果等と併せてより詳細な解析を行い、翌年度以降の健康実態調査項目などカネミ油症に関する調査研究に活用される予定である。

### 1.6 調査の実施状況

各都道府県で把握している 1,440 人の認定患者（令和 7 年 3 月 31 日時点の調査対象見込者数、前年度 1,498 人）のうち、死亡や所在不明の方、非協力の意向を示された方等を除いた 1,237 人（前年度 1,253 人）から回答を得た。

以下の報告は、本調査に回答があった 1,237 人（前年度 1,253 人）についてとりまとめたものである。

「割合」の計算において使用する分母は、表中に記載している N の値とする。

## 2 調査結果

### 2.1 調査の実施状況について

回答者の性別は、男性 577 人、女性 660 人となっている（前年度 男性 593 人、女性 660 人）。回答者の平均年齢（回答時点での申告年齢）は 70.3 歳（男性 69.3 歳、女性 71.2 歳）となっている。

男性は、「65 歳～69 歳」の者が 120 人（20.8%）（前年度 117 人（19.7%））と最も多く、次いで、「60 歳～64 歳」が 114 人（19.8%）（前年度 114 人（19.2%））、「70 歳～74 歳」が 96 人（16.6%）（前年度 86 人（14.5%））等の順となっている。

女性は、「60～64 歳」の者が 118 人（17.9%）（前年度 124 人（18.8%））「65～69 歳」が 118 人（17.9%）（前年度 112 人（17.0%））が共に最も多く、次いで、「70 歳～74 歳」が 104 人（15.8%）（前年度 100 人（15.2%））等の順となっている。

各集団の男女比及び年齢階級については、表 1-1、1-2、図 1-1 のとおりである。

表 1-1 回答者の男女比

	回答者 (N=1237)	
	件数	割合
男性	577	46.6%
女性	660	53.4%
計	1,237	100.0%

図 1-1 回答者数及び年齢階級別回答者の割合




表 1-2 回答者数及び年齢階級別回答者の割合

	男性 (N=577)		女性 (N=660)		計 (N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
40歳～44歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
45歳～49歳	2	0.3%	5	0.8%	7	0.6%
50歳～54歳	19	3.3%	18	2.7%	37	3.0%
55歳～59歳	72	12.5%	68	10.3%	140	11.3%
60歳～64歳	114	19.8%	118	17.9%	232	18.8%
65歳～69歳	120	20.8%	118	17.9%	238	19.2%
70歳～74歳	96	16.6%	104	15.8%	200	16.2%
75歳～79歳	52	9.0%	71	10.8%	123	9.9%
80歳～84歳	40	6.9%	57	8.6%	97	7.8%
85歳～89歳	34	5.9%	55	8.3%	89	7.2%
90歳以上	28	4.9%	46	7.0%	74	6.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

## 2.2 生活習慣について

### 2.2.1 1日の歩行時間


農作業・家事などを含め1日の平均的な歩行時間についてみると、男性は「30分以上～60分未満」が30.8%（前年度31.2%）と最も多く、次いで、「90分以上」が26.7%（前年度24.6%）、「30分未満」が25.5%（前年度25.0%）等の順となっている。

女性は、「90分以上」が35.5%（前年度35.3%）と最も多く、次いで、「30分以上～60分未満」が24.4%（前年度25.6%）、「30分未満」が20.5%（前年度19.5%）等の順となっている。（表2-1、図2-1）

表2-1 1日の歩行時間

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
90分以上	154	26.7%	234	35.5%	388	31.4%
60分以上～90分未満	98	17.0%	124	18.8%	222	17.9%
30分以上～60分未満	178	30.8%	161	24.4%	339	27.4%
30分未満	147	25.5%	135	20.5%	282	22.8%
未回答	0	0.0%	6	0.9%	6	0.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図2-1 1日の歩行時間




### 2.2.2 運動（スポーツ）頻度

ウォーキング、ジョギング、体操も含めた運動（スポーツ）頻度をみると、「ほとんどしていない」と回答した方が39.2%（男性36.7%、女性41.4%）（前年度 男性41.1%、女性40.8%、全体40.9%）と最も多く、次いで、「週2～4回程度」が23.4%（男性23.1%、女性23.6%）（前年度 男性22.6%、女性21.2%、全体21.9%）、「ほぼ毎日」が19.8%（男性18.7%、女性20.8%）（前年度 男性16.5%、女性19.4%、全体18.0%）、「週1回程度」が12.3%（男性14.7%、女性10.2%）（前年度 男性15.0%、女性13.5%、全体14.2%）、「月1回程度」が4.6%（男性6.2%、女性3.2%）（前年度 男性4.2%、女性3.8%、全体4.0%）の順となっている。（表2-2、図2-2）

表2-2 運動（スポーツ）頻度

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ほぼ毎日	108	18.7%	137	20.8%	245	19.8%
週2～4回程度	133	23.1%	156	23.6%	289	23.4%
週1回程度	85	14.7%	67	10.2%	152	12.3%
月1回程度	36	6.2%	21	3.2%	57	4.6%
ほとんどしていない	212	36.7%	273	41.4%	485	39.2%
未回答	3	0.5%	6	0.9%	9	0.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図2-2 運動（スポーツ）頻度




### 2.2.3 飲酒頻度

飲酒頻度をみると、「飲まない」と回答した方が54.4%（男性35.2%、女性71.2%）（前年度 男性36.8%、女性70.0%、全体54.3%）と最も多くなっている。（表2-3-1、図2-3-1）

表2-3-1 飲酒頻度

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ほぼ毎日	189	32.8%	41	6.2%	230	18.6%
週3～5回程度	68	11.8%	36	5.5%	104	8.4%
週1～2回程度	44	7.6%	32	4.8%	76	6.1%
月1～3回程度	38	6.6%	36	5.5%	74	6.0%
年1～10回程度	30	5.2%	39	5.9%	69	5.6%
飲まない	203	35.2%	470	71.2%	673	54.4%
未回答	5	0.9%	6	0.9%	11	0.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図2-3-1 飲酒頻度




飲酒をすると回答した 553 人（前年度 565 人）の 1 日の飲酒量（ビール大瓶換算）についてみると、男性では「1～2 本未満」が 38.5%（前年度 42.7%）と最も多く、女性では「0.5～1 本未満」が 54.9%（前年度 54.4%）と最も多くなっている。全体では、「0.5～1 本未満」が 39.6%（男性 32.0%、女性 54.9%）（前年度男性 27.2%、女性 54.4%、全体 36.5%）と最も多く、次いで、「1～2 本未満」が 34.4%（男性 38.5%、女性 26.1%）（前年度 男性 42.7%、女性 23.8%、全体 36.3%）等の順となっている。（表 2-3-2、図 2-3-2）

表 2-3-2 飲酒量

	男性 (N=369)		女性 (N=184)		計 (N=553)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0.5本未満	6	1.6%	8	4.3%	14	2.5%
0.5～1本未満	118	32.0%	101	54.9%	219	39.6%
1～2本未満	142	38.5%	48	26.1%	190	34.4%
2～3本未満	77	20.9%	17	9.2%	94	17.0%
3～4本未満	15	4.1%	0	0.0%	15	2.7%
4～5本未満	4	1.1%	0	0.0%	4	0.7%
5～10本未満	6	1.6%	1	0.5%	7	1.3%
10本以上	0	0.0%	1	0.5%	1	0.2%
未回答	1	0.3%	8	4.3%	9	1.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	369	100.0%	184	100.0%	553	100.0%

図 2-3-2 飲酒量




## 2.2.4 喫煙状況

喫煙状況についてみると、「吸ったことがない」と回答した方が52.2%（男性22.0%、女性78.6%）（前年度 男性21.9%、女性78.9%、全体52.0%）と最も多くなっている。（表2-4-1、図2-4-1）

表2-4-1 喫煙状況

	男性 (N=577)		女性 (N=660)		計 (N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
吸う	160	27.7%	48	7.3%	208	16.8%
やめた	286	49.6%	82	12.4%	368	29.7%
吸ったことがない	127	22.0%	519	78.6%	646	52.2%
未回答	4	0.7%	11	1.7%	15	1.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図2-4-1 喫煙状況




たばこを吸うと回答した 208 人（前年度 215 人）の喫煙年数をみると、男性は「40 年以上」が 66.3%（前年度 61.0%）と最も多く、次いで、「30 年～40 年未満」が 23.1%（前年度 28.0%）、「20 年～30 年未満」が 5.6%（前年度 7.3%）等の順となっている。

女性では、「40 年以上」が 37.5%（前年度 37.3%）と最も多く、次いで、「30 年～40 年未満」が 35.4%（前年度 39.2%）、「20 年～30 年未満」が 14.6%（前年度 11.8%）等の順となっている。（表 2-4-2、図 2-4-2）

表 2-4-2 喫煙状況（喫煙者 喫煙年数）

	男性 (N=160)		女性 (N=48)		計 (N=208)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0～2年未満	2	1.3%	2	4.2%	4	1.9%
2年～3年未満	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%
3年～5年未満	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%
5年～10年未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
10年～20年未満	1	0.6%	3	6.3%	4	1.9%
20年～30年未満	9	5.6%	7	14.6%	16	7.7%
30年～40年未満	37	23.1%	17	35.4%	54	26.0%
40年以上	106	66.3%	18	37.5%	124	59.6%
未回答	3	1.9%	1	2.1%	4	1.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	160	100.0%	48	100.0%	208	100.0%

図 2-4-2 喫煙状況（喫煙者 喫煙年数）




たばこを吸うと回答した208人（前年度 215人）の1日の平均喫煙本数をみると、男性は「20本～30本未満」が53.1%（前年度 53.7%）と最も多く、女性は「10本～20本未満」が58.3%（前年度 49.0%）と最も多くなっている。（表2-4-3、図2-4-3）

表2-4-3 喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）

	男性 (N=160)		女性 (N=48)		計 (N=208)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1～5本未満	3	1.9%	1	2.1%	4	1.9%
5本～10本未満	6	3.8%	8	16.7%	14	6.7%
10本～20本未満	50	31.3%	28	58.3%	78	37.5%
20本～30本未満	85	53.1%	10	20.8%	95	45.7%
30本～40本未満	9	5.6%	1	2.1%	10	4.8%
40本以上	6	3.8%	0	0.0%	6	2.9%
未回答	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	160	100.0%	48	100.0%	208	100.0%

図2-4-3 喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）




たばこをやめたと回答した 368 人（前年度 371 人）の喫煙年数をみると、「20 年～30 年未満」が 26.6%（男性 28.3%、女性 20.7%）（前年度 男性 28.9%、女性 32.5%、全体 29.6%）と最も多く、次いで、男性は「40 年以上」が 19.2%（前年度 男性 17.0%）、「10 年～20 年未満」が 18.2%（前年度 男性 15.6%）等の順となっている。

女性は「30 年～40 年未満」が 22.0%（前年度 13.0%）と最も多く、次いで、「20 年～30 年未満」が 20.7%（前年度 32.5%）、「10 年～20 年未満」が 18.3%（前年度 11.7%）、「40 年以上」13.4%（前年度 11.7%）等の順となっている。（表 2-4-4、図 2-4-4）

表 2-4-4 喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）

	男性 (N=286)		女性 (N=82)		計 (N=368)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0～2年未満	6	2.1%	1	1.2%	7	1.9%
2年～3年未満	3	1.0%	3	3.7%	6	1.6%
3年～5年未満	7	2.4%	7	8.5%	14	3.8%
5年～10年未満	16	5.6%	6	7.3%	22	6.0%
10年～20年未満	52	18.2%	15	18.3%	67	18.2%
20年～30年未満	81	28.3%	17	20.7%	98	26.6%
30年～40年未満	47	16.4%	18	22.0%	65	17.7%
40年以上	55	19.2%	11	13.4%	66	17.9%
未回答	19	6.6%	4	4.9%	23	6.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	286	100.0%	82	100.0%	368	100.0%

図 2-4-4 喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）




たばこをやめたと回答した 368 人（前年度 371 人）の過去の喫煙本数をみると、男性は「20 本～30 本未満」が 50.3%（前年度 48.6%）と最も多く、次いで、「10 本～20 本未満」が 19.6%（前年度 19.7%）、「40 本以上」が 12.9%（前年度 11.9%）等の順となっている。

女性は「10 本～20 本未満」が 51.2%（前年度 49.4%）と最も多く、次いで、「20 本～30 本未満」が 25.6%（前年度 23.4%）、「5 本～10 本未満」が 9.8%（前年度 10.4%）等の順となっている。（表 2-4-5、図 2-4-5）

表 2-4-5 喫煙状況（卒煙者 喫煙本数）

	男性 (N=286)		女性 (N=82)		計 (N=368)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1～5本未満	3	1.0%	6	7.3%	9	2.4%
5本～10本未満	11	3.8%	8	9.8%	19	5.2%
10本～20本未満	56	19.6%	42	51.2%	98	26.6%
20本～30本未満	144	50.3%	21	25.6%	165	44.8%
30本～40本未満	23	8.0%	1	1.2%	24	6.5%
40本以上	37	12.9%	1	1.2%	38	10.3%
未回答	12	4.2%	3	3.7%	15	4.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	286	100.0%	82	100.0%	368	100.0%

図 2-4-5 喫煙状況（卒煙者 喫煙本数）




たばこをやめたと回答した 368 人（前年度 371 人）が何年前に卒煙したかについてみると、男性は「30 年以上」が 29.7%（前年度 28.2%）と最も多く、次いで、「20 年～30 年未満」が 26.9%（前年度 24.1%）、「15 年～20 年未満」が 14.7%（前年度 13.3%）等の順となっている。

女性では「10 年～15 年未満」が 23.2%（前年度 15.6%）と最も多く、次いで、「30 年以上」22.0%（前年度 20.8%）、「20 年～30 年未満」が 14.6%（前年度 16.9%）、「5 年～10 年未満」「15 年～20 年未満」が共に 12.2%（前年度 20.8%、11.7%）等の順となっている。（表 2-4-6、図 2-4-6）

表 2-4-6 喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）

	男性 (N=286)		女性 (N=82)		計 (N=368)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1年未満	2	0.7%	2	2.4%	4	1.1%
1～2年未満	10	3.5%	2	2.4%	12	3.3%
2年～3年未満	5	1.7%	4	4.9%	9	2.4%
3年～4年未満	8	2.8%	4	4.9%	12	3.3%
4年～5年未満	3	1.0%	0	0.0%	3	0.8%
5年～10年未満	18	6.3%	10	12.2%	28	7.6%
10年～15年未満	34	11.9%	19	23.2%	53	14.4%
15年～20年未満	42	14.7%	10	12.2%	52	14.1%
20年～30年未満	77	26.9%	12	14.6%	89	24.2%
30年以上	85	29.7%	18	22.0%	103	28.0%
未回答	2	0.7%	1	1.2%	3	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	286	100.0%	82	100.0%	368	100.0%

図 2-4-6 喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）



## 2.2.5 労働時間


労働時間についてみると、男性は「4時間未満」と回答した方が35.2%（前年度35.1%）と最も多く、次いで、「8時間以上9時間未満」が17.0%（前年度16.7%）、「7時間以上～8時間未満」が11.8%（前年度11.3%）等の順となっている。

女性は「4時間未満」と回答した方が40.8%（前年度40.2%）と最も多く、次いで、「4時間以上5時間未満」が11.5%（前年度12.7%）、「6時間以上～7時間未満」が8.9%（前年度7.4%）、「5時間以上～6時間未満」が8.8%（前年度8.9%）等の順となっている。（表2-5、図2-5）

表2-5 労働時間

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
10時間以上	45	7.8%	57	8.6%	102	8.2%
9時間以上～10時間未満	43	7.5%	39	5.9%	82	6.6%
8時間以上～9時間未満	98	17.0%	48	7.3%	146	11.8%
7時間以上～8時間未満	68	11.8%	48	7.3%	116	9.4%
6時間以上～7時間未満	28	4.9%	59	8.9%	87	7.0%
5時間以上～6時間未満	31	5.4%	58	8.8%	89	7.2%
4時間以上～5時間未満	57	9.9%	76	11.5%	133	10.8%
4時間未満	203	35.2%	269	40.8%	472	38.2%
未回答	4	0.7%	6	0.9%	10	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図2-5 労働時間



## 2.2.6 野菜摂取量


野菜摂取量についてみると、「70g以上140g未満(1~2つ)」と回答した方が33.4%(男性37.1%、女性30.2%)(前年度男性40.1%、女性32.3%、全体36.0%)と最も多く、次いで、男性は「70g未満(1つ未満)」が27.7%(前年度28.2%)、「140g以上210g未満(2~3つ)」が18.7%(前年度16.7%)等の順となっている。

女性は「140g以上210g未満(2~3つ)」が23.0%(前年度22.3%)、「210g以上280g未満(3~4つ)」が18.2%(前年度16.8%)等の順となっている。(表2-6、図2-6)

表2-6 野菜摂取量

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
70g未満(1つ未満)	160	27.7%	113	17.1%	273	22.1%
70g以上140g未満(1~2つ)	214	37.1%	199	30.2%	413	33.4%
140g以上210g未満(2~3つ)	108	18.7%	152	23.0%	260	21.0%
210g以上280g未満(3~4つ)	56	9.7%	120	18.2%	176	14.2%
280g以上350g未満(4~5つ)	24	4.2%	48	7.3%	72	5.8%
350g以上(5つ以上)	11	1.9%	22	3.3%	33	2.7%
未回答	4	0.7%	6	0.9%	10	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図2-6 野菜摂取量




## 2.2.7 果物類摂取量

果物摂取量についてみると、「50g未満」と回答した方が52.8%（男性57.9%、女性48.3%）（前年度 男性62.2%、女性45.3%、全体53.3%）と最も多く、次いで、「50g以上100g未満」が28.9%（男性27.4%、女性30.3%）（前年度 男性22.1%、女性30.0%、全体26.3%）、「100g以上150g未満」が14.5%（男性12.8%、女性15.9%）（前年度 男性12.8%、女性18.3%、全体15.7%）等の順となっている。（表2-7、図2-7）

表2-7 果物類摂取

	男性 (N=577)		女性 (N=660)		計 (N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
50g未満	334	57.9%	319	48.3%	653	52.8%
50g以上100g未満	158	27.4%	200	30.3%	358	28.9%
100g以上150g未満	74	12.8%	105	15.9%	179	14.5%
150g以上	8	1.4%	29	4.4%	37	3.0%
未回答	3	0.5%	7	1.1%	10	0.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図2-7 果物類摂取




## 2.2.8 効果があると思われるサプリメント・健康食品

効果があると思われるサプリメント・健康食品の有無についてみると、「ある」と回答した方は12.9%（男性10.2%、女性15.3%）（前年度 男性12.1%、女性14.1%、全体13.2%）となっている。（表2-8-1、図2-8-1）

表2-8-1 効果があると思われるサプリメント・健康食品

	男性 (N=577)		女性 (N=660)		計 (N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	59	10.2%	101	15.3%	160	12.9%
ない	493	85.4%	536	81.2%	1,029	83.2%
未回答	25	4.3%	23	3.5%	48	3.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図2-8-1 効果があると思われるサプリメント・健康食品



また、効果があると思われるサプリメント・健康食品があると回答した 160 人から具体的な品目名について回答があった。「ビタミン」が 20 件と最も多く、次いで、「青汁」が 14 件、「DHA、EPA サプリ」が 9 件、「ロコモア」が 8 件等の順となっている。(表 2-8-2)

表 2-8-2 効果があると思われるサプリメント・健康食品（上位品目）

	計
ビタミン	20
青汁	14
DHA、EPA サプリ	9
ロコモア	8
カルシウム	6
ブルーベリーエキス	5
ルテイン	5
高麗人参	5
黒酢	5
酵素	4
田七人参	4
イタドリ	3
クロレラ	3
しじみ習慣	3
にんにく	3


### 2.2.9 漢方薬の服用

漢方薬の服用の有無についてみると、「定期的に飲んでいる」と回答した方は 11.2%（男性 8.7%、女性 13.3%）、「症状があるときに飲んでいる」と回答した方は 7.2%（男性 5.5%、女性 8.6%）となっている。（表 2-9-1、図 2-9-1）

表 2-9-1 漢方薬服用の有無

	男性 (N=577)		女性 (N=660)		計 (N=1237)	
	割合	件数	割合	件数	割合	件数
定期的に飲んでいる	50	8.7%	88	13.3%	138	11.2%
症状があるときに飲んでいる	32	5.5%	57	8.6%	89	7.2%
飲んでいない	483	83.7%	497	75.3%	980	79.2%
未回答	12	2.1%	18	2.7%	30	2.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1237	100.0%

図 2-9-1 漢方薬服用の有無



また、「定期的に飲んでいる」または「症状があるときに飲んでいる」と回答した 227 人から具体的な品目名について回答があった。「芍薬甘草湯(ツムラ 68 番など)」が 63 件と最も多く、次いで、「大建中湯(ツムラ 100 番など)」が 25 件、「桂枝茯苓丸(ツムラ 25 番など)」が 16 件等の順となっている。(表 2-9-2)

表 2-9-2 内服中の漢方薬 (複数回答)

	計
	件数
芍薬甘草湯(ツムラ68番など)	63
大建中湯(ツムラ100番など)	25
桂枝茯苓丸(ツムラ25番など)	16
その他	120
未回答	31
不詳	0

漢方薬で効果があったと思われる症状は、「こむら返り(足がつる)」が 59 件と最も多く、次いで、「便秘・下痢」が 44 件、「倦怠感(体がだるい)」が 36 件等の順となっている。(表 2-9-3)

表 2-9-3 効果があったと思われる症状 (複数回答)

	計
	件数
こむら返り(足がつる)	59
便秘・下痢	44
倦怠感(体がだるい)	36
咳	27
冷え	23
手足のしびれ	21
不眠	17
腹痛	15
皮膚症状	7
腹痛以外の痛み	5
その他	67
未回答	24
不詳	0

反対に、効果が無かったと思われる症状は、「手足のしびれ」が28件と最も多く、次いで、「倦怠感(体がだるい)」が25件、「咳」が24件、「便秘・下痢」「皮膚症状」が共に22件等の順となっている。(表2-9-4)

表2-9-4 効果がなかったと思われる症状(複数回答)

	計
	件数
手足のしびれ	28
倦怠感(体がだるい)	25
咳	24
便秘・下痢	22
皮膚症状	22
こむら返り(足がつる)	21
不眠	20
冷え	18
腹痛以外の痛み	15
腹痛	9
その他	63
未回答	104
不詳	0

## 2.3 健康・悩み・ストレス・睡眠について


### 2.3.1 日常生活での悩みやストレス

日常生活での悩みやストレスの有無について、「ある」と回答した方が860人（69.5%）（男性385人（66.7%）、女性475人（72.0%））（前年度 男性389人（65.6%）、女性482人（73.0%）、全体871人（69.5%））となっている。（表3-1-1、図3-1-1）

表3-1-1 日常生活での悩みやストレスの有無

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	385	66.7%	475	72.0%	860	69.5%
ない	182	31.5%	164	24.8%	346	28.0%
未回答	10	1.7%	21	3.2%	31	2.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図3-1-1 日常生活での悩みやストレスの有無



日常生活での悩みやストレスが「ある」と回答した 860 人（男性 385 人、女性 475 人）（前年度 男性 389 人、女性 482 人、全体 871 人）を対象に、悩みやストレスの原因を質問したところ、「自分の健康状態、病気や介護」と回答した方が 66.4%（男性 62.1%、女性 69.9%）と最も多く（前年度 男性 65.0%、女性 68.3%、全体 66.8%）、次いで、「家族の健康状態、病気や介護」が 38.3%（男性 31.9%、女性 43.4%）（前年度 男性 33.7%、女性 42.5%、全体 38.6%）、「収入・家計・借金等」が 31.4%（男性 37.4%、女性 26.5%）（前年度 男性 39.1%、女性 28.8%、全体 33.4%）、「自分の仕事」が 26.6%（男性 34.8%、女性 20.0%）（前年度 男性 35.0%、女性 20.1%、全体 26.8%）、「家族との人間関係」が 19.3%（男性 16.9%、女性 21.3%）（前年度 男性 17.0%、女性 21.8%、全体 19.6%）等の順となっている。（表 3-1-2）

表 3-1-2 悩みやストレスの原因（複数回答）

	男性(N=385)		女性(N=475)		計(N=860)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
家族との人間関係	65	16.9%	101	21.3%	166	19.3%
家族以外との人間関係	44	11.4%	79	16.6%	123	14.3%
恋愛・性に関すること	8	2.1%	3	0.6%	11	1.3%
結婚	6	1.6%	1	0.2%	7	0.8%
離婚	2	0.5%	2	0.4%	4	0.5%
いじめ、セクシュアル・ハラスメント	3	0.8%	10	2.1%	13	1.5%
生きがいに関すること	72	18.7%	72	15.2%	144	16.7%
自由にできる時間がない	20	5.2%	26	5.5%	46	5.3%
収入・家計・借金等	144	37.4%	126	26.5%	270	31.4%
自分の健康状態、病気や介護	239	62.1%	332	69.9%	571	66.4%
家族の健康状態、病気や介護	123	31.9%	206	43.4%	329	38.3%
妊娠・出産	1	0.3%	0	0.0%	1	0.1%
育児	2	0.5%	3	0.6%	5	0.6%
家事	14	3.6%	48	10.1%	62	7.2%
自分の学業・受験・進学	3	0.8%	1	0.2%	4	0.5%
子どもの教育	6	1.6%	4	0.8%	10	1.2%
自分の仕事	134	34.8%	95	20.0%	229	26.6%
家族の仕事	24	6.2%	38	8.0%	62	7.2%
住まいや生活環境 (公害、安全及び交通事情を含む)	42	10.9%	57	12.0%	99	11.5%
その他	15	3.9%	18	3.8%	33	3.8%
わからない	5	1.3%	7	1.5%	12	1.4%
未回答	2	0.5%	2	0.4%	4	0.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	974	-	1231	-	2,205	-

また、上記の悩みやストレスの原因のうち、最も気になる原因を質問したところ、「自分の健康状態、病気や介護」と回答した方が43.0%（男性42.3%、女性43.6%）（前年度 男性41.4%、女性41.1%、全体41.2%）と最も多く、次いで、「家族の健康状態、病気や介護」が14.0%（男性12.2%、女性15.4%）（前年度 男性10.3%、女性17.4%、全体14.2%）等の順となっている。（表3-1-3）

表3-1-3 悩みやストレスの最も気になる原因

	男性(N=385)		女性(N=475)		計(N=860)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
家族との人間関係	9	2.3%	23	4.8%	32	3.7%
家族以外との人間関係	10	2.6%	15	3.2%	25	2.9%
恋愛・性に関すること	1	0.3%	0	0.0%	1	0.1%
結婚	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
離婚	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
いじめ、セクシュアル・ハラスメント	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
生きがいに関すること	5	1.3%	10	2.1%	15	1.7%
自由にできる時間がない	0	0.0%	7	1.5%	7	0.8%
収入・家計・借金等	52	13.5%	42	8.8%	94	10.9%
自分の健康状態、病気や介護	163	42.3%	207	43.6%	370	43.0%
家族の健康状態、病気や介護	47	12.2%	73	15.4%	120	14.0%
妊娠・出産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
育児	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
家事	1	0.3%	2	0.4%	3	0.3%
自分の学業・受験・進学	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
子どもの教育	1	0.3%	1	0.2%	2	0.2%
自分の仕事	51	13.2%	35	7.4%	86	10.0%
家族の仕事	4	1.0%	7	1.5%	11	1.3%
住まいや生活環境 （公害、安全及び交通事情を含む）	11	2.9%	9	1.9%	20	2.3%
その他	10	2.6%	12	2.5%	22	2.6%
わからない	3	0.8%	5	1.1%	8	0.9%
未回答	17	4.4%	25	5.3%	42	4.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	385	100.0%	475	100.0%	860	100.0%

### 2.3.2 睡眠時間


睡眠時間についてみると、「6時間以上～7時間未満」が32.3%（男性32.1%、女性32.6%）（前年度 男性38.4%、女性33.6%、全体35.9%）と最も多く、次いで、男性は「5時間以上～6時間未満」が23.6%（前年度 18.7%）、「7時間以上～8時間未満」が20.8%（前年度 18.9%）等の順となっている。

女性は「5時間以上～6時間未満」が28.3%（前年度 27.4%）、「7時間以上～8時間未満」が16.4%（前年度 13.5%）等の順となっている。（表3-2、図3-2）

表3-2 睡眠時間

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
9時間以上	31	5.4%	32	4.8%	63	5.1%
8時間以上～9時間未満	64	11.1%	51	7.7%	115	9.3%
7時間以上～8時間未満	120	20.8%	108	16.4%	228	18.4%
6時間以上～7時間未満	185	32.1%	215	32.6%	400	32.3%
5時間以上～6時間未満	136	23.6%	187	28.3%	323	26.1%
5時間未満	34	5.9%	63	9.5%	97	7.8%
未回答	7	1.2%	4	0.6%	11	0.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図3-2 睡眠時間




### 2.3.3 睡眠時間のとれている度合い

睡眠時間のとれている度合いについてみると、「夜間、睡眠途中で目が覚めて困った」が45.3%（男性44.2%、女性46.2%）（前年度 男性45.7%、女性47.4%、全体46.6%）と最も多く、次いで、「日中、眠気を感じた」が38.9%（男性38.0%、女性39.7%）（前年度 男性34.1%、女性38.5%、全体36.4%）、「睡眠全体の質に満足できなかった」が35.2%（男性34.5%、女性35.9%）（前年度男性33.4%、女性36.7%、全体35.1%）等の順となっている。（表3-3、図3-3）

表3-3 睡眠時間のとれている度合い（複数回答）

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
寝付き（布団に入ってから眠るまでに要する時間）に、時間がかかった。	132	22.9%	232	35.2%	364	29.4%
夜間、睡眠途中で目が覚めて困った。	255	44.2%	305	46.2%	560	45.3%
起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった。	170	29.5%	211	32.0%	381	30.8%
睡眠時間が足りなかった。	120	20.8%	146	22.1%	266	21.5%
睡眠全体の質に満足できなかった。	199	34.5%	237	35.9%	436	35.2%
日中、眠気を感じた。	219	38.0%	262	39.7%	481	38.9%
上記のようなことはなかった。	111	19.2%	110	16.7%	221	17.9%
未回答	9	1.6%	10	1.5%	19	1.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	1,215	-	1,513	-	2,728	-

図3-3 睡眠時間のとれている度合い（複数回答）




### 2.3.4 座っているとき、または横になっている間の脚の不快感や不快な感覚の有無

座っているとき、または横になっている間に脚に不快感や不快な感覚があるかについてみると、「いいえ」が55.8%（男性58.2%、女性53.6%）（前年度 男性58.0%、女性50.8%、全体54.2%）、「はい」が42.2%（男性39.9%、女性44.2%）（前年度 男性41.1%、女性47.0%、全体44.2%）となっている。（表3-4、図3-4）

表3-4 座っているとき、または横になっている間に脚に不快感や不快な感覚があるか

	男性 (N=577)		女性 (N=660)		計 (N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	230	39.9%	292	44.2%	522	42.2%
いいえ	336	58.2%	354	53.6%	690	55.8%
未回答	11	1.9%	14	2.1%	25	2.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図3-4 座っているとき、または横になっている間に脚に不快感や不快な感覚があるか




### 2.3.5 座っているとき、または横になっている間の足を動かす必要性や動かしたい衝動の有無

座っているとき、または横になっている間に足を動かす必要性、または動かしたい衝動があるか、またはこれまでにあったかについては「いいえ」が56.7%（男性57.5%、女性55.9%）（前年度 男性58.2%、女性54.8%、全体56.4%）、「はい」が37.7%（男性37.8%、女性37.6%）（前年度 男性38.4%、女性40.2%、全体39.3%）となっている。（表3-5-1、図3-5-1）

表3-5-1 座っているとき、または横になっている間に足を動かす必要性、または動かしたい衝動があるか

	男性 (N=577)		女性 (N=660)		計 (N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	218	37.8%	248	37.6%	466	37.7%
いいえ	332	57.5%	369	55.9%	701	56.7%
未回答	27	4.7%	43	6.5%	70	5.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図3-5-1 座っているとき、または横になっている間に足を動かす必要性、または動かしたい衝動があるか




座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚があるかについて「はい」、または座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動があるかについて「はい」と回答した560人（前年度601人）の、休んでいるとき（座っているとき、または横になっているとき）と、体を動かしているときのどちらでこのように感じやすいかについては、「休んでいるとき」が48.2%（男性52.4%、女性44.8%）（前年度 男性54.5%、女性43.9%、全体48.6%）が最も多く、次いで、「両方」が39.5%（男性35.6%、女性42.6%）（前年度 男性33.7%、女性41.8%、全体38.3%）、「体を動かしているとき」が6.3%（男性6.8%、女性5.8%）（前年度 男性5.7%、女性5.6%、全体5.7%）等の順となっている。（表3-5-2、図3-5-2）

表3-5-2 脚の不快感や脚を動かしたい衝動等は、休んでいるとき（座っているとき、または横になっているとき）と、体を動かしているときのどちらで感じやすいか

	男性(N=250)		女性(N=310)		計(N=560)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
休んでいるとき	131	52.4%	139	44.8%	270	48.2%
体を動かしているとき	17	6.8%	18	5.8%	35	6.3%
両方	89	35.6%	132	42.6%	221	39.5%
わからない	11	4.4%	18	5.8%	29	5.2%
未回答	2	0.8%	3	1.0%	5	0.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	250	100.0%	310	100.0%	560	100.0%

図3-5-2 脚の不快感や脚を動かしたい衝動等は、休んでいるとき（座っているとき、または横になっているとき）と、体を動かしているときのどちらで感じやすいか




座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚があるかについて「はい」、または座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動があるかについて「はい」と回答した560人（前年度601人）の、このような感じがするときに起き上がった、動き回ったりすると、実際に動き続けている間は、その感じはいくらかでも軽くなるかについてみると「はい」が52.9%（男性57.6%、女性49.0%）（前年度 男性64.8%、女性54.9%、全体59.2%）と最も多く、次いで、「わからない」が25.0%（男性24.0%、女性25.8%）（前年度 男性19.3%、女性23.7%、全体21.8%）、「いいえ」が21.5%（男性18.0%、女性24.3%）（前年度 男性14.8%、女性19.9%、全体17.6%）となっている。（表3-5-3、図3-5-3）

表3-5-3 脚の不快感や脚を動かしたい衝動等は、起き上がった、動き回ったりすると、実際に動き続けている間は、いくらかでも軽くなるか

	男性 (N=250)		女性 (N=310)		計 (N=560)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	144	57.6%	152	49.0%	296	52.9%
いいえ	45	18.0%	75	24.2%	120	21.4%
わからない	60	24.0%	80	25.8%	140	25.0%
未回答	1	0.4%	3	1.0%	4	0.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	250	100.0%	310	100.0%	560	100.0%

図3-5-3 脚の不快感や脚を動かしたい衝動等は、起き上がった、動き回ったりすると、実際に動き続けている間は、いくらかでも軽くなるか




座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚があるかについて「はい」、または座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動があるかについては、「はい」と回答した560人（前年度601人）の、脚のこの感じは1日のうちの時間帯でもっとも起こりやすいかについては、「夜」が31.1%（男性33.7%、女性29.2%）（前年度 男性35.7%、女性32.3%、全体33.8%）が最も多く、次いで、「すべての時間帯でほぼ同じ」が29.5%（男性27.7%、女性30.9%）（前年度 男性28.9%、女性27.8%、全体28.3%）、「朝」が12.2%（男性13.0%、女性11.5%）（前年度 男性12.0%、女性8.4%、全体9.9%）等の順となっている。（表3-5-4、図3-5-4）

表3-5-4 脚の不快感や脚を動かしたい衝動等は、1日のうちの時間帯でもっとも起こりやすいか（複数回答）

	男性 (N=250)		女性 (N=310)		計 (N=560)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
朝	39	13.0%	45	11.5%	84	12.2%
日中	36	12.0%	37	9.5%	73	10.6%
午後	12	4.0%	22	5.6%	34	4.9%
夕方	28	9.3%	46	11.8%	74	10.7%
夜	101	33.7%	114	29.2%	215	31.1%
すべての時間帯でほぼ同じ	83	27.7%	121	30.9%	204	29.5%
未回答	1	0.3%	6	1.5%	7	1.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	300	-	391	-	691	-

図3-5-4 脚の不快感や脚を動かしたい衝動等は、1日のうちの時間帯でもっとも起こりやすいか（複数回答）



## 2.4 介護や日常生活動作の状況について


### 2.4.1 病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況

病院や診療所への入院、または介護施設への入所状況についてみると、6.4%（男性4.0%、女性8.5%）（前年度 男性4.0%、女性7.4%、全体5.8%）の者が入院中もしくは入所中となっている。（表4-1、図4-1）

表4-1 病院、診療所への入院、または介護施設への入所状況

	男性 (N=577)		女性 (N=660)		計 (N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	23	4.0%	56	8.5%	79	6.4%
いいえ	549	95.1%	602	91.2%	1,151	93.0%
未回答	5	0.9%	2	0.3%	7	0.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図4-1 病院、診療所への入院、または介護施設への入所状況




## 2.4.2 要介護認定の状況

要介護認定の状況についてみると、146人（11.8%）（男性45人（7.8%）、女性101人（15.3%））（前年度 男性55人（9.3%）、女性94人（14.2%）、全体149人（11.9%））の者が要介護認定を受けていた。（表4-2-1、図4-2-1）

表4-2-1 要介護認定の状況

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	45	7.8%	101	15.3%	146	11.8%
いいえ	523	90.6%	555	84.1%	1,078	87.1%
未回答	9	1.6%	4	0.6%	13	1.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図4-2-1 要介護認定の状況




要介護認定を受けている 146 人（前年度 149 人）の調査日時点の要介護度の分布は、「要介護 1」が 22.6%（男性 22.2%、女性 22.8%）（前年度 男性 23.6%、女性 19.1%、全体 20.8%）と最も多く、次いで、男性は「要介護 2」が 20.0%（前年度 20.0%）、「要支援 2」が 15.6%（前年度 18.2%）等の順となっている。

女性は「要支援 2」が 17.8%（前年度 16.0%）、「要介護 2」が 16.8%（前年度 16.0%）等の順となっている。（表 4-2-2、図 4-2-2）

表 4-2-2 要介護認定を受けている場合の要介護度の状況

	男性(N=45)		女性(N=101)		計(N=146)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
要支援1	6	13.3%	13	12.9%	19	13.0%
要支援2	7	15.6%	18	17.8%	25	17.1%
要介護1	10	22.2%	23	22.8%	33	22.6%
要介護2	9	20.0%	17	16.8%	26	17.8%
要介護3	6	13.3%	11	10.9%	17	11.6%
要介護4	3	6.7%	9	8.9%	12	8.2%
要介護5	4	8.9%	9	8.9%	13	8.9%
未回答	0	0.0%	1	1.0%	1	0.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	45	100.0%	101	100.0%	146	100.0%

表 4-2-2 要介護認定を受けている場合の要介護度の状況




要介護認定を受けている146人（前年度149人）の現在利用している介護保険サービス状況についてみると、「通所介護（デイサービス）」が31.5%（男性31.1%、女性31.7%）（前年度男性36.4%、女性28.7%、全体31.5%）と最も多く、次いで、男性は「ホームヘルパーの訪問介護・訪問看護」が24.4%（前年度25.5%）、「通所リハビリテーション」が20.0%（前年度14.5%）等の順となっている。

女性は「ホームヘルパーの訪問介護・訪問看護」が18.8%（前年度13.8%）、「その他」「利用していない」が共に13.9%（前年度17.0%、11.7%）等の順となっている。（表4-2-3、図4-2-3）

表4-2-3 現在利用している介護保険サービスの状況（複数回答）

	男性(N=45)		女性(N=101)		計(N=146)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ホームヘルパーの訪問介護・訪問看護	11	24.4%	19	18.8%	30	20.5%
通所介護(デイサービス)	14	31.1%	32	31.7%	46	31.5%
通所リハビリテーション	9	20.0%	9	8.9%	18	12.3%
短期入所生活介護(ショートステイ)	4	8.9%	6	5.9%	10	6.8%
有料老人ホームへの入所	4	8.9%	8	7.9%	12	8.2%
グループホームへの入所	1	2.2%	3	3.0%	4	2.7%
特別養護老人ホームへの入所	2	4.4%	13	12.9%	15	10.3%
介護老人保健施設への入所	2	4.4%	11	10.9%	13	8.9%
その他	2	4.4%	14	13.9%	16	11.0%
利用していない	8	17.8%	14	13.9%	22	15.1%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	57	-	129	-	186	-

図4-2-3 現在利用している介護保険サービスの状況（複数回答）



要介護認定を受けている 146 人（前年度 149 人）について、介護が必要となった原因についてみると、男性は「脳血管疾患」「認知症」が共に 24.4%（前年度 20.0%、21.8%）と最も多く、次いで、「高齢による衰弱」が 22.2%（前年度 23.6%）、「骨折・転倒」が 15.6%（前年度 16.4%）等の順となっている。

女性は「高齢による衰弱」が 33.7%（前年度 25.5%）と最も多く、次いで、「認知症」「骨折・転倒」が共に 30.7%（前年度 34.0%、37.2%）、「関節疾患」が 20.8%（前年度 27.7%）等の順となっている。（表 4-2-4）

表 4-2-4 要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因（複数回答）

	男性(N=45)		女性(N=101)		計(N=146)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳血管疾患	11	24.4%	9	8.9%	20	13.7%
心臓疾患	5	11.1%	11	10.9%	16	11.0%
がん	2	4.4%	4	4.0%	6	4.1%
呼吸器疾患	4	8.9%	4	4.0%	8	5.5%
関節疾患	3	6.7%	21	20.8%	24	16.4%
認知症	11	24.4%	31	30.7%	42	28.8%
糖尿病	5	11.1%	5	5.0%	10	6.8%
パーキンソン病	2	4.4%	4	4.0%	6	4.1%
視覚・聴覚障害	6	13.3%	7	6.9%	13	8.9%
骨折・転倒	7	15.6%	31	30.7%	38	26.0%
脊髄損傷	1	2.2%	2	2.0%	3	2.1%
高齢による衰弱	10	22.2%	34	33.7%	44	30.1%
その他	6	13.3%	10	9.9%	16	11.0%
わからない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	5	11.1%	7	6.9%	12	8.2%
不詳	0	0.0%	1	1.0%	1	0.7%
合計	78	-	181	-	259	-

要介護認定を受けている 146 人（前年度 149 人）について、介護が必要になった原因のうち、主たる原因については、「認知症」が 30 人（20.5%）（男性 8 人（17.8%）、女性 22 人（21.8%））（前年度 男性 10 人（18.2%）、女性 18 人（19.1%）、全体 28 人（18.8%））と最も多くなっている。（表 4-2-5）

表 4-2-5 要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因

	男性(N=45)		女性(N=101)		計(N=146)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳血管疾患	9	20.0%	5	5.0%	14	9.6%
心臓疾患	2	4.4%	6	5.9%	8	5.5%
がん	1	2.2%	1	1.0%	2	1.4%
呼吸器疾患	0	0.0%	2	2.0%	2	1.4%
関節疾患	2	4.4%	10	9.9%	12	8.2%
認知症	8	17.8%	22	21.8%	30	20.5%
糖尿病	2	4.4%	2	2.0%	4	2.7%
パーキンソン病	1	2.2%	2	2.0%	3	2.1%
視覚・聴覚障害	1	2.2%	0	0.0%	1	0.7%
骨折・転倒	5	11.1%	16	15.8%	21	14.4%
脊髄損傷	1	2.2%	0	0.0%	1	0.7%
高齢による衰弱	8	17.8%	15	14.9%	23	15.8%
その他	3	6.7%	8	7.9%	11	7.5%
わからない	0	0.0%	1	1.0%	1	0.7%
未回答	2	4.4%	11	10.9%	13	8.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	45	100.0%	101	100.0%	146	100.0%

### 2.4.3 介助なしでできること

介助なしでできることについてみると、全ての項目において男性は約85%以上（前年度 約85%以上）の方が、女性は約80%以上（前年度 約80%以上）の方が「介助なしに自分ひとりで行える」と回答した。（表4-3）

表4-3 介助なしでできること（複数回答）

	男性(N=577)										計
	介助なしに自分ひとりで行える		介助や支えがあればできる		介助や支えがあってもできない		未回答		不詳		
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	552	95.7%	16	2.8%	5	0.9%	4	0.7%	0	0.0%	577
口腔清拭	552	95.7%	15	2.6%	4	0.7%	6	1.0%	0	0.0%	577
身体的清拭	542	93.9%	22	3.8%	8	1.4%	5	0.9%	0	0.0%	577
洗髪	544	94.3%	21	3.6%	7	1.2%	5	0.9%	0	0.0%	577
着替え	542	93.9%	25	4.3%	5	0.9%	5	0.9%	0	0.0%	577
入浴	540	93.6%	23	4.0%	9	1.6%	5	0.9%	0	0.0%	577
体位交換・起居	552	95.7%	15	2.6%	4	0.7%	6	1.0%	0	0.0%	577
排泄	548	95.0%	20	3.5%	4	0.7%	5	0.9%	0	0.0%	577
食事の準備・後始末	520	90.1%	25	4.3%	25	4.3%	7	1.2%	0	0.0%	577
食事	557	96.5%	11	1.9%	4	0.7%	5	0.9%	0	0.0%	577
服薬	539	93.4%	29	5.0%	4	0.7%	5	0.9%	0	0.0%	577
散歩	529	91.7%	25	4.3%	17	2.9%	6	1.0%	0	0.0%	577
掃除	525	91.0%	13	2.3%	30	5.2%	9	1.6%	0	0.0%	577
洗濯	523	90.6%	15	2.6%	32	5.5%	7	1.2%	0	0.0%	577
買い物	519	89.9%	27	4.7%	24	4.2%	7	1.2%	0	0.0%	577
日常会話	553	95.8%	14	2.4%	5	0.9%	5	0.9%	0	0.0%	577

	女性(N=660)										計
	介助なしに自分ひとりで行える		介助や支えがあればできる		介助や支えがあってもできない		未回答		不詳		
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	615	93.2%	27	4.1%	14	2.1%	4	0.6%	0	0.0%	660
口腔清拭	616	93.3%	29	4.4%	11	1.7%	4	0.6%	0	0.0%	660
身体的清拭	592	89.7%	39	5.9%	23	3.5%	6	0.9%	0	0.0%	660
洗髪	589	89.2%	40	6.1%	27	4.1%	4	0.6%	0	0.0%	660
着替え	603	91.4%	32	4.8%	21	3.2%	4	0.6%	0	0.0%	660
入浴	587	88.9%	44	6.7%	24	3.6%	5	0.8%	0	0.0%	660
体位交換・起居	625	94.7%	14	2.1%	15	2.3%	6	0.9%	0	0.0%	660
排泄	618	93.6%	21	3.2%	17	2.6%	4	0.6%	0	0.0%	660
食事の準備・後始末	575	87.1%	30	4.5%	51	7.7%	4	0.6%	0	0.0%	660
食事	627	95.0%	21	3.2%	8	1.2%	4	0.6%	0	0.0%	660
服薬	599	90.8%	47	7.1%	9	1.4%	5	0.8%	0	0.0%	660
散歩	560	84.8%	52	7.9%	41	6.2%	7	1.1%	0	0.0%	660
掃除	561	85.0%	39	5.9%	53	8.0%	7	1.1%	0	0.0%	660
洗濯	569	86.2%	33	5.0%	53	8.0%	5	0.8%	0	0.0%	660
買い物	539	81.7%	58	8.8%	56	8.5%	7	1.1%	0	0.0%	660
日常会話	619	93.8%	30	4.5%	6	0.9%	5	0.8%	0	0.0%	660

	計 (N=1237)										
	介助なしに自分ひとりでできる		介助や支えがあればできる		介助や支えがあってもできない		無回答		不詳		計
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	
洗顔	1,167	94.3%	43	3.5%	19	1.5%	8	0.6%	0	0.0%	1,237
口腔清拭	1,168	94.4%	44	3.6%	15	1.2%	10	0.8%	0	0.0%	1,237
身体の清拭	1,134	91.7%	61	4.9%	31	2.5%	11	0.9%	0	0.0%	1,237
洗髪	1,133	91.6%	61	4.9%	34	2.7%	9	0.7%	0	0.0%	1,237
着替え	1,145	92.6%	57	4.6%	26	2.1%	9	0.7%	0	0.0%	1,237
入浴	1,127	91.1%	67	5.4%	33	2.7%	10	0.8%	0	0.0%	1,237
体位交換・起居	1,177	95.1%	29	2.3%	19	1.5%	12	1.0%	0	0.0%	1,237
排泄	1,166	94.3%	41	3.3%	21	1.7%	9	0.7%	0	0.0%	1,237
食事の準備・後始末	1,095	88.5%	55	4.4%	76	6.1%	11	0.9%	0	0.0%	1,237
食事	1,184	95.7%	32	2.6%	12	1.0%	9	0.7%	0	0.0%	1,237
服薬	1,138	92.0%	76	6.1%	13	1.1%	10	0.8%	0	0.0%	1,237
散歩	1,089	88.0%	77	6.2%	58	4.7%	13	1.1%	0	0.0%	1,237
掃除	1,086	87.8%	52	4.2%	83	6.7%	16	1.3%	0	0.0%	1,237
洗濯	1,092	88.3%	48	3.9%	85	6.9%	12	1.0%	0	0.0%	1,237
買い物	1,058	85.5%	85	6.9%	80	6.5%	14	1.1%	0	0.0%	1,237
日常会話	1,172	94.7%	44	3.6%	11	0.9%	10	0.8%	0	0.0%	1,237

## 2.5 現在の治療状況について


### 2.5.1 現在の受診頻度

現在の受診頻度についてみると、「毎月1～3回程度」が45.4%（男性43.0%、女性47.6%）（前年度 男性43.8%、女性48.6%、全体46.4%）と最も多く、次いで、「数か月に1回程度」が30.2%（男性30.3%、女性30.2%）（前年度 男性30.0%、女性28.0%、全体29.0%）等の順となっている。（表5-1、図5-1）

表5-1 受診頻度

	男性 (N=577)		女性 (N=660)		計 (N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院中	8	1.4%	12	1.8%	20	1.6%
施設入所中で医療的ケアを受けている	6	1.0%	19	2.9%	25	2.0%
毎週1回以上	29	5.0%	39	5.9%	68	5.5%
毎月1～3回程度	248	43.0%	314	47.6%	562	45.4%
数か月に1回程度	175	30.3%	199	30.2%	374	30.2%
受診していない	102	17.7%	70	10.6%	172	13.9%
未回答	9	1.6%	7	1.1%	16	1.3%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図5-1 受診頻度




### 2.5.2 医師の方から処方されているお薬

現在、医師から処方されているお薬はあるかをみると、何らかの処方を受けていると回答した方は905人（73.2%）（男性409人（70.9%）、女性496人（75.2%））（前年度 男性412人（69.5%）、女性505人（76.5%）、全体917人（73.2%））となっている。（表5-2、図5-2）

表5-2 医師から処方されているお薬はあるか

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	409	70.9%	496	75.2%	905	73.2%
いいえ	142	24.6%	128	19.4%	270	21.8%
未回答	26	4.5%	36	5.5%	62	5.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図5-2 医師から処方されているお薬はあるか




### 2.5.3 現在の服用（塗布）の状況（薬の対象となる病気）

現在、医師から処方されている薬の対象となる病気の内容をみると、「高血圧症」との回答が757件と最も多く、次いで、「鎮痛・消炎」が239件、「糖尿病」が236件等の順となっている。（表5-3-1、図5-3-1）

表5-3-1 薬の対象となる病気（複数回答）

病名	男性(N=409)		女性(N=496)		計(N=905)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧症	383	93.6%	374	75.4%	757	83.6%
鎮痛・消炎	111	27.1%	128	25.8%	239	26.4%
糖尿病	139	34.0%	97	19.6%	236	26.1%
高コレステロール血症	88	21.5%	122	24.6%	210	23.2%
睡眠障害	73	17.8%	130	26.2%	203	22.4%
胃潰瘍	77	18.8%	82	16.5%	159	17.6%
骨粗鬆症	10	2.4%	130	26.2%	140	15.5%
アレルギー性鼻炎	56	13.7%	70	14.1%	126	13.9%
便秘症	45	11.0%	82	16.5%	127	14.0%
胃・十二指腸潰瘍	46	11.2%	68	13.7%	114	12.6%
高脂血症	42	10.3%	67	13.5%	109	12.0%
湿疹・皮膚炎群	63	15.4%	43	8.7%	106	11.7%
うつ病	33	8.1%	53	10.7%	86	9.5%
痛風	64	15.6%	11	2.2%	75	8.3%
気管支喘息	27	6.6%	39	7.9%	66	7.3%
その他	1,340	327.6%	1,713	345.4%	3,053	337.3%
未回答	15	3.7%	18	3.6%	33	3.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	2,612	-	3,227	-	5,839	-

図5-3-1 薬の対象となる病気



## 2.6 油症患者受療券（受療券）の利用状況について


### 2.6.1 受療券の保有状況

受療券を保有しているか質問したところ、「はい」と答えたのは814人（65.8%）（男性366人（63.4%）、女性448人（67.9%））（前年度 男性385人（64.9%）、女性448人（67.9%）、全体833人（66.5%））となっている。（表6-1、図6-1）

表6-1 カネミ倉庫が発行している受療券の保有状況

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	366	63.4%	448	67.9%	814	65.8%
いいえ	200	34.7%	208	31.5%	408	33.0%
未回答	11	1.9%	4	0.6%	15	1.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図6-1 カネミ倉庫が発行している受療券の保有状況




## 2.6.2 受療券を使用せずに受診したことがあるか

受療券を持っていると回答した 814 人を対象に、この 1 年間で、受療券を使用せずに受診したことがあるかを質問したところ、485 人 (59.6%) (男性 214 人 (58.5%)、女性 271 人 (60.5%)) (前年度 男性 221 人 (57.4%)、女性 282 人 (62.9%)、全体 503 人 (60.4%)) の方が「はい」と回答した。(表 6-2、図 6-2)

表 6-2 この 1 年間で、受療券を使用せずに受診したことがあるか

	男性 (N=366)		女性 (N=448)		計 (N=814)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	214	58.5%	271	60.5%	485	59.6%
いいえ	151	41.3%	169	37.7%	320	39.3%
未回答	1	0.3%	8	1.8%	9	1.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	366	100.0%	448	100.0%	814	100.0%

図 6-2 この 1 年間で、受療券を使用せずに受診したことがあるか




### 2.6.3 受療券を利用せずに受診した理由

受療券を利用せずに受診したことがあると回答した485人を対象に、受療券を利用せずに受診した理由を質問したところ、312人(64.3%) (男性143人(66.8%)、女性169人(62.4%)) (前年度 男性156人(70.6%)、女性186人(66.0%)、全体342人(68.0%))の方が「受療券を利用できない医療機関のため」と回答した。(表6-3、図6-3)

表6-3 受療券を利用せずに受診した理由 (複数回答)

	男性(N=214)		女性(N=271)		計(N=485)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
受療券を利用できない医療機関のため	143	66.8%	169	62.4%	312	64.3%
その他	63	29.4%	94	34.7%	157	32.4%
未回答	11	5.1%	12	4.4%	23	4.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	217	-	275	-	492	-

図6-3 受療券を利用せずに受診した理由 (複数回答)




## 2.6.4 受療券を持たない理由

受療券を持たないと回答した408人(前年度414人)を対象に、受療券を持たない理由を質問したところ、155人(38.0%) (男性71人(35.5%)、女性84人(40.4%)) (前年度男性70人(34.3%)、女性75人(35.7%)、全体145人(35.0%))の方が「受療券が利用できる医療機関が限られるから」と回答した。(表6-4、図6-4)

表6-4 受療券を持たない理由(複数回答)

	男性(N=200)		女性(N=208)		計(N=408)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
利用する予定がないから	71	35.5%	56	26.9%	127	31.1%
手続きがめんどうだから	36	18.0%	15	7.2%	51	12.5%
他の人に油症患者であると知られてしまうと思うから	57	28.5%	94	45.2%	151	37.0%
受療券が利用できる医療機関が限られるから	71	35.5%	84	40.4%	155	38.0%
その他	25	12.5%	15	7.2%	40	9.8%
未回答	11	5.5%	13	6.3%	24	5.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	271	-	277	-	548	-

図6-4 受療券を持たない理由(複数回答)




### 2.6.5 受療券の利用を希望する医療機関

受療券の利用を希望する医療機関があるか質問したところ、57人（4.6%）（男性20人（3.5%）、女性37人（5.6%））が「はい」と回答した。（表6-5-1、図6-5-1）

表6-5-1 受療券の利用を希望する医療機関があるか

	男性 (N=577)		女性 (N=660)		計 (N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	20	3.5%	37	5.6%	57	4.6%
いいえ	528	91.5%	583	88.3%	1,111	89.8%
未回答	29	5.0%	40	6.1%	69	5.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図6-5-1 受療券の利用を希望する医療機関があるか




受療券の利用を希望する医療機関と受診頻度を質問したところ、のべ34カ所（※）についての回答があり、受診頻度は入院中が1.8%（前年度0.0%）、毎週1回以上が7.0%（前年度12.1%）、毎月1～3回程度が49.1%（前年度62.1%）、数ヶ月に1回程度が63.2%（前年度57.6%）、受診していないが8.8%（前年度12.1%）、未回答が8.8%（前年度7.6%）となっている。（※一部、既に受療券が利用可能な医療機関を含む）

表6-5-2 受療券の利用を希望する医療機関と受診頻度（複数回答）

	男性(N=20)		女性(N=37)		計(N=57)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院中	0	0.0%	1	2.7%	1	1.8%
毎週1回以上	3	15.0%	1	2.7%	4	7.0%
毎月1～3回程度	8	40.0%	20	54.1%	28	49.1%
数ヶ月に1回程度	13	65.0%	23	62.2%	36	63.2%
受診していない	0	0.0%	5	13.5%	5	8.8%
未回答	1	5.0%	4	10.8%	5	8.8%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	25	-	54	-	79	-

図6-5-2 受療券の利用を希望する医療機関と受診頻度（複数回答）



## 2.7 油症検診について


### 2.7.1 昨年度の油症検診の受診

昨年度の油症検診の受診をしたかどうかをみると、「はい」と答えたのは385人（31.1%）（男性199人（34.5%）、女性186人（28.2%））（前年度 男性206人（34.7%）、女性216人（32.7%）、全体422人（33.7%））となっている。（表7-1、図7-1）

表7-1 油症検診

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	199	34.5%	186	28.2%	385	31.1%
いいえ	373	64.6%	466	70.6%	839	67.8%
未回答	5	0.9%	8	1.2%	13	1.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図7-1 油症検診



### 2.7.2 油症検診の受診を受けなかった理由


油症検診を受けていない839人（男性373人、女性466人）（前年度 男性378人、女性437人、全体815人）を対象に、受けなかった理由を質問したところ、男性は「仕事などで都合がつかなかったから」と回答した方が36.1%（前年度 37.8%）と最も多かった。

女性は「検診の場所が遠かったから」と回答した方が13.5%（前年度 13.0%）と最も多かった。（表7-2-1、図7-2-1）

表7-2-1 油症検診の受診を受けなかった理由（複数回答）

	男性(N=373)		女性(N=466)		計(N=839)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
知らなかったから（案内が届かなかった）	11	2.4%	9	1.1%	20	2.4%
仕事などで都合がつかなかったから	168	36.1%	112	13.3%	280	33.4%
体調が悪かったから	38	8.2%	77	9.2%	115	13.7%
検診の場所が遠かったから	62	13.3%	113	13.5%	175	20.9%
職場や自治体の検診を受けているため、必要性を感じないから	96	20.6%	105	12.5%	201	24.0%
健康に自信があり、必要性を感じないから	15	3.2%	4	0.5%	19	2.3%
その時、医療機関に入通院していたから（介護施設への入所も含む）	24	5.2%	47	5.6%	71	8.5%
めんどうだから	33	7.1%	36	4.3%	69	8.2%
その他	47	10.1%	111	13.2%	158	18.8%
未回答	17	3.6%	13	1.5%	30	3.6%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	511	-	627	-	1,138	-

図7-2-1 油症検診の受診を受けなかった理由（複数回答）




油症検診を受診しなかった主な理由は、男性は「仕事などで都合がつかなかったから」が33.2%（前年度31.0%）と最も多く、次いで、「職場や自治体の検診を受けているため、必要性を感じないから」が17.2%（前年度15.6%）等の順となっている

女性は「その他」が20.2%（前年度16.5%）と最も多く、次いで、「仕事などで都合がつかなかったから」が18.5%（前年度14.0%）等の順となっている。（表7-2-2、図7-2-2）

表7-2-2 油症検診の受診を受けなかった主な理由

	男性(N=373)		女性(N=466)		計(N=839)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
知らなかったから（案内が届かなかった）	7	1.9%	4	0.9%	11	1.3%
仕事などで都合がつかなかったから	124	33.2%	86	18.5%	210	25.0%
体調が悪かったから	27	7.2%	48	10.3%	75	8.9%
検診の場所が遠かったから	32	8.6%	61	13.1%	93	11.1%
職場や自治体の検診を受けているため、必要性を感じないから	64	17.2%	68	14.6%	132	15.7%
健康に自信があり、必要性を感じないから	7	1.9%	2	0.4%	9	1.1%
その時、医療機関に入通院していたから（介護施設への入所も含む）	18	4.8%	38	8.2%	56	6.7%
めんどうだから	13	3.5%	18	3.9%	31	3.7%
その他	32	8.6%	94	20.2%	126	15.0%
未回答	49	13.1%	47	10.1%	96	11.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	373	100.0%	466	100.0%	839	100.0%

表7-2-2 油症検診の受診を受けなかった主な理由



## 2.8 相談体制について


### 2.8.1 油症相談員や相談窓口への相談経験

油症相談員や相談窓口に相談をしたことがあるかどうかみると、「ある」と答えたのは106人(8.6%) (男性52人(9.0%)、女性54人(8.2%)) (前年度 男性65人(11.0%)、女性70人(10.6%)、全体135人(10.8%))となっている。(表8-1、図8-1)

表8-1 相談経験がある

	男性(N=577)		女性(N=660)		計(N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	52	9.0%	54	8.2%	106	8.6%
ない	515	89.3%	601	91.1%	1,116	90.2%
未回答	10	1.7%	5	0.8%	15	1.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

図8-1 相談経験がある




## 2.8.2 今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容

油症相談員や相談窓口相談経験を「ない」と回答した1,116人（男性515人、女性601人）（前年度 男性520人、女性585人、全体1,105人）を対象に、今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容について質問したところ、「特になし」と回答した方が57.9%（男性55.1%、女性60.2%）（前年度 男性61.7%、女性59.5%、全体60.5%）と最も多く、次いで、「自分の病気や介護」が29.0%（男性32.2%、女性26.3%）（前年度 男性26.9%、女性28.0%、全体27.5%）等の順となっている。（表8-2、図8-2）

表8-2 今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容（複数回答）

	男性(N=515)		女性(N=601)		計(N=1116)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
自分の病気や介護	166	32.2%	158	26.3%	324	29.0%
家族の病気や介護	77	15.0%	76	12.6%	153	13.7%
収入・家計・借金等	40	7.8%	24	4.0%	64	5.7%
家族または家族以外との人間関係	10	1.9%	13	2.2%	23	2.1%
特になし	284	55.1%	362	60.2%	646	57.9%
その他	8	1.6%	11	1.8%	19	1.7%
未回答	29	5.6%	35	5.8%	64	5.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	614	-	679	-	1,293	-

図8-2 今後利用したい、または利用することが考えられる相談内容（複数回答）



## 2.9 罹患と治療状況について

本調査に回答するのは、今回初めてかどうかをみると、14人（1.1%）（男性5人（0.9%）、女性9人（1.4%））（前年度 男性6人（1.0%）、女性4人（0.6%）、全体10人（0.8%））が「はい」と回答した。（表9）

表9 本調査が今回初めてかどうか

	男性 (N=577)		女性 (N=660)		計 (N=1237)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	5	0.9%	9	1.4%	14	1.1%
いいえ	558	96.7%	629	95.3%	1,187	96.0%
未回答	14	2.4%	22	3.3%	36	2.9%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	577	100.0%	660	100.0%	1,237	100.0%

### 2.9.1 この一年間（または前回回答以降）に新たに罹った病気

「いいえ」と回答した1,187人（前年度1,224人）に、この一年間（または前回回答以降）に新たに罹った病気の有無を質問したところ、224人（18.9%）（男性105人（18.8%）、女性119人（18.9%））（前年度 男性104人（18.1%）、女性137人（21.1%）、全体241人（19.7%））が「ある」と回答した。（表9-1-1）

表9-1-1 この一年間（または前回回答以降）に新たに罹った病気の有無

	男性 (N=558)		女性 (N=629)		計 (N=1187)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	105	18.8%	119	18.9%	224	18.9%
ない	385	69.0%	424	67.4%	809	68.2%
未回答	68	12.2%	86	13.7%	154	13.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	558	100.0%	629	100.0%	1,187	100.0%

この一年間（または前回回答以降）に新たに罹った病気があると回答した 224 人に、具体的な病名を記述式で質問したところ、「コロナ」「大腸ポリープ」「白内障」「高血圧症」が共に 10 人（4.5%）と最も多く、次いで、「骨折」が 9 人（4.0%）等の順となっている。（表 9-1-2）

表 9-1-2 この一年間（または前回回答以降）に新たに罹った病気（複数回答）

	男性 (N=105)		女性 (N=119)		計 (N=224)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
コロナ	4	3.8%	6	5.0%	10	4.5%
大腸ポリープ	5	4.8%	5	4.2%	10	4.5%
白内障	5	4.8%	5	4.2%	10	4.5%
高血圧症	4	3.8%	6	5.0%	10	4.5%
骨折	3	2.9%	6	5.0%	9	4.0%
糖尿病	4	3.8%	1	0.8%	5	2.2%
骨粗鬆症	0	0.0%	5	4.2%	5	2.2%
前立腺肥大症	4	3.8%	0	0.0%	4	1.8%
带状疱疹	2	1.9%	2	1.7%	4	1.8%
心臓病	1	1.0%	3	2.5%	4	1.8%
肺炎	3	2.9%	1	0.8%	4	1.8%
脳梗塞	3	2.9%	1	0.8%	4	1.8%
インフルエンザ	0	0.0%	3	2.5%	3	1.3%
不整脈	2	1.9%	1	0.8%	3	1.3%
腰痛	2	1.9%	1	0.8%	3	1.3%
その他	86	81.9%	105	88.2%	191	85.3%
未回答	4	3.8%	5	4.2%	9	4.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	132	-	156	-	288	-

また、これらの方々に現在の治療状況を確認したところ、「医療機関で治療中」が 76.7%（男性 78.2%、女性 75.4%）と最も多くなっている。（表 9-1-3）

表 9-1-3 現在の治療状況（複数回答）

	男性 (N=101)		女性 (N=114)		計 (N=215)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
医療機関で治療中	79	78.2%	86	75.4%	165	76.7%
医療機関で治療をへて治癒	34	33.7%	50	43.9%	84	39.1%
治療していない	8	7.9%	14	12.3%	22	10.2%
未回答	7	6.9%	1	0.9%	8	3.7%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	128	-	151	-	279	-

## 2.10 罹患と治療状況について

### 2.10.1 悪性腫瘍（がん）について

本調査に回答するのは初めてと回答した14人に、悪性腫瘍（がん）に罹ったことがあるかと質問したところ、1人（7.1%）（女性1人（11.1%））が「ある」と回答した。（表10-1-1）

表10-1-1 悪性腫瘍（がん）にかかったことがあるか

	男性 (N=5)		女性 (N=9)		計 (N=14)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ある	0	0.0%	1	11.1%	1	7.1%
ない	5	100.0%	7	77.8%	12	85.7%
未回答	0	0.0%	1	11.1%	1	7.1%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	5	100.0%	9	100.0%	14	100.0%

悪性腫瘍（がん）に罹ったことがあると回答した1人に、具体的な病名を記述式で質問したところ、「大腸がん」、「その他」と回答した。（表10-1-2）

表10-1-2 悪性腫瘍（がん）（複数回答）

	男性 (N=0)		女性 (N=1)		計 (N=1)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸がん	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
胃がん	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎臓がん	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肺がん	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
膀胱がん	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
前立腺がん	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胆管がん	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
子宮がん	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	0	-	2	-	2	-

悪性腫瘍（がん）の具体的な病名を記述式で回答した 1 人に現在の治療状況を質問したところ「治療が完了し、通院もしていない」と回答した。（表 10-1-3）

表 10-1-3 悪性腫瘍（がん） 現在の治療状況（複数回答）

	男性 (N=0)		女性 (N=1)		計 (N=1)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
入院治療中・外来（通院）治療中	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
がんに対する治療は終了し、定期的な検査のため通院中	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
治療が完了し、通院もしていない	0	0.0%	2	200.0%	2	200.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	0	-	2	-	2	-

悪性腫瘍（がん）の具体的な病名を記述式で回答した 1 人に現在までに医療機関で受けたすべての治療を質問したところ、「外科手術（胸腔鏡・腹腔鏡手術を含む）」、「薬物療法（抗がん剤・ホルモン剤など）」と回答した。（表 10-1-4）

表 10-1-4 悪性腫瘍（がん） 現在までの医療機関で受けたすべての治療（複数回答）

	男性 (N=0)		女性 (N=1)		計 (N=1)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
外科手術（胸腔鏡・腹腔鏡手術を含む）	0	0.0%	2	200.0%	2	200.0%
内視鏡治療	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
薬物療法（抗がん剤・ホルモン剤など）	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
放射線療法	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	0	-	3	-	3	-

2.10.2 脳・精神・神経の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、脳・精神・神経の病気について、これまで罹ったことがある病気を見ると、「もの忘れ」が3件(21.4%) (男性0件(0.0%)、女性3件(33.3%))と最も多く、その中で「治療していない」3件(21.4%) (男性0件(0.0%)、女性3件(33.3%))となっている。(表10-2)

表10-2 脳・精神・神経の病気・症状(複数回答)

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
脳梗塞	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
頭痛	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
頭重(頭が重い)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
神経痛	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
知的障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
躁うつ病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
統合失調症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
幻覚	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
認知症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
もの忘れ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
かっとなりやすい・短気	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
脳梗塞	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
頭痛	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	2	22.2%
頭重(頭が重い)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
神経痛	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%
知的障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
躁うつ病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
統合失調症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
幻覚	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
認知症	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%
もの忘れ	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	33.3%
かっとなりやすい・短気	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22.2%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22.2%

	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脳卒中・脳出血・くも膜下出血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
脳梗塞	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
頭痛	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	14.3%
頭重(頭が重い)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
神経痛	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	14.3%
知的障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
躁うつ病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
統合失調症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
幻覚	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
認知症	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	14.3%
もの忘れ	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	21.4%
かっとなりやすい・短気	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	14.3%
その他	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28.6%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21.4%

### 2.10.3 自律神経系の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、自律神経系の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「不眠」と回答した方が5件（35.7%）（男性2件（40.0%）、女性3件（33.3%））と最も多く、「医療機関で治療中」1件（7.1%）（男性0件（0.0%）、女性1件（11.1%））「医療機関での治療をへて治癒」1件（7.1%）（男性1件（20.0%）、女性0件（0.0%））「治療していない」3件（21.4%）（男性1件（20.0%）、女性2件（22.2%））となっている。（表10-3）

表10-3 自律神経系の病気・症状（複数回答）

	男性 (N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
過敏性腸症候群	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
多汗症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
汗が出にくい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不眠	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	2	40.0%
不安神経症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
自律神経失調症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%
	女性 (N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%
過敏性腸症候群	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%
多汗症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
汗が出にくい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不眠	1	11.1%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	3	33.3%
不安神経症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
自律神経失調症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	5	55.6%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%
	計 (N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
起立性低血圧	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	14.3%
過敏性腸症候群	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	14.3%
多汗症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
汗が出にくい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不眠	1	7.1%	1	7.1%	3	21.4%	0	0.0%	5	35.7%
不安神経症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
自律神経失調症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	7	50.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

## 2.10.4 眼の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、眼の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気を見ると、「白内障」と回答した方が4件(28.6%) (男性2件(40.0%)、女性2件(22.2%))と最も多く、その中で「医療機関で治療中」2件(14.3%) (男性1件(20.0%)、女性1件(11.1%))、「医療機関での治療をへて治癒」0件(0.0%)、「治療していない」2件(14.3%) (男性1件(20.0%)、女性1件(11.1%))となっている。(表10-4)

表10-4 眼の病気・症状(複数回答)

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多(めやにが多い)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
瞼板腺(まつ毛の根元)からチーズ様分泌物	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
結膜(白目)の色素沈着	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
白内障	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	2	40.0%
緑内障	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%
近視	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
遠視	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
乱視	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
弱視	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%
	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多(めやにが多い)	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
瞼板腺(まつ毛の根元)からチーズ様分泌物	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
結膜(白目)の色素沈着	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
白内障	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	2	22.2%
緑内障	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
近視	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%
遠視	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
乱視	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%
弱視	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
その他	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33.3%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%
	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
眼脂過多(めやにが多い)	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
瞼板腺(まつ毛の根元)からチーズ様分泌物	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
結膜(白目)の色素沈着	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
白内障	2	14.3%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	4	28.6%
緑内障	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
近視	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	14.3%
遠視	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
乱視	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	21.4%
弱視	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	21.4%
その他	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28.6%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.1%

## 2.10.5 口の中の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、口の中の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気を見ると、「歯周病（歯槽膿漏）」「虫歯になりやすい」が共に4件（28.6%）と、最も多く、その中で「歯周病（歯槽膿漏）」は、「医療機関で治療中」1件（7.1%）（男性0件（0.0%）、女性1件（11.1%））、「医療機関での治療をへて治癒」2件（14.3%）（男性2件（40.0%）、女性0件（0.0%））、「治療していない」が1件（7.1%）（男性1件（20.0%）、女性0件（0.0%））、「虫歯になりやすい」は、「医療機関での治療をへて治癒」3件（21.4%）（男性2件（40.0%）、女性1件（11.1%））、「治療していない」が1件（7.1%）（男性1件（20.0%）、女性0件（0.0%））となっている。（表10-5）

表10-5 口の中の病気・症状（複数回答）

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
歯肉の色素沈着（歯茎が黒い）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歯牙形成不全 （子どもの時に歯が生えなかった）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歯周病（歯槽膿漏）	0	0.0%	2	40.0%	1	20.0%	0	0.0%	3	60.0%
歯肉炎（歯ぐきの病気）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
顎関節症（あご関節の異常）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
味覚異常	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
口内炎になりやすい	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
虫歯になりやすい	0	0.0%	2	40.0%	1	20.0%	0	0.0%	3	60.0%
歯の知覚過敏（歯がしみる）	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%
永久歯（全歯）を早期に失った	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
歯肉の色素沈着（歯茎が黒い）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歯牙形成不全 （子どもの時に歯が生えなかった）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歯周病（歯槽膿漏）	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
歯肉炎（歯ぐきの病気）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
顎関節症（あご関節の異常）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
味覚異常	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
口内炎になりやすい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
虫歯になりやすい	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
歯の知覚過敏（歯がしみる）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
永久歯（全歯）を早期に失った	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
その他	2	22.2%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	3	33.3%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	4	44.4%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%

	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
歯肉の色素沈着（歯茎が黒い）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歯牙形成不全 （子どもの時に歯が生えなかった）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
歯周病（歯槽膿漏）	1	7.1%	2	14.3%	1	7.1%	0	0.0%	4	28.6%
歯肉炎（歯ぐきの病気）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
顎関節症（あご関節の異常）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
味覚異常	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
口内炎になりやすい	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
虫歯になりやすい	0	0.0%	3	21.4%	1	7.1%	0	0.0%	4	28.6%
歯の知覚過敏（歯がしみる）	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%
永久歯（全歯）を早期に失った	0	0.0%	1	7.1%	1	7.1%	0	0.0%	2	14.3%
その他	2	14.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	3	21.4%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	5	35.7%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.1%

2.10.6 耳・鼻の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、耳・鼻の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気を見ると、「鼻炎を起こしやすい」、「難聴」が共に4件（28.6%）と最も多く、その中で「鼻炎を起こしやすい」は「医療機関で治療中」1件（7.1%）（男性0件（0.0%）、女性1件（11.1%））、「治療していない」3件（21.4%）（男性1件（20.0%）、女性2件（22.2%））、「難聴」は「治療していない」4件（28.6%）（男性0件（0.0%）、女性4件（44.4%））となっている。（表10-6）

表10-6 耳・鼻の病気・症状（複数回答）

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
めまい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
中耳炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
真珠腫性中耳炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻炎を起こしやすい	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
難聴	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
蓄膿症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻血がよく出る	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻血が止まりにくい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にならない	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
めまい	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%
中耳炎	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
真珠腫性中耳炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻炎を起こしやすい	1	11.1%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	3	33.3%
難聴	0	0.0%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	4	44.4%
蓄膿症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻血がよく出る	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻血が止まりにくい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
病気症状は特にならない	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22.2%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%

	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
メニエール病	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
めまい	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	14.3%
中耳炎	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
真珠腫性中耳炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻炎を起こしやすい	1	7.1%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	4	28.6%
難聴	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%	0	0.0%	4	28.6%
蓄膿症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻血がよく出る	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鼻血が止まりにくい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
病気症状は特にならない	-	-	-	-	-	-	-	-	5	35.7%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.1%

### 2.10.7 甲状腺の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、甲状腺の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、該当なしとなっている。(表10-7)

表10-7 甲状腺の病気・症状(複数回答)

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
慢性甲状腺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
バセドウ病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
甲状腺機能低下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
慢性甲状腺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
バセドウ病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
甲状腺機能低下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	8	88.9%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%

	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
甲状腺腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
慢性甲状腺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
バセドウ病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
甲状腺機能低下	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	12	85.7%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

### 2.10.8 のど・気管支・肺の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、のど・気管支・肺の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「風邪を引きやすい」「せき」と回答した方が共に3件(21.4%)と最も多く、その中で「風邪を引きやすい」は「治療していない」3件(21.4%) (男性0件(0.0)、女性3件(33.3%))、「せき」は「医療機関での治療をへて治癒」1件(7.1%) (男性1件(20.0%)、女性0件(0.0%))、「治療していない」2件(14.3%) (男性1件(20.0%)、女性1件(11.1%))、となっている。(表10-8)

表10-8 のど・気管支・肺の病気・症状(複数回答)

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺線維症(慢性間質性肺炎)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無気肺	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肺水腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
慢性気管支炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
嚔声(声がかれる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
呼吸困難	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
息切れ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
風邪を引きやすい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
風邪が治りにくい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
せき	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	2	40.0%
たん	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺線維症(慢性間質性肺炎)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無気肺	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肺水腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
慢性気管支炎	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
嚔声(声がかれる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
呼吸困難	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
息切れ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
風邪を引きやすい	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	33.3%
風邪が治りにくい	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
せき	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
たん	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	4	44.4%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%

	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
肺線維症(慢性間質性肺炎)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無気肺	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肺水腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肺炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
慢性気管支炎	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
嚔声(声がかれる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
呼吸困難	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
COPD(慢性閉塞性肺疾患、肺気腫)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
息切れ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
風邪を引きやすい	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	21.4%
風邪が治りにくい	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
せき	0	0.0%	1	7.1%	2	14.3%	0	0.0%	3	21.4%
たん	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	6	42.9%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

## 2.10.9 心臓の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、心臓の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「狭心症」「不整脈(脈がとぶ)」「頻脈(心拍数が増加してしている状態)」「動悸(異常にドキドキする)」がいずれも1件(7.1%)と最も多く、その中で「狭心症」は、「医療機関で治療中」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))、「不整脈(脈がとぶ)」は、「治療していない」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))、「頻脈(心拍数が増加してしている状態)」は、「治療していない」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))、「動悸(異常にドキドキする)」は、「治療していない」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))となっている。(表10-9-1)

表10-9-1 心臓の病気・症状(複数回答)


	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
狭心症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
心不全	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
心肥大	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不整脈(脈がとぶ)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
頻脈(心拍数が増加してしている状態)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
動悸(異常にドキドキする)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%
	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
狭心症	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
心不全	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
心肥大	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不整脈(脈がとぶ)	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
頻脈(心拍数が増加してしている状態)	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
動悸(異常にドキドキする)	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	6	66.7%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%
	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
心筋梗塞	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
狭心症	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
心不全	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
心肥大	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不整脈(脈がとぶ)	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
頻脈(心拍数が増加してしている状態)	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
動悸(異常にドキドキする)	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	10	71.4%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

心臓の病気で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、「内服薬」1件（100.0%）（男性0件（0.0%）、女性1件（100.0%））となっている。（表10-9-2、図10-9-2）

表10-9-2 心臓の病気 現在の治療内容（複数回答）

	男性(N=0)		女性(N=1)		計(N=1)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
内服薬	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
注射薬	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図10-9-2 心臓の病気 現在の治療内容（複数回答）



## 2.10.10 高血圧や血管の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、高血圧や血管の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「高血圧」と回答した方が8件（57.1%）（男性2件（40.0%）、女性6件（66.7%））と最も多く、その中で「医療機関で治療中」7件（50.0%）（男性1件（20.0%）、女性6件（66.7%））、「治療していない」1件（7.1%）（男性1件（20.0%）、女性0件（0.0%））となっている。（表10-10-1）

表10-10-1 高血圧や血管の病気・症状（複数回答）

	男性 (N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を へて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	2	40.0%
低血圧	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
動脈硬化	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
動脈瘤	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
静脈炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
静脈瘤	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

	女性 (N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を へて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	66.7%
低血圧	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
動脈硬化	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
動脈瘤	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
静脈炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
静脈瘤	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22.2%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%


	計 (N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療を へて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
高血圧	7	50.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	8	57.1%
低血圧	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
動脈硬化	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
動脈瘤	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
静脈炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
静脈瘤	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28.6%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

高血圧で現在治療中と回答した人について、治療方法についてみると、「内服薬」7件（87.5%）（男性1件（50.0%）、女性6件（100.0%））となっている。（表10-10-2、図10-10-2）

表10-10-2 高血圧 治療方法（複数回答）

	男性(N=2)		女性(N=6)		計(N=8)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
内服薬	1	50.0%	6	100.0%	7	87.5%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	1	50.0%	0	0.0%	1	12.5%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図10-10-2 高血圧 治療方法（複数回答）



2.10.11 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「胆石症」と回答した方が2件（14.3%）と最も多く、その中で「医療機関での治療をへて治癒」2件（14.3%）（男性0件（0.0%）、女性2件（22.2%））となっている。（表10-11）

表10-11 肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答）

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
B型肝炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
C型肝炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肝機能障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胆のう炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胆石症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
黄疸	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
脾腫(脾臓がはれる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
B型肝炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
C型肝炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肝機能障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胆のう炎	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
胆石症	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%
黄疸	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
脾腫(脾臓がはれる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	5	55.6%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%

	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
B型肝炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
C型肝炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肝機能障害	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胆のう炎	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
胆石症	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%
黄疸	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
脾腫(脾臓がはれる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	9	64.3%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

## 2.10.12 すい臓の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、すい臓の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、該当なしとなっている。

表 10-12 すい臓の病気・症状（複数回答）

	男性 (N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%
	女性 (N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	8	88.9%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%
	計 (N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
すい炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
糖尿病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	12	85.7%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

### 2.10.13 腎臓・膀胱の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、腎臓・膀胱の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「膀胱炎」「尿管結石」「血尿」「その他」がいずれも1件(7.1%)と最も多く、その中で「膀胱炎」は「医療機関での治療をへて治癒」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))、「尿管結石」は「医療機関での治療をへて治癒」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))、「血尿」は「治療していない」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))、「その他」は「治療していない」1件(7.1%) (男性1件(20.0%)、女性0件(0.0%))となっている。(表10-13)

表10-13 腎臓・膀胱の病気・症状(複数回答)

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
膀胱炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腎結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
尿管結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
膀胱結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
血尿	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
蛋白尿	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%
	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
膀胱炎	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
腎結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
尿管結石	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
膀胱結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
血尿	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
蛋白尿	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	6	66.7%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%
	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
腎炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
膀胱炎	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
腎結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
尿管結石	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
膀胱結石	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
血尿	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
蛋白尿	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	9	64.3%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

2.10.14 食道・胃・腸・肛門の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、食道・胃・腸・肛門の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「胃潰瘍」「下痢」が共に4件(28.6%)と最も多く、その中で「胃潰瘍」は「医療機関での治療をへて治癒」4件(28.6%)(男性3件(60.0%)、女性1件(11.1%))、「下痢」は「治療していない」4件(28.6%)(男性1件(20.0%)、女性3件(33.3%))、となっている。(表10-14)

表10-14 食道・胃・腸・肛門の病気・症状(複数回答)

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸ポリープ	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%
慢性胃炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胃潰瘍	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%
十二指腸潰瘍	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
下痢	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
便秘	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
腹部膨満感(おなかが張る)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
痔疾(ぢ)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
腹痛	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
逆流性食道炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にならない	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸ポリープ	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
慢性胃炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胃潰瘍	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
十二指腸潰瘍	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
下痢	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	33.3%
便秘	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%
腹部膨満感(おなかが張る)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
痔疾(ぢ)	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
腹痛	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
逆流性食道炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にならない	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33.3%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%

	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
大腸ポリープ	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%
慢性胃炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
胃潰瘍	0	0.0%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%
十二指腸潰瘍	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
下痢	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%	0	0.0%	4	28.6%
便秘	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	21.4%
腹部膨満感(おなかが張る)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
痔疾(ぢ)	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
腹痛	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
逆流性食道炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にならない	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21.4%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.1%

### 2.10.15 血液・リンパの病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、血液・リンパの病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「脂質異常症(高脂血症)」「貧血」が共に3件(21.4%)と最も多く、その中で「脂質異常症(高脂血症)」は、「医療機関で治療中」2件(14.3%) (男性0件(0.0%)、女性2件(22.2%))、「治療していない」1件(7.1%) (男性1件(20.0%)、女性0件(0.0%))、「貧血」は、「医療機関で治療中」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))、「医療機関での治療をへて治癒」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))、「治療していない」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))となっている。(表10-15-1)

表10-15-1 血液・リンパの病気・症状(複数回答)


	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脂質異常症(高脂血症)	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
貧血	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
リンパ節の腫大(リンパの腫れ)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%
	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脂質異常症(高脂血症)	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%
貧血	1	11.1%	1	11.1%	1	11.1%	0	0.0%	3	33.3%
リンパ節の腫大(リンパの腫れ)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33.3%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%
	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
脂質異常症(高脂血症)	2	14.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	3	21.4%
貧血	1	7.1%	1	7.1%	1	7.1%	0	0.0%	3	21.4%
リンパ節の腫大(リンパの腫れ)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	6	42.9%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

脂質異常症(高脂血症)を現在治療中と回答した人に治療方法についてみると、「内服薬」が2件(66.7%) (男性0件(0.0%)、女性2件(100.0%))と最も多くなっている。(表10-15-2、図10-15-2)

表10-15-2 脂質異常症(高脂血症) 治療方法(複数回答)

	男性(N=1)		女性(N=2)		計(N=3)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
内服薬	0	0.0%	2	100.0%	2	66.7%
その他	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図10-15-2 脂質異常症(高脂血症) 治療方法(複数回答)



### 2.10.16 前立腺・男性機能に関する病気・症状について（男性のみ）

本調査に回答するのは今回が初めての男性に対し、前立腺・男性機能に関する病気・症状について、これまでに罹ったことがある病気を見ると、「その他」と回答した方が1件（20.0%）と最も多く、すべて「治療していない」となっている。（表10-16）

表10-16 前立腺・男性機能に関する病気・症状（複数回答） 男性

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
前立腺肥大	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
男性不妊(子供ができない)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
インポテンツ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

### 2.10.17 子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について（女性のみ）

本調査に回答するのは今回が初めての女性に対し、子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について、これまでに罹ったことがある病気を見ると、「子宮筋腫」「不正出血」「月経不順」がいずれも1件と最も多く、その中で、「子宮筋腫」と「不正出血」が共に「医療機関での治療をへて治癒」1件（11.1%）、「月経不順」は、「治療していない」1件（11.1%）となっている。（表10-17）

表10-17 子宮・卵巣・婦人科系の病気（複数回答） 女性

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
子宮内膜症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
子宮筋腫	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
卵巣のう腫	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
月経困難症(生理痛)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不正出血	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
月経不順	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
過多月経(月経が多い)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
過小月経(月経が少ない)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	5	55.6%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%

2.10.18 月経・妊娠・出産に関することについて（女性のみ）

本調査に回答するのは今回が初めての女性に対し、初経の年齢を回答した8人の平均年齢は、13.9歳となっている。

（※）「初経あり」と回答した9人のうち、1人は年齢の回答がなかった。（表10-18-1）

表10-18-1 初経のあり・なし 女性

	女性 (N=9)		
	件数	割合	平均年齢
あり	9	100.0%	13.9
なし	0	0.0%	-
未回答	0	0.0%	
不詳	0	0.0%	
計	9	100.0%	-

本調査に回答するのは今回が初めての女性に対し、閉経の年齢を回答した8人の平均年齢は、51.9歳となっている。

（※）「閉経あり」と回答した9人のうち、1人は年齢の回答がなかった。（表10-18-2）

表10-18-2 閉経のあり・なし 女性

	女性 (N=9)		
	件数	割合	平均年齢
あり	9	100.0%	51.9
なし	0	0.0%	-
未回答	0	0.0%	
不詳	0	0.0%	
計	9	100.0%	-

本調査に回答するのは今回が初めての女性に対し、不妊症についてみると、「あり」と回答した方は該当なしとなっている。（表10-18-3）

表10-18-3 不妊症 女性

	女性 (N=9)	
	件数	割合
あり	0	0.0%
なし	6	66.7%
未回答	3	33.3%
不詳	0	0.0%
計	9	100.0%

本調査に回答するのは今回が初めての女性に対し、妊娠回数についてみると、「3回」が3件(33.3%)、「4回」が2件(22.2%)「0回」「1回」「2回」「5回」と回答した方が共に1件(11.1%)となっている。（表10-18-4）

表10-18-4 妊娠回数 女性

	女性 (N=9)	
	件数	割合
0	1	11.1%
1	1	11.1%
2	1	11.1%
3	3	33.3%
4	2	22.2%
5	1	11.1%
6	0	0.0%
7	0	0.0%
8	0	0.0%
9	0	0.0%
10	0	0.0%
11回以上	0	0.0%
未回答	0	0.0%
不詳	0	0.0%
計	9	100.0%

本調査に回答するのは今回が初めての女性に対し、記載のあった妊娠中の状況を集計してみると、「切迫早産」が1件(4.0%)、「その他」が1件(4.0%)となっている。(表10-18-5)

表10-18-5 妊娠中の状況(複数回答) 女性

	妊娠回数(N=25)	
	件数	割合
とくになし	23	92.0%
切迫流産	0	0.0%
切迫早産	1	4.0%
妊娠中毒症	0	0.0%
その他	1	4.0%
未回答	0	0.0%
不詳	0	0.0%
計	25	100.0%

本調査に回答するのは今回が初めての女性に対し、記載のあった出産等の状況を集計してみると、「正常分娩」が23件(92.0%)と最も多くなっている。(表10-18-6)

表10-18-6 出産等の状況(複数回答) 女性

	妊娠回数(N=25)	
	件数	割合
正常分娩	23	92.0%
帝王切開	0	0.0%
早産	0	0.0%
死産	1	4.0%
自然流産	0	0.0%
人工流産	1	4.0%
その他	0	0.0%
未回答	0	0.0%
不詳	0	0.0%
計	25	100.0%

本調査に回答するのは今回が初めての女性に対し、記載のあった出産時の出血量を集計してみると、「中」が15件(65.2%)と最も多くなっている。(表10-18-7)

表10-18-7 出産時の出血量 女性

	出産回数(N=23)	
	件数	割合
小	3	13.0%
中	15	65.2%
多	3	13.0%
未回答	2	8.7%
不詳	0	0.0%
計	23	100.0%

本調査に回答するのは今回が初めての女性に対し、記載のあった新生児の状況を集計してみると、「とくになし」が20件(87.0%)と最も多くなっている。(表10-18-8)

表10-18-8 新生児の状況(複数回答) 女性

	出産回数(N=23)	
	件数	割合
とくになし	20	87.0%
低出生体重児	3	13.0%
先天異常	0	0.0%
奇形	0	0.0%
その他	0	0.0%
未回答	0	0.0%
不詳	0	0.0%
計	23	100.0%

### 2.10.19 骨・関節の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、骨・関節の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「腰痛」と回答した方が8件(57.1%)と最も多く、その中で「医療機関で治療中」3件(21.4%)（男性0件(0.0%)、女性3件(33.3%)）、「医療機関での治療をへて治癒」1件(7.1%)（男性1件(20.0%)、女性0件(0.0%)）、「治療していない」4件(28.6%)（男性2件(40.0%)、女性2件(22.2%)）となっている。(表10-19-1)

表10-19-1 骨・関節の病気・症状(複数回答)

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨折	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%
椎間板ヘルニア	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%
骨粗しょう症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
骨の変形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
痛風	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%
関節痛	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ガングリオン	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
骨痛(骨がうずくような痛み)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肩こり	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
腰痛	0	0.0%	1	20.0%	2	40.0%	0	0.0%	3	60.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨折	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%
椎間板ヘルニア	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%
骨粗しょう症	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%
骨の変形	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	2	22.2%
痛風	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
関節痛	1	11.1%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	3	33.3%
ガングリオン	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
骨痛(骨がうずくような痛み)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肩こり	1	11.1%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	4	44.4%
腰痛	3	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	5	55.6%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0%


	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
骨折	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%
椎間板ヘルニア	0	0.0%	1	7.1%	2	14.3%	0	0.0%	3	21.4%
骨粗しょう症	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%
骨の変形	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	14.3%
痛風	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%
関節痛	1	7.1%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	3	21.4%
ガングリオン	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
骨痛(骨がうずくような痛み)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肩こり	1	7.1%	0	0.0%	4	28.6%	0	0.0%	5	35.7%
腰痛	3	21.4%	1	7.1%	4	28.6%	0	0.0%	8	57.1%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.1%

骨粗しょう症で現在治療中と回答した人に治療方法についてみると、「内服薬」「注射薬」が共に1件（50.0%）と最も多く、すべて女性1件（50.0%）となっている。（表10-19-2、図10-19-2）

表10-19-2 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法（複数回答）

	男性 (N=0)		女性 (N=2)		計 (N=2)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
内服薬	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
注射薬	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図10-19-2 骨粗しょう症 過去・現在の治療状況 治療方法（複数回答）



2.10.20 皮膚・爪の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、皮膚・爪の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「皮膚の掻痒(かゆみ)」と回答した方が7件(50.0%) (男性2件(40.0%)、女性5件(55.6%))と最も多く、「医療機関で治療中」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))、「医療機関での治療をへて治癒」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))、「治療していない」5件(35.7%) (男性2件(40.0%)、女性3件(33.3%))、となっている。(表10-20-1)

表10-20-1 皮膚・爪の病気・症状(複数回答)

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ざ瘡(にきび)	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
毛孔の開大・面疱 (毛穴が広がる、黒にきび)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
色素沈着(肌が黒くなる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
爪の変形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
粉瘤(皮膚のふくら)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
粘液嚢腫(関節のふくら)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
掌蹠膿疱症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
湿疹がでやすい	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%
皮膚の掻痒(かゆみ)	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%
乾燥肌(さめ肌)	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%
脱毛	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
白斑	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
紫斑(内出血)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%
病気症状は特いない	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ざ瘡(にきび)	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
毛孔の開大・面疱 (毛穴が広がる、黒にきび)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
色素沈着(肌が黒くなる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
爪の変形	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%
粉瘤(皮膚のふくら)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
粘液嚢腫(関節のふくら)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
掌蹠膿疱症	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
湿疹がでやすい	1	11.1%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	4	44.4%
皮膚の掻痒(かゆみ)	1	11.1%	1	11.1%	3	33.3%	0	0.0%	5	55.6%
乾燥肌(さめ肌)	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%
脱毛	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
白斑	0	0.0%	1	11.1%	1	11.1%	0	0.0%	2	22.2%
紫斑(内出血)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特いない	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%


	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
ざ瘡(にきび)	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	14.3%
毛孔の開大・面疱 (毛穴が広がる、黒にきび)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
色素沈着(肌が黒くなる)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
爪の変形	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	14.3%
粉瘤(皮膚のふくら)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
粘液嚢腫(関節のふくら)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
掌蹠膿疱症	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
湿疹がでやすい	2	14.3%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	5	35.7%
皮膚の掻痒(かゆみ)	1	7.1%	1	7.1%	5	35.7%	0	0.0%	7	50.0%
乾燥肌(さめ肌)	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%	0	0.0%	4	28.6%
脱毛	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
白斑	0	0.0%	1	7.1%	1	7.1%	0	0.0%	2	14.3%
紫斑(内出血)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
病気症状は特いない	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21.4%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

湿疹ができやすいと回答した方について、湿疹が特にできやすい場所をみると、「体躯(胸、背中、腹、腰)」が5件(100.0%) (男性1件(100.0%)、女性4件(100.0%))と最も多くなっている。(表10-20-2、図10-20-2)

表10-20-2 湿疹が特にできやすい場所(複数回答)

	男性(N=1)		女性(N=4)		計(N=5)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節の裏(ひじ、ひざ)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
顔面	0	0.0%	2	50.0%	2	40.0%
体躯(胸、背中、腹、腰)	1	100.0%	4	100.0%	5	100.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図10-20-2 湿疹が特にできやすい場所(複数回答)



## 2.10.21 アレルギー疾患について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、アレルギー疾患について、これまで罹ったことがある病気をみると、「花粉症」と回答した方が3件（21.4%）と最も多く、その中で「医療機関で治療中」1件（7.1%）（男性0件（0.0%）、女性1件（11.1%））、「治療していない」2件（14.3%）（男性0件（0.0%）、女性2件（22.2%））、となっている。（表10-21）

表10-21 アレルギー疾患の病気・症状（複数回答）

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
アレルギー性鼻炎	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
花粉症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
喘息	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
蕁麻疹	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
食物アレルギー	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
薬物アレルギー	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
アレルギー性鼻炎	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
花粉症	1	11.1%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	3	33.3%
喘息	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
蕁麻疹	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
食物アレルギー	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
薬物アレルギー	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33.3%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%

	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
アトピー性皮膚炎	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
アレルギー性鼻炎	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	14.3%
花粉症	1	7.1%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	3	21.4%
喘息	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
蕁麻疹	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
食物アレルギー	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
薬物アレルギー	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	6	42.9%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

## 2.10.22 膠原病について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、膠原病について、これまで罹ったことがある病気をみると、「その他」と回答した方が1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))と最も多く、その中で「医療機関で治療中」1件(7.1%) (男性0件(0.0%)、女性1件(11.1%))となっている。(表10-22-1)

表10-22-1 膠原病(複数回答)

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全身性エリテマトーデス(SLE)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
強皮症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
皮膚筋炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
シェーグレン症候群	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ベーチェット病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%

	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全身性エリテマトーデス(SLE)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
強皮症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
皮膚筋炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
シェーグレン症候群	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ベーチェット病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	7	77.8%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%


	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
関節リウマチ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全身性エリテマトーデス(SLE)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
強皮症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
皮膚筋炎	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
シェーグレン症候群	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ベーチェット病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	11	78.6%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%

膠原病で現在治療中と回答した人に治療方法についてみると、「内服薬」が1件（100.0%）（男性0件（0.0%）、女性1件（100.0%））となっている。（表10-22-2、図10-22-2）

表10-22-2 膠原病 過去・現在の治療状況 治療方法（複数回答）

	男性 (N=0)		女性 (N=1)		計 (N=1)	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
食事または運動療法のみ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
内服薬	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
注射薬	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

図10-22-2 膠原病 過去・現在の治療状況 治療方法（複数回答）



### 2.10.23 その他の病気・症状について

本調査に回答するのは今回が初めての方に対し、その他の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気を見ると、「手足のしびれ」「体がつる」と回答した方が共に5件（35.7%）と最も多く、その中で「手足のしびれ」は「医療機関で治療中」1件（7.1%）（男性0件（0.0%）、女性1件（11.1%）、「治療していない」4件（28.6%）（男性2件（40.0%）、女性2件22.2%）、「体がつる」はすべて「治療していない」（男性2件（40.0%）、女性3件（33.3%））となっている。（表10-23）

表10-23 その他の病気・症状（複数回答）

	男性(N=5)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感(体がだるい)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
手足のしびれ	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%
体がつる	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%
のどがつる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
筋肉の痛み	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
体がむくむ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
日光に当たると顔が腫れたり湿疹ができたりする	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
指が腫れる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
全身に痛みがある	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
手足に痛みがある	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.0%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.0%
	女性(N=9)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感(体がだるい)	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	33.3%
手足のしびれ	1	11.1%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	3	33.3%
体がつる	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	33.3%
のどがつる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
筋肉の痛み	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
体がむくむ	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	33.3%
日光に当たると顔が腫れたり湿疹ができたりする	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
指が腫れる	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
全身に痛みがある	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%
手足に痛みがある	1	11.1%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	3	33.3%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22.2%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1%
	計(N=14)									
	医療機関で治療中		医療機関での治療をへて治癒		治療していない		不詳		合計	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
全身倦怠感(体がだるい)	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	21.4%
手足のしびれ	1	7.1%	0	0.0%	4	28.6%	0	0.0%	5	35.7%
体がつる	0	0.0%	0	0.0%	5	35.7%	0	0.0%	5	35.7%
のどがつる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
筋肉の痛み	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
体がむくむ	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	21.4%
日光に当たると顔が腫れたり湿疹ができたりする	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
指が腫れる	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
全身に痛みがある	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%
手足に痛みがある	1	7.1%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	3	21.4%
その他	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	7.1%
病気症状は特にない	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28.6%
未回答	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.3%



## 2.11 調査票の自由記入欄について

本調査では、「これまでの症状や病気について、書ききれなかったことや、特に研究してもらいたいこと、要望などについて自由記入欄を設けたところ、229人から回答がありました。いずれも、回答いただいた一人一人の貴重なご意見ではありますが、ここでは代表的な内容のみを記載するにとどめることとしました。

なお、回答いただいた貴重なご意見については、「(再掲) 2.11 調査票の自由記入欄について (すべてのご意見)」に記載しました。

また、個別の相談支援が必要な、お困りの状況についての記載があった方については、都道府県に設置している相談支援員等が、詳しく状況をお聴きし、相談支援を行っています。

<自由記載欄の主な記入内容>

### ○自分、家族の健康に関する不安、生活上のストレス等について (154件)

- ・神経鞘腫による神経の圧迫で、現在右足への痛みと足先にかけての痺れが発生しており、手術では後遺症が考えられる中、手術にも踏み切れず、悩みながらの生活をしております。カネミ油症と神経鞘腫との因果関係について研究していただきたく要望致します。
- ・年々、目が悪くなっています。
- ・疲れやすく、腰痛が治らない
- ・家族には知られたくない。
- ・最近特に手が痛いのでよくきく薬や漢方等があれば紹介してほしい。
- ・背中に今までと異なる膿胞が出来、フジジン軟膏を処方してもらっているが、次々と発生し、●年近くなる
- ・歯科に行った所、生まれた時から歯の数が少ないため、元から歯がない所がいくつもあるので歯根が歯ぐきから出ていない為噛み合わせが悪いので年齢年齢と共に不便になるでしょうと言われ不安です。どの様に治療すれば良いのか先生も保健以内での対処で考えるのがひじょうに難しいですと言われてどうしようかと悩んでいます。それと今の時期とか私はアレルギー体質なので痒みや吹出物に鼻炎に悩んでいます。
- ・カネミ油を摂取した事によりこれから年齢を重ねると共に病気等の発症が不安です。

### ○職業 (仕事) に関する苦勞について (0件)

#### ○経済的な苦勞について (2件)

- ・経済面 健康状態
- ・現在治療しているリウマチ (関節リウマチ) のことで、一番症状の重いときは床から立ち上がれなくて、トイレにも行けないときが、あり日常生活にも支障を来すようなことが、今後病気の進行によって起きるのではないかと心配です。食糧品等の物の値りによって生活が今後できるかどうかの心配もあります。仕事をし働いて生活できる生活がどのくらい維持できるかの心配もあります。

#### ○治療の研究開発への要望、期待 (25件)

- ・透析に入り ●年です。カネミ油症との関連が気になってきました。カネミ油症で腎臓がやられるのか、ぜひ研究してください。もし、すでに研究済みでしたら、その内容を知りたいです。
- ・神経鞘腫による神経の圧迫で、現在右足への痛みと足先にかけての痺れが発生しており、手術では後遺症が考えられる中、手術にも踏み切れず、悩みながらの生活をしております。カネミ油症と神経鞘腫との因果関係について研究していただきたく要望致します。
- ・☆未認定の患者の救済して下さい。
- ・研究してもらいたいこと：・PCDFの体外排出促進の方法。・油症患者が化学物質に弱いことについての確認、その理由。※：農薬、合成洗剤、住宅内装建材、歯科治療、家電製品など
- ・いろいろと研究されているのは感謝します。ですが、手足のしびれ、全身のかゆみ、眼のいたみなど、残念ながら改善されません。背中、腰の痛み、身体のだるさ、どうしたらよくなるのでしょうか。認定されていない、子供、孫達もそれぞれ苦しんでいます。一日も早い解決薬が出来ますように
- ・私は認定患者です。兄、母等子供、兄の所も含めて皮フやアレルギーや多動などの病気難病等患者である母親族以外、父方親族には病気すらありません。長男、長男、次男、男の子すべて皮フが弱くケロイド体質しっしん、アレルギーが多くあります。皮フしっかん等をしっかり調査お願いします。

#### ○病院、医師、検診に関する要望（10件）

- ・前ページの本調査に回答した方は回答の必要がありませんと書かれていますが、耳に病気がでたりしているので、以前回答した時と変わっていることもあると思いますが本当に必要ないのでしょうか。カネミの年1回検診では、どういう基準で医者を選んでいきますか？熱心にきいたり、アドバイスして下さる方もいれば、外科だったため（内科の女性の先生）テキトーとは言いませんが、こちらが症状をくわしく言っても的はずれなことを言われる（眼科の男性）方もいらっやいます。ボランティアなのか無給なのかもやる気を感じません。患者は時間を作って遠い所から来ている方もいます。お年寄は、具合が悪くてもなおさら足が悪くても来ています。もう少し患者によりそう気持があっても良いように思うのですが、、、。以前はかなり待たされましたが前回ぐらいから案内が早くスムーズになり時間がかからなくなったのは良いと思います。
- ・毎年の検診を目安として、年間で自分で病院の検査などを受けてるので、ぜひ今後も、毎年検診をやってほしいです。コロナのときは、とても心配でしたので。よろしくお願いします。
- ・受療券を使える医療機関を増やして欲しい。
- ・希望した近くの「医院」に「受療券」での受診を要請しても、断られる事がある。

#### ○行政機関に対する要望（30件）

- ・2世の子供の健康状態について。油症検診に行っても認定基準に未たず認定されません。しかし、体調の悪さ、皮膚疾患等がある。人によっては症状はさまざまだと思いますが、基準に未たないからと言って認定しないのではなく、その人の体調や症状を見て決定してほしい。例えば、私はお酒が飲めません。そんな人が少しでもアルコールを摂取すればたちまち体調が悪くなります。カネミもそうです。少量のダイオキシシンやカネクロールでもひどい症状になりかねないと思います。そういう事も鑑みて、今後の認定を考えて頂きたいと思います。 ※カネミ認定の親から生まれた子供達は全て対象だと考えられます。次世代の子供達の健康を守って頂きたいと心から願っております。どうぞよろしくお願い致します。
- ・今は主人にも私の事はわかってるが、子供達は知らないで、わからなくなって（認知症とか）アンケートがきたとき、カネミって何って聞かれた時のことが心配
- ・私は薬が合わないことが多く、以前ジェネリックの薬を出された時、呼吸困難のようになり動悸がして苦しい思いをして、その薬はつかえないようになりました。薬が合わない事が多く、先生も困ってあります。それでいまは安定して服用しているのですが、そのまま請求したところ、ジェネリックではないので治療費の支払がされないものがでています。もし薬で私に何かあったときは、カネミ会社は責任をとってくれるのか考えます。
- ・健康保険適用外の治療でも場合によっては、治療請求できるように検討してほしい。（限度額を設けるなど）

#### ○カネミ倉庫に対する要望（1件）

- ・油症患者受療券をなくしたのでカネミ倉庫株式会社に請求できますか？

#### ○その他（44件）

- ・お世話になります。無事一年間入院もなく過ごせました。感謝です。ありがとうございました。 月一回の医療センターへの通院がバスに乗れなくてタクシーなので、申し訳なく思っています。カネミさんより支払っていただいています。
- ・アレルギー性鼻炎になっていることを以前記入していない気がします。現在 薬を飲んでいます。
- ・認知症（前頭葉・側頭葉委縮）●才で発症 カネミと関連があるのか、ないのか。
- ・大変でしたが時間と共に大切な事を学んだり生活の必用性の原理を学びてきおうしながら生きてきた事で生きる力を大切にできるようになった生活ができるようになりました ・自分を守る力を取り入れる事により生きる力になると思います ・自分が生活する上で大切な事を学び毎日を大切に生きていることが大事だと思います ・そして今の時代の便利の良さにまぎらわれないように生きることが大切だと思います
- ・高齢になり、ご支援ありがとうございます。

※お一人から複数の趣旨の回答を頂いている場合があるため、各件数の合計と回答者数とは必ずしも一致しません。

別表 調査結果の性・年齢（5歳階級）別  
集計表



別表 1

## 1日の歩行時間、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	90分以上	60分以上～ 90分未満	30分以上～ 60分未満	30分未満	未回答	不詳
総数	1,237	388	222	339	282	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	3	1	1	2	0	0
50～54	37	16	7	9	5	0	0
55～59	140	59	28	29	24	0	0
60～64	232	86	44	62	39	1	0
65～69	238	85	44	66	43	0	0
70～74	200	73	32	62	33	0	0
75～79	123	31	31	41	19	1	0
80～84	97	19	19	35	24	0	0
85～89	89	13	13	22	39	2	0
90歳以上	74	3	3	12	54	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	577	154	98	178	147	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	0	0	2	0	0
50～54	19	10	3	3	3	0	0
55～59	72	22	17	17	16	0	0
60～64	114	31	19	39	25	0	0
65～69	120	40	22	35	23	0	0
70～74	96	25	13	35	23	0	0
75～79	52	13	9	19	11	0	0
80～84	40	7	9	17	7	0	0
85～89	34	5	6	8	15	0	0
90歳以上	28	1	0	5	22	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	660	234	124	161	135	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	3	1	1	0	0	0
50～54	18	6	4	6	2	0	0
55～59	68	37	11	12	8	0	0
60～64	118	55	25	23	14	1	0
65～69	118	45	22	31	20	0	0
70～74	104	48	19	27	10	0	0
75～79	71	18	22	22	8	1	0
80～84	57	12	10	18	17	0	0
85～89	55	8	7	14	24	2	0
90歳以上	46	2	3	7	32	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 2

運動（スポーツ）頻度、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	ほぼ毎日	週2～4回程 度	週1回程度	月1回程度	ほとんどし ていない	未回答	不詳
総数	1,237	245	289	152	57	485	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	1	1	1	0	4	0	0
50～54	37	5	5	6	1	20	0	0
55～59	140	23	21	21	11	61	3	0
60～64	232	39	52	27	12	101	1	0
65～69	238	63	51	28	12	84	0	0
70～74	200	38	60	30	10	62	0	0
75～79	123	29	40	11	5	38	0	0
80～84	97	19	30	14	2	31	1	0
85～89	89	21	18	11	1	35	3	0
90歳以上	74	7	11	3	3	49	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	108	133	85	36	212	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	0	0	0	2	0	0
50～54	19	2	2	3	1	11	0	0
55～59	72	10	14	16	6	23	3	0
60～64	114	18	21	18	8	49	0	0
65～69	120	31	22	13	10	44	0	0
70～74	96	14	28	16	6	32	0	0
75～79	52	13	15	6	2	16	0	0
80～84	40	6	18	6	0	10	0	0
85～89	34	12	8	6	0	8	0	0
90歳以上	28	2	5	1	3	17	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	137	156	67	21	273	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	1	1	1	0	2	0	0
50～54	18	3	3	3	0	9	0	0
55～59	68	13	7	5	5	38	0	0
60～64	118	21	31	9	4	52	1	0
65～69	118	32	29	15	2	40	0	0
70～74	104	24	32	14	4	30	0	0
75～79	71	16	25	5	3	22	0	0
80～84	57	13	12	8	2	21	1	0
85～89	55	9	10	5	1	27	3	0
90歳以上	46	5	6	2	0	32	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3

## 飲酒頻度、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	ほぼ毎日	週3～5回程 度	週1～2回程 度	月1～3回程 度	年1～10回 程度	飲まない	未回答	不詳
総数	1,237	230	104	76	74	69	673	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	0	0	1	1	1	4	0	0
50～54	37	5	5	6	5	4	12	0	0
55～59	140	32	19	13	17	15	41	3	0
60～64	232	57	21	16	15	17	105	1	0
65～69	238	57	23	13	16	13	115	1	0
70～74	200	33	19	12	8	6	121	1	0
75～79	123	19	8	8	5	7	76	0	0
80～84	97	13	2	3	3	4	72	0	0
85～89	89	13	5	4	3	1	61	2	0
90歳以上	74	1	2	0	1	1	66	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	189	68	44	38	30	203	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	0	0	0	0	2	0	0
50～54	19	5	3	2	3	2	4	0	0
55～59	72	24	10	7	9	7	12	3	0
60～64	114	44	14	9	8	5	34	0	0
65～69	120	47	16	9	8	6	33	1	0
70～74	96	27	13	9	5	3	39	0	0
75～79	52	18	5	4	0	4	21	0	0
80～84	40	11	1	1	3	2	22	0	0
85～89	34	12	4	3	1	0	14	0	0
90歳以上	28	1	2	0	1	1	22	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	41	36	32	36	39	470	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	0	0	1	1	1	2	0	0
50～54	18	0	2	4	2	2	8	0	0
55～59	68	8	9	6	8	8	29	0	0
60～64	118	13	7	7	7	12	71	1	0
65～69	118	10	7	4	8	7	82	0	0
70～74	104	6	6	3	3	3	82	1	0
75～79	71	1	3	4	5	3	55	0	0
80～84	57	2	1	2	0	2	50	0	0
85～89	55	1	1	1	2	1	47	2	0
90歳以上	46	0	0	0	0	0	44	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 4

## 飲酒量（ビール大瓶換算）、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	0.5本未満	0.5~1.0本 未満	1~2本未満	2~3本未満	3~4本未満	4~5本未満	5~10本未 満	10本以上	未回答	不詳
総数	553	14	219	190	94	15	4	7	1	9	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
50~54	25	0	11	9	5	0	0	0	0	0	0
55~59	96	0	35	24	26	6	0	2	0	3	0
60~64	126	2	46	46	23	5	1	1	1	1	0
65~69	122	3	40	48	24	4	1	1	0	1	0
70~74	78	3	35	28	8	0	2	2	0	0	0
75~79	47	2	23	15	6	0	0	0	0	1	0
80~84	25	3	11	8	1	0	0	0	0	2	0
85~89	26	0	15	9	1	0	0	0	0	1	0
90歳以上	5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	369	6	118	142	77	15	4	6	0	1	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~54	15	0	5	6	4	0	0	0	0	0	0
55~59	57	0	16	13	20	6	0	2	0	0	0
60~64	80	0	19	33	20	5	1	1	0	1	0
65~69	86	2	23	36	19	4	1	1	0	0	0
70~74	57	2	20	24	7	0	2	2	0	0	0
75~79	31	0	13	13	5	0	0	0	0	0	0
80~84	18	1	10	6	1	0	0	0	0	0	0
85~89	20	0	10	9	1	0	0	0	0	0	0
90歳以上	5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	184	8	101	48	17	0	0	1	1	8	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
50~54	10	0	6	3	1	0	0	0	0	0	0
55~59	39	0	19	11	6	0	0	0	0	3	0
60~64	46	2	27	13	3	0	0	0	1	0	0
65~69	36	1	17	12	5	0	0	0	0	1	0
70~74	21	1	15	4	1	0	0	0	0	0	0
75~79	16	2	10	2	1	0	0	0	0	1	0
80~84	7	2	1	2	0	0	0	0	0	2	0
85~89	6	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 5

## 喫煙状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	吸う	やめた	吸ったこと がない	未回答	不詳
総数	1,237	208	368	646	15	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	7	1	3	3	0	0
50～54	37	14	11	12	0	0
55～59	140	40	38	61	1	0
60～64	232	55	69	108	0	0
65～69	238	54	69	115	0	0
70～74	200	26	64	108	2	0
75～79	123	8	44	70	1	0
80～84	97	7	30	56	4	0
85～89	89	2	20	63	4	0
90歳以上	74	1	20	50	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	577	160	286	127	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	2	0	0	0
50～54	19	10	5	4	0	0
55～59	72	30	24	17	1	0
60～64	114	41	50	23	0	0
65～69	120	43	52	25	0	0
70～74	96	20	57	19	0	0
75～79	52	7	32	12	1	0
80～84	40	6	26	7	1	0
85～89	34	2	20	11	1	0
90歳以上	28	1	18	9	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	660	48	82	519	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	5	1	1	3	0	0
50～54	18	4	6	8	0	0
55～59	68	10	14	44	0	0
60～64	118	14	19	85	0	0
65～69	118	11	17	90	0	0
70～74	104	6	7	89	2	0
75～79	71	1	12	58	0	0
80～84	57	1	4	49	3	0
85～89	55	0	0	52	3	0
90歳以上	46	0	2	41	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 6

## 喫煙状況（喫煙者 喫煙年数）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	0～2年 未満	2年～3年未 満	3年～5年未 満	5年～10年 未満	10年～20年 未満	20年～30年 未満	30年～40年 未満	40年以上	未回答	不詳
総数	208	4	1	1	0	4	16	54	124	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
50～54	14	0	0	0	0	0	3	11	0	0	0
55～59	40	1	0	0	0	0	4	30	5	0	0
60～64	55	1	0	1	0	1	2	4	46	0	0
65～69	54	1	0	0	0	2	3	7	39	2	0
70～74	26	1	0	0	0	1	2	1	21	0	0
75～79	8	0	1	0	0	0	1	0	5	1	0
80～84	7	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0
85～89	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	160	2	1	1	0	1	9	37	106	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	10	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0
55～59	30	1	0	0	0	0	2	22	5	0	0
60～64	41	0	0	1	0	0	1	3	36	0	0
65～69	43	0	0	0	0	1	2	4	35	1	0
70～74	20	1	0	0	0	0	1	0	18	0	0
75～79	7	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0
80～84	6	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
85～89	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	48	2	0	0	0	3	7	17	18	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
50～54	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
55～59	10	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0
60～64	14	1	0	0	0	1	1	1	10	0	0
65～69	11	1	0	0	0	1	1	3	4	1	0
70～74	6	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0
75～79	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
80～84	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7

## 喫煙状況（喫煙者 喫煙本数）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	1～5本未満	5本～10本 未満	10本～20本 未満	20本～30本 未満	30本～40本 未満	40本以上	未回答	不詳
総数	208	4	14	78	95	10	6	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	1	0	0	0	0
50～54	14	0	0	6	8	0	0	0	0
55～59	40	1	1	14	23	1	0	0	0
60～64	55	1	7	17	26	4	0	0	0
65～69	54	1	3	21	22	3	4	0	0
70～74	26	0	1	10	13	2	0	0	0
75～79	8	0	0	5	1	0	2	0	0
80～84	7	0	2	3	1	0	0	1	0
85～89	2	0	0	2	0	0	0	0	0
90歳以上	1	1	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	160	3	6	50	85	9	6	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	10	0	0	3	7	0	0	0	0
55～59	30	1	0	7	21	1	0	0	0
60～64	41	1	3	10	24	3	0	0	0
65～69	43	0	2	14	20	3	4	0	0
70～74	20	0	0	7	11	2	0	0	0
75～79	7	0	0	4	1	0	2	0	0
80～84	6	0	1	3	1	0	0	1	0
85～89	2	0	0	2	0	0	0	0	0
90歳以上	1	1	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	48	1	8	28	10	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	1	0	0	0	0
50～54	4	0	0	3	1	0	0	0	0
55～59	10	0	1	7	2	0	0	0	0
60～64	14	0	4	7	2	1	0	0	0
65～69	11	1	1	7	2	0	0	0	0
70～74	6	0	1	3	2	0	0	0	0
75～79	1	0	0	1	0	0	0	0	0
80～84	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8

## 喫煙状況（卒煙者 喫煙年数）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	0～2年未 満	2年～3年未 満	3年～5年未 満	5年～10年 未満	10年～20年 未満	20年～30年 未満	30年～40年 未満	40年以上	未回答	不詳
総数	368	7	6	14	22	67	98	65	66	23	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
50～54	11	0	0	0	1	4	4	1	0	1	0
55～59	38	2	1	0	2	8	17	7	0	1	0
60～64	69	2	2	4	3	10	22	17	7	2	0
65～69	69	1	2	3	4	17	17	12	11	2	0
70～74	64	1	0	2	8	9	15	13	12	4	0
75～79	44	1	1	2	3	8	5	9	14	1	0
80～84	30	0	0	2	1	5	9	2	8	3	0
85～89	20	0	0	0	0	2	6	3	2	7	0
90歳以上	20	0	0	1	0	2	2	1	12	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	286	6	3	7	16	52	81	47	55	19	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
50～54	5	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0
55～59	24	1	0	0	1	5	12	5	0	0	0
60～64	50	2	1	1	0	8	18	12	6	2	0
65～69	52	1	1	3	4	13	14	7	9	0	0
70～74	57	1	0	1	7	9	15	11	9	4	0
75～79	32	1	1	0	3	6	4	5	12	0	0
80～84	26	0	0	1	1	5	7	2	7	3	0
85～89	20	0	0	0	0	2	6	3	2	7	0
90歳以上	18	0	0	1	0	2	2	1	10	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	82	1	3	7	6	15	17	18	11	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
50～54	6	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0
55～59	14	1	1	0	1	3	5	2	0	1	0
60～64	19	0	1	3	3	2	4	5	1	0	0
65～69	17	0	1	0	0	4	3	5	2	2	0
70～74	7	0	0	1	1	0	0	2	3	0	0
75～79	12	0	0	2	0	2	1	4	2	1	0
80～84	4	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9

## 喫煙状況（卒煙者 喫煙本数）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	1～5本未満	5本～10本 未満	10本～20本 未満	20本～30本 未満	30本～40本 未満	40本以上	未回答	不詳
総数	368	9	19	98	165	24	38	15	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	3	0	1	0	2	0	0	0	0
50～54	11	1	0	3	5	0	1	1	0
55～59	38	2	2	11	17	2	4	0	0
60～64	69	5	2	23	26	5	6	2	0
65～69	69	0	5	23	27	7	5	2	0
70～74	64	0	1	16	31	2	12	2	0
75～79	44	0	4	9	23	4	3	1	0
80～84	30	0	1	5	16	3	4	1	0
85～89	20	1	1	5	7	1	0	5	0
90歳以上	20	0	2	3	11	0	3	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	286	3	11	56	144	23	37	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	0	0	2	0	0	0	0
50～54	5	0	0	0	3	0	1	1	0
55～59	24	0	1	5	12	2	4	0	0
60～64	50	2	2	12	23	4	5	2	0
65～69	52	0	2	13	25	7	5	0	0
70～74	57	0	1	12	28	2	12	2	0
75～79	32	0	2	5	18	4	3	0	0
80～84	26	0	0	2	16	3	4	1	0
85～89	20	1	1	5	7	1	0	5	0
90歳以上	18	0	2	2	10	0	3	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	82	6	8	42	21	1	1	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50～54	6	1	0	3	2	0	0	0	0
55～59	14	2	1	6	5	0	0	0	0
60～64	19	3	0	11	3	1	1	0	0
65～69	17	0	3	10	2	0	0	2	0
70～74	7	0	0	4	3	0	0	0	0
75～79	12	0	2	4	5	0	0	1	0
80～84	4	0	1	3	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	2	0	0	1	1	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 10

喫煙状況（卒煙者 何年前にやめたか）、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	1年未満	1年～2年未 満	2年～3年未 満	3年～4年未 満	4年～5年未 満	5年～10年 未満	10年～15年 未満	15年～20 年未満	20年～30 年未満	30年以上	未回答	不詳
総数	368	4	12	9	12	3	28	53	52	89	103	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
50～54	11	0	0	1	0	0	0	3	3	3	1	0	0
55～59	38	1	0	0	1	1	5	8	9	8	5	0	0
60～64	69	1	7	3	3	0	6	9	4	22	14	0	0
65～69	69	2	2	1	2	0	8	7	12	15	19	1	0
70～74	64	0	2	1	2	0	3	10	11	17	18	0	0
75～79	44	0	0	2	1	0	4	9	8	8	12	0	0
80～84	30	0	1	0	2	0	1	3	3	8	12	0	0
85～89	20	0	0	0	0	2	0	1	2	5	9	1	0
90歳以上	20	0	0	1	0	0	1	1	0	3	13	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	286	2	10	5	8	3	18	34	42	77	85	2	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
50～54	5	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
55～59	24	0	0	0	1	1	2	4	7	7	2	0	0
60～64	50	0	6	1	2	0	5	6	4	19	7	0	0
65～69	52	2	2	0	1	0	5	4	10	11	17	0	0
70～74	57	0	1	1	1	0	3	9	10	16	16	0	0
75～79	32	0	0	1	0	0	2	5	6	7	11	0	0
80～84	26	0	1	0	2	0	1	2	2	8	10	0	0
85～89	20	0	0	0	0	2	0	1	2	5	9	1	0
90歳以上	18	0	0	1	0	0	0	0	0	3	13	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	82	2	2	4	4	0	10	19	10	12	18	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
50～54	6	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0
55～59	14	1	0	0	0	0	3	4	2	1	3	0	0
60～64	19	1	1	2	1	0	1	3	0	3	7	0	0
65～69	17	0	0	1	1	0	3	3	2	4	2	1	0
70～74	7	0	1	0	1	0	0	1	1	1	2	0	0
75～79	12	0	0	1	1	0	2	4	2	1	1	0	0
80～84	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1

## 労働時間、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	10時間以上	9時間以上 ～10時間未 満	8時間以上 ～9時間未 満	7時間以上 ～8時間未 満	6時間以上 ～7時間未 満	5時間以上 ～6時間未 満	4時間以上 ～5時間未 満	4時間未満	未回答	不詳
総数	1,237	102	82	146	116	87	89	133	472	10	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
50～54	37	6	6	10	5	4	2	3	1	0	0
55～59	140	34	20	33	16	12	7	5	11	2	0
60～64	232	25	27	49	43	17	16	15	39	1	0
65～69	238	24	20	30	23	18	22	28	73	0	0
70～74	200	7	3	15	14	16	19	32	93	1	0
75～79	123	5	3	3	5	12	16	18	57	4	0
80～84	97	0	1	1	8	4	5	19	59	0	0
85～89	89	0	0	0	2	2	2	10	72	1	0
90歳以上	74	0	1	0	0	2	0	3	67	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	45	43	98	68	28	31	57	203	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	19	5	4	8	0	1	0	1	0	0	0
55～59	72	12	13	21	11	6	2	2	3	2	0
60～64	114	10	15	32	26	5	7	4	15	0	0
65～69	120	11	9	24	16	9	10	11	30	0	0
70～74	96	2	1	9	10	3	5	16	50	0	0
75～79	52	4	0	3	3	1	5	7	27	2	0
80～84	40	0	0	1	2	2	1	10	24	0	0
85～89	34	0	0	0	0	1	1	4	28	0	0
90歳以上	28	0	0	0	0	0	0	2	26	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	57	39	48	48	59	58	76	269	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
50～54	18	1	2	2	5	3	2	2	1	0	0
55～59	68	22	7	12	5	6	5	3	8	0	0
60～64	118	15	12	17	17	12	9	11	24	1	0
65～69	118	13	11	6	7	9	12	17	43	0	0
70～74	104	5	2	6	4	13	14	16	43	1	0
75～79	71	1	3	0	2	11	11	11	30	2	0
80～84	57	0	1	0	6	2	4	9	35	0	0
85～89	55	0	0	0	2	1	1	6	44	1	0
90歳以上	46	0	1	0	0	2	0	1	41	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2

## 一日平均野菜摂取量、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	70g未満 (1つ未満)	70g以上 140g未満 (1~2つ)	140g以上 210g未満(2 ~3つ)	210g以上 280g未満(3 ~4つ)	280g以上 350g未満(4 ~5つ)	350g以上(5 つ以上)	未回答	不詳
総数	1,237	273	413	260	176	72	33	10	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	7	1	4	2	0	0	0	0	0
50~54	37	12	14	6	4	1	0	0	0
55~59	140	35	60	19	12	6	6	2	0
60~64	232	58	83	56	17	10	8	0	0
65~69	238	59	79	48	36	10	6	0	0
70~74	200	32	68	43	35	20	2	0	0
75~79	123	18	33	28	34	5	3	2	0
80~84	97	14	23	28	18	10	3	1	0
85~89	89	22	26	16	12	5	5	3	0
90歳以上	74	22	23	14	8	5	0	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	160	214	108	56	24	11	4	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	2	0	1	1	0	0	0	0	0
50~54	19	8	7	2	2	0	0	0	0
55~59	72	22	30	9	5	3	1	2	0
60~64	114	37	47	17	5	3	5	0	0
65~69	120	40	36	28	10	3	3	0	0
70~74	96	19	40	19	10	8	0	0	0
75~79	52	11	18	11	11	1	0	0	0
80~84	40	6	14	8	8	4	0	0	0
85~89	34	8	13	6	4	0	2	1	0
90歳以上	28	9	8	7	1	2	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	113	199	152	120	48	22	6	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	5	1	3	1	0	0	0	0	0
50~54	18	4	7	4	2	1	0	0	0
55~59	68	13	30	10	7	3	5	0	0
60~64	118	21	36	39	12	7	3	0	0
65~69	118	19	43	20	26	7	3	0	0
70~74	104	13	28	24	25	12	2	0	0
75~79	71	7	15	17	23	4	3	2	0
80~84	57	8	9	20	10	6	3	1	0
85~89	55	14	13	10	8	5	3	2	0
90歳以上	46	13	15	7	7	3	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3

## 一日平均果物類摂取量、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	50g未満	50g以上 100g未満	100g以上 150g未満	150g以上	未回答	不詳
総数	1,237	653	358	179	37	10	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	4	2	1	0	0	0
50～54	37	32	3	1	1	0	0
55～59	140	99	23	12	3	3	0
60～64	232	148	56	25	2	1	0
65～69	238	125	84	26	3	0	0
70～74	200	85	73	35	7	0	0
75～79	123	48	37	29	8	1	0
80～84	97	35	31	24	6	1	0
85～89	89	35	27	17	6	4	0
90歳以上	74	42	22	9	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	577	334	158	74	8	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	1	1	0	0	0	0
50～54	19	17	0	1	1	0	0
55～59	72	51	11	8	0	2	0
60～64	114	82	21	10	1	0	0
65～69	120	71	41	7	1	0	0
70～74	96	45	35	15	1	0	0
75～79	52	22	18	11	1	0	0
80～84	40	15	13	11	1	0	0
85～89	34	14	10	7	2	1	0
90歳以上	28	16	8	4	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	660	319	200	105	29	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	3	1	1	0	0	0
50～54	18	15	3	0	0	0	0
55～59	68	48	12	4	3	1	0
60～64	118	66	35	15	1	1	0
65～69	118	54	43	19	2	0	0
70～74	104	40	38	20	6	0	0
75～79	71	26	19	18	7	1	0
80～84	57	20	18	13	5	1	0
85～89	55	21	17	10	4	3	0
90歳以上	46	26	14	5	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4

効果があると思われるサプリメント・健康食品  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1,237	160	1,029	48	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	1	6	0	0
50～54	37	4	33	0	0
55～59	140	19	118	3	0
60～64	232	32	195	5	0
65～69	238	27	203	8	0
70～74	200	26	169	5	0
75～79	123	22	89	12	0
80～84	97	12	80	5	0
85～89	89	10	75	4	0
90歳以上	74	7	61	6	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	59	493	25	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	0	2	0	0
50～54	19	1	18	0	0
55～59	72	8	62	2	0
60～64	114	12	98	4	0
65～69	120	10	104	6	0
70～74	96	10	83	3	0
75～79	52	7	40	5	0
80～84	40	5	34	1	0
85～89	34	4	29	1	0
90歳以上	28	2	23	3	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	101	536	23	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	1	4	0	0
50～54	18	3	15	0	0
55～59	68	11	56	1	0
60～64	118	20	97	1	0
65～69	118	17	99	2	0
70～74	104	16	86	2	0
75～79	71	15	49	7	0
80～84	57	7	46	4	0
85～89	55	6	46	3	0
90歳以上	46	5	38	3	0
不詳	0	0	0	0	0

## 別表 1 5

## 漢方薬の飲用の有無、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	定期的に飲 んでいる	症状がある ときに飲ん でいる	飲んでいな い	未回答	不詳
総数	1237	138	89	980	30	0
40～44	2	0	0	2	0	0
45～49	24	1	0	23	0	0
50～54	90	6	5	76	3	0
55～59	182	15	6	158	3	0
60～64	238	16	23	195	4	0
65～69	214	19	11	181	3	0
70～74	156	24	7	121	4	0
75～79	111	13	13	81	4	0
80～84	91	18	15	52	6	0
85～89	83	14	7	60	2	0
90歳以上	46	12	2	31	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	577	50	32	483	12	0
40～44	2	0	0	2	0	0
45～49	19	1	0	18	0	0
50～54	72	2	4	63	3	0
55～59	114	6	3	102	3	0
60～64	120	6	9	103	2	0
65～69	96	10	6	79	1	0
70～74	52	9	1	41	1	0
75～79	40	1	4	34	1	0
80～84	34	9	3	21	1	0
85～89	28	6	2	20	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	660	88	57	497	18	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	5	0	0	5	0	0
50～54	18	4	1	13	0	0
55～59	68	9	3	56	0	0
60～64	118	10	14	92	2	0
65～69	118	9	5	102	2	0
70～74	104	15	6	80	3	0
75～79	71	12	9	47	3	0
80～84	57	9	12	31	5	0
85～89	55	8	5	40	2	0
90歳以上	46	12	2	31	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 1 6

日常生活での悩みやストレス、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1,237	860	346	31	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	5	2	0	0
50～54	37	31	5	1	0
55～59	140	106	32	2	0
60～64	232	180	48	4	0
65～69	238	172	62	4	0
70～74	200	142	51	7	0
75～79	123	67	53	3	0
80～84	97	68	27	2	0
85～89	89	47	39	3	0
90歳以上	74	42	27	5	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	385	182	10	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	1	1	0	0
50～54	19	16	3	0	0
55～59	72	49	21	2	0
60～64	114	78	33	3	0
65～69	120	87	32	1	0
70～74	96	64	29	3	0
75～79	52	28	24	0	0
80～84	40	29	11	0	0
85～89	34	16	18	0	0
90歳以上	28	17	10	1	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	475	164	21	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	4	1	0	0
50～54	18	15	2	1	0
55～59	68	57	11	0	0
60～64	118	102	15	1	0
65～69	118	85	30	3	0
70～74	104	78	22	4	0
75～79	71	39	29	3	0
80～84	57	39	16	2	0
85～89	55	31	21	3	0
90歳以上	46	25	17	4	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 1 7

悩みやストレスの原因（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	家族との人 間関係	家族以外と の人間関係	恋愛・性に 関すること	結婚	離婚	いじめ、セ クシュア ル・ハラス メント	生きがいに 関すること	自由にで きる時間 がない
総数	2,205	166	123	11	7	4	13	144	46
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	24	1	3	0	1	1	0	1	1
50～54	92	9	9	1	0	0	0	3	3
55～59	292	18	18	4	2	0	2	16	10
60～64	477	42	29	4	1	1	3	31	14
65～69	453	32	24	0	1	0	3	32	11
70～74	366	21	21	2	2	1	2	22	3
75～79	162	15	5	0	0	1	0	14	1
80～84	163	16	7	0	0	0	2	13	0
85～89	89	7	5	0	0	0	0	6	1
90歳以上	87	5	2	0	0	0	1	6	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	974	65	44	8	6	2	3	72	20
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	14	1	1	0	1	1	0	1	1
50～54	51	5	6	1	0	0	0	2	3
55～59	133	7	6	1	1	0	1	10	3
60～64	196	14	7	4	1	0	1	12	6
65～69	207	9	9	0	1	0	1	17	5
70～74	173	12	10	2	2	1	0	14	1
75～79	65	6	3	0	0	0	0	6	0
80～84	69	6	1	0	0	0	0	7	0
85～89	35	4	1	0	0	0	0	2	1
90歳以上	31	1	0	0	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1,231	101	79	3	1	2	10	72	26
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	10	0	2	0	0	0	0	0	0
50～54	41	4	3	0	0	0	0	1	0
55～59	159	11	12	3	1	0	1	6	7
60～64	281	28	22	0	0	1	2	19	8
65～69	246	23	15	0	0	0	2	15	6
70～74	193	9	11	0	0	0	2	8	2
75～79	97	9	2	0	0	1	0	8	1
80～84	94	10	6	0	0	0	2	6	0
85～89	54	3	4	0	0	0	0	4	0
90歳以上	56	4	2	0	0	0	1	5	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 8

悩みやストレスの原因（複数回答） 2、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	収入・家 計・借金等	自分の健康 状態、病気 や介護	家族の健康 状態、病気 や介護	妊娠・出産	育児	家事	自分の学 業・受験・ 進学	子どもの 教育
総数	2,205	270	571	329	1	5	62	4	10
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	24	2	3	1	1	1	1	1	1
50～54	92	11	14	12	0	0	1	1	2
55～59	292	48	45	32	0	0	4	2	4
60～64	477	62	105	68	0	1	11	0	2
65～69	453	55	119	63	0	2	12	0	1
70～74	366	50	107	63	0	1	12	0	0
75～79	162	17	53	28	0	0	8	0	0
80～84	163	15	49	28	0	0	7	0	0
85～89	89	8	38	19	0	0	0	0	0
90歳以上	87	2	38	15	0	0	6	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	974	144	239	123	1	2	14	3	6
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	14	1	1	0	1	1	1	1	1
50～54	51	7	6	6	0	0	0	0	0
55～59	133	28	19	8	0	0	0	2	3
60～64	196	30	44	26	0	0	2	0	2
65～69	207	30	51	25	0	0	3	0	0
70～74	173	31	47	20	0	1	2	0	0
75～79	65	10	21	8	0	0	1	0	0
80～84	69	4	22	13	0	0	3	0	0
85～89	35	3	13	9	0	0	0	0	0
90歳以上	31	0	15	8	0	0	2	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1,231	126	332	206	0	3	48	1	4
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	10	1	2	1	0	0	0	0	0
50～54	41	4	8	6	0	0	1	1	2
55～59	159	20	26	24	0	0	4	0	1
60～64	281	32	61	42	0	1	9	0	0
65～69	246	25	68	38	0	2	9	0	1
70～74	193	19	60	43	0	0	10	0	0
75～79	97	7	32	20	0	0	7	0	0
80～84	94	11	27	15	0	0	4	0	0
85～89	54	5	25	10	0	0	0	0	0
90歳以上	56	2	23	7	0	0	4	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 9

悩みやストレスの原因（複数回答） 3、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	自分の仕事	家族の仕事	住まいや生活環境(公害、安全及び交通事情を含む)	その他	わからない	未回答	不詳
総数	2,205	229	62	99	33	12	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	24	4	1	0	0	0	0	0
50～54	92	19	4	2	0	0	1	0
55～59	292	65	11	10	1	0	0	0
60～64	477	62	16	16	7	2	0	0
65～69	453	55	18	20	5	0	0	0
70～74	366	20	6	25	5	2	1	0
75～79	162	3	0	11	5	1	0	0
80～84	163	1	6	9	6	3	1	0
85～89	89	0	0	2	1	2	0	0
90歳以上	87	0	0	4	3	2	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	974	134	24	42	15	5	2	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	14	1	0	0	0	0	0	0
50～54	51	12	2	1	0	0	0	0
55～59	133	37	3	4	0	0	0	0
60～64	196	33	5	5	3	1	0	0
65～69	207	34	8	10	4	0	0	0
70～74	173	13	1	12	3	1	0	0
75～79	65	3	0	5	1	1	0	0
80～84	69	1	5	3	2	1	1	0
85～89	35	0	0	1	0	1	0	0
90歳以上	31	0	0	1	2	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1,231	95	38	57	18	7	2	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	10	3	1	0	0	0	0	0
50～54	41	7	2	1	0	0	1	0
55～59	159	28	8	6	1	0	0	0
60～64	281	29	11	11	4	1	0	0
65～69	246	21	10	10	1	0	0	0
70～74	193	7	5	13	2	1	1	0
75～79	97	0	0	6	4	0	0	0
80～84	94	0	1	6	4	2	0	0
85～89	54	0	0	1	1	1	0	0
90歳以上	56	0	0	3	1	2	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 20

悩みやストレスの最も気になる原因 1、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	家族との人 間関係	家族以外と の人間関係	恋愛・性に 関すること	結婚	離婚	いじめ、セ クシュア ル・ハラス メント	生きがいに 関すること	自由にで きる時間 がない
総数	860	32	25	1	0	1	1	15	7
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	31	1	5	0	0	0	0	0	0
55～59	106	0	4	0	0	0	0	2	0
60～64	180	11	6	0	0	0	0	2	1
65～69	172	7	7	0	0	0	1	6	2
70～74	142	4	1	1	0	0	0	1	1
75～79	67	3	1	0	0	1	0	3	1
80～84	68	2	1	0	0	0	0	0	0
85～89	47	4	0	0	0	0	0	1	0
90歳以上	42	0	0	0	0	0	0	0	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	385	9	10	1	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	16	1	3	0	0	0	0	0	0
55～59	49	0	2	0	0	0	0	0	0
60～64	78	1	2	0	0	0	0	1	0
65～69	87	0	2	0	0	0	0	2	0
70～74	64	3	1	1	0	0	0	0	0
75～79	28	1	0	0	0	0	0	2	0
80～84	29	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	16	3	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	17	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	475	23	15	0	0	1	1	10	7
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	4	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	15	0	2	0	0	0	0	0	0
55～59	57	0	2	0	0	0	0	2	0
60～64	102	10	4	0	0	0	0	1	1
65～69	85	7	5	0	0	0	1	4	2
70～74	78	1	0	0	0	0	0	1	1
75～79	39	2	1	0	0	1	0	1	1
80～84	39	2	1	0	0	0	0	0	0
85～89	31	1	0	0	0	0	0	1	0
90歳以上	25	0	0	0	0	0	0	0	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 2 1

悩みやストレスの最も気になる原因 2、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	収入・家 計・借金等	自分の健康 状態、病気 や介護	家族の健康 状態、病気 や介護	妊娠・出産	育児	家事	自分の学 業・受験・ 進学	子どもの 教育
総数	860	94	370	120	0	0	3	0	2
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	0	2	1	0	0	0	0	0
50～54	31	5	5	5	0	0	0	0	0
55～59	106	17	24	9	0	0	0	0	0
60～64	180	27	61	31	0	0	1	0	1
65～69	172	18	74	22	0	0	0	0	1
70～74	142	15	76	23	0	0	0	0	0
75～79	67	4	33	10	0	0	1	0	0
80～84	68	5	34	10	0	0	1	0	0
85～89	47	3	28	6	0	0	0	0	0
90歳以上	42	0	33	3	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	385	52	163	47	0	0	1	0	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	16	4	2	1	0	0	0	0	0
55～59	49	8	13	1	0	0	0	0	0
60～64	78	12	29	13	0	0	0	0	1
65～69	87	15	34	11	0	0	0	0	0
70～74	64	8	36	7	0	0	0	0	0
75～79	28	2	14	3	0	0	1	0	0
80～84	29	2	17	4	0	0	0	0	0
85～89	16	1	6	4	0	0	0	0	0
90歳以上	17	0	12	3	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	475	42	207	73	0	0	2	0	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	4	0	2	1	0	0	0	0	0
50～54	15	1	3	4	0	0	0	0	0
55～59	57	9	11	8	0	0	0	0	0
60～64	102	15	32	18	0	0	1	0	0
65～69	85	3	40	11	0	0	0	0	1
70～74	78	7	40	16	0	0	0	0	0
75～79	39	2	19	7	0	0	0	0	0
80～84	39	3	17	6	0	0	1	0	0
85～89	31	2	22	2	0	0	0	0	0
90歳以上	25	0	21	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表 2 2

悩みやストレスの最も気になる原因 3、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	自分の仕事	家族の仕事	住まいや生活環境(公害、安全及び交通事情を含む)	その他	わからない	未回答	不詳
総数	860	86	11	20	22	8	42	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	1	1	0	0	0	0	0
50～54	31	8	1	1	0	0	0	0
55～59	106	35	4	0	1	0	10	0
60～64	180	20	2	4	4	2	7	0
65～69	172	18	1	5	3	0	7	0
70～74	142	3	0	2	3	2	10	0
75～79	67	0	0	4	3	0	3	0
80～84	68	1	2	3	5	1	3	0
85～89	47	0	0	0	2	2	1	0
90歳以上	42	0	0	1	1	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	385	51	4	11	10	3	17	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	1	0	0	0	0	0	0
50～54	16	5	0	0	0	0	0	0
55～59	49	21	0	0	0	0	4	0
60～64	78	10	1	1	2	1	4	0
65～69	87	11	1	4	2	0	5	0
70～74	64	2	0	2	1	1	2	0
75～79	28	0	0	3	1	0	1	0
80～84	29	1	2	1	2	0	0	0
85～89	16	0	0	0	1	1	0	0
90歳以上	17	0	0	0	1	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	475	35	7	9	12	5	25	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	4	0	1	0	0	0	0	0
50～54	15	3	1	1	0	0	0	0
55～59	57	14	4	0	1	0	6	0
60～64	102	10	1	3	2	1	3	0
65～69	85	7	0	1	1	0	2	0
70～74	78	1	0	0	2	1	8	0
75～79	39	0	0	1	2	0	2	0
80～84	39	0	0	2	3	1	3	0
85～89	31	0	0	0	1	1	1	0
90歳以上	25	0	0	1	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 2 3

## 睡眠時間、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	9時間以上	8時間以上 ～9時間未 満	7時間以上 ～8時間未 満	6時間以上 ～7時間未 満	5時間以上 ～6時間未 満	5時間未満	未回答	不詳
総数	1,237	63	115	228	400	323	97	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	0	0	1	3	2	1	0	0
50～54	37	0	3	10	11	9	4	0	0
55～59	140	2	12	15	52	51	6	2	0
60～64	232	4	19	37	84	68	19	1	0
65～69	238	5	22	42	84	62	19	4	0
70～74	200	5	16	32	76	54	17	0	0
75～79	123	7	9	26	43	24	12	2	0
80～84	97	7	10	21	20	32	7	0	0
85～89	89	14	11	27	16	12	8	1	0
90歳以上	74	19	13	17	11	9	4	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	31	64	120	185	136	34	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	0	0	1	1	0	0	0
50～54	19	0	2	6	5	3	3	0	0
55～59	72	2	9	7	27	25	0	2	0
60～64	114	2	15	23	35	27	11	1	0
65～69	120	2	10	25	42	29	9	3	0
70～74	96	3	12	18	38	19	6	0	0
75～79	52	3	4	13	20	9	3	0	0
80～84	40	3	3	11	10	12	1	0	0
85～89	34	7	4	11	5	7	0	0	0
90歳以上	28	9	5	6	2	4	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	32	51	108	215	187	63	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	0	0	1	2	1	1	0	0
50～54	18	0	1	4	6	6	1	0	0
55～59	68	0	3	8	25	26	6	0	0
60～64	118	2	4	14	49	41	8	0	0
65～69	118	3	12	17	42	33	10	1	0
70～74	104	2	4	14	38	35	11	0	0
75～79	71	4	5	13	23	15	9	2	0
80～84	57	4	7	10	10	20	6	0	0
85～89	55	7	7	16	11	5	8	1	0
90歳以上	46	10	8	11	9	5	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表 2 4

## 睡眠の質（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	寝付き（布団に入ってから眠るまでに要する時間）に、時間がかった。	夜間、睡眠途中で目が覚めて困った。	起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった。	睡眠時間が足りなかった。	睡眠全体の質に満足できなかった。	日中、眠気を感じた。	左記のようなことはなかった。	未回答	不詳
総数	2,728	364	560	381	266	436	481	221	19	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	16	3	2	2	1	5	2	1	0	0
50～54	82	9	13	17	9	15	14	5	0	0
55～59	297	28	50	45	38	48	65	21	2	0
60～64	505	57	102	75	67	78	80	43	3	0
65～69	564	61	109	84	57	105	102	43	3	0
70～74	474	74	108	71	41	78	71	31	0	0
75～79	268	39	59	37	21	43	48	17	4	0
80～84	207	44	50	21	14	29	31	16	2	0
85～89	178	33	38	17	11	22	34	20	3	0
90歳以上	137	16	29	12	7	13	34	24	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	1,215	132	255	170	120	199	219	111	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	1	1	1	0	1	0	1	0	0
50～54	41	3	7	9	5	6	8	3	0	0
55～59	147	12	24	27	18	25	29	10	2	0
60～64	237	16	53	33	33	38	41	22	1	0
65～69	277	25	50	44	31	50	51	24	2	0
70～74	213	34	51	29	17	36	31	15	0	0
75～79	103	12	21	15	7	17	19	12	0	0
80～84	77	15	19	5	4	14	10	9	1	0
85～89	63	10	17	5	3	6	14	6	2	0
90歳以上	52	4	12	2	2	6	16	9	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	1,513	232	305	211	146	237	262	110	10	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	11	2	1	1	1	4	2	0	0	0
50～54	41	6	6	8	4	9	6	2	0	0
55～59	150	16	26	18	20	23	36	11	0	0
60～64	268	41	49	42	34	40	39	21	2	0
65～69	287	36	59	40	26	55	51	19	1	0
70～74	261	40	57	42	24	42	40	16	0	0
75～79	165	27	38	22	14	26	29	5	4	0
80～84	130	29	31	16	10	15	21	7	1	0
85～89	115	23	21	12	8	16	20	14	1	0
90歳以上	85	12	17	10	5	7	18	15	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 2 5

脚に不快な感じ、または感覚があるか、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,237	522	690	25	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	3	4	0	0
50～54	37	13	24	0	0
55～59	140	39	99	2	0
60～64	232	85	146	1	0
65～69	238	100	132	6	0
70～74	200	98	100	2	0
75～79	123	63	57	3	0
80～84	97	50	42	5	0
85～89	89	39	45	5	0
90歳以上	74	32	41	1	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	230	336	11	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	1	1	0	0
50～54	19	7	12	0	0
55～59	72	16	54	2	0
60～64	114	41	72	1	0
65～69	120	49	66	5	0
70～74	96	47	49	0	0
75～79	52	25	27	0	0
80～84	40	18	21	1	0
85～89	34	14	19	1	0
90歳以上	28	12	15	1	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	292	354	14	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	2	3	0	0
50～54	18	6	12	0	0
55～59	68	23	45	0	0
60～64	118	44	74	0	0
65～69	118	51	66	1	0
70～74	104	51	51	2	0
75～79	71	38	30	3	0
80～84	57	32	21	4	0
85～89	55	25	26	4	0
90歳以上	46	20	26	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 2 6

脚を動かす必要性、または動かしたい衝動があるか、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,237	466	701	70	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	3	4	0	0
50～54	37	13	22	2	0
55～59	140	37	95	8	0
60～64	232	75	151	6	0
65～69	238	94	136	8	0
70～74	200	88	106	6	0
75～79	123	53	58	12	0
80～84	97	47	39	11	0
85～89	89	33	45	11	0
90歳以上	74	23	45	6	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	218	332	27	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	1	1	0	0
50～54	19	8	11	0	0
55～59	72	17	50	5	0
60～64	114	42	69	3	0
65～69	120	47	70	3	0
70～74	96	39	53	4	0
75～79	52	24	25	3	0
80～84	40	17	21	2	0
85～89	34	12	18	4	0
90歳以上	28	11	14	3	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	248	369	43	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	2	3	0	0
50～54	18	5	11	2	0
55～59	68	20	45	3	0
60～64	118	33	82	3	0
65～69	118	47	66	5	0
70～74	104	49	53	2	0
75～79	71	29	33	9	0
80～84	57	30	18	9	0
85～89	55	21	27	7	0
90歳以上	46	12	31	3	0
不詳	0	0	0	0	0

## 別表 27

## どちらで感じやすいか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	休んでいる とき	体を動かし ているとき	両方	わからない	未回答	不詳
総数	560	270	35	221	29	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	3	1	1	1	0	0	0
50～54	15	9	1	5	0	0	0
55～59	45	29	1	12	3	0	0
60～64	93	47	4	39	1	2	0
65～69	107	62	4	38	3	0	0
70～74	103	53	8	32	7	3	0
75～79	65	27	3	33	2	0	0
80～84	56	21	5	28	2	0	0
85～89	40	14	4	16	6	0	0
90歳以上	33	7	4	17	5	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	250	131	17	89	11	2	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	1	0	0	0
50～54	9	6	1	2	0	0	0
55～59	19	13	0	5	1	0	0
60～64	46	25	2	18	0	1	0
65～69	53	33	3	16	1	0	0
70～74	48	27	5	12	3	1	0
75～79	26	12	2	12	0	0	0
80～84	20	4	2	13	1	0	0
85～89	15	7	1	3	4	0	0
90歳以上	13	4	1	7	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	310	139	18	132	18	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	1	1	0	0	0	0
50～54	6	3	0	3	0	0	0
55～59	26	16	1	7	2	0	0
60～64	47	22	2	21	1	1	0
65～69	54	29	1	22	2	0	0
70～74	55	26	3	20	4	2	0
75～79	39	15	1	21	2	0	0
80～84	36	17	3	15	1	0	0
85～89	25	7	3	13	2	0	0
90歳以上	20	3	3	10	4	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 28

軽くなるか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	わからない	未回答	不詳
総数	560	296	120	140	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	3	2	0	1	0	0
50～54	15	9	4	2	0	0
55～59	45	26	8	11	0	0
60～64	93	48	25	19	1	0
65～69	107	71	17	19	0	0
70～74	103	51	23	28	1	0
75～79	65	35	16	13	1	0
80～84	56	23	13	20	0	0
85～89	40	19	10	11	0	0
90歳以上	33	12	4	16	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	250	144	45	60	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	1	0	0
50～54	9	6	1	2	0	0
55～59	19	9	4	6	0	0
60～64	46	25	11	10	0	0
65～69	53	34	9	10	0	0
70～74	48	30	8	9	1	0
75～79	26	17	5	4	0	0
80～84	20	9	4	7	0	0
85～89	15	9	2	4	0	0
90歳以上	13	5	1	7	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	310	152	75	80	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	2	2	0	0	0	0
50～54	6	3	3	0	0	0
55～59	26	17	4	5	0	0
60～64	47	23	14	9	1	0
65～69	54	37	8	9	0	0
70～74	55	21	15	19	0	0
75～79	39	18	11	9	1	0
80～84	36	14	9	13	0	0
85～89	25	10	8	7	0	0
90歳以上	20	7	3	9	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 2 9

どの時間帯でもっとも起こりやすいか（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	朝	日中	午後	夕方	夜	すべての時 間帯でほぼ 同じ	未回答	不詳
総数	697	84	73	34	74	215	204	7	6
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	1	1	1	1	0	1	0	0
50～54	20	2	1	0	3	7	5	1	1
55～59	57	3	5	5	9	22	13	0	0
60～64	121	21	9	5	11	42	31	1	1
65～69	130	14	12	3	13	47	41	0	0
70～74	128	20	19	7	13	37	31	1	0
75～79	83	4	9	5	8	24	29	2	2
80～84	69	6	11	3	3	23	19	2	2
85～89	46	7	3	3	8	10	15	0	0
90歳以上	38	6	3	2	5	3	19	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	300	39	36	12	28	101	83	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	3	1	1	1	0	0	0	0	0
50～54	11	1	1	0	1	5	3	0	0
55～59	22	0	1	2	4	10	5	0	0
60～64	58	11	4	1	4	23	15	0	0
65～69	60	7	6	1	3	25	18	0	0
70～74	61	12	11	3	7	16	11	1	0
75～79	32	3	3	2	4	7	13	0	0
80～84	22	0	7	1	0	9	5	0	0
85～89	17	2	1	0	3	5	6	0	0
90歳以上	14	2	1	1	2	1	7	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	397	45	37	22	46	114	121	6	6
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	0	0	1	0	1	0	0
50～54	9	1	0	0	2	2	2	1	1
55～59	35	3	4	3	5	12	8	0	0
60～64	63	10	5	4	7	19	16	1	1
65～69	70	7	6	2	10	22	23	0	0
70～74	67	8	8	4	6	21	20	0	0
75～79	51	1	6	3	4	17	16	2	2
80～84	47	6	4	2	3	14	14	2	2
85～89	29	5	2	3	5	5	9	0	0
90歳以上	24	4	2	1	3	2	12	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 30

病院、診療所への入院、または介護施設への入所状況、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,237	79	1,151	7	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	0	7	0	0
50～54	37	1	36	0	0
55～59	140	2	137	1	0
60～64	232	1	230	1	0
65～69	238	5	231	2	0
70～74	200	4	194	2	0
75～79	123	5	117	1	0
80～84	97	9	88	0	0
85～89	89	16	73	0	0
90歳以上	74	36	38	0	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	23	549	5	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	0	2	0	0
50～54	19	0	19	0	0
55～59	72	0	71	1	0
60～64	114	1	112	1	0
65～69	120	2	116	2	0
70～74	96	2	93	1	0
75～79	52	2	50	0	0
80～84	40	2	38	0	0
85～89	34	4	30	0	0
90歳以上	28	10	18	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	56	602	2	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	0	5	0	0
50～54	18	1	17	0	0
55～59	68	2	66	0	0
60～64	118	0	118	0	0
65～69	118	3	115	0	0
70～74	104	2	101	1	0
75～79	71	3	67	1	0
80～84	57	7	50	0	0
85～89	55	12	43	0	0
90歳以上	46	26	20	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 3 1

要介護認定の状況、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,237	146	1,078	13	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	0	7	0	0
50～54	37	1	36	0	0
55～59	140	0	138	2	0
60～64	232	2	228	2	0
65～69	238	6	230	2	0
70～74	200	11	186	3	0
75～79	123	15	107	1	0
80～84	97	19	77	1	0
85～89	89	37	51	1	0
90歳以上	74	55	18	1	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	45	523	9	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	0	2	0	0
50～54	19	0	19	0	0
55～59	72	0	70	2	0
60～64	114	2	111	1	0
65～69	120	3	115	2	0
70～74	96	5	89	2	0
75～79	52	5	47	0	0
80～84	40	4	36	0	0
85～89	34	9	24	1	0
90歳以上	28	17	10	1	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	101	555	4	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	0	5	0	0
50～54	18	1	17	0	0
55～59	68	0	68	0	0
60～64	118	0	117	1	0
65～69	118	3	115	0	0
70～74	104	6	97	1	0
75～79	71	10	60	1	0
80～84	57	15	41	1	0
85～89	55	28	27	0	0
90歳以上	46	38	8	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 3 2

要介護認定を受けている場合の要介護度の状況、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	未回答	不詳
総数	146	19	25	33	26	17	12	13	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
65～69	6	1	2	0	1	1	1	0	0	0
70～74	11	1	3	0	4	1	2	0	0	0
75～79	15	2	6	1	1	1	2	2	0	0
80～84	19	4	3	4	4	4	0	0	0	0
85～89	37	7	6	13	6	1	0	4	0	0
90歳以上	55	4	5	13	9	9	7	7	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	45	6	7	10	9	6	3	4	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
65～69	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0
70～74	5	1	2	0	2	0	0	0	0	0
75～79	5	0	2	1	1	1	0	0	0	0
80～84	4	0	0	1	2	1	0	0	0	0
85～89	9	2	1	3	0	1	0	2	0	0
90歳以上	17	2	1	4	2	3	3	2	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	101	13	18	23	17	11	9	9	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0
70～74	6	0	1	0	2	1	2	0	0	0
75～79	10	2	4	0	0	0	2	2	0	0
80～84	15	4	3	3	2	3	0	0	0	0
85～89	28	5	5	10	6	0	0	2	0	0
90歳以上	38	2	4	9	7	6	4	5	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 3

現在利用している介護保険サービス(複数回答)、  
性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	ホームヘルパーの訪問 介護・訪問 看護	通所介護 (デイサー ビス)	通所リハビ リテーショ ン	短期入所生 活介護 (ショート ステイ)	有料老人 ホームへの 入所	グループ ホームへの 入所	特別養護老 人ホームへ の入所	介護老人 保健施設 への入所	その他	利用して いない	未回答	不詳
総数	186	30	46	18	10	12	4	15	13	16	22	0	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
55~59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60~64	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
65~69	10	3	2	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
70~74	11	3	2	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0
75~79	18	3	7	1	0	1	0	0	0	1	5	0	0
80~84	21	2	2	6	2	1	1	3	0	1	3	0	0
85~89	50	8	16	5	2	4	2	2	1	4	6	0	0
90歳以上	73	11	17	2	6	5	1	9	10	7	5	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	57	11	14	9	4	4	1	2	2	2	8	0	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55~59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60~64	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
65~69	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70~74	5	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
75~79	6	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
80~84	4	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
85~89	13	3	3	2	0	2	0	0	0	0	3	0	0
90歳以上	23	4	5	1	3	2	1	1	1	1	4	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	129	19	32	9	6	8	3	13	11	14	14	0	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
55~59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60~64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65~69	6	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
70~74	6	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
75~79	12	2	4	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0
80~84	17	2	1	5	1	1	1	2	0	1	3	0	0
85~89	37	5	13	3	2	2	2	2	1	4	3	0	0
90歳以上	50	7	12	1	3	3	0	8	9	6	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 4

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因 1  
(複数回答)、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	脳血管疾患	心臓疾患	がん	呼吸器疾患	関節疾患	認知症	糖尿病	パーキン ソン病
総数	259	20	16	6	8	24	42	10	6
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	3	2	0	0	0	0	0	0	0
65～69	13	3	1	1	1	0	0	1	1
70～74	13	1	0	1	0	0	2	0	2
75～79	23	1	0	1	0	2	3	2	1
80～84	29	3	2	2	2	1	6	0	0
85～89	69	4	9	0	2	9	15	2	0
90歳以上	108	5	4	1	3	12	16	5	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	78	11	5	2	4	3	11	5	2
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	3	2	0	0	0	0	0	0	0
65～69	10	2	1	1	1	0	0	1	1
70～74	6	1	0	0	0	0	1	0	0
75～79	7	1	0	0	0	0	2	1	0
80～84	6	0	1	0	1	0	2	0	0
85～89	12	2	2	0	0	1	2	0	0
90歳以上	34	3	1	1	2	2	4	3	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	181	9	11	4	4	21	31	5	4
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	1	0	0	0	0	0	0	0
70～74	7	0	0	1	0	0	1	0	2
75～79	16	0	0	1	0	2	1	1	1
80～84	23	3	1	2	1	1	4	0	0
85～89	57	2	7	0	2	8	13	2	0
90歳以上	74	2	3	0	1	10	12	2	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 5

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった原因 2

(複数回答)、性、年齢(5歳階級)別

(単位:人)

性 年齢階層	総数	視覚・聴覚 障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による 衰弱	その他	わからない	未回答	不詳
総数	259	13	38	3	44	16	0	12	1
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55~59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60~64	3	1	0	0	0	0	0	0	0
65~69	13	1	1	0	1	2	0	0	0
70~74	13	0	2	1	0	3	0	1	0
75~79	23	2	4	1	1	2	0	3	0
80~84	29	1	2	0	4	2	0	4	0
85~89	69	2	9	0	14	2	0	1	0
90歳以上	108	6	20	1	24	5	0	3	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	78	6	7	1	10	6	0	5	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55~59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60~64	3	1	0	0	0	0	0	0	0
65~69	10	1	1	0	1	0	0	0	0
70~74	6	0	0	1	0	2	0	1	0
75~79	7	1	0	0	0	1	0	1	0
80~84	6	0	0	0	0	1	0	1	0
85~89	12	0	2	0	2	0	0	1	0
90歳以上	34	3	4	0	7	2	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	181	7	31	2	34	10	0	7	1
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55~59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60~64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65~69	3	0	0	0	0	2	0	0	0
70~74	7	0	2	0	0	1	0	0	0
75~79	16	1	4	1	1	1	0	2	0
80~84	23	1	2	0	4	1	0	3	0
85~89	57	2	7	0	12	2	0	0	0
90歳以上	74	3	16	1	17	3	0	2	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 6

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因 1、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	脳血管疾患	心臓疾患	がん	呼吸器疾患	関節疾患	認知症	糖尿病	パーキン ソン病
総数	146	14	8	2	2	12	30	4	3
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	2	0	0	0	0	0	0	0
65～69	6	2	1	0	0	0	0	1	0
70～74	11	1	0	1	0	0	2	0	1
75～79	15	1	0	0	0	1	3	0	1
80～84	19	2	2	0	1	2	4	0	0
85～89	37	2	4	0	0	3	13	2	0
90歳以上	55	3	1	1	1	6	8	1	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	45	9	2	1	0	2	8	2	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	2	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	1	1	0	0	0	0	1	0
70～74	5	1	0	0	0	0	1	0	0
75～79	5	1	0	0	0	0	2	0	0
80～84	4	0	1	0	0	0	2	0	0
85～89	9	2	0	0	0	1	2	0	0
90歳以上	17	2	0	1	0	1	1	1	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	101	5	6	1	2	10	22	2	2
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	1	0	0	0	0	0	0	0
70～74	6	0	0	1	0	0	1	0	1
75～79	10	0	0	0	0	1	1	0	1
80～84	15	2	1	0	1	2	2	0	0
85～89	28	0	4	0	0	2	11	2	0
90歳以上	38	1	1	0	1	5	7	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 7

要介護認定を受けている場合で介護が必要になった主な原因 2、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	視覚・聴覚 障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による 衰弱	その他	わからない	未回答	不詳
総数	146	1	21	1	23	11	1	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	6	0	0	0	0	2	0	0	0
70～74	11	0	2	1	0	2	0	1	0
75～79	15	0	2	0	1	1	1	4	0
80～84	19	0	1	0	1	2	0	4	0
85～89	37	0	5	0	6	1	0	1	0
90歳以上	55	1	11	0	15	3	0	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	45	1	5	1	8	3	0	2	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	5	0	0	1	0	1	0	1	0
75～79	5	0	0	0	0	1	0	1	0
80～84	4	0	0	0	0	1	0	0	0
85～89	9	0	2	0	2	0	0	0	0
90歳以上	17	1	3	0	6	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	101	0	16	0	15	8	1	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	3	0	0	0	0	2	0	0	0
70～74	6	0	2	0	0	1	0	0	0
75～79	10	0	2	0	1	0	1	3	0
80～84	15	0	1	0	1	1	0	4	0
85～89	28	0	3	0	4	1	0	1	0
90歳以上	38	0	8	0	9	3	0	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 38

## 介助なしでできること1、性、年齢（5歳階級）別

性 年齢階層	洗顔						口腔清拭（はみがきなど）					
	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳
総数	1,237	1,167	43	19	8	0	1,237	1,168	44	15	10	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
50～54	37	37	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
55～59	140	139	0	0	1	0	140	138	0	0	2	0
60～64	232	231	0	0	1	0	232	231	0	0	1	0
65～69	238	231	3	1	3	0	238	231	3	1	3	0
70～74	200	195	1	3	1	0	200	194	3	2	1	0
75～79	123	116	3	2	2	0	123	117	2	2	2	0
80～84	97	90	6	1	0	0	97	90	5	1	1	0
85～89	89	82	5	2	0	0	89	82	5	2	0	0
90歳以上	74	39	25	10	0	0	74	41	26	7	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	552	16	5	4	0	577	552	15	4	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
50～54	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
55～59	72	72	0	0	0	0	72	71	0	0	1	0
60～64	114	113	0	0	1	0	114	113	0	0	1	0
65～69	120	114	3	0	3	0	120	114	3	0	3	0
70～74	96	95	0	1	0	0	96	95	0	1	0	0
75～79	52	51	1	0	0	0	52	52	0	0	0	0
80～84	40	38	2	0	0	0	40	37	2	0	1	0
85～89	34	31	1	2	0	0	34	31	1	2	0	0
90歳以上	28	17	9	2	0	0	28	18	9	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	615	27	14	4	0	660	616	29	11	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
50～54	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
55～59	68	67	0	0	1	0	68	67	0	0	1	0
60～64	118	118	0	0	0	0	118	118	0	0	0	0
65～69	118	117	0	1	0	0	118	117	0	1	0	0
70～74	104	100	1	2	1	0	104	99	3	1	1	0
75～79	71	65	2	2	2	0	71	65	2	2	2	0
80～84	57	52	4	1	0	0	57	53	3	1	0	0
85～89	55	51	4	0	0	0	55	51	4	0	0	0
90歳以上	46	22	16	8	0	0	46	23	17	6	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 3 9

## 介助なしでできること 2、性、年齢（5歳階級）別

性 年齢階層	身体的清拭(体を拭う)						洗髪					
	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支え があればで きる	介助や支え があつても できない	未回答	不詳
総数	1,237	1,134	61	31	11	0	1,237	1,133	61	34	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
50～54	37	37	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
55～59	140	139	0	0	1	0	140	139	0	0	1	0
60～64	232	230	1	0	1	0	232	230	1	0	1	0
65～69	238	230	4	1	3	0	238	230	4	1	3	0
70～74	200	190	4	5	1	0	200	190	5	4	1	0
75～79	123	115	3	3	2	0	123	115	3	3	2	0
80～84	97	85	9	1	2	0	97	84	9	3	1	0
85～89	89	70	14	5	0	0	89	69	15	5	0	0
90歳以上	74	31	26	16	1	0	74	32	24	18	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	542	22	8	5	0	577	544	21	7	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
50～54	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
55～59	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0
60～64	114	112	1	0	1	0	114	112	1	0	1	0
65～69	120	114	3	0	3	0	120	114	3	0	3	0
70～74	96	93	1	2	0	0	96	93	2	1	0	0
75～79	52	51	1	0	0	0	52	52	0	0	0	0
80～84	40	36	3	0	1	0	40	35	3	1	1	0
85～89	34	29	2	3	0	0	34	29	3	2	0	0
90歳以上	28	14	11	3	0	0	28	16	9	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	592	39	23	6	0	660	589	40	27	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
50～54	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
55～59	68	67	0	0	1	0	68	67	0	0	1	0
60～64	118	118	0	0	0	0	118	118	0	0	0	0
65～69	118	116	1	1	0	0	118	116	1	1	0	0
70～74	104	97	3	3	1	0	104	97	3	3	1	0
75～79	71	64	2	3	2	0	71	63	3	3	2	0
80～84	57	49	6	1	1	0	57	49	6	2	0	0
85～89	55	41	12	2	0	0	55	40	12	3	0	0
90歳以上	46	17	15	13	1	0	46	16	15	15	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 4 0

## 介助なしでできること 3、性、年齢（5 歳階級）別

性 年齢階層	着替え						入浴					
	総数	介助なしに 自分ひとりで できる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳	総数	介助なしに 自分ひとりで できる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳
総数	1,237	1,145	57	26	9	0	1,237	1,127	67	33	10	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
50~54	37	37	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
55~59	140	139	0	0	1	0	140	139	0	0	1	0
60~64	232	229	2	0	1	0	232	229	1	1	1	0
65~69	238	230	4	1	3	0	238	229	4	1	4	0
70~74	200	191	5	3	1	0	200	190	5	4	1	0
75~79	123	113	5	3	2	0	123	115	3	3	2	0
80~84	97	88	6	2	1	0	97	84	9	3	1	0
85~89	89	76	9	4	0	0	89	69	16	4	0	0
90歳以上	74	35	26	13	0	0	74	28	29	17	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	542	25	5	5	0	577	540	23	9	5	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
50~54	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
55~59	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0
60~64	114	111	2	0	1	0	114	111	1	1	1	0
65~69	120	114	3	0	3	0	120	114	3	0	3	0
70~74	96	93	2	1	0	0	96	93	1	2	0	0
75~79	52	50	2	0	0	0	52	51	1	0	0	0
80~84	40	36	3	0	1	0	40	35	3	1	1	0
85~89	34	30	2	2	0	0	34	29	3	2	0	0
90歳以上	28	15	11	2	0	0	28	14	11	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	603	32	21	4	0	660	587	44	24	5	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
50~54	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
55~59	68	67	0	0	1	0	68	67	0	0	1	0
60~64	118	118	0	0	0	0	118	118	0	0	0	0
65~69	118	116	1	1	0	0	118	115	1	1	1	0
70~74	104	98	3	2	1	0	104	97	4	2	1	0
75~79	71	63	3	3	2	0	71	64	2	3	2	0
80~84	57	52	3	2	0	0	57	49	6	2	0	0
85~89	55	46	7	2	0	0	55	40	13	2	0	0
90歳以上	46	20	15	11	0	0	46	14	18	14	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表 4 1

## 介助なしでできること 4、性、年齢（5歳階級）別

性 年齢階層	体位交換・起居(寝返りや体を起こすなど)						排泄(トイレ)					
	総数	介助なしに 自分ひとりで できる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳	総数	介助なしに 自分ひとりで できる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳
総数	1,237	1,177	29	19	12	0	1,237	1,166	41	21	9	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
50~54	37	37	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
55~59	140	139	0	0	1	0	140	139	0	0	1	0
60~64	232	230	1	0	1	0	232	229	2	0	1	0
65~69	238	231	4	0	3	0	238	231	3	1	3	0
70~74	200	193	3	3	1	0	200	194	2	3	1	0
75~79	123	116	3	2	2	0	123	116	2	3	2	0
80~84	97	91	2	1	3	0	97	90	5	1	1	0
85~89	89	82	2	4	1	0	89	82	3	4	0	0
90歳以上	74	51	14	9	0	0	74	41	24	9	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	552	15	4	6	0	577	548	20	4	5	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
50~54	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
55~59	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0
60~64	114	112	1	0	1	0	114	111	2	0	1	0
65~69	120	114	3	0	3	0	120	114	3	0	3	0
70~74	96	94	1	1	0	0	96	94	1	1	0	0
75~79	52	51	1	0	0	0	52	51	1	0	0	0
80~84	40	38	1	0	1	0	40	37	2	0	1	0
85~89	34	30	1	2	1	0	34	31	1	2	0	0
90歳以上	28	20	7	1	0	0	28	17	10	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	625	14	15	6	0	660	618	21	17	4	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
50~54	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
55~59	68	67	0	0	1	0	68	67	0	0	1	0
60~64	118	118	0	0	0	0	118	118	0	0	0	0
65~69	118	117	1	0	0	0	118	117	0	1	0	0
70~74	104	99	2	2	1	0	104	100	1	2	1	0
75~79	71	65	2	2	2	0	71	65	1	3	2	0
80~84	57	53	1	1	2	0	57	53	3	1	0	0
85~89	55	52	1	2	0	0	55	51	2	2	0	0
90歳以上	46	31	7	8	0	0	46	24	14	8	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 4 2

## 介助なしでできること 5、性、年齢（5歳階級）別

性 年齢階層	食事の準備・後始末(調理を含む)						食事					
	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支え があればで きる	介助や支え があつても できない	未回答	不詳
総数	1,237	1,095	55	76	11	0	1,237	1,184	32	12	9	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
50~54	37	37	0	0	0	0	37	36	1	0	0	0
55~59	140	139	0	0	1	0	140	139	0	0	1	0
60~64	232	226	4	1	1	0	232	231	0	0	1	0
65~69	238	225	6	4	3	0	238	231	4	0	3	0
70~74	200	188	6	5	1	0	200	195	2	2	1	0
75~79	123	111	5	5	2	0	123	118	2	1	2	0
80~84	97	79	10	6	2	0	97	94	1	1	1	0
85~89	89	61	10	18	0	0	89	82	3	4	0	0
90歳以上	74	22	14	37	1	0	74	51	19	4	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	520	25	25	7	0	577	557	11	4	5	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
50~54	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
55~59	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0
60~64	114	109	4	0	1	0	114	113	0	0	1	0
65~69	120	112	3	2	3	0	120	114	3	0	3	0
70~74	96	90	3	3	0	0	96	94	1	1	0	0
75~79	52	47	4	1	0	0	52	52	0	0	0	0
80~84	40	31	4	3	2	0	40	39	0	0	1	0
85~89	34	26	2	6	0	0	34	31	1	2	0	0
90歳以上	28	12	5	10	1	0	28	21	6	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	575	30	51	4	0	660	627	21	8	4	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
50~54	18	18	0	0	0	0	18	17	1	0	0	0
55~59	68	67	0	0	1	0	68	67	0	0	1	0
60~64	118	117	0	1	0	0	118	118	0	0	0	0
65~69	118	113	3	2	0	0	118	117	1	0	0	0
70~74	104	98	3	2	1	0	104	101	1	1	1	0
75~79	71	64	1	4	2	0	71	66	2	1	2	0
80~84	57	48	6	3	0	0	57	55	1	1	0	0
85~89	55	35	8	12	0	0	55	51	2	2	0	0
90歳以上	46	10	9	27	0	0	46	30	13	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 4 3

## 介助なしでできること 6、性、年齢（5歳階級）別

性 年齢階層	服薬(薬を含む)						散歩					
	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支 えがあれば できる	介助や支 えがあつ てもでき ない	未回答	不詳
総数	1,237	1,138	76	13	10	0	1,237	1,089	77	58	13	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
50~54	37	37	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
55~59	140	139	0	0	1	0	140	139	0	0	1	0
60~64	232	228	2	0	2	0	232	226	3	2	1	0
65~69	238	231	4	0	3	0	238	223	6	5	4	0
70~74	200	193	4	2	1	0	200	188	4	7	1	0
75~79	123	114	6	1	2	0	123	110	7	4	2	0
80~84	97	87	8	1	1	0	97	79	13	3	2	0
85~89	89	70	16	3	0	0	89	60	21	7	1	0
90歳以上	74	32	36	6	0	0	74	20	23	30	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	539	29	4	5	0	577	529	25	17	6	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
50~54	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
55~59	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0
60~64	114	111	2	0	1	0	114	110	1	2	1	0
65~69	120	114	3	0	3	0	120	113	2	2	3	0
70~74	96	93	2	1	0	0	96	92	2	2	0	0
75~79	52	49	3	0	0	0	52	48	3	1	0	0
80~84	40	36	3	0	1	0	40	35	3	1	1	0
85~89	34	29	3	2	0	0	34	27	4	2	1	0
90歳以上	28	14	13	1	0	0	28	11	10	7	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	599	47	9	5	0	660	560	52	41	7	0
40~44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
50~54	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
55~59	68	67	0	0	1	0	68	67	0	0	1	0
60~64	118	117	0	0	1	0	118	116	2	0	0	0
65~69	118	117	1	0	0	0	118	110	4	3	1	0
70~74	104	100	2	1	1	0	104	96	2	5	1	0
75~79	71	65	3	1	2	0	71	62	4	3	2	0
80~84	57	51	5	1	0	0	57	44	10	2	1	0
85~89	55	41	13	1	0	0	55	33	17	5	0	0
90歳以上	46	18	23	5	0	0	46	9	13	23	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 4 4

## 介助なしでできること 7、性、年齢（5歳階級）別

性 年齢階層	掃除						洗濯					
	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳
総数	1,237	1,086	52	83	16	0	1,237	1,092	48	85	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
50～54	37	36	1	0	0	0	37	36	1	0	0	0
55～59	140	139	0	0	1	0	140	139	0	0	1	0
60～64	232	227	2	2	1	0	232	227	3	1	1	0
65～69	238	227	4	4	3	0	238	227	3	4	4	0
70～74	200	187	5	7	1	0	200	189	4	6	1	0
75～79	123	106	7	5	5	0	123	109	6	6	2	0
80～84	97	77	10	7	3	0	97	76	10	9	2	0
85～89	89	57	14	16	2	0	89	60	13	15	1	0
90歳以上	74	23	9	42	0	0	74	22	8	44	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	525	13	30	9	0	577	523	15	32	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
50～54	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
55～59	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0
60～64	114	110	2	1	1	0	114	110	2	1	1	0
65～69	120	114	0	3	3	0	120	113	0	3	4	0
70～74	96	92	1	3	0	0	96	93	0	3	0	0
75～79	52	44	4	2	2	0	52	46	3	3	0	0
80～84	40	35	1	3	1	0	40	32	3	4	1	0
85～89	34	25	1	6	2	0	34	24	4	5	1	0
90歳以上	28	12	4	12	0	0	28	12	3	13	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	561	39	53	7	0	660	569	33	53	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
50～54	18	17	1	0	0	0	18	17	1	0	0	0
55～59	68	67	0	0	1	0	68	67	0	0	1	0
60～64	118	117	0	1	0	0	118	117	1	0	0	0
65～69	118	113	4	1	0	0	118	114	3	1	0	0
70～74	104	95	4	4	1	0	104	96	4	3	1	0
75～79	71	62	3	3	3	0	71	63	3	3	2	0
80～84	57	42	9	4	2	0	57	44	7	5	1	0
85～89	55	32	13	10	0	0	55	36	9	10	0	0
90歳以上	46	11	5	30	0	0	46	10	5	31	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 4 5

## 介助なしでできること 8、性、年齢（5歳階級）別

性 年齢階層	買い物						日常会話					
	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっても できない	未回答	不詳	総数	介助なしに 自分ひとり でできる	介助や支え があればで きる	介助や支え があっ てもで き ない	未回答	不詳
総数	1,237	1,058	85	80	14	0	1,237	1,172	44	11	10	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
50～54	37	37	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0
55～59	140	139	0	0	1	0	140	139	0	0	1	0
60～64	232	225	3	2	2	0	232	230	1	0	1	0
65～69	238	224	10	1	3	0	238	231	3	1	3	0
70～74	200	187	6	6	1	0	200	194	3	2	1	0
75～79	123	108	7	4	4	0	123	114	7	0	2	0
80～84	97	66	21	8	2	0	97	90	5	1	1	0
85～89	89	51	22	15	1	0	89	80	6	3	0	0
90歳以上	74	14	16	44	0	0	74	50	19	4	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	519	27	24	7	0	577	553	14	5	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
50～54	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0
55～59	72	72	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0
60～64	114	109	3	1	1	0	114	112	1	0	1	0
65～69	120	113	4	0	3	0	120	115	1	1	3	0
70～74	96	91	3	2	0	0	96	94	1	1	0	0
75～79	52	46	4	1	1	0	52	51	1	0	0	0
80～84	40	32	4	3	1	0	40	37	2	0	1	0
85～89	34	25	3	5	1	0	34	31	1	2	0	0
90歳以上	28	10	6	12	0	0	28	20	7	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	539	58	56	7	0	660	619	30	6	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
50～54	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0
55～59	68	67	0	0	1	0	68	67	0	0	1	0
60～64	118	116	0	1	1	0	118	118	0	0	0	0
65～69	118	111	6	1	0	0	118	116	2	0	0	0
70～74	104	96	3	4	1	0	104	100	2	1	1	0
75～79	71	62	3	3	3	0	71	63	6	0	2	0
80～84	57	34	17	5	1	0	57	53	3	1	0	0
85～89	55	26	19	10	0	0	55	49	5	1	0	0
90歳以上	46	4	10	32	0	0	46	30	12	3	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表 4 6

## 受診頻度、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	入院中	施設入所中 で医療的ケアを受けて いる	毎週1回以上	毎月1～3回 程度	数か月に1 回程度	受診して いない	未回答	不詳
総数	1,237	20	25	68	562	374	172	16	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	0	0	0	2	3	2	0	0
50～54	37	0	0	2	12	13	10	0	0
55～59	140	1	0	3	44	44	42	6	0
60～64	232	1	0	14	85	80	51	1	0
65～69	238	0	2	6	102	84	42	2	0
70～74	200	1	3	13	107	64	11	1	0
75～79	123	3	0	11	65	37	6	1	0
80～84	97	2	3	13	49	21	6	3	0
85～89	89	5	5	2	54	21	1	1	0
90歳以上	74	7	12	4	42	7	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	577	8	6	29	248	175	102	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	0	0	0	2	0	0	0
50～54	19	0	0	0	7	5	7	0	0
55～59	72	0	0	2	20	20	26	4	0
60～64	114	1	0	7	36	41	28	1	0
65～69	120	0	0	4	45	39	30	2	0
70～74	96	0	2	5	53	31	5	0	0
75～79	52	1	0	2	29	18	2	0	0
80～84	40	1	1	5	19	10	3	1	0
85～89	34	2	1	2	19	8	1	1	0
90歳以上	28	3	2	2	20	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	660	12	19	39	314	199	70	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	0	0	0	2	1	2	0	0
50～54	18	0	0	2	5	8	3	0	0
55～59	68	1	0	1	24	24	16	2	0
60～64	118	0	0	7	49	39	23	0	0
65～69	118	0	2	2	57	45	12	0	0
70～74	104	1	1	8	54	33	6	1	0
75～79	71	2	0	9	36	19	4	1	0
80～84	57	1	2	8	30	11	3	2	0
85～89	55	3	4	0	35	13	0	0	0
90歳以上	46	4	10	2	22	6	1	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 4 7

医師から処方されている薬、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,237	905	270	62	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	4	3	0	0
50～54	37	20	17	0	0
55～59	140	73	56	11	0
60～64	232	150	75	7	0
65～69	238	166	67	5	0
70～74	200	161	26	13	0
75～79	123	107	12	4	0
80～84	97	80	10	7	0
85～89	89	78	3	8	0
90歳以上	74	66	1	7	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	409	142	26	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	1	1	0	0
50～54	19	9	10	0	0
55～59	72	33	32	7	0
60～64	114	73	38	3	0
65～69	120	80	37	3	0
70～74	96	78	12	6	0
75～79	52	46	5	1	0
80～84	40	35	4	1	0
85～89	34	29	3	2	0
90歳以上	28	25	0	3	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	496	128	36	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	3	2	0	0
50～54	18	11	7	0	0
55～59	68	40	24	4	0
60～64	118	77	37	4	0
65～69	118	86	30	2	0
70～74	104	83	14	7	0
75～79	71	61	7	3	0
80～84	57	45	6	6	0
85～89	55	49	0	6	0
90歳以上	46	41	1	4	0
不詳	0	0	0	0	0

## 別表 4 8

## 受療券を持っているか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,237	814	408	15	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	3	4	0	0
50～54	37	23	14	0	0
55～59	140	79	57	4	0
60～64	232	152	79	1	0
65～69	238	153	83	2	0
70～74	200	135	65	0	0
75～79	123	86	34	3	0
80～84	97	65	30	2	0
85～89	89	62	24	3	0
90歳以上	74	56	18	0	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	366	200	11	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	1	1	0	0
50～54	19	13	6	0	0
55～59	72	33	35	4	0
60～64	114	74	40	0	0
65～69	120	79	40	1	0
70～74	96	61	35	0	0
75～79	52	36	14	2	0
80～84	40	25	13	2	0
85～89	34	24	8	2	0
90歳以上	28	20	8	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	448	208	4	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	2	3	0	0
50～54	18	10	8	0	0
55～59	68	46	22	0	0
60～64	118	78	39	1	0
65～69	118	74	43	1	0
70～74	104	74	30	0	0
75～79	71	50	20	1	0
80～84	57	40	17	0	0
85～89	55	38	16	1	0
90歳以上	46	36	10	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 4 9

この1年間で、受療券を利用せずに受診したことがあるか、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	814	485	320	9	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	3	1	2	0	0
50～54	23	12	11	0	0
55～59	79	50	29	0	0
60～64	152	107	45	0	0
65～69	153	99	53	1	0
70～74	135	81	52	2	0
75～79	86	43	40	3	0
80～84	65	32	32	1	0
85～89	62	31	31	0	0
90歳以上	56	29	25	2	0
不詳	0	0	0	0	0
男	366	214	151	1	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	1	1	0	0	0
50～54	13	7	6	0	0
55～59	33	20	13	0	0
60～64	74	48	26	0	0
65～69	79	48	31	0	0
70～74	61	38	22	1	0
75～79	36	14	22	0	0
80～84	25	12	13	0	0
85～89	24	14	10	0	0
90歳以上	20	12	8	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	448	271	169	8	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	0	2	0	0
50～54	10	5	5	0	0
55～59	46	30	16	0	0
60～64	78	59	19	0	0
65～69	74	51	22	1	0
70～74	74	43	30	1	0
75～79	50	29	18	3	0
80～84	40	20	19	1	0
85～89	38	17	21	0	0
90歳以上	36	17	17	2	0
不詳	0	0	0	0	0

別表50

受療券を利用せずに受診した理由（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	受療券を 使用できない 医療機関の ため	その他	未回答	不詳
総数	492	312	157	23	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	1	1	0	0	0
50～54	12	7	5	0	0
55～59	50	32	17	1	0
60～64	111	71	39	1	0
65～69	101	72	23	6	0
70～74	82	51	28	3	0
75～79	43	27	14	2	0
80～84	32	19	9	4	0
85～89	31	18	8	5	0
90歳以上	29	14	14	1	0
不詳	0	0	0	0	0
男	217	143	63	11	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	1	1	0	0	0
50～54	7	3	4	0	0
55～59	20	15	5	0	0
60～64	50	31	18	1	0
65～69	48	36	10	2	0
70～74	39	25	13	1	0
75～79	14	10	4	0	0
80～84	12	9	1	2	0
85～89	14	5	4	5	0
90歳以上	12	8	4	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	275	169	94	12	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	5	4	1	0	0
55～59	30	17	12	1	0
60～64	61	40	21	0	0
65～69	53	36	13	4	0
70～74	43	26	15	2	0
75～79	29	17	10	2	0
80～84	20	10	8	2	0
85～89	17	13	4	0	0
90歳以上	17	6	10	1	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 5 1

受療券を持たない理由（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	利用する予 定がないか ら	手続きがめん どうだから	他の人に油 症患者であ ると知られ てしまうと 思うから	受療券が利 用できる医 療機関が限 られるから	その他	未回答	不詳
総数	548	127	51	151	155	40	24	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	5	2	0	2	1	0	0	0
50～54	17	4	1	7	3	0	2	0
55～59	77	24	9	18	19	4	3	0
60～64	104	24	9	35	26	8	2	0
65～69	122	25	8	40	38	10	1	0
70～74	92	16	15	23	27	7	4	0
75～79	44	8	3	7	19	2	5	0
80～84	41	12	4	8	11	2	4	0
85～89	28	5	0	9	7	5	2	0
90歳以上	18	7	2	2	4	2	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	271	71	36	57	71	25	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	1	0	0	0	0	0	0
50～54	7	3	1	3	0	0	0	0
55～59	47	14	8	9	11	4	1	0
60～64	54	15	5	14	12	6	2	0
65～69	60	15	7	14	18	6	0	0
70～74	49	7	9	10	16	4	3	0
75～79	16	5	1	1	6	1	2	0
80～84	21	8	4	2	6	0	1	0
85～89	8	1	0	4	0	2	1	0
90歳以上	8	2	1	0	2	2	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	277	56	15	94	84	15	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	4	1	0	2	1	0	0	0
50～54	10	1	0	4	3	0	2	0
55～59	30	10	1	9	8	0	2	0
60～64	50	9	4	21	14	2	0	0
65～69	62	10	1	26	20	4	1	0
70～74	43	9	6	13	11	3	1	0
75～79	28	3	2	6	13	1	3	0
80～84	20	4	0	6	5	2	3	0
85～89	20	4	0	5	7	3	1	0
90歳以上	10	5	1	2	2	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 5 2

受療券の利用を希望する医療機関があるか、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,237	57	1,111	69	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	0	6	1	0
50～54	37	0	35	2	0
55～59	140	2	133	5	0
60～64	232	14	210	8	0
65～69	238	12	219	7	0
70～74	200	9	180	11	0
75～79	123	7	108	8	0
80～84	97	5	79	13	0
85～89	89	5	78	6	0
90歳以上	74	3	63	8	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	20	528	29	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	0	2	0	0
50～54	19	0	19	0	0
55～59	72	1	68	3	0
60～64	114	5	105	4	0
65～69	120	3	115	2	0
70～74	96	5	86	5	0
75～79	52	2	46	4	0
80～84	40	2	34	4	0
85～89	34	1	28	5	0
90歳以上	28	1	25	2	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	37	583	40	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	0	4	1	0
50～54	18	0	16	2	0
55～59	68	1	65	2	0
60～64	118	9	105	4	0
65～69	118	9	104	5	0
70～74	104	4	94	6	0
75～79	71	5	62	4	0
80～84	57	3	45	9	0
85～89	55	4	50	1	0
90歳以上	46	2	38	6	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 5 3

受療券の利用を希望する医療機関の受診頻度（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	入院中	毎週1回以上	毎月1～3回程度	数か月に1回程度	受診していない	未回答	不詳
総数	79	1	4	28	36	5	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	2	0	0	0	2	0	0	0
60～64	19	0	2	5	8	3	1	0
65～69	19	0	1	7	7	1	3	0
70～74	15	0	1	8	6	0	0	0
75～79	9	0	0	1	7	0	1	0
80～84	3	0	0	2	1	0	0	0
85～89	8	0	0	5	3	0	0	0
90歳以上	4	1	0	0	2	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	25	0	3	8	13	0	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	0	0
60～64	6	0	1	1	4	0	0	0
65～69	4	0	1	1	1	0	1	0
70～74	7	0	1	4	2	0	0	0
75～79	3	0	0	1	2	0	0	0
80～84	2	0	0	1	1	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	2	0	0	0	2	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	54	1	1	20	23	5	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	0	0
60～64	13	0	1	4	4	3	1	0
65～69	15	0	0	6	6	1	2	0
70～74	8	0	0	4	4	0	0	0
75～79	6	0	0	0	5	0	1	0
80～84	1	0	0	1	0	0	0	0
85～89	8	0	0	5	3	0	0	0
90歳以上	2	1	0	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表 5 4

## 油症検診を受診したか、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,237	385	839	13	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	2	5	0	0
50～54	37	6	31	0	0
55～59	140	33	105	2	0
60～64	232	53	177	2	0
65～69	238	75	162	1	0
70～74	200	77	122	1	0
75～79	123	55	65	3	0
80～84	97	39	56	2	0
85～89	89	33	54	2	0
90歳以上	74	12	62	0	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	199	373	5	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	1	1	0	0
50～54	19	4	15	0	0
55～59	72	16	54	2	0
60～64	114	27	86	1	0
65～69	120	38	81	1	0
70～74	96	39	57	0	0
75～79	52	28	23	1	0
80～84	40	22	18	0	0
85～89	34	17	17	0	0
90歳以上	28	7	21	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	186	466	8	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	1	4	0	0
50～54	18	2	16	0	0
55～59	68	17	51	0	0
60～64	118	26	91	1	0
65～69	118	37	81	0	0
70～74	104	38	65	1	0
75～79	71	27	42	2	0
80～84	57	17	38	2	0
85～89	55	16	37	2	0
90歳以上	46	5	41	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 5 5

油症検診を受けなかった理由（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	知らなかつたから（案内が届かなかった）	仕事などで都合がつか なかったから	体調が悪 かったから	検診の場所 が遠かった から	職場や自治 体の検診を 受けている ため、必要 性を感じな いから	健康に自信 があり、必 要性を感じ ないから
総数	1,138	20	280	115	175	201	19
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	7	0	4	0	1	0	0
50～54	42	0	19	1	5	13	0
55～59	143	4	62	7	17	28	5
60～64	247	5	79	8	38	57	5
65～69	230	2	71	16	30	49	6
70～74	161	4	31	24	28	28	2
75～79	88	2	10	14	18	13	0
80～84	75	2	3	19	13	5	0
85～89	70	0	1	13	16	6	1
90歳以上	75	1	0	13	9	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	511	11	168	38	62	96	15
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	1	0	0	0	0
50～54	24	0	11	0	4	7	0
55～59	70	3	32	2	8	11	4
60～64	120	2	48	1	12	28	5
65～69	122	1	48	2	11	30	6
70～74	75	4	17	12	10	11	0
75～79	26	0	8	2	3	2	0
80～84	24	1	3	7	3	2	0
85～89	23	0	0	6	7	3	0
90歳以上	26	0	0	6	4	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	627	9	112	77	113	105	4
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	6	0	3	0	1	0	0
50～54	18	0	8	1	1	6	0
55～59	73	1	30	5	9	17	1
60～64	127	3	31	7	26	29	0
65～69	108	1	23	14	19	19	0
70～74	86	0	14	12	18	17	2
75～79	62	2	2	12	15	11	0
80～84	51	1	0	12	10	3	0
85～89	47	0	1	7	9	3	1
90歳以上	49	1	0	7	5	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表5 6

油症検診を受けなかった理由（複数回答） 2、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	その時、医療機関に入院していたから（介護施設への入所も含む）	めんどうだから	その他	未回答	不詳
総数	1,138	71	69	158	30	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	7	0	1	1	0	0
50～54	42	0	2	2	0	0
55～59	143	0	8	7	5	0
60～64	247	4	19	27	5	0
65～69	230	7	14	30	5	0
70～74	161	11	10	20	3	0
75～79	88	5	5	19	2	0
80～84	75	7	4	18	4	0
85～89	70	10	2	19	2	0
90歳以上	75	27	4	15	4	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	511	24	33	47	17	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	0	0
50～54	24	0	2	0	0	0
55～59	70	0	5	1	4	0
60～64	120	3	8	8	5	0
65～69	122	2	10	10	2	0
70～74	75	7	4	8	2	0
75～79	26	2	1	8	0	0
80～84	24	0	2	4	2	0
85～89	23	3	0	4	0	0
90歳以上	26	7	1	4	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	627	47	36	111	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	6	0	1	1	0	0
50～54	18	0	0	2	0	0
55～59	73	0	3	6	1	0
60～64	127	1	11	19	0	0
65～69	108	5	4	20	3	0
70～74	86	4	6	12	1	0
75～79	62	3	4	11	2	0
80～84	51	7	2	14	2	0
85～89	47	7	2	15	2	0
90歳以上	49	20	3	11	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 5 7

油症検診を受けなかった主な理由 1、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	知らなかつたから(案内が届かなかった)	仕事などで都合がつかなかったから	体調が悪かったから	検診の場所が遠かったから	職場や自治体の検診を受けているため、必要性を感じないから	健康に自信があり、必要性を感じないから
総数	839	11	210	75	93	132	9
40～44	1	0	0	0	0	0	0
45～49	5	0	2	0	0	0	0
50～54	31	0	11	0	2	10	0
55～59	105	3	54	7	10	15	0
60～64	177	2	54	5	19	41	4
65～69	162	2	50	10	17	31	3
70～74	122	2	27	15	14	20	1
75～79	65	1	9	8	10	10	0
80～84	55	0	2	11	10	2	0
85～89	54	0	1	10	4	3	1
90歳以上	62	1	0	9	7	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	373	7	124	27	32	64	7
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	0	0	0
50～54	15	0	5	0	2	4	0
55～59	54	3	28	2	5	7	0
60～64	86	0	34	1	6	18	4
65～69	81	2	33	1	3	21	3
70～74	57	2	14	8	5	9	0
75～79	23	0	8	2	1	2	0
80～84	18	0	2	5	3	1	0
85～89	17	0	0	4	3	2	0
90歳以上	21	0	0	4	4	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	466	4	86	48	61	68	2
40～44	1	0	0	0	0	0	0
45～49	4	0	2	0	0	0	0
50～54	16	0	6	0	0	6	0
55～59	51	0	26	5	5	8	0
60～64	91	2	20	4	13	23	0
65～69	81	0	17	9	14	10	0
70～74	65	0	13	7	9	11	1
75～79	42	1	1	6	9	8	0
80～84	37	0	0	6	7	1	0
85～89	37	0	1	6	1	1	1
90歳以上	41	1	0	5	3	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

## 別表 5 8

油症検診を受けなかった主な理由 2、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	その時、医療機関に入 通院していたから(介 護施設への 入所も含 む)	めんどうだ から	その他	未回答	不詳
総数	839	56	31	126	96	0
40～44	1	0	0	1	0	0
45～49	5	0	1	1	1	0
50～54	31	0	0	2	6	0
55～59	105	0	3	7	6	0
60～64	177	3	10	21	18	0
65～69	162	4	6	27	12	0
70～74	122	6	6	14	17	0
75～79	65	5	1	15	6	0
80～84	55	4	1	11	14	0
85～89	54	11	1	13	10	0
90歳以上	62	23	2	14	6	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	373	18	13	32	49	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	1	0	0	0	1	0
50～54	15	0	0	0	4	0
55～59	54	0	2	1	6	0
60～64	86	2	4	4	13	0
65～69	81	1	4	8	5	0
70～74	57	4	2	4	9	0
75～79	23	2	0	7	1	0
80～84	18	0	0	3	4	0
85～89	17	3	0	2	3	0
90歳以上	21	6	1	3	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	466	38	18	94	47	0
40～44	1	0	0	1	0	0
45～49	4	0	1	1	0	0
50～54	16	0	0	2	2	0
55～59	51	0	1	6	0	0
60～64	91	1	6	17	5	0
65～69	81	3	2	19	7	0
70～74	65	2	4	10	8	0
75～79	42	3	1	8	5	0
80～84	37	4	1	8	10	0
85～89	37	8	1	11	7	0
90歳以上	41	17	1	11	3	0
不詳	0	0	0	0	0	0

## 別表 5 9

油症相談員、相談窓口への相談経験、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1,237	106	1,116	15	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	0	7	0	0
50～54	37	2	35	0	0
55～59	140	8	130	2	0
60～64	232	13	217	2	0
65～69	238	21	216	1	0
70～74	200	23	176	1	0
75～79	123	16	106	1	0
80～84	97	13	82	2	0
85～89	89	5	81	3	0
90歳以上	74	5	66	3	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	52	515	10	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	0	2	0	0
50～54	19	2	17	0	0
55～59	72	3	67	2	0
60～64	114	5	107	2	0
65～69	120	9	110	1	0
70～74	96	13	83	0	0
75～79	52	10	42	0	0
80～84	40	5	34	1	0
85～89	34	3	29	2	0
90歳以上	28	2	24	2	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	54	601	5	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	0	5	0	0
50～54	18	0	18	0	0
55～59	68	5	63	0	0
60～64	118	8	110	0	0
65～69	118	12	106	0	0
70～74	104	10	93	1	0
75～79	71	6	64	1	0
80～84	57	8	48	1	0
85～89	55	2	52	1	0
90歳以上	46	3	42	1	0
不詳	0	0	0	0	0

## 別表 6 0

油症相談員、相談窓口へ今後考えられる相談内容（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	自分の病気 や介護	家族の病気 や介護	収入・家 計・借金等	家族又は家 族以外との 人間関係	特になし	その他	未回答	不詳
総数	1,293	324	153	64	23	646	19	64	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	8	1	2	0	0	3	0	2	0
50～54	38	11	6	1	0	16	0	4	0
55～59	151	38	25	8	3	71	0	6	0
60～64	250	58	28	15	4	130	3	12	0
65～69	253	62	24	15	7	137	2	6	0
70～74	202	51	19	12	2	100	5	13	0
75～79	130	30	18	7	3	62	2	8	0
80～84	93	23	12	3	1	40	3	11	0
85～89	97	34	11	3	2	46	1	0	0
90歳以上	71	16	8	0	1	41	3	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	614	166	77	40	10	284	8	29	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	2	0	1	0	0	0	0	1	0
50～54	20	7	3	1	0	9	0	0	0
55～59	82	25	14	5	0	35	0	3	0
60～64	120	28	10	9	2	63	2	6	0
65～69	130	32	14	9	3	66	1	5	0
70～74	101	30	9	9	1	42	3	7	0
75～79	52	11	8	3	1	26	1	2	0
80～84	40	9	6	2	1	19	0	3	0
85～89	39	15	7	2	1	14	0	0	0
90歳以上	28	9	5	0	1	10	1	2	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	679	158	76	24	13	362	11	35	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	6	1	1	0	0	3	0	1	0
50～54	18	4	3	0	0	7	0	4	0
55～59	69	13	11	3	3	36	0	3	0
60～64	130	30	18	6	2	67	1	6	0
65～69	123	30	10	6	4	71	1	1	0
70～74	101	21	10	3	1	58	2	6	0
75～79	78	19	10	4	2	36	1	6	0
80～84	53	14	6	1	0	21	3	8	0
85～89	58	19	4	1	1	32	1	0	0
90歳以上	43	7	3	0	0	31	2	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 1

本調査に回答するのは、今回初めてか、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	はい	いいえ	未回答	不詳
総数	1,237	14	1,187	36	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	0	7	0	0
50～54	37	0	37	0	0
55～59	140	1	137	2	0
60～64	232	1	226	5	0
65～69	238	4	231	3	0
70～74	200	3	193	4	0
75～79	123	2	116	5	0
80～84	97	0	90	7	0
85～89	89	2	83	4	0
90歳以上	74	1	67	6	0
不詳	0	0	0	0	0
男	577	5	558	14	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	0	2	0	0
50～54	19	0	19	0	0
55～59	72	1	69	2	0
60～64	114	0	112	2	0
65～69	120	2	115	3	0
70～74	96	2	91	3	0
75～79	52	0	51	1	0
80～84	40	0	39	1	0
85～89	34	0	32	2	0
90歳以上	28	0	28	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	660	9	629	22	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	0	5	0	0
50～54	18	0	18	0	0
55～59	68	0	68	0	0
60～64	118	1	114	3	0
65～69	118	2	116	0	0
70～74	104	1	102	1	0
75～79	71	2	65	4	0
80～84	57	0	51	6	0
85～89	55	2	51	2	0
90歳以上	46	1	39	6	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 6 2

この一年間に新たに罹った病気、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	1,187	224	809	154	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	7	0	5	2	0
50～54	37	6	27	4	0
55～59	137	24	100	13	0
60～64	226	34	174	18	0
65～69	231	39	170	22	0
70～74	193	41	123	29	0
75～79	116	28	64	24	0
80～84	90	25	48	17	0
85～89	83	15	56	12	0
90歳以上	67	12	42	13	0
不詳	0	0	0	0	0
男	558	105	385	68	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	2	0	1	1	0
50～54	19	2	15	2	0
55～59	69	9	54	6	0
60～64	112	16	88	8	0
65～69	115	21	82	12	0
70～74	91	17	63	11	0
75～79	51	16	25	10	0
80～84	39	13	19	7	0
85～89	32	5	21	6	0
90歳以上	28	6	17	5	0
不詳	0	0	0	0	0
女	629	119	424	86	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	5	0	4	1	0
50～54	18	4	12	2	0
55～59	68	15	46	7	0
60～64	114	18	86	10	0
65～69	116	18	88	10	0
70～74	102	24	60	18	0
75～79	65	12	39	14	0
80～84	51	12	29	10	0
85～89	51	10	35	6	0
90歳以上	39	6	25	8	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 6 3

新たに罹った病気の現在の治療状況（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	医療機関で 治療中	医療機関で 治療をへて 治癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	279	169	86	24	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	7	5	0	2	0	0
55～59	27	14	11	2	0	0
60～64	47	32	10	5	0	0
65～69	51	33	15	3	0	0
70～74	51	26	20	5	0	0
75～79	38	25	10	3	0	0
80～84	24	14	6	4	0	0
85～89	15	8	7	0	0	0
90歳以上	19	12	7	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	127	82	36	9	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	3	2	0	1	0	0
55～59	10	7	2	1	0	0
60～64	21	14	5	2	0	0
65～69	25	17	7	1	0	0
70～74	19	11	8	0	0	0
75～79	22	14	6	2	0	0
80～84	15	10	3	2	0	0
85～89	2	1	1	0	0	0
90歳以上	10	6	4	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	152	87	50	15	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	4	3	0	1	0	0
55～59	17	7	9	1	0	0
60～64	26	18	5	3	0	0
65～69	26	16	8	2	0	0
70～74	32	15	12	5	0	0
75～79	16	11	4	1	0	0
80～84	9	4	3	2	0	0
85～89	13	7	6	0	0	0
90歳以上	9	6	3	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0

## 別表 6 4

悪性腫瘍（がん）に罹ったことがあるか、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	ある	ない	未回答	不詳
総数	14	1	12	1	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	1	0	1	0	0
65～69	1	0	1	0	0
70～74	4	0	3	1	0
75～79	3	0	3	0	0
80～84	2	1	1	0	0
85～89	2	0	2	0	0
90歳以上	1	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0
男	5	0	5	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	1	0	1	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	2	0	2	0	0
75～79	2	0	2	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	9	1	7	1	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	1	0	1	0	0
70～74	2	0	1	1	0
75～79	1	0	1	0	0
80～84	2	1	1	0	0
85～89	2	0	2	0	0
90歳以上	1	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 6 5

悪性腫瘍（がん） 現在の治療状況（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	入院治療 中・外来 (通院)治療 中	がんに対す る治療は終 了し、定期 的な健診の ため通院中	治療が完了 し、通院も していない	その他	未回答	不詳
総数	2	0	0	2	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	2	0	0	2	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	0	2	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	2	0	0	2	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 6

悪性腫瘍（がん） 現在までに医療機関で受けたすべての  
治療（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	外科手術 (胸腔鏡・ 胸腔鏡手術 を含む)	内視鏡治療	薬物療法 (抗がん 剤・ホルモ ン剤など)	放射線治療	その他	未回答	不詳
総数	3	2	0	1	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	3	2	0	1	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	3	2	0	1	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	3	2	0	1	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 7

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	脳卒中・脳出血・くも膜下出血						脳梗塞					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	1	0	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	1	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 8

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 2、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	頭痛						頭重（頭が重い）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	1	0	1	12	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	0	1	7	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 6 9

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 3、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	神経痛						知的障害					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	2	12	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	2	7	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 0

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 4、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	躁うつ病						統合失調症					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 1

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 5、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	幻覚						認知症					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	2	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	2	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 2

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 6、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	もの忘れ						かっとなりやすい・短気					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	3	11	0	14	0	0	2	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	2	1	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	2	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	3	6	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 3

脳・精神・神経の病気・症状（複数回答） 7、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	14	1	0	0	13	0	4	4	3	3
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
65～69	4	0	0	0	4	0	2	2	2	2
70～74	3	0	0	0	3	0	1	1	0	0
75～79	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	2	2	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
70～74	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	0	0	8	0	2	2	2	2
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
70～74	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
75～79	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 4

自律神経系の病気・症状（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	起立性低血圧						過敏性腸症候群					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	2	12	0	14	0	0	2	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	1	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	2	7	0	9	0	0	2	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 5

自律神経系の病気・症状（複数回答） 2、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	多汗症						汗が出にくい					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 6

自律神経系の病気・症状（複数回答） 3、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	不眠						不安神経症					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	1	1	3	9	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	1	3	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	1	1	1	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	1	1	3	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	0	2	6	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 7

自律神経系の病気・症状（複数回答） 4、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	自律神経失調症						その他					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 7 8

自律神経系の病気・症状（複数回答） 5、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にはない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	7	7	2	2
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	1	1	2	2
70～74	1	1	0	0
75～79	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
男	2	2	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
女	5	5	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	0	0	1	1
70～74	1	1	0	0
75～79	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0

別表 7 9

## 眼の病気・症状（複数回答） 1、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	眼脂過多（めやにが多い）						瞼板腺（まつげの根元）からチーズ様分泌物					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 0

眼の病気・症状（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	結膜（白目）の色素沈着						白内障					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	2	0	2	10	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	1	0	0	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	1	2	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	1	0	1	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	1	0	1	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 1

## 眼の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	緑内障						近視					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	1	0	0	13	0	14	0	0	2	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	1	0	0	3	0	4	0	0	1	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	1	2	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	1	0	0	4	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	2	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 2

眼の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	遠視						乱視					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	3	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	1	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	1	2	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	1	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	2	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 3

眼の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	弱視						その他					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	3	11	0	14	0	2	0	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	2	1	0	3	0	1	0	2	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	2	3	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	2	0	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 4

眼の病気・症状（複数回答） 6、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	4	4	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	0	0	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
男	1	1	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	0	0	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
女	3	3	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0

別表 8 5

口の中の病気・症状（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	歯肉の色素沈着（歯茎が黒い）						歯牙形成不全（子どもの時に歯が生えなかった）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療を へて治療	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 6

口の中の病気・症状（複数回答） 2、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	歯周病（歯槽膿漏）						歯肉炎（歯ぐきの病気）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	1	2	1	10	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	1	1	0	2	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	1	1	1	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	2	1	2	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	0	0	8	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 7

口の中の病気・症状（複数回答） 3、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	顎関節症（あごの関節の異常）					味覚異常						
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 8

口の中の病気・症状（複数回答） 4、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	口内炎になりやすい						虫歯になりやすい					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	3	1	10	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	1	0	3	0
70～74	3	0	0	1	2	0	3	0	1	1	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	1	4	0	5	0	2	1	2	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
70～74	2	0	0	1	1	0	2	0	1	1	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	1	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 8 9

口の中の病気・症状（複数回答） 5、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	歯の知覚過敏（歯がしみる）						永久歯（全歯）を早期に失った					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	2	0	12	0	14	0	1	1	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	1	0	3	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	1	0	2	0	3	0	0	1	2	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	2	0	3	0	5	0	0	1	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	1	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 90

口の中の病気・症状（複数回答） 6、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	14	2	0	1	11	0	5	5	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	4	0	0	0	4	0	1	1	1	1
70～74	3	0	0	0	3	0	1	1	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	1	1	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1
70～74	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	2	0	1	6	0	4	4	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 1

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	メニエル病						めまい					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	0	2	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	0	2	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 2

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 2、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	中耳炎						真珠腫性中耳炎					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	1	0	13	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	1	0	2	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	1	0	8	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 3

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 3、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	鼻炎を起こしやすい						難聴					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	1	0	3	10	0	14	0	0	4	10	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	1	3	0	4	0	0	1	3	0
70～74	3	1	0	1	1	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	1	4	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	0	2	6	0	9	0	0	4	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 4

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 4、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	蓄膿症					鼻血がよく出る						
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 5

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 5、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	鼻血が止まりにくい						その他					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	1	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	1	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	1	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 6

耳・鼻の病気・症状（複数回答） 6、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にはない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	5	5	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	1	1	1	1
70～74	1	1	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
男	3	3	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	1	1
70～74	1	1	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
女	2	2	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0

別表 9 7

甲状腺の病気・症状（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	甲状腺腫						慢性甲状腺炎					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療を へて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 8

甲状腺の病気・症状（複数回答） 2、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	バセドウ病						甲状腺機能低下					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 9 9

甲状腺の病気・症状（複数回答） 3、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	15	0	0	0	14	1	12	12	2	2
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	4	0	0	0	4	0	2	2	2	2
70～74	3	0	0	0	3	0	3	3	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
不詳	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
男	6	0	0	0	5	1	4	4	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
70～74	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	8	8	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
70～74	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表100

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答）1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	肺線維症（慢性間質性肺炎）						無気肺					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表101

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答）2、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	肺水腫						肺炎					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表102

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答）3、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	慢性気管支炎						嗄声（声がかれる）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	1	3	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表103

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答）4、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	呼吸困難						COPD（慢性閉塞性肺疾患、肺気腫）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表104

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答）5、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	息切れ						風邪を引きやすい					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	3	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	1	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	3	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表105

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答）6、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	風邪が治りにくい						せき					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	1	2	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	1	0	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	1	2	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	1	1	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	0	1	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表106

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答）7、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	たん						その他					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表107

のど・気管支・肺の病気・症状（複数回答）8、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にはない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	6	6	2	2
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	0	0	2	2
70～74	2	2	0	0
75～79	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
男	2	2	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	0	0	1	1
70～74	1	1	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
女	4	4	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	0	0	1	1
70～74	1	1	0	0
75～79	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0

別表108

心臓の病気・症状（複数回答）1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	心筋梗塞						狭心症					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	1	0	0	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	1	0	0	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	1	0	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表109

心臓の病気・症状（複数回答）2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	心不全						心肥大					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 0

心臓の病気・症状（複数回答） 3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	不整脈（脈がとぶ）						頻脈（心拍数が増加している状態）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	0	1	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	0	1	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 1

心臓の病気・症状（複数回答） 4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	動悸（異常にドキドキする）						その他					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 2

心臓の病気・症状（複数回答） 5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	10	10	2	2
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	1	1	2	2
70～74	3	3	0	0
75～79	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	2	2	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
男	4	4	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	1	1
70～74	2	2	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
女	6	6	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	0	0	1	1
70～74	1	1	0	0
75～79	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	2	2	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0

## 別表 1 1 3

心臓の病気 現在の治療内容（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総数	1	0	1	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	1	0	1	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	1	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	1	0	1	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 4

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	高血圧						低血圧					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	7	0	1	6	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	1	0	0	3	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	1	0	1	1	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	1	0	1	3	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	6	0	0	3	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 5

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 2、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	動脈硬化						動脈瘤					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 6

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 3、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	静脈炎						静脈瘤					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	1	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	1	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表 1 1 7

高血圧や血管の病気・症状（複数回答） 4、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	14	0	0	0	14	0	4	4	2	2
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
65～69	4	0	0	0	4	0	1	1	2	2
70～74	3	0	0	0	3	0	1	1	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	2	2	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
70～74	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	2	2	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1
70～74	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表 1 1 8

高血圧 現在の治療内容（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	その他	未回答	不詳
総数	8	0	7	0	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	1	0	0	0
65～69	1	0	1	0	0	0
70～74	2	0	1	0	1	0
75～79	1	0	1	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	2	0	0	0
90歳以上	1	0	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	2	0	1	0	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	2	0	1	0	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	6	0	6	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	1	0	0	0
65～69	1	0	1	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0
75～79	1	0	1	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	2	0	0	0
90歳以上	1	0	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 1 1 9

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	B型肝炎						C型肝炎					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表120

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答）2、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	肝機能障害						胆のう炎					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	1	0	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	1	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表121

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答）3、

性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	胆石症						黄疸					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療を へて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	2	0	12	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	2	0	7	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表122

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答）4、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	脾腫（脾臓がはれる）						その他					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	1	0	0	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	1	0	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 3

肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状（複数回答） 5、

性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にはない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	9	9	2	2
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	2	2	2	2
70～74	3	3	0	0
75～79	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0
男	4	4	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	1	1
70～74	2	2	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
女	5	5	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	1	1	1	1
70～74	1	1	0	0
75～79	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0

別表124

すい臓の病気・症状（複数回答）1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	すい炎						糖尿病					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表125

すい臓の病気・症状（複数回答）2、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	14	0	0	0	14	0	12	12	2	2
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	4	0	0	0	4	0	2	2	2	2
70～74	3	0	0	0	3	0	3	3	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	4	4	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
70～74	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	8	8	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
70～74	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表 1 2 6

糖尿病 現在の治療内容（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	インスリン	その他	未回答	不詳
総数	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 7

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	腎炎						膀胱炎					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療を へて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	1	0	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	1	0	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	1	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表128

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答）2、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	腎結石						尿管結石					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療を へて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	1	0	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	1	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 2 9

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 3、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	膀胱結石						血尿					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	1	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	1	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	1	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表130

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答）4、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	蛋白尿						その他					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	1	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	1	2	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	1	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表 1 3 1

腎臓・膀胱の病気・症状（複数回答） 5、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	病気・症状は特にはない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	9	9	2	2
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	1	1	2	2
70～74	2	2	0	0
75～79	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0
男	3	3	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	1	1
70～74	1	1	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
女	6	6	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	0	0	1	1
70～74	1	1	0	0
75～79	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0

別表 1 3 2

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	大腸ポリープ						慢性胃炎					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療を へて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	3	0	11	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	2	0	2	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	2	0	3	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	1	0	8	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 3

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 2、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	胃潰瘍						十二指腸潰瘍					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	14	0	4	0	10	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	2	0	2	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	1	0	2	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	3	0	2	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	1	0	8	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表134

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答）3、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	下痢						便秘					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	4	10	0	14	0	0	3	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	1	3	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	2	1	0	3	0	0	1	2	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	1	4	0	5	0	0	1	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	3	6	0	9	0	0	2	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 5

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 4、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	腹部膨満感（おなかが張る）					痔疾（ぢ）						
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	1	0	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	1	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 6

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 5、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	腹痛						逆流性食道炎					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 3 7

食道・胃・腸・肛門の病気・症状（複数回答） 6、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	14	0	0	0	14	0	3	3	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	4	0	0	0	4	0	0	0	1	1
70～74	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
70～74	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	3	3	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1
70～74	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表138

血液・リンパの病気・症状（複数回答）1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	脂質異常症（高脂血症）						貧血					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	2	0	1	11	0	14	1	1	1	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	1	0	3	0
70～74	3	1	0	1	1	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	1	4	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	2	0	0	7	0	9	1	1	1	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
70～74	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表139

血液・リンパの病気・症状（複数回答）2、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	リンパ節の腫大（リンパの腫れ）					その他						
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療を へて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表140

血液・リンパの病気・症状（複数回答）3、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にはない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	6	6	2	2
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	1	1	2	2
70～74	1	1	0	0
75～79	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
男	3	3	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	1	1
70～74	1	1	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
女	3	3	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0
65～69	0	0	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0

別表 1 4 1

脂質異常症（高脂血症） 現在の治療内容（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	その他	未回答	不詳
総数	3	0	2	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	2	0	1	1	0	0
75～79	1	0	1	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	1	0	0	1	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	2	0	2	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	1	0	1	0	0	0
75～79	1	0	1	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 2

前立腺・男性機能に関する病気・症状（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	前立腺肥大						男性不妊（子供ができない）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表143

前立腺・男性機能に関する病気・症状（複数回答）2、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	インポテンツ						その他					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	5	0	0	0	5	0	5	0	0	1	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	1	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 4

前立腺・男性機能に関する病気・症状（複数回答） 3、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にはない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	3	3	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	0	0
70～74	1	1	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
男	3	3	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	0	0
70～74	1	1	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
女	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0

別表 1 4 5

子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状（複数回答） 1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	子宮内膜症						子宮筋腫					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	9	0	0	0	9	0	9	0	1	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	1	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 6

子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状（複数回答） 2、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	卵巣のう腫						月経困難症（生理痛）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 7

子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状（複数回答） 3、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	不正出血						月経不順					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療を へて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	9	0	1	0	8	0	9	0	0	1	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	1	0	8	0	9	0	0	1	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表148

子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状（複数回答）4、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	過多月経（月経が多い）						過少月経（月経が少ない）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 4 9

子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状（複数回答） 5、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	9	0	0	0	9	0	5	5	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	5	5	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 150

初経のあり・なし、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	9	9	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0	0
65～69	2	2	0	0	0
70～74	1	1	0	0	0
75～79	2	2	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	2	2	0	0	0
90歳以上	1	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	9	9	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0	0
65～69	2	2	0	0	0
70～74	1	1	0	0	0
75～79	2	2	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	2	2	0	0	0
90歳以上	1	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 1 5 1

閉経のあり・なし、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	9	9	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0	0
65～69	2	2	0	0	0
70～74	1	1	0	0	0
75～79	2	2	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	2	2	0	0	0
90歳以上	1	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	9	9	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	1	1	0	0	0
65～69	2	2	0	0	0
70～74	1	1	0	0	0
75～79	2	2	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	2	2	0	0	0
90歳以上	1	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 1 5 2

不妊症、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	あり	なし	未回答	不詳
総数	9	0	6	3	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	1	0
65～69	2	0	2	0	0
70～74	1	0	1	0	0
75～79	2	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	2	0	2	0	0
90歳以上	1	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0
女	9	0	6	3	0
40～44	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	1	0
65～69	2	0	2	0	0
70～74	1	0	1	0	0
75～79	2	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0
85～89	2	0	2	0	0
90歳以上	1	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0

別表 1 5 3

妊娠回数 1、性、年齢（5 歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	0	1	2	3	4	5	6
総数	8	1	1	1	3	2	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	1	0	0	0	0
65～69	2	0	1	0	1	0	0	0
70～74	1	0	0	0	0	1	0	0
75～79	1	1	0	0	0	0	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	8	1	1	1	3	2	1	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	1	0	0	0	0
65～69	2	0	1	0	1	0	0	0
70～74	1	0	0	0	0	1	0	0
75～79	1	1	0	0	0	0	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 5 4

妊娠回数 2、性、年齢（5 歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	7	8	9	10	11回以上	未回答	不詳
総数	8	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	0	0	0	0
70～74	1	0	0	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	8	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	0	0	0	0
70～74	1	0	0	0	0	0	0	0
75～79	1	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表155

## 妊娠中の異常（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	とくになし	切迫流産	切迫早産	妊娠中毒症	その他	未回答	不詳
総数	25	23	0	1	0	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	2	0	0	0	0	0	0
65～69	4	4	0	0	0	0	0	0
70～74	4	3	0	0	0	1	0	0
75～79	5	5	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	6	5	0	1	0	0	0	0
90歳以上	4	4	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	25	23	0	1	0	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	2	0	0	0	0	0	0
65～69	4	4	0	0	0	0	0	0
70～74	4	3	0	0	0	1	0	0
75～79	5	5	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	6	5	0	1	0	0	0	0
90歳以上	4	4	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表 1 5 6

## 出産について（複数回答）、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	正常分娩	帝王切開	早産	死産	自然流産	人工流産	その他	未回答	不詳
総数	25	23	0	0	1	0	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0
75～79	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0
90歳以上	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	25	23	0	0	1	0	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0
75～79	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0
90歳以上	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 5 7

出産時の出血量、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	小	中	多	未回答	不詳
総数	23	3	15	3	2	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	4	0	1	3	0	0
70～74	4	0	3	0	1	0
75～79	5	0	5	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	6	3	2	0	1	0
90歳以上	4	0	4	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0
女	23	3	15	3	2	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	4	0	1	3	0	0
70～74	4	0	3	0	1	0
75～79	5	0	5	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0
85～89	6	3	2	0	1	0
90歳以上	4	0	4	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0

別表158

新生児の異常、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	とくになし	低出生体重 児	先天異常	奇形	その他	未回答	不詳
総数	23	20	3	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	2	0	0	0	0	0	0
65～69	4	4	0	0	0	0	0	0
70～74	3	2	1	0	0	0	0	0
75～79	5	5	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	5	3	2	0	0	0	0	0
90歳以上	4	4	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0
女	23	20	3	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	2	2	0	0	0	0	0	0
65～69	4	4	0	0	0	0	0	0
70～74	3	2	1	0	0	0	0	0
75～79	5	5	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	5	3	2	0	0	0	0	0
90歳以上	4	4	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

別表159

骨・関節の病気・症状（複数回答）1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	骨折						椎間板ヘルニア					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	14	0	3	0	11	0	14	0	1	2	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	1	1	2	0
70～74	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	1	0	4	0	5	0	1	0	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
70～74	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	2	0	7	0	9	0	0	2	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表160

骨・関節の病気・症状（複数回答）2、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	骨粗しょう症						骨の変形					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	2	0	0	12	0	14	1	0	1	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	2	0	0	2	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	2	0	0	7	0	9	1	0	1	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表161

骨・関節の病気・症状（複数回答）3、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	痛風						関節痛					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	2	0	12	0	14	1	0	2	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	1	0	3	0	4	0	0	1	3	0
70～74	3	0	1	0	2	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	2	0	3	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	1	0	2	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表162

骨・関節の病気・症状（複数回答）4、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	ガングリオン						骨痛（骨がうづくような痛み）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療を へて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表163

骨・関節の病気・症状（複数回答）5、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	肩こり						腰痛					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	1	0	4	9	0	14	3	1	4	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
65～69	4	0	0	1	3	0	4	0	1	1	2	0
70～74	3	0	0	1	2	0	3	0	0	2	1	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	1	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	1	4	0	5	0	1	2	2	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
70～74	2	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	0	3	5	0	9	3	0	2	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
65～69	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	1	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 6 4

骨・関節の病気・症状（複数回答） 6、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	14	0	0	0	14	0	2	2	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
65～69	4	0	0	0	4	0	0	0	1	1
70～74	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	1	1	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1
70～74	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	1	1	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
70～74	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表165

骨粗しょう症 現在の治療内容（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総数	2	0	1	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	1	1	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	2	0	1	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	1	1	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表166

皮膚・爪の病気・症状（複数回答）1、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	ざ瘡（にきび）						毛孔の開大・面疱（毛穴が広がる、黒にきび）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	1	0	1	12	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	1	2	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	1	4	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	0	0	8	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表167

皮膚・爪の病気・症状（複数回答）2、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	色素沈着（肌が黒くなる）					爪の変形						
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	2	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	2	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表168

皮膚・爪の病気・症状（複数回答）3、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	粉瘤（皮膚のふくら）						粘液嚢腫（関節のふくら）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表169

皮膚・爪の病気・症状（複数回答）4、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	掌蹠膿疱症						湿疹がしやすい					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	2	0	3	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	1	0	0	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	1	0	1	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	1	0	0	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	1	0	3	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表170

皮膚・爪の病気・症状（複数回答）5、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	皮膚の掻痒（かゆみ）						乾燥肌（さめ肌）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療して いない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療を へて治癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	1	1	5	7	0	14	0	0	4	10	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	1	3	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	3	0	0	3	0	0	2	1	0
75～79	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	2	3	0	5	0	0	2	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	1	3	4	0	9	0	0	2	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表171

皮膚・爪の病気・症状（複数回答）6、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	脱毛						白斑					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	1	1	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	1	1	7	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 2

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 7、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	紫斑（内出血）						その他					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	1	0	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	1	0	2	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	1	0	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 3

皮膚・爪の病気・症状（複数回答） 8、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にはない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	3	3	2	2
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	2	2
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
男	2	2	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
女	1	1	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	0	0	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	1	1	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0

別表 1 7 4

湿疹が特にできやすい場所（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	総数	関節の裏 (ひじ、じ ざ)	顔面	体躯(胸、 背中、腹、 腰)	その他	未回答	不詳
総数	7	0	2	5	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	1	0	0	1	0	0	0
70～74	3	0	1	2	0	0	0
75～79	2	0	1	1	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	1	0	0	1	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	1	0	0	1	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	6	0	2	4	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	1	0	0	1	0	0	0
70～74	2	0	1	1	0	0	0
75～79	2	0	1	1	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表175

アレルギー疾患（複数回答）1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	アトピー性皮膚炎						アレルギー性鼻炎					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	0	2	12	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	1	3	0	4	0	0	1	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	1	2	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	1	4	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	0	1	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 1 7 6

アレルギー疾患（複数回答） 2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	花粉症						喘息					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治療	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	1	0	2	11	0	14	1	0	0	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	1	3	0	4	1	0	0	3	0
70～74	3	1	0	0	2	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	0	2	6	0	9	1	0	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	1	1	0	2	1	0	0	1	0
70～74	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 177

アレルギー疾患（複数回答）3、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	蕁麻疹						食物アレルギー					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表178

アレルギー疾患（複数回答）4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	薬物アレルギー						その他					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	1	0	0	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	1	0	0	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表 179

アレルギー疾患（複数回答）5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	病気・症状は特にない		未回答	
	総数	はい	総数	はい
総数	5	5	2	2
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	2	2
70～74	1	1	0	0
75～79	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
男	3	3	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	1	1	1	1
70～74	1	1	0	0
75～79	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0
女	2	2	1	1
40～44	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0
65～69	0	0	1	1
70～74	0	0	0	0
75～79	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0

別表180

膠原病（複数回答）1、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	関節リウマチ						全身性エリテマトーデス（SLE）					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表181

膠原病（複数回答）2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	強皮症						皮膚筋炎					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表182

膠原病（複数回答）3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	シェーグレン症候群						ベーチェット病					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表183

膠原病（複数回答）4、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	14	1	0	0	13	0	11	11	2	2
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	4	1	0	0	3	0	2	2	1	1
70～74	3	0	0	0	3	0	3	3	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	4	4	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
70～74	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	0	0	8	0	7	7	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
65～69	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別表184

膠原病 現在の治療内容（複数回答）、  
性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	総数	食事または 運動療法のみ	内服薬	注射薬	その他	未回答	不詳
総数	1	0	1	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	1	0	1	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
男	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0
女	1	0	1	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0
65～69	1	0	1	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0

別表185

その他の症状（複数回答）1、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	全身倦怠感（体がだるい）						手足のしびれ					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	3	11	0	14	1	0	4	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	1	3	0
70～74	3	0	0	1	2	0	3	0	0	2	1	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	2	3	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	3	6	0	9	1	0	2	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表186

その他の症状（複数回答）2、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	体がつる						のどがつる					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	5	9	0	14	0	0	0	14	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	1	3	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	2	1	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	2	3	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	3	6	0	9	0	0	0	9	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表187

その他の症状（複数回答）3、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	筋肉の痛み						体がむくむ					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	1	0	0	13	0	14	0	0	3	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	0	0	8	0	9	0	0	3	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表188

その他の症状（複数回答）4、性、年齢（5歳階級）別

(単位：人)

性 年齢階層	日光に当たると顔が腫れたり湿疹ができたりする						指が腫れる					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療して いない	未回答	不詳
総数	14	0	0	1	13	0	14	0	0	1	13	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	9	0	0	1	8	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表189

その他の症状（複数回答）5、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	全身に痛みがある						手足に痛みがある					
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	医療機関で 治療中	医療機関 での治療 をへて治 癒	治療してい ない	未回答	不詳
総数	14	1	0	0	13	0	14	1	0	2	11	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	4	0	0	0	4	0	4	0	0	1	3	0
70～74	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	1	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
70～74	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	1	0	0	8	0	9	1	0	2	6	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
65～69	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
70～74	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
75～79	2	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	1	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別表190

その他の症状（複数回答）6、性、年齢（5歳階級）別

（単位：人）

性 年齢階層	その他						病気・症状は特にない		未回答	
	総数	医療機関で 治療中	医療機関で の治療をへ て治癒	治療してい ない	未回答	不詳	総数	はい	総数	はい
総数	14	0	0	1	13	0	4	4	2	2
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
65～69	4	0	0	0	4	0	1	1	2	2
70～74	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
75～79	2	0	0	1	1	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男	5	0	0	0	5	0	2	2	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	1	1	1	1
70～74	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	9	0	0	1	8	0	2	2	1	1
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
65～69	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1
70～74	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
75～79	2	0	0	1	1	0	1	1	0	0
80～84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85～89	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0
90歳以上	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(再掲) 2.12 調査票の自由記入欄について  
(すべての回答)



95 ページに掲載したものを含め、「これまでの症状や病気について、書ききれなかったことや、特に研究してもらいたいこと、要望など」についての自由記入欄に回答があった内容を以下に記載している。記載は可能な限り原文のままとしているが、判読が困難な文字や記載した本人が特定されるおそれがある記載（年齢、地名、医療機関名、具体的な年月日、具体的な検査数値等）については、「●」と表記している。また、回答中に公表を望まない旨の記載があったもの等、ここに記載するのが適当でないものについても割愛している。

- 月●日～●日胃のエルニアで入院しました。今は良くなり元気になりました。今は週一回データーサービスに行くのが楽しみです。毎日スケルトンや線ひきをやっています。色々なことがわかり勉強になります。
- 透析に入り ●年です。 カネミ油症との関連が気になってきました。 カネミ油症で腎臓がやられるのか、ぜひ研究してください。 もし、すでに研究済みでしたら、その内容を知りたいです。
- 毎年、ありがとうございます。
- 引っ越しに伴い住所変更あり。
- いつも有りありがとうございます。これからもヨロシクお願い致します。
- 神経鞘腫による神経の圧迫で、現在右足への痛みと足先にかけての痺れが発生しており、手術では後遺症が考えられる中、手術にも踏み切れず、悩みながらの生活をしております。 カネミ油症と神経鞘腫との因果関係について研究していただきたく要望致します。
- 油し健診の日程を●月●旬で希望したい。 同健診会場を●●県●又は●市で実施してほしい（●●病院は自宅からかなり遠く通院に時間がかかるため、近くで受診希望です）
- 高齢になったせいか、膿の出が少なくなって来ましたが、今年になっておしりに溜まり始め、久しぶりに痛い思いをしました。 皮膚のケロイド状の傷は直しようもないのだろうけど、化膿を止める治療法はないものか・・・ 思春期のころから●年近く、顔・体（特に臀部）に膿が出たり、傷が残ったりで、人前が出るのが苦痛な人生でした。 多分、死ぬまで持っていくことになるのでしょうかね。 今更治っても、多感な時期は戻れませんが・・・
- 年々、目が悪くなっています。
- 後骨間神経麻痺による左手の動きが制限されています。 ガングリオンを左前腕部より手術により取り除き、だいぶ回復しましたが、未だに、指（特に親指と人差し指）が正常に動かさません。 インターネットで調べると、上腕部に神経のくびれ・ねじれがあるとドロップフィンガーや指が動かせないという症例があり、手術で治ったとの情報を見ました。 上腕部の橈骨神経における「くびれ」や「ねじれ」の検査をしていただける病院をご紹介いただけないでしょうか。 すでに●年以上、指がうまく動かせないため、毎日、心身共に、気持ちと一緒につらいです。 病院のご紹介をお願い致します。
- 2世の子供の健康状態について。 油症検診に行っても認定基準に未たず認定されません。しかし、体調の悪さ、皮膚疾患等がある。 ◎人によっては症状はさまざまだと思いますが、基準に未たないからと言って認定しないのではなく、その人の体調や症状を見て決定してほしい。 ◎例えば、私はお酒が飲めません。そんな人が少しでもアルコールを摂取すればたちまち体調が悪くなります。カネミもそうです。少量のダイオキシンやカネクロールでもひどい症状になりかねないと思います。そういう事も鑑みて、今後の認定を考えて頂きたいと思います。 ※カネミ認定の親から生まれた子供達は全て対象だと考えられます。 次世代の子供達の健康を守って頂きたいと心から願っております。 どうぞよろしくお願い致します。
- 疲れやすく、腰痛が治らない
- 昨年に引き続き ・原因不明の頭痛あり（痛み止め薬を週1～2回飲む） ・膝の痛み（左、右共に） ・皮フの一部の黒ずみ、カサカサしていかゆみがあります。 ・口腔内に白くもやもやした傷のようなところがあり扁平苔癬ではないかと言われましたが・・・●年以上同じ状態が続いています。熱いものや少し辛いものでもしみでずっと違和感があります。経過観察ということですが・・・口腔ガンに変化ということも稀にあるらしく少し心配です。 ・娘の皮フトラブルもひどくなっております。原因がわからず病院でも判断がつかず不安な毎日を送っています。 ・手指の関節の痛み（左、右共に） ・目の奥の痛み（まぶしさに耐えられない） ※住所が変わりました（旧住所 ●●区●●● ●●●）新住所→●●県●●市●●●●、〒●●-●●●● （氏名や連絡先に関しましては 変更ありません）
- 家族には知られたくない。
- 20●●年●月末にじんぞう病であることが判明した。それ以前の不調の原因もじんぞうに起因しているかも知れない。食事制限と投薬で、コレステロール、尿酸値も改善中で、投薬も一日おきになっている 妹はカネミ油を摂取した当時（中でも）急性腎臓病になり成績の良い子でしたが一年の病院生活となり、高校受験も希望かなわず、大学受験にも影響しました。 私は長い間の不調が腎臓であったことに●年●月に気づき（自分で調べて受診）eFGRの数値が●代であることの重たくさにおどろいています。 現在はたんぱくの食事制限、投薬、血流を良くする為の低周波機器を購入（40万）して改善のきざしがありますが、腎臓病であることはこれから先生涯向き合う必要があります。

- 脱毛改善の薬を希望します。 現在カツラ使用中
- 自分の娘が、からだが弱いのが心配。 ・孫の腹部に黒いあざがある。生まれつきである。両親にはあざがない。からだも弱い風邪ひきやすい ●才半すぎだが2回入院した。
- 最近特に手が痛いのでよくきく薬や漢方等があれば紹介してほしい。
- （吹きでもの、ニキビ等は若い頃より出ていました。）●年程前に病気になり、ベットに寝ている状態で、苦しい思い悲しい思い沢山あります
- 今は主人にも私の事はわかってるが、子供達は知らないで、わからなくなって（認知症とか）アンケートがきたとき、カネミって何って聞かれた時のことが心配
- 背中に今までと異なる膿胞が出来、フシジン軟膏を処方してもらっているが、次々と発生し、●年近くなる
- ☆未認定の患者の救済して下さい。☆次世代患者の救済して下さい。☆根本的な治療法を開発して下さい。☆油症患者の健康回復のための研究に力を入れてください。いつも ありがとうございます。よろしくお祈りします。
- 高齢になると、食事をしてても栄養の消化、吸収が劣ってくるかんじで、体力や気力の減少が気になります。油症ニュースの第47号に掲載された漢方薬の有効性はその後の研究は進んでいますか。
- 歯科に行った所、生まれた時から歯の数が少ないため、元から歯がない所がいくつもあるので歯根が歯ぐきから出ていない為噛み合わせが悪いので年齢年齢と共に不便になるでしょうと言われ不安です。どの様に治療すれば良いのか先生も保健以内での対処で考えるのがひじょうに難しいですねと言われてどうしようかと悩んでいます。それと今の時期とか私はアレルギー体質なので痒みや吹出物に鼻炎に悩んでいます。
- 油症患者受療券をなくしたのでカネミ倉庫株式会社に請求できますか？
- 私は男性ですが、男性患者でも、子孫に症状が出ますか？（遺伝しますか？） ・PCB は年とともに、血中から少なくなっていくのか？ ・患者と発癌の関係が高い癌はありますか？
- 足裏がつるつるすべって歩きづらい、スリッパや、かかとが少しでも高いと靴も長靴も履く事が出来ません ストッキングもつるつる滑るので履けません どこか、いい病院を知りませんか。
- 今の所、いたって健康状態です。 健康第一で生活しています。
- 今の所 現状維持
- 前年までに記しました通りです。どうぞ宜しくお願い致します。●●●●”
- 出産後、母乳で育ててきましたが、母乳による子供達への身体におこりえる病気があるのか知りたいです。 娘（●人）が今後、出産した時に母乳育児で影響が出ないか心配です。
- 1. 関西在住なので、検診会場のアクセスは非常に良くありがたいです。しかし、関東などはアクセスの悪さが目立つとの事で、受診件数の減につながっており改善を希望します。 2. 検診項目の担当医に油症の認知（周知）をお願いしたい。 3. 次世代への影響が気になります。 現在、研究他、すすめていただいておりますが、まだ、これといった起点にならず、時間ばかりが過ぎていってます。しっかりしたロードマップを示していただきたい。
- 首から肩、背中のこり痛み和らげるために定期的に整骨院通いをしています
- 今年●月、インフルエンザが完治した4日後にひどい目まいと吐き気で4、5日寝込みました。 昨年転倒して、頭を打ったので心配になり脳CT検査をしてもらいましたが異常はありませんでした。 その時に医師から「メニエール病」かも、と言われました。 現在症状は出ていないので、確定診断は受けていません。 関連はないと思いますが、少し気になっているのでご報告いたします。
- 毎朝背部の痛みで目覚めます（ストレッチ、マッサージ等をする日中は痛みがましになるのですが・・・）時々一日中痛みが続く日があり不安です。
- ☆仕事や歩いている時、たまに足の力がなくなる時がある。 ☆仕事や歩いている時、たまに頭が真っ白になる時がある。
- 子供の時より何度も手術してきました。 20●年●月●日 右側下顎腫瘍（エナメル上皮腫）で遊離腭骨移植しました。 約●カ月ほど入院しました。ところが20●年●月右足が骨が委縮（縮）していると言われ通院中です。 足の裏が骨がでて歩行に困っています。
- カネミ油を摂取した事によりこれから年齢を重ねると共に病気等の発症が不安です。
- 1人ぐらいですので、めまいがひどい時や倒れた時が心配です
- 昨年●月に白内障の診断を受け、点眼で様子を見ていましたが、進行が早く日常生活に支障が出たため、思い切って手術を受けました。術後日が浅くまだ安定していません。今後も目の症状には不安が大きいです。 ・次男は子供の頃からアレルギー（アトピー）症状があり、孫（小●）にも遺伝した様で顔（目のまわり）のかさかさや身体のかゆみが強い様です。油症との関連に心配しています。上記の研究を希望します。
- 代の時に結膜下腫瘍（左目）に罹って手術を受けたので現在右目の視力が0.4でそれだけが心配です。



ダイエットしてます。何とかボチボチの生活です。年なのでゆるゆると生きていこうと努力してます。 よろしく願います。

○いつもお世話になり、ありがとうございます。父も高齢になり、いろいろな病気になっています。今後とも、よろしくお願いいたします。

○後期高齢者になり カゼもよく引くし直りにくい。免疫力低下なので当り前だが、チョトなさない。体と相談しながら今を楽しんで行きます。 カネミ関係者の皆様に新たためて感謝してます。アリガトウ 規正拝

○病状が発覚した昭和●年頃、仕事の内容は、バス事務員であったが、早朝通勤中、不整脈で、警察派出所で保護され、職場に連絡し事なきを得たことが2度。その後目の病いにかかり（中心性もう幕症）で、入院治療し、事務不可で、内勤にしたり、管理者の仕事で転勤が多く、かねみ油症の認定はもちろん連絡がない状態で、永年不具な目にあい認定されず、最後に平成の終わりにやっと認定に至っています。 ぐちって申訳ないが、今になって自分に腹たっています。 ごめんなさい。お世話になります。

○グイチョウガン ノウコウソクチリョウ中 ヒニョウキカ

○R●年●月から人に進められて、酢納豆、ニンニク、ヨーグルと食べるようになり、身体、足の痛みが少なくなり、今は足の治療に行っておりません。薬を飲んで注射してもまったく変わりませんでしたので・・・ 今は便秘もなくなり又汗が出る様になり私に合っているのかも、もう少し続けて頑張りたいと思います。

○子供がいなく、これからの病気・介護が心配です

○現在自分自身ではそれなりに元気に動いていると思います。若い人の動きを見た時、なんで自分はゆっくり動作なんだろうと思う事はしばしばありますが、これが年を重ねる事なんだと痛感する事の日々です。夫が亡くなって●年です。やっと自分で生きて生かなければと思えるようになったので楽しく笑って生きていきたいです。色々なことにマイナスに考えない様に頑張ってますが、時として悲しくなったり涙を流したり、又大笑いしたりの日々です。カネミということばには負けずに痛かったら自分なりに元気になる方法をさがります 過去に戻る事はできません。気持ちで歩いている所だと思います。毎年毎年ありがとうございます。

○今年も検診は受けることができませんでした。今は病院の面会ができるので父に質問しながら記入できました。毎回ですが検診にも行けずお役に立てなくて申し訳ない気持ちだと父が言っておりました。

○認知症（前頭葉・側頭葉萎縮）●才で発症 カネミと関連があるのか、ないのか。

○※このカネミの病気がわかる前、私が●前後の事と思います。とても具合が悪くて当時、●●市内のあらゆる病院（●●病院 ●●病院 ひふ科 その他 ●●病院）に母が連れて行って来れました。100mが歩けないか・・・、すぐたおれるとか・・・ 気分（病院で）が悪くなるとすぐ気ぜつして電話番号を書いているので、気がつくといつも母が来てくれました。あげくのはてに、ハリ治りょう、うらないまで連れてゆかれましたが直りませんでした。元因がわからなかったからです。 それから結婚しても、同じようでした。 だから自分としては、私の体はこんなものなのだと思います今まで生活して来ましたので、どこがどうだとか、今後どんな事になるのか・・・ もう●才になりましたので墓まであと一歩です。現在は夜はねむりません。 12時から、本をよんだり、テレビをみたり、朝食は午前4時頃主人と食べます。（今は2人暮しです）今までは子供を育てるとか、孫のめんどうをみるとかいそがしかったのですが、今は主人のめんどうを見なくてははいけないので・・・ 人間というのは死ぬ事が一番むづかしいですね。 子供達にめいわくかけないようにしなくては・・・などと考えています。それに家が広すぎて手におえません。 まあ ぐちを書きました。他に心配事は自分達が動けなくなったら老人ホームに入れるかどうか・・・人と生活できるかどうか、調整がないので!!（そんなクリ言です） 手紙を書いたり字を書いたりしないのでわかりにくくてすいません。（字も忘れました） いつもお世話おかけしてすみません ありがとうございます!!

○前回（昨年）書いた事は、継続しておりますが、身体の症状も良くはなりません。新たな症状も出て来て、心配でなりません。毎回書かせていただいておりますが、全身倦怠感はずっと有ります。日によっては少しは良い日と悪い日があります。病院でも話しはしますが、何か口では言い表わせないような症状です。口で言ってもなかなか伝わらないと思います。自分ではこれがカネミ油症の独特の症状だと思っております。油症の検診とか病院の診察、血液検査では特に悪い所はありません。それがやはり油症の症状じゃないかと思えます。 難しいとは思いますが、何か良い治療法はないかなと思えます。 お世話になりますどうぞよろしくお願いいたします。

○●●年、今から●年前も前に油症を発症し、以来、身体的に苦しめられて来ました。 さすがに●年も経ってしまい、医療関係機関も認識がうすれ、色々な症状を訴えても、わかってもらえず、対処療法ですら処方してもらえなくなってしまってます。 ダイオキシン、PCB、PCOFを口から入れたらどういう症状が出るのかその影響は何年続くのか？自然に体外に排出されるのか？●●大学で研究を続けているにもかかわらず、周知されてないのが実情ではないでしょうか？ 血中濃度は残ってなくて、年令と共に様々な症状が今なお、我々を苦しめています。「カネミ油症事件」も、すでに風化しつつあります。裁判では国に敗れ、補賞もなし、カネミ倉庫には勝ったものの、満足な補賞もいただけず、あの頃の、若手だった（●才）我々世代も●代、あと●年もすれば、生存しているかわかりません。 ●●大学に、研究費を毎年支

払っている年月を考えれば、厚労省も、認定患者に手厚く出来たのでは、ないでしょうか？ 死ぬまで、治る事はないのですから。 -以上-

- 身体全体骨が痛くて動作は鈍く苦痛な日々を過ごしている。血液の循環が悪く体の冷えが著しい。特に歯の状態が悪く歯周病で膿が頻繁に出て、口の中がどろどろして気分が悪い 歯ぐきが弱くて普通食が食べられない 栄養不足と検査で云われている。 高血圧でふらつく事が多い 夕方になると足がむくみ重く感じ膝や背中の痛みが増す 耳の聴取力も悪く生活に困窮している 尚、上あごの歯は全部入歯ですが、下あごの残っている歯を抜いて総入歯にしようと思ひ親しらず歯を1本抜いて確かめてみましたが高血圧で血が止まりにくく検査では総入歯にするのはむずかしいとの事でした。
- 大変でしたが時間と共に大切な事を学んだり生活の必用性の原理を学びてきおうしながら生きてきた事で生きる力を大切にできるようになった生活ができるようになりました ・自分を守る力を取り入れる事により生きる力になると思ひます ・自分が生活する上で大切な事を学び毎日を大切に生きていることが大事だと思います ・そして今の時代の便利の良さにまぎらわれないように生きることが大切だと思います
- 昨年の油症検診の際に、障害年金の手續に関する助言を頂き、ありがとうございました。 両膝の痛みが、除々に悪くなって、今年(20●年・令和●年)●月末で会社を退職致しました。その際に傷病手当の手續きをお手伝いして頂きたくお電話でその旨を申しましたが、カネミ油との関係がないとの返答で、お断りされました。 カネミ油との関係が、あり、助言や、手續きを全面的に協力して頂ける、申請書等は何かあるのでしょうか？ 又は、カネミ油との関係は、全つくなく、公に認められている病気・疾患等は、何かあるのでしょうか？ 私にとってカネミは、(PCB等有害物質)私におこっている身の不具合全てに関係していると疑って止みません。その身の不具合は、全々カネミ油との関係はないですと言ひ切れないのでしたら、傷病手当の手續き等のサポートをして頂けないでしょうか？
- から引越して来て●年●月肺炎になり、これからどんな病気にかかるか心配です。
- 早期の治療方法を確立してほしい
- 年●月より、先発品長期収載品は、患者が一部自己負担が実施された。その結果一部自己負担はカネミ医療費負担の対象外とされている。しかし、カネミ患者救済の論点からすると、後発品のない先発品、後発品はカネミ医療費対象で長期収載品先発品の一部自己負担のみ、カネミ医療対象外であることは不公平、不平等だと考えられる。患者の会、国(厚労省)、カネミで上記の点を審議いただきたい。よろしくお願ひします。
- 年(20●)●才になりますが、今の所元気ですが、これから先どうなるかと思う事が多くなった気がする。(現在でも耳たぶ、へその廻りのふきで物からウミの様なもの出ることがあります)家族は父、母、兄と亡くなり自分1人になってしまいました。これからもよろしくお願ひします。
- 何年前の健診で、皮膚科のお医者さんが顔にできたホクロを取っていただけるとお話をされていました。●大の先生だったと思ひます。今でもホクロは取っていただけますか？(子どもの時からできたもので、今ではかなり大きくなっているもので、皮膚ガンにならないかと心配しています。)
- 調査票中、回答できなかった分、下記より回答します。ページ(6)老人ホーム入所中、移動時、スタッフに車椅子を押してもらっている。(7)食事等は、ホームで管理されたものだけ。(9)自分の身体が、どうゆうことか分かっていない。(9-10)わかりません。
- 頸椎及び腰椎の圧迫骨折が酷く、痺れがひどくなっている。下腹部の痺れが特に顕著に出始めた。痛みも有り、寝返りもつらい 今後、自分の体がどうなっていくのか不安。
- 糖尿病で薬を変えると副作用が有りインスリンに変わっている薬はないものですか？
- 今は背中が電気がはしまったみたいに痛む。車の運転のしんどうでも痛む。ねがえりが痛くてどうしようもない。手指のこわばり。足をまっすぐにのぼして、ひざが少し上がっているのをまっすぐになった時、身うごきができなくなる。すわったり、たったりが腰が痛む。胃酸がすごくのどがやけどしたみたいに痛む。頭痛がはげしく動けなくなる。つめがそって痛む。つかれが残る。
- 歯周病で次々と歯が失われ歯科医に長く治療しているが改善がみられない。自分では悪化の進行が判断できないのが心配です。(治療しないよりした方が良いでしょうとは思ひます)・糖尿病は●年入院しましたが今は少し良い方へと向かっています。しかし今までの経験ではいつ検査数値が急に上るのではという思ひがあります。
- 子どもへの遺伝が心配である。・●人の子供が居るが、●人共、喉頭のう胞があった。・●の男子は口蓋裂もあり、口内異状があった。
- 月の初めに直腸の炎症で入院をしました。子供の頃より下痢が激しく、腸が弱く年を重ねるごとに、大腸ガン等の不安が強くなってきています。食事、体を動かす事等の努力がなかなか出来てないのも事実ではありますので、なるべく意識的に努める様にしたいと思ひます。
- 健康な体になりたい！！
- 年以上苦しんでします。早期解決を願ひしています

- 油症に認定されて●年以上になりますが、何も進展が無いような気がする。また、長女が皮膚の発疹・かゆみ等に悩まされているが、心配でなりません。●年以上苦しんでいる。早期解決を願っている。
- 血糖値を抑える為にお薬を頂いていますが、食生活、運動の努力もしていますが、なかなか数値が下がりません。体重も変化が無いので、食事を取る事にストレスを感じます。又、●年くらい前から、食後の下痢が多く、整腸剤を飲みながら、我慢している状態です。ガン検診は受けています。
- 至急 協力調査金を毎年6月末にしてほしい 早ければ早い方がよい
- いろいろと研究されているのは感謝します。ですが、手足のしびれ、全身のかゆみ、眼のいたみなど、残念ながら改善されません。背中、腰の痛み、身体のだるさ、どうしたらよくなるのでしょうかね。認定されていない、子供、孫達もそれぞれ苦しんでいます。一日も早い解決薬が出来ますように
- 私は認定患者です。兄、母等子供、兄の所も含めて皮フやアレルギーや多動などの病気難病等患者である母親族以外、父方親族には病気すらありません。長男、長男、次男、男の子すべて皮フが弱くケロイド体質しっしん、アレルギーが多くあります。皮フしっかん等をしっかり調査お願いします。
- 早腸の病気、油症すべてのしよ常の解善、目の為に、ステロイドを飲んでます。解結する方法はありませんか。すでに七八？つかってます。
- 厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課 様 令和●年度(●月●日：福岡会場)の検診結果で腹部のエコー診察で総胆管拡張の疑いがあります。かかりつけ医に相談してください。の注意事項がありました。それに関連して別紙に臓器(漢字がむつかしくて理解出来なかった)の診断を紛失してしまい、肝心の臓器の名前が解からないままです。肝臓内科クリニックで受診する時、臓器の名前が必要なので今年になり福岡県食品衛生係(担当：●●さん)へ電話で臓器名を調べてもらいましたが不明でした。今回上記の臓器の名前に付いて教えて頂ければ幸いに思います。私のミスで紛失してしまい、お手数をかけて申し訳ございません。 ●● ●●
- 私は薬が合わないことが多く、以前ジェネリックの薬を出された時、呼吸困難のようになったり動悸がして苦しい思いをして、その薬はつかえないようになりました。薬が合わない事が多く、先生も困ってあります。それでいまは安定して服用しているのですが、そのまま請求したところ、ジェネリックではないので治療費の支払がされないものがでています。もし薬で私に何かあったときは、カネミ会社は責任をとってくれるのか考えます。
- お世話になります。よろしく願いいたします。
- 皮フがかゆい。尿が近く夜4~5回おきる。すいみん不足になる。●●の健康 ●●で手術。今まで精神的不安を感じていて社会生活がうまくいかなかったと思われる。本人は親の育てかたが悪かったと思っている。どちらにしろ親としては不安で認定してもらい、週困の物心両面の支援を願っている。私達親が生きている間はあるていど支援しているが、私達がいなくなった後が心配です。
- 子宮体ガンで子宮、卵巣を全的し、毎日、左足の浮腫に悩んでいます。この事は死まで続くのでしょうか。何かよい手立てはないこのですか。あったら教えてください。●若い頃 むし歯はありませんでした。●~●代~●代にかけて歯は一本もなくなりました。何故でしょうか。●今年に入って(●月~)階段の上り下りが困難になり悩んでいます。週1回りハビリし、なんとか日々過ごしています。
- 健康保険適用外の治療でも場合によっては、治療請求できるように検討してほしい。(限度額を設けるなど)
- ①・20●年●●に立つ事かなり困難 ・歩くのがくるくるして動きにくくなった ・イスに座る事が多く炊事場でも歩いていても何かに座りたくなってしまう。●ふとんの中で横になると左腰から足にかけての痛み激しくコロナルを飲む事時々、動けなくなるのではと不安だが6時半のラジオ体操、30分~40分かけて(昔は10分)かからなかった家の横の田んぼ道うい杖をたよりに歩いている 出来なくならないようにと常に努力している。が、、近いうちに出来なくなると思う ②大便がなかなか毎日体の力をいっぱいつかって頑張っている。薬を医者に頂いているのだがかなりむつかしい。今年も検査の時季を前にありがとうございます。
- 顔、脇、腹部、陰部など吹き出物が出来て、良くなると、穴がほげて元にもどないので、せめて顔など見る所の穴がもどるように研究をしていただきたいと思います
- 20●年●月●の検診の時みかた胆のうポリープは胆石でした。今●●病院で観察中です。20●年●月●日に●癌初期が見つかりましたが、これも2ヶ月ごとにCT検査で様子を見る事になってます。本年もどうぞよろしくお願い致します。息子(●●)の事が心配ですので又電話をします。
- 若年性アルツハイマーの疑いで今は観察中です。少し心配しています。●
- 年々仕事後の疲労感がとれず 足・腰・手のしびれや神経痛に悩まされ 睡眠が浅くなり休日で回復できない日々です。花粉等のアレルギーもひどくなって先々が心配。腰と手足の痛みで歩くのも遅くなり運動も中々出来ないで体重も落ちない。近い将来歩けなくなるのではと不安です。 マッサージやストレッチを自宅でも行いなんとか維持している現状です。 親や●●がガンで亡くなった恐怖が常にあります。 病気になった時の支援をお願いしたいです。 ※受療券 紛失したので送っていただきたいです。



- かなり高令になり、毎年のように疾患にかかり、入院、退院をくり返して、介護する側も高令になり、負担が少しづつ重く感じるようになってきました。●年から乳癌、胆石症、●年になって尿管結石による腎盂腎炎、ステントを入れ、何とか一命をとりとめ、回復途中です。退院後、3ヶ月に1度のステント交換の為、通院、乳癌の方は6ヶ月に1回の検査通院です。カネミ油症の義母の症状としては、手足の発疹でした。長年苦しんでいましたが、約●年以上前からその症状もなくなりました。検診も約10年前を最後に施設入所の為受けていません。関連性があるのか不明の乳癌、胆石症などの治療費を負担していただき、今回、尿管結石の領収書も送らせていただきます。本当にありがとうございました。研究が進み、一日も早く患者の皆様が救われることを希望します。すみません高令なので、このアンケートも今年が最後かと、覚悟〜、一言、お礼を申し上げます。
- 娘(●●●●)●才死亡が油症患者だったが孫については今後どうなるのか回答頂きたい。
- 年老いて来ましたが、今の所 身体は大丈夫そうです。しかし精神的にはいろいろと悩み事があります。
- 子や孫たちにどのような遺伝があるのか心配です。学校での学習や試験は普通に出来るのですが、入試になると力を発揮できない傾向が、、、。
- 最近パニック障害になりました。病院は未だ行っていません。内科の先生に寝むれない時の安定剤をもらっている
- 脚のむくみが、ひどい時があるので病院に行っても原因不明なので、心配している。
- 出産の所で少し書きましたが、長男が昭和●年に死産しています。●●産婦人科に通っていたが、妊娠中、カネミ油を食べた次の日に急に●か月で陣痛が始まり死産だった。まっ黒な赤ちゃんだったため、担当医に見ない方が良いと言われましたが見ました。まっ黒で冷たくなっていました。初産でとてもショックで当時は原因などが解りませんでしたが、カネミ油の事件をTVで見て始めてこれだ！！と思いました。1年程、体調も悪く、仕事(理容)も休みがちでしたが2番目を妊娠している事が解り、希望と不安がよぎりました。(また黒い子だったらどうしよう)無事に生まれてくれたので安心しました。●年も経っているので、原因がカネミ油かどうかは調べられませんが、まっ黒の赤ちゃんがカネミ油と関係しているのかどうかは知りたい！！と考えてます。長女(●●●●)も兄がなぜまっ黒で亡くなったのかを知りたいです。
- 私がカネミ油症患者と知ったのは、●才か●才頃だったと思います。私は幼少期に大人に囲まれて検査を受けた記憶があります。母は、私が胎児である時に、カネミ油で天ぷらをあげ食したそうです。カネミ油症の事が母から聞かされ年月も経ったので、県庁へ出向き、認定の確認をしました。先日、衛生課の方から電話がありました。その際、私の経緯など話していると「なぜ母がカネミ患者と認定されていないのか」と言われました。私は生まれた時から、少し肌色が黒く唇なども黒い所があり、母は私を検査してもらったそうです。その際、母も検査をしなかったのか、また、一緒に天ぷらを食した父や祖母も検査しなかったのかと疑問が湧きました。母はあまり理解していなかったのか、どんな気持ちだったのかは分かりません。(父と祖母は他界してるので、調べる事はできません)ただ、この事は母に伝え、今年、母も検査を受けるそうです。年月が経っても認定されるのでしょうか?もし、母がカネミ油症患者であった場合、私の弟●人も検査を受けた方が良いでしょうか?
- 油症検診の結果をもう少し早く郵送していただくと助かります。
- お世話になっております。家族に知られたくなく、心配しております。ご配慮宜しくお願い致します。
- いつもお世話になってます。今回も書類発送時のご配慮ありがとうございます。これからも「親展」で依頼主は「同上」記入でお願い致します
- この一年で足の(ウラ)指の根元が(シビレ)がひどくなり歩く時足うらが「ジカジカ」する
- 20●年●月2回の脳こうそくを発症して前回より動きが悪くなり介護大変です
- 前ページの本調査に回答した方は回答の必要がありませんと書かれていますが、耳に病気がでたりしているので、以前回答した時と変わっていることもあると思いますが本当に必要ないのでしょうか。カネミの年1回検診では、どういう基準で医者を選んでいきますか?熱心にきいたり、アドバイスして下さる方もいれば、外科だったため(内科の女性の先生)テキトーとは言いませんが、こちらが症状をくわしく言っても的はずれなことを言われる(眼科の男性)方もいらっしゃいます。ボランティアなのか無給なのかもやる気を感じません。患者は時間を作って遠い所から来ている方もいます。お年寄は、具合が悪くてもなおさら足が悪くても来ています。もう少し患者によりそう気持があっても良いように思うのですが、、、。以前はかなり待たされましたが前回ぐらいから案内が早くスムーズになり時間がかからなくなったのは良いと思います。
- 毎年の検診を目安として、年間で自分で病院の検査などを受けてるので、ぜひ今後も、毎年検診をやってほしいです。コロナのときは、とても心配でしたので。よろしく申し上げます。
- 自分も要介護2ですし妻も要支援1なのでこれからの介護が不安で心配です
- 特に関係は無いと思いますが、最近突発難聴を発症しました。(現在治療中)
- 経済面 健康状態
- 2ヶ月に1回●●がんセンターで口頭がんの検診を受けていますが転移がいつも心配しています。
- 手帳がみあたらず申し訳ありません

○令和7年の健康実態調査票の提出期限が迫って来ました。昨年は肉体的にも精神的にも衰弱してきたことに触れましたが、高齢者通所トレーニングで体力の回復を狙いましたが、上手いかず寧ろ、現状維持がやっとの状態です。老衰の見本のような自分自身に呆れて、子供や孫たちに迷惑かけないよう注意せねばと考えております。現在も将来も、妻の由紀子の体調が心配です。特に体の化膿がひどく、早く治療の特効薬でも出来ないかなと研究の皆さんにお願いするだけです。 令和7年●月 ●●●●

○ヒッピー

○よろしくお願いたします お世話になります。有難うございます。

○おせわになります。ありがとうございます

○今後も、引き続き、症状に対する研究を続けてほしい。対策等あれば教えてほしい。

○今後カネミ油症によりどのような症状が出てくるか心配です。この先も研究を続けてほしい。

○難聴が進み認知症も現れてきています。補聴器も全然ききとれなくなって2回、買い換えましたが、今は補聴器なしです。ごしていますがとてもふべんです。購入にさいしていくらかでも補助してもらえたらいいのにと願っています。

○やはり●オの時の心室中隔欠損のOPEで年を重ねて、心室性期外収縮が出てきてしまい、今後、どこまで心臓がもつのか不安。歯の状態がよくなかったが、ついに上アゴ8本分も入れ歯になってしまった。80 20運動どころではない。くやしくてしょうがない。もともと歯がスけるくらい透明で弱かった。もうどうしようもない。

○私はまだ大病してませんが「まだ」という感覚がつきまといます。未認定の人も多く、新認定されても賠償してもらえないとか、、、二世についても遅い認定、不安は大きいです。

○●大の油症外来を利用することで、体調の変化を相談することができるので助かっています。

○診断は受けていませんが、寝入りばなに、頭の中で大きな音がすることがあります。かなり大きな音で不快です。この一年頻発しています。ネットで調べたところ「頭内爆発音症候群」という症状でした。耳鼻咽喉科では、メニエールと右耳の低音障害型感音難聴の診断を受けていますが、頭の中で音がするというのは、耳鼻科的な病気ではないとのこと。私のほかに、このような症状が出ている人はいないでしょうか。睡眠の質にもかかわるので、とても気になっています。

○●●●●の妹、●●●です。いつも姉がお世話に成っております。有難うございます。私は身体を悪くしてしまし、姉の病院へは、3ヶ月に1回しか行けておりません。私が病院へ面会に行きますと、喜んで迎えてくれますが、私が妹だと理解しているか、サンドイッチやお菓子を持っていくので喜んでいいのかも知れません。私に「食べる」と言って、食べ物をくれます。でも、いつも歌ったりしています。2、30分程面会させていただきますので、帰りは(ハグ)して別れます。喜んで手を振って別れます。でも可哀相です。

○何度も書きましたが、手、足のしびれはひどいです。つかれやすいのは相変わらず。体のだるさかわらず、更に昨年から左肩が上がりがありません。筋肉が固まってしまい、後に手が回りません。痛くてねむれません(整骨院にいますが、、、)最近左肩をかばう為、腰に負担がきています。動きがきつくなっています。リハビリしてもなかなか容易ではありません。あぶないなあとも思います。

○疲労回復薬の支給

○●月頃に大腸カメラでポリプが見つかり、大腸と小腸との間にあるので、手術が必要あるそうなので迷っています。今定期的に病院にいますが心配です。

○私は同居人家族認定でそれ程症状はありませんが、直接カネミ油の被害者で本当に苦しんでいる人に対して充分の保証を希望します。

○いつも大変お世話になりありがとうございます。認定患者の母(●●●●)も高齢となり、医療、介護の利用が増加してくると思うと心配です。今後共よろしくお願致します

○●年前に橈骨神経麻痺になり、左手が自由に動けなくなりしびれが残っている。右目のみ白内障になり、原因不明、医者より、通常であれば両目なるという不安です。

○次世代被害者は長年にわたり、さまざまな症状に苦しみ悩まされており医療費負担になっている。国は次世代被害の状況を把握してもらい、早い段階の全員救済を求める。

○足の浮腫が年中あるので理由が知りたい。どのジャンパーを使っても。頭のかゆみが出てフケも出る。

○ありがとうございます

○アレルギー皮膚炎と言われ薬や軟こうで良くなったと思うとおりの場所に湿疹、カネミ患者だからかと思う時があります。・皮フが薄くなりちょっと何かに当たっても赤くあざになり、又ぶつけたんだと、がっかり。・夜、トイレを夢何度も目が覚め昼ウトウトし何をするにも集中できない。

○特に心配な事はないが、この病気の手続きや聞きとりなどが大変なので、かかりつけ医には伝えてない。

○ありがとうございました。

○油症のことは、数年前、勇気を出して夫にだけは知らせてはいる。特に差別的な言動や態度は受けずホッとしている。だが娘へ知らせることは(=知られること)は、強い恐れがある。年頃の娘が、母親のおぞましい過去を知った時の、精神

的ダメージとショックを受けるだろうことを想うと、やはり、カネミをうらみたくなる。娘のうち、一人は、生理がまともでないこと。これが自身から生まれたせいではないか・・と噴まれる。娘たちの皮疹も同様。（毎回同じ内容を記している気がする） ・私自身、原因不明の顔面の発赤・掻みで、●ヶ月治らず、我慢の末、皮フ科受診し、ステロイド軟膏を塗り、ようやく軽快している。しかし、経過と共に、掻みが再現。我慢し、ステロイド軟膏の離脱を図っている。カネミ油症が関係しているのか不安である。こわくて、化粧ができていない。 ・研究して欲しいこと：視力障害との関連性、斜視等。

○この1~2年間で体重が約10kg減しました。特に思いあたる症状はないのですが。人間ドックにかかってみようかと思っています。 ※これまでに胸部x-p、上下部の内視鏡検査、血液検査では特に深刻な異常はありませんでした。（ただし血液検査、胸部x-pはこの1年内ですが、内視鏡は●年以上前でした。） 20●.●.●●●

○最近、便秘がひどい

○両足に骨の変形がみられるようになった。一度整形外科で診てもらいたい

○幻覚の症状については薬を服用しているがなかなか治らない 今後治療したい 過敏性腸症候群、かっとなりやすい 短気。

○長期入院中でこの1年間変化なしです。

○体のだるさ、全体的に痛み どうしたら、楽になるか知りたいです。

○常に病氣と戦いながらの毎日です 油症でなければもっとちがった日々を送れたはずです 補償的にも考えてもらいたいです

○●年経った現在でも、未認定で苦しんでいる被害者がたくさんいます。そして、2世、3世の中にも苦しんでいる方々の1日も早い救済を望みます。

○私の息子の病氣（→・脳の血管の奇形（脳動静脈奇形）・術後の傷が治らない ●年経過するが膿が出る）がカネミ油症と関連性があるのか？

○今現在、脊髄損傷で体全体が麻痺してて また手根管正候郡で指の方までしびれていまして また電気が走って痛みがあったり前立腺肥大の薬もなんじゅうねんも飲んでいますがなかなかおならなくてこまっています。 また今現在車イス状態なのでつえをついてでも一歩でも2歩でも歩けるようになればと思っています。

○今から先、症状や病氣が悪くなったり心配事ができたら 油症相談員や都道府県の窓口で電話したりして 相談できたらと思います。

○油症のために、身体がボロボロになった。哀れなもの！ アメ玉をかむと歯肉出血し、歯がポロッと抜けてしまい黒っぽい血も流れた。皮疹から膿がつぶれ出て臭く、皮フは黒づみ見せもののようにされ、差別も受けた。哀れさ、悲しみ、苦悩は言いつくせない。 ここ最近では、手関節から手首に自然発生的に腫瘤様のふくらみが出現。痛みはさ程ないため放治してる。

○膝の関節痛が著しく正座が出来ない。 ・死亡リスクが高いのでしょうか。

○毎年色々気にかけて頂き、皆様にはありがたく思っております。 ここ何年かじん麻疹に悩まされ、手、足、体に傷が残ってます。 仕事でリフォーム等でホコリ等に負けてるのでしょうか。 年を取ると皮ふも体力も弱くなってます。 油症患者たちがより良い日々がおくれる様にこれから先もよろしくお祈いします。

○今後、新たに発症する病氣が心配

○手指に突然、イボみたいなのができた 油症と関連があるのでしょうか

○過去に胃がん、大腸がんの手術をしたことがありますが、再発が心配です。血液検査で腫瘍マーカーの検査をしてもらいたいと思っています。

○自宅に連絡しないでほしいです。 主人にないしょなのでお願いします。 連絡は姉をお願いします。

○毎年、検診結果の中で、抗核抗体が高度上昇なので、なぜ高いのか早急に研究をしてもらいたい。

○13 ページ介護認定を受けていない方でも回答してください。これに答えたのですが腰と両足のひざ関節がひどく弱ってて外に出る事も少なく家事もやっと言うことで答えております。

○緑内障は以前より気になっていたのですが、（検診での傾向ありとの回答あり）眼科での検査で診断され、不安になっています。急に見えなくなることもありとのことで。白内障もあり今の所、車の運転免許書の更新後に、白内障の手術をしましょうと言われていています。緑内障は点眼薬をいただいています。 右股関節の手術後●年以上経過し、筋肉もつき、長時間の歩きや、立ち仕事は無理ですが、日常生活は痛みなく過ごせており感謝しております。

○毎年の調査ありがとうございます。ご苦労様です。まだ今だにふきで物がします。においが強いので廻りにめいわくすることもあります。どうすることも出来ません どうぞよろしくお祈いします。

○いつもありがとうございます 今後共大変でしょうけどよろしくお祈い致します

○現在治療しているリウマチ（関節リウマチ）のことで、一番症状の重いつきは床から立ち上がれなくて、トイレにも行けないときが、あり日常生活にも支障を来たすようなことが、今後病氣の進行によって起きるのではないかと心配です。

食糧品等の物の値りによって生活が今後できるかどうかの心配もあります。仕事をし働いて生活できる生活がどのくらい維持できるかの心配もあります。

○歯ぐきが全体的にはれて歯医者へ行き血圧の薬の副作用 学会で発表されたばかりと言われ内科の先生へ「歯医者でのせつ明をしました。ごきげん悪くなされ不安になり内科の先生へはわびました。歯医者は、腎臓病があるので他の歯医者は断われ●●病院の内科の先生が探して下さった1件だけでした。慢性腎臓病でとうせきの事を考える事を話されていますが、私も恐さと 心を病んでいる母子家庭の娘が大村で暮らしているので孫も発達しよう害なのでこれからどう生きて行けるか悩んでる日々です。娘もかなりの薬をのみながら栄養ドリンクのんだりして子供をいろんな方へ預けたりで身体から毒性？出す薬とか研究出来ないでしょうか？今、私もし力がかなり低下、両手が余り使えない・全身の痛みボロボロの身体になっているのが恐いです。文字もやっと書いています。急に具合が悪くなるのを先生に上手にせつめいできません 左耳は全くきこえず 数しゆるいのざつ音だけがず〜と 右耳も時々変になりビクビクしています。 全身が痛い です。足の指が変形がひどくなっています。病院も良い返事ないです。 時々足がもつれたようになり つまづいてころびそうになります骨がボキッ？寝返が辛いです。薬ばかりが増えたりほうそう紙が変わったりで薬もむずかしい。体調良い日もありますが前ぶれがなく突然具合が悪くなるのが困ります。体のつかれ方がひどくなったかなーと感じます。うつ病の娘が落ちついている時に私に問いかけました。お母さんを元気にする治療法ってないのかな、自分(娘)が私に話した事も記憶ないみたいで子供達の体だけでも楽になる方法、研究、薬？出でこないのでしょうか 私に苦しいピークの時 子供達も苦しんでいると思うと心が痛みます ねむれません。左お腹の後ろが痛く時々息するのも辛い整形外科？内科？何科に伝えてよいか分からなく病院の受付でたずねたのですが良い返事がなく いつ頃からかを覚えてなくて他の病院も考え中です お薬をいろいろのんでいるためか分かりませんが寝て起き上がる時 時々足のもつれ？フラつき何かにつかまらなると起きられなくて足をかわせずころんだりしています。左耳は、もう治らず右耳が時々耳鳴り雑音両耳のせいでこうなっているかな？考え込んでいる最中で不安がつついています ●●病院へめまいの事や耳の事で電話するも予約がいっぱいでと断われ●●にぐう然にも私がお世話になった病院が有り そこに時々いっていますが医師、スタッフ不足だと聞きました。歯ぐきのはれ方がすごくて部分入れ歯を経験しました。手、足の先が足のしびれた時の感じが時々します 体や足など虫みたいのが付いている気持ちになりムカデ？と思えばやめぬいでみると何もついていなくて何んで？思ったり 服を着るのに苦労しています。何かが原因でしょうけど上手に伝える事が出来ません うつ病の娘と発達障害の孫のことで心がいっぱいになっているのでこう言うのも関係しているのかな？思ったりです。

○いろいろなアレルギーと体の体質との関係について研究をしてもらいたいです。(1年中を通して、食べ物、薬品、季節の変わり目など いつも何かしらのアレルギーに悩まされています。)

○令和●●年に発病した、血小板減少性紫斑病が再発しないか心配しています。高齢なので再発した場合に体力がもつかどうかいまのまま再発しないと良いと思っています。

○手が不充です。何か聞きたい時は●●老人ホームへお願いします。

○平成●●年●●大学病院 受療券が利用ができなかった ひざの手術にいった時です。●●大学病院、じんかんきの先生がシンレンズエコーデ心臓エコーデ、シヨウが有(じじで)のを見て下さって平成●●年●●月●●日入院、手術をたくさん支払しました。平成●●年●●月●●日手術、●●年●●月●●日退院、●●年●●月●●日半年目の検査、フセイミヤク有で●●病院入院 20●●年●●月●●日 ベースメカー植込しています。後、●●年でデンチがなくなります。

○脳下垂体腫瘍 すい頭症 は経過観察中で3ヶ月に1回MRIをとって8月で●●年になります 異常があれば手術しないといけないので 即 ●●大学病院に紹介状を書いてもらって受診したいと思っています 下垂体腫瘍は命がけの手術になるので後遺症もふくめて心配です

○次世代(子や孫)で認定を希望している人は、早急に認定してください。健康問題は非常に深刻な状態です。

カネミライスオイルを直接摂取し、認定を望んでいる人達を一刻も早く認定してください。高齢になりまた、時間が経過した今も被害者が出ています。救済してください。治療法をぜひ見つけてください。今後もよろしくおねがいたします。以上

○歯科に関すること。 虫歯のなりやすさについて。 皮膚科について できもののできやすさについて。

○早く薬を作って欲しい

○カネミ油を食べていなければ・・・と考える日々です

○高齢になり、ご支援ありがとうございます。

○足の爪の黒ずみがずーと続いています。研究してもらいたい。なぜ、右足親指が特にひどい。何か対策はありますか？

○現在血圧が高いのが1日に何回も続いているため、市販の健康食を次から次へと、自分にきく物を買求めて飲んでいきます。なかなか良いのがなくて、今は、イタドリを飲んでます。 それと田七人參も常用しています。身体全体のきついのが楽になるかと思って！！ 少しきついのが軽くなってるかなと思いますがまだ分かりません。

右かたの(じんたい)が切れているので(2本切れている)とても痛いです。後1本なので大事にして下さいといわれています。今右の腕を大事に無理しないように使っています。でも痛いです。

- 前回希望したのですが受療券の利用ができない医療機関が今回送っていただいた「受療券契約医療機関一覧」に載っていませんので残念でした。 20●年●月●日から通っていますが、面倒もあり受診料をカネミ倉庫へ請求していませんでした。 それでかなー?と思い今月分(4月分)より請求してみようと思いました。 それとも耳鼻科は無理だったんでしょうか?とにかく一度請求してみましょー! お疲れ様です。
- 現在婦人科にて何年もけいかんさつで受診中 今回?があると云われ検査中 いつもめまいが頭痛がで薬をはなせない状態
- 受療券を使える医療機関を増やして欲しい。
- 若い時から腎臓病で●才代から高血圧 昨年から腎臓機能の低下で人工透析の事を言われ、年々健康に不安ばかりです。
- ペースメーカーをいれたこと(20●年●月●日) ・腎臓の病気にかかる。左の腎臓に水がたまる。(20●年●月)
- 私達も一生懸命生きています。今後もカネミに関してさらなる研究を要望します。
- 毎日が感謝の日です。毎日一回医者と看護婦が来て薬も取って持って来てくれるので助かっています。
- 今回の肺炎は大変苦しく、死んだ方がましだと思った。娘も年々、身心が弱っていくことが心配でならない。毎年、毎回、調査したとて、私はあきらめがついても娘は何も助けてもらえない。 希望がない。
- 乱視が酷く、涙道閉塞もあるので眼科受診の予定です。 ・頭痛がひどく、毎日、頭痛薬を服薬しております。脳のMRIをとりました。数日後に受診予定しています。 ・尚、末の妹が●歳で、くも膜下出血で年末に入院しました。後遺症もなく退院。現在も定期検査をしています。(●)・(●)●は定期的に月に2回ほど発熱し、これが一週間ほどつづくために、就労することが出来ません。尚、私と同じく難病指定の頸椎後縦靭帯骨化症もあり、日常生活に不安をかかえております。 ・●人とも、同居家族でありながら、未認定患者とされており、母の認定を数十年も前から拒んだのは私です。しかしながら、妹(●)の懇願で調べてもらうと、すぐに認定となりました。この時はじめて妹のつらさを実感しました。 ・せめて医療費をと思う。就労出来ずに、なやみ、くるしんでいる妹が、同居(同一)家族であることで認定を受けられますよう、強くお願いしたいと思います。
- 子供の認定を願っています。生まれてから病気が多く、両親油症患者なので長い間悩んでいます。
- 私は令和●年●月から右眼網膜剥離手術●回した。今は剥離はしていないが、視力0.2ぐらいで物がゆがんで見えます。現状維持で満足するしか無いと諦めてありますが・・・又再々々々剥離するかと心配。令和●年●月脛管拡張の診断。医師はがんのリスク高く大学病院紹介するが私は納得出来なく現状維持。今は年2回、検体検査、MRI 検査受診。初診から●年何にも無く過しているから自分ではがんでは無いと思っている
- 胆石性胆のう炎の手術をしたので食事がきになります。
- 希望した近くの「医院」に「受療券」での受診を要請しても、断られる事がある。自宅の近くの「病院・医院」で対応してもらえるのが一番いいのだが、担当者の方々には負担をかけているが。
- 甲状腺腫について、今は1年に2回ほどエコー検査をしています。悪くならないか不安です。 ・今年の●月に夫が脳梗塞を発症し現在入院中です。検診に行くときは、主人と福岡まで行って受けていました。高齢で1人では行けないし、介護もしないといけなくなるので不安です。
- /●に脳腫瘍にて亡くなりました。記入もしておりませんし今年度該当はしないと思いましたが一応お送り致します。長いことありがとうございました。 助かりました。 ●●●●
- おわび ●●●●死亡は●月●日でしたのでアンケート調査は該当しておりました。 何もかかずに封をしてしまいました。 申し訳ありませんでした。 ●●●●
- 年々体調が悪くなっていくのを考じ先が不安になっています。
- 眠れない。
- 私がカネミ油症であることで孫に身体的な影響があるのかを知りたいです。
- ヒフのかゆい箇所が数箇所あるが、病院に行ってもカネミ油症かどうかわからない等と言って取り合ってもらえない。カネミ油症の事がよく分かっているヒフ科は、どこに行ったらいいのでしょうか?大量の汗をかく事が時々あるが原因がわからないと病院で言われる。カネミと何か関係があるのでしょうか?
- 家族の入退院や介護で日々疲れています。自分の将来も不安に感じており、何か気分転換を考えています。”
- 20●/●月の特定検診にて、いろいろ指摘されて食事や運動を積極的に改善しました。

## 参考資料 調査票

