

1回目接種後

心筋炎が疑われた報告頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | モデルナ社 | |
|-----------|--------|-----|-------|-----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 12～14 | 5.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15～19 | 5.4 | 3.5 | 22.0 | 0.0 |
| 20～24 | 4.1 | 1.8 | 4.5 | 0.0 |
| 25～29 | 1.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 30～34 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 3.1 |
| 35～39 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 1.5 |
| 40～44 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 0.0 |
| 45～49 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 2.6 |
| 50～54 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 1.5 |
| 55～59 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
| 60～64 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.0 |
| 65～69 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 5.6 |
| 70～74 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 6.6 |
| 75～79 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 80～ | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |

心膜炎が疑われた報告頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | モデルナ社 | |
|-----------|--------|-----|-------|-----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 12～14 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15～19 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 20～24 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 1.1 |
| 25～29 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 30～34 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
| 35～39 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
| 40～44 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 45～49 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
| 50～54 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| 55～59 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 60～64 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 65～69 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 70～74 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 75～79 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80～ | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |

注) 令和4年8月5日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

2回目接種後

心筋炎が疑われた報告頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | モデルナ社 | |
|-----------|--------|-----|-------|-----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 12～14 | 43.3 | 4.2 | 154.8 | 0.0 |
| 15～19 | 33.2 | 2.0 | 155.1 | 6.7 |
| 20～24 | 18.8 | 0.0 | 67.0 | 2.2 |
| 25～29 | 12.3 | 1.1 | 41.8 | 2.7 |
| 30～34 | 4.0 | 1.0 | 11.6 | 0.0 |
| 35～39 | 2.9 | 1.2 | 5.0 | 4.6 |
| 40～44 | 4.6 | 0.4 | 4.0 | 1.5 |
| 45～49 | 1.3 | 0.6 | 4.4 | 4.0 |
| 50～54 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 4.4 |
| 55～59 | 1.1 | 0.6 | 3.7 | 0.0 |
| 60～64 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 3.2 |
| 65～69 | 0.9 | 0.0 | 4.1 | 5.6 |
| 70～74 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 75～79 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 80～ | 3.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |

心膜炎が疑われた報告頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | モデルナ社 | |
|-----------|--------|-----|-------|------|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 12～14 | 12.8 | 0.0 | 22.1 | 0.0 |
| 15～19 | 12.2 | 1.0 | 33.0 | 10.0 |
| 20～24 | 9.8 | 0.0 | 11.0 | 1.1 |
| 25～29 | 3.7 | 0.5 | 6.1 | 1.3 |
| 30～34 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 1.5 |
| 35～39 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 40～44 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 45～49 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
| 50～54 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 1.5 |
| 55～59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60～64 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 65～69 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 70～74 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75～79 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 80～ | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |

注) 令和4年8月5日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心筋炎が疑われた報告頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | モデルナ社 | |
|-----------|--------|-----|-------|-----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 12～14 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15～19 | 17.9 | 0.0 | 54.1 | 0.0 |
| 20～24 | 5.0 | 1.2 | 23.3 | 2.7 |
| 25～29 | 0.0 | 4.3 | 11.9 | 2.8 |
| 30～34 | 2.6 | 1.0 | 5.9 | 0.0 |
| 35～39 | 2.2 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| 40～44 | 1.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 45～49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50～54 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55～59 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
| 60～64 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 |
| 65～69 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70～74 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.0 |
| 75～79 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80～ | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.0 |

心膜炎が疑われた報告頻度 (100万回接種あたり)

| 年齢 (歳) | ファイザー社 | | モデルナ社 | |
|-----------|--------|-----|-------|-----|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 12～14 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15～19 | 9.6 | 0.0 | 16.2 | 0.0 |
| 20～24 | 3.3 | 3.7 | 7.3 | 0.0 |
| 25～29 | 2.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 30～34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 35～39 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 40～44 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.0 |
| 45～49 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 |
| 50～54 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.0 |
| 55～59 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60～64 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 65～69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70～74 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 75～79 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80～ | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |

注) 令和4年8月5日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。