

令和5年3月7日

「平成28年国民健康・栄養調査報告」について、「正誤表」のとおり訂正いたしました。

平成28年国民健康・栄養調査報告 調査の概要

9. 本書利用上の留意点（6） 血圧の分類

（正）

	収縮期血圧 (最高血圧) (mmHg)	拡張期血圧 (最低血圧) (mmHg)
至適血圧	<120	かつ <80
正常血圧	<u>120-129</u>	かつ / または <u>80-84</u>
正常高値血圧	130-139	かつ / または 85-89
(略)	(略)	(略)

（誤）

	収縮期血圧 (最高血圧) (mmHg)	拡張期血圧 (最低血圧) (mmHg)
至適血圧	<120	かつ <80
正常血圧	<u><130</u>	かつ / または <u><85</u>
正常高値血圧	130-139	かつ / または 85-89
(略)	(略)	(略)

令和5年3月7日

「平成29年国民健康・栄養調査報告」について、「正誤表」のとおり訂正いたしました。

平成29年国民健康・栄養調査報告 調査の概要

8. 本書利用上の留意点（6） 血圧の分類

（正）

	収縮期血圧 (最高血圧) (mmHg)	拡張期血圧 (最低血圧) (mmHg)
至適血圧	<120	かつ <80
正常血圧	<u>120-129</u>	かつ / または <u>80-84</u>
正常高値血圧	130-139	かつ / または 85-89
(略)	(略)	(略)

（誤）

	収縮期血圧 (最高血圧) (mmHg)	拡張期血圧 (最低血圧) (mmHg)
至適血圧	<120	かつ <80
正常血圧	<u><130</u>	かつ / または <u><85</u>
正常高値血圧	130-139	かつ / または 85-89
(略)	(略)	(略)

(正)

第101表の2 血清総コレステロールが240mg/dL 以上の者の割合の年次推移(性・年齢階級別)
Trends in the Percentage of Subjects with High Serum Total Cholesterol (≥240mg/dL), 2003 to 2017

		15年 2003	16年 2004	17年 2005	18年 2006	19年 2007	20年 2008	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015	28年 2016	29年 2017
男性	総数 Total	11.5	12.1	11.2	11.8	10.8	10.3	10.4	12.6	10.2	9.8	10.3	10.8	9.8	9.8	12.4
	年齢調整値 Age-adjusted	11.3	12.7	11.3	11.4	10.6	10.5	10.0	12.9	11.2	9.8	11.1	10.9	10.2	10.0	12.9
	20～29歳	2.5	8.5	2.5	0.9	3.4	6.0	3.3	5.3	5.5	2.1	7.7	3.8	3.5	4.9	3.4
	30～39歳	13.7	15.3	13.3	11.3	11.5	11.9	9.1	13.6	13.3	10.9	11.9	9.3	11.4	10.1	11.1
	40～49歳	16.3	18.8	14.8	19.2	14.8	11.8	15.5	20.6	17.5	13.8	14.8	16.1	16.3	11.8	19.5
	50～59歳	17.5	13.4	16.3	14.5	15.8	16.8	16.2	17.8	18.6	15.1	14.5	18.7	12.7	15.6	21.4
	60～69歳	11.7	9.6	9.6	15.6	12.1	9.9	11.7	13.2	7.0	10.7	12.3	14.0	10.5	11.0	14.3
	70歳以上	5.8	10.7	10.0	6.1	5.8	7.1	4.7	7.1	6.0	6.1	6.0	4.1	6.5	6.8	7.4
女性	総数 Total	16.9	17.8	18.5	16.9	17.1	16.7	16.0	18.1	16.4	14.7	16.8	17.4	17.8	17.3	19.8
	年齢調整値 Age-adjusted	14.8	15.7	16.0	14.9	15.1	14.6	13.9	15.8	14.7	13.3	14.7	15.3	15.7	15.3	17.3
	20～29歳	3.3	3.7	3.2	4.1	2.5	4.9	1.4	6.7	4.7	4.9	2.7	4.7	7.1	6.0	6.1
	30～39歳	6.3	4.6	4.8	3.5	6.4	6.6	5.3	5.6	6.2	5.8	6.4	7.8	5.8	6.7	7.0
	40～49歳	10.9	12.3	14.3	11.3	12.1	10.7	12.2	11.0	9.4	10.6	8.5	12.6	14.3	9.9	11.6
	50～59歳	29.0	30.5	26.3	30.2	26.1	29.7	25.6	26.8	28.4	24.3	29.0	28.4	27.0	28.1	31.1
	60～69歳	24.8	25.5	27.8	23.9	25.2	23.3	24.5	28.7	26.7	21.5	25.1	23.7	26.3	24.6	30.4
	70歳以上	13.1	15.7	17.2	14.9	16.0	11.7	12.6	14.7	11.8	11.8	14.6	13.4	12.9	15.3	16.3

注1) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む。
注2) 平成24年、28年は抽出率等を考慮した全国補正值である。
注3) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

(誤)

第101表の2 血清総コレステロールが240mg/dL 以上の者の割合の年次推移(性・年齢階級別)
Trends in the Percentage of Subjects with High Serum Total Cholesterol (≥240mg/dL), 2003 to 2017

		15年 2003	16年 2004	17年 2005	18年 2006	19年 2007	20年 2008	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015	28年 2016	29年 2017
男性	総数 Total	11.5	12.1	11.2	11.8	10.8	10.3	10.4	12.6	10.2	9.8	10.3	10.8	9.8	9.8	12.4
	年齢調整値 Age-adjusted	11.3	12.7	11.3	11.4	10.6	10.5	10.0	12.9	11.2	9.8	11.1	10.9	10.2	10.0	12.9
	20～29歳	2.5	8.5	2.5	0.9	3.4	6.0	3.3	5.3	5.5	2.1	7.7	3.8	3.5	4.9	3.4
	30～39歳	13.7	15.3	13.3	11.3	11.5	11.9	9.1	13.6	13.3	10.9	11.9	9.3	11.4	10.1	11.1
	40～49歳	16.3	18.8	14.8	19.2	14.8	11.8	15.5	20.6	17.5	13.8	14.8	16.1	16.3	11.8	19.5
	50～59歳	17.5	13.4	16.3	14.5	15.8	16.8	16.2	17.8	18.6	15.1	14.5	18.7	12.7	15.6	21.4
	60～69歳	11.7	9.6	9.6	15.6	12.1	9.9	11.7	13.2	7.0	10.7	12.3	14.0	10.5	11.0	14.3
	70歳以上	5.8	10.7	10.0	6.1	5.8	7.1	4.7	7.1	6.0	6.1	6.0	4.1	6.5	6.8	7.4
女性	総数 Total	16.9	17.8	18.5	16.9	17.1	16.7	16.0	18.1	16.4	14.7	16.8	17.4	17.8	17.3	19.8
	年齢調整値 Age-adjusted	14.8	15.7	16.0	14.9	15.1	14.6	13.9	15.8	14.7	13.3	14.7	15.3	15.7	15.3	17.3
	20～29歳	3.3	3.7	3.2	4.1	2.5	4.9	1.4	6.7	4.7	4.9	2.7	4.7	7.1	6.0	6.1
	30～39歳	6.3	4.6	4.8	3.5	6.4	6.6	5.3	5.6	6.2	5.8	6.4	7.8	5.8	6.7	7.0
	40～49歳	10.9	12.3	14.3	11.3	12.1	10.7	12.2	11.0	9.4	10.6	8.5	12.6	14.3	9.9	11.6
	50～59歳	29.0	30.5	26.3	30.2	26.1	29.7	25.6	26.8	28.4	24.3	29.0	28.4	27.0	28.1	68.9
	60～69歳	24.8	25.5	27.8	23.9	25.2	23.3	24.5	28.7	26.7	21.5	25.1	23.7	26.3	24.6	30.4
	70歳以上	13.1	15.7	17.2	14.9	16.0	11.7	12.6	14.7	11.8	11.8	14.6	13.4	12.9	15.3	16.3

注1) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む。
注2) 平成24年、28年は抽出率等を考慮した全国補正值である。
注3) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

令和5年3月7日

「平成30年国民健康・栄養調査報告」について、「正誤表」のとおり訂正いたしました。

平成30年国民健康・栄養調査報告 調査の概要

8. 本書利用上の留意点（6） 血圧の分類

（正）

	収縮期血圧 (最高血圧) (mmHg)	拡張期血圧 (最低血圧) (mmHg)
至適血圧	<120	かつ <80
正常血圧	<u>120-129</u>	かつ / または <u>80-84</u>
正常高値血圧	130-139	かつ / または 85-89
(略)	(略)	(略)

（誤）

	収縮期血圧 (最高血圧) (mmHg)	拡張期血圧 (最低血圧) (mmHg)
至適血圧	<120	かつ <80
正常血圧	<u><130</u>	かつ / または <u><85</u>
正常高値血圧	130-139	かつ / または 85-89
(略)	(略)	(略)

令和5年3月7日

「令和元年国民健康・栄養調査報告」について、「正誤表」のとおり訂正いたしました。

令和元年国民健康・栄養調査報告 調査の概要

8. 本書利用上の留意点（6） 血圧の分類

（正）

	収縮期血圧 (最高血圧) (mmHg)	拡張期血圧 (最低血圧) (mmHg)
至適血圧	<120	かつ <80
正常血圧	<u>120-129</u>	かつ / または <u>80-84</u>
正常高値血圧	130-139	かつ / または 85-89
(略)	(略)	(略)

(「日本高血圧学会 (2014 年)」による血圧の分類 より)

（誤）

	収縮期血圧 (最高血圧) (mmHg)	拡張期血圧 (最低血圧) (mmHg)
至適血圧	<120	かつ <80
正常血圧	<u><130</u>	かつ / または <u><85</u>
正常高値血圧	130-139	かつ / または 85-89
(略)	(略)	(略)

(「高血圧治療ガイドライン 2019 年」による血圧の分類 より)